



22C. 166.

Dr. Bennett F. Davenport,  
751 TREMONT ST.  
BOSTON, - - MASS.
















RECEIVED  
JAN 10 1900  
1899



mk 11.90

Davenport

1/2 van

Dr. Bennett F. Davenport,  
751 TREMONT ST.  
BOSTON, - - MASS.

# Handbuch der gesamten Arzneimittellehre.

Mit besonderer Rücksichtnahme auf die zweite Auflage  
der Deutschen Pharmakopoe

für  
Aerzte und Studirende

bearbeitet

von

**Dr. med. Theodor Husemann,**  
Professor in Göttingen.

Zweite umgearbeitete Auflage.

In zwei Bänden.

**Zweiter Band.**



**Berlin.**  
Verlag von Julius Springer.  
1883.

1914-1915  
To the  
AM - 1914-1915



Dr. Bennett F. Davenport,  
751 TREMONT ST.  
BOSTON, - - MASS.

# Handbuch der gesamten Arzneimittellehre.

Mit besonderer Rücksichtnahme auf die zweite Auflage  
**der Deutschen Pharmakopoe**

für  
Aerzte und Studirende

bearbeitet

von

**Dr. med. Theodor Husemann,**  
Professor in Göttingen.

---

Zweite umgearbeitete Auflage.

In zwei Bänden.

**Zweiter Band.**



**Berlin.**  
Verlag von Julius Springer.  
1883.

14463

Digitized by the Internet Archive  
in 2011 with funding from  
Open Knowledge Commons and Harvard Medical School



# Inhalt des zweiten Bandes.

	Seite
VII. Classe. Erethistica, Reizende Arzneimittel . . .	516

## 1. Ordnung. Dermerethistica, Hautreizende Mittel . . . . .

Cantharides, Spanische Fliegen . . . . .	517
Acidum formicicum, Ameisensäure . . . . .	527
Brennnesseln, Quallen u. Medusen . . . . .	528
Euphorbium . . . . .	528
Assacu u. a. . . . .	529
Cortex Mezerei, Seidelbastrinde . . . . .	529
Resina Thapsiae . . . . .	530
Cardoleum, Cardol . . . . .	530
Fructus Capsici, Spanischer Pfeffer . . . . .	531
Piper Cayennense, P. nigrum u. s. w. . . . .	533
Semen Sinapis, Senf. Oleum Sinapis, Senföl . . . . .	534
Semen Sinapis albae . . . . .	537
Meerrettig, Knoblauch u. verwandte Drogen . . . . .	538
Frondes Thujae, Lebensbaum . . . . .	538
Oleum Rosmarini, Rosmarinöl . . . . .	538
Flores und Oleum Lavandulae, Lavendel . . . . .	540
Herba Thymi und Herba Serpylli, Gartenthymian und Quendel . . . . .	541
Erethistische Labiaten . . . . .	542
Terebinthina, Terpenthin. Colophonium, Geigenharz . . . . .	542

	Seite
Elemi . . . . .	547
Galbanum, Mutterharz . . . . .	547
Ammoniacum, Ammoniakgummi . . . . .	548
Sonstige reizende Harze . . . . .	549
Olibanum, Weihrauch . . . . .	549
Succinum, Bernstein . . . . .	550
Pix liquida, Theer. . . . .	550
Oleum Juniperi empyreumaticum, Kadeöl . . . . .	554
Resineon. Nicht officinelle Theerarten . . . . .	555
Naphthol . . . . .	555
Chrysarobinum, Chrysarobin . . . . .	555
Acidum pyrogallicum, Pyrogallussäure . . . . .	556
2. Ordnung. Stomerethistica, Mundreizende Mittel . . . . .	558
Herba Cochleariae, Löfelkraut . . . . .	558
Verwandte Cruciferen . . . . .	559
Folia Salviae, Salbeiblätter . . . . .	559
Myrrha, Myrrhe . . . . .	561
Oleum Cajeputi, Cajeputöl . . . . .	563
Radix Pyrethri, Bertramswurzel . . . . .	563
Herba Spilanthis, Parakresse . . . . .	564
3. Ordnung. Stomachere-thistica, Magenreizende Mittel . . . . .	564
a. Stomachica, Verdauungsbefördernde Magenreizmittel . . . . .	565

	Seite		Seite
Fructus Cardamomi, Kar-		Natrium sulfuricum, Na-	
damomen . . . . .	565	triumsulfat . . . . .	609
Rhizoma Galangae, Gal-		Alkalisch- salinische	
gant . . . . .	565	Quellen . . . . .	610
Rhizoma Zedoariae, Zitt-		Sal Carolinum factitium,	
wer . . . . .	566	Karlsbader Salz . . . . .	611
Rhizoma Zingiberis, Ing-		Magnesium sulfuricum,	
wer . . . . .	566	Magnesiumsulfat . . . . .	611
Semina Myristicae, Mus-		Bitterwässer . . . . .	612
catnuss. Oleum Ma-		Kalium sulfuricum, Ka-	
cidis, Macisöl . . . . .	567	liumsulfat . . . . .	612
Fructus Lauri, Lorbeeren	568	Radix Rhei, Rhabarber-	
Cortex Cinnamomi, Chi-		wurzel . . . . .	613
nesisch. Zimmt. Oleum		Folia Sennae, Sennes-	
Cinnamomi, Zimmtöl.	569	blätter . . . . .	618
Cortex Canellae, Malam-		Cortex Frangulae, Faul-	
bo etc. . . . .	571	baumrinde . . . . .	622
b. Emetica, Brechmittel	572	Fructus Rhamni cathar-	
Tartarus stibiatus, Brech-		ticae, Kreuzdornbee-	
weinstein . . . . .	572	ren . . . . .	623
Radix Ipecacuanhae,		Aloë . . . . .	624
Brechwurzel . . . . .	582	Herba Gratiolae, Linum	
Flores Violarum; Radix		catharticum . . . . .	628
Asari; Radix Vince-		Tubera Jalapae, Jalapen-	
toxici . . . . .	589	knollen . . . . .	628
Apomorphinum hydro-		Radix Scammoniae,	
chlorium, salzsaures		Scammonia wurzel . . . . .	631
Apomorphin . . . . .	589	Stipites Jalapae; Mecho-	
4. Ordnung. Entererethi-		acanha; Radix Tur-	
stica, Darmreizende		pethi . . . . .	631
Mittel . . . . .	593	Podophyllum, Podo-	
Manna . . . . .	593	phyllin . . . . .	632
Mannaarten; Cassia fis-		Cholagoga der Eklekti-	
tula . . . . .	595	ker . . . . .	633
Oleum Ricini, Ricinusöl	595	Fructus Colocythidis,	
Magnesium carbonicum,		Koloquinten . . . . .	634
weisse Magnesia. Mag-		Radix Bryoniae, Elate-	
nesia usta, gebrannte		rium . . . . .	636
Magnesia . . . . .	599	Gutti, Gummigutt . . . . .	636
Magnes. citricum effer-		Oleum Crotonis, Crotonöl	639
vescens, Brausemag-			
nesia . . . . .	603	III. Abtheilung. Allgemeine	
Magnesium aceticum, lac-		Arzneimittel, Pansoma-	
ticum u. tartaricum	604	tica . . . . .	643
Tartarus depuratus, Wein-		VIII. Classe. Plastica, Plas-	
stein . . . . .	604	tische Mittel . . . . .	643
Traubencuren . . . . .	605	1. Ordnung. Plastica	
Kalium tartaricum, Ka-		amara, bittere Medica-	
liumtartrat . . . . .	606	mente . . . . .	645
Tartarus natronatus,		Radix Gentianae, Enzi-	
Kaliumnatriumtartrat	607	anwurzel . . . . .	645
Tart. boraxatus, Borax-		Folia Trifolii fibrini,	
weinstein . . . . .	607	Fieberkleeblätter . . . . .	647
Natrium phosphoricum,		Herba Centaurii, Tau-	
Natriumphosphat . . . . .	608	sendgüldenkraut . . . . .	647
Natrium sulfovinicum u.		Bittere Gentianeen . . . . .	647
sulfomethylicum . . . . .	608	Herba Cardui benedicti,	
		Cardobenedictenkraut	647



	Seite		Seite
Calcitrapa, Krebsdistel, Mariendistel . . . . .	648	Alkalische Quellen . . . . .	689
Lignum Quassiae, Quas- sia . . . . .	648	Kalium carbonicum und bicarbonicum, Kali- umcarbonat und Ka- liumbicarbonat . . . . .	690
Simaruba, Bittera, Ce- dronsamen und Val- divianüsse . . . . .	650	Calcium phosphoricum, Calciumphosphat . . . . .	692
Radix Colombo, Colom- bowurzel . . . . .	650	Calcium carbonicum praecipitatum, Cal- ciumcarbonat. . . . .	695
Berberinhaltige Drogen . . . . .	652	Erdige Mineralquellen . . . . .	696
Lichen Islandicus, Islän- disch Moos . . . . .	652	Aqua Calcariae, Kalk- wasser . . . . .	696
Bittere Flechten . . . . .	654	Zuckerkalk, Chlorcalci- um, Calcium hypo- phosphorosum . . . . .	698
Folia Farfarae, Huflat- tigblätter . . . . .	654	Martialia, Eisenpräpa- rate . . . . .	699
Pulmonaria; Hedera ter- restris; Marrubium; Herba Galeopsidis . . . . .	654	Ferrum pulveratum, Fer- rum reductum, Eisen- pulver . . . . .	705
Lignum Anacahuite; Her- ba Polygalae . . . . .	655	Ferrum oxydulatum, Ei- senoxydul . . . . .	706
Fructus Aurantii immat- uri, Pomeranzen. Cort. fructus Auran- tii, Pomeranzenschale . . . . .	655	Ferr. oxydatum fuscum, Eisenhydroxyd . . . . .	706
Rhizoma Calami, Cal- muswurzel . . . . .	657	F. o. saccharatum solu- bile, Eisenzucker . . . . .	707
Cortex Cascarillae, Cas- karillrinde . . . . .	658	F. carbonicum sacchara- tum, zuckerhaltiges Ferrocarbonat. Pilu- lae Ferri carbonici, Eisenpillen . . . . .	708
Cortex Angusturae . . . . .	659	Eisenhaltige Mineral- wässer . . . . .	709
Herba Absinthii, Wer- muth . . . . .	659	Ferrum lacticum, Ferro- lactat . . . . .	710
Iva und Genippkräuter . . . . .	661	Extractum Ferri poma- tum . . . . .	710
Herba Millefolii . . . . .	661	Citrate, Tartrate und Phosphate des Eisens . . . . .	710
Radix Taraxaci cum her- ba, Löwenzahn . . . . .	662	Eisenalbuminat, Ferrum albuminatum . . . . .	713
Fumaria, Cichorium . . . . .	663	F. chloratum, Eisen- chlorür . . . . .	713
Glandulae Lupuli, Hop- fenmehl . . . . .	664	Liquor Ferri acetici, Fer- riacetatlösung . . . . .	714
2. Ordnung. Plastica pep- tica, Verdauende pla- stische Mittel . . . . .	665	Ferr. sulfuricum, Ferro- sulfat . . . . .	715
Pepsinum, Pepsin . . . . .	665	F. sesquichloratum, Ei- senchlorid . . . . .	716
Ingluvin; Papain; Pan- creatin . . . . .	666	F. iodatum, Eiseniodür . . . . .	720
Acidum hydrochloricum, Reine Salzsäure . . . . .	667	F. iodicum, bromatum etc. . . . .	722
Fel Tauri, Ochsen-galle . . . . .	671	Manganum sulfuricum, Mangansulfat . . . . .	724
3. Ordnung. Plastica di- recta, Direct plastisch wirkende Mittel . . . . .	672	Extractum carnis, Fleisch- extract . . . . .	724
Natrium chloratum, Na- triumchlorid . . . . .	673	Fleisch, Caro . . . . .	725
Natürlich vorkommende Kochsalzwässer . . . . .	677	Peptone . . . . .	727
Natrium carbonicum und bicarbonicum, Natri- umcarbonat und Natri- umbicarbonat . . . . .	681		

	Seite		Seite
Solutio carnis, Fleisch-		Barium chloratum . . .	805
solution . . . . .	729	Acidum arsenicosum, Ar-	
Blut, Sanguis . . . . .	729	senige Säure. Liquor	
Hühnereier, Ova galli-		Kalii arsenicosi, Fow-	
nacea . . . . .	729	lersche Lösung . . .	805
Serum lactis, Molken . .	730	Sonstige Arsenikalien .	818
Milch, Lac . . . . .	732	Phosphorus, Phosphor .	818
Kumiss, Kumys . . . . .	734	Kalium sulfuratum, Kali-	
Oleum jecoris aselli, Le-		schwefelleber . . . . .	821
berthran . . . . .	736	Schwefellebern u. Schwe-	
Oleum pedum tauri u. s. w.	740	felwasser . . . . .	825
Malzextract u. a. Prä-		Aqua, Wasser . . . . .	827
parate der Gerste . . .	740		
Cerealien . . . . .	743	2. Ordnung. Antidyscrati-	
Leguminosen . . . . .	744	tica organica, Organi-	
Semen Cacao, Cacaoboh-		sche antidyskratische	
nen . . . . .	745	Mittel . . . . .	829
Amylum Marantae, Ma-		Rad. Sarsaparillae, Sassa-	
rantastärke . . . . .	746	parille . . . . .	829
Sago . . . . .	747	Rhizoma Chinae, China-	
Racahout; Eichelkaffee	747	wurzel . . . . .	831
		Lignum Sassafras, Sassa-	
		fras . . . . .	832
		Lignum Guajaci, Guajak-	
		holz . . . . .	833
		Tayuya . . . . .	834
		Rhizoma Caricis . . . .	835
		Folia Juglandis, Wal-	
		nussblätter . . . . .	835
		Radix Bardanae; Radix	
		Carlinae . . . . .	835
		Rad. Saponariae, Seifen-	
		wurzel . . . . .	836
		Stipites Dulcamarae . .	837
		Herba Violae tricoloris,	
		Freisamkraut . . . . .	837
		Folia Toxicodendri, Gift-	
		sumach . . . . .	838
		Herbae Pulsatillae, Kü-	
		chenschelle . . . . .	838
		Herbae Chelidonii, Schöll-	
		kraut . . . . .	839
		Rad. Sanguinariae, Blut-	
		wurzel . . . . .	839
		Cortex Condurango, Con-	
		durangorinde . . . . .	841
		Vegetabil. Krebsmittel	
		und Antileprosa . . .	841
		Semen Colchici, Zeit-	
		losensamen . . . . .	842
		Vegetabilische Antirheu-	
		matica . . . . .	845
		X. Classe. Antipyretica, Fie-	
		bermittel . . . . .	846
		1. Ordnung. Antipyretica	
		antitypica, Antitypi-	
		sche Fiebermittel . .	846
		Cortex Chinae, China-	

IX. Classe. Antidyscratica, Antidyskratische Arzneimittel . . . . . 748

1. Ordnung. Antidyscratica anorganica, Anorganische antidyskratische Arzneimittel . . . 748

Stibium sulfuratum nigrum, Spiessglanz . . . . . 749

Mercurialia, Quecksilberpräparate . . . . . 749

Hydrargyrum, Quecksilber . . . . . 759

Hydr. oxydatum, Rother Präcipitat . . . . . 764

Hydr. chloratum, Quecksilberchlorür . . . . . 765

H. bichloratum, Quecksilbersublimat . . . . . 769

Hydr. praecipitatum album, Weisser Quecksilberpräcipitat . . . . . 773

Hydr. iodatum, Quecksilberiodür . . . . . 774

Hydr. biiodatum, Quecksilberiodid . . . . . 775

Hydr. cyanatum, Cyanquecksilber . . . . . 776

Nichtofficinelle Mercurialien . . . . . 777

Auro-Natrium chloratum, Chlorgoldnatrium . . . . . 780

Platinsalze . . . . . 782

Iodum, Iod. Kalium iodatum, Iodkalium . . . . . 782

Iodoformium, Iodoform . . . . . 798

Sonstige Iodverbindungen . . . . . 802



	Seite		Seite
rinde. Alcaloidea corticum Chinae, Chinaalkaloide . . . . .	846	augen. Strychn. nitricum, Strychninnitrat	913
Bebeerin, Eucalyptus, Salicin, Chinolin u. a. Surrogate der Chinaalkaloide . . . . .	868	Physostigminum salicylicum, Physostigminsalicylat . . . . .	924
2. Ordnung. Antipyretica pura, Reine Fiebermittel . . . . .	871	Ditain . . . . .	929
Acidum tartaricum, Weinsäure . . . . .	872	3. Ordnung. Neurotica encephalica. Vorzugsweise auf das Gehirn wirkende Nervenmittel	929
Acidum citricum, Citronensäure . . . . .	873	a. Encephalica analeptica, belebende Hirnmittel . . . . .	930
Fructus Citri, Citronen	874	Moschus, Moschus . . . . .	930
Syrupus Cerasi, Kirschen-syrup . . . . .	875	Castoreum, Bibergeil . . . . .	933
Syrupus Rubi Idaei, Himbeersyrup . . . . .	876	Hyraceum . . . . .	934
Succus Sambuci inspissatus u. saure Früchte	876	Oleum Terebinthinae, Terpenthinöl . . . . .	935
Pulpa Tamarindorum, Tamarindenmus . . . . .	877	Camphora, Campher . . . . .	941
Acidum phosphoricum, Phosphorsäure . . . . .	878	Radix Serpentariae . . . . .	949
Kalium nitricum, Salpeter	880	Radix Valerianae, Baldrianwurzel . . . . .	949
Natrium nitricum, Gereinigter Chilisalpeter . . . . .	885	Herba Chenopodii ambrosioidis . . . . .	953
Ammonium nitricum u. Sulfocyankalium . . . . .	886	Sadix Artemisiae, Beifusswurzel . . . . .	953
Veratrinum. Rhizoma Veratri, Weisses Nieswurzel . . . . .	886	Rad. u. Flores Arnicae, Wohlverleih . . . . .	953
Veratrum Lobelianum, V. viride etc. . . . .	891	Flores Chamomillae vulgaris, Kamille . . . . .	955
Folia Digitalis, Fingerhutkraut . . . . .	892	Folia Menthae piperitae, Pfefferminz . . . . .	957
IV. Abtheilung. Entfernt wirkende Arzneimittel, Medicamenta teledynamica . . . . .	903	Folia Menthae crispae, Krauseminz . . . . .	959
XI. Classe. Neurotica, Nervenmittel . . . . .	903	Fructus Carvi, Kümmel	960
1. Ordnung. Neurotica peripherica, Vorzugsweise auf das periphere Nervensystem wirkende Nervenmittel	903	Fructus Cumini . . . . .	960
Herba Conii, Schierlingskraut . . . . .	904	Radix Angelicae, Engelwurz . . . . .	961
Curare . . . . .	910	Rhizoma Imperatoriae, Meisterwurz . . . . .	962
2. Ordnung. Neurotica spinalia, besonders auf das Rückenmark wirkende Mittel . . . . .	913	Asa foetida, Stinkasant	962
Semen Strychni, Krähen-		Sagapenum, Radix Sumbul u. s. w. . . . .	964
		Coffeinum, Kaffeein . . . . .	965
		Pasta Guarana . . . . .	968
		Kaffee und Thee . . . . .	968
		Folia Cocae . . . . .	970
		Acidum succinicum und Oleum Succini . . . . .	972
		Spiritus, Weingeist. Spiritus dilutus, verdünnter Weingeist. Vinum, Wein. Spiritus Vini Cognac, Cognac . . . . .	973
		Amylalkohol; Methylalkohol; Allylalkohol . . . . .	987
		Ammoniakpräparate, Ammoniacalia . . . . .	987

	Seite		Seite
Liquor Ammonii caustici, Ammoniak . . . . .	988	d. Encephalica mydria- tica, Pupillenerwei- ternde Hirnmittel . . . . .	1078
Ammonium carbonicum, Ammoniumcarbonat . . . . .	994	Atropinum sulfuricum, Atropinsulfat. Folia Belladonnae, Toll- kirschenblätter . . . . .	1078
Ammonium valeriani- cum . . . . .	997	Folia Stramonii, Stech- apfelblätter . . . . .	1094
Semen Cocculi, Kok- kelskörner . . . . .	998	Folia Hyoscyami, Bil- senkraut . . . . .	1096
b. Encephalica anaesthe- tica, Anästhesirende Hirnmittel . . . . .	999	Duboisin; Homatropin . . . . .	1100
Kohlensäure, Acidum carbonicum . . . . .	1001	4. Ordnung. Neurotica cerebrospinalia, Auf Gehirn u. Rückenmark gleichzeitig wirkende Mittel . . . . .	1101
Nitrogenum oxydula- tum, Stickstoffoxydul . . . . .	1005	Kalium bromatum, Ka- liumbromid . . . . .	1101
Carboneum sulfuratum, Schwefelkohlenstoff . . . . .	1008	Ammonium bromatum, Bromammonium . . . . .	1110
Aether, Aethyläther . . . . .	1009	Surrogate des Brom- kaliums . . . . .	1110
Aether aceticus, Essig- äther . . . . .	1016	Zincum oxydatum, Zink- oxyd . . . . .	1112
Verschiedene Ester . . . . .	1016	Wismutvalerianat; Zinn- präparate; Cerium- verbindungen . . . . .	1114
Chloroformium, Chloro- form . . . . .	1017	Oleum animale aethe- reum, Aetherisches Thieröl . . . . .	1115
Methylchlorür; Methy- lenbichlorid . . . . .	1029	Amygdalae amarae, Bittere Mandeln . . . . .	1116
Zweifach Chlorkohlen- stoff; Bromoform . . . . .	1030	Folia Nicotianae, Ta- baksblätter . . . . .	1125
Spiritus Aetheris chlo- rati; Aethylbromid, Aethyliodid . . . . .	1030	Herba Lobeliae, Lobe- lienkraut . . . . .	1132
Aethylidenchlorid; Elayl- chlorür . . . . .	1031	Cortex Quebracho; Ra- dix Gelsemii . . . . .	1134
Aether anaestheticus; Monoäthylidenchlo- rid; Amylen . . . . .	1032	Flores Narcissi . . . . .	1135
c. Encephalica hypno- tica, Schlafmachende Hirnmittel . . . . .	1032	Tubera Aconiti, Eisen- hutknollen . . . . .	1135
Opium et Alcaloidea Opii, Opium und Opiumalkaloide . . . . .	1033	5. Ordnung. Neurotica vasomotoria, Vorzugs- weise auf die Vasomo- toren wirkende Stoffe . . . . .	1142
Fructus Papaveris im- maturi, Unreife Mohn- köpfe . . . . .	1060	Amylium nitrosum, Amylnitrit . . . . .	1142
Flores Rhoeados . . . . .	1060	Spiritus Aetheris ni- trosi, versüsster Sal- petergeist . . . . .	1144
Lactucarium, Giftlat- tichsaft . . . . .	1061	XII. Classe. Pneumatica, Respirationsmittel . . . . .	1146
Herba Cannabis Ind- icae, Indisch. Hanf . . . . .	1062	Radix Senegae, Senega- wurzel . . . . .	1146
Wrightia antidysente- rica; Piscidia ery- thrina . . . . .	1066	Radix Pimpinellae, Bi- bernellwurzel . . . . .	1148
Chloralum hydratum, Chloralhydrat . . . . .	1066		
Butylchloral; Acetal; Paraldehyd . . . . .	1078		



	Seite		Seite
Fructus Anisi vulgaris, Anis. Oleum Anisi, Anisöl . . . . .	1148	Cainca; Blatta . . . .	1174
Sternanis . . . . .	1149	Fructus Juniperi, Wa- cholderbeeren. Oleum Juniperi, Wachol- deröl . . . . .	1174
Lippia; Chekan; Folia Myrthi . . . . .	1150	Radix Levistici, Lieb- stöckelwurzel . . . .	1176
Turiones Pini; Gemmae Populi . . . . .	1150	Fructus Petroselini . .	1176
Fructus Phellandrii, Wasserfenchel . . . .	1151	Apium; Ammi; Pyrola; Bucco . . . . .	1177
Scabiosa; Drosera . . .	1151	Erigeron; Ballota; Se- dum . . . . .	1178
Stibium sulfuratum aurantiacum, Gold- schwefel . . . . .	1151	Kalium aceticum, Ka- liumacetat . . . . .	1178
Ammonium chloratum, Ammoniumchlorid . . .	1153	Kalium citricum . . . .	1178
		Natrium aceticum, Na- triumacetat . . . . .	1179
		Urea nitrica . . . . .	1180
XIII. Classe. Dermatica, Hautmittel . . . . .	1157	2. Ordnung. Nephrica li- tholytica, Steinlösende Nierenmittel . . . . .	1180
1. Ordnung. Hidrotica, Schweissstreibende Mittel . . . . .	1157	Lithium carbonicum, Lithiumcarbonat . . . .	1180
Flores Sambuci, Ho- lunderblüthen . . . . .	1157	Borax, Natriumborat . .	1181
Flores Tiliae. Linden- blüthen . . . . .	1158	Magnesium boro-citri- cum; Ammonium- phosphat . . . . .	1182
Flores Primulae . . . .	1159	Vegetabilische steinlö- sende Mittel . . . . .	1183
Folia Jaborandi, Jabo- randiblätter. Pilo- carpinum nitricum, Pilocarpinnitrat . . . .	1159	XV. Classe. Genica, Sexu- almittel . . . . .	1184
Liquor Ammonii acetici, Ammoniumacetatlö- sung . . . . .	1164	1. Ordnung. Antiblennor- rhagica, Trippermittel . .	1184
2. Ordnung. Schweiss- vermindernde Haut- mittel . . . . .	1165	Cubebae, Cubeben . . .	1184
Boletus laricis, Lärchen- schwamm . . . . .	1166	Matico . . . . .	1187
		Balsamum Copaivae . .	1188
XIV. Classe. Nephrica, Nie- renmittel . . . . .	1167	Gurjunbalsam, Woodoil .	1192
1. Ordnung. Nephrica hy- dragoga, Harntreibende Nierenmittel . . . . .	1167	2. Ordnung. Uterina, Ge- bärmuttermittel . . . .	1192
Bulbus Scillae, Meer- zwiebel . . . . .	1167	Summitates Sabinae, Sadebaumspitzen . . . .	1192
Radix Hellebori viridis und nigri . . . . .	1171	Oleum Cedriae; Radix Gossypii; Taxus; Paeonia; Folia Rutae . .	1194
Adonis vernalis; Sassy- rinde; Convallaria . . .	1172	Secale cornutum, Mut- terkorn . . . . .	1195
Radix Ononidis, Hau- hechel . . . . .	1172	3. Ordnung. Galactago- ga, Milchvermehrnde Mittel . . . . .	1205
Flores Stoechados; Ca- cumina Scoparii . . . .	1173	Fructus Foeniculi, Fen- chel. Oleum Foeni- culi, Fenchelöl . . . .	1205
		Anethum; Cerefolium; Galega . . . . .	1207





## VII. Classe. Erethistica (Irritantia), Reizende Arzneimittel.

Wir handeln in dieser Classe alle Stoffe ab, welche man zur Hervorrufung eines Reizes an der Applicationsstelle zu benutzen pflegt, um dadurch entweder auf gewisse locale Krankheiten verändernd zu wirken oder um reflectorisch Veränderungen der Circulation und Blutvertheilung oder Bewegungen gewisser Art oder Steigerung gewisser Secretionen zu veranlassen.

Die Mehrzahl der hier zu topischen Zwecken benutzten scharfen Stoffe sind organischer Natur und dem Pflanzenreiche angehörnd. Buchheim unterscheidet Gruppen organischer Stoffe, welchen eine eigenthümliche Schärfe zukomme. Als besondere hat er aufgestellt: 1) Anhydride gewisser Säuren, welche entweder selbst scharf sind oder keine Schärfe besitzen (Cantharidin, der wirksame Stoff von Euphorbium, Daphne, Podophyllin, Elaterin, Convolvulin, Jalapin, Turpethin, Tampicin, Anemonin, nach Buchheim wahrscheinlich auch ein Stoff in Thapsia Silphium, in Boletus laricis, im Colophonium und im Copaivabalsam). 2) Glykoside, theils saurer Natur, theils neutral (Colocyntbin, Aloin, Cathartinsäure, Frangulasäure und das purgirende Princip des Rhabarbers, wohin übrigens auch die gleichzeitig glykosidischen und anhydridischen Stoffe der purgirenden Convolvulaceen gestellt werden könnten). 3) Glieder einer eigenthümlichen Reihe von Fettsäuren, welche bei trockener Destillation Oenanthol und beim Kochen mit Salpetersäure Oenanthylsäure liefern (Ricinusölsäure, Crotonölsäure, Curcasölsäure und verschiedene Säuren aus Oelen von Euphorbiaceen). 4) Cardol und demselben sich chemisch analog verhaltende Körper, welche bei trockener Destillation ebenfalls neben anderen Producten Oenanthol liefern (Capsicol, Paradisol, vielleicht auch das scharfe Princip des Ingwers). 5) Indifferent Körper von ähnlichen Eigenschaften wie das in Pimpinella aufgefunden Pimpinellin. 6) Alkaloide, welche bei Behandlung mit alkoholischer Kalilösung Piperidin und einen Säurerest geben: (Piperidin, Chavicin, Pyrethrin, scharfes Princip von Spilanthes). Zu diesen Gruppen kommen dann noch diverse ätherische Oele und eine Menge Harze, von welchen letzteren vielleicht manche Anhydride enthalten. Bei der grossen Menge von Stoffen, die sich der Gruppierung bisher noch wegen mangelhafter Untersuchung entziehen, und bei der Differenz der chemischen Resultate bei diversen Erethistica ist indess jede Gruppierung nach chemischen Gesichtspunkten gegenwärtig höchst provisorisch.

Das Zustandekommen der örtlichen Reizungserscheinungen ist offenbar als die Folge chemischer Einwirkung auf die Albuminate des Körpers zu beziehen, indessen sind bis jetzt wenig entscheidende Thatsachen für das Bestehen von chemischen Veränderungen der Eiweisskörper durch scharfe Stoffe bekannt. Man weiss, dass durch Terpenthinöl u. a. ätherische Oele und selbst durch die nur geringe Mengen ätherischer Oele enthaltenden destillirten Wasser Eialbumin coagulirt wird (Chevreul, Lienau). Senföl, Cardol und einige andere Stoffe heben die Gerinnbarkeit des Eiweisses beim Kochen und die Coagulabilität der Milch auf (Buchheim und Eberbach).

Nach den Applicationsstellen, auf die man die Erethistica bringt, zerfallen dieselben in mehrere Ordnungen vom therapeutischen Gesichtspunkte aus, an dem wir festhalten, obschon physiologisch nicht einmal die auf die äussere Haut irritirend wirkenden Substanzen von den auf den Schleimhäuten Hyperämie producirenden, geschweige denn die die verschiedenen Schleimhäute afficirenden Stoffe differiren. Als einziger Unterschied lässt sich vielleicht der hinstellen, dass, um eine Hautreizung bei Application auf die Epidermis hervorzubringen, der betreffenden Substanz eine gewisse Flüchtigkeit zukommen muss, vermöge deren sie die Epidermis zu durchdringen vermag, während für das Zustandekommen der Wirkung bei Application auf Schleimhäuten die Löslichkeit in Wasser oder in den Säften, mit denen sie in Contact tritt, nöthig ist. Da beide Verhältnisse verschiedenen Stoffen vereint zukommen, muss es auch Stoffe geben, welche auf Schleimhäute und Haut zugleich irritirend wirken.

### 1. Ordnung. Dermerethistica, Hautreizende Mittel.

Hinsichtlich der allgemeinen Verhältnisse dieser Mittel, von denen wir zunächst die vorzugsweise zur Derivation dienenden sog. Epispastica und dann die bei Localerkrankungen der Haut benutzten abhandeln, verweisen wir auf S. 44, wo auch unser gegenwärtiges Wissen über die Ableitung durch Hautreize ausführlich dargestellt wurde.

**Cantharides, Muscae Hispanicae; Spanische Fliegen, Canthariden.**

Sowohl die deutsche als die lateinische Bezeichnung der genannten Droge aus dem Thierreiche schliesst Unrichtigkeiten ein. Die Spanischen Fliegen sind keine Dipteren, zu denen die Fliegen gehören, sondern Koleopteren (Käfer); auch beschränkt sich ihr Vorkommen keineswegs auf Spanien, vielmehr findet sich das Insect in ganz Südeuropa und kommt in heissen Sommern auch bei uns und selbst noch nördlicher auf Eschen, Syringen und Ligustern vor. Der Name Cantharides ist weder historisch noch zoologisch zu rechtfertigen; denn was man im Alterthume als Cantharis bezeichnete, ist nicht unsere Cantharide, sondern eine analog wirkende Mylabris (vielleicht *M. Fuesselini*), und die Käfergattung Cantharis schliesst die Spanische Fliege nicht ein, welche jetzt allgemein als *Lytta vesicatoria* Fabr., Pflasterkäfer, bezeichnet wird.

Die Pflasterkäfer werden in den Ländern, wo sie in grösseren Mengen vorkommen, in der Weise gesammelt, dass man sie von den ihnen zum Aufenthalt dienenden Bäumen vor Sonnenaufgang im erstarrten Zustande abschüttelt und auf untergelegten Tüchern auffängt. Man tödtet sie dann durch starke Hitze,



heisses Wasser, auch wohl durch Terpenthinöl oder Ammoniakflüssigkeit, und trocknet sie bei gelinder Wärme. Es sind  $1\frac{1}{2}$ —3 Cm. lange und 6 Mm. breite Käfer mit goldgrünen, glänzenden Flügeldecken, Kopf- und Brustschild und fadenförmigen schwarzen Antennen und von ganz eigenthümlichem unangenehmem Geruche, der, bei trocknen Thieren minder stark, jedoch deutlich wahrnehmbar, bei lebenden so intensiv ist, dass man die Nähe von Cantharidenschwärmen daran im Freien erkennen kann. Sie kommen vorzugsweise aus Russland, Ungarn und Sicilien in den Handel. Die russischen Canthariden sind grösser als die aus Sicilien stammenden. Sehr sorgfältig ist bei der Aufbewahrung zu verfahren; die Thiere werden äusserst leicht durch Milben zerstört, wobei ihre Wirksamkeit verloren geht. Junge Individuen wirken minder kräftig als ausgewachsene; ganz junge entbehren vollständig der blasenziehenden Wirkung (Nentwich). Im Handel sind ausser der *Lytta vesicatoria* noch die Chinesischen Canthariden, mit schwarzem Kopf, Brust und Hinterleib und Flügeldecken von derselben Farbe, mit drei breiten, gelbbraunen Querstreifen, welche zum grössten Theile aus *Mylabris Cichorii* Fabr., neben welcher auch *Mylabris Sidae* Fabr. vorkommt, bestehen. Dieselben wirken schwächer blasenziehend als *Lytta vesicatoria* (Schroff). *Mylabris Graeca* und *variegata* werden noch heute in Griechenland viel statt dieser angewendet, z. B. bei Hundswuth (Roeser); ebenso im Gouvernement Saratow *Mylabris quatuordecimpunctata* und *M. melanura*. Persische Canthariden (*Mylabris colligata* Redtenb. und *M. maculata* Oliv.) sind kräftiger als unsere Canthariden (Schroff). Die Gattung *Lytta* hat in wärmeren Ländern eine sehr grosse Anzahl von Species, welche als *Vesicantia* angewendet werden; so die (violette) ostindische *Lytta Gigas* (sog. *Cantharides coeruleae*) und die Nordamerikanische *Lytta vittata* Fabr., sog. *Potato-fly*.

Die scharfen Eigenschaften der Canthariden werden durch einen von Robiquet entdeckten, gewöhnlich als Cantharidin, auch wohl als Vesicatorin oder Cantharidencampher bezeichneten, nicht stickstoffhaltigen Körper bedingt.

Derselbe krystallisirt in farblosen, glänzenden Prismen, löst sich leicht in Chloroform, Benzin, Aether, fetten und ätherischen Oelen, schwierig in Spiritus und Wasser, selbst beim Erhitzen, und verflüchtigt sich nicht nur mit Wasser, sondern auch schon mit Chloroformdämpfen (62°). Er ist nach den hauptsächlich über den Stoff Licht verbreiteten Untersuchungen von Dragendorff das Anhydrid einer Säure, der Cantharidinsäure, welche sich mit verschiedenen Metallen zu löslichen Salzen verbindet, die ebenfalls blasenziehende Eigenschaften besitzen. Stärkere Säuren scheiden aus diesen nicht Cantharidinsäure, sondern Cantharidin wieder ab. Das Cantharidin findet sich nach Dragendorff und Blum in den Canthariden nur theilweise frei, theilweise als cantharidinsaures Magnesium. Ob gewisse den Canthariden zugeschriebene Wirkungen, insbesondere die stimulirenden Eigenschaften, auf darin enthaltenem ätherischem Oele (Schroff) beruhen, das besonders in frischen Canthariden reichlich vorhanden ist, bedarf noch genauerer Untersuchung. Die übrigen Bestandtheile der Spanischen Fliegen (grünes Weichharz, gelbes Fett, Essigsäure, phosphorsaures Calcium, Harnsäure, Chitin) stehen zu der Wirkung in keiner Beziehung.

Der Gehalt der Canthariden an Cantharidin variirt zwischen 0,18—0,57% (Blum, Rennard). Die Frage, in welchen Theilen des Insects das Cantharidin seinen Sitz habe, ist verschieden beantwortet. Ich kann nach meinen Versuchen die Angaben von Ferrer, Krahmer u. A. nur bestätigen, dass nicht allein das Abdomen, sondern alle Theile der Canthariden, auch Beine und Flügeldecken, letztere besonders, wenn sie mit ihrer Innenfläche auf der Haut, am zweckmässigsten nach zuvoriger Befeuchtung mit Oel, befestigt werden, Entzündung an der Applicationsstelle bewirken. Von Abwesenheit des Cantharidins in diesen Theilen kann somit keine Rede sein, zumal da Dragendorff in Füßen, Köpfen und Fühlern einer nahe verwandten Species, *Mylabris quatuordecimpunctata*, direct Cantharidin nachwies. Allerdings ist im Abdomen das meiste vorhanden, nach Ferrer 4mal mehr als in den harten Theilen. Nach

Einigen sind es besonders die Ovarien der weiblichen Canthariden, in deren Nähe Cantharidin und das riechende Princip, dessen Beziehungen zum Cantharidin noch nicht erkannt wurden, producirt wird.

Die eigenthümlichen fettartigen Körper, welche sich in den Canthariden finden, haben für die Wirkung insofern Bedeutung, als sie die Löslichkeit des Cantharidins befördern. Dass neben dem Cantharidin noch ein zweiter narkotisch wirkender Stoff vorhanden sei, hat man aus der giftigen Wirkung des Destillats geschlossen, doch ist das Cantharidin in gewissem Masse flüchtig.

Das Cantharidin kommt, abgesehen von den verschiedenen obengenannten Mylabrispecies, auch noch in diversen Arten der Gattung *Meloë* L. vor, in deren gelbem Saft Lavini, Sobrero und Fumouze es auffanden. Zahlreiche nordamerikanische Käfer wirken blasenziehend. Ob auch die Sonnenkäfer (Sonnenkälbchen) oder Marienkäfer, *Coccinella septempunctata* L., deren gelber Saft seit der Empfehlung von Hirsch als Zahnwehmittel (auf das Zahnfleisch applicirt) verschiedentlich versucht wurde und aus denen man auch eine *Tinctura Coccinellae* als Zahnwehtinctur bereitete, Cantharidin enthalten, ist nicht festgestellt. Wahrscheinlicher ist dies von der in China neben *Mylabris Cichorii* als Vesicans benutzten Cicadenart *Huechys sanguinolenta*, Chu-ki oder Ailanthusvogel. Die diuretische Wirkung der sog. Millepedes, Kellerasseln, Kellersesel, meist ein Gemenge verschiedener Isopoden, hauptsächlich *Armadillo officinarum* Brdt. und *Oniscus Asellus* L. darstellend, scheint nicht von Cantharidin, sondern vielleicht von Ameisensäure abzuhängen. In *Mylabris quatuordecimpunctata* fand Dragendorff 0,49% Cantharidin, also mehr als in manchen Sorten von *Lytta vesicatoria*. Noch mehr (0,8% neben 0,5% Ammoniumcantharidat) will Wolff (1875) in der Cantharide von Uruguay, *Lytta adspersa*, gefunden haben.

Auf die äussere Haut applicirt rufen Cantharidin und die Alkalisalze der Cantharidinsäure (Gubler) Entzündung hervor, welche sich anfangs durch Röthung, später durch Bildung einer aus kleinen Bläschen confluirenden Blase documentirt. Da diese Wirkung relativ langsam eintritt und mit wenig Schmerzen verbunden ist, sind cantharidinhaltige Präparate zur künstlichen Erzeugung von Blasen besonders geeignet.

Bei dem gewöhnlichsten Cantharidenpräparate, dem *Emplastrum Cantharidum ordinarium*, welches die Käfer selbst fein pulverisirt enthält, vergehen in der Regel 7—10 Stunden, ehe eine dem Umfange des Blasenpflasters entsprechende grosse Blase gebildet ist; deutliche Hautröthung wird nach  $1\frac{1}{2}$ —2 Stunden beobachtet. Individualität und relative Dicke der Haut an der Applicationsstelle sind nicht ohne Einfluss auf die Zeit der Blasenbildung. Reines Cantharidin wirkt viel früher, bei Application auf zarte Hautstellen, z. B. an den Lippenrändern, in  $\frac{1}{4}$  Stunde, selbst wenn nur  $\frac{1}{2}$  Mgm. angewendet wird. Selbst  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$  Mgm. Cantharidin wirkt noch blasenziehend (Bluhm). Alkoholische und ätherische Lösungen wirken ebenfalls rasch, und unter Beihülfe von Lösungsmitteln für das Cantharidin wirkt auch das genannte Pflaster weit rascher blasenziehend. Dies ist namentlich der Fall, wenn man ein solches Pflaster mit Oel bestreicht. Bisweilen erfolgt noch Blasenbildung, wenn das Pflaster frühzeitig, noch ehe Vesikeln gebildet sind, abgenommen wird. Das in der Blase enthaltene Serum ist gelblich, von alkalischer Reaction und eiweisshaltig; in der Regel finden sich weisse Blutkörperchen in demselben. Bringt man das Serum auf eine andere Körperstelle, so entsteht mitunter in Folge des Cantharidingehaltes desselben neue Vesication. Nach dem Platzen der Blase trocknet das Secret ein und darunter bildet sich neue Epidermis. Wird das Blasenpflaster noch nach Beendigung der Blasenbildung liegen gelassen, so greift die Entzündung auch auf das Corium über und es kommt zur Eiterung.

Die entzündungserregende Wirkung des Cantharidins macht sich auch auf den Schleimhäuten geltend. Schon das Kauen unbedeutender Quantitäten Spanischer Fliegen verursacht Brennen im



Munde, Schlunde und selbst im Magen, bisweilen auch Uebelkeit. Bei toxischen Dosen stellt sich, abgesehen von entfernten Erscheinungen, oft das ausgeprägte Bild einer Entzündung des Tractus im ganzen Verlaufe vom Munde bis zum Mastdarme, mitunter mit blasenförmiger Erhebung des Epithels im Munde, auf der Zunge und im Pharynx ein.

Auch an anderen Körpertheilen (Muskeln, Leber), soweit solche Blutgefässe besitzen, bringt Cantharidin bei directer Application Entzündung zuwege, nicht aber an Sehnen und blutgefässlosen Geweben (Carl Wernher).

Das Cantharidin kann sowohl bei Application auf die äussere Haut als von Wund- und Geschwürsflächen, als besonders von der Schleimhaut des Tractus aus resorbirt werden und dann auch zu Veränderung der Function, vielleicht sogar der Structur entfernter Organe führen. Die dadurch bedingten Erscheinungen betreffen theils das Nervensystem, was sich namentlich bei Vergiftungen mit Spanischen Fliegen durch Respirationsstörungen und Convulsionen zu erkennen giebt, theils und vorzugsweise die Nieren und Harnwege, welche dadurch in intensiven Reizungs- und Entzündungszustand versetzt werden können. Folge der Respirationsstörungen ist mangelhafte Oxydation und daraus resultirendes Sinken der Temperatur, Folge der entzündlichen Reizung der Harnwege Auftreten von Eiweiss, Fibrincylindern und Blut im Urin, von Katarrh und selbst croupösen Ablagerungen auf der Blaseschleimhaut, wodurch Abgang von klumpigen fibrinösen Coagula und Pseudomembranen durch die Harnröhre resultirt, ferner von Strangurie und Dysurie, in seltenen Fällen auch von schmerzhaften Erectionen und Priapismus, welche als Reflexerscheinungen aufzufassen sind. Reizung der Nieren und Harnwege kommt nicht nur nach Verschlucken von Spanischen Fliegen und ihren Präparaten in toxischen Mengen, sondern auch nach Application sehr grosser Vesicatore vor, besonders wenn dieselbe bei Kindern oder in der Nähe der Lumbargegend stattfindet, weshalb von Seiten der Aerzte auch mit der äusseren Anwendung der Canthariden vorsichtig zu verfahren ist. Am häufigsten entstehen sie beim Verbande von Fontanellen mit Cantharidensalbe. Gleichzeitiger Gebrauch von Substanzen, welche ein besonderes Lösungsvermögen für Cantharidin besitzen, muss natürlich zu Vermehrung der Aufsaugung und Steigerung der entfernten Wirkung führen, weshalb z. B. bei Vergiftungen mit Canthariden Darreichung von Oleosa und Emulsionen zur Linderung der örtlichen Phänomene durchaus verboten ist. Die Wirkung auf die Nieren scheint Eliminationswirkung zu sein.

Das Bild der acuten Cantharidenvergiftung setzt sich aus den Erscheinungen örtlicher Läsion und Symptomen entfernter Action zusammen, von denen die auf das Urogenitalsystem bezüglichen nicht selten in den Vordergrund treten. Wird Cantharidin in Lösung, z. B. in Form eines flüssigen Cantharidenauszuges, eingeführt, so können geradezu die örtlichen Erscheinungen auf ein geringes Mass zurückgedrängt werden und sich erst später geltend machen, so dass die Strangurie das Hauptsymptom bildet oder in einzelnen Ausnahmefällen sogar rein nervöse Phänomene, wie Suffocation und Tetanus, ausschliesslich sich geltend machen (Pietro Labus). Cornil (1880) fand bei acuter Cantharidinvergiftung

bei Thieren fast unmittelbar Austritt von weissen und rothen Blutkörperchen aus den Glomerulusschlingen der Nieren, Schwellung der Kapselzellen und Epithelien der gewundenen Harncanälchen, später Wucherung und Gestaltveränderung der Cylinderzellen in den geraden und ausführenden Harncanälchen, ferner zellige Infiltration des Bindegewebes und Vergrößerung der Epithelien mit Kernwucherung in der Blaseschleimhaut. Aehnliche Erscheinungen finden sich auch im Darm (nach Subcutanapplication) und selbst in der Leber (Cornil). Das Cantharidin muss als ein auf die respiratorischen Centren wirkendes Gift angesehen werden, da der Herzschlag bei tödtlicher Cantharidinvergiftung auch nach Sistiren der Respiration fort dauert (Dragendorff und Radecki). Das Vorkommen febriler Zustände bei Vergiftungen mit Canthariden trotz der Verringerung der Oxydation in Folge der Respirationsstörung erklärt sich leicht aus den entzündlichen Erscheinungen im Magen, Darmcanal oder entfernten Theilen. Ausser den Harnwerkzeugen können auch die Muskeln (z. B. bei Hühnern der Herzmuskel nach Radecki) der Sitz von Entzündung werden. Vielleicht hängt mit diesen entzündlichen Reizungen auch das Auftreten von Speichelfluss nach intravenöser Einspritzung von Cantharidin (C. Wernher) zusammen.

Reizungserscheinungen der Urogenitalorgane sind nicht selten das Hauptsymptom bei Cantharidismus acutus durch interne Einführung des Giftes und stets beim sog. Cantharidismus externus, doch sind die alten Mythen längst widerlegt, wonach der Geschlechtstrieb dabei in excessivem Masse gesteigert werde. Die neueren Beobachter von Vergiftungen durch Canthariden reden zwar von Schmerzen und Anschwellung der Genitalien (Pallé), auch wohl von Drang zum Harnlassen, aber nicht von Drang zum Coitus; dagegen hat Galippe (1875) nach medicinalen Dosen von Cantharidenpräparaten einige Male sexuelle Aufregung gesehen.

Das Auftreten von Reizung der Harnwege nach Blasenpflastern ist keinesweges selten, obschon nicht so häufig, wie es von Vernois u. A. angenommen wird, die es in  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{5}$  sämtlicher Fälle von externer Application vorkommend bezeichnen. Nach statistischen Erhebungen von Gubler und Ribes kommt sog. Cantharidismus externus etwa in 9—10 % vor, und zwar in fast der Hälfte nur aus Dysurie bestehend, in den übrigen aus Albuminurie. Sehr selten ist Abgang von fibrinösen Flocken oder Blut. Gublers Statistik scheint zu beweisen, dass Frauen viel leichter als Männer afficirt werden (1 unter 3 Frauen). In den meisten Fällen verschwindet die Albuminurie in 12—36 Stunden, doch kann sie auch 3—4 Tage anhalten. In schweren Fällen kann ausser Blasenentnesmus auch Tenesmus alvi vorkommen, ja der Tod durch parenchymatöse Nephritis (Nicolas) erfolgen. Das zur Verhütung dieser Symptome angegebene Bestreuen des Vesicators mit Campher ist ebenso wenig wie gleichzeitige Campherklystiere von irgend welchem Nutzen (Ribes).

Die Behandlung des Cantharidismus ist rein symptomatisch. Mucilaginoso erfüllen gleichzeitig die Indication, die Darmentzündung zu mässigen und die Resorption zu verzögern. Bei starker Nephritis und Urethritis ist Antiphlogose (kalte Umschläge, Schröpfköpfe in der Nierengegend) am Platze. Beim Cantharidismus externus ist selbstverständlich die Ursache des Leidens auf das Schleunigste zu entfernen. Bei interner Vergiftung leistet Opium bessere Dienste als der als Antidot von Alters her gepriesene Campher.

Die Ausscheidung des Cantharidins geschieht vorzugsweise durch die Nieren, aber auch durch Leber und Darm, der auch nach subcutaner Einführung entzündet wird. Im Speichel fand Radecki kein Cantharidin. Beim Kaninchen beginnt die Ausscheidung durch den Harn schon in 1— $1\frac{1}{2}$  Stunden; beim Menschen scheint die gesammte Cantharidinmenge in 18 Std. eliminirt zu sein (Radecki).

Für das Cantharidin sind verschiedene Immunitäten bestimmter Thierspecies (Igel, Huhn, Frosch) nachgewiesen. Muskeln von Hühnern, welche Cantharidin längere Zeit gefressen hatten, wirken giftig. Hunde zeigen bei Cantharidinvergiftung selten ausgesprochene Cystitis (Orfila, Poumet). Die bei Menschen beobachteten Verschiedenheiten hinsichtlich der Empfänglichkeit für Cantharidin sind theilweise wohl auf Differenzen des benutzten Präparates zu beziehen. Reines Cantharidin kann schon zu 0,01 intensive Entzündung



des gesammten Tractus und der Harnwerkzeuge bedingen (Schroff und Heinrich). Bei der nicht unbedeutenden Verschiedenheit des Cantharidin-gehaltes der Spanischen Fliegen nach Grösse, Alter und Körpertheilen lässt sich die angebliche Differenz der Empfindlichkeit einzelner Personen gegen interne und externe Application von Präparaten der Spanischen Fliegen nicht bestimmt auf sog. Idiosynkrasien beziehen; doch ist es ja bekannt, wie intensiv bei manchen Personen überhaupt Hautreize zu wirken im Stande sind. Tödliche Vergiftung durch gepulverte Canthariden ist schon nach zwei Gaben von 0,75 (Orfila), wiederholt nach 2,0—8,0 vorgekommen.

Innerlich werden die Canthariden nur äusserst selten benutzt. Früher als Aphrodisiacum berühmt, hat das Mittel seinen Ruf als solches im Laufe der Zeit verloren und nur noch einzelne Lobredner als Diureticum in neuerer Zeit gefunden. Die Anwendung gegen Wasserscheu und gegen Hautkrankheiten der schlimmsten Art (Lepra, Elephantiasis) sind Ueberbleibsel aus der Zeit des Glaubens an Specifica.

Dass Canthariden zwar Reizung und Entzündung der Urogenitalschleimhaut, aber doch nur occasionell Erectionen hervorrufen, wurde bereits oben erwähnt. Die Canthariden bildeten und bilden in Italien und in orientalischen Ländern z. Th. noch jetzt den Hauptbestandtheil der sog. Liebestränke und Lustpulver, deren Gebrauch oft genug zum Tode führte. Ausser Nephritis und Cystitis scheint dadurch bei Frauen auch Abortus herbeigeführt werden zu können. Die Hervorrufung unterdrückter Tripper durch interne Anwendung von Canthariden ist geradezu Thorheit. Die so leicht auftretende Nierenreizung macht den Gebrauch der Canthariden als Diureticum, welchen Faivre (1865) besonders bei pleuritischen Exsudaten empfahl, wenig zweckmässig und in allen Fällen, wo Irritation der Nieren schon besteht, geradezu contraindicirt. Bei Lähmung der Harnblase und Cystitis chronica können Canthariden nur schaden. Die Ratorische Schule benutzt Cantharidin als contrastimulirendes Medicament bei Entzündungen innerer Organe, was die physiologischen Versuche nicht als irrational bezeichnen lassen; doch giebt es gewiss minder gefährliche Mittel. Früher sah man in den Canthariden ein Reizmittel und wandte dieselben aus diesem Grunde bei bösartigen Fiebern an. Der Gebrauch war übrigens ehemals so geführt, dass das Londoner College of physicians 1698 den holländischen Arzt Groenvelt wegen innerlichen Gebrauches der Canthariden einsperren liess.

Wir haben schon oben angeführt, dass man in Griechenland Mylabris-Arten gegen Hundswuth prophylaktisch anwendet. Nach Röser hat ein Kloster auf Salamis ein seit Alters her berühmtes Verfahren, das sich auf deren Anwendung gründet, neben welchem aber auch noch eine Tisane von *Cynanchum erectum* gebraucht wird. Röser cauterisirt die Bisswunde, legt Charpie mit einer Salbe aus Ungt. Hydrargyri 8 Th., Mylabrid. pulv. 1 Th. auf und reicht innerlich mehrmals täglich ein Pulver von 0,0025—0,005 des Insects. Es ist auffallend, dass auch ein anderer cantharidinhaltiger Käfer, der Maiwurm, *Meloë proscarabaeus* und *Meloë majalis*, gerade bei Lyssa seine Verwerthung gefunden hat. Maiwürmer wurden zu 24 Stück in der Form einer Latwerge (ohne Kopf in Honig, mit Theriak u. a. Dingen), welche das Geheimmittel der Familien von Stangen auf Wägnitz und von Domnig auf Elgut bildete und von Friedrich dem Grossen angekauft wurde, daher dieser sog. Haustus antilyssus auch den Namen der preussischen Latwerge erhalten hat, gegeben.

Äusserlich kommen Canthariden selten zur Beseitigung localer Affectionen der Haut oder bei torpiden Geschwüren behufs Erregung substitutiver Entzündung zur Anwendung.

Die Benutzung von Blasenpflastern bei circumscripiter, aber sehr hartnäckiger Psoriasis, Lepra und Lupus (Rayer) oder bei Erysipelas kann als völlig aufgegeben betrachtet werden, ebenso die Application in der Umgebung brandiger Partien der Haut. Bei Alopecie ist der Nutzen höchst problematisch.

Ihre Hauptbedeutung besitzen die Canthariden als das zur Production von Blasen am häufigsten benutzte Material, wobei dasselbe entweder zur Blosslegung der Cutis behufs Application von Morphin oder anderen Medicamenten (endermatische Methode) oder, was häufiger der Fall ist, zur Beseitigung von Affectionen tiefer liegender Körpertheile durch Derivation dient. In letzterer Hinsicht kommen die Canthariden theils bei entzündlichen Affectionen, theils bei Schmerzen der verschiedensten Art, insbesondere auch Neuralgien, oft mit dem grössten Nutzen in Anwendung. Als Belebungsmittel bei Scheintod und Collapsus eignen sie sich wegen zu langsamer Wirkung nicht. Um länger dauernde Eiterung entweder ebenfalls in derivatorischer Absicht oder zu anderen Zwecken zu unterhalten, sind Canthariden ebenfalls nicht zu empfehlen, da Aufsaugung des Cantharidins leicht zu unangenehmer Reizung der Nieren und Harnwege führt.

Die Leiden, bei denen Canthariden als Derivantien benutzt werden, sind sehr zahlreich. Von entzündlichen Affectionen sind es vorzugsweise acute und chronische Inflammationen seröser Häute (Pleuritis, Pericarditis, Meningitis, Peritonitis) und unter diesen die der Pleuren, wo sie am meisten in Betracht kommen. Man rühmt ihnen im acuten Stadium dieser Krankheiten nach, dass sie die Schmerzen lindern, das Fieber herabsetzen und selbst die Exsudation beschränken, im chronischen Stadium, dass sie neben Beseitigung der Schmerzen auch die Aufsaugung des Exsudats befördern. Andere wollen z. B. bei Pleuritis Steigerung des Fiebers beobachtet haben; jedenfalls sind Vesicatore bei acuter Entzündung wohl nicht ganz gleichwerthig den örtlichen Blutentziehungen. Daneben sind es besonders rheumatische Affectionen acuter und chronischer Art, wo Blasenpflaster Günstiges leisten. Beim acuten Gelenkrheumatismus waren vor Einführung der Salicylsäuretherapie sog. fliegende Vesicantien sehr gebräuchlich und manchmal von auffallend günstiger Wirkung (Davies). Weitere analoge Anwendungen sind bei Pneumonie, zumal im kindlichen Lebensalter, wo man Blutentziehungen möglichst meidet, Spondylitis, Phlegmone, Phlebitis in Folge von Aderlass oder Typhus (Nonat) u. s. w., Phlegmasia alba dolens, Augentzündungen, wo man Blasenpflaster hinter die Ohren applicirt, und chronischen Entzündungen der verschiedensten Schleimhäute, namentlich der Respirationsorgane, wo subacute Katarrhe am besten dadurch influirt werden, aber auch selbst bei chronischem Tripper und Spermatorrhoe (hier an der Wurzel des Penis oder auf das Perineum applicirt), Lymphadenitis und Bubonen (Vidal de Cassis), endlich selbst bei Phthisis. Bei letzterer ist die wiederholte Application entschieden eine zu vermeidende Quälerei und besonders ist es zu widerrathen, grössere eiternde Flächen durch Spanische Fliegen zu erzeugen, während allerdings kleine fliegende Vesicatorien, wie sie neuerdings Revilloud wieder angerathen, anscheinend nicht ohne Nutzen sind und namentlich intercurrente pleuritische Schmerzen beseitigen können. Vermeidung eiternder Vesicatore gilt auch dringend für die Behandlung der Neuralgien, gegen welche Blasenpflaster vorzügliche Dienste zu leisten im Stande sind, wie dies besonders Valleix betonte und wie es die tägliche Erfahrung in frischen Fällen von Ischias, Trigeminusneuralgie u. s. w., welche ihre Entstehung einer Erkältung verdanken, bewcist. Neuerdings ist das Verfahren allerdings durch die Subcutaninjection narkotischer Mittel ein wenig verdrängt. Hierher gehört auch die im Ganzen wenig geübte Behandlung der Cardialgie u. a. Neurosen des Magens (hartnäckiges Erbrechen) durch Application eines Vesicators in der Regio epigastrica. Im Ganzen ist damit das Gebiet der Nervenkrankheiten erschöpft, wo die Blasenpflaster indicirt sind, obschon sie auch anderswo vielfach Benutzung und Lob gefunden haben; früher z. B. bei Lähmungen motorischer und sensibler Nerven, wo man mit Recht jetzt der Elektrizität den Vorrang lässt, bei Chorea (Grosse), Keuchhusten (Holl), ja selbst bei Hypochondrie, Melancholie u. a. Formen psychischer

Erkrankung, endlich bei Gehirnsymptomen im Verlaufe zymotischer Krankheiten (Typhus, acute Exantheme). Selbst Dyskrasien wollte man durch Vesicantien heilen, z. B. Intermittens, Syphilis u. a. m. Bei Asthma scheint der Senfteig im Allgemeinen Vorzug zu verdienen. Grosse Vesicatore empfahl Traube neben Bleizucker bei dem im Verlauf von Pneumonia potatorum und nephritischem Hydrops auftretenden Lungenödem.

Contraindicirt sind die Blasenpflaster bei kachektischen Personen, wo die Wundflächen leicht schlechte Beschaffenheit annehmen und in langwierige Geschwüre übergehen. Selbst brandiges Absterben der Wundfläche kann vorkommen. In Räumen überfüllter Hospitäler, wo Diphtheritis, Hospitalbrand, epidemische Rose herrschen, ist Application von Blasenpflastern selbstredend nicht gestattet. Grosse Vesicatore, z. B. über die ganze Brustfläche, sind im Allgemeinen und namentlich bei Kindern zu meiden.

Die Canthariden kommen fast ausschliesslich in Form der officinellen Präparate in Anwendung.

Für interne Anwendung ist die maximale Einzelgabe auf 0,05, die maximale Tagesgabe auf 0,15 festgesetzt, welche Dosen früher bei der prophylaktischen Cur der Lyssa jedoch oft überstiegen wurden. Die Darreichung in Pulverform ist unzweckmässig, selbst wenn man Pulvis gummosus als Vehikel anwendet, weil leicht Partikelchen in Falten der Schleimhaut eingebettet liegen bleiben und Entzündung bedingen. Selbst der Anwendung in Pillenform ist die Benutzung der Tinctur vorzuziehen. Aeusserlich hat man fein gepulverte Canthariden zu Streupulvern auf torpide Geschwüre benutzt, auch daraus mit Iriswurzel Fontanellkugeln oder magistral Salben, Pasten u. s. w. dargestellt, die jedoch sämmtlich zweckmässiger durch die officinellen Ppt. zu ersetzen sind.

#### Präparate:

1) **Tinctura Cantharidum; Spanischfliegentinctur.** Mit 10 Th. Spiritus be-reitet; grünlich gelb, von brennendem Geschmacke. Das allein innerlich in Anwendung kommende Präparat der Canthariden, welches zu 2—10 Tropfen (bis 0,5 pro dosi! bis 1,5 pro die!) in schleimigen Vehikeln (Mucilago Salep, Mixtura gummosa, Haferschleim) verabreicht wird. Aeusserlich benutzt man sie zu reizenden Injectionen in Fistelgänge (mit 10—30 Th. Flüssigkeit verdünnt), und besonders zu reizenden Einreibungen und Salben, letzteres z. B. bei Pernionen, häufig als Mittel gegen Alopecie, in Gemeinschaft mit anderen, angeblich haarwuchsbefördernden Mitteln, wie Extractum Chinae, Decoctum Bardanae u. s. w.

Andere flüssige Auszüge sind nicht officinell. Die Tinctur ist stark genug, um die äusserliche Anwendung erfolgreich zu machen, und bedarf es daher nicht der früher in einzelnen Theilen Deutschlands gebräuchlichen Tinctura Cantharidum concentrata (1:6). Ebenso sind Auszüge mit Essigsäure, wie sie in England (als Acetum cantharidale) und anderswo gebräuchlich sind, oder solche mit Oel (Oleum Cantharidum) überflüssig. Ein ätherischer Auszug, als Aether cantharidale oder Oleum Cantharidum viride oder Cantharidinum oleosum bezeichnet, hat zur Darstellung von blasenziehenden Klebtaffeten (Oettinger) Anwendung gefunden.

2) **Unguentum Cantharidum, Unguentum irritans, Ung. epispasticum; Spanischfliegensalbe, Reizsalbe, Zugsalbe, Käfersalbe.** Canthariden 1 Th. mit Oleum Olivarum 4 Th. im Wasserbade 12 St. digerirt, nach dem Erkalten filtrirt, und 7 Th. des Filtrats mit Cera flava 3 Th. bei gelinder Wärme gemischt. Die gelbe Salbe wird selten zur Einreibung in die unverletzte Haut gebraucht, häufiger zum Offenhalten von Wunden und Geschwüren, wo sie, weil leicht zu Albuminurie führend, zweckmässiger mit Ung. Mezerei vertauscht wird, und wohl höchstens bei Bisswunden toller Thiere indicirt ist. Statt der officinellen Salbe lässt sich billiger eine Cantharidensalbe aus 1 Th. Cantharides pulveratae



und 8 Th. Adeps (Unguentum epispasticum Hufelandi) oder 7 Th. Unguentum basilicum (Unguentum Cantharidum nigrum. Cod. Hamb.) darstellen. Die alte Fontanellsalbe, Unguentum ad fonticulos, eine früher unter dem Namen Unguentum acre officinelle, nur veterinärärztlich benutzte Salbe, enthielt ausser Canthariden noch Euphorbium, andre zur Hervorrufung künstlicher Geschwüre benutzte Salben, wie Autenrieths scharfe Salbe, noch Sublimat oder Brechweinstein und Sublimat.

3) **Collodium cantharidatum**, Collodium cantharidale s. vesicans; **Cantharidencollodium**, blasenziehendes Collodium. Auflösung von 2 Th. Schiessbaumwolle in 42 Th. Aether cantharidatus (Macerat von grobgepulverten Canthariden 50 Th. in Aether 80 Th.) und Spiritus 6 Th.; olivengrün, syrupdick, klar und neutral. Wegen Leichtigkeit der Application und Sicherheit der Wirkung, zumal an Stellen, wo Pflaster leicht abfallen, und bei unruhigen Personen sehr empfehlenswerthe Form, die auch den anderen Collodiumarten zukommenden Uebelstand, nur mit Schwierigkeit sich entfernen zu lassen, nicht hat, da es mit der sich abstossenden Epidermisdecke der Blasen entfernt wird. Durch genaue Signatur ist vor Verwechslung mit innerlich zu nehmenden Tropfenmixturen, wozu der ätherische Geruch leicht Anlass geben kann, zu schützen!

4) **Emplastrum Cantharidum ordinarium**, Emplastrum vesicatorium ordinarium; **Spanischfliegenpflaster**, Blasenpflaster. Grobgepulverte Canthariden 50 Th. mit Oleum Olivarum 25 Th. einige Stunden im Wasserbade digerirt, damit Cera flava 100 Th., Terebinthina 25 Th. gemischt. Dieses Pflaster von weicher Consistenz, fettig anzufühlen, schwarz mit glänzenden grünen Punkten, enthält  $\frac{1}{4}$  Canthariden. Es ist das zur Ableitung am häufigsten benutzte Pflaster, hat aber den Nachtheil, dass es schlecht klebt und der Haut nicht fest anhaftet. Es ist deshalb zweckmässig, es mit einem Rande von Heftpflaster zu versehen oder doch mit Streifen von Emplastrum adhaesivum zu befestigen. Wie oben bemerkt, bedingt das Pflaster in 7—12 Std. die Bildung einer Blase, während sich Röthung der Applicationsstelle schon in  $1\frac{1}{2}$ —2 Std. entwickelt. Zur Beschleunigung der Wirkung dient Bestreichen mit einem Tropfen Oel; zur Abschwächung derselben kann ein Stück Seidenflor zwischen Haut und Pflaster gelegt werden oder man verbindet letzteres mit einem anderen gut klebenden, aber schwächer reizenden Pflaster. Handelt es sich um rasche Erzielung einer Blase, so kann man vor Anwendung des Pflasters zunächst einen Senfteig oder Senfspiritus appliciren. Ist die Blase gebildet, so kann man sie entweder direct heilen lassen oder die Wundfläche zur Suppuration bringen. Ist ersteres die Absicht, so entleert man zunächst das Serum und verbindet dann mit Watte, wobei sehr rasch Heilung erfolgt. Die früher üblichen Verbände mit Lappchen, welche mit Talg, Wachssalbe, Bleisalbe, Cacaobutter bestrichen sind, sind weniger zweckmässig. Soll die Stelle eitern, so schneidet man die emporgehobene Epidermis weg und verbindet dann mit einer reizenden Salbe (Digestivsalbe, Ungt. Mezerei). Erytheme in der Umgebung des Vesicators, welche nicht selten entstehen, scheinen unter Anwendung von Bleiwasser am besten zu verschwinden.

Die Application geschieht in der Regel in der Nähe des leidenden Theiles. Dies ist besonders auch der Fall bei Anlegung der sog. fliegenden Vesicanten. Hierunter versteht man wiederholte Application von Blasenpflastern mit Wechsel der Stelle, die man meist nicht bis zur perfecten Ausbildung einer Blase liegen lässt. So wendet man dieselben z. B. bei Ischias in Form schmaler Streifen an, mit denen man dem Verlaufe des Nervus ischiadicus folgt.

Zusatz von Campher oder Opium zum Pflaster, um Strangurie zu verhindern, erfüllt diesen Zweck nicht.

5) **Emplastrum Cantharidum perpetuum**, Empl. vesicatorium perpetuum, Empl. Janini, Empl. epispasticum, Empl. Euphorbi; **Zugpflaster**, Immerwährendes Spanischfliegenpflaster. Cantharides 20 Th., Euphorbium 5 Th., mit Colophonium 70 Th., Cera flava 50 Th., Terebinthina 35 Th., Sebum 20 Th. Grünlich schwarzes Pflaster, das  $\frac{1}{10}$  Canthariden enthält. Das officinelle Pflaster hatte

ursprünglich den Zweck, nur äusserst langsam Blasen zu ziehen, weshalb es eine sehr starre Consistenz besass; das jetzige Pflaster klebt besser, wirkt aber auch rascher epispastisch. Zu fliegenden Vesicatorien eignet es sich gut, auch vorzugsweise hinter die Ohren bei rheumatischem Zahnschmerz, Augenentzündungen, wobei es der französische Augenarzt Janin im vorigen Jahrhundert empfahl. Es ersetzt verschiedene ähnlich componirte Pflaster, wie das Emplastrum Cantharidum Lübeckii, Empl. Canth. Parisiense u. a. m.

Neben dem Colloidum cantharidale und den Spanischfliegenpflastern sind noch, namentlich beim Volke, Formen officinell, die wir als Zugtaffete unterscheiden können. Ein Taffet dieser Art war früher als Emplastrum Mezerei cantharidatum oder Pannus vesicatorius officinell und stellte einen mittelst Hausenblasenlösung auf Baumwollenzeug fixirten Auszug von Canthariden und Cortex Mezerei mit Essigsäure unter Zusatz von Harzen dar. Derselbe entspricht im Wesentlichen dem sog. Drouottischen Pflaster, den Blistering tissues von Brown u. a. Ähnlich sind auch manche Sorten von Gichtpapier, Charta vesicatoria s. antirheumatica, welche als Grundlage Papier enthalten, das meist zuvor mit Colophonium und Pech überstrichen ist; der Cantharidgehalt ist jedoch kleiner und geht durch längeres Aufbewahren oft ganz verloren.

Das Cantharidin, Cantharidinum, ist wegen seines hohen Preises und seiner starken Wirkung medicinisch wenig benutzt. In Italien gab man es als contrastimulirendes Medicament bei Entzündung innerer Organe zu 0,002 bis 0,006. Coutisson und Laboulbène (1878) benutzten mit einer Chloroformlösung von Cantharidin (1:100) bestrichenen Taffet an Stelle der fliegenden Vesicator und injicirten diese Solution auch in Muttermäler. Delpech und Guichard empfahlen cantharidinsaures Kalium zur Herstellung eines blasenziehenden Klebtaffet, um ein Präparat von bestimmter Stärke (0,01 im Quadratdecimeter) darzustellen. Die Erwartung, dass diese keine Nierenentzündung bedingen sollten, hat sich nicht erfüllt.

#### Verordnungen:

- |   |  |
|---|--|
| <p>1) R<br/> <i>Tincturae Cantharidum</i> 10,0<br/> <i>Spiritus Sinapis</i> 5,0<br/> <i>Spiritus</i> 50,0<br/> <i>Olei Lavandulae</i><br/> — <i>Amygdalarum amar. aetherei</i><br/> — <i>Rosae</i><br/> — <i>Aurantii florum</i> aa 0,25<br/> <i>M. D. S.</i> Einen Tag um den anderen einen Theelöffel voll in die Kopfhaut einzureiben. (Gegen Ausfallen der Haare. Epenstein.)</p> | <p>3) R<br/> <i>Cantharidum</i><br/> <i>Farinae Secalis</i> aa 15,0<br/> <i>Aceti Vini</i> q. s.<br/> <i>ut f. pasta mollis.</i> (Sog. Vésicatoire magistrale.)</p>  |
| <p>2) R<br/> <i>Tincturae Cantharidum</i><br/> <i>Mixturae odoriferae moschatae</i><br/> aa 0,5<br/> <i>Olei Ricini</i> 50,0<br/> <i>M. D. S.</i> Haaröl. (Gegen Ausfallen der Haare.)</p>  | <p>4) R<br/> <i>Elemi</i><br/> <i>Storacis</i><br/> <i>Cerae albae</i> aa part. 125<br/> <i>Leni calore liquefactis admisce</i><br/> <i>Cantharidum pulveratarum</i><br/> ptt. 200<br/> <i>Massae refrigeratae adde</i><br/> <i>Camphorae</i> ptt. 30<br/> <i>M.</i> (Formel für die in Italien und Südfrankreich sehr gebräuchlichen Mouches de Milan s. Mosche di Milano.)</p> |

#### Acidum formicicum; Ameisensäure.

Diese Säure dient zur Darstellung des fast nur in der Volksmedizin benutzten **Spiritus Formicarum, Ameisenspiritus**, welcher eine Mischung aus 70 Th. Weingeist, 26 Th. Wasser und 4 Th. Ameisensäure bildet und eine farblose Flüssigkeit von saurer Reaction und 0,894—0,898 spec. Gew. darstellt. Er er-

setzt analoge Präparate aus den früher officinellen Waldameisen, *Formicae s. Formicae rufae*, die ihre Wirksamkeit der Ameisensäure verdanken, welche diese Hymenopteren in einem Bläschen am Hinterleibe enthalten.

Die Ameisensäure ist eine wasserhelle, stechend sauer riechende und rein sauer schmeckende, flüchtige Flüssigkeit von 1,060—1,063 sp. Gew., welche das unterste Glied der Reihe der fetten Säuren bildet, und findet sich nicht allein im Thierreich, wo sie wahrscheinlich im Gifte diverser Insecten (Wespen, Bienen) und in den Haaren der Processionsraupe vorhanden ist, sondern auch im Pflanzenreiche, z. B. in den Kiefernadeln, in den Brennesseln; auch kann sie auf verschiedene Weise, z. B. durch Oxydation von Proteinstoffen, Kohlehydraten, künstlich dargestellt werden. Sie ist mit Wasser und Spiritus in allen Verhältnissen mischbar. Verdünnte Ameisensäure (7%) bedingt auf der Haut in  $\frac{1}{2}$  St. leichtes Brennen, concentrirtere in  $\frac{1}{2}$ —2 Min. heftigen brennenden Schmerz, in 5 Min. Exsudation und Schwellung nebst intensiver Röthung in der Umgebung der afficirten Partie. Von 7% Ameisensäurelösung sind 15.0 im Stande, Kaninchen zu tödten, wobei heftige Entzündung des Magens und Dünndarms, Nierenhyperämie, Ausscheidung von Faserstoffcylindern und Blut im Urin auftritt (Mitscherlich). Im Organismus wird sie zu Kohlensäure verbrannt; nach Genuss kleiner Mengen von Ameisensäure oder ameisen-sauren Salzen finden sich dieselben im Urin als Carbonate wieder (Rabuteau).

Die Ameisen selbst gehören nur der Volksmedizin an, die sie als Diureticum (mit Schnaps macerirt) und als Rubefaciens und hautreizendes Mittel (direct applicirt oder im Aufguss zu Localbädern oder Dampfbädern) verwendet. Die volksthümliche Rheumatismuscure, mit Ameisen gefüllte Säckchen aufzulegen oder die kranken Gliedmassen in einen mit Ameisen gefüllten Topf zu stecken, hat oft zu intensiven Verbrennungen geführt. Ameisenspiritus, den man in den gleichen Richtungen benutzte — als Diureticum 1—2 Theelöffel mit Wasser vermischt, als Rubefaciens bei Algien, Rheumatismus, Lähmungen unverdünnt eingerieben — hat ebenfalls für den Arzt keine sonderliche Bedeutung.

**Anhang:** Auch unsere gewöhnlichen Brennesseln, *Urtica urens* L. und *Urtica dioica* L., werden vom Volke als Diureticum benutzt und fanden früher als Hautreiz zur sog. Flagellation (Peitschen mit einem Bündel Nesseln) bei rheumatischen Affectionen, Sopor, Collapsus und Lähmungen Anwendung. Die nesselnde Wirkung kommt theilweise auf Rechnung der Ameisensäure, theilweise auf die der aus Kieselsäure bestehenden, steckenbleibenden Haare. Die Nesseln enthalten auch Gerbsäure in grösserer Menge, worin die manchmal günstige Wirkung von Abkochungen, die man bei Durchfall, Blutungen, Metrorrhagie und colliquativen Schweissen gesehen haben will, ihre Erklärung findet. Die Anwendung von nesselnden Quallen und Medusen als Hautreiz bei Rheumatismus, Lähmungen u. s. w. ist an manchen Seeküsten gebräuchlich.

**Euphorbium, Gummi s. Resina Euphorbii; Euphorbium, Euphorbiumharz.**

Dieses nur als Bestandtheil des Emplastrum Cantharidum perpetuum für den Arzt wichtige Gummiharz bildet den erhärteten Saft einer maroccanischen Euphorbia mit gestielten Blüten, *Euphorbia resinifera* Berg, welche sich von unseren einheimischen Wolfsmilcharten durch ihre kantigen, fleischigen, am Grunde verholzenden, nicht beblätterten, dagegen an den Kanten zahlreiche Polster mit einem kurzen divergenten Stachelpaar tragenden Stengel, die den Pflanzen eher den Habitus eines Cactus geben, unterscheidet. Das Euphorbium des Handels ist oft im hohen Grade unrein, mit Stengelresten, Früchten und Erde untermengt, welche selbst das eigentliche Euphorbium, das unregelmässige, kuglig-dreieckige, erbsen- bis nussgrosse, schmutzig-gelbliche, mit 1—3 Löchern versehene Stücken bildet, an Masse übertreffen können. Das Euphorbium hat keinen Geruch, verbrennt mit aromatischem Geruche, löst sich in Wasser, Spiritus und Aether zum Theile auf und erregt, in gepulvertem Zustande mit der Nasenschleimhaut in Contact gebracht, äusserst heftiges Niesen. Es enthält wenig Gummi, 40—60%



eines spröden, gelbbraunen Harzes, 13–19% eines wachsartigen Stoffes und ebensoviel apfelsaure Salze. Das Harz ist ein Gemenge von sog. Euphorbon (Gammaharz von Rose), einem indifferenten, in siedendem Alkohol, aber nicht in Alkalien löslichen Harze, und einer in Aether und Weingeist leicht, in Petroleumäther und fetten Oelen wenig löslichen colophoniumähnlichen Harzmasse, welche nach Buchheim als das Anhydrid einer dunkelbraunen, in Aether wenig löslichen, bitteren, aber nicht scharfen, in der Droge nicht präformirten Harzsäure, der Euphorbinsäure, anzusehen ist.

Die scharfen Eigenschaften des bereits im Alterthume bekannten Medicamentes sind vielfach übertrieben. Auf der Haut verhält es sich nach meinen Versuchen mit auserlesener Waare in Pulverform völlig indifferent, erregt jedoch in kleinen Mengen Niesen (angeblich selbst heftiges Nasenbluten, nach Einigen auch beim Pulverisiren Thränen der Augen und Gesichtsgeschwulst); es erregt nach Buchheim in alkoholischer Lösung an zarteren Hautstellen Dermatitis, im Munde und Rachen Stunden lang anhaltendes Brennen, im Magen und Darm Erbrechen und Abführen, in Wunden und Geschwüren heftige Entzündung bis zu brandiger Zerstörung. In Pulverform gegeben purgirt es zu 0,2–0,5 nicht. Das früher als Bestandtheil verschiedener reizender Pflaster oder Verbandsalben (1:25 Fett) benutzte Gummiharz dient jetzt vorzugsweise zum Ueberziehen der Schiffsböden.

Eine früher daraus bereitete rothgelbe, bei längerer Aufbewahrung Krystalle von Euphorbon absetzende Tinctur, *Tinctura Euphorbii*, wurde sonst als Zusatz zu reizenden Verbandsalben oder zum Betupfen torpider Geschwüre oder cariöser Knochen, auch gegen Warzen benutzt. Als *Emplastrum Picis irritans* wurde ein gelbes Pflaster aus 3 Th. Euphorbium mit 56 Th. einer Schmelze von Fichtenharz, gelbem Wachs und Terpenthin bereitet, bezeichnet, welches nach Art des *Emplastrum Cantharidum perpetuum*, aber noch langsamer, hautreizend wirkt.

**Anhang.** Die Familie der Euphorbiaceen liefert noch eine Reihe scharfer Arzneimittel. Am heftigsten scheint die Schärfe bei dem tropischen Mancinellbaum, *Hippomane Mancinella* L., dessen Ausdünstungen, wie Karsten neuerdings bestätigt, besonders auch bei Verbrennen des Holzes, Augenentzündung und heftige Dermatitis erregen können. Hierher gehört auch der gegen Schlangenbiss und Hautkrankheiten benutzte Saft von *Hura crepitans* L., das sog. Assacu. Auch einheimische Euphorbiaceen, z. B. *Euphorbia helioscopia* L., *E. Cyparissias* L., führen scharfen Milchsaff, der von Kindern häufig zum Wegbeizen von Warzen benutzt wird.

**Cortex Mezerei; Seidelbastrinde, Kellerhalsrinde.** — Die Familie der Thymeläen liefert eine Anzahl scharfstoffiger Drogen, von denen die Rinde von *Passerina Tortonraira*, *Cortex Tortonraira*, die stärkste sein soll. Bei uns war früher die im Frühling gesammelte, brennend scharf schmeckende Rinde des Stammes und der kräftigeren Aeste, auch wohl der Wurzel des in fast ganz Europa und Nordasien einheimischen Seidelbasts, *Daphne Mezereum* L., officinell, im Handel in aufgerollten, mit dem Bast nach aussen gekehrten, langen Bändern von kaum 1 Mm. Dicke vorkommend. Die Rinde von *Daphne Laureola* (mit grünem Baste) ist weit minder scharf (Flückiger). Die Schärfe kommt auch anderen Theilen des Kellerhalses, namentlich den Früchten, welche schon zu 1–3 Stück beim Erwachsenen heftige Gastroenteritis bedingen können und öfters bei Kindern zu Vergiftung Anlass geben, auch den Blüthen (Enz), sowie Rinden und Früchten anderer Thymeläen zu, z. B. den *Baccae Coccognidii* s. *Semina Gnidii*, den schon vor Hippokrates als drastisches Purgirmittel benutzten Früchten von *Daphne Gnidium* L. Der scharfe Bestandtheil der Seidelbastrinde, der in der Mittelrinde vorzugsweise seinen Sitz hat, ist weder das mässig bittere, hinterher herbe schmeckende Glykosid Daphnin, noch das besonders in den Früchten vorhandene, nur durch Beimengung des scharfen Stoffes auf der Haut Entzündung und Ausschlag verursachende fette Oel, sondern in dem Harzgemenge vorhanden, welches neben einem unwirksamen, dem Euphorbon ähnlichen, indifferenten Harze aus einer gelbbraunen, glänzenden, nicht krystallinischen, in

Aether und Weingeist leicht, in Petroleumäther fast gar nicht löslichen Masse besteht, die in Pulverform heftiges Niesen verursacht, in spirituöser Lösung Brennen und stundenlanges Kratzen auf der Mundschleimhaut und bei grösseren Mengen Blasenbildung bedingt und als Anhydrid einer bitteren, nicht scharfen Harzsäure, der Mezereinsäure, die sich sehr leicht unter Einwirkung von Kali daraus bildet, anzusehen ist (Buchheim). — Auf die äussere Haut gelegt bedingt der Bast der Seidelbastrinde nur sehr langsam Hautröthung und Blasenbildung, was bei Anfeuchten mit Wasser oder Essig etwas rascher vor sich geht. Auf Wunden und Geschwüren wirken sowohl der Bast als daraus hergestellte Auszüge ebenfalls reizend.

Die früher übliche, jetzt vergessene interne Anwendung gegen chronische Hautkrankheiten, z. B. Psoriasis (Cazenave), und syphilitische Knochenaufreibungen ist eine rein empirische. Man gab ihn hier in Tisanenform (1:100 Colatur) mit oder ohne andere Kräuter von vermeintlich gleicher Wirkung, z. B. mit Sarsaparilla, Sassafras, Lignum Guajaci und Süssholz, im sog. Lisboa diet drink (Decoctum Sarzae compositum Ph. Brit.).

Auch die äusserliche Anwendung ist eine beschränkte, nur hier und da beim Volke noch beliebt, das ein passendes Stück der frischen und von dem Periderma entblösten Rinde in Wasser oder Essig aufweicht und zum Zwecke der Ableitung bei Entzündungen in der Nähe der kranken Stelle applicirt und zuerst 2mal täglich, dann, sobald sich die Oberhaut abgelöst hat, 1mal und später alle 2 Tage mit einem gleichen Stücke vertauscht. Die Schmerzen sind dabei nicht erheblich, dagegen ist die Befestigung lästig und die Wirkung unsicher, immerhin sicherer, als die des gleichfalls beim Volke gebräuchlichen Kauenlassens eines Stückes Seidelbast bei Zungenlähmung.

Nicht ganz unzweckmässig ist eine früher officinelle, aus 1 Theil eines dünnen spirituösen Extracts (Extractum Mezerei) und 9 Th. Wachssalbe bereitete Salbe, Unguentum Mezerei s. epispasticum s. rubefaciens, zum Verbands wundgemachter Hautstellen, wo man eine längere Ableitung nöthig hält, in der Absicht, die durch analoge Salben, z. B. Cantharidensalbe, häufiger hervortretende Nierenreizung zu verhüten. In der That ist Nierenreizung nach dieser Art der Anwendung der Seidelbastsalbe noch nicht beobachtet. Man hat auch künstliche Fontanellebsen aus Mezereum, Althaea und Kautschuk bereitet (sog. Pois élastiques).

*Resina Thapsiae Garganicae.* — In Frankreich benutzt man nicht selten den als *Resina Thapsiae* bezeichneten alkoholischen Auszug der Wurzelrinde einer in Südeuropa und Nordafrika einheimischen Umbellifere, *Thapsia Garganica* L., zur Darstellung von Pflastern und Klebtaffeten, welche Hautröthung und bei längerem Liegen Blasenbildung hervorbringen (Reboulleau, Laperdriel). Die Wirkung wird der des Crotonöls verglichen, indem spirituöse Lösung des Harzes auf die Haut eingerieben Blaschenausschlag producirt und das Harz intern zu 0,01—0,04 Purgiren bedingt. Bedeutend wirksamer ist die Wurzelrinde der nahe verwandten *Thapsia Silphium* L., welche die *Thapsia* der Alten, nicht aber das als Genussmittel, Gemüse und Arzneimittel bei den alten Griechen und Römern in hohem Rufe stehende *Silphium* ist. Dasselbe bewirkt gekaut mehrtägliches Brennen im Munde mit Verminderung der Geschmacksempfindung und Vermehrung der Absonderung und giebt eine weit stärker hautreizend wirkende alkoholische Tinctur als *Radix Thapsiae Garganicae* (Schroff). Die letztere kam früher auch unter dem Namen *Rad. Turpethi* (*Hispanici* s. *spirii*) in den Handel. Buchheim vermuthet, dass das Harz ein Anhydrid enthalte.

*Cardolcum, Cardol.* Als Ersatzmittel der Cantharidenpräparate, hauptsächlich um die bei äusserer Application oft entstehende Nierenreizung zu verhüten und um einen Hautreiz an gewissen Körperstellen etabliren zu können, wo sich Pflaster schlecht appliciren lassen, ist das aus den sog. Elefantensäusen, *Anacardia*, Acajounüssen, Mahagoninüssen bereitete *Cardol* empfohlen. Von letzteren unterscheidet man zwei Sorten im Handel, die westindischen und ostindischen Elefantensäusen, *Anacardia occidentalia*, die Früchte von *Cassuvium pomiferum* Lam. (*Anacardium occidentale* L.), und *Anacar-*

dia oridentalia, die Früchte von *Semecarpus Anacardium* L. Dieselben enthalten in Lücken des Pericarps einen syrupdicken, scharlachrothen, ätzend scharfen Saft, aus welchem *Staedeler* das wirksame Princip in Form eines indifferenten, hellgelblichen, öartigen oder balsamartigen Körpers, den er *Cardol* nannte, isolirte. Dieselbe besitzt keinen erheblich scharfen Geschmack, entwickelt beim Erwärmen schwachen angenehmen Geruch und löst sich leicht in Weingeist und Aether, nicht in Wasser. Das *Cardol* des Handels ist jedoch nicht der reine Körper, sondern ein mehr unreines, meist dunkles ätherisches Extract der Elephantenläuse. Man unterscheidet *Cardol vesicans* und *pruriens*, letzteres angeblich aus der ostindischen Droge dargestellt und von tiefschwarzer Farbe, die wohl durch differenten Gehalt an reinem *Cardol* verschieden sind und daher quantitativ differente Wirkung entfalten. *Cardol vesicans* macht schon in wenigen Minuten Gefühl von Brennen und in 2 bis 12 Stunden und später, je nach Individualität und Applicationsstelle, Quaddeln und daraus hervorgehende Blasen. Nach *Cardol pruriens* tritt minder stark ausgesprochene Exsudation auf, nicht selten erysipelatöse Röthung, bisweilen übrigens auch Blasenbildung. Bei nicht sorgfältiger Reinigung der Haut nach Application von *Cardol* können Spuren desselben in Folge des Kratzens auch auf andere Körperstellen übertragen werden und dort ekzematösen Ausschlag produciren, der sich auf andere Stellen verbreiten kann (*Buchheim*). Die Schärfe des *Cardols* ist so bedeutend, dass die Bereitung desselben zum Auftreten von Ekzem im Gesichte und an anderen Körperstellen führen kann (*Krahmer*). Für die Anwendung des Mittels sprachen *Frerichs* und *Bartels* sich deshalb aus, weil die Blasenbildung ohne Schmerzen geschieht und nach Oeffnung der Blase reichliche Eiterung eintritt, ohne dass reizende Verbandssalbe nöthig wird. Die von *Bartels* gerühmte Beschränkung der Wirkung des Mittels ist illusorisch, da sich gar nicht selten entzündliches Oedem in der Umgebung der Applicationsstelle entwickelt. In einzelnen Fällen ist die Reizung so heftig, dass sich sanguinolentes Serum ergiesst und die gebildeten Blasen mit Blut gefüllt erscheinen; die Wundfläche ist manchmal durch Extravasate in das *Corium* dunkelroth und die Eiterung schlecht. Die Vorzüge vor *Cantharidenpräparaten* sind deshalb nur sehr gering, zumal wenn die in meinen eigenen Versuchen allerdings nie hervorgetretene Reizung der Nieren, wie *Bertram* behauptet, keinesweges immer fehlt. *Frerichs* wandte das Mittel besonders bei Laryngitis Phthisischer an. Es wird mit einem Pinsel aufgestrichen. Die Dosis ist sehr gering; *Bartels* reichte bei 100 Personen mit 8,0 zur Hervorrufung ausgedehnter Eiterungsstellen aus. Die *Acajounüsse* werden in ihrer Heimath als *Drasticum* benutzt. Nach *Buchheim* ist *Cardol* zu 3—4 Tropfen innerlich wegen Unlöslichkeit in Wasser auf den *Tractus* ohne Einwirkung. Inwieweit dieser scheinbare Widerspruch vielleicht durch das Vorhandensein eines anderen drastischen Stoffes in den *Acajounüssen* zu erklären ist, in denen nach *Städeler* sich eine eigenthümliche Säure, die *Anacardsäure*, findet, bedarf weiterer Untersuchungen. *Buchheim* hält das *Cardol* für das toxische Princip des Giftsumachs.

**Fructus Capsici, Piper Hispanicum, Piper Indicum; Spanischer Pfeffer, Paprika.**

Der Spanische Pfeffer ist die durch grosse Schärfe ausgezeichnete reife Frucht von *Capsicum longum* und *annuum* Fingerhut, zwei Solaneen, welche, ursprünglich in Westindien und Südamerika einheimisch, in wärmeren Ländern äusserst häufig cultivirt werden und eine Menge Varietäten bilden.

Die Frucht ist eine saftlose, 5—10 Cm. lange, am Grunde 4 Cm. dicke, konische, meist rothe, gelbrothe oder braunrothe, glänzende Beere, mit ziemlich flachem, grünlich braunem Kelche, innen hohl, mit dünnem Pericarp und flachen, unregelmässig rundlichen, gelblichen Samen von ungefähr 5 Mm. Durchmesser.



Das scharfe Princip des Spanischen Pfeffers, welches sich beim Kauen desselben rasch in sehr empfindlich brennender Weise fühlbar macht, ist noch nicht rein dargestellt.

Buchheim und Eberbach halten einen rothbraunen, dicklich öligen, Pflanzenfarben nicht verändernden, in Weingeist, Aether, Petroleumäther, Benzol, Kali und Ammoniak leicht, in Wasser wenig löslichen Stoff von scharfem Geschmacke, das Capsicol, für das active Princip. Derselbe soll wie Cardol und Crotonölsäure die Gerinnung des Eiweiss beim Kochen verhindern, die Coagulation der Milch und die alkoholische Gährung verzögern und bei trockener Destillation ein Aldehyd und beim Behandeln mit Salpetersäure Oenanthylsäure und Korksäure liefern. Fleischer und Högyes (1878) gewannen aus Capsicum einen ähnlichen Stoff, der nur örtlich irritirend wirkte. Parrish und Taylor vindiciren die Schärfe einem krystallisirten, farblosen Stoffe, den sie einem Stearopten verglichen.

Capsicum erregt, befeuchtet auf die Haut gelegt, in wenigen Minuten brennende Empfindung und Röthung, bei längerem Liegenlassen auch Blasenbildung. Der Staub reizt die Augen und andere Schleimhäute; auch beim Erhitzen der Fruchtschalen kommt es leicht zu Räuspern und Husten.

Kleine Mengen verschluckt erzeugen Wärmegefühl im Magen und sollen die Verdauung befördern und Flatulenz verhüten. Einfluss auf den Puls scheint nicht stattzufinden. Habituellem Genuss soll zu Schwäche der Verdauung und Störung der Darmfunction führen können; doch wird in tropischen Gegenden Capsicum in solchem Uebermasse genossen, z. B. auf Butterbrod in grossen Stücken, dass man sich wundern muss, nicht mehr von dadurch bedingtem Unheil zu hören. Grosse Dosen sollen nach Vogt heftige Kolik, Purgiren und Magenentzündung bedingen. Auch gilt Capsicum als Diureticum und Anaphrodisiacum, wofür indess authentische Belege nicht existiren.

Im Ganzen findet Capsicum bei uns innerlich und äusserlich sehr wenig Anwendung. In den Tropen benutzt man dasselbe bei Verdauungsschwäche und glaubt dadurch die Digestion vegetabilischer Nahrungsmittel zu befördern. Ist die Verdauungsstörung Folge einer entzündlichen Affection, so ist das Mittel zu meiden.

Englische und ostindische Aerzte rühmen es als Stimulans bei Typhus, wo es indess nur bei bestehendem Meteorismus Günstiges leistet (Chapman). Auch bei Delirium tremens ist es neuerdings empfohlen. Gegen Intermittens wird es in den Tropen seltener für sich als in Verbindung mit Chinin angewendet, dessen Wirkung es bei bestehendem Magenkatarrh fördern soll. Rein empirisch ist der Gebrauch gegen Hämorrhoiden (innerlich zu 0,5—3,0 nach Allégre), wo auch die eingemachte unreife Frucht gute Dienste leisten soll. Auch bei Rheumatismus und Gicht ist es innerlich gegeben (Hereford). Westindische Aerzte rühmen ausserordentlich die Anwendung eines starken Gurgelwassers aus Capsicum bei Angina maligna, Tonsillitis und Angina scarlatinosa. Es liegt jedoch auf der Hand, dass man gerade hier äusserst vorsichtig sein muss, weil es sehr wohl möglich erscheint, dass durch den intensiven Reiz die Entzündung auf den Kehlkopf sich fortpflanzt. Es soll übrigens nur im Beginne der Affection nützen. Bei Kindern wird ein solcher Aufguss oder Capsicumtinctur mittelst eines Schwämmchens applicirt.

Innerlich wird Capsicum zu 0,3—0,6 meist in Pillen verordnet. Im Aufguss giebt man 2,0—4,0 auf 200,0 Colatur; in Westindien als Gurgelwasser 8,0—15,0 auf 200,0 Colatur, wozu 90,0 Acetum und 8,0 Natrium chloratum gesetzt werden.

#### Präparat:

**Tinctura Capsici, Spanischpfeffertinctur, Capsicumtinctur.** Mit 10 Th. Spiritus bereitet, von scharfem Geschmack. Innerlich zu 10—20 Tropfen, in Verdünnung äusserlich zu ableitenden und belebenden Einreibungen wie Senfspiritus, als Zahnwehmittel u. s. w. benutzt.

**Anhang:** Dem Spanischen Pfeffer botanisch nahe verwandt ist der Cayenne-Pfeffer, *Piper Cayennense*, die viel kleineren Früchte von *Capsicum Brasilianum* Clusius (*Capsicum crassum* Willd.) und von Varietäten dieser oder in Form und Grösse ähnlicher *Capsicum*species. Dieselben übertreffen zum Theil die *Fructus Capsici* an Schärfe. Im Handel kommen sie meist fein gepulvert vor. In England officinell, werden sie wie *Capsicum* angewendet, sind auch gegen Seekrankheit empfohlen, jedoch wenig zuverlässig. Ein mit einem Extracte bestrichenen Papier zum Hautröthen ist als Mustard paper in den Handel gelangt.

Die wahren Pfefferarten stammen nicht von Solaneen ab, sondern von Gewächsen aus der Familie der *Piperaceae*. Der als Gewürz hinlänglich bekannte schwarze Pfeffer, *Piper nigrum*, ist die unreife Beere, der weisse Pfeffer der viel weniger scharfe Same der reifen Frucht von *Piper nigrum* L., einem in Hindien und auf dem indischen Archipel vielfach cultivirten Schlingstrauche. Der weniger benutzte lange Pfeffer, *Piper longum*, ist der ganze Fruchtstand (Spindel mit den festverwachsenen Fruchtknoten) der auf den Philippinen und Sundainseln wildwachsenden *Piperaceae* *Chavica officinarum* Miq. und der verwandten bengalischen *Chavica Roxburghii* Miq. Medicinische Bedeutung hat nur der schwarze Pfeffer, der noch jetzt in einzelnen Gegenden als Heilmittel gegen Intermittens gebraucht wird und in der That Fieberanfälle zu coupiren vermag. Er verdankt diese Eigenschaft einem darin enthaltenen Alkaloide, dem Piperin, welches in glasglänzenden Prismen krystallisirt und in reinem Zustande fast ohne Geschmack ist. Bei längerem Erhitzen mit weingeistigem Kali zerfällt es in Piperidin, eine nach Pfeffer und Ammoniak riechende, ätzend schmeckende, stark alkalische Flüssigkeit, und piperinsaures Kalium. Neben Piperin findet sich im schwarzen Pfeffer noch ein Terpen, das mehr den Geruch als den Geschmack des Pfeffers besitzt, und ein Harzgemenge. Letzterem wird insgemein die Schärfe des Pfeffers zugeschrieben, doch sind nach Buchheim und Neumann sowohl der saure als der indifferente Bestandtheil desselben auf Haut und Tractus (zu 8,0) unwirksam. Buchheim und Neumann vindiciren die Schärfe dem Piperin, das bei Selbstversuchen zu 2,5 intern Brennen und prickelndes Gefühl an Händen und Füssen hervorrief, Erscheinungen, welche weder Piperidin noch Piperinsäure bedingen. Neben dem Piperin soll noch eine zweite Base, welche sich leichter in Aether löst und wenig Neigung zu krystallisiren besitzt, das Chavicin, im schwarzen Pfeffer vorhanden sein, die mit Kalihydrat in Piperidin und eine von der Piperinsäure verschiedene Säure zerfällt. Das Piperin wurde zuerst 1823 von Meli gegen Intermittens versucht und erwarb sich innerhalb und ausserhalb Italiens manche Freunde, welche es sogar dem Chininsulfat vorzogen, aber auch entschiedene Gegner, die es unwirksam fanden (Chiappa, Werneck und Radius). Manche wollten die Heileffecte aus Verunreinigung des Piperins mit ätherischem Oele oder Harz erklären; doch hat sich das von Charpentier warm empfohlene *Oleum Piperis aethereum* gegen Intermittens in keiner Weise bewährt. Man gab Piperin zu 0,5 2mal in der Apyrexie (Gordini), bisweilen selbst in vertheilten Dosen bis 4,0 pro die. Die Anwendung des ätherischen Oeles bei Glossoplegie ist verlassen. An die antitypische Verwendung des Piperins und des schwarzen Pfeffers schliesst sich der in manchen Gegenden populäre Gebrauch des schwarzen und auch des weissen Pfeffers zum Hinausschieben der Menstruation von Seiten mancher Damen an, wenn denselben durch die Katamenien die Aussicht auf Tanzvergnügen gestört wird. Stahl u. A. rühmten den weissen Pfeffer, zu 6—12 ganzen Körnern genommen, gegen Hämorrhoidalbeschwerden. Als reizendes Mittel benutzte man den (viel schärferen) schwarzen Pfeffer zu trocknen Fomenten der Fusssohlen bei Sopor, zu Salben (1:10 Fett) bei chronischen Hautausschlägen, ferner als Kaumittel bei Anginen und Zungenlähmung. Man darf nicht vergessen, dass grössere Mengen Pfeffer intern genommen heftige Vergiftungserscheinungen hervorbringen können, namentlich hat die Behandlung des Intermittens mit Pfeffer in Branntwein zu Gastritis geführt. In einzelnen Fällen kam es zu Ohnmachten und Convulsionen. Chiappa will auch bei Behandlung von Fiebern mit Piperin brennenden Schmerz im Magen, Hitze im Rectum und im ganzen Abdomen, Injection der Augen und Anschwellung der Augenlider und Nase beobachtet haben.

Zu den Pfefferarten zählt man meist noch den Nelkenpfeffer oder Wunderpfeffer, auch Piment oder Jamaica-Pfeffer genannt, *Fructus Amomi s. Pimentae*, die Früchte der in Westindien und Mexico einheimischen, in tropischen Ländern vielfach cultivirten *Myrthacee Pimenta officinalis* Berg s. *Eugenia Pimenta* DC. Derselbe besitzt eine viel geringere Schärfe, die er einem in der Zusammensetzung mit dem Nelkenöle identischen Oele verdankt und dient bei uns ausschliesslich als Gewürz. — An den Pfeffer schliesst sich auch die Wurzel des Betelpfeffers, *Macropiper methysticum*, welche auf den Südseeinseln als Kaumittel und zur Darstellung eines berauschenden Getränkes, des sog. Awa oder Kawa, dient und die man zur Darstellung einer bei Podagra, Indigestion und Blennorrhöen benutzten Tinctur verwendete.

**Semen Sinapis**, Semen Sinapeos, Semen Sinapis nigrae s. viridis; **Senfsamen**, schwarzer Senf. **Oleum Sinapis**, Oleum Sinapis aethereum; **Senföl**, ätherisches Senföl.

Als Senf bezeichnet man die Samen von *Brassica nigra* Koch s. *Sinapis nigra* L., einer Crucifere, welche in fast ganz Europa wächst und in vielen Gegenden Europas (auch in Californien) zur Gewinnung ihrer Samen cultivirt wird.

In Sarepta und dem südöstlichen Russland wird statt *Brassica nigra* eine andere Crucifere, *Sinapis juncea* Mayer, gebaut, deren Samen, von der Samenschale und dem in Russland als Speiseöl geschätzten fetten Oele befreit, gepulvert als Sarepta-Senfmehl im Handel vorkommt.

Der Senf bildet fast kuglige, 1 Mm. dicke, fein netzig grubige, aussen mehr oder minder dunkel rothbraune, innen gelbe Samen, die beim Kanen anfangs milde ölig, bald aber brennend scharf schmecken und ein gelblich grünes Pulver geben, welches bei Befeuchtung mit Wasser einen äusserst intensiv reizenden Geruch entwickelt. Die dünne Samenschale lässt das in die Rinne der zusammengefalteten Keimblätter heraufgebogene Würzelchen erkennen. Der Senfsamen wird bisweilen mit anderen Cruciferensamen verfälscht. So mit den Samen der als Oelgewächse gezogenen *Brassica Napus* L. und *Brassica Rapa* var. *oleifera* (Raps, Rübsamen), welche aber nur sehr feingrubig punktiert, gegen 2 Mm. gross, von dunklerer Farbe und fast ohne Schärfe sind. Die Samen des Ackersenfes, *Sinapis arvensis* L., und der schwarzsamigen Varietät von *Sinapis alba* L. sind ebenfalls grösser und fast glatt.

Der Senf enthält bis 32% eines milde schmeckenden, fast geruchlosen Oeles, das die Glyceride der Stearinsäure, der Eruksäure und einer vielleicht eigenthümlichen Oelsäure enthält. Derjenige Stoff, auf welchem die scharfen Eigenschaften des Senfes beruhen, das durch Destillation der in kaltem Wasser eingeweichten Senfsamen dargestellte **Senföl**, **Oleum Sinapis**, ist in den Senfsamen nicht präformirt enthalten.


Es bildet ein farbloses oder gelbliches, dünnes Fluidum von 1,016 bis 1,022 spec. Gew., von durchdringend scharfem Geruche und Geschmacke, neutraler Reaction, in 50 Th. Wasser und in jedem Verhältnisse in Spiritus löslich. Es besteht in der Hauptsache aus Schwefelcyanallyl (Sulfocyanensäure-Allyl-äther), welches künstlich durch Destillation von Iodpropylen mit Sulfocyanalkalium dargestellt werden kann, und neben dem mehr oder minder grosse Mengen von Cyanallyl, aus Sulfocyanallyl unter Abscheidung von Schwefel entstehend, auftreten.

Die Entstehung des Senföls findet nur statt, wenn Wasser mit Senfsamen in Berührung kommt, und zwar, wie Will und Körner



1863 nachwiesen, unter Einwirkung eines als Ferment wirkenden, dem Senfsamen eigenthümlichen Eiweisskörpers, des Myrosin, auf eine zunächst als myronsaures Kali, später als Sinigrin bezeichnete krystallisirbare Verbindung.

Das Sinigrin hat die Formel  $C^{10}H^{18}KNS^2O^{10}$ , welche die Elemente von



enthält und in diese drei Körper zerfällt. Die Spaltung des Sinigrins erfolgt nicht durch Emulsin oder ähnliche Fermente, wohl aber mittelst Baryt und Silbernitrat (Ludwig und Lange). Schwefelcyanallyl bildet mit Ammoniak behandelt eine krystallinische Verbindung, das Thiosinamin, welches von Wolff gegen Internittens versucht wurde, jedoch wegen Erregung von Kopfschmerzen und wegen nicht sicherer Wirkung keine Anwendung verdient. Künstliches Senföl wirkt physiologisch genau wie aus Senfsamen dargestelltes (Köhler und Henze).

Senföl hebt die Gerinnbarkeit des Eiweisses beim Kochen und die Coagulabilität der Milch auf (Buchheim und Eberbach) und retardirt die alkoholische, faulige, ammoniakalische Harn- und Milchgährung (Köhler und Henze).

Es ist das giftigste aller sog. ätherischen Oele und tödtet schon zu 1,0 Kaninchen in 2 Stunden, wobei es hämorrhagische Gastroenteritis bewirkt. Beschleunigung der Herzaction, erschwerte Respiration, Muscularschwäche, schliesslich Anästhesie und Convulsionen bilden das Intoxicationsbild; die Reizbarkeit des Herzens und der Muskeln persistirt lange Zeit nach dem Tode; der Geruch des Oeles zeigt sich dabei in Blut und Athem, mitunter auch im Urin (Mitscherlich). In Emulsion intravenös eingeführt bedingt es je nach der Dosis Steigen resp. Sinken des Blutdrucks durch Reizung bezw. Herabsetzung des vasomotorischen Centrums und Beschleunigung ev. Verlangsamung der Athmung durch Erregung resp. Lähmung des Athmencentrums; kleine Mengen steigern die Reflexerregbarkeit anfangs und heben dieselbe später ganz auf (Köhler und Henze).

Auf der menschlichen Haut erregt es selbst in starker Verdünnung sofort heftiges Brennen, Röthung und später Blasenbildung.

Riecht man an einer Senföl enthaltenden Flasche, so erfolgt sofort Stechen in der Nase und Thränen. Unzerkleinerte Senfkörner machen beim Verschlucken keine nennenswerthen Erscheinungen. Senfpulver erregt wie gekaute Senfkörner Gefühl von Brennen auf der Zunge, auch im Schlunde, und nach dem Verschlucken Wärmegefühl im Magen. Appetit und Digestion werden durch reflectorische Vermehrung des Magensaftes etwas gefördert, bei längerem Gebrauche jedoch vermindert; auch will man danach mechanische Verstopfung des Dickdarms beobachtet haben. Grosse Dosen wirken emetisch, können auch Gastroenteritis und Diarrhoe erzeugen. Man schreibt dem Senf diuretische Effecte zu, wofür physiologische Beweise nicht vorliegen. Das Volk vindicirt ihm günstigen Einfluss auf das Gedächtniss!

Die Effecte befeuchteten Senfmehls auf die menschliche Haut sind die nämlichen wie die des Oleum Sinapis. Die Röthung erfolgt meist in 7–10 Minuten, selten erst in  $\frac{1}{4}$  Stunde; der brennende Schmerz ist dabei ziemlich heftig, die Haut an der Applicationsstelle heiss und empfindlich. Später erfolgt Bildung von Bläschen und selbst von grossen Blasen, welche Geschwüre hinterlassen, die sehr wenig Neigung zur Verheilung zeigen.

Die Wirkung allgemeiner Senfbäder äussert sich ähnlich wie bei Bädern, denen viel ätherische Öle beigemengt sind. In einem Bade von der Temperatur des Körpers tritt allgemeiner Frost, Zähneklappern, leichtes Zucken der Lippen und Gliedmassen, Verfall des Gesichtes, bei beschleunigtem Pulse und ohne dass Abnahme der Körperwärme stattfindet, ein; die Haut wird dabei an einzelnen Stellen geröthet, ohne dass sich Schmerz zeigt, ehe die Kranken das Bad verlassen haben. Später folgt allgemeines Hitzegefühl, Stechen und Brennen der Haut (Trousseau und Bonfils).

Sowohl der Senf als das Senföl finden ihre Hauptanwendung äusserlich als Hautreiz.

Innerlich wird ersterer oft als Diäteticum, besonders als Zusatz von gekochtem und gebratenem Fleisch, meist gleichzeitig und mehr noch in der Absicht, dasselbe pikanter zu machen, gebraucht. Dass vor übermässiger Benutzung und vor der Anwendung bei bestehenden Reizungszuständen des Magens zu warnen ist, liegt auf der Hand. In England benutzt man grössere Mengen Senf innerlich als Brechmittel, besonders bei Vergiftungen, wenn Magenspumpe oder Brechmittel aus Zink- oder Kupfervitriol nicht gleich zur Hand sind. Man meide ihn übrigens bei Giften, welche an sich Entzündung des Magens erregen, und beschränke seine Benutzung auf narkotische Intoxicationen, wenn die betreffenden Gifte (Morphin, Atropin) bedeutende Herabsetzung der Erregbarkeit der Magennerven bedingen, aus der die Unwirksamkeit schwächerer Emetica resultirt. Die Empfehlung des längeren Gebrauches von Senfsamen gegen Rheumatismus und chronische Hautkrankheiten hat keine rationelle Begründung. Wolff hat Senföl bei chronischem Magenkatarrh und Anorexie gerühmt; Kuhk empfahl es gegen Hydrops, wo man früher die sog. Senf molken, *Serum lactis sinapisatum*, zu verordnen pflegte.

Als hautreizendes Mittel findet Senf seine Indication in allen Fällen, wo rasche Irritation und Röthung der Haut geboten ist, während da, wo die Wirkung eine nicht so schnelle zu sein braucht, die Cantharidenpräparate den Vorzug haben.

Vor allem ist Senf angezeigt, wo man durch Reizung peripherischer Nerven Erregung der gesunkenen Thätigkeit der Nervencentra herbeizuführen beabsichtigt, so bei Asphyxien, Ohnmachten, comatösen Zuständen, bei Respirationsstörungen, um reflectorisch die Inspirationsmuskeln anzuregen. Der Senf eignet sich ferner da, wo man das hautröthende Mittel auf eine grössere Fläche des Körpers zu appliciren beabsichtigt, um eine grössere Menge von Blut auf einmal nach der Peripherie des Körpers zu leiten, worauf der Gebrauch der Senfbäder (bei Cholera angewendet) und Senffussbäder beruht. Auch bei schmerzhaften Affectionen, z. B. Odontalgie, Rheumatismus, Neuralgien, ist der Senf als Gegenreiz zu verwenden und leistet in frischen Fällen gar nicht selten die günstigsten Dienste. Zu längerem Gebrauche eignet sich dagegen Senf nicht; doch will Herpin durch fortgesetzte Anwendung von Senfbädern Intermittens geheilt haben.

Senföl kann ganz wie Senfsamen gebraucht werden, doch beschränkt man dessen Anwendung meist auf solche Partien, an welchen sich der Senf selbst nicht gut anbringen lässt, z. B. im Gesicht, hinter den Ohren.

Innerlich wird der Senf als kräftiges Emeticum zu 8,0–15,0 verabreicht. Senföl ist nur mit grösster Vorsicht innerlich zu gebrauchen; man gab es bis zu  $\frac{1}{4}$  Tropfen in wässriger Lösung.

Äusserlich wird der Senfsamen vorzugsweise in der Form des Senfteiges, Sinapismus, Cataplasma Sinapis, Pasta epispastica, Cataplasma epispasticum, benutzt. Man versteht darunter ein

Kataplasma, das durch Mischen von gleichen Theilen gepulverten Senfsamens und Brunnenwasser bereitet wird.

Es ist zweckmässig, bei domestiker Anfertigung lauwarmes Wasser zu benutzen, weil dieses rascher die Zersetzung des Sinigrins, welche immer einige Zeit erfordert, bewirkt. Kochendes Wasser hemmt die Spaltung durch Einwirkung auf das Myrosin. Ebenso schwächt Zusatz von Essig, Weingeist, Ammoniak, Phenol oder Salicylsäure die Wirkung. Altes Senfmehl verliert die Fähigkeit, bei Befeuchten mit Wasser Senföl zu produciren, weshalb frisch gepulverter Senfsamen am meisten zu empfehlen ist. Man streicht den Teig gewöhnlich auf Leinwand und applicirt ihn nach Bedürfniss. Nach 10—15 Minuten ist er zu entfernen und die Stelle sorgfältig abzuwaschen, um nicht durch liegende Reste Ulcerationen zu veranlassen. Wo man den Senfteig bei Gelähmten oder Empfindungslosen applicirt, ist dies besonders zu beachten, weil solche Patienten die Wirkung anfangs nicht verspüren oder nicht anzugeben vermögen. Im Falle sehr heftiger Schmerzen wirken kalte Uberschläge, auch Lini-  
mentum Calcis günstig.

Zu Fussbädern nimmt man 50,0—100,0 gröblich zerstoßenen Senf, zu Bädern 100,0—200,0. Wenn man Fussbäder, wie es manche Aerzte thun, bei Ophthalmien benutzt, muss man den Patienten vor den daraus aufsteigenden reizenden Dämpfen ausdrücklich warnen. Von Senfaufgüssen wird jetzt so leicht Niemand als Zusatz von Bädern und Fussbädern oder als Mittel zur Heilung von Scabies Gebrauch machen.

Senföl wird meist in spirituöser Lösung, seltener in Oel (5 Tr. in 4,0 Mandelöl) gelöst, benutzt. Man kann diese einreiben oder damit getränktes Fliesspapier auflegen. Nach Russheim schüttelt man zweckmässig 1 Tr. mit 4,0 Wasser, bei Kindern und Individuen von zarter Haut mit 6,0, trinkt damit ein Stück Löschpapier und applicirt dies unter einem Stück Wachsleinwand, das man mit Heftpflaster befestigt.

#### Präparate:

1) **Charta sinapisata; Senfpapier.** Diese zuerst von Rigollot als Ersatz des Sinapismus angegebene Form stellt Papier dar, welches mit entöltem Senfmehl beklebt ist, wobei als Klebemittel in Ammoniak gelöstes Kautschuk dient (da Gummilösung oder ein spirituöses Klebemittel offenbar vorzeitige Spaltung des Sinigrin bedingen würde). Man schneidet ein Stück von beliebiger Grösse davon ab, taucht es in lauwarmes Wasser und applicirt dasselbe an der gewählten Stelle. Es ist zu fürchten, dass bei längerer Aufbewahrung trotz der Entölung das Mittel in dieser Form doch an Activität verlieren wird.

2) **Spiritus Sinapis, Senfspiritus.** Senföl 1 Th. in Weingeist 49 Th. gelöst. Der Umstand, dass er schneller und kräftiger als der Senfteig wirkt und überall applicirt werden kann, bedingt die Vorzüge des Senfspiritus.

Senfmolken, Serum lactis sinapisatum, siedende Milch durch Senfpulver (Myrosin) zum Gerinnen gebracht, etwa 30,0 Sinapis auf 500,0 Milch, dienten, tassenweise getrunken, früher gegen Hydrops.

**Anhang:** Neben dem schwarzen Senf waren früher noch gebräuchlich die weissen Senfsamen, Semen Sinapis albae s. Semen Erucae, von der bei uns einheimischen verwandten Crucifere Sinapis alba L. Dieselben sind grösser, aber in ihrer Wirkung schwächer. Wie der schwarze Senf enthalten sie Myrosin, dagegen statt des myronsauren Kalium eine analoge eigenthümliche Verbindung, das Sinalbin,  $C^{30}H^{44}N^2S^2O^{16}$ , welches die Elemente von

Schwefelcyanakrinyl . . . . .  $C^8 H^7 NSO$

Traubenzucker . . . . .  $C^6 H^{12} O^6$

und zweifach schwefelsaurem Sinapin . .  $C^{16}H^{22}N O^5, SH^2O^4$

enthält und durch den Einfluss des genannten Fermentkörpers unter Contact mit Wasser in diese zerlegt wird (Will). Das im weissen Senfe früher als präformirt angenommene Alkaloid Sinapin oder Sulfosinapin erscheint hiernach als Spaltungsproduct des Sinalbin. Das Schwefelcyanakrinyl, ein scharf und



brennend schmeckendes, auf der Haut blasenziehendes, gelbes Liquidum, entspricht dem ätherischen Senföl. In dem ätherischen Oele des weissen Senfes findet sich neben dem Sulfocyanakrinyl auch Cyanakrinyl in wechselnden Mengen. Die weissen Senfsamen sind Hausmittel gegen Magenkatarrh.

Dem ätherischen Senföle sehr nahestehende scharfe schwefelhaltige Oele finden sich auch in einer Anzahl anderer Cruciferen. So in der vorzugsweise diätetisch benutzten, besonders im Herbst durch grosse Schärfe ausgezeichneten *Radix Armoraciae*, Meerrettig, von *Armoracia rusticana* Gärtner (*Cochlearia Armoracia* L.). Im frischen Zustande zerquetscht kann die Wurzel als energischer Hautreiz dienen. Früher benutzte man sie in Aufgüssen mit Wein oder Bier als Diureticum; auch bei Indigestion, Amenorrhoe, Intermittens, endlich als Kaumittel gegen Zungenlähmung und Zahnschmerz.

Aus anderen Cruciferen entwickeln sich dagegen bei der Destillation ätherische Oele, welche dem in den Zwiebeln verschiedener Angehöriger der Gattung *Allium* (Fam. *Asphodeleae*), so namentlich im Knoblauch, *Bulbus Allii sativi*, und in den Zipollen oder Zwiebeln, *Bulbus Cepae*, enthaltenen Oele, dem Knoblauchöle, entsprechen oder ein Gemenge von Senföl und Knoblauchöl bilden. Das durch seinen intensiven Geruch ausgezeichnete Knoblauchöl, welches mit dem künstlich durch Einwirkung von Iodallyl oder Sulfocyanallyl (Senföl) auf Schwefelkalium dargestellten Schwefelallyl identisch ist, wirkt scharf reizend auf Haut und Schleimhäute, wie das dadurch so leicht reflectorisch bedingte Thränen der Augen genugsam beweist. Im Orient dient Knoblauch roh oder in Wasserdämpfen gekocht als Derivatium bei Rheumatismus; bei uns giebt man ihn bisweilen in Abkochung mit Milch oder Wasser im Klystier gegen *Oxyuris vermicularis*. Auch die Zwiebel kann man als Hautreiz verwenden; sie ist Volksmittel gegen Keuchhusten (mit Schweineschmalz eingerieben) und Ohrenschmerz, auch benutzt man sie gebraten als Zusatz zu reizenden Kataplasmen bei Drüsengeschwülsten und Panaritien. Man legt den Zwiebelarten eine besonders günstige Wirkung bei Bronchialkatarrhen und bei Hydrops bei, wo man den ausgepressten Saft mit Zucker (als sog. *Syrupus Allii*) oder auch Abkochungen früher medicinisch benutzte. Der Knoblauch gilt auch als ein „pestwidriges“ Mittel und hat deshalb früher zur Darstellung des Räucheressigs (nicht eben zur Verfeinerung!) und selbst innerlich bei Cholera Anwendung gefunden. Vielleicht ist dieser Ruf nur eine Verwechslung mit der als Lachenknoblauch bezeichneten Labiate *Teucrium Scordium* L., die ähnlich riecht und in alten Zeiten als *Bezoardicum* in Ansehen stand. In Südfrankreich ist Knoblauch Volksmittel zur Verhütung des Rausches.

*Herba s. Frondes Thujae*. — Die nordamerikanische Conifere (*Cupressine*) *Thuja occidentalis* L., der bei uns viel cultivirte Lebensbaum, enthält in ihren grünen Theilen ätherisches Oel, ein Glykosid, Thujin, nebst dessen Zuckerpaarling Thujigenin und zwei Harzen (*Kawalier*). Eine aus den Frondes *Thujae* bereitete *Tinctura Thujae* ist ausserordentlich scharf und kann örtlich applicirt Condylome, Papillome und Warzen beseitigen. Sie gilt innerlich gebraucht homöopathischen Aerzten als Heilmittel wider den Krebs. Grosse Mengen wässrigen Aufgusses der *Herba Thujae* gelten als abortiv und können ähnlich wie Sadebaumaufgüsse Gastroenteritis und Tod herbeiführen.

#### **Oleum Rosmarini, Oleum Anthos; Rosmarinöl.**

Dieses ätherische Oel wird aus dem blühenden Kraute von *Rosmarinus officinalis*, einer im Mittelmeergebiete einheimischen strauchartigen Labiate, auf der dalmatischen Insel Lessina gewonnen.

Das Oel ist farblos oder gelblich, dünnflüssig, verharzt aber leicht an der Luft, und wird dickflüssig, hat ein spec. Gew. von 0,88–0,91, riecht campherartig und besitzt einen kühlenden Geschmack. In Alkohol löst es sich in jedem Verhältnisse und schwärzt sich mit Salzsäuregas, ohne eine feste Verbindung zu

erzeugen. Es ist ein Gemenge eines bei 115° siedenden Camphens und eines sauerstoffhaltigen Oeles.

Früher waren auch die im getrockneten Zustande fast nadelförmig zusammengetrockneten, steif lederartigen, an den Rändern zurückgerollten, ganzrandigen, oben glänzend graugrünen, unten weisslichen Blätter von stark campherartigem und aromatisch bitterem und wenig adstringirendem Geschmacke unter dem Namen *Folia Rosmarini* s. *Roris marini* s. *Folia Anthos officinell.* Sie werden viel mit den linienförmigen, am Rande mit kleinen, zahlreichen Höckern besetzten Blättern von *Santolina rosmarinifolia* L. verfälscht. Man vindicirte denselben eine Beziehung zu den weiblichen Sexualorganen und gebrauchte sie deshalb bei Menstruationsanomalien und weissem Fluss. Stärkere Aufgüsse sollen wiederholt getrunken als Abortivmittel gemissbraucht werden (Thierfelder). Im Allgemeinen benutzt man die Droge medicinisch fast nur äusserlich zu Kräuterkissen und Fomenten, meist in Verbindung mit anderen Labiäten, z. B. in älteren Vorschriften der *Species aromaticae*. Man bereitet daraus auch einen Spiritus, den *Rosmarinspiritus*, *Spiritus Rosmarini*, den man zu reizenden Waschungen und Einreibungen, auch als *Badespiritus*, benutzt und der früher auch mit *Lavendelspiritus* als Grundlage des *Spiritus coeruleus*, einer Lösung von Salmiakgeist und Grünspan in den genannten beiden Spiritusarten, diente. Aus einem Gemenge von Rosmarinblättern mit Salbei, Lavendel, Pfefferminz, Rautenblättern und Wermut erhielt man durch Destillation die sog. weisse Arquebusade, *Aqua vulneraria vinosa* s. *spirituosa* s. *sclopetaria*, *Spiritus vulnerarius*, früher viel zu Umschlägen auf Schusswunden und unreine Geschwüre, bei Quetschungen und Verstauchungen benutzt, jetzt wie andere ehemals gebräuchliche Auszüge aus Rosmarin und ähnlichen Kräutern, z. B. der *Spiritus Anhaltinus* s. *Aqua Anhaltina*, in praxi meist durch Antiseptica ersetzt. Der bald mit Wasser, bald mit Spiritus durch Destillation von Rosmarin, Lavendel u. s. w. erhaltene *Spiritus Rosmarini compositus* s. *Aqua Reginae Hungariae* war früher zu kosmetischen Zwecken und reizenden Waschungen sehr beliebt.

Das Rosmarinöl, welches von Jähne gegen Krätze empfohlen wurde und in der That für Krätzmilben wie für andere kleine Gliederthiere toxisch ist, gilt beim Volke als Mittel bei Augenschwäche und Alopecie und wird in Frankreich nicht selten zu erregenden und belebenden Bädern in Verbindung mit anderen Labiatenölen benutzt.

Auch für grössere Thiere ist Rosmarinöl toxisch; schon 1,2 tödtet Kaninchen unter Convulsionen in kurzer Zeit (Strumpff). Bei Säugethieren bewirkt es Steigerung und später Herabsetzung des Blutdrucks durch Erregung resp. Lähmung des vasomotorischen Centrums und tödtet durch Lähmung des Athemcentrums; es steigert in kleinen Dosen und setzt in grossen die Reflexerregbarkeit herab, bewirkt starkes Sinken der Eigenwärme, erregt die Peristaltik und bedingt vermehrte Absonderung nach Veilchen riechenden Harns, bei längerer Darreichung auch Nephritis (H. Köhler und Schreiber). Auf die Haut wirkt es reizend; im Bade ruft es zu 2,0 anfangs Wärmegefühl, später Stechen und in  $\frac{1}{4}$  Stunde Röthung hervor (Topinard).

Besonders geschätzt sind in Frankreich die sog. *Bains de Pennès*, welche man nach Topinard einfacher aus 300,0 Natrium carbonicum und  $\bar{a}\bar{a}$  2,0 Ol. Rosmarini, Ol. Thymi und Ol. Lavandulae bereiten lässt. Eine Mischung von 15 Th. Rosmarinöl,  $\bar{a}\bar{a}$  2 Th. Lavendelöl und Ol. Thymi und 1 Th. Salpetersäure liess Rimmel aus einem kupfernen Gefässe über der Spiritusflamme zur Desinfection verdampfen.

#### Präparat:

**Unguentum Rosmarini compositum**, Ungt. nervinum, Ungt. aromaticum; **Rosmarinsalbe**, Nervensalbe Adeps suillus 16 Th., Sebum 8 Th., Cera flava, Ol. Nucistae  $\bar{a}\bar{a}$  2 Th., Oleum Rosmarini, Ol. Juniperi  $\bar{a}\bar{a}$  1 Th. Gelbliche, aromatisch riechende Salbe. bei Kolik, Lähmungen u. s. w. benutzt. Dieselbe Benennung wird auch billigeren Salbengemischen gegeben, welche kein Oleum

Myristicae und Ol. Juniperi, dagegen aber Ammoniak enthalten, wodurch die reizende Wirkung natürlich erheblich erhöht wird. Aeltere Formeln enthielten statt Ol. Myristicae meist Ol. Lauri, wodurch die Salbe grünlich wird.

#### Verordnung:

R  
*Sebi ovilli*  
*Adipis suilli* āā 25,0  
*Liquefactis et semirefrigeratis ad-*  
*misce*

*Olei Rosmarini*  
*Liquoris Ammonii caustici* āā 5,0  
*M. f. ungt. (Unguentum nervinum in*  
*usum pauperum).*

#### Flores Lavandulae; Lavendelblumen. Oleum Lavandulae; Lavendelöl.

*Lavandula officinalis* Chaix (*Lavandula angustifolia* Ehrh. s. L. *Spica* L.), ein im Mittelmeergebiete einheimischer, bei uns angebauter und in England (Mitcham) im Grossen cultivirter Halbstrauch, liefert die aus dem mit zierlichen Sternhaaren flockig bestreuten, mehr oder weniger stahlblauen Kelche und der azurblauen Blumenkrone bestehenden Lavendelblumen, welche sich durch lieblichen Geruch auszeichnen, der von dem hauptsächlich in den Drüsen des Kelches enthaltenen ätherischen Oele herrührt. Das Lavendelöl des Handels wird meist nicht aus den Blumen allein, sondern auch aus den übrigen Theilen von *Lavandula officinalis* gewonnen; nur das feinste Oel stammt von den Blüthen, die bei uns frisch 1,3, in Südfrankreich getrocknet gegen 3% liefern. Das Lavendelöl ist blassgelb, sehr dünnflüssig, von 0,885—0,95 spec. Gew., neutral und in Weingeist oder 90% Essigsäure in allen Verhältnissen löslich, siedet bei 186—188° und scheidet in der Kälte bisweilen Campher ab. Es enthält in wechselnden Mengen ein bei 200—210° siedendes Camphen und ein Stearopten.

Neben dem Lavendelöl ist noch ein weniger angenehm riechendes, ähnliches Oel, das Spiköl, im Handel, welches gewöhnlich von *Lavandula Spica* Chaix L. (*L. latifolia* Ehrh.), deren Blüthen (mit nicht filzigem Kelche und kleineren Blumen) minder angenehm riechen, abgeleitet wird; doch scheint unter diesem Namen auch das aus den Stengeln von *Lavandula officinalis* gewonnene Oel zu cursiren.

Das Lavendelöl gehört zu den stark toxischen Aetherolea und kann bei Kaninchen schon zu 4,0 Convulsionen und Tod bedingen. Auf die Haut wirkt es verhältnissmässig schwach, indem 2,0 im Bade nur allgemeine Wärme und erst in 1 Stunde Erythem bedingen (Topinard). Epizoön werden dadurch rasch getödtet. Innerlich ist es bei Migräne und nervöser Aufregung zu 1—3 Tropfen benutzt, meist dient es jedoch nur zur Darstellung von Parfümerien. Die Lavendelblumen kommen fast nie für sich in Anwendung, sondern meist im Gemenge mit ähnlich wirkenden Pflanzentheilen.

#### Präparate:

1) **Species aromaticae; Gewürzhafte Kräuter.** Lavendel, Thymian, Quendel, Pfefferminz āā 2 Th., Gewürznelken, Cubeben āā 1 Th. Zu trocknen Umschlägen und Kräuterkissen, die man wohl mit Eau de Cologne oder Lavendelspiritus befeuchtet (bei Zahnweh, rheumatischen Schmerzen), zu Bädern ( $\frac{1}{2}$  bis 1 Pfd. pro balneo), auch im Aufgusse (1:10—20) zu Bähungen und Umschlägen. Die Species aromaticae ersetzen verschiedene ältere Kräutergemische, wie die Species pro cucuphis, die bei Hirnerschütterung und Kopfverletzungen gebrauchten Species cephalicae s. pro epithemate, die Species ad fomentum (mit viel Hopfen), die Species resolventes u. a. m. Ein filtrirtes Macerat von 2 Th. Species aromaticae mit 5 Th. Aqua vulneraria spirituosa und 16 Th. Rothwein bildet den früher officinellen aromatischen Wein (Kräuterwein, Gewürzwein, Sturmfederwein), Vinum aromaticum, welcher äusserlich zur Fomentation putrider Geschwüre diente. Auch ein Macerat mit Essig war früher als Fomentatio aromatica acida zu gleichem Zwecke in Gebrauch.



2) **Spiritus Lavandulae; Lavendelspiritus.** Flor. Lavandulae 5 Th., mit aa 15 Th. Spiritus und Aq. comm. 24 Stdn. macerirt, dann 20 Th. abdestillirt. Klar, farblos. Zu reizenden Waschungen und Einreibungen.

Wegen ihres Wohlgeruches werden die Lavendelblumen auch zu Parfüms vielfach benutzt. Ein Digestionsauszug von Zimmtkassie, Muscatnuss und rothem Sandelholz mit gleichen Theilen Spir. Lavandulae und Spir. Rosmarini bildete den früher zu Einreibungen und Waschungen, sowie als Riechmittel vielbenutzten Spiritus Lavandulae compositus. In England ist derselbe unter dem Namen Lavender drops bei Koliken zu 20—60 Tropfen gebräuchlich. Das als Eau de Lavande bezeichnete Parfüm des Handels ist in der Regel eine spirituöse Lösung des Lavendelöls mit Tinctura Ambrae u. a. wohlriechenden Tincturen.

Mit Benzö und anderen Harzen dienen die Lavendelblüthen zur Darstellung diverser Räucherpulver sowohl zur Parfümierung der Luft (Pulvis fumalis nobilis u. a.) als zu gelinder Reizung rheumatisch afficirter, gelähmter oder oedematöser Glieder.

**Herba Thymi; Gartenthymian, Römischer Quendel. Oleum Thymi; Thymianöl.**  
**Herba Serpylli; Quendel, Wilder Thymian, Feldkümmelkraut.**

Die als Herba Thymi und Herba Serpylli bezeichneten Drogen stellen das blühende Kraut zweier Angehöriger des Labiatengenus Thymus dar, die erstgenannte der südeuropäischen und bei uns in Gärten cultivirten Species Thymus vulgaris L., die letztgenannte des bei uns an sonnigen Grasplätzen überaus häufigen Quendel, Thymus Serpyllum L. Beide sind durch einen (bei Thymus Serpyllum besonders feinen) Wohlgeruch ausgezeichnet, welchen sie ätherischen Oelen verdanken, von denen das aus Thymus vulgaris destillirte Thymianöl in die Pharmacopoe Aufnahme gefunden hat.

Thymus Serpyllum hat einen liegenden, mit feinen Härchen besetzten, Thymus vulgaris einen aufstrebenden, von kleinen Härchen wie weiss bestäubt aussehenden Stengel; die Blätter sind bei beiden klein und gegenständig, bei Th. Serpyllum lanzettlich bis eiförmig, stumpf, auf beiden Seiten drüsig punktirt, am Rande gewimpert, bei Th. vulgaris linienförmig, steif, ganzrandig, am Rande umgerollt, oben grün, grubig, unten grauweiss, dicht und zart behaart; die Blüten sind weiss oder violett und stehen in Scheinquirlen, welche bei Thymus Serpyllum gegen die Spitze der Zweige hin zusammengedrängt sind und in Köpfchenform übergehen. Aus Thymus Serpyllum haben die Botaniker eine Menge Arten gemacht, da die Pflanze nach dem Standorte ungemein variirt. Die Oele der beiden Thymusarten sind verschieden. Das Thymianöl, von dem der Römische Quendel etwa  $2\frac{1}{2}\%$  liefert, ist gelblich oder bräunlich, dünnflüssig, von starkem Thymiangeruche und campherartigem Geschmacke, und besteht aus einem farblosen Camphen, dem bei  $160-165^{\circ}$  siedenden Thymen, dem Kohlenwasserstoffe Cymen,  $C^{10}H^{14}$ , und dem zu der Reihe der Phenole gehörenden Thymol, dessen Verhältnisse bereits unter den Antiseptica ausführlich erörtert worden sind. Das goldgelbe bis braunrothe Quendelöl, von welchem das Kraut nur geringe Mengen ( $\frac{1}{10}\%$ ) zu liefern scheint, besteht fast ganz aus einem Camphen.

Besondere physiologische Untersuchungen über die beiden Thymusarten und ihre ätherischen Oele liegen nicht vor.

Hauptsächlich dienen Thymian und Quendel äusserlich in Verbindung mit anderen Kräutern zu aromatischen Kräuterkissen, welche neben gelind irritirend auf die Haut und ausserdem noch als Schutzmittel dienen. So sind die Herba Serpylli Bestandtheil der Species aromaticae. Auch Thymianöl wirkt als Hautreiz in der Mixtura oleoso-balsamica und im Opodeldok mit und war früher als Desinficiens wegen seines Gehaltes an Thymol auch Bestandtheil des Acetum aromaticum.

**Präparat der Herba Serpylli:**

**Spiritus Serpylli**, Quendelspirit. Herba Serpylli 5 Th. mit  $\bar{a}\bar{a}$  15 Th. Spiritus und Aqua comm. 24 Stunden macerirt, dann 20 Th. abdestillirt. Klare, farblose Flüssigkeit, die bei Verstauchungen u. s. w. als äusserer Hautreiz benutzt wird, auch als Zusatz zu Mund- und Gurgelwässern und als Badespiritus dient

**Anhang.** Den officinellen Thymusarten nahe verwandt sind die früher der Gattung Thymus zugerechneten Calaminthen, von denen die Bergmelisse, *Calamintha montana* Lam. s. *officinalis* Moench, die Cretische Bergminze, *Calamintha incana*, und die grossblumige Bergminze, *Calamintha grandiflora* Moench, sich durch vorzüglichen Wohlgeruch auszeichnen.

In gleicher Weise können auch noch verschiedene andere Labiaten benutzt werden, die z. Th. wie die Herba et summitates *Origani*, von unserm einheimischen Dosten oder wilden Majoran, *Origanum vulgare* L., in anderen Ländern Bestandtheile der Species aromaticae sind. Die genannte Pflanze dient beim Volke sehr häufig mit anderen wilden Labiaten (Quendel u. s. w.) zu Kräuterbädern gegen Scrophulose und Atrophie der Kinder. Auch rieb man das *Oleum Origani aethereum* bei Kolik und Alopecie ein. Aehnlich ist das sog. Spanische Hopfenöl, das Oel von *Origanum Creticum* L., welches in Italien als Zahnwehmittel und zu Einreibungen bei Lähmung Benutzung gefunden zu haben scheint. Das Oel enthält wie das des als Gewürz verwendeten Bohnenkrauts, *Satureja hortensis* L., ein mit Thymol isomeres Phenol, das Carvacrol (Jahns). Hieran reihen sich mehrere südeuropäische Labiaten, z. B. *Dracocephalum Moldavicum*, die Mutterpflanze der Herba *Melissae Turcicae*, *Micromeria filiformis* Benthams, deren Kraut als Herba *Cunilae thymoidis* in Spanien bezeichnet wird, und viele andere, die wir hier übergehen müssen.

Unter dem Namen Herba *Majoranae*, Mairan, Majoran, waren früher die ovalen oder länglichen, stumpfen, ganzrandigen, getrocknet schmutzig graugrünen, campherartig riechenden Blätter und blühenden Köpfchen von *Origanum Majorana* L., einer bei uns in Gärten cultivirten, aus Nordafrika stammenden, krautigen Labiate, officinell. Das darin enthaltene gelbgrüne bis braungrüne, in Weingeist in jedem Verhältnisse lösliche Oel, *Oleum Majoranae*, welches brennend schmeckt, sauer reagirt und beim Aufbewahren Majorancampher absetzt, wurde zu Einreibungen bei Schnupfen, auch innerlich zu 1–3 Tropfen gegen Hysterie benutzt. Mit Spiritus aufgeweichtes Majorankraut mit Fett im Wasserbade digerirt, liefert die grüne Mairansalbe, *Unguentum Majoranae*, ein Volksmittel gegen Stockschnupfen der Kinder, in Stirn und Nasenwurzel eingerieben.

In gleicher Weise kam früher auch die Herba *Mari veri*, die Blätter des ebenfalls zu den Labiaten gehörenden Amber- oder Katzenkrauts, *Teucrium Marum* L. (in Südeuropa einheimisch), in Gebrauch. Sie bilden einen Bestandtheil des alten Pulvis sternutatorius viridis (*Majorana* 3 Th., *Marum verum*, *Convallaria*, *Iris florentina*  $\bar{a}\bar{a}$  1 Th.)

**Terebinthina**, *Terebinthina communis*; **Gemeiner Terpenthin**. **Colophonium**.  
Resina Colophonium; **Geigenharz**, Kolophonium.

Mit dem Namen Terpenthin belegt man die dickflüssigen Lösungen von Harzen in Camphenen, welche beim Anbohren oder Anschneiden der Stämme verschiedener Coniferen von der Abtheilung der Abietineen aus der Rinde und dem Holze ausfliessen. Man unterscheidet als gewöhnlichen oder gemeinen Terpenthin diejenigen Sorten, welche selbst bei längerem Stehen trübe bleiben und zum Theil sogar krümlig und krystallinisch erstarren.

Ursprünglich wurde der Name Terpenthin einem ähnlichen Balsam aus *Pistacia Terebinthus* beigelegt, welcher als Chiotischer oder Cyprischer Terpenthin früher im Handel war und in neuester Zeit durch die Empfehlung von Clay (1880) einen vorübergehenden Ruf als Krebsmittel (besonders bei Uteruscarcinomen) gefunden hat, wobei man ihm innerlich in Pillen oder Emulsion längere Zeit darreichte. Die Bestandtheile des Chios-Terpenthins weichen von dem des Coniferen-Terpenthins wesentlich ab; ersterer enthält ein eigenthümliches ätherisches Oel (9,2%), das Alphaharz des Mastix (80%), das Gammaharz der Benzoë (4–6%) und Spuren von Benzoësäure. Der gemeine Terpenthin, den man seiner Abstammung nach in verschiedene Sorten unterscheidet, stammt vorzugsweise von *Pinus Pinaster* Ayton (*Pinus maritima* Lam.) und wird besonders im Departement des Landes zwischen Bordeaux und Bayonne gewonnen. Ausserdem liefert besonders Virginien Terpenthin, wo *Pinus australis* Michaux (*P. palustris* Miller), *Pinus Taeda* L. und *Pinus Strobus* L. (Weymouthkiefer) die Mutterpflanzen sind. Auch in Oesterreich, wo die sehr harzreiche Schwarzkiefer, *Pinus Laricio* Poiret (*P. nigricans* Link), hauptsächlich Terpenthin liefert, und in verschiedenen Gebirgsgegenden Deutschlands wird Terpenthin gewonnen, hier besonders aus der Föhre (Kiefer), *Pinus sylvestris* L., der Rothtanne, *Abies excelsa* DC., und der Weisstanne, *Abies pectinata* DC. Von letzterer stammt der Strassburger Terpenthin, *Terebinthina Argentoratensis*, welcher wegen seiner Klarheit und seines Wohlgeruches geschätzt ist.

Alle Sorten des gemeinen Terpenthins bilden mehr oder minder dickflüssige, gelblich weisse oder bräunliche, trübe, körnige Massen von starkem, widrigem Geruche und von reizendem, mehr oder weniger bitterem Geschmacke. Sie klären sich beim Erwärmen und sind in Wasser unlöslich, in Alkohol und Aether leicht löslich. Mit Terpenthin geschütteltes Wasser nimmt saure Reaction an, welche von Ameisensäure und Bernsteinsäure herrührt. Das Verhältniss der Mengen des Camphens (15–30%) und der Harze (70–85%) ist in den einzelnen Terpenthinsorten sehr verschieden. Die Camphene, welche man gewöhnlich unter dem Namen Terpenthinöl zusammenfasst, sind zwar sämmtlich Kohlenwasserstoffe von der Formel  $C^{10}H^{16}$ , weichen aber namentlich in Bezug auf Geruch und Polarisationsverhalten von einander ab. Mikroskopisch besteht der Terpenthin zum grössten Theil aus kleinen, zum Theil krummen, wetzsteinartigen Abietinsäurekrystallen.

Zu den Harzsäften von Coniferen gehört auch der nicht mehr officinelle Venetianische oder Lärchenterpenthin, *Terebinthina Veneta s. laricina s. laricis*, in Südtirol Lorget, in der Schweiz Lörtsch genannt, in den südlichen Alpen hauptsächlich in Südtirol, auch in Piemont und in der Dauphiné aus dem Kernholze der Lärchtanne, *Pinus Larix* (*Larix Europaea* DC.), gewonnen wird. Er ist bei gewöhnlicher Temperatur ein ziemlich klarer oder nur mässig trüber oder grünlich schillernder, schwerflüssiger Balsam von schwach bräunlich-gelblicher Farbe, eigenthümlichem, an Muscatnuss erinnerndem Geruche und bitter aromatischem Geschmacke. Vom gewöhnlichen Terpenthin weicht er dadurch ab, dass er nicht durch Auskrystallisiren der Harzsäure körnig wird. An der Luft verdickt er sich langsam.

Hierher gehört auch der Canadabalsam, *Balsamum Canadense*, der Terpenthin der Nordamerikanischen Balsamtanne, *Abies balsamea* DC. s. *Pinus balsamea* L., welcher eine farblose oder gelbliche, aromatisch riechende, ziemlich flüssige Masse darstellt, die etwa 17% ätherisches Oel enthält. Seine Anwendung zum Verkitten optischer Gläser ist bekannt. Wie der Canadabalsam sind auch der Karpatische und Ungarische Terpenthin, *Balsamum Carpathicum* (von *Pinus Cembra*) und *Hungaricum* (von *Pinus Pumilio*), durchsichtig, klar und von angenehmem Geruche.

Entweder durch Abdestillation des Terpenthinöls oder durch spontanes Erhärten des ausgeflossenen Balsams entstehen die verschiedenen sog. Fichtenharze, von denen das Geigenharz oder *Colophonium officinell* ist.

Das durch destillirendes Kochen der deutschen Terpenthinarten mit Wasser



als anfangs weicher, später harter und spröder Rückstand erhaltene Harzmenge bildet den sog. gekochten Terpenthin, *Terebinthina cocta*, in welchem noch kleine Mengen von ätherischem Oele vorhanden sind, dessen allmähliges Verharzen dem gekochten Terpenthin die Eigenschaft, beim ruhigen Stehen gleichsam fließend zusammenzusinken, verleiht. Die *Terebinthina cocta* ist von schmutzig gelber Farbe und kommt im Handel auch in cylindrischen und gedrehten Rollen vor. Die durch Ausfließen aus den verwundeten Rinden resultirenden Harzmassen werden als gemeines Harz, *Resina communis* s. *Pini*, bezeichnet, wobei man wohl das aus der Lärchtanne exsudirte Harz als *Lärchenharz*, *Resina laricis*, unterscheidet. Unter diese Kategorie fallen der Galipot und das Burgundische Harz, *Resina Burgundica* (nach Dorvault von *Abies excelsa* stammend, nach Anderen geschmolzenen und colirten Galipot darstellend). Auch gehört hierher der sog. Waldweihrauch, *Olibanum sylvaticum* s. *Thus vulgare*, das von Ameisen in ihre Haufen getragene Harz von *Pinus sylvestris*. Erhitzt man das gemeine Harz mit Wasser, bis das ätherische Oel verflüchtigt ist, und colirt dann, so erhält man in Gestalt weisser, allmählig gelb werdender, harter, spröder Stücke das weisse Harz, *Resina alba*, während durch Schmelzen des gemeinen Harzes mit wenig oder ohne Wasser und nachheriges Coliren das gelbe Harz, *Resina flava* s. *citrina*, erhalten wird. Wird das letztere oder auch der gekochte Terpenthin längere Zeit ohne Wasser geschmolzen, so dass alles gebundene Wasser fortgeht und das Product klar und ganz durchsichtig wird, so entsteht das Colophonium. Dasselbe bildet weisslich-gelbe oder gelbbraune, durchsichtige, brüchige und leicht zerreibliche Stücke von grossmuscheligem Bruch, welche bei 80° erweichen, bei 135° schmelzen und bei weiterem Erhitzen sich bräunen. Das Colophonium ist in Wasser unlöslich, in Weingeist, Aether, fetten und ätherischen Oelen leicht löslich. Im Handel unterscheidet man nach der Farbe ein weisses (französisches, amerikanisches) und ein braunes oder schwarzes (deutsches) Colophonium, von denen ersteres in der pharmaceutischen Praxis bevorzugt wird. Es ist ausgezeichnet durch die Adhäsion in pulverförmigem Zustande an glatten Flächen, woher seine Benutzung zum Bestreichen der Violinbogen und glatter Maschinentheile stammt.

Wie der Terpenthin sind auch die Fichtenharze bis auf das Colophonium sämmtlich Gemenge von kleinen Quantitäten Terpenthinöl mit verschiedenen Harzsäuren und geringen Mengen in-differenten Harze.

Die bisherigen Angaben über die Harzsäuren des Terpenthins weichen unter einander nicht unbeträchtlich ab, doch ist nach den Untersuchungen von Maly das Vorhandensein von drei Pinusharzsäuren, die als Abietinsäure, Sylvinsäure und Pimarsäure bezeichnet werden, unzweifelhaft, während die früher aus dem Colophonium von Unverdorben angeblich erhaltene Pininsäure als das Anhydrid der Abietinsäure anzusehen ist. Letztere stellt eine leichte, lockere, aus weissen Krystallblättchen zusammengesetzte Masse dar, welche bei 118—122° schmilzt und auch in trockenem Zustande aus der Luft Sauerstoff aufnimmt. Im Colophonium existirt diese Säure als Anhydrid, welches beim Lösen in verdünntem Weingeist in krystallisirte Abietinsäure übergeht. Auch in der lebenden Pflanze existirt nur das Anhydrid; der frische, klare und amorphe Harzsaft erstarrt indess an der Luft zu Krystallen von Abietinsäure. Beim Kochen von Colophonium mit alkalischen Lösungen entstehen schmierige abietinsäure Salze (Harzseifen). Die Sylvinsäure findet sich im amerikanischen Colophonium neben Abietinsäure, die Pimarsäure im französischen Galipot (Laurant). Im Terpenthin findet sich wahrscheinlich auch das Pinipikrin bezeichnete, 1853 von Kavalier in Nadeln, Rinden und Borken von *Pinus sylvestris* L. aufgefundene Glykosid, dem vielleicht der bittere Geschmack des Terpenthins zuzuschreiben ist.

Oertlich wirken die in Rede stehenden Präparate um so stärker irritirend, je mehr Terpenthinöl dieselben enthalten, während die Harzsäuren nur geringe locale Action besitzen, mögen sie auf die

äussere Haut oder innerlich applicirt sein. Ein theilweiser Uebergang der Harzsäuren in das Blut und in den Urin ist nach den Versuchen von Maly nicht in Abrede zu stellen.

Nach Schauer (1867) erscheint Abietinsäure bei Hunden erst nach Dosen von 4,0 im Harn, und zwar zuerst nach 8 Std. und höchstens auf die Dauer von 24 Std.; der grösste Theil (etwa  $\frac{3}{4}$ ) geht mit den Faeces ab. Die Galle kann dabei nicht allein als Lösungsmittel betrachtet werden, da auch bei Hunden mit Gallen fisteln der Uebergang in den Harn stattfindet. Auch in Emulsion wirkt Abietinsäure nicht irritirend auf das Rectum; wird dagegen eine Lösung der Säure (1,2) in Galle im Klystier applicirt, so entsteht heftiges Brennen, Tenesmus und wiederholte Defaecation. Bei Fröschen bedingt abietinsaures Natrium, in die Lymphsäcke des Rückens gespritzt, exsudative Entzündung und Tod. Auch das Anhydrid der Abietinsäure ist wegen seiner Unlöslichkeit in Wasser ohne reizende Wirkung; wenigstens passirt Colophonium den Darm, ohne Purgiren oder entfernte Erscheinungen zu veranlassen, und findet sich in den Faeces wieder. Nach Schauer ist Abietinsäure nach Passiren des Darmcanals in ihren Eigenschaften etwas verändert.

Die Anwendung des Terpenthins und der Fichtenharze geschieht jetzt ausschliesslich zu äusseren Zwecken, theils zur Darstellung von Pflastern, wozu die Klebfähigkeit der betreffenden Substanzen mehr als ihre irritativen Eigenschaften den Anlass giebt, theils zur Anfertigung von Salben zum Offenhalten von Geschwüren oder zur Reizung torpider Ulcerationen.

In früherer Zeit fanden selbst die Fichtenharze innerlich Anwendung bei chronischen Hautkrankheiten oder als Balsamica bei Bronchial- und Urethralkatarrhen. Man gab sie in Pillen mit Gummischleim, Amylum oder Theer (*Pilulae Picis Danicae*) zu 1,0–2,0 mehrmals täglich. Will man die entfernten Wirkungen des Terpenthinöls erhalten, so ist es natürlich zweckmässiger, dieses anzuwenden, da der Gehalt an demselben in Terebinthina sehr variirt. Wollte man einen Grund für die interne Anwendung des Terpenthins anführen, so könnte derselbe höchstens darin gefunden werden, dass Terpenthin in geringerem Grade irritirend auf Magen und Darmcanal wirkt als Terpenthinöl in Substanz. Jedenfalls ist intern Venetianischer Terpenthin vorzuziehen. Man kann denselben zu 0,3–1,0 mehrmals täglich in Pillen, Bissen, Latwerge oder Emulsion geben. Pillen lässt man am besten mit Wachs, Emulsionen mit Eigelb machen.

Für die äussere Anwendung genügen die officinellen Präparate vollständig, obschon es neben denselben noch eine Menge alter Vorschriften giebt, deren sich einzelne Praktiker bedienen. Es verdient Erwähnung, dass einzelne Personen Terpenthinpflaster gar nicht ertragen, sondern selbst nach klebenden Pflastern mit sehr geringem Terpenthingehalte ekzematöse oder impetiginöse Ausschläge in der Umgebung der Applicationsstelle bekommen.

Zu den älteren Formeln gehört der Genofevabalsam, *Balsamum Locatelli* s. *Italicum* s. *Genofevae*, ein rothgefärbtes und mit Perubalsam versetztes Cerat aus Lärchenterpenthin, das früher als Wundsalbe in grossem Ansehen stand; ferner eine als Wundbalsam, *Balsamum vulnerarium*, bezeichnete spirituöse Terpenthinlösung (1:12 Spiritus), die man auf atonische Geschwüre brachte; das aus aa 1 Th. Lärchenterpenthin und Lorbeeröl, 2 Th. Elemi und 8 Th. Pix alba bereitete *Emplastrum agglutinativum* oder *Empl. d'André Delacroix* und diverse als Gichtpapier, *Charta anti-rheumatica*, bezeichnete, als Hautreiz benutzte, aus Harz und Terpenthin, mit oder ohne Zusatz von Schusterpech gefertigte, auf Papier gestrichene Klebmassen. Hier mögen auch die sog. Pechkappen (*Calottes*) Erwähnung finden, welche man früher bei Favus in der Weise benutzte, dass man entweder sog.

Schusterpech oder ein durch Zusammenschmelzen erhaltenes Gemenge von Resina Pini mit  $\frac{1}{6}$  Th. Terpenthin auf fingerbreiten Leinwandstreifen erwärmt auf den geschorenen Kopf applicirt und die Streifen später einzeln abriß, welches Verfahren ausser seiner Schmerzhaftigkeit auch noch die Inconstanz der Wirkung, selbst bei nochmaliger Wiederholung, gegen sich hat. Aehnliche Pflaster versuchte man auch bei Psoriasis (Skoda) und Leichdornen (Wetzler).

Als eine mechanische Wirkung muss die blutstillende Action des Colophoniums bezeichnet werden, welche sich nicht selten bei Blutegelstichen, aber auch bei Blutungen aus Mundhöhle, Scheide, Mastdarm bewährt. Ebenso wird Colophonium als Protectivum mit Weingeist benetzt zweckmässig bei Gelenkleiden und anderen Affectionen zu sog. Wergverbänden benutzt.

Um Colophonium als blutstillendes Mittel anzuwenden, streut man es entweder für sich oder mit gleichen Theilen Gummi Arabicum oder Alaun auf und befeuchtet es dann mit Weingeist. Die sog. Wergverbände erhält man durch Bestreuen von Werg mit Colophonium und Begiessen mit Weingeist; statt Werg lassen sich auch Watte oder Flanell benutzen. Man gebraucht derartige Verbände besonders bei geschwollenen Gelenken, bei Rheumatismus acutus, auch bei Pes varus und valgus (Hoppe)

Eine irritative Wirkung beabsichtigt man dagegen, wenn man die Fichtenharze zu Räucherungen, sei es behufs Inhalation (bei chronischer Bronchitis) oder behufs Zuleitung zu schmerzhaften Theilen (bei Rheumatismus), benutzt.

Hier streut man dieselben meist mit Bernstein, Myrrha u. s. w. auf heisses Blech oder Kohlen. Im Departement de Drôme sind Terpenthindampfbäder bei rheumatischen Affectionen, Algien, aber auch bei anderen Affectionen z. B. chronischem Bronchialkatarrh, Hydrops, in Gebrauch, wobei man die Kranken und die Patienten in den heissen Destillations-Räumen sich aufhalten lässt (Chevandier, Ireland). In ähnlicher Weise d. h. durch die Wärme und durch die Irritation der Haut wirken auch die in neuerer Zeit so häufig benutzten Fichtennadelbäder, zu deren Darstellung die Nadeln unserer einheimischen Pinusarten (*Pinus sylvestris*, *Abies excelsa*) angewendet werden können, zu deren Bereitung aber gewöhnlich das käufliche Fichtennadel-extract, *Extractum Abietis s. Abietinis s. Pini*, dient. Dieses Extract wird als Nebenproduct bei der Herstellung der in Schlesien, Thüringen u. s. w. dargestellten Waldwolle, *Lana Pini sylvestris*, die in ähnlicher Weise wie Watte zur Umhüllung rheumatisch afficirter Gliedmassen benutzt wird, gewonnen, und dient zu 15,0—30,0 als Zusatz zu den genannten Bädern, welche Jucken und Brennen auf der Haut erregen und medicinische Anwendung bei Rheumatismus, Gicht, Lähmungen, Scrophulose, Hautleiden u. s. w. gefunden haben. Man hat es auch innerlich bei chronischen Bronchialkatarrhen mit Wasser oder Mineralwässern gereicht. Durch Kiefernadeln gestrichene Wasserdämpfe dienen an verschiedenen Badeorten Schlesiens, Thüringens, Badens u. s. w. zu Kiefernadeldampfbädern, welche in derselben Weise wie die aus dem Extract bereiteten Bäder Gebrauch finden. In allen Fällen ist vorzugsweise das Oel, welches auch als *Oleum Pini sylvestris*, Waldwollöl oder Kiefernadelöl, im Handel vorkommt und dem Terpenthinöl isomer ist, das wirksame Agens.

Endlich ist noch die Anwendung der *Terebinthina laricina* zu reizenden Klystieren (5,0—8,0 in Emulsion von 150,0 Kamillenthee) zu erwähnen, die man bei narkotischen Vergiftungen, zur Erregung der Wehenthätigkeit, auch bei Oxyuris in Anwendung brachte.

#### Präparate:

1) **Unguentum basilicum; Königssalbe.** Baumöl 45 Th., gelbes Wachs, Sebum, Colophonium aa 15 Th., *Terebinthina* 10 Th., bei mässiger Hitze zusammenge-



schmolzen. Gelbbraune Salbe, von geringem Terpentingeruch, vielfach als einfache Verbandsalbe verwendet, wo sie indessen mehr schadet als nützt, da sie den Heilungsprocess verzögert, daher nur als reizende Salbe zu verwenden. Mit Schiffspech bildet sie das *Unguentum basilicum nigrum*, mit rothem Quecksilberoxyd das *Ungt. basilicum fuscum* Ph. Gall.

2) **Unguentum Terebinthinae; Terpenrhinsalbe.** Terebinthina, Cera flava, Oleum Terebinthinae aa 1 Th. Weiche, gelbliche Salbe, welche früher auch als Digestivsalbe oder als Balsamum terebinthinatum Frahmii bezeichnet wurde und durch ihren Terpenrhinölgehalt noch reizender als die vorige wirkt. Sie ist hauptsächlich bei Frostschäden als irritirendes Verbandmittel gebräuchlich.

Aehnliche jetzt nicht mehr officinelle reizende Verbandsalben sind das fälschlich als Altheesalbe bezeichnete *Unguentum flavum s. citrinum s. resinae Pini*, ein mit Curcuma gefärbtes Gemisch von Fichtenharz, gelbem Wachs und Schmalz, und die zusammengesetzte Terpenrhinsalbe, *Unguentum Terebinthinae compositum*, *Unguentum digestivum*, eine weiche, dünne Salbe aus emulgirtem Lärchenterpenrhin mit Myrrha und Aloë, die man in Frankreich auch mit Storax (sog. Digestif animé) oder grauer Quecksilbersalbe (*Digestif mercuriel*) verband.

Ebenfalls nicht mehr officinell ist das durch Zusammenschmelzen von Terpenrhin, Fichtenharz, gelbem Wachs und Talg dargestellte gelbe Cerat (gelbes Pflaster, weisses Pechpflaster, Harzcerat), *Ceratum resinae Pini s. resinae Burgundicae s. Picis*, *Ceratum s. Emplastrum citrinum*, welches als Zugpflaster und als Excipiens für different wirkende Metall- und Alkaloidsalze, die man auf die Haut appliciren will, dient. Mit Curcuma gefärbt und in Stangen gerollt, bildet es das Baumwachs der Gärtner, *Cera arborea*, welches wohl zum Schutze kranker Nägel gebraucht wird.

Elemi, Gummi s. Resina Elemi; Elemi. — Zu den irritirenden Weichharzen gehört auch das früher officinelle Westindische oder Yucatan Elemi, welches unregelmässige, weiche oder feste, halbdurchscheinende grünlich-gelbe oder orangegelbe in kochendem Spiritus lösliche Massen bildet. Die Stammpflanze desselben ist unbekannt. Der von den Alten für ein aus Aethiopien stammendes Harz benutzte Name wurde zunächst auf ein Brasilianisches weiches Harz übertragen, dessen Abstammung von einem Baume aus der Familie der Burseraceen, *Icica Icicariba* DC., schon im 16. Jahrh. ermittelt wurde. Im Handel kommt jetzt neben Yucatan Elemi besonders das nach Flückiger wahrscheinlich mit dem sog. Arbrol-a-Brea-Harze identische Manila-Elemi, ein gelblich-weisser, zäher, mit Pflanzenresten stark untermischter Balsam, nach Flückiger vermuthlich von einem Canarium stammend, daneben auch ein festes Harz aus Mexico, vor. Yucatan Elemi ist ein Gemenge von einem Camphen, einem sauren, in kaltem Weingeist leicht löslichen Weichharz und einem krystallinischen Anhydride, das vielleicht aus zwei Harzen (Amyrin und Elemin) besteht. Pharmakodynamisch untersucht ist nur das ätherische Oel, welches nach Mannkopf die Wirkung des Oleum Terebinthinae hat, aber erst zu 15,0—30,0 Kaninchen unter den Erscheinungen, welche bei Vergiftung mit ätherischen Oelen vorkommen, tödtet. Man gebrauchte Elemi zur Herstellung einer von Arcaeus (1574) zur Behandlung von Geschwüren empfohlenen Salbe, des auch als Balsamum Arcaeï bezeichneten und früher nicht selten wie Terpenrhinsalben zum Verbande schlecht eiternder Geschwüre oder von Vesicatorflächen benutzten, grünlich-grauen oder gelblichen *Unguentum Elemi*, *Elemi-salbe*, das durch Zusammenschmelzen gleicher Theile Elemi, Terebinthina laricina, Sebum und Axungia bereitet wurde.

**Galbanum, Gummi-resina Galbanum; Galbanum, Mutterharz.**

Dieses Gummiharz stammt von nordpersischen Umbelliferen, vermuthlich von *Ferula galbaniflua* Boiss. und *F. rubricaulis* Boiss. (*F. erubescens*), an

denen es am unteren Theile des Stengels und an den Blattscheiden ausschwitzt. Es bildet entweder lose oder zusammenklebende Körner von bräunlicher oder gelblicher, etwas grüner Farbe, und von gelbem, wachsähnlich glänzendem Bruche (sog. Galbanum in granis s. in lacrymis), oder mehr oder weniger weiche, braune Massen von verschiedenartigem Aussehen und Bruche (Galbanum in massis). Es besitzt einen eigenthümlichen penetranten Geruch und einen an Terpenthin erinnernden bitteren Geschmack; die weiche Sorte riecht am stärksten.

Das zum pharmaceutischen Gebrauche durch Pulvern bei Frostwetter und Absieben von den Verunreinigungen befreite Präparat wurde früher als Galbanum depuratum, gereinigtes Galbanum, bezeichnet.

Das Galbanum besteht aus 7% ätherischem Oel (vorwiegend Terpenen), 60% Harz und soviel Gummi, dass es mit Wasser eine gelbliche Emulsion giebt. Das Harz giebt beim Erhitzen mit Salzsäure Umbelliferon in farblosen Nadeln, welches in alkalischer Lösung prachtvoll blau florescirt. Mit Kali geschmolzen liefert Galbanumharz Resorcin. Nach Semmers Untersuchungen hat das Galbanumharz Schwefelgehalt und besteht aus einem sauren und einem indifferenten Antheil, wovon nur der letztere zu 15,0 Purgiren bedingt, beide mit den Faeces zum grössten Theile wieder abgehen, dagegen nur spurenweise im Urin erscheinen. Das ätherische Oel ist zu 60 Tropfen ohne Wirkung auf den Organismus (Semmer).

Galbanum wird innerlich selten gebraucht. Man hat es als Antispasmodicum nach Art der Asa foetida benutzt und ihm specifische Wirkung auf den Uterus (daher die Bezeichnung Mutterharz) zugeschrieben, wonach es bei Amenorrhoe in Anwendung kam. Auch gegen chronische Katarrhe und Rheumatismus wurde es gebraucht. Man gab es zu 0,3—1,0 pro dosi in Pillenform, seltener in Emulsion.

Bei den alten Juden diente das Galbanum zum Räuchern in den Tempeln. Ausserlich wurde früher eine aus Galbanum bereitete Tinctur, Tinctura Galbani, zu Fomenten bei Oedem der Augenlider u. a. Augenaffectionen viel benutzt. Sehr populär waren auch zwei besonders zur Zertheilung chronischer Entzündungen, namentlich von Lymphdrüsen, und als Derivans bei Brustaffectionen benutzte, mit Crocus gefärbte Pflaster, das einfache Mutterharzpflaster, Emplastrum Galbani crocatum s. de Galbano crocatum, und das complicirtere Safran- oder Oxycroceumpflaster (corrupirt Ochsenkreuzpflaster), Emplastrum oxycroceum s. Galbanirubrum (mit Ammoniacum, Mastix, Myrrha und Olibanum).

### **Ammoniacum, Gummi resina Ammoniacum; Ammoniakgummi.**

Dieses Gummiharz exsudirt von dem Stengel einer in den Steppen von Iran und Turan wachsenden hohen Umbellifere, Dorema Ammoniacum Don.

Es bildet zusammengefloßene Massen (Ammoniacum in placentis s. massis) oder rundliche erbsen- bis wallnussgrosse Körner (Ammoniacum in granis s. lacrymis), die aussen gelb oder gelblichbräunlich, innen weiss und auf dem leicht muschligen Bruche milchweiss, fettglänzend erscheinen. In der Kälte ist es spröde, lässt sich aber schon zwischen den Fingern erweichen. Es besitzt einen eigenthümlichen Geruch und erzeugt gekaut eine etwas bittere und unangenehm scharf aromatische Geschmacksempfindung mit zurückbleibendem Kratzen im Halse. Mit Wasser lässt es sich leicht emulgiren. — Das von der Oase des Jupiter Ammon stammende Ammoniacum des Dioskorides ist offenbar mit dem Gummiharze nicht identisch, wahrscheinlich aber mit dem Maroccanischen, von Ferula tingitana Herm. abgeleiteten Ammoniacum, welches in Nordafrika zum Räuchern dient und im Geruch vom Persischen abweicht. Der Name ist nicht, wie Delioux de Savignac will, aus Gummi Armeniacum corrupirt. Dorema Ammoniacum wächst in Armenien nicht.

Das Ammoniacum ist ein Gemenge von etwa 70% Harz, 23% Gummi und Bassorin, 6 Th. Wasser und geringen Mengen von ätherischem Oele. Das Harz liefert beim Behandeln mit Kalihydrat kein Umbelliferon, sondern Protocatechusäure und etwas Resorcin. Das ätherische Oel ist nicht schwefelhaltig.

Nach Przeciszewski lässt sich das Harz in ein saures hellbraunes und ein indifferentes schwefelhaltiges Harz zerlegen, welche beide selbst zu 15,0 den Organismus nicht afficiren, den Darm mit den Faeces zum grössten Theile verlassen und nur spurweise in den Urin übertreten. Auch Troussseau fand 8,0 auf den gesunden Körper ohne jede Wirkung, womit sich die älteren Angaben, dass grössere Dosen die Verdauung stören, abführend wirken, Congestionen zum Kopf verursachen und das Sehen verdunkeln, sowie das Gefässsystem aufregen, berichtigen.

Therapeutisch ist Ammoniakgummi innerlich bei chronischen Katarrhen und Blennorrhöen der Bronchien als ein Mittel empfohlen worden, welches die Expectoration rasch fördere, das Athmen freier mache und bestehenden Hustenreiz vermindere. In der That sind hier manchmal Erfolge damit erzielt. Delio ux de Savignac rühmt es auch bei ähnlichen Affectionen der Harnröhre und glaubt, dass die Wirkung des Mittels bei respiratorischen Leiden auf Beschleunigung der Flimmerbewegung beruhe, während Briquet annimmt, dass die anhaltende Schärfe, welche es im Schlunde bedingt, sich auf die Bronchien fortsetze. In älterer Zeit wurde es auch bei chronischem Rheumatismus, Menstrualstörungen, Hydrops, Unterleibsstockungen u. s. w. gegeben, ohne dass sich dafür eine aus der physiologischen Wirkung abzuleitende rationelle Indication fände. Vorhandene Digestionsstörungen, Neigung zu Hämoptoë und febriler Zustand sollen das Mittel bei Bronchialaffectionen contraindiciren.

Häufiger findet es Anwendung als Bestandtheil von gelinde reizenden Pflastern, die man gegen chronische Entzündungen, Drüsenanschwellungen, rheumatische Affectionen, Hühneraugen u. s. w. applicirt.

Zum internen Gebrauche dient das bei kaltem Wetter gepulverte und durch Sieben von den beigemengten Verunreinigungen, Pflanzenresten u. s. w. befreite Gummiharz, welches auch wohl als *Ammoniacum depuratum* bezeichnet wird. Man kann es zu 0,5—4,0 verwenden und benutzt meist die Form der Pillen oder die Emulsion.

Pillen componirt man am besten mit Seife und Pflanzenpulver; die Emulsion lässt sich mit Wasser ohne Zusatz eines Emulgens machen (die *Mixtura* oder *Lac Ammoniaci* anderer Phkpp.), doch ist die Anwendung von Eidotter vorzuziehen, weil dadurch eine haltbarere Emulsion hergestellt wird.

Pflastermassen liess man früher besonders durch Kochen von 2 Th. Ammoniakgummi mit 1 Th. Essig oder Meerzwiebeleissig herstellen, doch genügen die früher officinellen Pflaster, deren Hauptgrundlage Ammoniakgummi bildete, das Ammoniakpflaster, *Emplastrum Ammoniaci* (mit Galbanum), und das Stinkasantpflaster, *Emplastrum foetidum* s. *Asae foetidae* s. *resolvens* Schmuckeri s. *antihystericum*, welche vorzugsweise bei Drüsengeschwülsten benutzt wurden.

Sonstige reizende Harze. — Ein aus unserem Epheu, *Hedera Helix* L., erhaltenes Harz, Gummi s. *Resina Hederae*, galt früher für emmenagog und blutreinigend (bei Hautkrankheiten). Fontanellkugeln aus Epheuholz wirken stärker reizend als andere Holzkugeln und frische Epheublätter unterhalten die Eiterung von Geschwüren besonders gut.

Nur zu Räucherungen dienen das *Ladanum* s. *Labdanum* (von *Cistus Creticus* L.), welches mit Weihrauch und Sand in spiralförmig aufgewundenen Stangen als Räucherungsmittel (L. in tortis) in den Handel kommt, und mehrere Sorten von Anime und Tacamahaca, welche aus verschiedenen tropischen Gegenden zu uns gelangen, ohne dass ihre Abstammung überall sichergestellt ist.

Olibanum, Gummi resina Olibanum, Thus; Weihrauch. — Dieses im hohen Alterthume bereits zu Räucherungen benutzte Gummiharz ist nach den Untersuchungen von Birdwood der freiwillig oder aus Einschnitten hervoriessende erhärtete Saft von *Boswellia Carterii* u. B. *Bau-Dhajiana*, zwei Bäumen aus der Familie der Burseraceen, welche sich im nordöstlichen Afrika auf den Gebirgen längs der Somaliküste und in einem beschränkten Gebiete der mittleren Südwestküste Arabiens in grossen Mengen finden. Es bildet erbsen- bis wallnussgrosse, tropfenähnliche, oft stalaktitenartige, blassgelbe oder röthliche, etwas durchscheinende, aussen bestäubte Stücke von spröder Be-



schaffenheit und unebenem, wachsglänzendem Bruche, welche beim Erhitzen unter Entwicklung eines starken aromatischen Geruches vollkommen schmelzen und mit russender Flamme verbrennen, und besteht aus etwa 4% eines wasserhellen, bei 162° siedenden ätherischen Oeles, 56% sauren Harzes, 30–36% Gummi und 6% Bassorin. Als innerliches Arzneimittel bei Blennorrhagien längst verlassen, dient es nur zum Räuchern von Zimmern oder Körpertheilen oder als Zusatz von Pflastern.

**Succinum, Electrum.** Ambra flava; Bernstein, Achtstein. — Zu Räucherungen dient auch der besonders an der preussischen Ostseeküste gewonnene, aber durch ganz Nordeuropa, Sibirien und Nordamerika vorkommende Bernstein, das Harz einer vorweltlichen Conifere, *Pinites succinifera* Goeppert, welches entweder in Tropfen aus der Rinde ausschwitzte oder in grösseren Stücken innerhalb des Stammes und an der Wurzel sich ausschied. Man verwendet dazu die sog. *Rasura Succini*, Bernsteingrus, den bei der Verarbeitung des Bernsteins zu Schmucksachen resultirenden grobpulverigen Abfall.

Ausser den genannten Harzen und den S. 395 und 396 erörterten (*Mastix*, *Sandarak*, *Dammharz*) giebt es noch eine Reihe anderer, welche in früherer Zeit theils als Bestandtheil reizender Pflaster, theils zu Räucherungen benutzt sind. Aus der Familie der Umbelliferen stammt das dem Galbanum nahe verwandte *Opopanax* und das dem Ammoniacum sich nähernde *Sagapenum*, ersteres aus Verletzungen am Wurzelkopfe am *Opopanax Chironium* Koch, einer kleinasiatischen und südeuropäischen Pflanze gewonnen, letzteres aus Persien zusammen mit Galbanum ausgeführt, von einer unbekannten Stammpflanze (*Ferula Scovitsiana*?). *Sagapenum* soll der später zu erwähnenden *Asa foetida* in seiner Wirkung gleichen, *Opopanax* enthält nach Przeciszewski kein schwefelhaltiges ätherisches Oel, aber zwei schwefelhaltige Harze, die in ihrem Verhalten im Organismus dem Ammoniacum gleichen.

**Pix liquida**, *Resina empyreumatica liquida*, *Oleum empyreumaticum coniferarum*; **Theer**, Nadelholztheer.

Unter der Bezeichnung Theer versteht man das bei der trocknen Destillation verschiedener Holzarten neben flüssigen (Holzessig) und gasförmigen Zersetzungsproducten entstehende dickflüssige Gemenge diverser organischer Substanzen.

In der Regel beschränkt man den Namen *Pix liquida* auf das aus dem Holze von Abietineen, unter denen besonders die Kiefer, *Pinus sylvestris* und die Sibirische Lärche, *Larix Sibirica* Ledeb. s. *Pinus Ledebourii*, welche die arktischen Nadelholzwälder bilden, in Betracht kommen, durch den Process unvollkommener Verbrennung (Schwelung) gewonnene Product.

Die Gewinnung des Theers geschieht meist in communicirenden Erdhöhlen, von denen die eine, zur Verbrennung des zur Theerfabrikation benutzten Materials dienende, mit einer Erdschicht so geschlossen wird, dass die Verbrennung ohne Flamme erfolgt, während in der zweiten die brenzlichen Producte sich condensiren. Der Theer bildet eine dickflüssige, braunschwarze, meist durch mikroskopische Kryställchen etwas krümlige Masse, welche schwerer als Wasser ist und einen unangenehmen brenzlichen Geruch und einen bitteren, scharfen Geschmack besitzt. Theer löst sich mehr oder minder in Alkohol, Aether und Oelen und ertheilt Wasser, welches damit geschüttelt wird, gelbe Farbe und saure Reaction. Neben dem Fichten- oder Kienholztheer, Stockholmer Theer, Archangeler Theer, Goudron de Norvège, war früher als *Pix liquida* auch noch der aus dem Holze der Buche, *Fagus sylvatica* L., gewonnene Theer (Buchenholztheer, *Oleum Fagi empyreumaticum* s. *Pyrooleum fagi*), der sich durch fast schwarze Farbe und geringere Löslichkeit in fetten Oelen unterscheidet, officinell. Beim Abdampfen des Theers

hinterbleibt das sog. Schiffspech, *Pix navalis*, als schwarze, undurchsichtige, glänzende, in der Kälte spröde, in der Wärme knetbare Masse, die theerartig schmeckt und riecht. Da dasselbe bei längerer Application reizend auf die Haut wirkt, dient es, namentlich in der Volksmedizin, zur Ableitung, besonders bei Rheumatismus und Gicht, entweder für sich auf Leder oder Papier (*Charta resinosa*) gestrichen oder mit Harzen zusammen geschmolzen in verschiedenen Pflastergemengen, z. B. *Emplastrum basilicum*, Königspflaster, *Emplastrum antarthriticum Helgolandii* (mit Theer) und in der früher officinellen *Charta resinosa s. antirheumatica s. antarthritica*, Gichtpapier (Terpenthin, Colophonium und gelbes Wachs zusammengeschmolzen). Durch Destillation des Theers wird eine Flüssigkeit erhalten, welche leichter als Wasser ist, das sog. *Oleum Cedriae s. Picis*, *Oleum Pini rubrum*, Theeröl, Kienöl, Tar oil, welches bei Favus, Psoriasis und als Desinfectionsmittel (Wilson) Anwendung gefunden hat. In England sind dadurch wiederholt Vergiftungen (Christison, Slight) vorgekommen, deren Erscheinungen an Carbolismus erinnern; doch ist bei der wechselnden Zusammensetzung des Theers die Giftigkeit dieses Präparats sehr verschieden, so dass selbst 120,0 in einzelnen Fällen nicht letal wirkten.

Von dem schwarzen Theer und dem Schiffspech sind der weisse Theer, *Pix liquida alba*, und das weisse Pech, *Pix alba*, zu unterscheiden, welches letztere die Bezeichnung weiss sehr wenig verdient, da es bräunlichgelbe Farbe besitzt. Der weisse Theer ist der im Beginne des Schwelungsprocesses ausschmelzende gelbe Balsam, der hauptsächlich aus Terpenthin besteht, das weisse Pech die bei Destillation des weissen Theers mit Wasser zurückbleibende Masse, welche somit der *Terebinthina cocta* (vgl. S. 544) im Wesentlichen entspricht.

Der Theer ist ein Gemenge höchst verschiedener flüchtiger und nichtflüchtiger empyreumatischer Producte, welche theils aus Cellulose und Zucker, theils aus den Harzen durch trockne Destillation gebildet werden. Die wesentlichsten sind verschiedene Kohlenwasserstoffe der Benzolreihe, insbesondere Toluol und Xylol, daneben die unter der Bezeichnung Paraffin zusammengefassten Hydrocarbure, ferner Essigsäure in geringen Mengen, welche die saure Reaction des Theers bedingt, endlich Pyrocatechin (Brenzcatechin). In Buchenholztheer findet sich auch Kreosot. Phenol und flüchtige Basen, welche in dem durch Destillation von Steinkohlen erhaltenen Kohlentheer vorhanden sind, finden sich in Holztheer nicht.

Verschiedene von Reichenbach mit wohlklingenden Namen (Pittakall, Kapnomor, Eupion) belegte Theerstoffe sind zweifelsohne Gemenge.

Auf der äusseren Haut erregt Theer Röthung und Entzündung und steigert daselbst bereits bestehende Entzündungen. Krätzmilben werden in 5 Minuten durch Theer getödtet. Inhalation von Theerdämpfen bedingt Reizung der Luftwege und Vermehrung der Secretion derselben.

Die Empfänglichkeit der einzelnen Individuen gegen Theer differirt sehr; bei einigen Personen tritt schon nach einmaligem Bestreichen Schwellung und Röthung, vermehrte Wärme und Spannung, selbst Bildung von Bläschen und Blasen, ja sogar Erysipelas vesiculosum (Hebra) ein. In anderen Fällen werden Theereinreibungen lange Zeit gut ertragen, ehe Dermatitis Entfernung des Mittels erheischt. In den meisten Fällen wird durch Theer bestehendes Hautjucken vermindert, während bei Einzelnen excessiver Pruritus eintritt.

Verschluckt kann Theer in Dosen von 8,0—10,0 Erscheinungen von Gastro-

enteritis erzeugen. Sowohl durch den Theer selbst als durch dessen weiteren zu besprechendes Präparat, das Theerwasser, können Uebelkeit, Erbrechen, Leibscherzen, Durchfälle bedingt werden, womit sich febrile Symptome verbinden; bei sehr grossen Dosen treten Kopfschmerz, Apathie und Schwindel hinzu. Unter den durch grössere Gaben von Theer verursachten Erscheinungen wird Nierenreizung noch besonders hervorgehoben. Auch bei Einreibung einer sehr grossen Hautfläche treten mitunter Resorptionswirkungen ein, die sich bald in Fieberschauern, bald in Ekel, Erbrechen und Eingenommensein des Kopfes, bald in flüssigen Stühlen manifestiren, sich aber bald verlieren, sobald reichliche Diurese erscheint. Diese Wirkungen sind nicht Folge der Einverleibung von Theer in Dampfform, da die Bettnachbarn und Wärter mit Theer eingelegener Patienten trotz constanter Einathmung derselben Atmosphäre nicht in gleicher Weise afficirt werden. Dass der Theer auch bei Application auf die äussere Haut resorbirt wird, beweisen vor Allem Phänomene, welche gleichzeitig die Elimination des Theers durch die Darmschleimhaut und die Nieren darthuen. Nach allgemeinen Theereinreibungen erfolgt bei einzelnen Personen schon in  $\frac{1}{2}$  Std., bei anderen nach etwa 3—6 Std. bald Erbrechen schwarzgefärbter Flüssigkeit, bald Abgang schwarzer Stuhlgänge, bald Ausscheidung olivengrünen bis dintschwarzen Urins von deutlichem Theergeruche, der besonders nach Zusatz einiger Tropfen Schwefelsäure hervortritt. Petters wollte in solchem Harn Carbolsäure und Eupion nachgewiesen haben; Schmiedeberg fand keine Carbolsäure, sondern eine Masse von der Beschaffenheit des Theers selbst. Der während internen Theergebrauches entleerte Harn widersteht der Fäulniss lange (Reclam).

Die hauptsächlichste medicinische Anwendung, welche der Theer findet, ist die externe bei chronischen Hautaffectionen, insbesondere bei Psoriasis und Ekzem, wo die Heileffecte des Mittels von einer sog. substitutiven Entzündung abgeleitet werden. Der Theer ist das Hauptmittel bei Behandlung squamöser Hautleiden (Pityriasis, Psoriasis u. s. w.), ist aber auch bei einer grossen Menge von Dermopathien, namentlich bei gewissen Formen des Ekzems und Lichen exsudativus ruber (Hebra), wirksam.

Die schon lange von Thierärzten gegen Hautkrankheiten benutzten Theersalben scheinen 1831 beim Menschen zuerst von Giron gegen Prurigo gebraucht zu sein, dessen günstige Erfolge von Cazenave bestätigt wurden; dann von Gauthier gegen Lichen und Psoriasis, von Bateman gegen Impetigo und Ichthyosis, von Duchesne, Fricke u. A. gegen Scabies u. s. w. In Deutschland haben Krieg, Cless, Otto, Veiel und Hebra besonders zur Verallgemeinerung des Theergebrauches beigetragen. In Hinsicht des Ekzems ist hervorzuheben, dass besonders Ekzeme mit mässiger Infiltration und keiner oder geringer Secretion (Eczema squamosum, rubrum und papulosum) vorzüglich gut durch Theermittel beeinflusst werden, Ekzeme mit starker Schwellung und das sog. Eczema impetiginosum den Theer contraindiciren.

Sigmund bestrich den Schmiercur das Zahnfleisch mit Theer, um das Entstehen von Speichelfluss und Stomatitis zu verhüten. Sarasin (1874) empfahl Theer zum Verbande frischer und granulirender Wunden (mit Watteverband).

Minder häufig werden jetzt die Theerdämpfe zur Inhalation bei chronischen Bronchialkatarrhen und Lungenphthise, welche von Crichton, Hufeland und Neumann warm befürwortet wurde, benutzt. Obschon sich nicht in Abrede stellen lässt, dass namentlich langwierige Katarrhe mit sehr reichlichem Secret dadurch auf die Dauer sehr gebessert werden, ist eine Einwirkung auf den tuberculösen Process doch selbstverständlich nicht zu erwarten, und bei einer etwas erhöhten Reizbarkeit des Respirationstractus findet sogar Verschlimmerung statt.



Theerräucherungen sind auch von Wansbrough, Robertson und Thomson bei Keuchhusten empfohlen. Mehr als hier ist Entwicklung von Theerdämpfen in neuerer Zeit als Desinficiens der Luft bei Cholera- u. a. Epidemien benutzt, wo indess meist der billigere Steinkohlentheer in Anwendung kommt und wobei Theer als Ozonträger wirkt. In Frankreich hat man neuerdings einen Apparat zur Theerverdunstung in Privatzimmern als sog. Gondronnière oder Emanateur hygiénique in Gebrauch.

Die innere Anwendung des Theers, sowohl gegen Hautkrankheiten, wo Bateman und M'Call Anderson ihn bei Ichthyosis, Porrigio und Psoriasis wirksam gefunden haben wollen, als gegen Phthisis und chronische Katarrhe der Respirationsorgane (Berkeley, Guibert, Durand-Fardel, Reclam) u. a. Leiden, z. B. Hämorrhoidalbeschwerden (Wardleworth), ist bei uns durch andere Medicationen fast vollständig verdrängt. Die Urtheile älterer Autoren über den Werth des Mittels bei Phthisis sind sehr getheilt. Nach Canstatt bringt es auch in mässigen Dosen bei alten Leuten Indigestion hervor, während es nach Durand-Fardel und Guibert auf die Digestion fördernd wirkt und bestehende Anorexie beseitigt. Guibert weist auf die rosige Farbe und das frische Aussehen tuberculöser Patienten hin, welche schon kurze Zeit nach dem Theergebrauche eintritt. Die günstige Wirkung bei chronischem Bronchialkatarrh und Emphysem ist nicht zu verkennen (Reclam).

Aeusserlich wird der Theer bei Psoriasis am besten unvermischt eingerieben, bei Ekzem messerrückendick aufgetragen, nachdem Schuppen, Borken u. s. w. vorher entfernt sind.

Hier sowohl wie bei verschiedenen anderen Hautaffectionen hat man vielfach Mischungen mit 5–6 Th. Fett oder Oel oder Glycerin angewendet, wodurch sich die Wirksamkeit verringert, wenn auch die Einreibung erleichtert wird. Dass bei Theereinreibungen die Wäsche stark verdirbt, ist eine Thatsache. Verschiedene Krätzsalben, z. B. die Wilkinsonsche, enthalten Pix liquida.

Zu Inhalationen verdampft man den Theer über einer Spiritusflamme langsam von einer flachen Schale. Der schon von Crichton empfohlene Zusatz von etwas Natronlauge soll die im Theer enthaltene Essigsäure binden und das Auftreten stärkerer Reizung verhindern.

Innerlich hat man den Theer zu 0,03–0,15 mehrmals täglich in Form von Pillen (mit Wachs und Pflanzenpulver oder Magnesia) oder in Gallertkapseln (als Dr. Berkeleys antiherpetic capsules oder Guyots Theerkapseln im Handel) benutzt.

### Präparat:

**Aqua Picis s. picea; Theerwasser.** An Stelle des früheren, durch Aufgiessen und zweitägiges Maceriren mit 10 Th. Wasser erhaltenen Theerwassers wird dasselbe jetzt extempore durch 5 Minuten langes Schütteln einer Mischung von 1 Th. Theer und 3 Th. gepulvertem Bimsstein mit 10 Th. Wasser und Filtriren erhalten und bei jedesmaligem Bedarf frisch bereitet. Die klare, gelbliche Flüssigkeit von dem Geruche und Geschmacke des Theers enthält ausser Brenzcatechin u. a. empyreumatischen Stoffen auch etwas Essigsäure und Methylalkohol. Das 1744 von Berkeley, Bischof von Cloyne, in einer besonderen Schrift als Mittel gegen Phthisis empfohlene Theerwasser, welches später auch gegen Scorbut, Asthma, Cholera und Geschwüre innerlich, gegen Tripper und syphilitische Geschwüre, sowie zur Verhütung wunder Brustwarzen, ja selbst zur Erregung künstlicher Frühgeburt äusserlich in Gebrauch gezogen wurde, findet jetzt verhältnissmässig selten bei chronischem Bronchialkatarrh mit fötidem Secret oder bei chronischen Hautkrankheiten Anwendung, wo man es tassen- oder becherweise geniesst. Mit 12 Th. Aqua picis gekochter Schwefel bildet die zu 10–20 Tropfen verabreichten lithontriptischen Tropfen von Palmieri, welche in Italien bei Nierensteinkolik sehr beliebt sind. Gegen chronische Bronchialkatarrhe ist Theerwasser auch in Verstäubung versucht. Auf alle Fälle bleibt das Präparat ein seinem Gehalte nach sehr variables und unsicheres. Verschiedene Formeln zur Herstellung eines flüssigen Theerpräparates von constanterem Gehalte und besserem Geschmacke, meist unter Beihülfe von Natron-

lauge bereitet, z. B. Guyots Liqueur de goudron concentré et titré (zu 1 Theelöffel voll in einem Glase Wasser innerlich, mit 4 Th. Wasser äusserlich), Jeannels Emulsion de goudron u. a. m. haben bei uns bisher keine Anwendung gefunden.

Ausser diesen flüssigen Formen hat Magnes-Lahans auch ein festes Theerpräparat aus 1 Th. Pix liquida und 2 Th. Holzkohle dargestellt, das bei Gebrauch zu Räucherungen nicht zerfliesst und welches man zu Inhalationen aus Cigarrenspitzen rauchen kann. Dasselbe ist zu antiseptischen Verbänden und auch zum inneren Gebrauche empfohlen.

Vielfach benutzt bei Hautleiden wird auch die Theerseife des Handels, zu deren Bereitung gewöhnlich der weiter unten zu erwähnende Birkenholztheer benutzt wird.

#### Verordnungen:

- |  |   |
|--|---|
| <p>1) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Picis liquidae</i><br/> <i>Vitelli ovorum</i> aa 25,0<br/> <i>Glycerini</i> 50,0<br/> <i>M. D. S.</i> Äusserlich. (<i>Goudron gly-</i><br/> <i>cériné</i> von Adrian, besonders zum<br/>     äusseren Gebrauche.)</p> | <p>2) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Picis liquidae</i><br/> <i>Fruct. Anisi pulverati</i> aa 10,0<br/> <i>Magnesiae q. s.</i><br/> <i>ut f. pilul. No. 100. Consp. D. S.</i> 1 bis<br/>     10 Pillen täglich. (Bei Haut- und<br/>     Lungenaffectionen. Miguët.)</p> |
|--|---|

**Anhang:** Neben dem Abietineentheer sind mehrere ähnliche Producte aus dem Holze anderer Bäume in gleicher Weise gebraucht. Von diesen hat das im südlichen Frankreich durch Schwelen des Stammes von *Juniperus Oxycedrus* L. (Französisch cade) und wahrscheinlich auch anderer Wachholderarten, z. B. *Juniperus phoenicea*, dargestellte *Oleum cadinum* s. *Oleum Juniperi empyreumaticum*, Kadeöl, als externes Mittel bei Psoriasis u. a. Hautkrankheiten selbst den Fichtenholztheer fast vollständig verdrängt. Echtes *Oleum cadinum* ist frisch braungelb, später dunkelbraun und dickflüssig, etwa von der Consistenz des Perubalsams, und hat einen eigenthümlichen, minder unangenehmen Theergeruch als Kienholztheer. Zuerst in der Veterinärpraxis gegen Räude, dann als Antiscrophulosum benutzt, hat das Mittel namentlich durch Serres, Devergie, Gibert, Bazin und Hebra allgemeine Anwendung bei Hautaffectionen chronischer Art gefunden. Vor dem Fichtenholztheer hat es jedenfalls den Vorzug besseren Geruches, während es in der Wirkung mindestens gleicht. Der heilsame Effect beschränkt sich nicht auf Psoriasis, auch Ekzeme, lichenartige und papulöse Exantheme können durch Einreibungen mit Kadeöl geheilt werden, auch Scabies lässt sich durch einige Einreibungen beseitigen. Bei Favus scheint es ohne günstige Wirkung, ebenso wird Lupus dadurch nicht geheilt, oft sogar verschlimmert. Die Empfehlung van Holsbecks gegen wunde Brustwarzen (mit Glycerin und Mandelöl) ist ohne Vortheile. Serres und Sully wandten es äusserlich bei scrophulöser Ophthalmoblennorrhoe an. Seit Devergies Versuche zeigten, dass die innerliche Verabreichung des Kadeöls bei den obenerwähnten Hautaffectionen für sich die Heilung nicht herbeiführen kann, wendet man *Oleum cadinum* nur äusserlich an, und zwar da, wo nicht zu starke Reizung zu befürchten ist, am besten unverdünnt, in anderen Fällen in Salbenform (1:3–5 Th. Fett) oder als Liniment (mit Glycerin oder Mandelöl oder alkalischen Seifen). Eine Mischung gleicher Theile *Sapo viridis* und *Oleum cadinum* mit 2 Th. Spiritus bildet Hebras flüssige Theerseife. Einzelne empfehlen *Oleum cadinum* auch als Zahnwehmittel.

Mit dem *Oleum Juniperi empyreumaticum* ist nicht ein ebenfalls als Huile de cade bezeichnetes flüssiges Nebenproduct bei der Kienholztheergewinnung zu verwechseln. Aus diesem hat Péraire durch fractionirte Destillation drei Producte von verschiedenem Siedepunkte erhalten, Resinon, Resineon und Resinein, von denen das zweite, welches bei 148° übergeht, ein dünnflüssiges, farbloses, später gelblich werdendes, fettig anzufühendes und penetrant riechendes Liquidum, nach Péraire die medicinischen Eigenschaften des Theers bedingen soll. Es hat sich auch bei äusserer Anwendung gegen Hautkrankheiten

bewährt, wo es den Vortheil minder intensiven Geruches und geringerer Beschmutzung der Wäsche darbietet, jedoch stärker reizend wirkt (Hebra). Auch innerlich ist Resineon als Balsamicum bei chronischen Katarrhen und äusserlich als ableitendes Mittel bei Brustschmerzen, Gastralgie, Kolik empfohlen. Man applicirt es bei chronischen Exanthemen in Substanz (Kleinhaus) oder mit 3 Th. Unguentum simplex.

Weitere nicht officinelle Theerarten sind das aus Birken bereitete *Oleum betulinum* s. *Rusci* s. *Balsamum Lithavicum*, welches wie *Oleum Juniperi empyreumaticum* benutzt wird, und das gegen Krämpfe, Gicht, Schwindsucht und alles Mögliche gepriesene, aus Braunkohlen bereitete *Oleum ligni fossilis empyreumaticum*. Wie das oben erwähnte *Oleum Fagi empyreumaticum*, Buchenholztheer, haben alle diese Theerarten bei Hautaffectionen und namentlich bei Psoriasis Anwendung gefunden. Nach Veiel soll Nadelholztheer minder reizend als Laubholztheer wirken, während Hebra alle als ziemlich gleichwirkend bezeichnet und das *Oleum Rusci* vor den übrigen nur bevorzugt, weil es den mindest unangenehmen Geruch besitzt, da es wie Juchten riecht.

Zu den empyreumatischen Stoffen gehört auch das als Pyrothonide bezeichnete, durch Verbrennen von Papier dargestellte *Oleum chartae*, Papieröl, welches hauptsächlich gegen Augen- und Ohrenleiden und bei cariösem Zahnschmerz, ferner bei Frostbeulen und syphilitischen Geschwüren, aber auch bei Angina membranacea (in Gurgelwasser) und Bronchialkatarrhen (inhalirt) in Frankreich Anwendung gefunden hat (Ranque, Broussais u. A.).

**Naphthol.** — Als ein den Theer bei Behandlung von Hautkrankheiten ersetzendes Mittel empfiehlt Kaposi (1881) das Naphthol (*Isonaphthol*,  $\beta$ -Naphthol), ein Hydroxylderivat des im Steinkohlentheer vorkommenden Kohlenwasserstoffs Naphthalin. Das Isonaphthol bildet eine dunkelviolettblaue, krystallinische, leicht zerreibliche Masse von schwachem, an Carbonsäure erinnernden Geruche und wird in verdünnter alkoholischer Lösung (0,25—10 : 100) und in Salbenform (1—15 : 100) bei Scabies, Psoriasis, Ekzem, Seborrhoe u. s. w. verwendet. Kaposi combinirt es bei Scabies mit Kaliseife und Kreide (Naphthol 15 Th., Kaliseife 50 Th., Kreide 10 Th., Schweineschmalz 100 Th.). Im Munde erregt Naphthol starkes Brennen, beim Riechen intensives Niesen. Es scheint auch von der Haut aus zur Resorption zu gelangen und kann möglicherweise bei Einreibung grösserer Partien der Körperoberfläche zu Hämoglobinurie Veranlassung geben (Neisser). Im Harn erscheint es als Naphtholschwefelsäure (Mauthner); in manchen Fällen zeigt derselbe olivengrüne Farbe. Das oben beschriebene Naphthol des Handels ist keineswegs rein; reines Isonaphthol bildet leichte, weisse, perlmutterglänzende, fast geruchlose Blättchen, die sich wenig in Wasser, leicht in Alkohol, Chloroform, Aether, Terpenthinöl und fetten Oelen lösen. Bei Psoriasis kommt man mit Salben von 1—2 Naphthol auf 100 Th. Schmalz oder Paraffinsalbe aus. Vor dem Chrysarobin hat es den Vorzug, dass es weder Haut noch Haare färbt und in der Umgebung des Applicationsortes keine Entzündung bewirkt, weshalb es sich besonders für die Anwendung im Gesichte eignet.

### Chrysarobinum; Chrysarobin.

Als sehr wirksames Mittel gegen verschiedene Hautkrankheiten, insbesondere Psoriasis, hat sich das gewöhnlich mit dem unrichtigen Namen Chrysophansäure bezeichnete Chrysarobin bewährt, welches die Hauptmasse eines seit vielen Jahren in den Tropenländern unter verschiedenen Namen als Mittel gegen Dermatosen benutzten gelben Pulvers bildet, welches in Spalten und anderen Hohlräumen des Holzes eines in der brasilianischen Provinz Bahia sehr häufig vorkommenden Baumes aus der Familie der Leguminosen, *Andira Araroba*, sich findet.

Das in den Tropenländern benutzte Pulver kam 1875 unter dem Namen



Poudre de Goa von Ostindien nach Europa. Da Silva Lima zeigte 1876 die Identität desselben mit dem in Brasilien bei Dermatosen hochgeschätzten Pó de Bahia oder Araroba, welches früher von Brasilien aus nach Portugal in grossen Massen verschickt und von dort nach den asiatischen Colonien (Goa) exportirt zu sein scheint, wo es seinem alten Rufe Ehre machte und von wo das Mittel sich als Goapulver Eingang in die englischen Colonien verschaffte. In Singapore blieb indessen der Name Pó Baia gebräuchlich, der auf die Abstammung aus Brasilien hindeutet. Im Jahre 1877 zeigte Monteiro, dass die Araroba von einem von den Eingeborenen Angelim amargoso genannten brasilianischen Baume, in welchem dasselbe seine Entstehung einer Desorganisation des Holzes zu verdanken scheint (Vogl), abstammt. Sie stellt ein dunkelgelbbraunes, erdiges, sehr leichtes, an Papier stark haftendes, mit wallnussgrossen, dunkelgelbbraunen oder ochergelben, im Innern röthlichbraunen erdigen Stücken, Holzsplintern und Rindenfragmenten gemischtes Pulver dar, das zum grossen Theile aus mikroskopischen Krystallen gebildet wird. Die daraus mit Benzol extrahirte Masse stellt das officinelle Präparat dar, welches im Wesentlichen aus dem von Liebermann und Seidler 1878 entdeckten Chrysarobin besteht, das kleine gelbe, in Wasser unlösliche, in concentrirter Schwefelsäure mit gelber Farbe sich auflösende, von verdünnter Kalilauge nicht, von stärkerer mit gelber Farbe gelöste Krystallblättchen bildet. Daneben finden sich noch farblose Krystalle und ein amorphes Harz (Vogl). Attfield hielt das Chrysarobin für Chrysophansäure. Auf dieser Anschauung beruht die früher übliche Bezeichnung *Acidum chrysophanicum* oder *Acidum chrysophanicum impurum* für das Präparat. Das Chrysarobin steht übrigens zur Chrysophansäure in sehr naher Beziehung, indem beide Derivate des Methylanthracens sind und beim Schüttein der alkalischen Chrysarobinlösung mit Luft Chrysophansäure entsteht. Das Chrysarobin geht sowohl bei interner Application als beim Einreiben von Chrysarobinsalbe auf rasirte ausgiebige Flächen der Bauchseite bei Kaninchen in das Blut über und wandelt sich im Organismus theilweise in Chrysophansäure um (Lewin und O. Rosenthal).

Die irritirende Wirkung des Chrysarobins zeigt sich bei therapeutischer Verwendung stärkerer Salben durch erythematöse Entzündung der Haut, welche auch über die Applicationsstelle hinaus sich erstreckt.

Auch bei den mit Einsammlung der Araroba beschäftigten Arbeitern soll Conjunctivitis, Schwellung der Haut und Erythem des Gesichts als Folge des Staubes vorkommen. Die erythemathöse Hautentzündung nach Chrysarobinsalben verbindet sich mit starkem Brennen und Jucken, Schlaflosigkeit und Frösteln. Oberhaut, Nägel und Haare werden purpurbräunlich, fast kupferroth gefärbt; die Färbung verschwindet in 8–10 Tagen und lässt sich von der Haut durch Waschen mit Benzin beseitigen (Neumann). Nach Heilung hautkranker Stellen durch Bestreichen mit Chrysarobinsalbe bleibt gewöhnlich an den entsprechenden Stellen ein weisser Fleck zurück (Anders).

Die reizende Wirkung des Chrysarobins tritt auch bei interner Einverleibung durch Emetokatharsis zu Tage (Thompson) und zeigt sich auch bei dem resorbirten Chrysarobin durch das Eintreten von Albuminurie und Nierenentzündung (Lewin und Rosenthal). Nach Ashburton Thompson enthält das Goapulver noch ein Harz, welches auf den Tractus 4–5mal stärker als Chrysarobin wirkt; kleine Dosen des letzteren wirken nicht kathartisch, sondern nur emetisch. Lewin und Rosenthal sahen nach interner Verabreichung bei Kaninchen Hamaturie, nach Inunction Albuminurie und leichte parenchymatöse Nephritis. Glaister beobachtete bei einer Frau nach 0,2 heftige Irritation des Tracts (Magenschmerzen, Erbrechen, Purgiren während der ganzen Nacht) und der Blase (anfangs heftige Schmerzen, dann Urinverhaltung, später Hämaturie).

Als die vorzüglichsten Hautaffectionen, welche neben Psoriasis der Chrysarobinbehandlung unterliegen, sind Pityriasis versicolor und Herpes tonsurans oder Eczema marginatum (Thin) zu nennen. Zur Beseitigung derselben scheint die Anwendung concentrirter Salben

aus 1 Th. Chrysarobin auf 4—5 Th. Unguentum cereum oder Paraffini erforderlich zu sein.

Das Ararobapulver wird nach Da Silva Lima in Brasilien meist in Verbindung mit Essigsäure benutzt. Derselbe empfahl eine Salbe aus 2—4 Th. Araroba, 1—2 Th. Acidum aceticum und 30 Th. Adeps benzoatus mit einem feinen Pinsel aufzutreiben oder ein durch achttägige Digestion mit verdünnter Essigsäure (1 : 4) erhaltenes Acetum rein oder mit Glycerin gemischt zu appliciren. Von den durch englische Dermatologen, z. B. Ogilvie Will, empfohlenen 3—4 % Salben, welche zwar keine Irritationserscheinungen hervorrufen, haben deutsche Kliniker keinen Erfolg gesehen. Vor Recidiven schützen auch stärkere Salben nicht, weshalb von manchen Aerzten eine Combination mit interner Arsenikur befürwortet wird. Bei den genannten parasitären Hautleiden sind meist 2—3 Bepinselungen mit 25 % Salbe ausreichend, bei Psoriasis 10—12, in leichteren Fällen auch weniger (Neumann).

Interne Anwendung von Chrysarobin als Emetocatharticum (Thompson) ist als zu gefährlich zu vermeiden.

### **Acidum pyrogallicum; Pyrogallussäure, Pyrogallol.**

Als äusseres Mittel bei verschiedenen Hautkrankheiten hat sich die durch Erhitzen von Gallussäure auf 215—220° entstehende Pyrogallussäure einen besonderen Ruf erworben, doch hat man sich vor der Anwendung auf zu ausgedehnte Körperstellen zu hüten, da durch solche vermöge Resorption und Einwirkung der resorbirten Substanz auf die rothen Blutkörperchen sehr schwere Störungen hervorgerufen werden können, welche unter dem Bilde der Hämoglobinurie auftreten und mitunter zum Tode führen.

Die Pyrogallussäure bildet sehr leichte, weisse, glänzende Blättchen oder Nadeln von bitterem Geschmacke, die sich in drei Theilen Wasser zu einer klaren, farblosen, neutralen Flüssigkeit, schwerer in Alkohol und Aether lösen, bei 130—131° schmelzen und bei vorsichtigem Erhitzen bei 210° unzersetzt sublimiren. Es ist keine Säure, sondern ein Trihydroxybenzol, isomer mit Phloroglucin und deshalb zweckmässiger als Pyrogallol zu bezeichnen. Wässrige Lösungen färben sich schwarz und zersetzen sich rasch beim Kochen, weshalb die Pyrogallussäure zum Schwarzfärben der Haare empfohlen wurde (Wimmer).

In seinen Wirkungen nähert sich das Pyrogallol in mancher Beziehung dem Phenol, namentlich wirkt es stark antiseptisch, so dass es in 1 % Lösung Faulniss und Bacillenbildung im Pankreas mehrere Wochen lang verhindert, in 2½ % Lösung faulendes Pankreas und Fleisch sofort geruchlos macht und von Mikroorganismen befreit, endlich in 2 % Solution Hefegährung sistirt und ammoniakalische Harngährung aufhebt (Bovet). Bacillen werden in 3 % Lösung sofort bewegungslos. Die intensive toxische Wirkung auf höher organisirte Thiere, welche schon Jüdel und Personne (1871) zeigten, ist neuerdings von Neisser (1879) genau studirt, nach dessen Versuchen der Tod bei massigen Gaben unter continuirlichem Zittern, convulsivischem Zucken und Sinken der Temperatur und des Pulses wahrscheinlich durch directe Beeinflussung der Nervencentren erfolgt, während bei mittleren letalen Mengen (0,2 per Kilo beim Kaninchen, 1,0—1,5 beim Hunde) die Auflösung der rothen Blutkörperchen offenbar Ursache des Todes ist, dem heftiger Schüttelfrost mit grosser Athembeschleunigung und starker Herabsetzung der Reflexerregbarkeit vorausgehen. In den Nieren finden sich Haemoglobincylinder, im Harn Haemoglobin mit Methämoglobin und Haematin. In Breslau starb ein an Psoriasis universalis leidender Mann, dem nach einem warmen Seifenbade Brust und linke Seite mit Pyrogallussäuresalbe eingerieben wurde, nachdem zuerst Diarrhöe, dann wiederholter Schüttelfrost, Collaps, Tremor, Anurie und Coma eingetreten war; in der Leiche fand sich exquisite Nephritis haemoglobinurica (Neisser). Die Resorption von

Pyrogallol von krankhaften Hautpartieen aus beweist auch der braun und selbst schwarz gefärbte Harn bei manchen mit Pyrogallolsalbe behandelten Psoriasis-kranken (Kaposi). Neben diesen Oxydationsproducten erscheint die Pyrogallussäure nach Jüdeli auch als solche im Urin, verschwindet aber ziemlich rasch, beim Menschen nach 0,5 in 12 Std., bei vergifteten Thieren auch bei noch lange fortdauernder Intoxication, und ist ausserdem in Blut und Galle nachweisbar. Als einzig rationelles Mittel bei Pyrogallolvergiftung erscheint die von Neisser vorgeschlagene Transfusion.

Gegen Psoriasis ist die Pyrogallussäure zuerst von Hebra und Jarisch (1879) als rasch heilendes Medicament erkannt, das auch in Fällen, wo Chrysarobin sich unwirksam gezeigt hatte, sich erfolgreich bewies, ohne in gleich intensiver Weise irritirend zu wirken. Besonders günstige Effecte wurden ausserdem bei Eczema marginatum und Lupus erhalten; bei letzteren werden constant nach dreitägiger Application die Zelleninfiltrate zerstört, während die gesunde Haut kaum beeinträchtigt wird. Auch gegen hypertrophische Narben bei cauterisirtem Lupus (Jarisch) und bei Folliculärentartung der Vaginalportion (Rosa Engert) ist das Mittel gerühmt. Als Antisepticum benutzte Bovet das Pyrogallol bei Ozaena und übelriechenden Krebsgeschwüren, Kocher beim Listerschen Verbands zum Ersatz des Phenols. Vesey will Pyrogallussäure zu 0,05 mehrmals täglich mit ausgezeichnetem Erfolge bei Lungen- und Magenblutungen gegeben haben.

Als Applicationsform ist vorzugsweise Salbe gebräuchlich. Wässrige Lösungen scheinen auf der Haut stärker reizend zu wirken als Mischungen mit Fetten.

Bovet gebrauchte 2% Lösung bei Ozaena unter Anwendung der Nasendouche. Pyrogallolsalbe wird entweder mit Unguentum simplex oder mit Unguentum Paraffini bereitet, bei Psoriasis und Lupus im Verhältniss von 1 : 10, bei Folliculärentartung der Vaginalportion von 1 : 20. Letztere Proportion ist auch bei Hautleiden von Personen mit zarter Haut anzuwenden, bei denen stärkere Salben tiefere Excoriationen an den Psoriasisplaques und Blasen in deren Umgebung hervorruft. Die Salbe wird zweimal täglich mittelst Borstenpinsels aufgetragen und die eingeriebene Stelle mit Watte geschützt.

## 2. Ordnung. Stomerethistica, Mundreizende Mittel.

Die hier zu betrachtenden Mittel kommen vorzugsweise bei Mundaffectionen in Anwendung, theils bei Geschwürsbildungen, namentlich scorbutischem Zahnfleische, wo sie die Erschlaffung und Lockerung beseitigen, theils als Kaumittel, um mittelst des durch sie gesetzten Reizes reflectorisch vermehrte Speichelsecretion hervorzurufen, theils zur Beseitigung von Zahnschmerzen, wo sie entweder direct ertödtend auf den blossliegenden Zahnnerven oder ableitend wirken.

### *Herba Cochleariae*; Löffelkraut.

Das frische Kraut von *Cochlearia officinalis* L., einer an den Seeküsten der kalten Zone und auf Salzboden wachsenden Crucifere, gilt seit Jahrhunderten nach der Empfehlung von Wier (1557) für ein Antiscorbuticum ersten Ranges und hat deshalb geradezu den Namen Scorbutkraut erhalten.



Es ist eine zweijährige Pflanze, welche im ersten Jahre nur ein Büschel langgestielter und fast herzförmig runder (Löffelartiger), am Rande ausgeschweiften, schön grüner Blätter treibt und erst im zweiten Jahre, wo die Wurzelblätter meist verschwinden, etwa fußhohe, dünne, kantige Stengel mit eiförmigen, buchtig gezähnten, fast stengelumfassenden Blättern, in endständigen Trauben stehenden weissen Blüthen und 0,5 Cm. langen, an doppelt bis einfach so langen Stielen sitzenden Schötchen, die in jedem der beiden Fächer 4 rothbraune Samen enthalten, entwickelt. Das Löffelkraut riecht beim Zerquetschen schwach senfartig und schmeckt beim Zerkauen gleichzeitig scharf und salzig bitter.

Der scharfe Geschmack rührt von einem sehr flüchtigen, schwefelhaltigen ätherischen Oele her, welches nach Hofmann (1874) Schwefelcyanbutyl ist und wie das verwandte Senföl wahrscheinlich durch Fermentwirkung entsteht.

Aus getrocknetem Kraute entwickelt sich kein Oel bei der Destillation, wohl aber bei Zusatz von Myrosin, so dass der fermentartige Eiweissstoff durch Trocknen zerstört wird und es unerlässlich ist, die Löffelkrautpräparate aus frischem Kraute zu bereiten. Der salzige Geschmack rührt von den unorganischen Bestandtheilen her; das Löffelkraut giebt 20% Asche, in welcher je nach dem Standorte bald Kali- und bald Natronsalze prävaliren.

Gegen Seescorbut bediente man sich des Löffelkrautes in der Form von Gemüse und Salat, wobei auch verwandte Pflanzen, wie *Cochlearia Anglica* und *Danica*, in Gebrauch kamen. Auch der ausgepresste Saft des frischen und zur Zeit der Blüthe (April, Mai) gesammelten Krautes wurde gegen die erwähnte Affection benutzt, deren Schwinden unter Anwendung des Löffelkrautes wohl zum grossen Theile aus der damit verbundenen Beseitigung der gesalzenen Kost bei Seefahrern sich besser erklärt als aus einer specifischen Wirkung. Denselben Presssaft empfahl man zu Frühlingscuren gegen Hydrops, Rheumatismus und Gicht.

#### Präparat:

**Spiritus Cochleariae, Löffelkrautspiritus.** Dieses jetzt fast ausschliesslich in Anwendung gezogene Präparat des Löffelkrauts, welches man durch Destillation von 8 Th. frischem Kraut mit  $\alpha\alpha$  3 Th. Spiritus und Wasser (zu 4 Th. Destillat) als klare, farblose, eigenthümlich riechende, brennend scharf schmeckende Flüssigkeit von 0,908—0,918 spec. Gewicht gewinnt, dient bei Geschwüren des Zahnfleisches, sowie im Munde und Schlunde überhaupt, mit Wasser, Salbeiaufguss und ähnlich wirkenden Flüssigkeiten verdünnt, zu Collutorien und Gargarismen (1 Esslöffel auf 1 Glas Wasser) oder für sich zur Bepinselung des Zahnfleisches.

**Anhang.** Aehnliche, aber anscheinend minder scharfe, ätherische Oele sind in mehreren anderen Cruciferen enthalten, welche deshalb auch analoge Verwendung wie das Löffelkraut finden. Dahin gehört die Kresse, *Lepidium sativum* L., die Brunnenkresse, *Nasturtium officinale* R. Br., die Schaumkresse, *Cardamine pratensis* L., und *Cardamine amara* L. u. a. m., die namentlich zu Frühlingscuren benutzt werden. Das ebenso gebrauchte Kraut von *Veronica Beccabunga* L., Bachbunge (Fam. Scrophulariaceae), ist viel weniger scharf. Wir erwähnen aus der Familie der Cruciferen noch die *Herba Bursa pastoris* von *Capsella bursa pastoris* Moench (*Thlaspi bursa pastoris* L.), in Russland als Specificum gegen Intermittens und von der Rademacherschen Schule (in Form einer Tinctur zu 15—30 Tropfen 4—6 mal täglich) gegen Blutungen und Harnbeschwerden benutzt.

#### Folia Salviae, Herba Salviae; Salbeiblätter, Salbei.

Die Blätter von *Salvia officinalis* L., einem der nördlichen Mittelmeerflora angehörigen, bei uns in Gärten cultivirten Halb-

strauche aus der Familie der Labiaten, sind durch aromatischen Geruch und gewürzhaft adstringirend bitteren Geschmack ausgezeichnet.

Sie sind meist eiförmig, bisweilen am Grunde geöhrt, dunkelgrün, und auf dem sehr verzweigten, runzligen, engmaschigen Adernetze mit weissem Filze überzogen, besonders stark auf den jüngeren Blättern und denen der kleinblättrigen Varietät, welche zahlreichere Oeldrüsen zeigen und daher stärkeres Aroma besitzen und für den medicinischen Gebrauch bevorzugt werden. Man sammelt die Blätter vor der Blüthezeit. Die durch Cultur auf fettem Boden erzielte Varietät mit fast 1 Dm. langen, breiten Blättern, welche 4mal länger als der Blattstiel sind, hat viel weniger Aroma.

Die Wirksamkeit des Salbei ist offenbar auf das gleichzeitige Vorhandensein eines adstringirenden und eines gelind reizenden Principis (ätherisches Salbeiöl) zu beziehen.

Ueber ersteres liegen keine Angaben vor. Das Salbeiöl, wovon aus den frischen Blättern nur  $\frac{1}{4}\%$  gewonnen wird, ist grünlich bis bräunlich gelb, dünnflüssig und nach Rochleder ein Gemenge mehrerer sauerstoffhaltiger Oele (Oxydationsstufen von  $C^{12}H^{20}$ ). Bei längerer Aufbewahrung unter Luftzutritt scheidet es Salbeicampher ab, welcher kühlenden, scharfen Geschmack besitzt. Medicinisch wurde Salbeiöl zu 1–10 Tropfen bei chronischen Katarrhen der Athmungsorgane, Asthma und Tuberculose von Schneider empfohlen.

Weder die Droge noch deren Bestandtheile haben ausreichende physiologische Prüfung gefunden.

In einem Selbstversuche von Pidoux trat auf Genuss eines Aufgusses von 15,0 Folia Salviae mehrstündiger copióser Schweiß, fliegende Hitze, etwas beschleunigter und voller Puls, Unruhe, Unfähigkeit zu geistiger angestrenzter Arbeit, Trockne des Mundes, ungewöhnliche Verstopfung, Vermehrung des Appetits und Schlaflosigkeit ein. Es sind diese Erscheinungen bis auf die Obstipation ziemlich ähnlich den durch grosse Dosen von Kaffee oder Thee hervorgerufenen, als deren Surrogat Hunault und Stenzel gegen Ende des 17. Jahrhunderts den Salbei empfahlen.

Die Salbeiblätter haben in älterer Zeit für eines der wirksamsten Medicamente bei einer grossen Anzahl der schwersten Krankheiten gegolten (Salvia Salvatrix Naturae Conservatrix), so dass die Salernitaner Schule fragte: Cur moritur homo, cui crescit Salvia in horticis? Jetzt dienen sie innerlich nur bei Nachtschweissen, wogegen sie van Swieten im weinigen Aufgusse empfahl. Van Swieten fand sie besonders bei Schweissen im Reconvalescenzstadium acuter Krankheiten indicirt, und betrachtete sie da, wo sie jetzt meistens angewendet werden, nämlich bei Phthisikern, als contraindicirt, weil sie die Hitze der Haut nicht herabsetzen. Auch als die Milchsecretion beschränkendes Mittel ist Salbei gerühmt (van Swieten, Gardner).

Hauptsächlich dienen Salbeiblätter äusserlich bei Affectionen des Mundes und Schlundes, wo es sich darum handelt, gleichzeitig zusammenziehend und gelind reizend zu wirken.

Sie passen deshalb besonders bei schlaffem, zu Blutungen und Exulcerationen geneigtem, sog. scorbutischem Zahnfleisch, bei Speichelfluss oder bei Quecksilbercuren, um das Eintreten von Ptyalismus zu verhüten, ferner bei Angina catarrhalis, wenn das entzündliche Stadium überwunden ist, in Form von Mund- und Gurgelwässern. Man verbindet das Mittel hier theils mit Honig, um minder reizend zu wirken, theils mit Rothwein, um die zusammenziehende Action zu verstärken. Auch bei schlecht heilenden Fussgeschwüren werden Aufgüsse von Salbei gerühmt (Pidoux). Als Zusatz zu Zahnpulvern und Latwergen ist Salbei beliebt.

Zum Aufgusse für äusseren und inneren Gebrauch rechnet man 1 Theil Salbeiblätter auf 5–10 Th. Colatur.

Ein aus Salbei bereitetes destillirtes Wasser, *Aqua Salviae*, diente früher als Vehikel für Stoffe, welche locale Wirkung auf Mund- oder Pharyngeal-schleimhaut ausüben sollen. Salbei war auch das Hauptingrediens einer durch Destillation verschiedener aromatischer Pflanzen (Rosmarin, Pfefferminz, Lavendel, Fenchel, Zimmetcassia) dargestellten Flüssigkeit, die mit den sonderbaren Namen *Aqua cephalica*, *Aqua s. Balsamum Embryonum*, *Aqua apoplectica*, Schlagwasser, belegt wurde, die später der Bezeichnung *Aqua aromatica* weichen mussten. Die Bezeichnung *Aqua Embryonum* oder Kinderbalsam soll daher rühren, dass man das Präparat als Einreibung in die Bauchhaut bei Schwangeren benutzte, welche Tendenz zu Fehlgeburten hatten. Es diente vorzugsweise äusserlich zu reizenden Einreibungen bei Contusionen, Lähmungen, Kopfschmerz, innerlich bei Blähungen und Dyspepsie. Die *Aqua aromatica* ist der Rest der alten *Aqua cephalica Caroli V. imperatoris*, die, dem Geschmacke des 16. Jahrhunderts entsprechend, aus 25–30 Pflanzen-species destillirt wurde.

### **Myrrha, Gummi resina Myrrha; Myrrhe.**

Die Myrrhe des europäischen Handels, ist der freiwillig ausgeflossene, erhärtete, anfangs blassgelbe, beim Trocknen röthlich oder braun werdende Saft von *Balsamodendron* (*Balsamea*) *Myrrha* Nees, einem im westlichen Südarabien und an der gegenüberliegenden afrikanischen Küste wachsenden Bäumchen aus der Familie der *Burseraceen*. Sie besteht aus Gummi (40–60 %), einem Gemenge von Harzen, die sich in Alkohol und Chloroform vollständig lösen, und  $3\frac{3}{4}$ –4 % eines an der Luft dunkler und dicker werdenden, sauerstoffhaltigen ätherischen Oels und enthält einen noch nicht genau untersuchten Bitterstoff.

Der Afrikareisende Hildebrandt hat neuerdings die Stammpflanze der Myrrha an Ort und Stelle verificirt, die früher von Berg als eine von *Balsamodendron Myrrha* verschiedene Species, *Balsamodendron Ehrenbergianum*, nach einem von Ehrenberg 1825 gesammelten Exemplare beschrieben wurde. Die Myrrhe bildet gelbliche, röthliche oder braune, bestäubte, spröde Körner oder Stücke von verschiedener Grösse, mit rauher, unebener, löcheriger Oberfläche und von gelbem, wachsglänzendem, oft stellenweise weisslichem, unebenem Bruche. Sie riecht angenehm balsamisch, schmeckt bitter gewürzhaft und kratzend, giebt ein gelbes Pulver, mit Wasser zerrieben eine Emulsion, löst sich nicht vollständig in Alkohol mit gelber Farbe, bläht sich beim Erhitzen auf, ohne zu schmelzen, und verbrennt mit rauchender Flamme. Nach Wigand beruht die Bildung der Myrrha auf Umbildung und Verflüssigung der Zellwand und finden sich darin stets Stückchen Borke, welche unverkennbare Metamorphose darbieten. — Das Myrrhenöl (*Myrrhol*) wird wie die Myrrhe selbst durch Salpetersäure oder Salzsäure trüb violett gefärbt, wodurch letztere von dem *Bdellium*, das dunklere Farbe, stärker bitteren Geschmack und geringeren Gummigehalt besitzt und wahrscheinlich von *Balsamodendron Africanum* Arnott stammt, unterschieden werden kann. Beim Schmelzen mit Kalihydrat liefert Myrrha Protokatechusäure und Brenzkatechin.

Die medicinische Bedeutung der bekanntlich schon im Alterthume als Räucherungssubstanz geschätzten Myrrha hat in der neueren Zeit sehr abgenommen. Eine genaue physiologische Prüfung fehlt; kleinere Dosen erregen leicht Ructus, grössere (2,0–4,0) sollen Magenentzündung und Fiebererscheinungen bedingen können (Pereira). Nach Hirt findet Vermehrung der farblosen Blutkörperchen unter Gebrauch von Myrrha statt. Therapeutisch hat die Myrrha als tonisch-balsamisches Mittel bei übermässiger Secretion der Respirations- und Urogenitalorgane, ferner als Stomachicum bei Indigestion und Magenkatarrh (Savignac), endlich gegen Amenorrhoe bis in die neueste Zeit Anwendung gefunden. Die günstigen Effecte gegen Phthisis, welche man na-



mentlich in vorigem Jahrhundert der Myrrha nachrühmte, wo Friedr. Hoffmanns Myrrhenzucker allgemeine Benutzung fand, und welche auch noch heute manche Aerzte veranlassen, das Mittel in Verbindung mit plastischen Stoffen, namentlich mit Eisen, z. B. in der Griffithschen Mixtur, zu verwenden, finden ihre Erklärung theils in der Herabsetzung der Absonderung bei Hypersecretion der Bronchialschleimhaut, theils und vorzugsweise in der örtlichen Einwirkung auf die Pharyngealschleimhaut, wo Myrrha vermöge ihres Gummigehaltes bei acuten Reizungszuständen demulcirend wirkt und vermöge ihres Gehaltes an Harz und ätherischem Oel bei chronischen Entzündungszuständen von günstigem Einflusse sein kann, theils endlich in der durch das Medicament hervorgebrachten Steigerung des Appetits. Directe specifische Wirkung der Myrrha auf Phthisis und den tuberculösen Process existirt selbstverständlich nicht.

Die vorzüglichste und berechtigteste Anwendung findet Myrrha bei Anginen und bei scorbutischem Zahnfleische, sowie zum Verbande schlaffer und jauchiger Geschwüre überhaupt. Die ihr zugeschriebene günstige Wirkung auf Caries dentium ist problematisch, ihre Anwendung zu Räucherungen bei Rheumatismus und zu Inhalationen bei chronischem Bronchialkatarrh wenigstens nicht irrationell.

Man giebt die Myrrha innerlich zu 0,03—0,15 in Pulvern, Pillen, Electuarien und Schüttelmixturen. Die Form der Electuarien ist unzweckmässig, weil auch bei sorgfältigster Bereitung die Myrrha sich wieder absetzt. Pulver können einfach mit Zucker bereitet werden; eine Mischung mit 5 Th. Saccharum galt unter der Bezeichnung Myrrhenzucker im vorigen Jahrhundert als Mittel gegen Phthisis pituitosa. Aeusserlich wird Myrrha zu Räucherungen und Inhalationen, in Streupulvern, Salben und Pflastern, sowie besonders in Mund- und Gurgelwässern angewendet, doch mehr als Tinctur (vgl. unten). Bei Verabreichung der Myrrha sind Chlor, Iod und Brom, concentrirte Mineralsäuren und Metallsalze möglichst zu meiden, weil sie auf das in der Myrrha enthaltene Gummi fäallend wirken. Zu Räucherungen streut man Myrrha auf Kohlen, was auch zum Zwecke der Inhalation geschehen kann, wo man früher die Myrrha auch mit Essig oder Campher kochte.

#### Präparat:

**Tinctura Myrrhae; Myrrhentinctur.** Mit 5 Th. Weingeist bereitet, röthlich gelb, nach Myrrha riechend, von bitterem, brennend gewürzhaftem Geschmacke, durch Wasserzusatz milchig getrübt. Die Myrrhentinctur, innerlich selten zu 10—20 Tropfen gegeben, dient vorzugsweise äusserlich in allen zur Application auf Mund- und Pharynxschleimhaut üblichen Formen, sowie zu Verbandwässern und Verbandsalben bei scorbutischen und cariösen Geschwüren, seltener zu Injectionen bei chronischen Schleimhautblennorrhöen. Zu Collutorien und Gargarismen, wo man das Mittel gewöhnlich mit ähnlich wirkenden verbindet, namentlich häufig mit Salbei und Löffelkrautpräparaten, rechnet man 1 Th. Myrrha auf 10—50 Th. Vehikel, wozu man zweckmässig, um das Myrrhenharz in Lösung zu erhalten, schwach spirituöse Mischungen wälft. Zu Pinselsäften rechnet man 1 Th. Myrrhentinctur auf 3—10 Th. Rosenhonig, zu Injectionen und Verbandwässern 1 Th. auf 10—100 Th. Flüssigkeit, zu Salben 1 Th. auf 3—10 Th. Fett. Bei scorbutischen Geschwüren des Zahnfleisches und anderen schlaffen oder jauchigen Geschwüren trägt man Tinctura Myrrhae am besten unverdünnt auf.

Nicht mehr officinell ist das durch zweitägige Maceration von 1 Th. Myrrha mit 5 Th. Aq. dest. und Filtriren dargestellte Myrrhenextract, Extractum Myrrhae, ein rothgelbes Pulver, welches im Wesentlichen aus dem in der Myrrha enthaltenen Gummi und wenig ätherischem Oele und Harz besteht, bitter balsamisch schmeckt und sich in wenig Wasser klar auflöst. In 5 Th. Wasser gelöst bildet es das in älterer Zeit gebräuchliche Liquamen s. Liquor Myrrhae, auch Oleum Myrrhae per deliquium genannt. Innerlich gab

man Extractum Myrrhae zu 0,3—1,0 in Pillen, Pulvern oder Mixturen, äusserlich in den zur Application auf Mundschleimhaut und Zahnfleisch bestimmten Formen. Ein früher bei scorbutischem Zahnfleische viel gebrauchtes Myrrhenpräparat bildete die durch Digestion von Myrrha und Catechu mit Löffelkrautspiritus dargestellte und mit Perubalsam parfümirte Tinctura Myrrhae composita s. gingivalis.

### Oleum Cajeputi, Oleum Cajeput; Cajeputöl.

Das Cajeputöl ist ein auf der Insel Buru in der Residentie Amboina aus den Zweigen von *Melaleuca minor* Sm. und *Melaleuca Leucadendron* L., zwei, vielleicht nicht besondere Arten darstellenden, den Molukken angehörigen Bäumen aus der Familie der Myrtaceen, welche sich durch die oben am Stamme weisse (cajuput malaiisch weisses Holz), unten schwarze Borke auszeichnen, durch Destillation gewonnenes ätherisches Oel von grüner oder grüngelblicher Farbe, eigenthümlichem, an Campher, Rosmarin und Minze erinnerndem, doch keineswegs angenehmem Geruche und aromatischem, kühlendem Geschmacke, das mit Alkohol ohne Trübung in jedem Verhältnisse mischbar ist. Die durch Salzsäure verschwindende grüne Farbe scheint dem Gehalte von Kupfer in Folge von Anwendung kupferner Blasen bei der Destillation oder vom Transport in kupfernen Flaschen zu entstammen, theilweise durch ein grün gefärbtes Harz bedingt zu werden (Blanchet und Sell). Bei Rectification des Oels geht zuerst farbloses Oel (das Oleum Cajeputi rectificatum einzelner Pharmacopöen), später grünlch gefärbtes über.

Das Cajeputöl besteht zu  $\frac{2}{3}$  aus bei 175—178° siedendem Cajeputenhydrat (Cajuputol), zu  $\frac{1}{3}$  aus Camphenen von der Zusammensetzung des Borneols.

Die Dämpfe bewirken starke Reizung der Augenbindehaut, öftere Bepinselung führt zur Bildung einer kleinen, weissen Narbe (Prosper Delvaux). Auf Milben und Insecten wirkt das Oel deleter, desgleichen auf Helminthen (Rudolphi). — In kleineren Dosen gegeben, wird es bei Säugethieren vom Magen aus völlig resorbirt, in grösseren Mengen verwandelt es sich in eine halbfüssige, gelbe, klebrige Masse und erzeugt Gastroenteritis (Prosper Delvaux). Die hautröthende Wirkung steht der des Terpenthinöls nach.

In therapeutischer Beziehung hat sich das Cajeputöl ziemlich überlebt, und seine Hauptanwendung besteht jetzt wohl nur in der Application in cariöse Zähne nach Art des Nelkenöls. Die Medicin des 18. Jahrhunderts machte aus dem nach einem Wolfenbütteler Theologen oft als Oleum Wittnebianum bezeichneten Oele eine Panacee gegen Nervenaffectionen und Sinnesleiden aller Art. In diesem Jahrhunderte hat es gegen Aphonie, Tetanus traumaticus, Wasserkolk während der Gravidität, bei Cardialgien und Koliken, welche mit Tympanites im Gefolge von abnormen Gährungsprocessen im Digestionstractus verbunden sind, und besonders im Stadium algidum der Cholera Anwendung gefunden. Prosper Delvaux (1861) rühmt es gegen *Ascaris lumbricoides* und *Oxyuris*, bei Dyspepsie mit Flatulenz, bei Meteorismus im Verlaufe schwerer Erkrankungen, bei Cholerine (nicht bei Cholera epidemica), bei asthenischen Affectionen der Respirationsorgane, endlich äusserlich bei Rheumatismus chronicus und diversen Hautaffectionen (*Acne rosacea*, *Pityriasis*, *Psoriasis*), bei Distorsionen und Luxationen. Im Allgemeinen steht es dem Terpenthinöl in seiner Wirkung nahe, ohne nachweisbare Vorzüge vor demselben zu besitzen.

Die Dosis des Oeles beträgt 1—10 Tropfen, bei Cholera und Tetanus selbst bis 60 Tropfen. Man giebt es als Oelzucker, auch in Emulsion oder Latwerge.

Äusserlich wird es für sich oder mit Oleum Olivarum (1:3) oder Spiritus (1:9) aufgepinselt oder für sich oder im Gemenge mit Anaestheticis (Chloroform, Chloralhydrat) auf Watte in hohle Zähne applicirt.

*Radix Pyrethri*; Bertramwurzel. — Als Sialagogum gilt die als Deutsche Bertramwurzel, *Radix Pyrethri Germanici*, bezeichnete Wurzel von *Anacyclus officinarum* Hayne, einer vermuthlich aus Südeuropa stammenden, bei Merseburg cultivirten einjährigen Composite, welche früher als

einjährige Spielart von *Anacyclus Pyrethrum* angesehen wurde, von der die meist aus Nordafrika kommende, nicht ganz so scharfe Römische Bertramwurzel, *Radix Pyrethri Romani*, stammt. Sie ist geruchlos, entwickelt aber beim Kauen einen sehr anhaltenden und brennenden, ein Gefühl von Abstumpfung hinterlassenden Geschmack, den sie einem Harze zu verdanken scheint, das neben einer Spur von ätherischem Oele und einer grossen Menge von Inulin sich findet. Auf die Nasenschleimhaut und die äussere Haut wirkt die Wurzel scharf reizend. Nach Buchheim wird ihre Schärfe durch ein dem Piperin ähnliches Alkaloid bedingt. Die Bertramwurzel dient als Sialagogum besonders bei cariösem Zahnschmerz (namentlich als Bestandtheil von Zahnwehmitteln), auch bei Trockensein im Munde und bei Zungenlähmung, ferner als Zusatz von Gargarismen bei Relaxation der Uvula u. s. w. Als Niespulver und äusserer Hautreiz findet sie jetzt kaum noch Anwendung, wie man auch von dem internen Gebrauche gegen Typhus, Paralysen und Rheumatismus längst zurückgekommen ist. Grosse Dosen des Pulvers (1,0—2,0) können Gastritis erzeugen und ist die Gabe auf 0,2—0,3 zu normiren.

*Herba Spilanthis*; Parakresse. — Aehnliche Verwendung wie die Bertramwurzel findet das blühende Kraut von *Spilanthes oleracea* Jacq., einer in Südamerika einheimischen krautigen Composite mit langgestielten, herzförmigen, beim Trocknen schmutzigen Blättern und vor dem Aufblühen braunen, später gelben, kugligen Blüthenköpfchen, welches wahrscheinlich vermöge des darin nach Lassaigue enthaltenen ätherischen Oeles beim Kauen beissend scharfen Geschmack erregt und Zusammenlaufen des Speichels im Munde veranlasst und das in seinem Vaterlande gegen Rheumatismen, Steinbeschwerden und Scorbut angewendet wird. In Europa dient es besonders zur Darstellung der *Tinctura Spilanthis composita*, Paratinctur, Paraguay-Roux, einer braungrünen, aus *Herba Spilanthis* und *Rad. Pyrethri* bereiteten Tinctur, welche als vorzügliches Mittel gegen Zahnschmerz gilt, wenn man einen damit befeuchteten Baumwollpfropf in den hohlen Zahn bringt oder das Mittel in das Zahnfleisch einreibt oder auch in Form von Mundwasser applicirt.

Auch das Kraut von *Spilanthes Acmella* (Brasilien) besitzt ähnliche Eigenschaften. Nach Buchheim ist das wirksame Princip der Parakresse ein dem Piperin und Chavicin verwandtes Alkaloid, welches sich in Piperidin und eine eigenthümliche Säure spaltet.

### 3. Ordnung. Stomacherethistica, Magenreizende Mittel.

Wir betrachten hier solche Stoffe, welche vorzugsweise zur Anwendung kommen, um einen Reiz auf die Magenschleimhaut auszuüben. Die Absicht bei ihrer Anwendung ist eine doppelte, nämlich entweder reflectorisch vermehrte Absonderung von Magensaft hervorzurufen und dadurch Verbesserung der Digestion herbeizuführen, oder um ebenfalls reflectorisch Erbrechen zu bedingen und dadurch Entleerung des Mageninhaltes etc. zu veranlassen. Es ergeben sich danach zwei Unterordnungen, die der Stomachica (Digestiva) und die der Emetica oder Brechmittel. Die Wirkung der Stomachica ist besonders hervortretend bei chronischen katarhalischen Leiden des Magens, wo ihnen ausser der angegebenen Action auf die Secretion vielleicht auch ein direct günstiger sog. substitutiver Einfluss zukommt. Ein Theil derselben wird in analoger Richtung auch bei Mundaffectionen benutzt. Die wirksamen



Principien sind hier durchgängig ätherische Oele. Die als Brechmittel benutzten Stoffe wirken entschieden stärker reizend und sind im Stande, eine irritirende Wirkung auch auf die Haut und andere Schleimhäute auszuüben. Das Allgemeine über beide Abtheilungen ist bereits S. 50—57 angegeben.

a. Verdauungsbefördernde Magenreizmittel, Stomachica.

**Fructus Cardamomi, Cardamomum minus; Malabarische Cardamomen.**

Mehrere Pflanzen aus der Gattung *Elettaria* (Fam. Zingiberaceae), welche in verschiedenen Theilen von Holländisch- und Britisch-Ostindien vorkommen, liefern aromatische, bald mehr kugelige, bald mehr längliche Kapselfrüchte, die unter dem Namen Cardamomen bekannt und als Gewürz geschätzt sind. Die feinsten und medicinisch allein verwendeten kleinen oder Malabarcadamomen, *Cardamomum minus* s. *Malabaricum*, von 1—2 Cm. Länge und etwa 1 Cm. Dicke, stammen von *Elettaria Cardamomum*, welche Pflanze besonders auf der Westküste von Vorderindien wild und cultivirt vorkommt.

Neben denselben finden sich im Handel bei uns noch die langen oder Ceyloncardamomen, von *Elettaria major*. Als *Cardamomum maximum* sind die Früchte verschiedener, besonders afrikanischer Species der Scitamineengattung *Amomum* bezeichnet, zu welcher auch *Amomum granum paradisi* Atz., die Mutterpflanze der gewürzhaft und pfefferartig schmeckenden Paraskörner, *Grana Paradisi*, gehört, aus denen Buchheim eine dem Cardol nahe verwandte Substanz isolirte.

Das Aroma der Cardamomen ist von einem ätherischen Oele abhängig, das seinen Sitz nicht in der longitudinal gestreiften, grauweissen, lederartigen Haut des dreifächrigen Fruchthäuses, sondern in den darin enthaltenen braunen, runzeligen, innen weissen Samen hat. Das in den Malabarcadamomen zu 5% enthaltene Oel scheidet Campher ab.

Die Cardamomen dienen fast ausschliesslich als aromatischer Zusatz zu zusammengesetzten Tincturen, z. B. *Tinctura aromatica*.

**Rhizoma Galangae, Radix Galangae; Galgantwurzel, Galgant.**

Dieses auch als kleiner Galgant, *Radix Galangae minoris*, bezeichnete Rhizom stammt nach Hance (1871) von der bis dahin unbekannten chinesischen Scitaminee *Alpinia officinarum* Fletcher, nicht aber von *Alpinia Chinensis* Rosc., noch von der in Indien cultivirten Stammpflanze des im europäischen Handel nicht mehr vorkommenden grossen Galgants, *Alpinia Galanga* Sw. Es bildet 7—8 Cm. lange, fingerdicke, cylindrische, knieförmig gebogene, längsstreifige, aussen braunrothe und innen zimmetfarbige Stücke von zäher Consistenz mit dicker Rinde, holzig faserigem Bruche, aromatischem Geruche und brennend gewürzhaftem Geschmacke. Neben Stärke und Harz findet sich darin besonders ätherisches Oel, das ähnlich wie Cajeputöl riecht. Das von Brandes aus Galgant dargestellte krystallinische, neutrale, geruch- und geschmackfreie Kaempferid, welches Jahns (1881) in drei verschiedene Körper (Galangin, Alpinin und Kaempferid) zerlegte, ist an der Wirkung vermuthlich unbetheiligt.

Galgant ist als Kaumittel bei Zungenlähmung verwerthet, und eine durch Digestion mit Rum erhaltene Tinctur wird in Russland gegen cariösen Zahnschmerz benutzt. In seiner Heimath ist er als Gewürz für Fische und Krabben beliebt. Ueberhaupt gilt er wie viele scharfe Stoffe (Ingwer, Senf) als appetitreizendes Mittel und dient deshalb bei schwacher Digestion als Zusatz zu bitteren Stoffen. Er ist ein Bestandtheil der *Tinctura aromatica*.

**Rhizoma Zedoariae, Radix Zedoariae; Zitwerwurzel.**

Dem Galgant nahe verwandt ist die Zitwerwurzel, der Hauptwurzelstock einer in Bengalen und Madagascar einheimischen Scitaminee, *Curcuma Zedoaria Roscoe* (*Curcuma Zerbumbet Roxb.*). Derselbe ist eiförmig, geringelt, und kommt, der Quere oder Länge nach zerschnitten, in compacten, zähen, aussen hellgrauen Stücken im Handel vor. Gekaut erzeugt die Zitwerwurzel Brennen im Munde und eine etwas bitterliche Geschmacksempfindung; der Geruch ist eigenthümlich campherartig. Harz und ätherisches Oel sind ohne Zweifel die Hauptbestandtheile (eine genauere Untersuchung fehlt), daneben ist die Droge reich an Amylum. Sie kommt meist in Verbindung mit den beiden vorigen als *Stomachicum* in Anwendung und ist Bestandtheil der *Tinctura amara*.

**Rhizoma Zingiberis, Radix Zingiberis; Ingwer, Ingber.**

Häufige Verwendung als *Stomachicum* und *Digestivum* findet der Ingwer, welcher die Nebenwurzelstöcke einer ursprünglich in Südasien und China einheimischen, jetzt in verschiedenen tropischen Ländern cultivirten *Zingiberaceae*, *Zingiber officinale Rosc.* (*Amomum Zingiber L.*), darstellt.

Dieselben bilden compacte, schwere, zweizeilig und kurz verästelte, abgeplattete, bis 2 Cm. breite Stücke von angenehmem aromatischem Geruche und feurig gewürzhaftem Geschmacke. Sie kommen entweder nur theilweise, nicht am Rande, wo sich dann die schmutzig gelbgraue Rinde bemerklich macht, (Bengalischer Ingwer), oder vollständig geschält, wo sie eine blassgelbliche oder weissliche Farbe besitzen (*Cochinchina-Ingwer*), im Handel vor. Der körnige Querbruch zeigt zahlreiche braune Oelbehälter gleichmässig in das graue Gewebe der nur 1 Mm. breiten Rinde und des auf dem Querschnitte elliptischen, bis etwa 2,5 Cm. breiten Gefässbündelcylinders eingestreut.

Ausser den bezeichneten Sorten giebt es noch eine gar nicht geschälte Sorte, den schwarzen Ingwer oder *Barbadoes-Ingwer*, ferner eine ausserordentlich schön weisse Sorte, sog. weisser oder *Jamaica-Ingwer*. Bei letzterer ist die Farbe offenbar künstlich durch Bleichen mit Chlor oder schwefliger Säure oder durch Einlegen in Kalkwasser erzielt und ist dieselbe deshalb verwerflich.

Der Ingwer kommt auch in Zucker eingekocht aus China und (der beste) aus Westindien als eingemachter Ingwer, *Conditum Zingiberis*, den man als Hausmittel bei Magenkatarrh, Katzenjammer verwendet, im Handel vor.

Im Ingwer findet sich ein gelbliches, sehr dünnflüssiges, ätherisches Oel von dem Geruche und Geschmacke der Droge, das zum grössten Theile aus einem dem Cubebenöle isomeren Kohlenwasserstoffe besteht. Wie schon Buchheim eine dem Cardol ähnliche Substanz als actives Princip bezeichnete, hat auch Thresh (1851) dasselbe als einen zähen, strohgelben Syrup beschrieben und als *Gingerol* bezeichnet.

Die scharfe Wirkung des Ingwers äussert sich nicht allein beim Kauen, sondern auch bei Application befeuchteter Stücke auf die äussere Haut, wodurch nach einiger Zeit Röthung, Hitze und Stechen resultirt. Das Pulver erregt auch starkes Niesen. Wie andere ätherische ölige Mittel besitzt er auch carminative Wirkungen d. h. er regt die peristaltische Bewegung an. Beschleunigung der Circulation, allgemeines Wärmegefühl, Erregung der geistigen Thätigkeiten durch Ingwer dürfte nur bei grösseren Gaben vorkommen.

Für sich dient Ingwer nur als Kaumittel bei Glossoplegie, Zahnweh, und in Form eines Aufgusses als Gurgelwasser gegen Erschlaffung der Uvula, chronische Angina und Aphonie. Seine Hauptverwendung findet er als Gewürz und in manchen zusammen-

gesetzten als magenstärkend und verdauungsbefördernd benutzten Präparaten.

Namentlich in England benutzt man Ingwer sehr häufig als aromatischen Zusatz zu Stoffen, welche den Magen belästigen, z. B. Eisen und Eisensalzen, auch zu abführenden Mixturen, in der Absicht, um dem Entstehen von Kolikschmerzen vorzubeugen. Ingweraufguss leistet bei Colica flatulenta, Ingwertinctur angeblich bei Sommerdiarrhoe Vorzügliches. Dass übrigens habitueller Gebrauch von candirtem Ingwer, Magenmorsellen oder Ingwerliqueur auch zu Digestionsstörungen, belegter Zunge, Appetitlosigkeit führen kann, weiss Mancher aus eigener Erfahrung.

Zum internen Gebrauche dient das Pulver zu 0,3—0,6; zum Aufguss für internen Gebrauch rechnet man 1 Th. auf 10 Th. Colatur, für Gargarismen 1:5.

#### Präparat:

**Tinctura Zingiberis, Ingwertinctur.** Mit 5 Th. Spiritus bereitet, braungelb, vom Geruche und Geschmacke des Ingwers. Zu 15—30 Tropfen als Stomachicum.

Der nicht officinelle Syrupus Zingiberis, Ingwersyrup, ist als gewürzhaftes Corrigenes für eine Reihe unangenehm schmeckender Substanzen ausserordentlich geeignet.

#### Semen Myristicae, Nux moschata; Muskatnuss. Oleum Macidis; Macisöl.

Die Muskatnüsse sind die Samen des auf den östlichen Inseln des indischen Archipels einheimischen Muskatnussbaumes, *Myristica fragrans* Houttouyn (*M. moschata* Thunb., *M. aromatica* Lam., *M. officinalis* L. fil.), welcher besonders auf den Banda-inseln (daher die französische Bezeichnung noix de Banda) und auf Amboina zur Gewinnung der als Gewürz geschätzten, vielleicht schon den Römern, sicher den Arabern bekannten Fruchtheile (Samen und Samenmantel) cultivirt wird.

Der zur Familie der Myristiceen gehörige diöcische Baum, welcher in beschränkter Weise auch auf Java, Sumatra, Madagascar, Bengalen u. s. w. cultivirt wird, liefert vom 8. Jahre an reife Früchte, deren Zahl in der besten Lebensperiode (vom 25. Lebensjahre an) über 2000 betragen kann. Die Frucht ist eine einsamige, kugelig-eiförmige, ochergelbe Beere von ca. 5 Cm. Länge. Der in dem trocken fleischigen, zuletzt lederartigen Fruchtgehäuse enthaltene nussartige Samen ist von einem zerschlitzten, fleischigen, karminrothen Mantel (arillus) umgeben, der am Grunde mit der Samenschale und dem Nabelstreifen verwachsen ist. An der Sonne getrocknet, bildet dieser Samenmantel die als *Macis* (Muskatblüthen, Muskatblumen), *Arillus Myristicae* bezeichnete, früher officinelle Droge, welche hornartige, etwas biegsame, aber leicht zerbrechliche, matt fettglänzende, gelbrothe, zerschlitzte Stücke darstellt. Der Samen besteht aus einer glänzend dunkelbraunen, verknöcherten Samenhaut von 1 Mm. Dicke und dem von der inneren Samenhaut bedeckten Kerne, welcher letztere getrocknet und nach längerem Einlegen in Kalkmilch (zur absoluten Zerstörung der Keimfähigkeit, die übrigens schon bei Stägigem Trocknen an der Sonne verloren geht, und zur Verhinderung der Verpflanzung von den Holländern geübtes Verfahren) die Muskatnuss des Handels darstellt. Die Muskatnüsse sind fast kugelig oder elliptisch,  $1\frac{1}{2}$ —2 Cm. lang, unregelmässig gefurcht, netzförmig geadert, zimmetfarbig oder bräunlich, mit einem weissen Pulver von Calciumcarbonat (in Folge des oben angegebenen Verfahrens) bestäubt; im Innern sind sie — in Folge des Eindringens der inneren Samenhaut in langen und schmalen braunen Streifen bis in das Centrum des grauweisen Eiweisses — eigenthümlich marmorirt. Sie lassen sich leicht schneiden und zu einem fettigen, braunen Pulver von aromatischem Geruche und Geschmacke zer-



reiben. Länglichere Samen von viel weniger starkem Aroma, die von *Myristica fatua* Houtt. abgeleitet werden, kommen als *Nuces moschatae masculae* im Handel vor und sind ebenso wie von Insecten angegriffene Muskatnüsse medicinisch nicht verwendbar.

Als wirksamer Bestandtheil der Muskatnüsse ist das in ihnen zu mehr als 6 % vorkommende ätherische Oel, welches dem aus der *Macis* erhaltenen officinellen *Oleum Macidis* sehr nahe steht, zu betrachten.

In den Muskatnüssen ist ausserdem das bereits S. 369 abgehandelte feste Fett enthalten, das fast die Hälfte des Gewichtes ausmacht. Das farblose oder blassgelbliche *Macisöl* besteht vorzugsweise aus einem *Camphen*, *Macen*, das bei 150° siedet, mit Salzsäure Krystalle giebt und mit Salpetersäure und Weingeist kein krystallinisches Hydrat erzeugt, und zum geringeren Theil aus einem bei 221° siedenden sauerstoffhaltigen Oele. Das Muskatnussöl enthält ein ähnliches Terpen (*Myristicen*), das bei 165° siedet und mit Salzsäure keine krystallinische Verbindung liefert, nach Wright ausserdem *Thymol* und einem dem *Carvol* isomeren sauerstoffhaltigen Körper (*Myristicol*).

Nach Versuchen von Mitscherlich erzeugt Muskatnussöl auf der Haut Brennen und in  $\frac{1}{2}$  Std. Röthung wie *Terpenthinöl*. Grosse Kaninchen sterben nach 8,0 in einigen Tagen, nach 24,0 schon in 12–24 St. ohne vorgängige Convulsionen. Der Urin nimmt dabei eigenthümlichen, nicht dem des Oeles entsprechenden Geruch an. Bei Menschen können grössere Dosen Muskatnüsse narkotische Phänomene hervorbringen. Schon nach 2 Stück tritt Summen im Kopfe (Fronmüller) ein, und nach 7 Nüssen sind Uebelkeit, Magenschmerz, Cephalalgie, Pupillenerweiterung, unsichere Sprache. Sinken der Temperatur und der Pulsfrequenz, keuchender Athem und 4 Tage anhaltende Schlafsucht beobachtet (van Bosch). Letzteres Phänomen ist auch von älteren Schriftstellern (*Bontius*, *Cullen*, *Ainslie*, *Pereira*) bestätigt und *Purkyne* verfiel bei Selbstversuchen nach 3 Nüssen sofort in einen traumreichen Schlaf, dem noch eine Zeit lang ein Zustand halber Bewusstlosigkeit folgte. Bei Thieren soll nicht letale Intoxication hartnäckige Obstipation hinterlassen (Mitscherlich).

Therapeutisch finden Muskatnüsse bei Magen- und Darmkatarrhen, Dyspepsie u. s. w., meist nicht für sich, sondern als Adjuvantien und Corrigentien, Anwendung.

Man kann Muskatnuss zu 0,5–1,5 in Pulver oder Pillen geben. Aeussere Anwendung verbietet der theure Preis der Mittel. *Macis* gab man zu 0,3–3 pro dosi. Das *Oleum Macidis* wird mit Zucker verrieben bei Flatulenz, Hyperemese u. s. w. zu 1–3 Tropfen, ausserdem auch, wie Nelken- und *Cajeput-Oel*, als Zahnwehmittel benutzt. Zur Darstellung eines Oelzuckers ist die Verwendung des Oeles weniger gebräuchlich als Verreibung der *Macis* selbst.

Früher war bei Atrophie im kindlichen Lebensalter und Rachitis das Gölische Kinderpulver, *Pulvis Nucis moschatae compositus* s. *antiscrophulosus Goelisia*, sehr beliebt, welches aus *Sem. Myristicae*, *Cornu Cervi ustum*, *Fructus Lauri* aa 1 Th. und *Rad. Liquiritiae* 6 Th. bestand und theelöffelweise gegeben wurde.

#### **Fructus Lauri, Baccae Lauri; Lorbeeren.**

Zu den *Stomachica* gehören auch die Lorbeeren, die Früchte des in Vorderasien einheimischen und schon seit dem Alterthume in den Ländern des Mittelmeeres cultivirten Lorbeerbaumes, *Laurus nobilis* L. (Fam. *Laurineae*), welche jedoch, wie die lederartigen, gelbgrünen Lorbeerblätter, *Folia Lauri*, mehr in der Küche als in der Medicin benutzt werden. Die Lorbeeren enthalten ausser Lorbeerfett (S. 369) ein stark aromatisch und bitter schmeckendes ätherisches Oel (zu 0,2–0,8%), das ein Gemenge von einem *Camphene*, einem dem *Cubebenöle* isomeren Kohlenwasserstoffe und *Laurinsäure* (*Bla s*) oder *Nelken-*

säure (Gladstone) bildet. Das Lorbeeröl ist nicht mit dem aus Guyana stammenden *Oleum Lauri aethereum nativum*, dessen Ursprung von einer Laurinee (*Nectandra cymbarum* Mart.) zweifelhaft ist und welches die Indianer am Orinoco gegen Rheumatismus zu 10—20 Tr. verwenden, zu verwechseln. Man gab Lorbeeren früher in Brodteig gebacken oder im Gölisschen Pulver bei Indigestion und bei Atrophie der Kinder. Auch wurde eine Maceration von Lorbeeren und verschiedenen Labiaten als *Oleum Lauri compositum* bei Rheumatismus und Gicht äusserlich angewendet.

**Cortex Cinnamomi**, *Cortex Cinnamomi Cassiae*, *Cortex Cinnamomi Chinensis*, *Cinnamomum Anglicum* s. *Sinense*, *Cassia cinnamomea*; **Chinesischer Zimmt**, Zimmtcassie. **Oleum Cinnamomi**, *Oleum Cinnamomi Cassiae*, *Oleum Cassiae*; **Zimmtöl**, Zimmtkassienöl.

Mit dem Namen Zimmt oder Kaneel pflegt man verschiedene ostasiatische, als Gewürz schon in den ältesten Zeiten benutzte aromatische Rinden zu belegen, welche von verschiedenen, der Laurineengattung *Cinnamomum* angehörigen Bäumen stammen. Der officinelle Chinesische Zimmt stammt von *Cinnamomum Cassia* Blume s. *Cinnamomum aromaticum* Nees und verdankt Geruch und Wirkung dem in der Ueberschrift genannten ätherischen Oele, welches in der Heimat der Zimmtbäume dargestellt wird, neben welchem Zucker (sog. Cinnamomin von St. Martin), Gummi, Stärkemehl und Gerbsäure in der Droge enthalten sind.

Neben dem Chinesischen Zimmt war früher noch der Ceylonzimmt, *Cortex Cinnamomi Zeylonici* s. *Cortex Cinnamomi acuti* s. *Cinnamomum acutum* officinell, welcher von feinerem Aroma, aber viel theurer als die officinelle Rinde ist und ebenfalls ein ätherisches Oel, das im Wesentlichen dem Zimmtkassienöle gleicht, aber einen noch angenehmeren Geruch besitzt. Derselbe stammt von einer andern Species *Cinnamomum*. *C. Zeylonicum* var. *communis* Nees (*Laurus Cinnamomum* L. s. *Persea Cinnamomum* L.). Dieselbe unterscheidet sich von dem in Annam und der südlichsten Chinesischen Provinz Kuangsi einheimischen, auf den Sunda-Inseln und in Vorderindien cultivirten, durch höheren Wuchs ausgezeichneten *Cinnamomum aromaticum* leicht durch dunkelgrüne, ovale, 3—5nervige Blätter, während letzterer hellgrüne, lanzettliche, 3nervige Blätter hat. Von *Cinnamomum Zeylonicum* var. *subcordata*, mit an der Basis herzförmigen Blättern, stammt Javazimmt, welcher dem Ceylonzimmt am nächsten steht, aber etwas dicker und von schwächerem Geruche und Geschmacke ist.

Neben den genannten Zimmtarten finden sich im Handel noch verschiedene Rinden von geringerem Werthe, welche häufig zur Verfälschung des im Handel vielfach debitirten gepulverten Zimmts dienen. Unter diesen ist die Holzcassie, Malabarzimmt, *Cassia lignea* s. *Xylocassia* s. *Cinnamomum occidentale*, die nicht eben angenehm riechende Rinde einer auf dem indischen Festlande wachsenden baumartigen Varietät von *Cinnamomum Zeylonicum*, *Cinn. Zeylon.* var. *Cassia* Nees (*Laurus Cassia* L.), während als *Cassia vera* aus China stammende Rinden von *Cinnamomum*-Arten (vielleicht die Stamm- und Astrinden von *Cinnamomum aromaticum*) häufig bezeichnet werden. Diese Rinden schmecken mehr schleimig und herbe als scharf und gewürzhaft. Dass auch andere Species von *Cinnamomum* dem Zimmt ähnliche Producte liefern können, beweisen die unter dem Namen *Flores Cassiae* s. *Canelli cinnamomi* früher gebräuchlichen, nicht völlig ausgewachsenen, keulenförmigen Fruchtkelche der in Cochinchina und Japan wachsenden Species *Cinnamomum Loureirii* Nees (*Laurus Cinnamomum Loureiroi*), da dieselben nicht nur wie Zimmt schmecken, sondern sogar zur Darstellung des *Oleum Cassiae* mitbenutzt werden, von dem

sie sogar mehr ( $1\frac{1}{2}\%$ ) als die Zimmtcassienrinde liefern. Dagegen produciren andere Cinnamomum-Arten Oele von ganz differenter Beschaffenheit. So liefern Cinnamomum Culilawan Nees, *C. rubrum* Bl. u. a. m. (Molukken) die Culilawanrinde, *Cort Culilawan* s. *caryophillicoides*, deren Oel an Nelken- und Cajeputöl erinnert und welche in ihrer Heimath als treffliches Adstringens gilt (selbst bei Cholera), Cinnamomum Javanicum Bl. die ähnliche Sintokrinde, *C. Kiamis* Nees (*C. Burmanni* Blume) die Massoyrinde, deren Oel eigenthümlich, etwas wanzenartig riecht u. s. w. Das Oel der Blätter von Cinnamomum Zeylonicum ist dem Nelkenöle nahe verwandt.

Der Ausdruck Kaneel (*canella*, Röhre) ist offenbar nur eine allgemeine Bezeichnung der seefahrenden romanischen Nationen, welche im Mittelalter den Gewürzhandel in Händen hatten, für gewürzhafte, in röhrenförmigen Stücken verschickte Rinden und wird auch andern Rinden, z. B. *Canella alba* s. *dulcis*, s. *Cort. Winteranus spurius* s. *Costus dulcis*, dem früher wie Zimmt gebrauchten Bast der Aeste von *Canella alba* Murray (Antillen), *Canella caryophyllata*, Nelkenzimmt, Nelkenrinde, von *Amomis acris* Bg. (Antillen) beigelegt. Zimmt entspricht dem schon von den Phöniciern und Hebräern gebrauchten Kinnamom und scheint aus dem Singalesischen *kacyn* (Holz) und *nama* (süss) herzustammen. (Flückiger).

Der Zimmtcassie, die Rinde der Zweige oder jüngerer Stämme von Cinnamomum aromaticum, bildet fingerdicke, fusslange Röhren, welche bedeutend fester und stärker (1—2 Mm. dick) als die des Ceylonzimmts und nicht wie letzterer in Lagen über einander gerollt sind. Sie ist innen braun, von bräunlich grauen, wenig rissigem Korke bedeckt oder von letzterem beinahe ganz befreit, von hellbrauner, längsadriger Oberfläche und schmeckt aromatisch ohne schleimigen Beigeschmack.

Das Zimmtöl ist frisch hellgelb, dünnflüssig, dunkelt aber und verdickt sich mit der Zeit, wobei es Krystalle von Zimmtsäure absetzt. Es besitzt einen höchst angenehmen Geruch, schmeckt zuerst süsslich, später gewürzhaft feurig, hat ein spec. Gew. von 1,055—1,065 und löst sich in Weingeist in jedem Verhältnisse. Der Hauptbestandtheil des Oeles ist der Zimmtaldehyd oder Cinnamylwasserstoff, welcher nach Mulder jedoch erst bei der Aufbewahrung sich bildet; derselbe ist ein angenehm riechendes und brennend schmeckendes, farbloses, in Wasser nur wenig, in Weingeist und wässrigem Alkohol leicht lösliches Oel, das sich an der Luft durch Sauerstoffaufnahme rasch in Zimmtsäure verwandelt. In dem braungewordenen Oele findet sich neben dem Zimmtaldehyd und der Zimmtsäure auch ein Gemenge zweier Harze. Bei längerem Stehen der Oele ohne Luftzutritt scheidet sich ein geruchloses Stearopten ab.

Das Cassiaöl hat keine starke Action auf die gesunde Oberhaut, indem es nur schwaches Prickeln und Röthe erzeugt, und wirkt in grösseren Dosen toxisch, indem es zu 24,0 Kaninchen in 5 Stunden tödtet, zu 4,0 mehrtägiges Kranksein und Verstopfung bei denselben bedingt, während welcher Zeit nur wenig Urin entleert wird, der nach dem Oele riecht (Mitscherlich). Es wirkt auch als Ozonträger.

Wir können den Zimmttrinden und dem Zimmtöle keine andere Stellung zugestehen, wie unter den magenstärkenden reizenden Medicamenten. Allerdings schreibt man dem *Cortex Cinnamomi* und den daraus dargestellten Präparaten eine besondere Heilkraft bei Blutungen zu, welche man besonders bei Uterinblutungen constatirt haben will.

Man könnte hier an die Wirkung der Gerbsäure denken, indessen ist der Gerbsäuregehalt nicht bedeutend genug, um nicht dem ätherischen Oele allein die therapeutischen Effecte der Rinde zuzuschreiben. Ob Stillung von Metrorrhagien durch Zimmtpräparate wirklich zu Stande gebracht wird, ist übrigens um so weniger erwiesen, als bei den desfallsigen Beobachtungen gewöhnlich neben dem Zimmt noch andere Präparate, welche auf den Uterus wirken, verabreicht



sind und die Sistirung der Blutung nach dem Gebrauch des Mittels ja an sich noch keineswegs beweist, dass sie die Folge der Einwirkung des Mittels ist. Man bringt dieselbe übrigens meist in Zusammenhang mit Gebärmuttercontractionen, welche der Zimmt hervorrufen soll, bei denen dann natürlich die Gerbsäure als bei der Wirkung unbetheiligt erscheint. Uebrigens darf man nicht vergessen, dass die Einführung des Zimmts in die geburtshülfliche Praxis durch Plenck nicht den Zweck hatte, Blutungen zu unterdrücken, sondern die aus Metrorrhagien hervorgehende Erschöpfung zu beseitigen und dass man daneben der Blutung selbst durch Alaun, Eisenchlorid und analoge Mittel Herr zu werden versuchte.

Seine hauptsächlichste Verwendung findet Zimmt als Geschmacks corrigens für Species und Pulver (hier besonders auch als Vehikel für Eisenpräparate), ferner zum Bestreuen von Pillen. Zimmt dient hauptsächlich zur Darstellung angenehm schmeckender Oelzucker und zum Parfümiren von Zahnpulvern. Zu 5—10 Tropfen  $\frac{1}{4}$  stdl. ist es von Schneider als Mittel gegen Cholera angeblich mit Erfolg benutzt.

### Präparate:

1) **Aqua Cinnamomi**, Aqua Cinnamomi spirituosa s. vinosa; **Zimmtwasser**, weingeistiges Zimmtwasser. Cort. Cinnamomi 1 Th., Spiritus 1 Th., Aq. q. s. zu 10 Th. Destillat. Anfangs milchig trübes, mit der Zeit aber ziemlich klar werdendes, süsslich angenehm, hintennach brennend gewürzhaft schmeckendes und nach Zimmt riechendes Liquidum, das als Constituens bitterer und aromatischer oder eisenhaltiger Mixturen zum inneren Gebrauche und zu 1 bis mehreren Theelöffeln bei Kolik, Magenkrampf und Darmkatarrhen in Anwendung gezogen wird. Es enthält das flüchtige Oel des Zimmts, welches beim längeren Stehen an der Luft zu Zimmtsäure und Harz oxydirt wird. Früher war auch eine mit Wasser bereitete, zu gleichen Zwecken dienende Aqua Cinnamomi s. Aqua Cinnamomi simplex officinell.

2) **Syrupus Cinnamomi**; **Zimmtsyrup**. Cortex Cinnam. 10 Th. mit Aq. Cinnamomi 50 Th. 2 Tage digerirt und filtrirt, in 40 Th. Filtrat 60 Th. Zucker gelöst. Röthlich brauner Syrup, der vorzüglich als Corrigens aromatischer und bitterer flüssiger Mischungen dient.

3) **Tinctura Cinnamomi**; **Zimmttinctur**. Aus 1 Th. Cort. Cinnam. mit 5 Th. Spiritus dilutus bereitet. Die rothbraune, süsslich gewürzhaft und etwas herbe schmeckende Tinctur ist das am häufigsten benutzte Zimmtpräparat, das man als blutstillendes Mittel bei Metrorrhagie zu 20—60 Tropfen  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  stdl. anwendet.

Als Pulvis aromaticus, aromatisches Pulver, war früher eine Mischung von Zimmt 5 Th., Cardamomen 3 Th. und Ingwer 2 Th. officinell, die vorzugsweise als Constituens für Pulver oder als Conspargirpulver für Pillen diente und auch als Stomachicum zu 0,3—1,0 gegeben wurde. Eine rothbraune Tinctur aus Cortex Cinnamomi 4 Th., Fruct. Cardamomi, Caryophylli, Rhiz. Galangae und Zingiberis aa 1 Th. mit 50 Th. Spiritus dilutus bildet die früher ebenfalls officinelle, als Stomachicum zu 20—60 Tropfen mehrmals täglich gebrauchte Tinctura aromatica.

**Anhang:** Ausser den oben erwähnten Theilen verschiedener Cinnamomum-Arten sind noch aromatische Rinden verschiedener anderer exotischer Bäume früher nach Art des Zimmts benutzt. Zu erwähnen ist vor Allem die von Canella alba Murray stammende und aus Westindien bei uns eingeführte Rinde, welche als Cortex Canellae albae oder weisser Zimmt bezeichnet wurde, jedoch einen viel minder angenehmen Geschmack als Zimmt besitzt. Sie heisst auch falsche Winters Rinde, Cortex Winteranus spurius, im Gegensatz zu der von Capitän Wm. Winter 1578 von der Magelhansstrasse nach England gebrachten nelkenähnlich riechenden Rinde des zu den Magnoliaceen gehörenden Baumes Drimys Winteri DC., die gegen Scorbut und Atonie der Verdauungsorgane nach Intermissen in Pulver oder im Infusodecoct

angewandt wurde. Eine andere *Drimys*-Art aus dem nördlichen Südamerika, *Drimys Granatensis*, soll die ebenfalls bei Intermittenten (*Bacchetti*) benutzte Malambo-Rinde liefern, welche neben ätherischem Oele noch Bitterstoff zu enthalten scheint.

#### b. Emetica, Brechmittel.

**Tartarus stibiatus**, *Tartarus emeticus*, *Stibio-Kali tartaricum*; **Brechweinstein**, Antimonykaliumtartrat.

Unter den emetisch wirkenden Substanzen nimmt der 1631 von Adrian von Mynsicht entdeckte Brechweinstein die erste Stelle ein. Seine Wichtigkeit als Medicament wird noch dadurch erhöht, dass er vermöge seines Antimongehaltes auch eine Reihe anderer Wirkungen ausübt, durch welche er namentlich als antifebriles und expectorirendes Medicament sich bewährt.

Der Brechweinstein ist nebst einigen Schwefelverbindungen des Antimons der Rest einer im 17. und 18. Jahrhundert ausserordentlich häufig gebrauchten, zahlreichen Suite von Präparaten des von Basilius Valentinus gegen Ende des 15. Jahrhunderts entdeckten Spiessglanzmetalls oder Antimons. Von Paracelsus dringend empfohlen, wurden die als *Medicamenta spagirica* oder *chymica* bezeichneten Antimonialien von dessen Schülern so viel gebraucht, theilweise auch gemissbraucht, dass die Pariser Facultät auf Betreiben von Riolan 1566 ein Verbot der Spiessglanzmittel durch das Parlament erwirkte. Noch 1603 untersagte die Pariser Facultät dem späteren Leibarzte Jacobs I. und Carls II., Th. Mayerne, die Praxis wegen einer Schrift für die spagirischen Mittel, und selbst bis 1609 kamen Ausstossungen aus der Facultät wegen deren Darreichung vor. Im Jahre 1666 wurde das Verbot des Antimons von der Pariser Facultät zurückgenommen, nachdem schon 1638 das *Vinum stibiatum* in der Pariser Pharmacopoe aufgenommen war. Auch in Heidelberg musste lange Zeit beim Promoviren der Nichtgebrauch der Antimonialien eidlich gelobt werden. Früher gebräuchliche Antimonialien waren vor Allem das Antimonmetall, *Stibium metallicum* s. *Regulus Antimonii*, und das Antimonoxyd, *Stibium oxydatum*. Das erstere wurde zur Darstellung von Bechern (sog. *Pocula emetica*) benutzt, in denen man Wein über Nacht stehen liess, um demselben emetische Eigenschaften zu verschaffen, oder man machte Kügelchen (*Pilulae aeternae*) daraus, die zum Purgiren benutzt und nach stattgehabter Wirkung aus den Stuhlgängen zu weiterem Gebrauche ausgelesen wurden. Das Antimonoxyd bildete in nicht völlig reinem Zustande verschiedene bei den Paracelsisten in Ansehen stehende, jetzt obsolete Formen, wie *Calx Stibii grisea*, *Cinis Antimonii*, *Vitrum Antimonii*, *Crocus metallorum*, *Antimonium diaphoreticum* u. a. m.

Der Brechweinstein, durch Kochen von Kaliumtartrat mit Wasser und Antimonoxyd bereitet, bildet wasserhelle rhombische Octaëder, die an trockner Luft verwitern und undurchsichtig werden, indem sie ihr Krystallwasser verlieren. Sie lösen sich in 17 Th. kaltem und 3 Th. kochendem Wasser zu einer schwach sauer reagirenden und metallisch schmeckenden Flüssigkeit, in welcher Ammoniak und Kali Niederschläge von Antimonoxyd erzeugen. In Weingeist ist Brechweinstein nicht löslich. Wässrige Brechweinsteinlösung wird durch Salzsäure gefällt, doch löst sich der Niederschlag im Ueberschusse der Säure und in einem grossen Ueberschusse mit Salzsäure angesäuertem Wassers wieder auf. In Brechweinsteinlösungen giebt Tannin einen fast unlöslichen Niederschlag von Antimonantannat. Eiweiss fällt Brechweinstein nur bei Anwesenheit freier Säure.

Der Brechweinstein besitzt örtlich reizende und eine besonders auf Herz und Nervencentren, aber auch auf die Respirationsorgane

und bei längerer Zufuhr auf die gesammte Ernährung gerichtete entfernte Wirkung.

Die Resorption des Brechweinsteins kann von allen Schleimhäuten und selbst von der äusseren Haut, wenn letztere durch Brechweinstein in entzündeten Zustand versetzt ist, stattfinden. Die Elimination erfolgt durch Nieren, Leber und Milchdrüsen (Lewald), bei subcutaner Application auch durch die Magenschleimhaut. Ueber die Dauer der Ausscheidung bestehen Differenzen zwischen den einzelnen Beobachtern.

Nach Taylor verschwindet Brechweinstein bei innerer Darreichung in grossen oder wiederholten kleinen Gaben in kurzer Zeit vollständig aus dem Magen und findet sich nur in Leber, Nieren und Milz in grösserer, sowie im Blute in geringerer Menge; nach einigen Wochen ist er auch aus dem Blute völlig und aus den genannten Drüsen bis auf Spuren verschwunden, während sich im Fettgewebe und in den Knochen in dieser Zeit Antimon nachweisen lässt, und ist die völlige Elimination in 20—25 Tagen vollendet. Nach Millon und Laveran findet sich dagegen Antimon noch 4 Monate nach dem Aufhören der Zufuhr in Leber und Eingeweiden.

Im Magen scheint Bildung von Chlorantimon aus Brechweinstein, wie Mialhe annahm, unter dem Einflusse der Chlorüre des Magensaftes nicht stattzufinden; im künstlichen Magensaft wird derselbe bei Körpertemperatur nicht zersetzt (Bellini). Im Darme wirken die dort vorhandenen Alkalicarbonate und Bicarbonate, sowie auch das Schwefelwasserstoffgas zum Theil zersetzend, erstere indess ziemlich langsam, da ausserhalb des Körpers Brechweinstein im Contact mit denselben bei Körperwärme erst in einer Stunde vollständig zersetzt wird. Es scheint somit der Brechweinstein als solcher in das Blut zu gelangen und seine entfernte Wirkung auszuüben. Ob das etwa im Darmcanal gebildete, im Ueberschusse von Alkalicarbonaten lösliche Antimoncarbonat auch theilweise ins Blut übergeht, bleibt unbestimmt.

Auf die unversehrte Oberhaut applicirt, ruft Brechweinstein in concentrirter Lösung, mit grösserer Sicherheit in Salben- oder Pflasterform, nach 24—48 Std. unter wenig intensiven stechenden Schmerzen einen Hautausschlag hervor, welcher gewöhnlich, und nicht mit Unrecht, mit Pockenpusteln verglichen wird.

Es bilden sich anfangs kleine circumscripte Blasen mit eitrigem oder blutigem Inhalte, welche linsen- oder bohnergross werden und, indem ihre Zahl sich mehrt, confluiren. Sie trocknen entweder in braunen Krusten ab, oder platzen und geben zur Entstehung von schmerzhaften bis tief in das Corium eindringenden Geschwüren Veranlassung. Die zwischen den Pusteln belegenen Hautpartien erscheinen heiss und geröthet und sterben bei längerer Einwirkung ab. Die Vernalbung erfolgt langsam; in der Regel hinterbleiben deutlich sichtbare Narben auch nach ziemlich kurzdauernder Brechweinsteineinwirkung.

Bisweilen bleiben bei Unthätigkeit der Hautnerven Brechweinsteineinreibungen ohne sichtbare Folgen, und nach Wiederherstellung der Nervenethätigkeit entstehen mitunter längere Zeit nach geschehener Einreibung Pusteln, Exsudation und Brand (Falck). Bei äusserlicher Anwendung von Brechweinsteinpräparaten kommt es bisweilen zum Auftreten von Pusteln an solchen Körpertheilen, zu denen ursprünglich die Brechweinsteinpräparate nicht gebracht wurden, namentlich an Genitalien, Armen, Schenkeln und Rücken. Das Auftreten dieses Exanthems ist zwar in vielen Fällen Folge von directer Uebertragung mittelst der Finger der Patienten, doch kommt dasselbe nach vollständig verbürgten Beobachtungen (Boeckh, Crichton u. A.) auch nach innerlicher Application grosser Brechweinsteindosen vor, und da wir wissen, dass von der Haut aus, zumal nach entstandener Dermatitis pustulosa, Resorption erfolgen kann, indem sich Erbrechen und Uebelsein nach Einreibung von Brechweinstein-



salbe mitunter einstellen, liegt die Möglichkeit nicht fern, dass das secundäre Exanthem wenigstens mitunter als Eliminationswirkung anzusehen ist.

Wird Brechweinstein (zu 0,2—0,3) in blutende Einschnitte eingerieben, welche mittelst einer Lancette in die Haut gemacht wurden, so resultirt keine Pustelbildung, wenn der Rest des Brechweinsteins in 10 Min. durch Abwaschen entfernt wird. Das Exanthem geht von den Hautfollikeln und Schweissdrüsen aus und scheint mit der sauren Beschaffenheit des Secretes der letzteren im engen Zusammenhange zu stehen. Wird Brechweinsteinsalbe mit Zusatz von Alkalicarbonat eingerieben, so resultirt keine Pustelbildung, während Zusatz von Essig das Auftreten der Hautirritation befördert (Coze). Wird Brechweinsteinsalbe oder conc. Lösung auf Hautstellen applicirt, welche von der Epidermis entblösst sind, so kann es zu noch intensiverer Entzündung als bei Application auf die unverletzte Haut kommen. Aber auch bei öfters wiederholter Anwendung hat man sehr schwere Zerstörungen gesehen, wie z. B. Jacobi (1854) nach Einreibung von Brechweinsteinsalbe auf den Kopf bei Geisteskranken in mehreren Fällen Nekrose und Perforation beider Lamellen der Scheitelsknochen eintreten sah.

In ähnlicher Weise entzündungserregend wirkt Brechweinstein auch auf die Schleimhäute. In sehr grossen Dosen vermag derselbe nicht allein im Magen und Darmcanal hochgradige Entzündung, sondern auch im Munde und Schlunde der Hautaffection analoge Pustelbildung zu erzeugen.

Solche sog. *Aphthae antimoniales*, selbst bis in die Bronchien und in den Magen hinein, sind bisweilen auch nach medicinalen Dosen von Brechweinstein beobachtet (Troschel, Ogier Ward).

Man muss jedoch nicht glauben, dass emetische Dosen Brechweinstein starke Entzündung der Magenschleimhaut bewirken. Nach Handfield Jones tritt bei Katzen und Hunden nach brechenenerregenden Gaben weder Gefässinjection noch Röthung an der *Mucosa ventriculi* hervor, dagegen in geringem Grade nach wiederholten Dosen, wo dann auch schleimige und wässrige Exsudation im Magen und Dünndarm, die zur Abstossung der sonst unversehrten Epithelien führt, erfolgt. Engel sah bei Menschen nach Missbrauch von Brechweinstein *circumscripte* erweichte Stellen im Magen, Schwellung der Follikel mit Geschwürsbildung in Magen, Dünndarm und Dickdarm, besonders im Ileum bei vollkommener Anämie der übrigen Schleimhaut. Die Angabe Bellinis, dass grosse Dosen keine entzündliche Wirkung im Magen und Darm bedingen, bezieht sich wohl nur auf Fälle, wo vermöge rascher Resorption grösserer Mengen starker Collapsus und baldiger Tod erfolgte.

Die Erscheinungen nach innerer Einführung von Brechweinstein gestalten sich nach der Grösse der Gabe verschieden. Sehr kleine Dosen (0,002—0,005) bedingen nur etwas Druck in der Magen-egend und bei wiederholter Anwendung Vermehrung der Secretion des Speichels und Magensaftes. In kleinen Gaben (0,005—0,01) eingeführt, erregt Brechweinstein Druck und Schmerzen in der Magen- und Lebergegend, Uebelkeit, Neigung zum Gähnen, Aufstossen, Brechneigung und häufig wirkliches Erbrechen; daneben zeigt sich Brennen im Halse und Dysphagie, dann folgt Frösteln, später Schweiss und fast immer reichliche wässrige Durchfälle; Mattigkeit und Kopfschmerz, Vermehrung der Pulsfrequenz und Beschleunigung der Respiration sind constant. Werden solche Dosen 3- bis 4stündlich längere Zeit fortgegeben, so legt sich allmählig Uebelkeit und Erbrechen und stellt sich Verlangsamung des Herzschlages mit Verringerung der Intensität des Spitzenstosses und Verminderung des Seitendruckes in den Gefässen, Herabsetzung der

Temperatur, Verlangsamung der Athmung und grosse Schwäche der Musculatur ein. Bei Darreichung dieser Mengen in längeren Intervallen kommt es zu Appetitlosigkeit, Zungenbelag, Empfindlichkeit des Abdomen, breiigen oder dünnen Stuhlentleerungen, Muskelschwäche und Abmagerung (Mayerhofer, Nobiling). Das Bronchialsecret nimmt während dieser Zeit zu (Mayerhofer); die Diurese wird am häufigsten vermindert (Ackermann, Nobiling), seltener vermehrt; auch kann Eiweiss im Urin auftreten (Mayerhofer). Zu 0,03—0,06 erregt Brechweinstein bald Nausea mit nachfolgendem Erbrechen, welchem in den meisten Fällen flüssige Dejectionen folgen.

Bei solchen brechenenerregenden Dosen schwankt der Puls zuerst in kleinen Grenzen bis zum Eintritte der Nausea, steigt dann schnell um ein Bedeutendes und erhält sich unter geringen Steigerungen auf dem Niveau bis zum Eintritte des Erbrechens, erhebt sich mit Auftreten des letzteren sehr bedeutend und noch stärker bei Wiederholung des Erbrechens, fällt dann einige Minuten später schnell, dann wieder, so lange Ekel besteht, langsamer und nach Beendigung der Nausea schneller bis zur ursprünglichen Höhe. Mit der steigenden Frequenz des Pulses nimmt auch seine Kleinheit zu und umgekehrt. Die Athemfrequenz fällt und steigt gleichzeitig mit der Pulsfrequenz (Ackermann).

Bei Wiederholung emetischer Gaben cessirt das Erbrechen meist schon nach der zweiten Dosis und tritt ziemlich rasch der oben beschriebene Zustand der Musculatur, der Gefässe und der Respiration ein; nur in einzelnen Fällen erfolgt keine Toleranz, vielmehr entwickelt sich ausserordentlich heftiges und anhaltendes Erbrechen mit Hyperkatharsis, die zu gefährlichem Collaps führen können. Bei sehr grossen Dosen kommt es zu wirklicher Vergiftung, wobei die localen Reizungserscheinungen des Tractus entweder in grosser Intensität sich geltend machen und hochgradige Prostration zur Folge haben, oder in einzelnen Fällen vollständig fehlen, indem durch rasche Resorption grösserer Mengen von Brechweinstein schleunige Lähmung des Herzens und der Respiration erfolgt. In beiden Formen der Vergiftung ist die Temperatur herabgesetzt, die Haut kalt, feucht und cyanotisch, die Respiration mühsam, keuchend, anfangs beschleunigt, später auf 10 bis 15, ja selbst auf 6 Athemzüge sinkend, der Puls klein, anfangs beschleunigt, später verlangsamt und unregelmässig, daneben bestehen Kopfschmerz, Schwindel, Delirien, Zittern, Verlust des Bewusstseins und bisweilen klonische und tonische Krämpfe.

Zur Behandlung der Brechweinsteinvergiftung bedarf es bei vorwaltendem Ergriffensein der Nervencentren der Entleerung des Magens, am zweckmässigsten durch die Magenpumpe, und ausser symptomatischer analeptischer Behandlung auch eines Antidotes, als welches die Gerbsäure bereits bezeichnet wurde. Abkochungen gerbstoffhaltiger Drogen stehen in ihrer Wirksamkeit der Gerbsäure nach, indem sie Brechweinsteinlösungen nur unvollständig fällen, doch sind Decocte von Galläpfeln, Eichenrinde oder Chinarinde nöthigenfalls zu benutzen (Bellini). Brauchbar sind auch Ferrum sulphuratum hydratum (Bellini) und Magnesia usta. Bei Hyperemese sind Eispillen und Narcotica indicirt.

Versuche an Thieren geben im Wesentlichen dieselben Erscheinungen wie beim Menschen.

Nach Untersuchungen von Ackermann, Lenz, Pécholier u. A. stellt

sich zunächst vermehrte Frequenz des Herzschlages ein, die constant von Verminderung des Blutdruckes begleitet ist, wobei die Höhe der einzelnen Pulswellen steigt und die Diastole sich verlängert; die Abnahme des Seitendrucks dauert auch fort, wenn die Pulsfrequenz nach kurzer Zeit zu sinken beginnt oder der Puls irregulär wird, auch wenn derselbe kurz vor dem Tode wieder frequent wird. Die Athemfrequenz macht dieselben Phasen durch wie die Pulsfrequenz. Sinken der Temperatur (oft selbst um  $6^{\circ}$ ) begleitet die ganze Dauer der Brechweinsteinwirkung bei Thieren. Mit der Einwirkung auf die Respirationsorgane und das Herz verbindet sich bei Thieren auch eine allgemeine Schwäche der Musculatur, Apathie und selbst Tremor. Bei Fröschen, welche ziemlich unempfindlich gegen das Gift sind, das bei ihnen erst zu 0,2—0,3 tödtlich wirkt, findet sich stets nach sehr grossen Dosen Lähmung der cerebros spinalen Centren und vollständige Reactionslosigkeit gegen äussere Reize (Radziejewski). — Werden kleinere Dosen von Brechweinstein bei Thieren längere Zeit eingeführt, so bildet sich, wie auch nach anderen Antimonverbindungen, fettige Degeneration der Leber (Saikowski).

In Bezug auf die Theorie der Brechweinsteinwirkung halten wir es für zweifellos, dass die durch den Brechweinstein bedingte Emese als Reflexerscheinung, hervorgehend aus des Reizung der Magenerven, in specie der Verzweigungen der Vagus, aufzufassen ist und dass die Wirkung überhaupt auf seinem Gehalte an Antimon, dessen entfernte Wirkung in Folge der Leichtlöslichkeit des Brechweinsteins entschieden stärker als bei minder löslichen Antimonialien hervortritt, nicht aber auf dem Kaligehalte beruht.

Hinsichtlich der örtlich reizenden Wirkung auf die Haut kann die eigenthümliche Form der dadurch bedingten Dermatitis, von dem primären Betroffensein der Drüsen abhängig, mit der sauren Beschaffenheit des Secrets dieser Drüsen und dem Umstande, dass unter Anwesenheit einer Säure Brechweinstein Eiweiss coagulirt, zusammengehalten, nicht befremden. Dieses Moment ist auch eine Erklärung dafür zu bieten im Stande, weshalb der Brechweinstein gerade im Magen stärker wirken muss, als an anderen Körperstellen. Eine directe entzündungserregende Wirkung, durch Reizung von Nerven oder Gefässen erklärt (L. Hermann), lässt dies Factum völlig unbeachtet.

Dass bei interner Verabreichung des Mittels bei der brechenerregenden Action die örtlich reizende Wirkung auf die peripherischen Endigungen des Vagus oder der Darmnerven ausschliesslich im Spiele ist, beweist besonders der Umstand, dass im Erbrochenen so viel Antimon sich wieder findet, dass der Brechweinstein, welcher danach im Magen zurückblieb oder zur Resorption gelangte, nicht genügen würde, um subcutan applicirt, brechenerregend zu wirken. Radziejewski constatirte nach innerlichem Gebrauche von 0,06 und 0,12 im Erbrochenen eine 0,04 und 0,11 des Salzes entsprechende Menge Antimon. Es spricht für die locale Action des Medicaments auch ferner, dass man selbst bei directer Einspritzung von Brechweinsteinlösung in die Venen drei- bis fünfmal mehr Tartarus stibiatus nöthig hat, um Brechen zu erzielen, als bei Einführung per os, bei Hunden z. B. 0,5 oder doch 0,35 in ersterem Falle (Gianuzzi; Grimm) gegen 0,1 in letzterem. Es kann deshalb auch hier recht gut Ausscheidung eines Theiles des circulirenden Mittels durch die Magenschleimhaut Ursache des Brechens sein. Dass eine solche Elimination auch bei subcutaner Application oder bei Einspritzung in die Venen stattfindet, ist von Brinton, Taylor, Bellini, Kleimann und Simonowitsch erwiesen. Das Experiment Magendies, dass Brechweinstein auch, wenn der Magen exstirpirt wird, Brechbewegungen bedingt, beweist nicht etwa eine centrale Action, sondern nur, dass auch durch Reizung des Darmes oder Pharynx Brechbewegungen ausgelöst werden können.

Dass nach Wiederholung brechenerregender Gaben eine Toleranz gegen das Mittel sich einstellt, lässt sich dadurch erklären, dass die ursprüngliche Reizung der Nervenendigungen bei grösseren Gaben sich in das Gegentheil, Lähmung, umwandelt und dass die Reflexaction durch Antimonialien herabge-



setzt wird (Radziejewski). Rabuteau glaubt, dass in Folge der an sich gesunkenen Reflexaction bei Pneumonie hier die Toleranz leichter und selbst für grössere Dosen sich einstelle. Die reflexhemmende Wirkung grösserer Dosen ist Folge von Lähmung der Leitung im Rückenmark, nicht von Reizung reflexhemmender Centren des Gehirns (Radziejewski). Die Wirkung auf das Herz tritt auch hervor, wenn Gehirn und Rückenmark abgetrennt werden; der diastolische Herzstillstand wird durch Helleborein in systolischen verwandelt (Soloweitschik). Die von Buchheim und Eisenmenger behauptete direct lähmende Wirkung auf quergestreifte Muskeln ist problematisch. Die Irritation der Magenschleimhaut kann zum Zustandekommen der Herzverlangsamung reflectorisch beitragen, doch ist sie jedenfalls von nebensächlicher Bedeutung, da die Herzwirkung auch ohne Magenirritation (z. B. bei subcutaner Application) stattfindet.

Eine besondere Wirkung auf die Respirationsschleimhaut wird von Radziejewski ziemlich positiv in Abrede gestellt und die weiter unten zu erwähnende therapeutische Thatsache, dass Antimonialien bei Bronchialkatarrhen vorzügliche Wirkung haben, auf die Herabsetzung der Reflexleitung zurückgeführt. Indessen findet sich bei Thieren eine wirkliche Vermehrung der Epithelien auf der Oberfläche der feineren Luftwege.

Die Wirkung auf die Temperatur, welche übrigens keinesweges immer bei Therversuchen sinkt, obschon das Sinken Regel ist, ist auf die Herabsetzung der Respirations- und Pulsfrequenz bei Abnahme des Blutdruckes zu beziehen. Die Abnahme des Körpergewichts bei längerer Zufuhr von Brechweinstein in den weiter unten zu erwähnenden Ekelcuren erklärt sich aus der geringen Aufnahme von Speisen. Nach Boecker wird die Menge der festen Harnbestandtheile mit Ausnahme der Harnsäure unter längerer Zufuhr von medicinalen Gaben Brechweinstein vermindert. Nach Gähtgens steigern Antimonialien beim hungernden Hunde die Harnstoffausscheidung.

Dass die entfernten Wirkungen des Brechweinsteins nicht auf Rechnung des darin enthaltenen Kaliums kommen, wie dies Nobiling (1668) behauptete, geht daraus hervor, dass die Menge Kalium, welche eine brechennerregende Dosis Tartarus stibiatus enthält, so unerheblich ist, dass sie das Befinden des Organismus in keiner Weise alterirt. Natriumbrechweinstein wirkt auf Rückenmark und Circulation genau wie Kaliumbrechweinstein (Soloweitschik) und auf den Tractus kaum schwächer ein; ebenso Antimontartrat, obschon es kein Kalium enthält (Buchheim und Eisenmenger). Auch Radziejewski (1871) zeigte die Gleichheit der entfernten Wirkungen des Antimonchlorürs und anderer Antimonialien mit derjenigen des Tartarus stibiatus.

Hinsichtlich der inneren Anwendung des Brechweinsteins haben wir zunächst der Benutzung als Brechmittel zu gedenken, welche in Fällen, wo die Entleerung des Magens nothwendig ist, berechtigt erscheint.

Die Indicationen des Brechweinsteins sind im Allgemeinen die der Emetica überhaupt. Im Ganzen ist die Wirkung eine ziemlich sichere. Unangenehm erscheint die oft sehr intensive kathartische Wirkung und die Action auf das Herz. Auch erzeugt längere Darreichung leicht Hyperemesis. Der zu befürchtende Collaps nach grösseren Dosen contraindicirt das Mittel namentlich bei schwächlichen Individuen, Kindern und Greisen. Bei Croup ist Brechweinstein deshalb auch meist durch Kupfer- oder Zinkvitriol ersetzt, während er früher oft anfangs als Brechmittel und später in kleineren Dosen in Gebrauch gezogen wurde, welches Verfahren jedoch nicht ohne Gefahr für das Leben der kleinen Patienten war.

In früherer Zeit waren Brechmittel aus Brechweinstein sehr gebräuchlich bei chronischem Magenkatarrh, wo sie in der That manchmal sehr günstig influiren. Hier kann indess der Brechweinstein auch in sehr kleinen Dosen (nach Art der Stomachica wirkend) von demselben Nutzen sein.

Tritt nach Brechweinstein Hyperemese ein, so ist Darreichung von Eispillen allen übrigen Mitteln vorzuziehen, obschon in leichteren Fällen Selterswasser oder Limonade, ja selbst eine Tasse schwarzen Kaffees manchmal das

Brechen stillt. Ausser dem Eis ist Opiumtinctur oder Morphinlösung, in manchen Fällen auch Tannin, bisweilen Aether oder Tinctura Castorei hilfreich.

Abgesehen von seiner Anwendung als Brechmittel ist der Brechweinstein in kleineren Dosen, oder wie man sich auszudrücken pflegt, *refracta dosi*, bei den verschiedensten Affectionen in Gebrauch gezogen worden, vor Allem bei entzündlichen Erkrankungen der Brustorgane (Pneumonie, Pleuritis, Pericarditis) und ähnlichen acuten fieberhaften Krankheiten.

Es lässt sich nicht verkennen, dass der Tartarus stibiatus als antipyretisches Mittel seine Glanzperiode, die in das erste Drittel unseres Jahrhunderts fällt, bereits hinter sich liegen hat und dass die ihm in jener Zeit nachgerühmten Erfolge durch andere Eingriffe und Medicamente sich zweckmässiger erzielen lassen. Nothnagel beschränkt sogar den Gebrauch des Mittels auf Bronchitis acuta, wo der Brechweinstein als indicirt erscheint, wenn entweder bei ganz frischer Bronchitis oder bei Exacerbation eines vorhandenen Bronchialkatarrhs die physikalische Untersuchung nur Schnurren und Pfeifen und fast gar keine feuchten Rasselgeräusche erkennen lässt. Man giebt in solchen Fällen den Brechweinstein zuerst in brechenerregender Dosis und lässt dann kleinere Gaben folgen. In der Pneumonie ist Brechweinstein besonders durch Rasori, später durch Peschier, Laennec, Trousseau und Louis zu Ehren gebracht, bald als Hauptmittel, bald als Unterstützungsmittel des Aderlasses, welchen ja die neuere Medicin bei der Behandlung dieser Krankheit mehr und mehr verbannt hat. Sowohl die physiologischen Wirkungen des Brechweinsteins als die überaus ausgedehnten Erfahrungen am Krankenbette weisen zur Evidenz die herabsetzende Wirkung des Mittels auf Puls und Temperatur nach. Auch lässt sich nicht bestreiten, dass von Pneumonikern manchmal selbst colossale Dosen ertragen werden, ohne auf Magen und Darmcanal schädlich zu wirken. Besonders italienische Aerzte haben den Nachweis geliefert, dass von den in Rede stehenden Kranken selbst Mengen von 1,0—2,5 in 24—48 Std. genommen werden können, ohne dass Erbrechen oder Durchfall oder sonst eine ungünstige Nebenwirkung sich manifestirt. Andererseits ist aber auch nicht zu leugnen, dass durch derartige Dosen in verschiedenen Fällen hochgradiger Collaps mit nachgefolgtem Tode entstanden ist und dass der Nachlass des Fiebers auch durch kleinere Dosen erzielt werden kann. Dass durch Brechweinstein ebensowohl wie durch andere Antipyretica häufig das subjective Befinden des Kranken mit der Verminderung der Fiebersymptome sich wesentlich günstiger gestaltet, ist eine nicht zu leugnende Thatsache. Ob der Brechweinstein vermöge seiner expectorirenden Wirkung vor Veratrin und Digitalis gerade bei Pneumonie einen Vorzug besitzt, muss als eine offene Frage betrachtet werden; sicher ist jedenfalls, dass die Wirkung auf den Organismus eine eingreifendere ist, dass die Nebenerscheinungen beim Tartarus stibiatus gerade bei vorsichtiger Anwendung desselben in kleineren Gaben sich geltend machen und das Mittel trotz angemessener Darreichung in schleimigem Vehikel und unter Zusatz von Opiumtinctur nach einiger Zeit, wie man sich ausdrückt, durchschlägt und wegen eintretender profuser Diarrhoe nicht weiter gegeben werden darf. Auf alle Fälle ist der Brechweinstein auf solche Formen der Pneumonie zu beschränken, welche den acut inflammatorischen Charakter tragen, wo das erkrankte Individuum von kräftiger Constitution ist und anderweitige Complicationen, namentlich Digestionsstörungen, nicht vorhanden sind. Man hat daher diese Art der Behandlung bei Pneumonie älterer Leute und im kindlichen Lebensalter einerseits und bei biliöser Pneumonie andererseits möglichst zu meiden. Es liegen in der Literatur Fälle vor, wo bei Pneumonie der Kinder oder bei der Behandlung von Croup mit verhältnissmässig geringen Dosen von Brechweinstein, welche mehrere Tage hintereinander gereicht wurden, plötzlich Tod durch Herzlähmung eingetreten ist, welche nur durch das gereichte Medicament bedingt sein konnte. Um diesen Unglücksfällen zu entgehen, ist die Wahl eines anderen Antipyreticums für Kinder, wozu sich nach neueren Erfahrungen namentlich die Alcoholica eignen, besonders geboten.

Wenn gegen die Anwendung des Brechweinsteins in der Pneumonie nur die oft aufgestellte und richtige Behauptung angeführt worden ist, welche über-

haupt gegen die antipyretische Methode sich richtet, dass nämlich auch unter expectativer Behandlung genug Pneumonien geheilt werden: so sind gegen die jetzt durch den Gebrauch der Salicylsäure ganz verdrängte Brechweinsteintherapie des Rheumatismus acutus, so wie der Entzündungen seröser Häute, entschiedene Misserfolge seitens verschiedener Aerzte ins Feld geführt. Einzelne Autoren wollen beim Gelenkrheumatismus vom Tartarus stibiatus nur dann Erfolg gesehen haben, wenn derselbe Durchfälle bedingt, während bei Eintritt von Toleranz gegen das Mittel keine erhebliche Besserung erfolgt.

Was für die Pneumonie gilt, findet auch auf sonstige entzündliche Affectionen Anwendung, wo in der Regel örtliche Antiphlogose völlig ausreicht und Allgemeinbehandlung nur bei sehr heftigem Fieber geboten erscheint. Wir nennen aus der Zahl solcher Affectionen, gegen welche man Brechweinstein benutzte, Orchitis, Epididymitis, Bubonen, Metritis, Mastitis, Encephalitis, Anginen und Panaritien. Ob die von Trousseau, Recamier u. A. gerühmten Erfolge gegen Phlebitis und Febris puerperalis wirklich dem Brechweinstein zuzuschreiben sind, muss dahingestellt bleiben. Wir erwähnen hier auch die Anwendung bei Lungenblutungen, wo Trousseau den Brechweinstein empfahl, während er bei Bronchialblutungen keinen Erfolg davon wahrnahm; aber auch bei Pneumorrhagien vermisst man häufig den Erfolg, welchen man besser mit der Herabsetzung des Blutdrucks als mit der Anämie der Lungen in Zusammenhang bringt, die man bei mit Brechweinstein vergifteten Thieren in der Regel beobachtet.

Ferner ist der Brechweinstein in Gebrauch wegen seiner Wirkung auf die Absonderung von Schleimhäuten, insbesondere bei Katarrhen der Respirationsorgane und des Intestinaltractus.

Neben der Verwendung bei Bronchitis acuta und Pneumonie hat der Brechweinstein wie andere Antimonialien auch bei Bronchialkatarrhen mit oder ohne gleichzeitige Veränderung der Lungen (Emphysem, Oedem, Bronchiektasie, Tuberculose), sowie bei Keuchhusten Benutzung gefunden, namentlich in der Form des unten zu erwähnenden Brechweins. In der Regel zieht man hier jedoch nicht so leicht emetisch wirkende Antimonpräparate, namentlich den Goldschwefel, vor. Günstig wirkt Brechweinstein allerdings bei sog. Status pituitosus und biliosus des Darmcanals, jedoch nicht mehr als Calomel oder Rhabarber. Wir gedenken hier der jetzt obsoleten, auf die dem Brechweinstein beigelegte diaphoretische und diuretische Wirkung gestützten Anwendung gegen Albuminurie, Hydrops und Hydrothorax.

Vielfach kam Brechweinstein früher (bald in kleineren, bald in emetischen Dosen) als Sedativum bei Aufregungszuständen, vorzüglich bei Manie, Dementia paralytica, Puerperalmanie, Delirium tremens und im Typhus (Graves), so wie bei krampfhaften Leiden der verschiedensten Art in Anwendung.

Der durch Brechweinstein bedingte Erschlaffungszustand ist allerdings geeignet, in den meisten dieser Zustände den Kranken und dem Arzte Ruhe zu verschaffen, doch muss man gerade hier sich vor outrirter Anwendung hüten, um nicht zu starken Collaps zu bedingen, und z. B. beim Delirium tremens gilt das für die antipyretische Anwendung des Mittels Bemerkte, dass nur robuste Individuen und sog. synochale Formen des Säuerwahnnsinns den Gebrauch indiciren. Wenn Laennec u. A. wiederholte Brechmittel bei Chorea darreichten, so ist dies offenbar eine Verirrung. Die Anwendung des Brechweinsteins bei Epilepsie (Acherley) ist völlig aufgegeben und ebenso hat das Mittel zur Erzielung acuter Muskeler schlaffung bei Luxationen und Contracturen dem Chloroform weichen müssen. Als Antipasmodicum haben namentlich die Geburtshelfer bei Krampfwehen und Tetanus uteri Gebrauch von Brechweinstein gemacht.

Endlich ist noch der Verwendung des Brechweinsteins als alterirendes Mittel zu gedenken, indem man durch längere Darreichung sehr kleiner Dosen die Beseitigung von Hypertrophien und Neubildungen, von Exsudaten u. s. w. in den verschiedensten Organen zu bewirken strebte. Der Tartarus stibiatus



diente in früherer Zeit zu den sog. Ekelcuren, wobei täglich 0,03–0,12 in starker Verdünnung und in getheilten Gaben genommen wurden und die Patienten monatelang sich fortwährend im Zustande der Nausea befanden. Man kann durch diese barbarische Cur indess weder Geisteskrankheiten, noch Lebercirrhose, noch Tuberculose, noch primäre und secundäre Syphilis heilen. Günstig soll eine analoge Cur besonders bei Psoriasis (Danielssen und Boeck) wirken, wobei vielleicht Ausscheidung durch die Haut im Spiele ist. Hieran reiht sich auch der Gebrauch des Brechweinsteins bei Wechselfieber (Moore, Legrand u. A.); man giebt dabei das Mittel entweder als Emeticum, besonders bei bestehendem Magenkatarrh, wodurch nach Pietra-Santa die dauernde Wirkung des später zu reichenden Chinins sicher gestellt wird, oder verordnet es zusammen mit Chinin, oder giebt es für sich, wie namentlich in dem sog. Peysonschen Tranke (mit Lindenblüthenwasser und Opiumsyrup).

Aeusserlich wird Brechweinstein meist in derivirender Absicht in Anwendung gezogen, heute jedoch viel weniger als früher, wo man ihn, z. B. bei Keuchhusten (Autenrieth) und bei Geisteskrankheiten (Keil und Langermann), in übertriebener Weise benutzte. Zur Erzielung topischer Effecte ist er auf der äusseren Haut als destruirendes Medicament (bei Naevus) oder behufs Erregung substitutiver Entzündung (bei Psoriasis, Alopecie), auf Schleimhäuten zur Hervorrufung von Entzündung (z. B. bei unterdrücktem Tripper, bei Maculae corneae) gebraucht. Zu gleichem Zwecke hat man ihn in Fistelgänge, Abscesse, neuerdings auch subcutan in kleine Tumoren gespritzt.

Die externe Application zur Erzielung entfernter Wirkungen, z. B. in Klystir bei Pneumonie (Boling) oder bei Rigidität des Uterus mit Wehenmangel (Young), ist ganz ohne Bedeutung.

Bei der Anwendung des Brechweinsteins als internes Medicament ist die Dosis je nach dem Zwecke, welchen man mit dem Mittel erreichen will, verschieden. Will man entfernte Wirkungen erzielen, so reicht man es in der Regel in kleinen Dosen von 0,005–0,02 mehrere Male täglich, wodurch die Expectoration und die Diaphorese am besten gefördert wird. Will man Nausea ohne Erbrechen erzeugen, so giebt man das Mittel zu 0,01–0,03 stündlich oder 2stündlich. Um Brechen zu erregen, verordnet man 0,02–0,03 alle 10–15 Minuten bis zum Eintritte der Wirkung. Die Pharmakopoe gestattet als höchste Einzeldosis 0,2, als höchste Tagesgabe 0,5.

Starke brechenenerregende Dosen (0,1–0,2) hat man bei Vergiftungen mit narkotischen Substanzen in Anwendung gezogen; in der Regel genügen auch hier 0,05–0,15 zur Hervorrufung der Wirkung. Die Anhänger der Rasorischen Schule benutzen ebenfalls zur Hervorrufung contrastimulistischer Wirkung bei Pneumonie, Rheumatismus grössere Gaben, welche jedoch als gefährlich und häufig durch Collapsus tödtend zu meiden sind. Die von Rasori selbst bei Pneumonie benutzten Einzelgaben von 0,5–1,2 in Gerstenabkochung, zweimal und öfters täglich, sind offenbar unzulässig.

Als Brechmittel giebt man Brechweinstein in Pulvern, Pastillen, Solutionen und Schüttelmixturen, meist nicht allein für sich, sondern in Verbindung mit Ipecacuanha.

Soll das Brechmittel gleichzeitig purgirend wirken, so hat die alleinige Verabreichung von Brechweinstein den Vorzug. Als Vehikel für Pulver lässt sich Pulvis Ipecacuanhae oder Amylum verwerthen. Zu Solutionen löst man

0,02 bis 0,2 in 100,0 Wasser auf. Eine Lösung von 1 Th. Brechweinstein in 120 Th. Wasser wurde früher als *Aqua stibiata*, eine etwa halb so schwache in England als *Liquor Antimonii tartarisi* gebraucht. Statt Wasser lässt sich auch Wein als Vehikel verwenden (vgl. Präparate).

Für den Brechweinstein als antifebriles und expectorirendes Mittel sind dieselben Arzneiformen gebräuchlich; hier setzt man jedoch gern schleimige Mittel oder geringe Mengen eines Opiumpräparates hinzu, um die kathartische Wirkung zu vermeiden und die Resorption des *Tartarus stibiatus* möglichst zu befördern. Bei Ekelcuren hat man die Pillenform benutzt.

Zur Application auf die Haut dient besonders die officinelle Brechweinsteinsalbe, früher auch Brechweinsteinpflaster.

Letzteres lässt sich durch Aufstreuen von pulverförmigem *Tartarus stibiatus* auf fertig gestrichenes Pflaster ersetzen. Auch concentrirte Lösungen in Wasser (1:25) lassen sich zu ableitenden Einreibungen benutzen und in die Haut einimpfen, um Pusteln zu erzeugen oder Muttermäler durch substitutive Entzündung zu beseitigen. Zusatz von Brechweinstein zu *Charta antirheumatica* (Steege) ist völlig überflüssig. Sonstige externe Formen werden sehr wenig benutzt. Dahin gehören Streupulver (bei fungösen Geschwüren), Aetzpasten (mit Wasser angerührt, ebenfalls bei Ulcerationen mit harten Rändern), Suppositorien (0,1 bis 0,3 auf 5,0–10,0 Cacao butter), Verbandwässer und Umschläge (1:100–1000 Wasser) und die verschiedensten Injectionen. Zur Injection in die Urethra zur Hervorrufung unterdrückter Gonorrhoe, ebenso zu emetischen Klystieren rechnet man 0,1–0,3 auf 100,0 Flüssigkeit, zur Infusion in die Venen 0,05 bis höchstens 0,2 auf 50,0–100,0 lauwarmes Wasser. Zur Injection in Balggeschwülste verwendet Krafft-Ebing einige Tropfen einer Lösung von 0,4 Brechweinstein in 10,0 Wasser.

Der Brechweinstein gehört zu den leicht zersetzlichen Präparaten und darf deshalb mit einer grossen Menge von Substanzen nicht zusammen verordnet werden. Besonders zu vermeiden sind Säuren, Gerbsäure, Haloide, kaustische und kohlensaure Alkalien und alkalische Erden, Schwefelmetalle, saure Salze und Alkaloide. Manche Farbstoffe werden durch Brechweinstein verändert, was bei Verordnung mit gefärbten Syrupen in Mixturen zu berücksichtigen ist, indem z. B. Himbeersyrup violett, Veilchensyrup grün wird, ohne dass dabei wesentliche Aenderung der Wirkung erfolgt.

### Präparate:

1) *Unguentum Tartari stibiati*, *Unguentum stibiatum*, *Unguentum Stibio-Kali tartarici*, *Unguentum Autenriethii*; **Pockensalbe**, Pustelsalbe, Brechweinsteinsalbe. Diese Salbe, welche den Namen Autenriethsche Reizsalbe unzuweckmässig führt, da derselbe leicht Verwechslung mit dem ähnlich benannten *Unguentum Plumbi tannici* bedingen kann, wird aus 1 Th. höchst fein gepulvertem Brechweinstein und 4 Th. *Unguentum Paraffini* bereitet. Sie dient als Hautreiz, indem man eine Erbse bis eine Bohne gross 2 Mal täglich bis zum Erscheinen des Exanthems einreibt, nach Art der *Vesicatora*, theils als ableitendes Mittel, theils zur Erzeugung substitutiver Entzündung bei Hautkrankheiten und Muttermälern. Die Anwendung, mit welcher früher namentlich bei Geisteskranken grosser Missbrauch getrieben wurde, indem durch wiederholte Einreibung in den rasirten Scheitel brandiges Absterben der *Galea aponeurotica* und selbst Nekrose der Schädelknochen resultirte, ist an Stellen zu vermeiden, welche unbedeckt getragen werden, da einzelne sichtbare Narben stets zurückbleiben. Schwächere Salben, wie das *Unguentum stibiatum Ph. pauperum*, sind unzuweckmässig, da die Erzeugung der Pusteln danach weit langsamer eintritt.

Früher war auch *Emplastrum Tartari stibiati*, Brechweinsteinpflaster, mit *Emplastrum Lithargyri compositum* oder *Ceratum Resinae Pini* bereitet, viel gebraucht. Je nach der Menge der Pflastermasse, die bald das Dreifache, bald das Siebenfache des Brechweinsteins betrug, und nach der Kleb-

fähigkeit ist die Wirkung mehr oder minder intensiv, aber immer rascher und energischer als die der Brechweinsteinsalbe und nach 6—8tägiger Anwendung von solcher Intensität, dass nach Krahmer der Anblick der Haut bei sensibeln Personen nervenerschütternd wirkt. Jedenfalls sind die allgemeinen Contraindicationen der Exutorien beim Brechweinstein ganz besonders zu beachten und der Gebrauch des Unguentum oder Emplastrum Tartari stibiati bei kachektischen Personen unter allen Umständen zu meiden.

2) **Vinum stibiatum**, Vinum emeticum, Vinum Stibio-Kali tartarici; Brechwein, Spiessglanzwein. Das Präparat bildet eine filtrirte Auflösung von 1 Th. Brechweinstein in 250 Th. Xeres, ist klar und von braungelber Farbe. Der von Huxham (gest. 1768) eingeführte und auch noch jetzt als Vinum Antimonii Huxhami bezeichnete Brechwein, welcher die alte Aqua benedicta Rulandi ersetzte, lässt sich zu 10—15 Tropfen mehrmals täglich als Diaphoreticum und Expectorans bei Erkältungskrankheiten oder esslöffelweise, bei Kindern theelöffelweise alle 5—10 Min. bis zum erfolgten Erbrechen als Emeticum geben. Man reicht ihn meist in Verbindung mit Expectorantien oder brechenenerregenden Mitteln, namentlich mit Syrupus Ipecacuanhae.

#### Verordnungen:

- |  |  |
|--|--|
| <p>1) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Tartari stibiati</i> 0,01<br/> <i>Amyli</i> 0,5<br/> <i>M. D. S.</i> Brechpulver für ein Kind.</p> <hr/> <p>2) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Tartari stibiati</i> 0,15<br/> <i>Tartari depurati</i> 2,0<br/> <i>M. f. pulv. D. S.</i> Auf 2—3 Mal zu geben, bis Erbrechen erfolgt (<i>Pulvis e Tartaro stibiato s. emeticus Ph. mil.</i>)</p> <hr/> <p>3) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Tartari stibiati</i> 0,1<br/> <i>Natrii nitrici</i> 4,0<br/> <i>Macerati rad. Althaeae</i> 175,0<br/> <i>Syrupi Liquiritiae</i> 20,0<br/> <i>M. D. S.</i> Zweistündlich einen Esslöffel voll. (Bei Bronchitis acuta, Pneumonie).</p> <hr/> <p>4) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Tartari stibiati</i> 0,25<br/> <i>Extracti Opii</i> 0,1<br/> <i>Aq. destillatae</i> 175,0<br/> <i>Syrupi simplicis</i> 25,0</p> | <p><i>M. D. S.</i> Stündlich einen Esslöffel voll. (Bei Delirium tremens).</p> <hr/> <p>5) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Tartari stibiati</i><br/> <i>Extracti Opii</i> aa 0,05<br/> <i>Tragacanthae</i> 1,0<br/> <i>Aq. florum Aurantii</i> 10,0<br/> <i>Aquae destillatae</i> 200,0<br/> <i>M. D. S.</i> 1—2stdl. 1 Esslöffel voll. (Bei Bronchitis, Intermittens u. s. w.)</p> <hr/> <p>6) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Tartari stibiati</i> 0,25<br/> <i>Pulveris radicis Rhei</i><br/> <i>Saponis medicati</i><br/> <i>Galbani dep.</i><br/> <i>Sagapeni dep.</i> aa 0,12<br/> <i>Succi Liquirit. dep.</i> 5,0<br/> <i>F. c. Aq. dest. q. s. pilul. No. 90.</i><br/> <i>Consp. pulv. sem. Myristicae. D. S.</i><br/>         2—3 Mal täglich 12—15 Pillen, bis Uebelkeit eintritt. (Zu Ekelcuren früher beliebt. <i>Pilulae resolutives Schmuckeri.</i>)</p> |
|--|--|

#### Radix Ipecacuanhae; Brechwurzel, Brechwurz.

Die Einführung der Wurzel der in Brasilien, Peru und Neu-Granada einheimischen *Cephaëlis Ipecacuanha* Willd. s. *Cephaëlis emetica* Persoon, eines Halbstrauches aus der Familie der Rubiaceen, in die Praxis europäischer Aerzte durch Helvetius (um 1680) ist zu den Epoche machenden Daten in der Geschichte der Materia medica zu zählen, da man dadurch nicht bloss, wie man anfangs meinte, ein vortreffliches Mittel bei Ruhren



und Durchfällen, sondern auch ein Brechmittel erhielt, das in Hinsicht seiner geringen Beeinflussung des Gesamtorganismus alle bis dahin bekannten Emetica übertraf.

Schon 1648 von Wilhelm Piso beschrieben und als Mittel gegen die Ruhr gerühmt, gelangte die Ruhr- oder Brechwurzel 1672 durch Le Gras zuerst nach Frankreich, wurde aber erst allgemein durch Helvetius Lobpreisungen und den Ankauf des Ruhrmittels durch Ludwig XIV. bekannt. Zur Verbreitung desselben trugen namentlich H. Sloane und der berühmte Philosoph Leibnitz bei. Die Wichtigkeit des Medicaments erhellt daraus, dass man neuerdings Acclimationsversuche in Ostindien gemacht hat. Die Droge, welche meist aus der brasilianischen Provinz Matteo Grosso zu uns kommt, besteht aus den verdickten Mitteltheilen der Wurzelfasern und bildet mehrere Zoll lange, 3—5 Mm. dicke, nach oben und unten verschmälerte, wurmförmig gekrümmte Stücke von dunkel- oder hellgrauer oder brauner Farbe, ausgezeichnet durch ringförmige oder halbkreisförmige, ungleiche, in kurzen Abständen von etwa 1 Mm. auf einander folgende Wülste, sowie durch feine Längsstreifen. Sie bricht kurz und körnig, nicht fasrig. Die allein medicinisch wirksame Rinde ist weissgrau, hornartig, von dem dünnen, hellgelblichen Holzcyliner leicht trennbar und besteht aus dünnwandigen, reich mit Stärkmehl gefüllten Zellen; sie macht etwa 75 % des Ganzen aus. Die Brechwurzel hat einen eigenthümlich widrigen, dumpfen Geruch und schmeckt ekelhaft bitter. Verschiedene nach der Farbe der Oberhaut unterschiedene Handelssorten (braune, röthlich-graue und weisslich-graue Brechwurzel) scheinen in ihrer Wirkung nicht besonders zu differiren. Dagegen fanden sich früher in der *Ipecacuanha* bisweilen Beimengungen anderer Wurzeln, welche in Hinsicht ihrer emetischen Wirksamkeit der echten Brechwurzel nachstehen. So von sog. *Ipecacuanha nigra* s. *striata* (Wurzel von *Psychotria* s. *Ronabea emetica*, mit schwärzlich-brauner Oberfläche ohne ringförmige Erhabenheiten, aber mit Längsrünzeln und Querspalten), ferner von der als *I. farinosa* s. *alba* s. *amylacea* bezeichneten Wurzel von *Richardsonia scabra* (mit aussen graubrauner, längsrünzeliger, innen weisser, mehligter Rinde) und von der *Ipecacuanha alba lignosa* von *Ionidium Ipecacuanha* (mit vorwaltendem Holzkern). Alle diese falschen *Ipecacuanha*-Arten sollen dasselbe active Princip wie die echte enthalten, jedoch in 3—4fach geringerer Menge. Wirkungsgrad und Abstammung der von Vogl (1867) beschriebenen Verwechslungen *I. rhodophloea*, *glycyphloea* und *cyanophloea* sind unbekannt. Die Bezeichnung *Ipecacuanha* soll in der Tupi-Sprache brechen-erregendes Unkraut bedeuten (Martius).

Der die Brechwirkung bedingende Bestandtheil der Brechwurzel ist das 1821 von Pelletier und Magendie rein dargestellte, in der Rinde vorzugsweise enthaltene Alkaloid Emetin. Ausserdem enthält die Brechwurzel eine von Pelletier irrthümlich als Gallussäure betrachtete, der Kaffeegeersäure und Chinasäure nahestehende, glykosidische Gerbsäure, die *Ipecacuanhasäure*, welche neben dem Stärkmehl für die Bedeutung der Droge als Ruhrmittel und für den Umstand, dass die Brechwurzel kein Purgiren bedingt, sondern ein reines Emeticum ist, während das Emetin auch Durchfälle erzeugt, gewiss als wichtig anzusehen ist.

Das Emetin, welches nach Pelletier in der echten Brechwurzel zu 0,68 bis 0,78 %, nach Zenoffskys verbesserter Methode zu mehr als 3 % vorkommt, ist ein weisses, unkrystallinisches, geruchloses Pulver von bitterem Geschmacke, welches sich leichter in Weingeist als in Wasser, kaum in Aether löst und mit Säuren neutrale, unkrystallisirbare, meist leicht in Wasser lösliche, scharf und bitter schmeckende Salze bildet. Die *Ipecacuanhasäure* ist eine amorphe, röthlich-braune, hygroskopische und stark bitter schmeckende Masse, welche sich leicht in Wasser löst, mit Eisenoxydsalzen grün und an der Luft in alkalischer Lösung dunkelschwarzbraun färbt (Willigk).

Die *Ipecacuanha* und das Emetin stimmen in ihren Beziehungen zum Organismus ziemlich genau mit dem Brechweinstein überein, indem sie bei Application auf die äussere Haut ebenfalls einen Hautausschlag bedingen und bei innerlicher Einführung in nicht zu kleinen Dosen Brechen erregen, welches auch nach subcutaner Application oder nach Infusion in die Venen, jedoch erst nach grösseren Dosen, hervortritt, weshalb auch von der *Ipecacuanha* anzunehmen ist, dass das durch dieselbe bedingte Erbrechen reflectorisch zu Stande kommt. Letzteres ist um so wahrscheinlicher, als neuere Versuche die Abscheidung von Emetin durch die Magenschleimhaut nach subcutaner Einführung constatirt haben (D'Ornellas). Von der Brechweinsteinwirkung unterscheidet sich die Action der *Ipecacuanha* durch ihre geringere Intensität, welche sich sowohl bezüglich der Einwirkung auf die Haut als hinsichtlich der Wirkung auf den Tractus digestivus, indem nicht allein die Magenschleimhaut weniger behelligt wird, sondern auch die nach Brechweinstein regelmässig eintretende Katharsis in den meisten Fällen ausbleibt. In gleicher Weise verhalten sich auch die entfernten Erscheinungen, insofern die Circulation und die Herzthätigkeit durch die Brechwurzel weniger beeinflusst werden und selbst nach relativ grossen Dosen kein solcher Collapsus wie nach toxischen Gaben von *Tartarus stibiatus* eintritt.

Einreibung von Brechwurzpulver mit Fett bedingt auf der Haut Auftreten kleiner, in Gruppen gestellter, stark brennender und juckender Pusteln, die in der Regel mit einem grossen Hofe umgeben sind und ohne Narbenbildung heilen; bei fortgesetztem Einreiben kann es zu schmerzhaften Ulcerationen mit dauerhafter Narbenbildung kommen. Die Wirkung tritt nicht hervor auf Hautstellen, wo kurz vorher Vesicatore gelegen haben, auch nicht nach Lösungen von Emetin in Essigsäure (Duckworth). Werden Pulvis *Ipecacuanhae* oder Emetin auf die Conjunctiva gebracht, so resultirt heftige Entzündung der Bindehaut und Hornhaut, erstere mit Oedem verbunden. Auch auf Wundflächen und der Präputialschleimhaut erzeugt Emetin starke Irritation. Erbrechen tritt bei dieser Applicationsweise nicht auf (Turnbull, Duckworth). Alkoholische Emetinlösung bewirkt heftig brennende Empfindung im Munde und an der Zungenspitze, welche erst nach einigen Stunden sich verliert. Auf der irritirenden Einwirkung des Emetins beruhen auch die häufig auf Apotheken beobachteten Erscheinungen von Schleimhautentzündung nach dem Pulvern von *Ipecacuanha*, welche in seltenen Fällen die Conjunctiva (Thamhayn), meist die Respirationsschleimhaut betreffen und sich in letzterem Falle in Folge von Anschwellung derselben in Form intensiver Erstickungsanfälle mit grosser Angst und Lividität des Gesichtes darstellen.

Kleine Dosen von 0,01–0,05 Pulv. *Ipecacuanhae* haben beim Menschen nach Einführung in den Magen in der Regel keine wahrnehmbare Veränderung des Befindens zur Folge und bedingen nur bei einzelnen Individuen Gefühl von Druck im Magen und etwas Uebelkeit; auch soll danach bisweilen Gähnen, Speichelfluss und selbst Vermehrung der Schweisssecretion sich einstellen. Meist steigert sich nach solchen Gaben der Appetit, und erst nach öfterer Wiederholung derselben kommt es zur Abnahme der Esslust. Sehr reizbare Personen erbrechen schon auf 0,05 *Ipecacuanha*, während bei der Mehrzahl mindestens 0,3, bei vielen Personen sogar 1,0–1,5 Brechwurzpulver zur Hervorrufung von Emese nothwendig sind. Reines Emetin wirkt schon zu 0,004–0,01 emetisch. Das durch *Ipecacuanha* hervorgerufene Erbrechen folgt in der Regel auf ein Stadium starker Nausea. Die dabei hervortretenden Veränderungen der Circulation und Respiration sind nach Versuchen von Ackermann von der Art, dass zunächst Schwanken der Pulsfrequenz mit vorwaltender Tendenz zum

Sinken, dann mit dem Eintritte des Ekels Steigen derselben bis zu einer beträchtlichen Höhe und weiteres Steigen nach dem Eintritte des Erbrechen, hierauf schnelles Sinken nach vollendetem Erbrechen, dann wieder allmähliges Sinken bis zum Ende des secundären Ekels und schliesslich continuirliches Sinken bis ein wenig unter die vor dem Versuche beobachtete Normalzahl stattfindet. Das Steigen der Pulsfrequenz mit dem Eintritt des Ekels ist bedeutender, das mit dem Eintritt des Erbrechen verbundene Steigen weniger bedeutend als beim Brech Weinstein. Die Grösse des Pulses steht zu der Frequenz desselben in umgekehrtem Verhältnisse; die Athemzahl ist proportional zur Pulsfrequenz, wird aber relativ nie so gesteigert wie der Puls und bleibt wie letzterer in der absoluten Höhe hinter der durch Brech Weinstein bedingten Steigerung erheblich zurück (Ackermann). Die relativ mildere Wirkung der Wurzel auf den Tractus ergibt sich auch daraus, dass in der Regel nach emetischen Dosen das Erbrechen nur ein-, höchstens zweimal sich wiederholt.

Versuche an Thieren lehren, dass bei Hunden und Katzen schon durch sehr kleine Mengen von reinem Emetin (0,002—0,005) Erbrechen hervorgerufen wird und dass bei innerer Anwendung von 0,025 Kaninchen und Katzen, letztere trotz Entfernung einer grossen Menge des eingeführten Giftes durch das stattgehabte Erbrechen, getödtet werden. Der Tod erfolgt unter den Erscheinungen von grosser Muskelschwäche und Collapsus, nach Sinken der Temperatur; post mortem findet sich in der Regel heftige Gastroenteritis, welche auch bei subcutaner Einführung von Emetin in ausgeprägter Weise sich zeigt; in einzelnen Fällen protrahirter Vergiftung kommt Lungenentzündung vor. Diese Erscheinungen resultiren sowohl nach innerlicher und subcutaner Einführung als nach Einspritzung in die Venen, in die Pleurahöhle und den Mastdarm. Das Verhalten von Puls, Respiration und Temperatur ist bei diesen Vergiftungsversuchen an Thieren verschieden, indem bisweilen constantes Sinken des Herzschlages und der Athemzüge, in anderen Fällen Steigen der Respiration erfolgt; manchmal kann auch die Temperatur im Rectum steigen, während die äussere Temperatur stark gesunken ist. Grosse Dosen bewirken steilen Abfall des Blutdrucks ohne Betheiligung des Vagus (Podwyssotzki). Bei Fröschen bedingt Emetin zuerst Hirnlähmung, dann Lähmung der Reflexaction; die Muskelirritabilität und die elektrische Reizbarkeit der Nerven werden nicht durch Emetin vernichtet (Podwyssotzki). Directe Application von Emetinlösung auf das blossgelegte Froschherz retardirt und sistirt die Herzaction rasch. In der Leber fehlt die Glykose (Pécholier). Nach Rutherford (1879) bedingt Ipecacuanha zu 2,0—4,0 beim Hunde starke und längere Zeit anhaltende Vermehrung der Gallensecretion bei gleichzeitiger Zunahme des Darmschleims.

Dass das durch Emetin bedingte Erbrechen auf Reizung der Vagusendigungen beruht, beweist auch der Umstand, dass das Eintreten derselben durch Vagusdurchschneidung in der Regel verhindert wird (Pécholier, D'Ornellas). Nach Dragendorff und Pander findet Elimination des Emetins ausser durch die Magenschleimhaut auch durch die Nieren statt; dagegen konnte Podwyssotzki das Alkaloid in keinem Secrete constatiren.

Auch die therapeutische Anwendung der Ipecacuanha schliesst sich eng an die des Brech Weinstein an. Bis in die neueste Zeit war die Brechwurzel das beliebteste aller Emetica, welches auch besonders bei Kindern, Frauen, Greisen und schwächlichen Personen vor dem Brech Weinstein verschiedene Vorzüge besitzt, während es bei kräftigen Individuen meist mit Tartarus stibiatus zusammen in Anwendung gebracht wird. Das Ausbleiben von Collapsus und Hyperkatharsis nach gewöhnlichen Dosen Ipecacuanha sichert dem Mittel seine Vorzüge vor dem Brech Weinstein.

Das Fehlen von Durchfällen nach dem Gebrauche von Ipecacuanha ist nach meinen Erfahrungen nicht auch in gleicher Weise dem Emetin eigen. Die Ipecacuanha ist das Brechmittel, welches ganz besonders zum Coupiren acuter Krankheiten von älteren Aezzten gebraucht wurde. Wie ausgedehnt seine Benutzung in dieser Richtung ist, lehrt die Empfehlung des Mittels durch Higgin-



bottom (1869), wonach dasselbe sich bei Cholera nostras, im Beginne des Typhus und Erysipelas (mit Höllestein), bei Bronchitis (nicht nur im Anfange, sondern auch bei plötzlich auftretender Oppression der Brust und Erstickungsanfällen), bei Tic douloureux (zur Vorbereitung der Wirkung von Chinin und Eisen), bei periodischer Trunksucht und Delirium tremens, bei hartnäckiger Indigestion und Intestinalreizung, bei Erschöpfung im Wochenbett (!), bei Marasmus senilis und Syncope senilis in Folge gastrischer Reizung, bei Metrorrhagie, endlich selbst in hartnäckigen Fällen von scrophulöser Augenentzündung bewährt. Diese Liste schliesst übrigens eine Anzahl von Krankheiten ein, gegen welche die Ipecacuanha auch in kleineren Dosen Anwendung gefunden hat, liesse sich jedoch noch um eine grosse Anzahl von Krankheitsnamen bereichern, da fast sämtliche entzündliche und fieberhafte Krankheiten, von Wechselfieber und Anginen an bis zu den Bubonen, in früherer Zeit durch Brechmittel coupirt oder doch zu coupiren versucht wurden. Was die Anwendung der Brechwurzel bei Vergiftungen, wo sie jetzt durch Apomorphin in den meisten Fällen ersetzt wird, anlangt, so passt dieselbe und noch besser das Emetin besonders da, wo Zinkvitriol und Kupfervitriol eine Zersetzung durch das Gift erleiden, während im Allgemeinen Ipecacuanha, weil sie langsamer wirkt, den kaustisch wirkenden Emetica nachsteht. Dass das Coupiren von Typhus, das von Aerzten früher vielfach behauptet wurde, meist auf ungenügender Diagnose beruhte, wobei acuter Magenkatarrh mit Typhus verwechselt wurde, darf als ausgemacht gelten. Dass Haemorrhagien unter dem Gebrauche eines Emeticums oft stehen, ist ein Factum, ob das Verfahren aber wirklich stets ohne Gefahr ist, steht dahin. Sehr gut bewährt sich oft ein Brechmittel aus Ipecacuanha bei acuten dyspnoischen Anfällen.

Als Antipyreticum kann Brechwurzel nach Anleitung der physiologischen Versuche nicht von Bedeutung sein, dagegen schliesst es sich dem Tartarus stibiatus als Expectorans nahe an und lässt sich namentlich bei Bronchitis acuta im kindlichen Lebensalter und bei schwächlichen Personen, sowie bei verschiedenen anderen Lungenaffectionen an Stelle desselben verwerthen.

Exacerbationen chronischer Bronchialkatarrhe mit Schwellung der Schleimhaut, Dyspnoe, Cyanose und Fieber (sog. Catarrhus suffocativus) weichen unter dem Gebrauche häufiger kleiner Gaben oder nach einer einzigen grösseren. Selbst bei subacutem und chronischem Katarrh der Luftwege mit zähem Secret kann sie mit Vortheil gegeben werden. Bestehende Tuberculose contraindicirt den Gebrauch keinesweges. Bei eigentlich spasmodischem Asthma nützt ein Brechmittel aus Ipecacuanha selten, noch weniger kleine Dosen.

Ihren alten Ruf als Ruhrwurzel, wie sie geradezu genannt wurde, hat dieselbe noch keinesweges völlig eingebüsst und noch neuerdings sind aus den Tropengegenden wiederholte Empfehlungen des Medicaments laut geworden. Man giebt sie dort meist in grossen, brechenerregenden Dosen (1,2 zweimal täglich), wobei man durch Zusatz von Opium das Brechen selbst verhütet, während sich bei uns die kleinen Gaben mehr bewährt und eingebürgert haben. Sie ist hier nicht allein in späteren Stadien anwendbar, wie von Einzelnen behauptet wird, sondern auch im Anfange der Krankheit, und dasselbe gilt auch bezüglich der Anwendung gegen Darmkatarrh überhaupt, wo sie am meisten bei der auf Erkältung beruhenden acuten Diarrhoe in Ansehen steht.

Die in der ärztlichen Praxis übliche Verbindung mit Opium (z. B. im Pulvis Ipecacuanhae opiat) hat manche Pharmakologen an der Wirkung der Brechwurzel als durchfallbeschränkendes Mittel zweifeln lassen, jedoch mit Unrecht. Der Grund für die stopfende Wirkung der Ipecacuanha liegt in ihrem

Gehalt an Stärkmehl und Gerbsäure, deren Leichtlöslichkeit in Wasser den Grund dafür abgibt, dass Aufgüsse viel besser als Pulver wirken. Für die Ansicht Rabuteaus, dass Emetin im Darm purgirend, vom Blute aus verstopfend wirke, spricht nicht die Spur einer Thatsache. Minder gebräuchlich ist die Anwendung gegen chronischen Magenkatarrh und Dyspepsie, doch sind auch hier kleine Dosen oft von eclatantem Nutzen, und gar nicht selten beseitigen dieselben auch Folgeerscheinungen häufiger wiederholter gastrischer Störungen (Kopfschmerz, Hemicranie) gründlich. Bezüglich der Dyspepsie rath Budd sie besonders bei Personen von sitzender Lebensweise, wo nach dem Essen unbehagliches Gefühl und Völle im Magen sich einstellt, an. Bei asiatischer Cholera hat Ipecacuanha sehr variable Resultate ergeben.

Alle übrigen Anwendungen der Ipecacuanha sind von geringerer Bedeutung. Bei der herabsetzenden Wirkung der Ipecacuanha auf die Reflexerregbarkeit ist es nicht irrationell, dieselbe gegen krampfartige Zustände zu benutzen; doch ist sie vorwaltend nur bei Krampfwehen, sehr selten bei Epilepsie u. a. Leiden benutzt. Ueberhaupt hat Ipecacuanha den Geburtshelfern hier und da sehr imponirt und Trousseau giebt sogar an, bei allen Affectionen Neuentbundener im Hôtel Dieu nach Vorgang von Récamier Ipecacuanha (in emetischer Dosis) mit grossem Erfolge benutzt zu haben.

Als äusserliches Reizmittel wird Ipecacuanha fast gar nicht verwendet.

Die Dosis der Ipecacuanha richtet sich nach dem Zwecke, welchen man zu erreichen beabsichtigt. Will man Brechen erregen, so giebt man 0,5—1,0—2,0 alle 10—15 Minuten; will man nur Nausea bedingen, so genügt die Darreichung von 0,06—0,3 in mehrstündlichen Intervallen; zur Erzielung von Diaphorese, Stypsis u. s. w. genügen 0,01—0,06 pro dosi.

Als Brechmittel giebt man Radix Ipecacuanhae am häufigsten in Pulverform oder in Schüttelmixtur, seltener im Aufguss (1,0—5,0 auf 150,0 Colatur), in allen diesen Formen meist in Verbindung mit Brechweinstein. Zu Brechpulvern nimmt man zweckmässig gleiche Mengen Amylum.

Als Expectorans oder als Mittel gegen Diarrhöen kann man die Brechwurzel in Pulverform oder zweckmässiger im Aufguss (0,5—1,0 auf 150,0—200,0 Colatur, esslöffelweise in mehrstündigen Intervallen) verwenden; auch hier combinirt man sie gern mit ähnlich wirkenden Mitteln.

Bei Diarrhöen ist auch der Aufguss (0,5—1,0 auf 100,0 Colatur) im Klystier angewendet. Die Benutzung zu reizenden Streupulvern oder zu irritirenden Salben (1:5 Schmalz und 1 Baumöl) hat keine besondere Bedeutung.

Das Emetin ist nicht officinell. Man kann es als Brechmittel zu 0,004 bis 0,008 in Pulverform oder Lösung geben, als Expectorans und Antipyreticum bei Lungenentzündung zu 0,001—0,002. Die subcutane Application behufs Erzielung von Emese ist zweckmässig, weil sie grössere Dosen erfordert und leicht örtliche Abscedirung veranlasst. Immer ist das reine Emetin zu benutzen, und nicht das früher oft als Emetinum impurum oder coloratum bezeichnete gereinigte alkoholische Brechwurzelextract, Extractum Ipecacuanhae, welches von Magendie, Klinsmann u. A. zu 0,01—0,03 als Emeticum empfohlen wurde, übrigens in seiner Wirkung sehr inconstant ist und selbst in erheblich grösserer Dose manchmal ohne Wirkung bleibt.

### Präparate:

1) **Tinctura Ipecacuanhae; Brechwurzeltinctur.** Macerationstinctur, mit 10 Th. Spiritus dilutus bereitet, röthlich-braun und bitterlich. Dient ausschliesslich als Zusatz zu stopfenden, expectorirenden und krampfstillenden Mixturen; als Brechen erregende Dosis müssten mehrere Gramm gegeben werden.

2) **Vinum Ipecacuanhae, Tinctura Ipecacuanhae vinosa; Brechwurzelwein.** Durch 8tägige Maceration mit 10 Th. Vinum Xerense, Auspressen und Filtriren

bereitet; klar, gelbbraunlich. Theelöffelweise bei Kindern als Brechmittel; zu 10–30 Tropfen als Expectorans oder bei Durchfällen. Mit ätherischer Baldrian-tinctur, Tr. Opii crocata und Pfefferminzöl bildet das Präparat die Lorenz-schen Choleratropfen.

3) **Syrupus Ipecacuanhae; Ipecacuanhasyrup.** Bereitet durch 2 tägige Mace-ration von 1 Th. Brechwurzel mit 5 Th. Spiritus dilut. und 40 Th. Aq. destill. und Lösen von 60 Th. Zucker in 40 Th. Colatur, so dass 100 Th. etwa 1 Th. Ipecacuanha entsprechen; von gelblicher Farbe. Esslöffelweise als Emeticum, meist als Zusatz zu emetischen, expectorirenden und stopfenden Mixturen.

Die früher officinellen Trochisci Ipecacuanhae, Brechwurzelzeltchen, Ipekaplätzchen, aus Brechwurzelaufguss (1:5) mit Zucker bereitet, so dass jedes Stück das Lösliche von 0,005 Rad. Ipecacuanhae enthält, dienen als Expectorans zu 1–3 Stück mehrmals täglich.

4) **Pulvis Ipecacuanhae compositus** vgl. bei Opium.

#### Verordnungen:

- |   |   |
|---|---|
| <p>1) R<br/> <i>Tartari stibiati</i> 0,06 (cgm. 6)<br/> <i>Pulv. rad. Ipecacuanhae</i><br/> <i>Amyli Tritici</i> aa 1,0<br/> <i>M. D. S.</i> Auf einmal zu nehmen.</p> <hr/> <p>2) R<br/> <i>Tartari stibiati</i> 0,04 (cgm. 4)<br/> <i>Pulv. rad. Ipecac.</i> 1,2<br/> <i>Sacchari</i> gm. 2<br/> <i>M. f. pulv. Divide in partes aequales</i><br/> <i>No. 4. S.</i> Viertelstündlich 1 Pulver:<br/>         (Brechmittel für Kinder von 5–10<br/>         Jahren.)</p> <hr/> <p>3) R<br/> <i>Tartari stibiati</i> 0,1 (dgm. 1)<br/> <i>Pulv. rad. Ipecac.</i> 2,0<br/> <i>M. f. pulv. D. S.</i> Alle 10–15 Min.<br/>         den vierten Theil zu nehmen. (Bil-<br/>         ligste Form.)</p> <hr/> <p>4) R<br/> <i>Tartari stibiati</i> 0,06 (cgm. 6)<br/> <i>Pulv. rad. Ipecacuanhae</i> 1,0<br/> <i>Aq. dest.</i> 75,0<br/> <i>Oxymellis Scillae</i> 15,0<br/> <i>Sacchari albi</i> 10,0<br/> <i>M. D. S.</i> Wohlumgeschüttelt alle 10<br/>         Minuten einen Esslöffel, bis Er-<br/>         brechen erfolgt. (Sog. <i>Linctus emeti-</i><br/> <i>cus Hufelandi</i>, für Kinder empfehls-<br/>         werth.)</p> <hr/> <p>5) R<br/> <i>Tartari stibiati</i> 0,06<br/> <i>Infusi radices Ipecacuanhae</i> (e 1,0)<br/> <div style="text-align: right;">75,0</div><br/> <i>Mellis depurati</i> 25,0</p> | <p><i>M. D. S.</i> Alle 10 Minuten einen Thee-<br/>         löffel voll bis zu reichlicher Wirkung.</p> <hr/> <p>6) R<br/> <i>Rad. Ipecacuanhae grossiuscule</i><br/> <i>pulveratae</i> 5,0<br/> <i>Cort. Aurantii pulv.</i> 7,5<br/> <i>Tartari depurati</i> 3,5<br/> <i>Infunde c. Aq. dest. bullientis q. s.</i><br/> <i>ad colat.</i> 125,0<br/> <i>Oxymellis scillitici</i> 10,0<br/> <i>M. D. S.</i> Alle 10 Minuten einen Ess-<br/>         löffel bis zu reichlicher Wirkung.<br/> <b>(Infusum Ipecacuanhae compositum</b><br/> <i>Ph. Hann.)</i></p> <hr/> <p>7) R<br/> <i>Rad. Ipecac. grosse pulv.</i> 0,5–1,0<br/> <i>Affunde</i><br/> <i>Aq. ferv. q. s. ad colat.</i> 150,0<br/> <i>Cui adde</i><br/> <i>Tinct. Opii simpl.</i> 1,0<br/> <i>Syrupi gummosi</i> 25,0<br/> <i>M. D. S.</i> Zweistündlich 1 Esslöffel.<br/>         (Bei Ruhr und ruhrartigen Durch-<br/>         fällen.)</p> <hr/> <p>8) R<br/> <i>Infusi rad. Ipecacuanhae</i> (e 0,2)<br/> <div style="text-align: right;">75,0</div><br/> <i>Natrii bicarbonici</i> 2,0<br/> <i>Syrupi Althaeae</i> 25,0<br/> <i>M. D. S.</i> Zweistündlich 1 Esslöffel<br/>         voll. (Bei Bronchitis acuta im kind-<br/>         lichen Lebensalter.)</p> |
|---|---|



**Anhang.** Ein dem Emetin ähnliches Alkaloid, das Violin, findet sich in verschiedenen Theilen unseres wohlriechenden Veilchen. *Viola odorata* L., besonders in der Wurzel, die schon zu 2,0—4,0 emetokathartisch wirkt und in grösseren Gaben Gastritis und Tod bedingen kann. Auch die als *Flores violarum* s. *Violae odoratae* früher officinellen Veilchenblumen enthalten ausser ätherischem Oel und blauem Farbstoff Violin (Boullay). Man benutzte dieselben besonders zur Darstellung des durch schön blaue Farbe ausgezeichneten Veilchensyrups, *Syrupus Violarum*, welcher hie und da Volksmittel bei Aphthen ist, meist aber zur Färbung von Mixturen dient. Grössere Mengen Alkalien färben ihn grün, Säuren roth. Das Violin kann zu 0,2 Erbrechen und Durchfall bedingen, doch ist die Wirkung inconstant (Chomel).

**Radix Asari, Rhizoma Asari; Haselwurzel.** Das rundlich vier-eckige, bis 2 Mm. dicke, entfernt gegliederte, graubräunliche Rhizom der bei uns einheimischen *Asarinee Asarum Europaeum* L., das namentlich frisch pfefferartig brennend schmeckt und campherartig riecht, kommt kaum noch als Emeticum bei uns in Anwendung, obschon die mit Katharsis verbundene Wirkung bei Anwendung von 1,0—2,0 sicher ist. Die Wurzel enthält ein gelbes, dickflüssiges, ätherisches Oel von baldrianähnlichem Geruche und scharfem Geschmacke, sowie eine campherähnliche Substanz, den Haselwurzelcampher (*Asarin, Asaron*), welcher letztere als emetisches Princip zu betrachten ist (Feneulle und Lassaigue), dem bei Fröschen auch eine lähmende Wirkung auf die quergestreiften Muskeln zukommt (Harnack).

Die frische Haselwurzel erregt leicht Niesen; bringt man von dem Pulver der Droge 0,1—0,2 auf die Nasenschleimhaut, so bildet sich nach einiger Zeit ein starker Ausfluss von Schleim und selbst von Blut. Man hat sie daher zu 0,1—0,2 (für sich oder mit Schnupftabak) als Errhinum bei chronischem Kopfweg, insonderheit in Folge von Entzündung der *Sinus frontales* benutzt, ferner bei Ozaena und Polypenresten in der Nase, bei Taubheit, welche man von Verstopfung der Eustachischen Trompete herleitete, bei Augenaffectionen und bei Hirnleiden. Es ist einleuchtend, dass nur eine locale irritirende Action unter Umständen bei chronischem Katarrhe Günstiges leisten kann, während namentlich bei Neigung zu Apoplexie u. dgl. durch die mit dem Niesen, welches das Mittel erregt, verbundene heftige Erschütterung bedenkliche Zufälle hervorrufen werden können. Man schrieb dem Mittel früher auch abortive Wirkung zu und in Russland soll *Asarum* gebraucht werden, um Trinkern die Lust am Schnaps zu verleiden.

Ganz obsolet ist die früher als *Radix Vincetoxici*, Schwalbenwurzel, officinelle Wurzel der bei uns einheimischen *Asclepiadee Cynanchum Vincetoxicum* Moench, welche als Brechmittel und Diureticum (Schlesier) Benutzung fand und deren wirksames Princip, das *Asclepiadin*, ein die quergestreiften Muskeln lähmendes Gift ist (Harnack).

#### **Apomorphinum hydrochloricum; Apomorphinhydrochlorat, salzsaures Apomorphin.**

Wir reihen den erethistischen Emetica einen erst in der neuesten Zeit durch die Untersuchungen von Matthiessen und Wright (1869) bekannt gewordenen Stoff, das Apomorphinhydrochlorat, an, welches genau in denselben Richtungen wie Brechweinstein und *Ipecacuanha* verwendet wird, sich aber von denselben wesentlich dadurch unterscheidet, dass seine brechenerregende Wirkung nicht eine reflectorische, durch Reizung der Magenerven bedingte ist, sondern durch eine directe Erregung gewisser centraler Nervengebiete zu Stande kommt. Das Apo-

morphinhydrochlorat wirkt bei subcutaner und intravenöser Application in weit kleineren Mengen rascher und sicherer emetisch als bei interner Einführung und bedingt weder bei Einführung in den Magen noch bei einer anderen Applicationsweise locale entzündliche Reizung.

Das Apomorphinhydrochlorat wird durch 2—3stündiges Erhitzen der bekannten Opiumbase Morphin im zugeschmolzenen Rohre mit einem grossen Ueberschusse von wässriger Salzsäure erhalten. Die daraus durch Natriumbicarbonat abgeschiedene Base, das Apomorphin, bildet eine krystallinische Masse, die in Substanz oder wässriger Lösung rasch grün wird. Ihrer chemischen Zusammensetzung nach  $C^{17}H^{17}NO^2$  ist dieselbe (Morphin)  $C^{17}H^{19}NO^3$  weniger (Wasser)  $OH^2$ . Das Apomorphinhydrochlorat ist ein weisses oder grauweisses, trocknes, neutrales, in Wasser lösliches, in Aether oder Chloroform unlösliches Pulver, welches an feuchter Luft bei Einwirkung von Licht bald grün wird, sich mit Salpetersäure blutroth färbt und mit überschüssiger Natronlauge eine Lösung giebt, die an der Luft rasch purpurroth und später schwarz wird. Das Apomorphin ist identisch mit dem schon 1843 von Arppe durch Behandeln von Morphin mit Schwefelsäure erhaltenen Sulfomorphid.

Die brechenerregende Wirkung wurde schon von den Entdeckern bei ihren Arbeiten wiederholt wahrgenommen und therapeutisch zuerst von Gee (1869) in Anwendung gezogen, später wurde die Wirkung von Siebert (1870), Riegel und Böhm (1871), H. Köhler und Quehl (1871), Bourgeois, Harnack (1874), Tassinari, Ronty (1875) und Reichert (1880) sehr genau studirt. Die emetische Action tritt ausser beim Menschen auch bei Hunden und Katzen, bei Hunden subcutan applicirt schon nach 1—2 Mgm. ein, während vom Magen aus 20, ja selbst 30—40 (Siebert, Quehl) Mgm. erforderlich sind; noch mehr ist bei Application in den Mastdarm nothwendig (Quehl). Eine ganz ähnliche Differenz zeigt sich beim Menschen, bei welchem 6—7 Mgm. bei Subcutanapplication in der Regel zur Hervorrufung von prompter Emese genügen, während interne 0,06—0,12 in der Regel nur Nausea erregen. Das bei Hunden und Menschen mit Apomorphin erzielte Erbrechen ist im Wesentlichen dem durch Brech Weinstein und Ipecacuanha bedingten gleich und namentlich mit starker Steigerung der Pulsfrequenz verbunden. Es tritt nach Dosen von 0,006—0,012 subcutan zwischen 3 und 15 Min. ein, leichtes Hitzegefühl, Schwindel, etwas apathische Stimmung und vermehrte Speichelsecretion gehen demselben in der Regel voraus, während häufig leichter Schlaf nachfolgt. Das Erbrechen kommt bei Hunden nicht zu Stande, wenn dieselben in der Chloroformnarkose sich befinden, nach einzelnen Autoren auch wenn sie forcirt künstlicher Athmung unterworfen werden; Chloralhydrat und Morphin suspendiren das Erbrechen vollständig, während Vagusdurchschneidung ohne Einfluss zu sein scheint. Bei nicht emetischen Dosen scheinen Nausea, Gesichtsblässe, Unruhe und Hinfälligkeit bedeutender als bei emetischen (Moers und Loeb).

Sehr grosse Dosen scheinen, soweit dies aus Thierversuchen geschlossen werden kann, nicht brechenerregend zu wirken. Bei Hunden tritt dadurch ein geringer Grad von Betäubung, Pupillenerweiterung und Injection der Bindehaut auf.

In Bezug auf die sonstige Wirkung des Apomorphins ist besonders zu betonen, dass dasselbe keine Entzündung an der Applicationsstelle erregt und namentlich auch bei subcutaner Injection 5—10% Lösung keinerlei Irritation erzeugt noch inflammatorisch wirkt. Instillation von Apomorphinlösung auf die Bindehaut bewirkt weder Röthung derselben noch Pupillenveränderung. Directe Application auf Hirn, Nerven und Muskeln bei Fröschen hebt deren Function auf, ohne materielle Veränderungen hervorzurufen (Reichert). Ein directer Einfluss des resorbirten Apomorphins auf die Hirnfunction lässt sich nach den vorliegenden Beobachtungen über die Wirkung bei Thieren und Menschen nicht in Abrede stellen und scheint je nach der Dosis in Excitation oder Depression der cerebralen Functionen zu bestehen. Bei Thieren ist Unruhe mit wilden Bewegungen nichts Seltenes. Beim Menschen kommt auch nach reinen Präparaten mitunter Schwindel, Neigung zum Gähnen und zum Schläfe vor.

Bei Thieren, welche nicht brechen können, resultiren nach grossen Dosen heftige convulsivische Bewegungen, theils cerebralen, theils spinalen Ursprungs. Derartige Convulsionen sind auch als Nebenerscheinungen des Apomorphingebrauches bei Kindern beobachtet, insbesondere auffallende Vor- und Rückwärtsbewegung des Kopfes, Pronation und Supination der Arme, Zucken und krampfhaftige Bewegung der Beine, Kaubewegungen und Singultus. Wenn schon hierdurch sich ein Effect auf das Rückenmark andeutet, so wird ein solcher durch die bei Kindern wiederholt beobachtete Steigerung der Reflexaction (Jurasz) sicher gestellt. Eine besondere, vom Erbrechen unabhängige Wirkung auf den Herzschlag und den Puls ist ebenfalls nicht zu leugnen. Atropin hebt die durch Apomorphin bewirkte Beschleunigung der Herzschlagzahl nicht auf (Harnack). Unabhängig vom Brechen einerseits und vom Vagus andererseits ist primäre Erhöhung und secundäre Herabsetzung der Athemzahl (Harnack), welche Erscheinungen auf directe Beeinflussung des Athemcentrums zu beziehen sind. Die Erregung des Respirationcentrums resultirt auch in absoluter Chloroform-, Chloral- oder Morphinarkose, während Erbrechen in diesem Stadium nicht eintritt (Harnack). Die Reflexübertragung von sensiblen Nerven auf das vasomotorische Centrum wird durch Apomorphin nicht gelähmt (Quehl). Die Reizbarkeit der willkürlichen Muskeln wird bei Vergiftung von Fröschen durch Apomorphin constant herabgesetzt (Harnack) und eine gleiche Wirkung ergibt sich auch auf die glatten Muskeln des Darms (Reichert). Inconstant ist der Einfluss auf die Temperatur, die in der Regel anfangs gesteigert, später erniedrigt wird. Bei directer Einführung von Apomorphin in die Venen resultirt anfängliches Steigen des Blutdrucks durch Erregung des vasomotorischen Centrums, später Herabsetzung durch Schwächung des Herzens (Reichert). Während Reichert nach Apomorphin starke Vermehrung der Speichel- und Magensaftsecretion, dagegen nicht eine solche bei anderen Abscheidungen beobachtete, constatirte Rossbach (1882) in der Trachea massenhafte Production höchst dünnflüssigen, wasserklaren Schleims bei knötchenartiger Auftreibung der Drüsen, ohne Veränderung der Gefässfüllung und überhaupt unabhängig von der Blutzufuhr und den Nerven.

Das Apomorphinhydrochlorat hat sich als das einzige Emeticum, welches subcutan angewendet werden kann und bei dieser Applicationsweise örtliche Entzündungserscheinungen nicht bedingt, die Gunst des ärztlichen Publikums erworben und in allen Fällen Verwendung gefunden, in denen man überhaupt Brechmittel zu appliciren pflegt. Es ist dies nicht zu verwundern, da bei richtiger Anwendung der Dosen in der Regel Nebenerscheinungen von Bedeutung nicht resultiren.

Nimmt man zu geringe Dosen, so dass entweder das Erbrechen ganz ausbleibt oder erst spät sich einstellt, so kann es zu Agitation, kleinem Pulse, Trübung des Sehens, Gähnen, Salivation, Somnolenz und Schwäche kommen (Moeller). Intensiven Collaps, der nur in sehr wenigen Fällen, z. B. nach 0,01 (Dujardin-Beaumetz), beobachtet ist, hat vielleicht seinen Grund in zufälliger directer Einspritzung in eine Vene. In analoger Weise dürfte auch die von Prevost nach 3—4 Mgm. bei einer Frau beobachtete Syncope mit wechselnder Mydriasis und Miosis und Zucken der Mundwinkel zu erklären sein. Bei Kindern kommen übrigens starke Apathie und leichter Collaps nicht selten vor, sind jedoch ganz unbedenklich, da sie äusserst rasch vorübergehen und mit dem Eintritte des Erbrechens, das durchschnittlich schon in  $\frac{1}{2}$ —3 Minuten erfolgt, aufhören.

Mit Rücksicht auf die physiologische Wirkung des Apomorphinhydrochlorats könnte man eine Contraindication seines Gebrauchs als Brechmittel bei narkotischen Vergiftungen annehmen, doch bleibt das Erbrechen nach Apomorphin nur bei wirklichem schwerem Sopor aus, wo auch die Emetica erethistica häufig im



Stiche lassen. Besonders indicirt ist das Mittel in Fällen, wo die Unmöglichkeit, ein Emeticum intern zu appliciren, z. B. bei bestehendem Trismus, vorliegt oder die innerliche Application grossen Schwierigkeiten unterliegt, wie bei Geisteskranken, ferner da, wo ein bestehender Irritationszustand der ersten Wege die Anwendung von Brech Weinstein, Kupfersulfat u. s. w. geradezu verbietet, endlich bei croupösen Entzündungen der Luftwege, wo ausser der emetischen Action noch die ausgezeichnete expectorirende Wirkung des Mittels in Frage kommt, das in den letzten Jahren als internes Medicament einen hervorragenden Ruf als Expectorans gewonnen hat.

Bei dem nur höchst ausnahmsweise auftretenden Collaps nach emetischen Dosen von Apomorphin ist letzteres bei alten und schwachen Personen gewiss gerade so gut indicirt wie Ipecacuanha. Auch der längere Gebrauch ist ohne jede nachtheilige Folge (v. Gellhorn) und namentlich kehrt nach dem Gebrauche Appetit und Digestion sofort wieder zur Norm zurück (Fronmüller). Dass mitunter nicht emetische Gaben cumulativ, d. h. brechenrerregend wirken, ist nicht zu bestreiten, dagegen ist eine cumulative Action auf andere Gebiete als das Brechcentrum nicht sichergestellt. Gerade durch das Hervortreten von Erbrechen werden aber die bei Thieren, welche nicht brechen können, z. B. Kaninchen, in grösster Intensität, beim Menschen nur ausnahmsweise hervortretenden Erscheinungen der Erregung anderer spinaler und centraler Centren aufgehoben, vielleicht im Zusammenhange mit der Ausscheidung des Apomorphins durch die Magendarmschleimhaut, welche neben Elimination durch die Nieren neuerdings Reichert nachgewiesen zu haben glaubt.

Abgesehen von der Entleerung croupöser und diphtheritischer Membranen oder starker Schleimmassen bei Bronchialkatarrhen, Asthma u. s. w. ist das Apomorphin als Brechmittel zur Entfernung von Fremdkörpern aus dem Halse (Verger), bei Vergiftung mit irritirenden Substanzen (Duncan) und Bittermandelöl (Loeb), bei hochgradiger, mit Magenüberfüllung complicirter Berausung und bei galligen Zuständen nach Morphingebrauch (Fronmüller) benutzt. Bei Geisteskranken, für welche Apomorphin wegen der Möglichkeit, die Wirkung durch Subcutanapplication zu erhalten, das beste Brechmittel ist, empfahl es v. Gellhorn als schlafmachendes und beruhigendes Mittel, besonders bei Maniakalischen. Männich gab es bei Spasmus glottidis, Vallen der zum Coupiren von epileptischen Anfällen. Als Expectorans bewährt es sich vorzugsweise bei Bronchitis catarrhalis, Bronchiolitis, katarrhalischer Pneumonie, Pseudocroup, aber auch bei Rachen- und Kehlkopfdiphtheritis und bei stockendem Auswurf der Pneumoniker; bei Laryngitis acuta und Katarrhen der Phthisiker scheint es ohne Nutzen (Fraenzel, Beck).

Als Emeticum wird Apomorphinhydrochlorat nur subcutan benutzt, da die Wirkung der internen Application zu inconstant ist. Die Dosis emetica für den Erwachsenen schwankt, je nach den individuellen Verhältnissen, zwischen 6 und 10 Mgm., bei Frauen zwischen 5 und 8 Mgm., bei Kindern zwischen 0,5 und 4 Mgm. Es ist zweckmässig, die Dosen nicht zu klein zu bemessen, da man sonst unangenehme Nausea als Zugabe erhält. Man verwendet zur Subcutaninjection in der Regel wässrige Lösungen von 1—2:200. Zusatz von Zuckersyrup verhindert die Grünfärbung solcher Lösungen (Blaser).

Die innerlich als Expectorans zu benutzenden Dosen sind weit höher und betragen für den Erwachsenen 0,01—0,02 (!). Für die Bemessung der Dosis bei Kindern sind die Maximen von Kormann empfehlenswerth, wonach man unter einem Jahr 1 Mgm. pro Dose reicht und dann mit jedem Jahre bis zum 11. um  $\frac{1}{2}$  Mgm. und vom 11. Jahre an bis zum 15. um 1 Mgm. steigt. Jurasz giebt in den ersten 3 Lebensmonaten nur 0,5—0,8 Mgm., Kormann verordnet pro die 10 Dosen, womit dann beim Erwachsenen bei Anwendung der Einzelgabe von 0,01 die Maximalgabe der deutschen Pharmacopoe um das Doppelte überschritten ist. Die Anwendung von Apomorphin in Pulver- oder Pillenform, wo-

gegen an sich nichts zu erinnern sein würde, ist verhältnissmässig ungebrauchlich.

Wie bereits bemerkt färben sich Apomorphinlösungen nach kurzer Zeit grün; die Wirkung wird dadurch aber entweder gar nicht oder in nicht erheblichem Masse beeinträchtigt. Harnack hat ein Jahr alte, dunkelgrüne, Jurasz 19 Monate alte, fast schwarze Apomorphinlösung mit Erfolg als Emeticum benutzt. Auch stärkere Irritation in loco scheint solchen grüngefärbten Solutionen nicht zuzukommen.

#### 4. Ordnung. Entererethistica, Darmreizende Mittel.

Die unter dieser Ordnung zu besprechenden Abführmittel, Purgantia s. Cathartica, deren allgemeine pharmacodynamische und therapeutische Verhältnisse schon S. 51 ausführliche Darstellung fanden, handeln wir in der Weise ab, dass wir, mit den mildesten, den sog. Lenitiva, beginnend und zu den stärker abführenden fortschreitend, sie nach der Intensität ihrer Wirkung gruppieren.

##### Manna; Manna.

Die Droge ist ein jetzt ausschliesslich aus Sicilien, früher auch aus Calabrien in den Handel gebrachtes süßes Ausschwitzungsproduct aus künstlich in die Rinde der zum Zwecke der Mannaerzeugung cultivirten Mannaesche, *Fraxinus Ornus* L. s. *Ornus Europaea* Pers., gemachten Einschnitten.

Die Mannaesche ist ein im nördlichen und östlichen Gebiete des Mittelmeers einheimisches Bäumchen. Zur Mannaerzeugung wird eine cultivirte Varietät, als *Fraxinus rotundifolia* bezeichnet, benutzt. Die Cultur der Mannaesche in Sicilien, über welche 1872 Langenbach genaue Mittheilungen gemacht hat, ist in Abnahme begriffen; in Calabrien hat sie völlig aufgehört. Man leitete früher die Manna von dem Stiche der Cicade, *Cicada Orni* L., ab, doch hat, wenn sich auch nicht leugnen lässt, dass aus den Blättern des Baumes spontan oder in Folge des Stiches des genannten Insects Manna ausfließt, derartige sog. Manna in lacrymis für den Handel gar keine Bedeutung. Die Manna des Handels ergießt sich aus künstlichen Einschnitten, welche in den Monaten Juli bis September an Bäumen im Alter von 18—20 Jahren täglich gemacht werden, als braune Flüssigkeit, die in wenigen Stunden fest und weiss wird. Sie erhärtet in Form von Stangen oder Zapfen, welche entweder senkrecht herabhängen oder an der Rinde festkleben. Die frei herabhängenden Zapfen stellen die sog. *Manna cannulata* (cannellata) (die beste Sorte), die an der Rinde herabgefllossene die schlechtere *Manna communis* s. in sortis dar. Erstere bildet 7—20 Cm. lange und 2—4 Cm. breite, undeutlich dreikantige oder bisweilen rinnenförmige, weisse oder weissgelbliche Stücke, welche sehr locker, trocken und brüchig, nur sehr wenig klebrig und von rein süßem Geschmacke sind; sie zeigt auf dem Querbruche eine concentrische Schichtung und in ihren zahlreichen Höhlungen grosse Mengen von Krystallsäulchen und löst sich in etwa 6 Th. kaltem Wasser völlig zu klarer neutraler Flüssigkeit, ebenso mit Leichtigkeit in Alkohol zu einer beim Erkalten krystallinisch erstarrenden Solution. Kleinere Stücke dieser Sorte heissen im Handel wohl *Manna cannulata* in fragmentis. Die *Manna communis*, welche auch *Manna Geracina* genannt wird, kommt in zusammengeklebten Klumpen oder Körnern von weisslicher oder bräunlicher Farbe vor, welche etwas klebrig und von süßem, aber gleichzeitig ein wenig kratzendem Geschmacke sind. Zu verwerfen ist fette Manna, Manna

pinguis s. crassa s. de Puglia, welche weiche, schmierige und missfarbige Massen von schleimig kratzendem Beigeschmack darstellt, die mannigfaltige Verunreinigungen enthält. Die von Ortschaften hergenommenen Bezeichnungen der einzelnen Mannasorten haben keinen wissenschaftlichen Werth; die Qualität der Waare, für welche der Grad der Trockenheit (gute Waare darf im Wasserbade nicht über 10% verlieren) und Reinheit und der rein süsse Geschmack entscheidend sind, wird durch die Witterungsverhältnisse bei der Einsammlung ausserordentlich beeinflusst.

Als chemischer Hauptbestandtheil und als actives Princip der Manna erscheint der Mannazucker oder Mannit, neben welchem in guter Waare sich geringe Mengen von Gummi und Traubenzucker finden.

Der Mannit oder Mannazucker,  $C^6H^{14}O^6$ , ein im Pflanzenreiche ausserordentlich verbreiteter Süsstoff, welcher künstlich durch schleimige Gährung aus Zucker erzeugt werden kann, auch in geringer Menge beim Kochen von Stärkemehl mit verdünnten Säuren entsteht und durch Behandeln von Invertzucker, Glykose und Laevulose mit Natriumamalgam entsteht, krystallisirt in langen, glänzenden Säulen oder Nadeln von schwachem, angenehm süssem Geschmacke, löst sich in 6,4 Th. Wasser, wenig in kaltem Weingeist, nicht in Aether und wird durch Kochen mit verdünnten Säuren oder Alkalien oder mit alkalischem Kupfertartrat nicht verändert. Mannit ist gährungsfähig, jedoch viel weniger leicht als andere Zuckerarten. Mischung von Salpeter- und Schwefelsäure verwandelt ihn in Nitromannit, welcher durch Schlag explodirt und sich toxisch dem Nitroglycerin anreicht (Werber). Im Tractus scheint sich der Mannit z. Th. in Milchsäure umzuwandeln, in die er auch bei Behandlung mit Milchsäureferment z. Th. zerfällt; ein Theil geht in den Urin über, ein noch geringerer Theil findet sich in den Faeces wieder (Witte). Direct in das Blut eingeführt, scheint er theilweise zu verbrennen, da nur  $\frac{1}{3}$  der eingeführten Menge im Urin erscheint.

Der Mannit ist als das einzige purgirende Princip der Manna anzusehen, deren Gehalt an diesem Körper zwischen 60 und 80% schwankt und deren purgirende Wirkung um so mehr hervortritt, je reicher an Mannit und je freier von sog. kratzendem Extractivstoff die Mannasorte ist. Schlechte Manna enthält viel schleimige Materie, vielleicht auch Dextrin (Baignet), welche die Purgirkwirkung geradezu beschränken.

Bei Menschen bewirken 30,0—45,0 Mannit meist in 4—5 Std., bisweilen schon in  $1\frac{1}{2}$  Std. Abführen unter Borborygmen und Tenesmus (Gerlach). Bei Thieren bedingt Injection von Mannitlösung in die Venen kein Purgiren. Witte und Buchheim schliessen hieraus und aus der nicht purgirenden Action der im Tractus aus Mannit entstehenden Alkalilactate, dass die purgirende Wirkung desselben in der nämlichen Weise zu erklären sei wie die des Glaubersalzes, und dass das geringe Diffusionsvermögen des Mannits die hervorragende Stelle desselben als Purgans unter den übrigen Zuckerarten erkläre. Uebrigens ist Mannit von verschiedenen Aerzten als Abführmittel praktisch verworther und von Martin Solon zu 30,0—60,0 als Laxans für Kinder und Erwachsene in allen Fällen empfohlen, wo man Purgiren ohne Reizung des Darmcanals herbeiführen will, z. B. bei Bauchfellentzündung. Man verordnet ihn in warmer wässriger Lösung (1:4), oder in Form der noch angenehmer schmeckenden Mannitlimonade von Calvetti (Mannit 30,0 und Succus Citri 25,0 auf 275,0 Wasser). Gubler empfahl Mannit statt Zucker bei Verätzung der Augen mit Kalk.

Man verordnet die Manna wegen ihres süssen Geschmackes und ihrer wenig intensiven Einwirkung auf den Organismus besonders bei Kindern oder bei empfindlichen und schwachen Individuen. Häufig dient sie als versüssender Zusatz anderer purgirender Mixturen, z. B. von Sennesblätteraufgüssen.

Als Laxans genügen 50,0—100,0. Man kann die Manna in Substanz (als



sog. *Manna tabulata*, die durch Abdampfen einer mit Zucker versetzten Mannalösung erhalten wird), verordnen, giebt sie aber meist in Wasser oder aromatischen Wässern gelöst.

#### Präparat:

**Syrupus Mannae; Mannasyrup.** Filtrirte Auflösung von 10 Th. Manna und 50 Th. Zucker in 40 Th. Wasser. Gelblicher Syrup, der für sich (oder bei Neugeborenen mit der doppelten Menge *Aqua Foeniculi*)  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  stündlich theelöffelweise in der Kinderpraxis als Abführmittel verordnet werden kann, meist aber als versüssender Zusatz purgirender Mixturen dient. Mit gleichen Theilen *Syrupus Sennae* wird er als *Syrupus Sennae cum Manna* (auch als *Syrupus mannatus* bezeichnet) dispensirt.

**Anhang:** Der Name Manna, welcher bekanntlich zunächst in der Bibel für ein wohlschmeckendes, als Speise benutztes Product angewendet wird, ist für sehr verschiedene Ausschwitzungen gebräuchlich. Das Manna der Bibel ist ein durch Stiche einer Schildlaus bedingtes Ausschwitzungsproduct an einer eigenthümlichen Varietät des Tarfastrauches, *Tamarix Gallica mannifera*, welche noch jetzt am Sinai ein wohlschmeckendes Nahrungsmittel liefert, das nach Berthelot aus Rohrzucker, Invertzucker und Dextrin besteht. Weder diese Sinaimanna noch die sog. Lerpmanna aus Australien, welche von verschiedenen *Eucalyptus*arten stammt und statt Mannit besondere Zuckerarten (Melitose, Eucalyn) enthält, noch auch die sehr seltene Manna von Briançon; welche von *Larix decidua* stammt und ebenfalls eine eigenthümliche Zuckerart, die Melecitose, einschliesst (Berthelot), haben für die Arzneykunde Bedeutung. Der Name Manna wird ausserdem auch auf andere Gebilde bezogen, z. B. auf die Galläpfeln nicht unähnlichen, durch den Stich von Rüsselkäfern erzeugte Auftreibung an einem *Echinops* in der syrisch-mesopotamischen Wüste, welche unter der Bezeichnung Trehala oder Tricala nach Europa gelangte und ebenfalls eine besondere Zuckerart, die Trehalose, enthält, vorzugsweise aber aus Stärkmehl besteht. Auch den Knollen von *Cyperus esculentus* wird im Neugriechischen der Name Manna beigelegt, ebenso gewissen, in den nordafrikanischen Wüsten häufigen und durch Winde weithin verbreiteten, kleinen Flechten, *Lecanora esculenta* und *L. affinis* Ev., welche man mit Unrecht für das Manna der Bibel gehalten hat.

Durch Gehalt an Süsstoff purgirend wirkt auch das in der Röhrencassie, den Hülsen einer in Afrika und Ostindien einheimischen *Caesalpiniee*, *Cassia s. Bactyrolobium fistula*, enthaltene Fruchtmark, *Pulpa Cassiae*, welches früher mit Manna oder Tamarindenmus esslöffelweise als Lenitivum gegeben wurde.

#### *Oleum Ricini, Oleum Palmae Christi; Ricinusöl, Castoröl.*

Bekanntlich sind die fetten Oele sämmtlich in grösseren Dosen (30,0—60,0) milde Abführmittel, indem sie durch Ueberziehen der Fäces mit einer schlüpfrigen Fettschicht den Transport derselben im Darne erleichtern. Besondere Wirkung kommt indessen dem Ricinusöle zu, welches aus den Samen des gemeinen Wunderbaumes, *Ricinus communis* L., einer in tropischen Ländern baumartigen, bei uns krautigen *Euphorbiacee*, durch Auspressen erhalten wird.

Dasselbe ist ein blassgelbliches, fadenziehendes, durchsichtiges, bei 0° durch Abscheidung krystallinischer Flocken trübes, bei niederer Temperatur butterartiges, mit Spiritus und Aether in allen Verhältnissen mischbares, fettes Oel von 0,96 spec. Gew. und mildem, hinterdrein etwas kratzendem Geschmacke. Der Name Castoröl, Castoroil, von Einzelnen als Biberöl verdeutscht, ist wahrscheinlich aus *Castus* (*Agnus castus*) Oil, wie man dasselbe wegen angeblicher

keuschheitsschirmender Wirkung nannte, *corruptum*. — In tropischen Ländern gelten die Blätter des Ricinusbaumes als Emmenagogum, auch dienen sie dort zur Application auf die Brüste als Lactagogum.

Ueber das wirksame Princip des Ricinusöls, das eines unserer beliebtesten und geschätztesten milden Abführmittel bildet, befinden wir uns noch im Unklaren. Wir wissen mit Sicherheit nur, dass das Oel in seiner Wirksamkeit ausserordentlich den unreifen und reifen Samen nachsteht, aus denen es gewonnen wird und welche in sehr geringen Mengen heftig drastisch purgiren, und dass eine aus dem Oele isolirte eigenthümliche Säure, die Ricinölsäure, deren Glycerid den Hauptbestandtheil des *Oleum Ricini* ausmacht, neben welchem sich noch Spuren von Stearin, Palmitin und Cholesterin finden, nicht ohne Schärfe ist. Die früher ziemlich allgemein angenommene Theorie Buchheims, dass bei Einverleibung des Oeles wie auch bei Verseifung desselben Zersetzungsproducte auftreten, denen der grösste Antheil an der Wirkung zugeschrieben sei, ist von Buchheim selbst zurückgenommen.

Der wohl ursprünglich in Indien und Nordafrika einheimische Wunderbaum wird behufs der Oelgewinnung in den verschiedensten Ländern, in Europa besonders in Italien und Frankreich, cultivirt. Das Oel wird meist durch Auspressen der geschälten Samen erhalten, welche durch ihre mit bräunlichen Bändern und Punkten schön bemalte, glänzende, graue Oberfläche und durch ihre Gestalt an Zecken (*Ricinus*) erinnern. Italienische Samen sind bis 15 Mm. lang und höchstens 10 Mm. breit, Indische etwas grösser. Sie geben  $\frac{1}{2}$  (und weniger) ihres Gewichtes an Oel. Nach Flückiger wird durch kaltes Auspressen ein fast geschmackloses, dagegen durch warmes Auspressen ein Oel von scharfem Geschmacke erhalten. Als feststehend gilt es, dass durch Extraction mit verdünntem Alkohol erhaltenes Ricinusöl schon in der Hälfte der Dosis Purgiren bewirkt, wie das gewöhnliche Präparat. Schon Dioskorides wusste, dass bei unvorsichtigen Gaben der Ricinussamen heftige Vergiftungserscheinungen, die den Charakter der Cholera tragen, entstehen, während das Ricinusöl bei den Alten und bei den Arabern nicht als Purgans, sondern ausschliesslich als Speiseöl oder zu Einreibungen benutzt wurde. Die Kenntniss der purgirenden Wirkung des Oels scheinen englische Aerzte in Ostindien oder Westindien zuerst erworben zu haben; Fraser in Antigua (1769) führte es in die Praxis ein. Die Samen sind noch heutzutage in Italien, Südfrankreich u. s. w. Volksmittel, um Abführen zu bewirken, und hat dieser Gebrauch wiederholt zu heftigen Intoxicationen, ja selbst zum Tode geführt. Schon 3—4 Samen im reifen Zustande können mehrtägige gefährliche Erkrankung bei Erwachsenen (*Pécholier*), 5,0—6,0 den Tod durch heftige Entzündung des Darmes nach intensivem Erbrechen und mehrere Tage anhaltenden blutigen Diarrhöen bewirken. Der nach Auspressen des Ricinusöls restirende Presskuchen hat wiederholt den Tod von Kühen in Frankreich bedingt. Auch die unreifen Ricinussamen wirken in derselben Richtung (*Popp*). — Soubeiran hat, weil das durch Alkohol extrahirte Oel stärker wirkt als das ausgepresste, als den wirksamen Stoff ein Harz bezeichnet, doch wird dies von Emil Werner (1870) zurückgewiesen, weil weder mit Alkohol noch mit Benzin und Aether das wirksame Princip ausgezogen werden kann. Mit den genannten Lösungsmitteln behandelte Samen büssen an Wirksamkeit nicht ein, wohl aber verlieren mit Alkohol ausgezogene Samen ihre Activität, wenn sie mit destillirtem Wasser im Dampfbade ausgezogen werden. Es stimmt dies freilich nicht ganz zu der durch Parola gegebenen Empfehlung eines ätherischen Extractes der *Semina Ricini*, das zu 8,0 soviel wirken sollte wie 30,0 *Oleum Ricini*. Werner betrachtet das nach seinen Versuchen wirksame Princip als in Wasser löslich, doch gelang es ihm nicht, ein wirksames wässriges Extract darzustellen, weil das active Princip bei höherer Temperatur zerstört wird. Dasselbe ist nicht flüchtig, weil das wässrige Destillat der Samen unwirksam ist. Für die Annahme von *Pécholier*, dass das wirksame Princip

sich ähnlich bilde wie das ätherische Senföl, d. h. durch Contact eines spaltbaren Körpers mit einem Fermente, und somit in den Ricinussamen nicht präformirt sei, liegen zwingende Gründe durchaus nicht vor. Das active Princip ist übrigens keinesweges an einen bestimmten Theil (Embryo, Perispermium) der Samen gebunden. Das von Tuson im Ricinussamen gefundene Alkaloid Ricinin, welches zu 0,12 nicht purgirend wirkte, hält Werner für das Magnesiumsalz einer Säure, welche Wiggers Niricinsäure nennt. Das Ricinusöl enthält keine freie Ricinölsäure, wonach somit die Wirkung nur durch die Verseifung im Darne ermöglicht werden kann. Bei der Verseifung tritt allerdings als Umwandlungsproduct der Ricinölsäure eine zweite Säure auf, doch ist dieselbe nicht scharf und purgirend (Buchheim). Die von Saalmüller entdeckte Ricinölsäure ist ein hellweingelbes, in dünnen Schichten farbloses, syrupdickes Oel von 0,94 spec. Gew. und scharfem, kratzendem Geschmacke, das sich nicht in Wasser, wohl aber in Spiritus und Aether löst. Bei trockener Destillation ihres Natronsalzes entsteht Oenanthol, bei Destillation mit Natronhydrat Oenanthylalkohol und Sebacylsäure (Städeler). Mit ihren Salzen haben Buchheim und Krich (1857) Selbstversuche angestellt, wonach ricinölsaures Magnesium zu 15,0 nicht purgirend wirkt, während ricinölsaures Natrium in derselben Dosis Ructus und geringe Uebelkeit, Kollern im Leibe und flüssigen Stuhl bedingt. Die durch Einwirkung von salpetriger Säure auf Ricinölsäure entstehende isomere Ricinelaidsäure ist selbst zu 48,0 ohne Einfluss auf den Stuhl. In den Faeces konnten Buchheim und Krich ricinölsaures Natrium und Ricinelaidsäure nicht wieder auffinden. Dass Ricinusöl nicht bloß als fettes Oel wirkt, lehren die Dosenverhältnisse; fast scheint es vielmehr, als ob das Fett die Wirkung des drastischen Princips mildere und so eben die eigenthümliche Stellung des Ricinusöls unter den Abführmitteln bedinge.

Die abführende Wirkung des Ricinusöls zeigt sich bei verschiedenen Personen nach sehr differenten Gaben; bei einzelnen genügen 5,0–10,0, während bei den meisten die Dosis von 15,0 nicht abführt, wenn sie nicht durch eine nachfolgende gleiche Menge unterstützt wird. Auch nach diesen kleinen Gaben zeigt sich Nausea, meist in geringem Grade, nach 30,0 nicht selten auch Erbrechen. Der Stuhlgang erfolgt fast immer ohne Kolikschmerzen; bei vollem Darne haben die abgehenden Faeces oft ihre gewöhnliche Form beibehalten; bei verhältnissmässig leerem Darne und grösseren Dosen geht das Oel als solches mit Schleim gemengt, auch in Form käseartiger Flocken oder seifenartigen Schaumes (Golding Bird) wieder ab, während man es bei kleineren Dosen nicht wieder antrifft. Buchheim und Krich konnten selbst nach 30,0 keine Verseifungsproducte in den Faeces finden.

Nebenerscheinungen, wie Schwäche, Pulsverlangsamung, Neigung zum Schläfe sind selten und wohl nur indirect Folge des Oels, direct Folge des durch dasselbe bedingten Purgirens. Die älteren Angaben, dass Gaben von 1–2 Esslöffel Ricinusöl choleraähnliche Symptome und selbst den Tod bedingt haben, sind offenbar in Folge von Verwechslung oder Verfälschung mit anderen Oelen von stärkerer Wirksamkeit entstanden. In ersterer Beziehung kommt Crotonöl besonders in Betracht, in letzterer das Oleum Jatrophae Curcadis s. infernale, Hölleöl, das aus den Samen einer in tropischen Gegenden (Südamerika, Westindien, Afrika) einheimischen Euphorbiacee gewonnen wird und zwar nicht die ihm in älterer Zeit zugeschriebene intensive Wirkung, die der Name ausdrückt, besitzt, jedoch schon in Dosen von 15 Tropfen soviel wie ein Esslöffel Ricinusöl leistet und in grösseren Mengen offenbar zu Erbrechen und übermässigem Purgiren führen kann (Th. Husemann). Ueberhaupt liefert die Familie der Euphorbiaceen eine Menge fetter purgirender Oele, welche aber sämmtlich weit stärker als das Ricinusöl wirken und vielleicht, wie Buchheim vermuthet, Oelsäuren enthalten, welche eine homologe Reihe mit der Ricinöl-



säure bilden und bei trockner Destillation analoge Producte liefern. Dahin gehören z. B. das Anda-Oel, Oleum-Andae, aus den Samen der brasilianischen *Anda Gomesii*, das zu 15–20 Tropfen leicht purgirend wirkt (Norris), das Oel der Moluccanischen *Aleurites triloba* und das etwa gleich starke Oel aus den früher unter der Benennung *Semina Cataputiae minoris* officinellen Samenkörnern der bei uns einheimischen *Euphorbia Lathyris* L., das *Lathyris*-Oel, Oleum *Lathyridis*, welches ebenfalls eine purgirende Oelsäure und einen in Alkohol löslichen beigemengten drastischen Körper zu enthalten scheint (Buchheim und Krich).

Die Wirkung des Ricinusöls erfolgt auch bei Application in den Mastdarm; Ricinusölklystiere wirken stärker als solche aus Leinöl. In das Blut gespritzt riefen 15,0 beim Menschen Aufstossen, Nausea, Geschmack nach dem Oele (in 25 Min. auftretend), Ohnmachten und Depression, in 3 Std. vergeblichen Stuhldrang, später Fieber und mehrwöchentliches Unwohlsein hervor (bei Hale). Aeltere Autoren geben an, dass auch Einreibungen auf die Haut des Unterleibes purgirend wirken; bei Wiederholung solcher Frictionen tritt Hautröthung und Ekzem ein.

Vermehrender Einfluss auf die Gallensecretion kommt dem Ricinusöle nicht zu (Rutherford).

Die Indicationen des Ricinusöls ergeben sich leicht aus den Wirkungen desselben. Da es keine Darmreizung bedingt, gebe man es in allen Fällen, wo man überhaupt nur Entleerung stagnirender Darmmassen beabsichtigt oder wo Obstipation im Verlaufe von entzündlichen Affectionen des Tractus oder anderer Unterleibsorgane (Blase, Prostata, Uterus) zu beseitigen ist.

So z. B. auch bei Dysenterie, wo manchmal angehäufte feste Kothmassen die Entleerung erfordern. Bei Darmreizung durch unverdaute Nahrungsmittel ist selbst bei bestehender Diarrhoe das Mittel von entschiedenem Nutzen.

In zweiter Linie indicirt der Umstand, dass Ricinusöl ausserordentlich geringe Nebenerscheinungen bedingt und wenig schwächt, dasselbe als gelegentliches Abführmittel bei schwachen und empfindlichen Personen.

Dies ist besonders der Fall bei Schwangeren und Wöchnerinnen, bei Verwundeten oder Operirten, im Verlaufe von Leiden, die in Folge der durch sie erfordernten längeren Rückenlage Tendenz zur Obstipation erzeugen. Ein brauchbares Abführmittel für Kinder ist Ricinusöl nicht, da es ihnen schlecht beizubringen ist. Eine Contraindication giebt der Widerwille einzelner Personen, welche absolut ausser Stande sind, dasselbe hinunterzuschlucken, vielmehr es regelmässig erbrechen. Ein solcher bildet sich namentlich nach öfterer Wiederholung einer purgirenden Dosis Ricinusöl aus und ist in der That bei unzumuthbarer Anwendung, wie sie gewöhnlich stattfindet, indem man das Oel esslöffelweise ohne Zusatz nehmen lässt, unüberwindlich. Ueberhaupt aber ist vor wiederholtem Gebrauche des Ricinusöls bei Hartleibigkeit zu warnen, weil sich leicht Appetitlosigkeit, Verdauungsschwäche, Zungenbeleg, manchmal sogar etwas Fieber, einstellt. Gerade in solchem Zustande, der leichter bei Anwendung ranzig gewordenen Oeles auftreten soll, wird das Mittel in den kleinsten Mengen erbrochen. Dasselbe gilt von Magenkatarrhen aus anderen Ursachen, bei denen man es deshalb am besten meidet.

Die Hartnäckigkeit der Obstruction darf nicht abschrecken, dieses gelinde Purgans zu versuchen, mit welchem man selbst bei Bleikolik oft Entleerung von Scybala und Beschwichtigung der Schmerzen erreicht. Dagegen ist es ungerechtfertigt, von dem Mittel bei eingeklemmten Brüchen und Volvulus, wo es mehr schaden als nützen kann, Erfolge zu erwarten. Absurd ist die Anwendung in halbstündigen Dosen von 1 Esslöffel bei asiatischer Cholera.

Die Dosis des Ricinusöls beträgt 15,0–60,0. Da grössere

Dosen oft Erbrechen erregen, führen sie verhältnissmässig weniger gut zum Ziele als kleinere. Englische Aerzte geben an, dass allmählig zur Herbeiführung desselben Effects geringere Mengen nöthig seien. Von allen Darreichungsweisen ist nach meiner Erfahrung diejenige in heisser Bouillon die allerbeste. Zusatz von Corrigentien und Nachspülenlassen des Mundes stehen derselben nach.

Krahmer empfiehlt, Ricinusöl auf eine halbe Tasse Pfefferminzthee zu giessen und mit weiter Mundöffnung in einem Zuge auszutrinken, dann Zähne und Lippen mit einem Tuche zu reinigen, bei sehr grossen Dosen das Mittel pure nehmen und mit Citronensaft benetzten Streuzucker nachnehmen zu lassen oder den Mund mit ätherhaltigem Wasser auszuspülen. Die empfohlene Mischung von Ricinusöl und Syrupus Succi Citri ist auch nicht wohlschmeckend; besser maskirt Zusatz von Aq. Amygdalarum amararum den Geschmack. Gubler empfiehlt es in Caffee, Bouillon oder mit einem Liqueur zu nehmen; Stillé, es mit dem Schaum von Porter und Ale hinunterzuschlucken. In Frankreich hat man besonders construirte Löffel für Ricinusöl (und Leberthran), welche ein directes Einschütten in den Pharynx ermöglichen. Vielfach in Gebrauch ist die Emulsion (mit  $\frac{1}{4}$  Gummi Arabicum, da mehr als  $\frac{1}{4}$  die Purgirwirkung beeinträchtigt), die jedoch auch nicht zu den angenehmsten Mixturen gehört. Angenehmer, aber weniger verwerthet wird die Ricinusölgallerte (8 Th. Oel mit 1 Th. Cetaceum zusammengeschmolzen), die in Oblate genommen wird. — Die Wirkung des Ricinusöls soll durch Oleum Terebinthinae (zu  $\frac{1}{3}$  zugesetzt) erhöht werden, doch schmeckt eine solche Mischung noch schlechter. — Das als Abführmittel versuchte ricinölsaure Magnesium, Magnesium ricinolicum, welche indessen nur in grossen Dosen purgirt und kaum anders wie Seife wirkt, kommt im Handel unter der Form dünner, schneeweisser und mattglänzender Blätter vor. Früher wurde auch ricinölsaures Natrium in gleicher Weise gerührt.

Zum Klystier rechnet man 30,0–60,0 Ricinusöl. — Pharmaceutisch findet dasselbe zur Darstellung von Collodium elasticum und als Vehikel ätherischer Oele in Form von Haarölen und Pomaden, denen man günstigen Einfluss auf den Haarwuchs zuschreibt, Anwendung.

**Magnesium carbonicum**, *Magnesia carbonica*, *Magnesia hydrico-carbonica*, *Magnesia alba*, *Magnesia carbonica hydrata* s. *subcarbonica*; **Magnesium-carbonat**, weisse *Magnesia*, basischkohlensäure *Magnesia*. **Magnesia usta**, *Magnesium oxydatum*, *Magnesia pura* s. *calcinata*; **gebrannte Magnesia**, *Magnesia*.

Die beiden in der Ueberschrift genannten Verbindungen der Bittererde, mit welchen sich die Reihe der unorganischen Purgirmittel eröffnet, das *Magnesium-carbonat* und die aus dieser dargestellte *Magnesia*, stimmen im Allgemeinen in ihrer Wirkung und Anwendung so mit einander überein, dass es geboten erscheint, beide mit einander gemeinsam abzuhandeln. Das *Magnesiumcarbonat* wird fabrikmässig durch heisse Fällung von Magnesiumsulfat oder Chlormagnesium mit Kalium- oder Natriumcarbonat gewonnen und bildet weisse, leichte, lose zusammenhängende, leicht zerreibliche Massen oder ein lockres, weisses Pulver. Nach der bei der Fällung angewendeten Temperatur stellt dieses ein Präparat von sehr verschiedener Zusammensetzung dar. Es löst sich in 2500 Th. kaltem und 9000 Th. kochendem Wasser, leichter in kohlensäurehaltigem Wasser und verwandelt sich beim Glühen unter Abgabe von Wasser und Kohlensäure in Magnesiumoxyd oder *Magnesia*, die ebenfalls ein lockeres und sehr weisses Pulver darstellt, das spec. Gew. von 3,64 hat und zu seiner Lösung 55000 Th. kalten Wassers bedarf. Es ist nur im Knallgasgebläse schmelzbar; an der Luft zieht es allmählig Kohlensäure an und mit Wasser verbindet es sich langsam und ohne Temperaturerhöhung zu *Magnesiumhydroxyd*, welches schon beim gelinden Erhitzen sein Hydratwasser wieder verliert.

Sowohl die *Magnesia* als das *Magnesiumcarbonat* werden im

Contact mit der Säure des Magensaftes in lösliches Chlormagnesium umgewandelt, wobei aus dem Magnesiumcarbonat Kohlensäure frei wird. Diese Metamorphose ist jedoch nur in kleinen Dosen eine vollständige, während bei grösseren Mengen beider Verbindungen der beträchtlichste Theil in den Darmcanal als solcher übergeht und sich dort in Magnesiumbicarbonat verwandelt, welches in den Faeces sich wiederfindet und, da es auch nach dem Einnehmen von Chlormagnesium und organisch sauren Magnesiumsalzen (Lactat, Tartrat, Citrat, Oxalat) in den Excrementen auftritt, als die Ursache der purgirenden Action der meisten Magnesiumsalze zu betrachten ist (Buchheim und Magawly).

Die Theorie der Abführwirkung der *Magnesia* wird von verschiedenen Pharmacologen different aufgefasst. Die u. A. noch von Nothnagel ausgesprochene Ansicht, dass die im Magen gebildeten Salze (Lactat, Chlormagnesium), wenn sie im Ueberschuss vorhanden seien, der Grund der Katharsis seien, kann durch die Untersuchungen, welche Buchheim mit Guleke, Kerkovius und Magawly anstellte, als beseitigt betrachtet werden. Wenn dadurch auch das Factum, dass kleine Dosen *Magnesia* und Magnesiumcarbonat nicht purgirend wirken, wohl erklärt wird, indem die genannten Magnesiumsalze erst in höheren Gaben Abführen erregen, als solche bei Anwendung kleiner Mengen der fraglichen Medicamente im Magen mit den dort vorhandenen Säuren gebildet werden können, so lässt die Theorie doch das Eigenthümliche der *Magnesiawirkung*, nämlich das späte Eintreten derselben, welches oft 8–10 Std. auf sich warten lässt, völlig unerklärt. Letzteres deutet schon a priori darauf hin, dass eine Umwandlung in den unteren Partien des Darmcanals statthaben muss. Das Magnesiumbicarbonat ist bei Weitem leichter löslich in Wasser als *Magnesia* und wirkt eben so rasch purgirend wie Magnesium- und Natriumsulfat. Man wandte dieselbe früher unter der Form des durch Lösen von Magnesiumcarbonat in stark kohlensäurehaltigem Wasser erhaltenen doppeltkohlensauren *Magnesiawassers*, *Aqua Magnesiaë bicarbonicæ* s. *carbonicæ* s. *magnesiata*, an, welches jetzt meist durch Mineralwasser ersetzt wird.

Ein Theil der im *Tractus* aus der *Magnesia* und dem Magnesiumcarbonat gebildeten löslichen Verbindungen wird resorbiert und erscheint im Harn als Ammoniummagnesiumphosphat. Die Ausscheidung durch den Urin ist beträchtlicher, wenn kleinere Dosen, welche nicht purgirend wirken, gegeben werden (Guleke); der Urin nimmt dabei oft alkalische Reaction an. Ob *Magnesia* wie Alkalien die Bildung von Harnsäure und harnsauren Salzen vermindern oder auf die Abscheidung von Phosphaten fördernd wirken kann (Brande, Jones), ist fraglich. Bei längerer Darreichung von *Magnesia* usta können im Dickdarme Concremente entstehen, welche selbst durch die Bauchdecken hindurch gefühlt werden und hartnäckige Verstopfung, Perityphlitis und Durchbohrung des Darmes zur Folge haben können (Brande), aber auf reichlichen Genuss von Essig rasch schwinden (Krahmer). Starker Gehalt von *Magnesia* in Trinkwassern wird von Einzelnen als Ursache des Kropfes bezeichnet, während nach Peez, Lambert u. A. auf die Darreichung von Magnesiumcarbonat häufig Warzen verschwinden sollen, was übrigens wohl rein zufällig ist. Wilson meint das Schwinden der Warzen nach dem *Magnesiagebrauch* aus einer Atrophirung in Folge von Phosphorentziehung durch die *Magnesia* erklären zu können, indem die *Magnesia* eine besondere Affinität zur Phosphorsäure habe, die sie selbst den organischen Blutbestandtheilen entziehe, um als Tripelphosphat in den Urin überzugehen.

Therapeutisch werden *Magnesia* und Magnesiumcarbonat fast ausschliesslich innerlich gebraucht; äusserlich sind beide als Basis für Zahnpulver und wegen ihrer Leichtigkeit auch als Streupulver bei Intertrigo, Ekzem u. s. w. tauglich. Innerlich werden beide Präparate ausserordentlich häufig als säuretilgende Mittel bei



Affectionen des Magens und Darmcanals benutzt, welche durch excessive Säurebildung in Folge abnormer Gährungsprocesse characterisirt sind (Pyrosis, Durchfälle kleiner Kinder). Sie haben anderen Antacida gegenüber besonders ihre Indication, wenn gleichzeitig bestehende Verstopfung gehoben werden soll, doch ist, namentlich bei Diarrhoea infantum, die *Magnesia usta*, in nicht zu grossen Dosen gegeben, geradezu von stopfender Wirkung. Der Vorzug, den Einzelne dem *Magnesiumcarbonat* bei diesen Affectionen geben, weil gleichzeitig die freiwerdende Kohlensäure von günstigem Einflusse sei, scheint nicht begründet. Als neutralisirendes Mittel findet *Magnesia usta* ferner ausgedehnte Anwendung bei allen Vergiftungen mit Säuren (Schwefelsäure, Salpetersäure, Salzsäure, Phosphorsäure, Oxalsäure), mit welchen sie theils unlösliche, theils lösliche, aber unschädliche, höchstens etwas purgirende Salze bildet.

Auch bei Oxalsäurevergiftung ist die *Magnesia* als Antidot verwendbar, jedoch nur bei Anwendung im grossen Ueberschuss, weil neutrales oxalsaures *Magnesium* löslich und resorptionsfähig ist, während die basischen Salze durch grosse Schwerlöslichkeit ausgezeichnet sind. Ueberhaupt ist bei Vergiftungen mit Säuren die *Magnesia* stets in grossen Mengen zu geben und wenn, wie dies stets geschehen sollte, dieselbe gleichzeitig in einer grossen Menge Wasser suspendirt dargereicht wird, so steht sie den Alkalien und Alkalicarbonaten in keiner Weise nach. Wegen der durch Auftreibung des Magens möglicherweise resultirenden schädlichen Wirkung bei Anwendung des *Magnesium carbonicum* wird letzteres als Antidot bei Säurevergiftungen widerrathen.

Auch bei Vergiftung mit arseniger Säure, Sublimat, Quecksilberoxyd und Kupfersalzen ist die *Magnesia* als Gegengift empfohlen und namentlich beim Arsenicismus acutus haben sich bewährte Forscher dafür ausgesprochen, dass die *Magnesia* vor dem Eisenoxydhydrat entschiedene Vorzüge besitze, welche jedoch dem jetzt officinellen Antidotum Arsenici gegenüber nicht hervortreten.

Die *Magnesia* wurde gegen Arsenicismus schon 1808 von Mandel und 1814 von Graf, später auch von Berzelius bei dieser Intoxication empfohlen. Schuchardt (1851) constatirte durch Versuche die Wirksamkeit des Antidots, das eben so rasch wie Eisenhydroxyd eine unlösliche Verbindung mit der arsenigen Säure eingehe, und betonte als Vorzüge der *Magnesia* vor letzterem die Möglichkeit, dieselbe in sehr grossen Dosen und sogar bei bestehender Gastritis ohne Schaden darzureichen, so wie die Vermehrung der Stuhlentleerung durch das Mittel und die aus der geringeren spec. Schwere und der leichteren Vertheilbarkeit der *Magnesia* resultirende raschere Vereinigung mit der arsenigen Säure. Uebrigens ist das bei der Arsenvergiftung in Vorschlag gebrachte Antidot nicht unser officinelles Präparat, sondern das *Magnesiumhydroxyd*, welches als *Magnesia usta in aqua* oder als *Magnesium hydro-oxydatum*, auch als Antidotum Arsenici albi in einzelne Pharmakopöen (z. B. in Oesterreich) übergegangen ist. Dieses Hydrat, welches eine gallertartige Masse darstellt, bildet sich nur aus *Magnesia*, welche bei möglichst niedriger Temperatur calcinirt wurde. Das Präparat der österreichischen Pharmakopoe wird aus 50 Th. frisch geglühter *Magnesia* und aus 500 Th. destillirtem Wasser bereitet und bleibt nach Schroffs Versuchen in hermetisch verschlossenen Gefässen lange Zeit unverändert. Man giebt davon bei Intoxication mit arseniger Säure anfangs  $\frac{1}{4}$  std., dann in grösseren Zwischenräumen 40,0—60,0, bis die Vergiftungserscheinungen nachlassen und die *Magnesia* reichlich mit den Faeces zum Vorschein kommt. Das gebildete *Magnesiumarseniat* ist nicht völlig unlöslich (Schroff), sondern geht ins Blut und von da in den Urin über, ein Umstand,

der bei der langsam purgirenden Wirkung der Magnesia wohl in Betracht kommt und der Anwendung des eigentlichen Antidotum Arsenici das Wort redet.

Was die Anwendung der Magnesia gegen die übrigen Gifte anlangt, so ist bei Metallsalzen die Fällbarkeit derselben in Form von unlöslichen Metallhydroxyden nicht abzuleugnen, doch bleiben die Niederschläge offenbar nur so lange ungelöst, als im Magen die Säure des Magensaftes nicht auf sie einwirken kann, weshalb die Magnesia hier im grossen Ueberschusse verabreicht werden muss. Bei Sublimat hat Schrader in antidotarischen Thierversuchen keine befriedigenden Resultate erhalten. Schuchardt hebt die Möglichkeit, Magnesia bei Alkaloidvergiftungen als Gegengift zu verwenden, hervor, doch fehlen bestätigende Versuche. Der Gebrauch der Magnesia als Antidot bei Phosphorvergiftungen ist zu widerrathen; dieselbe kann zwar Neutralisation der gebildeten Oxydationsstufen des Phosphors bewirken, doch bedingen letztere die relativ geringste Gefahr beim Phosphorismus, und andererseits kann die Anwesenheit der Magnesia die Bildung des viel gefährlicheren Phosphorwasserstoffs begünstigen.

Der Gebrauch der Magnesia und des Magnesiumcarbonats als Purgans ist besonders in Fällen angezeigt, wo stärkere Reizung des Darmcanals vermieden werden soll, so wie bei Personen, deren Kräftezustand die Anwendung eingreifender Laxantien contraindicirt, weshalb sie auch in der Kinderpraxis, zumal in Form der sog. Kinderpulver, ausserordentlich beliebt ist.

Andere früher gebräuchliche Anwendungen der Magnesia, z. B. bei Lithiasis mit übermässiger Bildung von Harnsäure oder harnsauren Salzen, bei Eklampsie, Kolik, Kopfschmerzen, Magenschmerzen u. s. w., sind fast ganz ausser Cours. Seydlitz empfahl die Magnesia im Klystier gegen Tenesmus bei Dysenterie; Wilson innerlich als beruhigendes Mittel bei Exaltationszuständen, Säuferswahn u. s. w., weil Magnesia der Nervensubstanz Phosphor entziehe.

Pharmaceutisch dient Magnesiumcarbonat zur Darstellung der officinellen Brausemagnesia. Zu Brausepulvern und Saturationen eignet sich Magnesiumcarbonat nicht so gut, wie Natrium carbonicum und bicarbonicum. Mit medicinischer Seife und etwas Pfefferminzöl giebt Magnesia usta die zur Zahnreinigung dienende sog. Odontine. Die Anwendung zu Pillen wird beim Copaivabalsam ausführlicher besprochen.

Man giebt die beiden in Rede stehenden Magnesiumpräparate als Absorbentien zu 0,1—0,5, als Abführmittel zu 1,0—3,0 mehrmals täglich, am häufigsten in Pulverform, Schüttelmixtur oder Pastillen.

Zu vermeiden sind bei der Darreichung ausser Säuren und Metallsalzen auch Alkaloid- und Ammoniaksalze, z. B. Chlorammonium, indem sich beim Verordnen des letzteren mit Magnesiumcarbonat Chlormagnesium und Ammoniumcarbonat bildet, welches letztere der Mixtur nicht allein einen unangenehmen Geschmack und Geruch, sondern geradezu kaustische Eigenschaften verleiht.

Bei der grossen Leichtigkeit der Magnesia und Magnesia carbonica hat man sich vor der Verordnung zu grosser Mengen zu hüten. Magnesium carbonicum nimmt ungefähr das achtfache Volumen wie die gleiche Gewichtsmenge Zucker ein. Aus diesem Grunde ist auch das Einnehmen einer purgirenden Einzeldosis in Pulverform sehr beschwerlich, weshalb man sich in England und Frankreich oft eines comprimirtten Präparates, welches als schwere Magnesia, Magnesia ponderosa oder Henrysche Magnesia, bezeichnet wird und eine asbestartig glänzende, blendende weisse, leicht zerreibliche Masse darstellt, welche viel schwieriger von Säuren angegriffen wird, mit Wasser kein Hydrat bildet und Copaivabalsam nicht solidificirt, bedient. Man kann schwere Magnesia durch Anrühren von Magnesiumcarbonat mit Wasser, Pressen, Trocknen und Calciniren erhalten. Die Darreichung in Schüttelmixtur sichert gegen die von Einzelnen hervorgehobenen, übrigens sehr geringen kaustischen Wirkungen der officinellen Magnesia auf die Magenschleimhaut; sie hat das Unangenehme, dass bei Anwendung zu grosser Mengen von Magnesia usta, namentlich bei warmem Wetter,

Gelatinisiren der Mixturen erfolgt, das vorzugsweise auf Hydratbildung, vielleicht auch auf Bildung einer Verbindung der Magnesia mit dem Zucker des verordneten Syrups, beruht. Man vermeidet das Gelatinisiren durch Anwendung reichlicher Mengen Wasser (10–12 Th.) und Syrup (4 Th. auf 1 Th. Magnesia nach Goble). Diese Verbindung der Magnesia mit Zucker ist neben Magnesiumhydroxyd auch in der als Abführmittel, besonders im kindlichen Lebensalter, empfehlenswerthen Magnesiamilch, *Lac Magnesia* von Mialhe, vorhanden.

Früher officinell waren aus Chocodemasse gefertigte *Magnesiapastillen*, *Trochisci Magnesia ustae*, jede 0,1 Magnesia enthaltend und als Absorbens nach dem Essen benutzt. Ähnliche Pastillen, jedoch 1,0 Magnesia enthaltend, bilden die sog. *Pastilles purgatives à la Magnésie calcinée*.

#### Verordnungen:

- |  |  |
|--|--|
| <p>1) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Magnesiae ustae</i> 10,0<br/> <i>Ebulliant cum</i><br/> <i>Aquae destillatae</i> 50,0<br/> <i>Adde</i><br/> <i>Sacchari</i><br/> <i>Aquae florum Aurantii</i> aa 25,0<br/> <i>M. D. S.</i> Esslöffelweise zu nehmen.<br/> (Magnesiamilch von Mialhe.)</p> | <p>3) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Magnesii carbonici</i> 4,0<br/> <i>Aquae florum Aurantii</i> 150,0<br/> <i>Syrupi simplicis</i> 10,0<br/> <i>M. D. S.</i> Wohlumgeschüttelt stündlich<br/> ein Esslöffel. (Bei Pyrosis.)</p>                      |
| <p>2) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Magnesiae ustae</i> 25,0<br/> <i>Aquae destillatae</i> 175,0<br/> <i>M. D. S.</i> Esslöffelweise rasch hintereinander zu verbrauchen. (Bei Vergiftung mit Mineralsäuren).</p>   | <p>4) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Magnesii carbonici</i> 2,0<br/> <i>Tartari depurati</i> 1,0<br/> <i>Sacchari albi</i> 3,0<br/> <i>M. f. pulv. D. S.</i> Theelöffelweise.<br/> (Pulvis aërophorus, cum Magnesia. Billig, aber wenig brausend.)</p> |

**Magnesium citricum effervescens**, *Magnesia citrica effervescens*; **Brausemagnesia**, trockene citronensaure Magnesia-Limonade, *Citrate de magnésie granulaire*, *Limonade sèche au citrate de magnésie*.

Ein sehr wohlschmeckendes, indessen auch theures, erst bei einer Dosis von 25,0–60,0 in 5–6 Stunden einige, nicht sehr rasch aufeinanderfolgende Stühle hervorrufendes Präparat ist *Magnesium citricum effervescens*, welches das seit 1847 von Rogé de la Barre in Frankreich in den Arzneischatz eingeführte *Magnesiumcitrat*, *Citrate de magnésie*, sowie die ebenfalls in Frankreich besonders üblichen, meist Specialitäten verschiedener Apotheker darstellenden, flüssigen Limonaden und Brauselimonaden aus citronensaurem *Magnesium* ersetzt.

Das Präparat wird durch Vermischen von 25 Th. *Magnesiumcarbonat*, 75 Th. *Citronensäure* und 10 Th. *Wasser*, Trocknen und Pulverisiren, Zusatz von 85 Th. *Natriumbicarbonat*, 6 Th. *Citronensäure* und 20 Th. *Zucker* und Verwandelu des Gemenges unter tropfenweisem Zusatze von Weingeist durch sanftes Reiben mit einem Pistill in eine grobkörnig krümlige Masse, Trocknen bei gelinder Wärme und Absieben dargestellt, wodurch ein sehr weisses, grobkörniges Pulver entsteht. Das Ppt. enthält, wie das *Magnesiumcitrat* von Rogé de la Barre, amorphes *Magnesiumcitrat* mit 4–6 Aeq. *Wasser*, welches sich schon in 2 Th. *Wasser* löst, während andere Modificationen des *Magnesiumcitrats* mit mehr Krystallwasser, in welche das amorphe Citrat sehr leicht übergeht, viel geringere Löslichkeit besitzen. In England soll unter der Bezeichnung *Granular citrate of magnesia* häufig ein Gemisch von *Magnesiumsulfat*,



Weinsäure und Natriumbicarbonat verkauft werden. Billig lässt sich dasselbe durch Zumischen von 1 Esslöffel Citronensaft zu einem Glase voll Aqua Magnesiae carbonicae ersetzen (Clarus). Bei der milden Wirkung aller dieser Präparate und ihres Wohlgeschmackes wegen eignen sie sich sämmtlich besonders für empfindliche Personen, z. B. für Wöchnerinnen. Das Magnesium citricum effervescens kann man thee- bis esslöffelweise geben.

Statt Magnesiumcitrat sind auch Magnesiumtartrat, Magnesium tartaricum (Chevallier), Magnesiumacetat, Magnesium aceticum (Renault), und Magnesiumlactat, Magnesium lacticum, zu 15,0—30,0 als angenehmere und billigere Purganzen empfohlen, das milchsäure Salz vorzugsweise der Theorie zu Liebe, dass die Magnesia im Tractus sich in Lactat umwandle, zu dessen Bildung in grösserer Menge früher Gumprecht die letztere mit gleichen Theilen Milchzucker theelöffelweise nehmen liess. Die genannten Salze lösen sich übrigens schwieriger und verdecken den bitteren Geschmack der Magnesia weniger gut als die Brausemagnesia.

**Tartarus depuratus**, Kalium bitartaricum purum, Cremor tartari, Crystalli tartari; **Weinstein**, Kaliumbitartrat, Monokaliumtartrat, saures weinsaures Kali.

Das Kaliumbitartrat findet sich im Saft vieler säuerlichen Früchte, besonders in demjenigen der Weintrauben. Aus letzterem geht es bei der Gährung in den Wein über und scheidet sich bei Zunahme des Alkoholgehaltes, da es in spirituösen Flüssigkeiten weniger als in Wasser löslich ist, in Gemenge mit Calciumtartrat, Farbstoffen und Hefe als sog. roher Weinstein in harten, cohärenten Krystallkrusten aus. Aus diesem wird durch Auflösen in kochendem Wasser und Entfärben mit Kohle der Tartarus depuratus gewonnen, welcher bei langsamer Krystallisation weisse, halbdurchsichtige, klinorhombische Krystalle (Crystalli tartari) oder bei gestörter Krystallisation ein weisses krystallinisches Pulver (Cremor tartari, Weinsteinrahm, früher auch als Tartarus depuratus pulveratus bezeichnet) bildet. Der gereinigte Weinstein schmeckt säuerlich und löst sich nicht in Alkohol und schwierig in Wasser; von letzterem sind in der Kälte 192, in der Siedhitze 20 Th. zur Lösung erforderlich. Beim Erhitzen in verschlossenen Gefässen schmilzt der Weinstein unter Verbreitung eines eigenthümlichen Geruches nach Brenzweinsäure.

Das Kaliumbitartrat wird wegen seines geringen Diffusionsvermögens nur langsam resorbirt und hernach im Blute zu Carbonat verbrannt, als welches es sich im Urin, welcher dadurch alkalisch wird, findet (Wöhler); bei Einführung grösserer Mengen geht auch Weinsäure in den Harn über (Buchheim und Piotrowsky).

Im Munde bedingt Weinstein säuerlichen Geschmack und wirkt durstlöschend. Kleinere Mengen haben keine besondere Wirkung auf den Organismus; dass danach die Menge des Urins gemehrt wird, ist trotz der allgemeinen Annahme durch physiologische Versuche nicht festgestellt. Bei längerer Zufuhr kleiner Dosen stellt sich manchmal Appetitlosigkeit und Digestionsstörung, selbst mit nachfolgender Abnahme des Körpergewichts, ein. Grössere Dosen (15,0 und darüber) bedingen wässrige Stuhlentleerungen, meist mit Kolikschmerzen.

Uebergrosse Dosen können sogar Gastroenteritis erzeugen, deren Folge selbst Tod (in einem Falle von Tyson nach 4–5 Esslöffeln) sein kann.

Therapeutisch findet Tartarus depuratus als Purgans vielfach Anwendung, wo es sich darum handelt, bei fieberhaften Zuständen,

zu denen Obstipation hinzutritt, zugleich bethätigend auf den Stuhlgang und kühlend zu wirken, da man seit jeher den Weinstein zu den sog. Refrigerantien rechnete.

Dass der Weinstein nicht bloß durstlöschend, sondern auch nach Art anderer Kaliverbindungen auf Herzaction und Temperatur herabsetzend wirkt, ist keinem Zweifel unterworfen, vorausgesetzt, dass man purgirende Dosen anwendet, während nach kleinen Dosen (0,5—1,0) höchstens durstlöschende Action eintritt. Man rechnet in praxi den Weinstein zu den milderen Abführmitteln und braucht ihn häufig zur Verstärkung der Action des Schwefels bei Hämorrhoidariern etc. Letzteren und überhaupt Unterleibsleidenden würde er früher auch vielfach als Resolvens in kleineren Dosen gegeben.

Vielfache Benutzung hat Weinstein auch als kühlendes Mittel bei starken Erhitzungen, Congestionen und besonders Aufregungen gefunden, wo der Hauptwerth der früher vielgebrauchten niederschlagenden Pulver vielleicht in Ablenkung des Geistes von dem erregenden Momente besteht.

Als Diureticum bei Hydrops zieht man dem von Bright sehr gerühmten Weinstein essigsäures und salpetersäures Kalium vor. Die Anwendung gegen Scorbut (Garrod) scheint ohne Nutzen. Eine besondere äusserliche Anwendung hat man vom Weinstein bei Angina gemacht, indem man in frischen Fällen die Mandeln mit einer kalten Lösung von etwa 4,0 10—20mal in Contact brachte. Die früher übliche Anwendung des Weinstein zu dem Reinigen der Zähne ist sehr zu widerrathen, weil die Zähne durch die Säure entschieden leiden.

Als Abführmittel giebt man Weinstein zu 4,0—8,0 mehrmals wiederholt, als Diureticum und durstlöschendes Mittel zu 1,0—2,0, am besten in Pulver oder Latwerge, auch in Solution, die bei der Schwerlöslichkeit in kaltem Wasser sich bei grösseren Mengen schlecht bewerkstelligen lässt.

Bei der Verordnung sind stärkere Säuren, alkalische Salze und Metallsalze zu meiden. Benutzung des Weinstein zu Brausepulvern gewährt keinen Vortheil. Der Umstand, dass in heissem Wasser Weinstein sich leicht löst, bewirkt, dass beim Abkühlen das Salz krystallinisch an den Wänden sich abscheidet. Dies ist der Grund zu der Benennung *Aqua crystallina* für eine von Hufeland zum Ersatz purgirender Mineralwässer vorgeschlagene *Solutio Tartari depurati* s. *Decoctum crystallorum Tartari* (Tart. dep. 1 Th., Sacch. 4 Th., Aq. fervid. 60 Th.), welche auch als diuretisches Getränk diene. Borax erhöht die Löslichkeit sehr durch Bildung eines Doppelsalzes.

Der Weinstein dient auch zur Bereitung der sauren Molken, *Serum lactis acidum* s. *Serum lactis tartarisatum*, wobei man 1 Th. Weinstein auf 100 Th. Milch rechnet. Officinell war früher unter dem Namen niederschlagendes Pulver, *Pulvis temporans s. refrigerans*, eine besonders bei Congestionen und Aufregungszuständen theelöffelweise in Wasser genommene Mischung von 3 Th. Weinstein, 1 Th. Salpeter und 6 Th. Zucker.

#### Verordnung:

℞  
*Tartari depurati* 5,0  
*Aq. destill.* 450,0  
*Syr. Rubi Idaei* 50,0

*M. D. S.* Gläserweise. (*Decoctum crystallorum* s. *Solutio Tartari depurati*. Ph. Hann.)

**Anhang.** Weinstein und Traubenzucker bilden die wesentlichsten wirksamen Bestandtheile der Weintrauben oder Trauben, der Beeren von *Vitis vinifera* L., welche getrocknet die Corinthen und Rosinen (S. 353) bilden und im frischen Zustande zu sog. Traubencuren Anwendung finden, die vorzugsweise bei plethorischen, an Unterleibsstockungen, Hypochondrie, Gicht leidenden Personen,

aber auch bei nervösen, zu Congestionen, Schlaflosigkeit, Neuralgien geneigten Individuen, ja selbst bei Tuberculösen Empfehlung gefunden haben. Die besten Erfolge erreicht man damit bei chronischen Magen- und Darmleiden mit oder ohne Obstipation. Bei dieser Cur werden 3 bis 6 Wochen hindurch täglich entweder Morgens vor dem Frühstück auf einmal oder auf mehrere Portionen von  $\frac{1}{2}$ —1 Pfd. vertheilt 5—6 Pfd. Trauben genossen, wobei die Diät den Verhältnissen des Kranken entsprechend regulirt wird. Die Cur wird bei Personen mit schwacher Verdauung und allgemeiner Anämie anfangs schlecht ertragen, auch kommt es bei Brustkranken zu Palpitationen und im Anfange zu einer Verstärkung des Hustenreizes. Uebrigens betrachtet man dieselbe mit grossem Unrecht als eine stärkende Cur, vielmehr nimmt das Körpergewicht, zumal bei der meist mit der Cur verbundenen knappen Diät und starken Bewegung im Freien, ab und ist dieselbe vorwaltend kräftigen, zu Fettleibigkeit disponirenden, nicht aber schwach genährten und anämischen Personen anzurathen. Zu Traubencuren eignen sich dünnschalige Beeren mit weichem, wenige Kerne enthaltendem Mark; vielsamige, wie die Ahrtrauben, sind in grösseren Mengen nur schwierig zu consumiren (Krahrmer), hartschalige, fleischige Beeren können schmerzhaftes Excoriationen am Gaumen hervorbringen. Meist benutzt man grüne Sylvaner oder Muscateller Trauben, auch Gutedel, Burgunder Trauben, Traminer abwechselnd. Traubencuren lassen sich an allen Orten veranstalten, wo die gehörige Menge guter, reifer Trauben anzuschaffen ist; doch giebt es eine Menge besonderer Curorte, die sich vorzugsweise am Rhein und am Genfer See finden, z. B. Bingen, Rüdesheim, St. Goar am Rhein, Kreuznach an der Nahe, Dürkheim, Neustadt, Gleisweiler in der Pfalz, Weinheim an der Bergstrasse, Cannstatt am Neckar, Montreux am Genfer See. Auch in Meran und Gries bei Bozen, in Tyrol, sowie in Pressburg in Ungarn werden Traubencuren durchgemacht. Nördlicher gelegen sind Grünberg (Schlesien), Altmühl im Naumburgischen u. a. m. Durch die Versendung guter Trauben lässt sich die Traubencur auch in der Heimath zweckmässig abmachen. Statt der Trauben hat man auch den Saft derselben, den süssen Traubenmost, methodisch trinken lassen, den man durch Aufkochen in nicht ganz gefüllten und verkorkten Flaschen vor Gährung schützen und sogar zur Versendung und Aufbewahrung bis zum Frühjahr geeignet machen kann. Der Rückstand nach Auspressen des Traubensaftes, die Trebern oder Treestern, wird, mit Wasser gekocht, zu Bädern verworther, denen man demulcirende, ja selbst nährenden Wirkung zuschrieb. Der Saft unreifer Trauben, welcher vorzugsweise apfelsaure Salze und Gerbsäure enthält, war früher, ebenso wie ein wässeriges Extract der jungen Ranken der Weintrauben, *Extractum pampinorum vitis*, bei Epilepsie, Rachitis und Blutungen in Gebrauch.

**Kalium tartaricum, Tartarus tartarisatus; Kaliumtartrat, neutrales weinsaures Kali, Dikaliumtartrat.**

Weit löslicher als Weinstein ist das Kaliumtartrat, welches durch Sättigung von Weinstein mit Kaliumcarbonat erhalten wird. Es bildet wasserhelle klinorhombische Säulen oder ein weisses Pulver von salzigbitterlichem Geschmacke, das an der Luft feucht wird, in Alkohol wenig löslich ist, dagegen in 1,4 Th. heissem Wasser sich löst. Es wirkt wie der Weinstein in kleinen Gaben diuretisch, in grösseren mild purgirend, und scheint den Magen nicht so leicht zu irritiren, weshalb es selbst als Digestivum Anwendung fand. Da es weit unangenehmer schmeckt und sich, besonders bei Zusatz von Säuren, sehr leicht zersetzt, kommt es verhältnissmässig selten in Gebrauch. Mit Rhabarber, Magnesia und Schwefel bildet es das alte Solamen hypochondriacorum Kleinii. Die laxirende Dosis ist 3,0—15,0; als Diureticum giebt man 1,0—2,0.

Zweckmässiger ist das nicht officinelle Natriumtartrat. Natrium tartaricum, welches fast gar keinen Geschmack besitzt, sich leicht in Wasser löst, übrigens auch ex tempore durch Zersetzung von Natriumcarbonat mit Weinsäure (Limonade von Desvignes) erhalten werden kann. Die purgirende Dosis beträgt 15,0—30,0.



**Tartarus natronatus**, Natro-Kali tartaricum, Kali natronato-tartaricum, Kali tartaricum natronatum, Tartras kalico-natricus cum aqua, Sal polychrestum Seignetti, Sal Rochellense; **Kaliumnatriumtartrat**, Seignettesalz, Rochelle Salz, Natron-Weinstein.

Das Seignettesalz, welches seinen Namen dem Apotheker Seignette in Rochelle verdankt, wird durch Neutralisation des Weinstein mit Natriumcarbonat erhalten und bildet grosse, durchsichtige, rhombische Säulen von bitterlich salzigem Geschmacke, welche sich in 1,4 Th. heissem Wasser zu einer neutr. Flüssigkeit lösen, dagegen in Alkohol unlöslich sind.

Das Kaliumnatriumtartrat ist eines der am häufigsten benutzten Abführmittel, welches besonders bei schwächlichen Personen, bei Frauen und Kindern, dann bei entzündlichen und congestiven Zuständen, z. B. bei Zahnschmerz (Krahmer), als ableitendes Purgans befürwortet wird.

In kleinen Dosen kann es auch als Diureticum gebraucht werden, da es in solchen, wie Versuche von Millon und Laveran lehren, in grösseren Mengen resorbiert wird. Als Abführmittel reicht man 15,0–30,0 in mehreren Portionen. Das Salz ist sehr leicht zersetzlich und muss deshalb sogar der Zusatz von Fruchtsyrupen bei Darreichung in Lösung vermieden werden. Bei Anwendung grösserer Dosen ist Fleischbrühe als Vehikel zu empfehlen.

Aehnliche Doppelsalze sind Kaliummagnesiumtartrat, Kalio-Magnesium tartaricum, welches Maillier statt des Magnesiumtartrats empfahl, und der ganz obsolete Ammoniakweinstein, Tartarus ammoniatus, und Garots borweinsäure Kali-Magnesia, Kalio-Magnesium borotartricum, sämmtlich zu 15,0–50,0 purgirend, aber ohne Vorzüge.

#### Präparat:

**Pulvis aërophorus laxans**, Pulvis aërophorus Seidlitzensis, P. effervescens laxans, **Abführendes Brausepulver**, Seidlitzpulver. Tartarus natronatus 7,5, Natriumbicarbonat 2,5 in einer blauen, Weinsäure 2,0 in einer weissen Papierkapsel dispensirt. Nach Lösung der Salze in einem Glase Wasser setzt man die Säure zu und trinkt während des Aufbrausens. Etwas mehr Weinsäure verbessert den Geschmack, doch scheidet sich dadurch Kaliumbitartrat aus.

**Tartarus boraxatus**, Kali tartaricum boraxatum, Cremor tartari solubilis s. boraxatus, Borax tartarisata, Kali bitartaricum cum Natro biboracico;

#### Borax-Weinstein.

Zur Bereitung dieses Präparates schreibt die Pharmakopoe vor, 2 Th. Borax in 20 Th. Aq. dest. gelöst und 5 Th. Tartarus depuratus pulv. in einem Porzellangefässe im Wasserbade bis zur Auflösung des Weinstein stehen zu lassen und die filtrirte Flüssigkeit zu einer zähen Masse einzudampfen, letztere in dünne Bänder auszuziehen, in mässiger Wärme völlig auszutrocknen, rasch zu pulvern und das Pulver in ein gut schliessendes erwärmtes Glasgefäss zu bringen. Der so bereitete Borax-Weinstein bildet ein weisses, sauer schmeckendes und reagirendes Pulver, welches an der Luft sehr leicht feucht wird und in gleichen Th. Wasser sich löst. Die wässrige Lösung schimmelt leicht.

Das Präparat hat vor dem Tartarus natronatus den Vorzug geringerer Zersetzlichkeit, da es von organischen Säuren, mit Ausnahme der Weinsäure, nicht zersetzt wird. Ob es stärker diuretisch wirkt, ist fraglich. Ure empfahl es zur Auflösung harnsaurer Concremente. Als Abführmittel giebt man 25,0–60,0, doch ist das Präparat theuer und lässt sich bequem und billiger durch eine Mischung von Weinstein 2 Th. und Borax 1 Th. ersetzen.

**Natrium phosphoricum**, Sal mirabile perlatum, Soda phosphorata; **Natriumphosphat**, phosphorsaures Natron, Perlsalz.

Diese Verbindung des Natriums mit gewöhnlicher Orthophosphorsäure wird durch Sättigung der gewöhnlichen Phosphorsäure mit Natriumcarbonat bis zu schwachalkalischer Reaction erhalten und bildet grosse, durchsichtige, schief rhombische Säulen von kühlend salzigem Geschmacke und alkalischer Reaction. Das Salz verwittert an trockner Luft schnell, ohne zu zerfallen, schmilzt bei 40° zu vollkommen klarer Flüssigkeit, verliert aber beim Erwärmen auf 100° sein Krystallwasser und verwandelt sich in der Glühhitze in wasserfreies Natriumpyrophosphat. Es löst sich in 6 Th. kaltem und 2 Th. warmem Wasser. Die wässrige Lösung absorbiert viel Kohlensäure.

Das Natriumphosphat wird seines Wohlgeschmackes wegen als mildes Laxans, namentlich bei wohlhabenderen und empfindlicheren Patienten, nicht selten benutzt. Früher spielte es bei einer Reihe von Erschöpfungskrankheiten eine wichtige Rolle als Medicament, ohne dass sich für seine Wirksamkeit hinreichende Gründe ergeben. Auch ist es bei harnsaurer Diathese und neuerdings gegen Durchfälle der Kinder (Stevenson) empfohlen. Die laxirende Dosis beträgt beim Erwachsenen 15,0—30,0.

Das Natriumphosphat ist bei subcutaner und intravenöser Einführung bei Thieren in Mengen, welche 0,5—1,0 Orthophosphorsäure entsprechen, ohne schädliche Wirkung und wird in 4—7 Stunden durch die Nieren eliminiert; 9,0 bis 10,0 bedingen Erbrechen und Entleerung schmierigen Koths; grössere Mengen bei Infusion (0,3 per Kilo) Tetanus und Adynamie (C. Ph. Falck; Gamgee, Larmuth und Priestley). Auf die Anwendung des Natriumphosphats bei Osteomalacie, Rachitis, Scrophulose, Diabetes u. s. w. hat offenbar der Umstand, dass phosphorsaure Alkalien in allen Flüssigkeiten und Geweben des Organismus sich finden, bestimmend eingewirkt. Es fehlt indessen vollständig an Beweisen für die reconstituirende Wirkung des Salzes, welches bei den angeführten Affectionen natürlich nicht in purgirenden Gaben gereicht werden darf. Die Angabe Böckers, dass Natriumphosphat in grossen Mengen die Ausscheidung von Chlornatrium vermindere und überhaupt alle Körperverluste geringer mache, bedarf sehr der Nachprüfung. — Stevenson empfiehlt das Salz namentlich bei künstlich aufgefütterten Kindern und bei Diarrhoe nach dem Entwöhnen, weniger bei einfacher Diarrhoe, ausserdem bei Dyspepsie Erwachsener, und sucht den Hauptgrund seiner Wirksamkeit in der Beförderung der Assimilation der Fette. Bei Kindern giebt er 0,2—0,6 mit der Nahrung, bei Erwachsenen 1,0—2,0 in wässriger Lösung nach der Mahlzeit.

Als Laxans wird Natriumphosphat in Lösung (Wasser mit Syrupzusatz, ungesalzener Fleischbrühe) gegeben.

**Natrium sulfovinicum s. aethylsulfuricum**, Schwefelweinsaures Natrium, Aethylschwefelsaures Natrium. Das Salz, welches kleine durchsichtige und glänzende Blätter oder sechsseitige Tafeln von süsslich salzigem Geschmacke, die in feuchter Luft zerfliessen und sich ausserordentlich leicht in Wasser und Alkohol lösen, bildet, ist 1870 von Rabuteau als mildes und sicheres salinisches Purgans empfohlen, welches von Kindern und empfindlichen Personen seines nicht unangenehmen Geschmackes wegen gut genommen wird, ohne Schmerz purgirt und selbst während der Menses genommen werden kann, auch keine consecutive Obstipation bedingt. Es wird zum Theil als schwefelsaures, zum Theil als äthylschwefelsaures Salz im Urin ausgeschieden. Bei Kindern sind 10,0, bei Erwachsenen 25,0 anzuwenden. Man reicht das Salz in wässriger Lösung mit Zusatz von Himbeer- oder Kirschsyrup. Ganz analog wirkt nach Rabuteau auch das methylschwefelsaure Natrium, Natrium

sulfomethylicum, welches selbst zu 10,0 in die Venen von Hunden injicirt keine Befindensstörung verursacht.

**Natrium sulfuricum**, **Natrum sulfuricum depuratum**, **Sal mirabile s. catharticum s. polychrestum Glauberi**, **Soda vitriolata**; **Natriumsulfat**, **Glaubersalz**, schwefelsaures Natron.

Das Natriumsulfat, welches sich in vielen Mineralwässern und Salzsoolen findet und bei verschiedenen chemischen Processen (Darstellung rauchender Salpetersäure aus Chilisalpeter, Darstellung der Salzsäure aus Kochsalz und Schwefelsäure) als Nebenproduct resultirt, wird gegenwärtig in grössten Mengen in Stassfurt dargestellt. Es bildet farblose, leicht schmelzende, lange, schiefrhombische Säulen, welche an der Luft unter Verlust des Krystallwassers zu einem weissen Pulver zerfallen und in 3 Th. kaltem Wasser, in 0,3 Th. Wasser von 33° und 0,4 Th. von 100°, dagegen nicht in Alkohol löslich sind. Bei der Auflösung des Glaubersalzes in Wasser wird viel Wärme gebunden. Der Geschmack des Salzes ist unangenehm bitter, etwas kühlend; in Lösungen schmeckt es nur bitter und etwas salzig.

Das Glaubersalz ist das wichtigste aller salinischen Abführmittel und gewissermassen der Repräsentant derjenigen Cathartica, für welche man früher die S. 53 besprochene endosmotische Theorie der Abführwirkung als gültig betrachtete. Die purgirende Wirkung des Natriumsulfats erfolgt beim erwachsenen Menschen nach 10,0—15,0—30,0.

1,0—5,0 Glaubersalz erregt keine Aenderung des Befindens; selbst mehrere Gaben von 5,0, in Zwischenräumen von 5 Std. verabreicht, so dass eine Aufnahme ins Blut stattfinden kann, wirken nicht purgirend, wohl aber, wenn sie in kürzeren Intervallen, bis zu 3 Std., wo noch nicht alles Salz in die Circulation übergegangen ist, wiederholt verabreicht werden (Laveran u. Millon, Buchheim, A. Wagner). Bei Dosen von 10,0 entsteht Kollern im Leibe und Stuhl-drang, welcher mit einiger Anstrengung unterdrückt werden kann, worauf am folgenden Tage die Stühle weichere Beschaffenheit zeigen. 15,0—30,0 erzeugen die erstgenannten Phänomene in kurzer Zeit und in 2—3 Std. eine sehr flüssige Ausleerung, der im Verlaufe von einigen Stunden gewöhnlich noch einige andere folgen; auch bleiben die Faeces am folgenden Tage breiig. Die Concentration der Lösung ist ohne Einfluss auf die purgirende Wirkung des Glaubersalzes (Buchheim, Headland). Nebenerscheinungen kommen beim Natriumsulfat nur selten vor, doch bekommen einzelne Personen danach Ekel und Brechneigung, vielleicht nur in Folge des Geschmackes. Störende Wirkung auf die Verdauung erfolgt bei einmaliger Darreichung purgirender Gaben nicht, wohl aber bei längerer Verabreichung mässiger laxirender Dosen.

Dieselben Effecte wie beim Menschen lassen sich auch beim Thiere erzielen, wenn grössere Mengen Glaubersalz in den Magen eingeführt werden. Die zahlreichen, besonders zur Ergründung der Theorie der Abführwirkung der Mittelsalze angestellten Versuche, wo bei Thieren Natriumsulfatlösung direct ins Blut gebracht wurde, haben bezüglich der Wirkung auf den Darm schwankende Resultate ergeben, beweisen aber, dass das Glaubersalz wie andere Natronsalze die Herzthätigkeit nicht alterirt, sondern den Blutdruck steigert (Jolyet). Schottins Angabe, dass dadurch urämische Erscheinungen bedingt würden, hat sich nicht bestätigt.

Sowohl nach kleineren als nach grösseren Glaubersalzgaben findet Vermehrung der Sulfate im Urin statt; dieselbe ist am erheblichsten bei kleinen Dosen, am geringsten bei sehr grossen, wo in Folge der vermehrten Peristaltik nicht selten fast die ganze



Menge des Mittels mit den Stühlen wieder abgeht (Millon und Laveran, Buchheim).

Das Auftreten reichlicher Mengen Schwefelwasserstoff im Darm nach laxirenden Dosen Glaubersalz scheint durch Reduction vermöge Einwirkung organischer Stoffe bedingt zu werden. Die Harnmenge variirt nach kleinen oder wenig purgirenden Gaben bei Menschen sehr; bei Hunden fand Voit dieselbe etwas vermehrt, Seegen nicht verändert. Die Angabe Seegens, dass bei längerer Darreichung die Ausscheidung von Harnstoff Zunahme erfahre, ist von Voit widerlegt.

Als Purgans benutzt man Glaubersalz sowohl zu einmaliger Entleerung angehäufter Faecalmassen als bei chronischer Obstipation, wo das Mittel besonders gut bei wohlgenährten, kräftigen Personen, die bei sitzender Lebensweise den Freuden einer guten Tafel ergehen sind, passt. Auch chronische Darmkatarrhe sind dadurch zu beseitigen und neuerdings hat Ziemssen die günstigen Wirkungen einer methodischen Glaubersalzcur bei chronischem Magengeschwür nachgewiesen.

Das Glaubersalz kommt auch vielfach als sog. Ableitung auf den Darm bei entzündlichen Affectionen innerer Organe, zumal seröser Häute, bei Meningitis u. s. w. in Anwendung, ohne dass es hier besondere Vorzüge vor drastischen vegetabilischen Mitteln besässe, und kann wegen der dadurch hervorgerufenen wässerigen Entleerungen auch bei Hydrops in Fällen benutzt werden, wo diuretische Mittel ihren Dienst versagen. Amelung rühmt Glaubersalz gegen Milztumoren und andere Folgezustände von Malariaerkrankungen.

Man giebt Glaubersalz als Purgans zu 15,0—50,0, als Digestivum zu 1,0—5,0—10,0.

In der Regel verordnet man es in Substanz, die man im Hause des Kranken lösen lässt, seltener in Solution. Als Geschmacks corrigens dienen Säuren, z. B. Acidum sulfuricum dilutum (1:15—20 des Salzes), Weinsäure, Citronensaft oder kohlensäurehaltige Getränke, doch thut man besser, wenn man ein wohlschmeckendes Purgans reichen will, die *Magnesia citrica effervescens* zu benutzen. *Succus Liquiritiae* verdeckt den Geschmack ziemlich gut. — Nicht selten wird Glaubersalz in Verbindung mit anderen salinischen oder vegetabilischen Abführmitteln gereicht. Glaubersalz und Kochsalz  $\bar{a}\bar{a}$  4 Th., Bittersalz 3 Th. bilden das sog. *Pulvis salinus compositus*; Glaubersalz 8 Th. und Fol. *Sennae* 1 Th. die *Species purgantes Ph. paup.* zu 30,0 mit 3 Tassen Wasser infundirt, wovon man stündlich  $\frac{1}{2}$  Tasse trinkt. Noch complicirter ist das als Purgans bei der Cur von chronischen Hautaffectionen und Syphilis benutzte Guindrésche Salz (mit Salpeter und Brechweinstein).

#### Präparat:

**Natrium sulfuricum siccum**, N. sulf. dilapsum; Entwässertes Natriumsulfat, Man erhält dies Präparat als weisses, feines, lockeres Pulver, wenn man gröblich zerriebenes Natriumsulfat bis zur vollständigen Verwitterung einer 25° nicht übersteigenden Wärme aussetzt und dann bei 40—50° so lange trocknet, bis es die Hälfte seines Gewichtes verloren hat. In seiner Wirkungsweise verhält es sich dem Glaubersalze gleich, purgirt jedoch in doppelt so kleiner Dosis und wird deshalb als Abführmittel zu 5,0—20,0 verordnet. Es ist jedesmal zu dispensiren, wenn der Arzt Natrium sulfuricum in Pulverform verschreibt. Auch zu Suppositorien ist es statt des letzteren zu gebrauchen.

**Anhang.** Das Glaubersalz ist der Hauptbestandtheil einer grossen Anzahl Mineralquellen, welche zum curmässigen Gebrauche des Mittels beliebter als einfache Glaubersalzlösungen sind, besonders da verschiedene vermöge Gehalts von Natriumcarbonat und Kohlensäure angenehmer zu nehmen sind. Es sind dies die sog. alkalisch-salinischen Quellen, namentlich die verschiedenen

Quellen von Karlsbad, der einzigen Therme dieser Art, welche 12 verschiedene Quellen (Sprudel, Mühlbrunnen, Schlossbrunnen u. s. w.) hat, Marienbad (besonders Krenz- und Ferdinandsbrunnen) und die Salzquelle in Franzensbad (sämtlich im böhmischen Kreise Eger), die Salzquelle in Elster (im sächsischen Voigtlande) und die Lucius- und Emeritaquelle von Tarasp im Unter-Engadin, die vermöge ihres Gehaltes an Kochsalz sich zwischen die salinisch-alkalischen und die muriatisch-alkalischen Quellen, zwischen Karlsbad und Kissingen, stellen. Die betreffenden Quellen enthalten in 1000,0 Flüssigkeit 2,15–6,36 Natriumsulfat.

Als künstliches Karlsbader Salz, *Sal Carolinum factitium* s. *Sal thermarum Carolinarum factitium*, ist eine Mischung von 44 Th. Natrium sulfuricum siccum, 2 Th. Kaliumsulfat, 18 Th. Natriumchlorid und 36 Th. Natriumbicarbonat officinell. Von diesem Pulver geben 6,0 in 1000,0 Wasser gelöst ein dem Karlsbader ähnliches Wasser. Man giebt es auch als Abführmittel zu 8,0–15,0, in geringeren Dosen bei rheumatischen Magenkatarrhen. Ziemssen empfahl dasselbe zur Cur bei *Ulcus ventriculi* zu 8,0–15,0 in 500,0 Wasser Morgens nüchtern alle 10 Minuten zu  $\frac{1}{4}$  genommen, bei ausbleibender Purgirwirkung in concentrirteren Lösungen.

**Magnesium sulfuricum, Sal amarum, Sal Anglicum; Magnesiumsulfat, Bittersalz, Englisches Salz.**

Das Magnesiumsulfat wurde früher entweder durch Verdampfung bitter-salzhaltiger Mineralquellen oder durch Zersetzung des natürlich vorkommenden Magnesiumcarbonats (Magnesit, Dolomit) mit Schwefelsäure oder aus der Mutterlauge des Meerwassers und der Salzsoolen gewonnen. Jetzt wird dasselbe vorzugsweise in Stassfurt aus dem vorwaltend aus Magnesiumsulfat bestehenden Kieserit und Reichardt durch Auslaugen, Glühen, Auslösen und Wiederauskrystallisiren dargestellt. In Folge rascher Krystallisation bildet das im Handel vorkommende Bittersalz kleine, farblose, prismatische Krystalle, während bei langsamer Krystallisation das Magnesiumsulfat in grossen, vierseitigen, rhombischen Säulen erhalten werden kann. Es hat einen salzig-bittern, kühlenden Geschmack, löst sich in 8,0 Th. kaltem und 0,15 heissem Wasser, dagegen nicht in Alkohol. Die wässrige Lösung ist neutral.

Das Bittersalz gleicht in seiner Wirkung nahezu vollkommen dem Glaubersalz und wird wie dieses, und noch häufiger als dasselbe, zu 15,0–50,0 als Purgirmittel verwendet. Vom Natriumsulfat unterscheidet es sich vielleicht durch eine geringere chologoge Wirkung.

Die Angabe Radziejewskis, dass die durch Magnesiumsulfat bewirkten Stühle keine Galle enthalten, ist durch Rutherford (1879) bestätigt. Nach Laffargue soll Magnesiumsulfat wegen depressirender Wirkung auf das Herz bei Patienten mit Herzklappenfehlern, insbesondere Mitralisinsufficienz contraindicirt sein, während es günstigen Einfluss auf Palpitationen besitzen könnte. Diese Ansicht, welche auf den Ergebnissen von Versuchen von Jolyet und Laffont beruht, wonach lösliche Magnesiumsalze (Sulfat, Acetat, Chlorür), im Verhältnisse von 1:4000 des Körpergewichts in die Venen eingeführt, vorübergehendes erhebliches Sinken des Blutdrucks und Stillstand des Herzens durch Einwirkung auf die in der Medulla und im Herzen belegenden nervösen Centra bedingen, scheint nicht gerechtfertigt, da bei Einführung purgirender Dosen in den Darm so geringe Mengen von Magnesiumsulfat zur Resorption gelangen, dass dadurch eine Wirkung auf das Herz in keiner Weise resultiren kann, dagegen würde eine solche allerdings zu befürchten sein, wenn man grössere Mengen Magnesiumsulfat unter die Haut einspritzte, da Magnesiumsalze in der That nicht ohne Giftigkeit sind und schon 0,5 bei Hunden und 0,3–0,5 bei Kaninchen den Tod herbeiführen können, wenn sie direct in das Blut eingeführt werden. Die Subcutaninjection von Magnesiumsulfat zu purgirenden Zwecken, wozu schon

0,1 nach Luton ausreichen soll, ist übrigens nach neueren Untersuchungen an Thieren unzulässig (Recke).

Am zweckmässigsten giebt man Magnesiumsulfat in Lösung, wobei man als Geschmacks corrigens entweder aromatische Wässer, z. B. Zimtwasser, oder bitter-aromatische Syrupe, wie Syrupus Aurantii corticis, oder Succus Liquiritiae, oder einen Zusatz von Weinsäure oder Citronensäure benutzt. Auch lässt es sich in kohlen säurehaltigen Wässern angenehmer nehmen. Mit Sennesblätter-aufguss und verschiedenen Corrigentien bildet es den in England als Purgans sehr gebräuchlichen schwarzen Trank, Black draught, Potio nigra s. Mixtura Sennae compositae.

#### Präparat:

**Magnesium sulfuricum siccum; entwässertes Magnesiumsulfat.** Das Bittersalz verwittert an der Luft oberflächlich und verliert bei 150° 6 Aeq. und bei 210° auch das 7. Aeq. Krystallwasser. Im Wasserbade bis zu 35—37% Gewichtsverlust verwitterte Magnesia bildet nach Durchsieben ein feines, weisses Pulver, welches unter dem vorgenannten Namen officinell ist und in allen Fällen verabreicht wird, wo Bittersalz in Pulverform verordnet werden soll. Auch zu Pillen und Latwergen eignet sich das Präparat besser als gewöhnliches Sulfat. Die Dosis beträgt  $\frac{2}{3}$  der für letzteres gebräuchlichen Gabe.

Das Bittersalz ist der Hauptbestandtheil der meisten natürlichen Bitterwässer, welche meist auch Natriumsulfat, in einzelnen Quellen (Püllna, Ivanda) überwiegend, und Kochsalz enthalten. Der Procentgehalt des Bittersalzes schwankt in den Bitterwässern zwischen 0,3 und 1,6%, der des Glaubersalzes in ähnlichen Grenzen. Am meisten bei uns benutzt wird das Friedrichshaller Bitterwasser, ein Gemenge von zwei Quellen bei Friedrichshall in Sachsen-Meiningen, welches 0,55% Magnesium- und 0,6% Natriumsulfat enthält. Fast genau dieselbe Zusammensetzung besitzt das Kissinger Bitterwasser und das concentrirte Bitterwasser von Mergentheim, während der Bitterbrunnen von Rehme etwas weniger (0,4%) Glaubersalz enthält. Früher war besonders das Püllnaer Bitterwasser (mit 1,2% Magnesium- und 1,6% Natriumsulfat) gebräuchlich, neben welchem in Böhmen auch noch Saidschütz und Seidlitz Bitterwässer liefern, welche in ihrer Wirkung entschieden schwächer sind. Das stärkste aller Bitterwässer ist die Hunyady János Bittersalzquelle bei Ofen (mit 1,0% Bittersalz und 1,59% Glaubersalz), neben welchem Ungarn noch eine grössere Anzahl anderer kräftiger Bitterbrunnen besitzt. England hat Scarborough und Epsom, welches letztere dem Bittersalz den Namen Epsom Salt, Sal Epsomense, verschaffte. Alle diese Wässer lassen sich wie salinische Abführmittel benutzen.

Aehnlich wie Magnesiumsulfat wirkt auch Magnesium chloratum, Magnesiumchlorid, purgirend (Rabuteau), nach Laborde unter auffälliger Vermehrung der Gallensecretion.

**Kalium sulfuricum, Tartarus vitriolatus depuratus, Arcanum duplicatum depuratum, Sal de duobus; Kaliumsulfat, schwefelsaures Kali,** einfach schwefelsaures Kali.

Von den als Abführmittel benutzten Sulfaten ist das Kaliumsulfat das am wenigsten gebräuchliche, da seine purgirende Wirkung bei Anwendung grösserer Mengen mit gefährlichen Nebenerscheinungen verbunden sein kann. Es bildet farblose, durchsichtige, harte, sechsseitige Säulen oder Pyramiden oder krystallinische Krusten, ist an der Luft auch bei erhöhter Temperatur beständig und löst sich in 10 Th. kaltem und 4 Th. warmem Wasser. Es besitzt einen salzig-bitteren Geschmack. Das Kalium sulfuricum des Handels ist meist ein durch Umkrystallisiren gereinigtes Salz, welches bei diversen chemischen Processen als Nebenproduct gewonnen wird. Zur Zeit der Alchymisten spielte es eine grosse Rolle und hat aus dieser Zeit verschiedene Benennungen, z. B. Sal polychrestum Glaseri, Specificum purgans Paracelsi u. a. m. Es ist zu unterscheiden von dem Kaliumbisulfat, Kalium bisulfuricum s. Kali



sulfuricum acidum s. Tartarus vitriolatus acidus, welches sich leichter in Wasser löst und früher ebenfalls als Purgans und mit Kalium aceticum zur Herstellung von Riechsalz diente.

**Radix Rhei, Radix Rhabarbari; Rhabarberwurzel, Rhabarber.**

Unter Rhabarber versteht man die Rhizome einer oder mehrerer auf den Hochebenen von Centralchina einheimischer Species der Gattung Rheum (Fam. Polygoneae), vorzugsweise wohl von Rheum officinale Baillon.

Von den Rheumarten, welche nacheinander als Mutterpflanzen des asiatischen Rhabarbers angesehen wurden, insbesondere Rheum palmatum L., Rrh. undulatum L., Rh. compactum L. und Rh. australe (Rheum Emodi Wall.), liefert keine die wirkliche Rhabarberwurzel. Die im Jahre 1867 von dem französischen Consul Dabry nach Europa gebrachte Rhabarberart, welche von Baillon mit dem Namen Rheum officinale belegt wurde und im südöstlichen Tibet zur Gewinnung der Rhabarberwurzel cultivirt werden soll, liefert allein ein Rhizom, welches in seiner Structur dem asiatischen Rhabarber des Handels entspricht. Neuerdings hat Przewalski wiederum eine besondere Varietät von Rheum palmatum, Rh. p. var. Tangutianum, als Mutterpflanze des Rhabarbers in der chinesischen Provinz Kansu bezeichnet, doch hat Dragendorff diese Wurzel als dem echten Rhabarber nicht entsprechend erklärt. Rheum officinale wird jetzt in grösserem Maassstabe von Usher bei Bodicott in England cultivirt.

Die Rhabarberwurzel kommt fast ganz geschält in Stücken von sehr verschiedener Gestalt und Grösse (vom Umfange einer Wallnuss bis zu dem einer Faust), welche häufig mit einem Bohrloche versehen sind, im Handel vor. Das sehr dichte Gewebe erweist sich auf der frischen Bruchfläche zerschlagener Stücke als Gemisch aus einer körnigen, nicht faserigen, glänzend weissen, aus Amylum und Kalkoxalat enthaltenden Zellen gebildeten Grundmasse und braunrothen Markstrahlen, welche in den inneren Theilen regellos verlaufen, in der Nähe der Oberfläche Strahlenkreise von höchstens 1 Cm. Durchmesser bilden und nur in der sehr schmalen äussersten Schicht regelmässige radiale Anordnung zeigen. Auf der Oberfläche ist der Rhabarber fast gleichmässig gelb, glanzlos und mehr oder weniger mit einem gelben Pulver bestreut, nur vereinzelt kleinere oder grössere Residuen der Rinde tragend. Das Pulver der Rhabarberwurzel ist hochgelb, der Geruch eigenthümlich, der Geschmack widrig bitter adstringirend; gekaut knirscht Rhabarber zwischen den Zähnen und theilt dem Speichel eine intensiv gelbe Färbung mit.

Man unterschied in früherer Zeit den auf dem Landwege über Sibirien und Russland zu uns gelangenden Rhabarber als sog. Sibirischen, Russischen oder Moskovitischen Rhabarber, Radix Rhei Sibirici s. Rossici s. Moscovitici, von dem über Canton auf dem Seewege importirten Chinesischen oder Indischen Rhabarber, Radix Rhei Chinensis s. Indici, auch Canton-Rhabarber, Englischer oder Holländischer Rhabarber genannt.

In früherer Zeit hatte die russische Regierung an der chinesischen Grenze eine besondere Station zur Prüfung des eingeführten Rhabarbers, dessen Weiterverbreitung sie zeitweise vollständig monopolisirte, wo ein von der Regierung ernannter Apotheker alle unansehnlichen, verdorbenen und fremdartigen Stücke beseitigen und die ausgesuchten völlig zu schälen, zu säubern, anzubohren oder entzwei zu brechen hatte. Davon hat der sog. Kronrhabarber, die früher von der russischen Regierung meist an die Kronapotheken abgegebene beste Waare, seinen Namen. Seit 1863 hat indess diese Einrichtung vollständig aufgehört und existirt jetzt gar kein Kronrhabarber mehr, wie überhaupt schon seit 1852 nur wenig Rhabarber über Russland zu uns gelangt. Gegenwärtig bezieht sogar Russland seinen Rhabarber über England, wohin er vorzugsweise von Hankow über Shangai gelangt. Es sind namentlich die Provinzen Shensi,

Kansu und Szechuen, welche Rhabarber liefern; nach F. von Richthofen stammt die beste Sorte von den Hochalpen des westlichen Szechuen, während die in den Ebenen der Provinz cultivirte Pflanze schlechtere Sorten liefern soll.

Bei dem theueren Preise der asiatischen Waare hat man wiederholt in europäischen Ländern den Anbau von Rheumarten versucht, ohne dass jedoch, vielleicht weil nicht die richtige Rheumspecies angebaut wurde, bisher eine Rhabarberwurzel erzielt wurde, die in ihren äusseren Eigenschaften und in ihrem arzneilichen Werthe dem Chinesischen Rhabarber gleiche. Im Handel ist englischer, französischer und österreichischer Culturrhabarber vorgekommen, theils mit grossem Geschick dem Chinesischen Rhabarber in Bezug auf die Form nachgeköpft. Der Anbau in England (bei Banbury in Oxfordshire) betraf Rheum Rhaponticum L., welche man auch in Frankreich und in Ungarn cultivirt; während man in Mähren Rheum compactum L. (Austerlitz- und Auspitz-Rhabarber) baut. Rheum Rhaponticum soll in Ungarn eine weit dunklere, mehr rothe, rhabarberähnliche Wurzel liefern als in England. Die Cultur von Rheum australe L. durch Johanny in Bielitz (Schlesien) lieferte nur poröse, sehr lockere Wurzeln von schwachem Rhabarbergeruche, aber mehr rhabarberähnlichem Geschmacke. Allen diesen Sorten fehlt ein ausgebildeter Markstrahlenring; dickere Stücke sind ausserdem meist im Centrum missfarbig und in Zersetzung übergegangen. Sie knirschen nicht unter den Zähnen wie echter Rhabarber (Fehlen von Oxalaten) und geben einen viel weniger dunkelgelben Auszug mit Wasser.

Ob der Rhabarber bereits im Alterthum bekannt gewesen, ist zweifelhaft, indem das Rha barbaron des Dioskorides wie das Rha ponticum der Alten auf die Radix Rhapontici von Einzelnen bezogen wird. Sicher ist, dass bereits im 16. Jahrhundert die echte Rhabarberwurzel von der Rhapontikwurzel wohl unterschieden wurde. Diese letztere stammt von Rheum Rhaponticum L., einer in verschiedenen Theilen Sibiriens und am Schwarzen Meer wachsenden und cultivirten Rheum-Art und kommt geschält in cylindrischen Stücken von rhabarberähnlichem, jedoch matterem Aussehen, von mehr schwammigem Gewebe und mit nicht unregelmässig verlaufenden Markstrahlen, vor. Dieselbe wurde sonst als Surrogat des Rhabarbers benutzt, dessen Geruch und Geschmack sie theilt. In ähnlicher Weise diente im Mittelalter der sog. Mönchsrhabarber, Rad. Rhei Monachorum, der Wurzelstock von Rumex alpinus L. und auch wohl von Rumex Patientia L., zwei europäischen Angehörigen des der Gattung Rheum am nächsten stehenden Genus, welche in Klostergärten cultivirt wurden. In dieser Rumexwurzel findet sich, ebenso wie in der als Grindwurzel, Mangelwurzel, Radix Lapathi s. Oxylapathi, bezeichneten Wurzel von Rumex obtusifolius L., einer bei uns sehr gemeinen Ampferart, die innerlich und äusserlich seit alten Zeiten (Hippokrates) bei Hautkrankheiten Anwendung fand, einer der als Bestandtheil des Rhabarbers mit Sicherheit nachgewiesenen färbenden Stoffe, die Chrysophansäure.

Ueber das oder die activen Principien des Rhabarbers bestehen bis auf den heutigen Tag divergirende Anschauungen. Man hat längere Zeit die nur in geringen Mengen darin vorhandene Chrysophansäure dafür angesehen, neben welcher sich nach Kubly noch Chrysophan und ein bis jetzt nicht benannter krytallisirter Körper findet, von denen das erstere vielleicht im Tractus — wie beim Kochen mit verdünnter Salzsäure — in Chrysophansäure und Zucker sich spaltet. Von den sonst im Rhabarber vorgefundenen harzartigen, als Emodin, Phäoretin, Aporetin und Erythroretin bezeichneten Stoffen wirkt nach Kubly Phäoretin in grossen Mengen purgirend, während Aporetin den Tractus nicht afficirt. In einem gewissen Gegensatze zu den genannten Stoffen steht die Rheumgerbsäure, welche vielleicht zu den dem Rhabarber beigelegten tonischen Wirkungen Beziehung hat. Sicher ist das active Princip vorzugsweise in Wasser löslich, doch auch

in Alkohol, und dürfte deshalb zwar Analogie mit dem später zu erwähnenden activen Princip der Sennesblätter besitzen, jedoch nicht damit völlig identisch sein.

Die Chrysophansäure, auch Parietinsäure (wegen ihres Vorkommens in der Wandflechte, *Parmelia parietina* L.) oder Rheinsäure genannt, in unreinem Zustande als Rhabarberbitter, Rheumnin, Rhabarbarin, Rhabarbergelb u. s. w. beschrieben, kommt im Rhabarber nur in geringer Menge fertig gebildet vor. Sie krystallisirt in orangegelben, goldglänzenden Nadeln oder Tafeln, ist geruch- und geschmacklos, schmilzt bei 162°, löst sich kaum in kaltem, etwas mehr in kochendem Wasser, besser in siedendem Weingeist, Aether und Amylalkohol, am besten in Benzol. Wässrige Alkalien und Ammoniak lösen sie leicht mit schön rother Farbe. Nach den Versuchen von Schlossberger und verschiedenen Schülern Buchheims (Sawicky, Meykow, Auer) ist die aus Rheum dargestellte Chrysophansäure zu 0,5 ohne Einwirkung auf den Tractus. Schroff sah dagegen in einem Versuche mit derselben Menge Chrysophansäure aus *Parmelia parietina* Ructus und wiederholte breiige Stühle erfolgen, welche letztere nach 24 St. auftraten und bis zum fünften Tage sich hinzogen, daneben auch Schwindel, Mattigkeit, Eingenommensein des Kopfes und Appetitlosigkeit. Diese Erscheinungen sind mit der Wirkung des Rhabarber nicht wohl in Einklang zu bringen. Das Chrysophan bildet ein dem Goldschwefel ähnliches, orangefarbiges, krystallinisches Pulver von rein bitterem Geschmack, das sich beim Uebergiessen mit kaltem Wasser braun färbt und allmählig mit gelber Farbe löst. In warmem oder heissem Wasser löst es sich sehr leicht, ebenso in wässrigen Alkalien, nicht in Aether. Beim Kochen mit verdünnter Schwefelsäure oder Salzsäure wird es in Zucker und Chrysophansäure gespalten. Die Rheumgerbsäure ist ein gelblich braunes, hygroskopisches Pulver von herbem Geschmack, leicht in Wasser und Weingeist, nicht in Aether löslich. Die braune wässrige Lösung reagirt sauer, fällt Leim und Eiweiss, dagegen nicht Brechweinsteinlösung; Eisenchlorid wird dadurch schwarzgrün gefärbt. Durch Kochen mit verdünnten Mineralsäuren wird sie in Zucker und eine in kaltem Wasser kaum lösliche Säure, Rheumsäure, gespalten (Kubly).

In kleinen Dosen (0,05—0,25) ist der Rhabarber bei gesunden Individuen ohne besondere Action. Steigerung des Appetits und Förderung der Digestion tritt weniger bei Gesunden als bei Kranken, welche an Magenkatarrhen leiden, hervor. Mehrmals wiederholte kleine Dosen wirken retardirend auf den Stuhlgang, was auch bei regelmässigem Stuhl, auffallender bei Vorhandensein von Diarrhoe, sich zeigt.

Die Wirkung kleiner Dosen ist theils als Folge der Bitterstoffe, theils als solche der Gerbsäure zu betrachten, die, sobald bei Anwendung grösserer Gaben eine hinreichende Menge des purgirenden Principes zur Anwendung kommt, nicht mehr zur Wirkung gelangt. Bei den kleinen Dosen gehen Rhabarberfarbstoffe in das Blut und von da ab in die Secrete über, der Harn färbt sich braungelb (bei alkalischer Beschaffenheit oft braunroth), Sch weiss und Milch gelb. Bei längerer Darreichung soll es zur Bildung von Oxalsäuregries im Urin kommen können (Bidenkap).

Gaben von 2,0—4,0 oder wiederholte Gaben von 0,5—1,5 bedingen Vermehrung der Darmentleerungen; die nach 6—8 Stunden auftretenden Stühle sind breiig, selten flüssig, gelb oder (bei Alkalescenzen) dunkelbraun, was vielleicht zuerst Anlass dazu gegeben hat, dem Rhabarber besondere cholagoge Wirkungen beizulegen, obschon das Colorit der Stühle zum grössten Theile auf Rechnung des Rhabarberfarbstoffes kommt. Gleichzeitig und in den Zwischenpausen gehen übelriechende Darmgase ab.



Cholagoge Wirkung kommt dem Rhabarber nach Versuchen von Rutherford allerdings zu. Als charakteristische Erscheinung der Rhabarberwirkung beim Menschen bezeichnet man das nachträgliche Eintreten von Obstipation nach dem Gebrauche als Purgans; durch zweckmässige Auswahl der Speisen und planmässige Anstrengung der Bauchmuskeln ist man indessen, wie Krahmer richtig bemerkt, wohl im Stande, auch nach vorausgehendem Gebrauche starker Rhabarberdosen rechtzeitig Defaecation zu erzielen. Indessen lässt sich nicht verkennen, dass Rhabarber mehr Tendenz zur Obstipation hinterlässt als z. B. Aloë.

Man giebt Rhabarber als Purgans am zweckmässigsten zu einmaliger Entleerung angehäufter Stercoralmassen, weniger gut bei hartnäckiger Obstipation als dauernd anzuwendendes Abführmittel. Die ausserordentliche Milde seiner Wirkung macht ihn besonders geeignet bei Kindern und schwächlichen Individuen (bei bestehender Anämie oder in der Reconvalescenz von acuten Krankheiten). Nicht unrationell ist auch nach Rutherfords Versuchen die beliebte Verwendung beim Ikterus.

Die Empfänglichkeit gegen Rhabarber ist bei den einzelnen Individualitäten sehr verschieden, so dass manche Personen sogar stärker danach abführen als nach Senna. Die Anwendung gegen Ikterus datirt aus älterer Zeit, wo man den Rhabarber als *anima hepatis* bezeichnete. Er purgirt bei Ikterischen oft, wo Aloë und *Drastica* fehlschlagen, weil letztere zu ihrer Wirkung das Vorhandensein von Galle bedürfen.

Noch häufiger findet Rhabarber in kleinen Dosen Benutzung bei Dyspepsie und chronischen Darmkatarrhen, namentlich im kindlichen Lebensalter.

Besonders gut wirkt er bei Dyspepsie und Durchfall rachitischer und scrophulöser Kinder. Bei acutem Darmkatarrh ist er ganz unzuverlässig und auch bei hartnäckigen chronischen Durchfällen verfehlt er oft seine Wirkung.

Die purgirende Dosis des Rhabarbers ist, wenn man nicht energisch abführen will, auf 1,0—2,0 zu setzen. Will man wiederholte reichliche Stuhlentleerungen erzielen, so muss man 2,5—4,0 darreichen. Als die Verdauung anregendes Mittel kommt der Rhabarber zu 0,1—0,5 in Anwendung. Man giebt Rhabarber in Substanz, in Pulver, Pillen und im Aufguss.

Sowohl Pulver als Aufgüsse haben ihre Schattenseiten, erstere, weil sie sehr schlecht schmecken — die Verdeckung des Geschmacks bei kleinen Dosen wird am besten durch Ingwer, Cardamom, Zimmt bewerkstelligt —, letztere bei beabsichtigter purgirender Wirkung, weil dieselbe danach oft ausbleibt. Auch Pillen werden zweckmässig gelatinisirt. Zu vermeiden sind Metallsalze und Alaun. Zusatz von Mineralsäuren erhöht oft die purgirende Action (vielleicht durch Abscheidung der Chrysophansäure?); Alkalien scheinen sie zu mindern (Krahmer).

Das Kauen von gebranntem Rhabarber (braun oder schwarz gebrannt), *Radix Rhei tosta*, u. a. gegen Durchfälle von Phthisikern empfohlen, ist ganz obsolet; ebenso die Anwendung aus Rhabarberwurzel gedrechselter Pillen.

Aeusserlich als Streupulver bei atonischen Geschwüren ist der Rhabarber obsolet und kann durch billigere tanninhaltige Drogen leicht ersetzt werden.

#### Präparate:

1) **Extractum Rhei s. Rheorum; Rhabarberextract.** Wässrig spirituöses, trockenes Macerationsextract von gelbbrauner Farbe, in Wasser trübe löslich. Ungefähr von gleicher Wirksamkeit wie die Wurzel, daher als Tonicum zu 0,1—0,5. als Purgans zu 0,5—1,0 in Pillen oder in Lösung.

2) **Extractum Rhei compositum**, Extr. catholicum s. panchymagogum; **Zusammengesetztes Rhabarberextract**. Extractum Rhei 30 Th., Extr. Aloë 10 Th., Resina Jalapae 5 Th., Sapo medicatus 20 Th., mit Hülfe von Wasser und Spiritus dilutus zu einem trocknen Extracte vereinigt. Schwarzbraunes, in Wasser mit gelbbrauner Farbe trübe lösliches Pulver. Durch die Beimischung von Aloë und Jalape in seiner Purgirwirkung etwas verstärktes Rhabarberextract, das man als Abführmittel zu 0,2—1,0 in Pillen verwendet.

3) **Tinctura Rhei aquosa; Wässrige Rhabarbertinctur**. Rad. Rhei conc. 100 Th., Kalium carbonicum, Borax aa 10 Th. mit kochendem Wasser 900 Th. übergossen und  $\frac{1}{4}$  St. in verschlossenem Gefässe ausgezogen, dann mit 90 Th. verdünntem Weingeist versetzt und  $\frac{3}{4}$  St. extrahirt, hierauf zu 850 Th. Colatur 150 Th. Aqua Cinnamomi zugesetzt. Klare, rothbraune, nach Rhabarber riechende Flüssigkeit. Dieser früher als Anima Rhei, besser als Infusum Rhei kalinum bezeichnete flüssige Auszug dient zweckmässig zu 10—15 Tropfen bei Kindern und theelöffelweise bei Erwachsenen als Stomachicum, wird auch esslöffelweise als Abführmittel verwendet, ist aber unsicher in seiner Wirkung und verhältnissmässig theuer. Eisensalze, Ammoniakpräparate und Säuren sind zu meiden; erstere, weil die Gerbsäure mit dem Eisen sich verbindet, wodurch die Mixturen ein tintenartiges Aussehen bekommt.

4) **Tinctura Rhei vinosa; Weinige Rhabarbertinctur**. Rad. Rhei, fein zerschnitten, 8 Th., Cortex fruct. Aurantii 2 Th., Fructus Cardamomi 1 Th., mit Vinum Xerense 100 Th. digerirt, im Filtrate der siebente Theil Zucker gelöst. Diese auch als Tinctura Rhei dulcis und zweckmässig als Vinum Rhei bezeichnete Tinctur dient niemals als Abführmittel, sondern stets als Stomachicum und Digestivum, und zwar zu  $\frac{1}{2}$ —1 Theelöffel, oft in Verbindung mit bitter-aromatischen Stoffen, nicht selten auch mit Eisentincturen, obschon die Rücksicht auf das Aussehen der Mixturen dies verbietet. Das Präparat ersetzt die Tinctura Rhei Darelii (Elixir Rhei Darelii, Vinum Rhei), welche früher sehr beliebt war und besonders von Hufeland gerühmt wurde, ein mit Malaga gemachter Auszug aus Rhabarber (1:12), Rosinen, Citronenschalen, Süssholz und Cardamomen, worin ausser Zucker noch Extractum Helenii aufgelöst wurde. Neben dieser süssen Rhabarbertinctur war früher auch noch eine Tinctura Rhei amara (mit Gentiana und Serpentaria) als Stomachicum gebräuchlich.

5) **Syrupus Rhei; Rhabarbersaft, Rhabarbersyrup**. Rad. Rhei 10 Th., Cort. Cinnamomi 2 Th., Kal. carbon. 1 Th. mit 100 Th. Wasser eine Nacht macerirt, in dem Filtrat (80) Saccharum 120 Th. gelöst. Schön rothbrauner Syrup, der stark nach Rhabarber schmeckt. Man giebt ihn theelöffelweise als Abführmittel bei Kindern oder setzt ihn purgirenden Mixturen zu. Säuren sind zu vermeiden, weil der Syrup in Folge des darin enthaltenen kohlensauren Kalium damit aufbraust. Der obsolete Syrupus Cichorii cum Rheo, ein versüßter Auszug aus Cichorienwurzeln und Rhabarber, galt früher für ein nothwendiges Desiderat zur Beseitigung des Meconium bei Neugeborenen!

6) **Pulvis Magnesiae cum Rheo, Pulvis infantum, Pulvis antacidus; Kinderpulver**. Magnes. carbon. 60 Th., Rad. Rhei 25 Th., Elaeosaccharum Foeniculi 40 Th. Dieses ist das sog. Ribkesche oder Hufelandsche Kinderpulver, welches man bei Verdauungsstörungen, Magensäure, Durchfällen und Verstopfung in dem ersten Lebensjahre messerspitzenweise, oft sehr überflüssig, reicht. In älteren Vorschriften enthielt das Ppt. auch Veilchenwurz, selbst Seife (Henslersches Kinderpulver). Es entspricht ziemlich dem Pulvis Rhei compositus (Magnes. carb. 16 Th., Rheum 6 Th., Zingiber 1 Th.), das unter dem Namen Gregory powder bekannt ist.

Mischungen von Rhabarber mit purgirenden Salzen (Kaliumtartrat, Kaliumsulfat) waren früher unter verschiedenen Benennungen, wie Pulvis digestivus, Pulvis Rhei tartarisatus s. digestivus Kleinii, gebräuchlich.

## Verordnungen:

- 1)  $\mathcal{R}$   
*Pulv. Rad. Rhei* 10,0  
*F. c. Mucilag. Gi Arab. q. s. pilul.*  
*No. 100. Obd. gelatina. D. S. Abends*  
 2—5 Stück. (Sog. Rhabarber-  
 pillen.)
- 2)  $\mathcal{R}$   
*Rhad. Rhei pulv.* 3,0  
*Aloës* 2,0  
*Saxonis med.*  
*Myrrhae pulv.*  $\overline{aa}$  1,5  
*Olei Ment. pip. gtt.* 1  
*Syrupi commun.* 4,0  
*F. pilul. No. 120. Comp. D. S. Abends*  
 3—5 Stück. (Compound rhubarb  
 pills s. *Pilulae Rheicompositae*  
 Ph. Br.)
- 3)  $\mathcal{R}$   
*Rad. Rhei*  
*Corticis Aurantii*  
*Kalii tartarici*  $\overline{aa}$  10,0

*M. f. pulv. D. S. Mehrmals täglich*  
 2 Theelöffel voll. (Sog. *Pulvis Rhei*  
*tartarisatus* s. *Pulvis lenitivus*  
*tartarisatus*.)

- 4)  $\mathcal{R}$   
*Rad. Rhei* 6,0  
*Magnesii carbonici* 12,0  
*Rhizomat. Zingiberis* 3,0  
*M. f. pulv. D. in scatula. S. Mehrmals*  
 täglich  $\frac{1}{2}$ —1 Theelöffel. (Com-  
 pound powder of rhubarb s.  
*Pulvis Rhei compositus*.)

- 5)  $\mathcal{R}$   
*Tinct. Rhei vinosae*  
*Elixir. Aurantii comp.*  $\overline{aa}$  15,0  
*M. D. S. Dreimal täglich*  $\frac{1}{2}$  Thee-  
 löffel. (*Digestivum*.)

## Folia Sennae; Sennesblätter.

Unter dem Namen Sennesblätter sind die Fiederblättchen von *Cassia acutifolia* Delil. (*Cassia lenitiva* Bisch., *Senna acutifolia* Batka) und *Cassia angustifolia* Vahl. (*C. elongata* Lemaire) officinell.

Die Blättchen der ersten Sorte bilden die Alexandrinische Senna, auch als Tribut- oder Palt-Senna, Séné de la Palte, bezeichnet, welche aus Ober-egypten und Nubien stammt und über Alexandria nach Europa gelangt. Die Alexandrinischen Sennesblätter sind lederartig, spitz, eiförmig, oben grün, unterseits bläulichgrün, am Grunde ungleich geädert, am Rande gewimpert, an den Blattnerven mehr oder weniger behaart, 1—2, höchstens 3 Cm. lang und 4—9 bis höchstens 13 Mm. breit. Sie werden von wildwachsenden Exemplaren der genannten, fast strauchigen Leguminose gesammelt. Zwischen den Alexandrinischen Sennesblättern finden sich gewöhnlich Blattstiele und Blüthenheile der Pflanze, sowie grössere oder geringere Mengen der Blätter und Blüthenköpfchen von *Solenostemma Arghel* Hayne, welche, in Gestalt und Grösse den Sennesblättern ähnlich, jedoch dicker, graulich grün, an der Basis gleich, an der Oberfläche sehr runzlig, einnervig und beiderseits mit kurzen starren Härchen besetzt sind. Sie sind stark gerbstoffhaltig, bitter, nach Versuchen von Schroff, der Aufgüsse von 8,0—12,0 nehmen liess, nicht purgirend. Von cultivirten Exemplaren von *Cassia angustifolia* stammen die früher nicht in den Apotheken zugelassenen Indischen Sennesblätter oder Tinnivelly-Sennesblätter, die unbeschädigten, lanzettlichen, bis 6 Cm. langen und bis gegen 2 Cm. breiten, flachen Fiederblättchen, welche in ihrer Wirksamkeit der Alexandrinischen Senna nicht nachstehen, dagegen einen angenehmeren Geschmack und Geruch besitzen. Die Aufgüsse enthalten mehr Schleim als die der Senna Alexandrina. Von *Cassia angustifolia* stammt auch die Arabische oder Mecca-Senna, die auch über Bombay als Indische Senna nach Europa gelangt, meist aber ebenfalls andere Pflanzentheile beigemischt enthält und weit weniger gut getrocknet ist. Alte Senna von bräunlicher oder gelblicher Farbe ist nicht zu verwenden. Verwerflich ist auch die aus Fragmenten von Sennesblättern, Blattstielen und allerlei Unreinigkeiten bestehende sog. *Senna parva*, obschon die



ältere Ansicht, dass die Blattstiele mehr Kolikschmerzen erregen, eine irrig ist. Die Sennesfrüchte, sog. *Folliculi Sennae*, von den Arabern als stärker purgirend bezeichnet, kommen im Handel nur noch ausnahmsweise vor. — In Amerika werden die Blätter von *Cassia Marylandica* theilweise statt unserer Sennesblätter gebraucht.

In Frankreich sind früher wiederholt tödtliche Vergiftungen durch Substitution der Blätter von *Coriaria myrtifolia* für Sennesblätter vorgekommen; die Blätter sind ebenfalls lederartig, aber dreinervig und an der Basis symmetrisch.

Als purgirendes Princip der Sennesblätter ist nach Untersuchungen von Kubly eine glykosidische Säure, die Cathartinsäure, anzusehen, welche einen geringen Schwefel- und Stickstoffgehalt besitzt und schon zu 0,1 (besonders in Alkali gelöst) flüssige Darmentleerungen bewirkt. Die daraus durch Behandeln mit Salzsäure resultirende Cathartogeninsäure wirkt ebenfalls, aber schwächer purgirend.

Durch Kublys Untersuchungen sind die älteren Angaben, dass das active Princip der Senna Cathartin (Lassaigne und Feneulle) oder ein gelber Farbstoff, der von Martius für Chrysophansäure gehalten wurde, sei, als abgethan zu betrachten. Das Cathartin ist ein völlig unreiner Körper, nur ein Extract, das schon deshalb nicht das active Princip sein kann, weil es mit Alkohol, worin sich der wirksame Bestandtheil fast gar nicht löst, gemacht wurde. Die Chrysophansäure oder ein Sennafarbstoff kann nicht der wirksame Bestandtheil sein, weil auch nach völligem Ausziehen mit Alkohol der Rückstand der Sennesblätter stark purgirend wirkt. Nach Bourgoin und Bouchut (1870) sind an der Wirkung der Senna die Cathartinsäure, welche jedoch bei Kindern erst zu 3,0 wirken soll, und das Cathartin, welches noch schwächer wirkte, theiligt, dagegen nicht der Sennesblätterschleim und eine als Cathartomannit bezeichnete, bereits von Kubly aufgefundene Substanz, welche offenbar eben so wenig wie die übrigen Stoffe der französischen Autoren rein war, und ist das Cathartin aus Chrysophansäure, die bei Kindern zu 1,0 purgirt, und einem zu 2,0 abführenden, in Aether unlöslichen Theile zusammengesetzt. Bley und Diesel (1849) wollen in der Senna ein wirkungsloses gelbes (Chrysoretin) und ein brechenerregendes braunes Harz gefunden haben. Im weingeistigen Auszuge fanden Ludwig und Stütz (1864) zwei glykosidische Bitterstoffe, Sennakrol und Sennapikrin. Das angeblich zu 0,3—0,4 purgirende Sennin von Rau (1866) ist offenbar ein Kunstproduct. Sennesblätter liefern 8—9—12% Asche, die zu  $\frac{3}{4}$  aus Kalk, Magnesia und Kaliumcarbonat besteht.

Das wirksame Princip der Sennesblätter ist ausserordentlich leicht zersetzlich. Bei längerer Aufbewahrung verlieren dieselben sehr an Wirksamkeit. Dampft man wässrige Aufgüsse an der Luft zur Trockne ab, so findet Abschwächung, bei Wiederholung fast totale Zerstörung der Abführwirkung statt. Kochen mit Alkalien und Säuren wirkt ebenso (Buchheim). In Alkohol ist das wirksame Princip nicht löslich, weshalb alkoholische Auszüge schlechte Präparate sind.

Senna wirkt nach den Berichten von Reisenden in Nubien nicht purgirend auf Kameele, welche die grünen Blätter begierig verzehren, scheint aber sonst Säugethiere (Schweine, Hunde, Katzen, Pferde) in gleicher Weise wie Menschen zu afficiren.

Beim Menschen treten nach Dosen unter 0,5 gar keine Wirkungen ein. Nach 1,0—2,0 erfolgt Abgang von Blähungen und in 5—7 Stunden weicher Stuhl, meist ohne Kolikschmerzen, welche letzteren sich nach 2,0—4,0 fast regelmässig einfinden.

Bei Dosen von 8,0—12,0 tritt weicher oder flüssiger Stuhl schon früher ein (in 3—4 St.), meist in den nächsten Stunden von weiteren diarrhoischen

Entleerungen gefolgt; hier kommt es auch zu Aufstossen, Uebelkeit und bisweilen zu Erbrechen; Kolikschmerzen sind manchmal sehr heftig; Kollern im Leibe und dünnflüssige Beschaffenheit der Dejectionen hält auch noch wohl bis zum nächsten Tage an, wo sich nicht selten geringe Störung des Appetits und Zungenbelag findet. Längere Obstipation folgt, wie schon Schwilgué angiebt, auch auf grössere Dosen Senna nicht. Stark purgirende Dosen sollen ihren Einfluss auch auf den Uterus ausdehnen und bei bestehender Gravidität zu partieller Lösung der Placenta, Blutungen und Abortus Veranlassung geben können. Bestehende Uterin- und Hämorrhoidalblutungen scheinen dadurch gesteigert zu werden (Gubler).

Eigentliche physiologische Versuche, soweit solche sich nicht auf die Ermittlung des wirksamen Stoffes beziehen, liegen in Bezug auf Senna nur wenige vor. Der Farbstoff der Senna geht schon in 15 Min. in den Urin über (Martius); die Schicksale des eigentlichen *Principium activum* im Organismus sind nicht bekannt. Die Beobachtung, dass Säuglinge Durchfälle bekommen, wenn die Mutter oder Amme Senna-Aufguss genommen, beweisen nicht mit Sicherheit den Uebergang der Cathartinsäure in die Milch, die auch, da das Mittel jedenfalls im kranken Zustande einverleibt wurde, in anderer Weise alterirt sein könnte. Regnaudet sah bei einem Manne nach Einspritzung von 15,0—30,0 Senna-Aufguss in die Vene nach der kleineren Gabe nur etwas vorübergehenden Kopfschmerz, nach der zweiten Erbrechen und Durchfall eintreten. Auch beim Hunde bedingt Infusion grosser Mengen von Senna-Aufguss starke Steigerung der Peristaltik und Erbrechen (Courten). Die Gallenabsonderung vermehrt Senna nicht (Radziejewski, Rutherford). Bestimmte Wirkung auf Puls und Körperwärme hat Senna nicht; meist findet zur Zeit der Stühle Herabsetzung, später Erhöhung statt. Martius fand schon vor dem Eintritte der Entleerung Pulsverlangsamung, welche sich später ausglich. Offenbar kommen hierbei Dosirung und Individualität besonders in Betracht.

Die Stühle enthalten viel Natron (C. Schmidt), jedoch nicht so viel, dass dasselbe nicht aus dem Pankreassaft herkommen könnte (Radziejewski).

Die zuerst von arabischen Aerzten erprobten Sennesblätter sind das beliebteste Abführmittel, zu welchem das Volk fast in allen Fällen greift, wo ein Laxans gebräuchlich ist. Auch dem Arzte, der das alte: *Qui bene purgat, bene curat* zum Wahlspruche nimmt, sind sie unentbehrlich.

Besondere therapeutische Indicationen und Contraindicationen für die Sennesblätter zu geben, ist schwierig. Bei Hartleibigkeit sind sie dem Rhabarber vielleicht vorzuziehen, weil sie weniger Neigung zu Verstopfung hinterlassen; doch macht dieser letztere sicherer breiige, die Senna leichter flüssige Stühle. Das *Pulvis Liquritiae compositus* (vgl. die Präparate) ersetzt abführende Rhabarber- und Aloëpillen recht gut. Mit Ausnahme von starker Darmentzündung, welche durch Sennesblätter, wie durch *Drastica* überhaupt, gesteigert werden könnte, und starkem Widerwillen gegen den Geruch und Geschmack der Senna ist eine Contraindication nicht gegeben.

Die Dosis der *Folia Sennae* ist, wenn man gelind eröffnend wirken will, 1,0—2,0, zu stärker purgirender Wirkung 2,0—5,0.

Die Sennesblätter werden, von den officinellen Präparaten abgesehen, fast ausschliesslich im Aufguss gegeben. Man lässt einen solchen häufig im Hause bereiten oder verordnet 7,5—15,0 auf 150,0 Colatur, wovon man zweistündlich 2 Esslöffel giebt. Nicht selten löst man darin abführende Salze auf.

Der Sennesblätteraufguss schmeckt am besten, wenn er kalt bereitet wird, während eine Abkochung wegen ihres abscheulichen Geschmackes ungern genommen werden dürfte. Letztere wirkt eher schwächer als stärker als *Maceration* oder *Infus*, erregt übrigens keinesweges, wie man behauptet hat, heftigere Kolikschmerzen, die man bei einem Mittel, das auf die Peristaltik des Dick-

darms so erregend wirkt wie die Senna, wohl unter keinen Umständen vermeiden kann.

Zur Correction des widrigen Geschmacks und auch des Geruches, der Manchen höchst lästig afficirt, sind besonders Kaffee, ferner der Zusatz organischer Säuren, z. B. Acidum tartaricum, von der eine Zersetzung des wirklichen Princips nicht zu erwarten ist, oder aromatische Substanzen (Zucker mit etwas Bittermandelöl, Elaeosaccharum Citri) empfehlenswerth. Letzteren rühmt man mit wenig Recht nach, dass sie Kolikschmerzen vorbeugen, während man andererseits in bitteren Stoffen ein Verstärkungsmittel der Purgirwirkung der Senna sieht. Bisweilen giebt man auch Senna-Aufguss im Klystier.

Die bei dem Gebrauche von Sennesblättern sich geltend machenden Kolikschmerzen sollen nach der Ansicht verschiedener Autoren auf beigemengten Harzen beruhen und sich nicht bei den früher officinellen *Folia Sennae spiritu extracta* s. *Folia Sennae sine resina* finden, die man dadurch erhält, dass man Sennesblätter in 4 Th. Spiritus 2 Tage lang macerirt, dann auspresst und trocknet. Indessen ist dieser Glaube irrig, dagegen entzieht die Maceration mit Spiritus den Blättern einen grossen Theil des den für manche Personen ausserordentlich unangenehmen, den Geruch und Geschmack bedingenden Stoffes, so dass die mit Spiritus ausgezogenen Sennesblätter in der That, weil sie nur rein schleimig schmecken, zu bevorzugen sind. Sie sind in derselben Dosis und Form wie die *Folia Sennae* zu geben und bildeten früher einen Bestandtheil der noch jetzt officinellen *Species laxantes*.

#### Präparate:

1) **Species laxantes, abführender Thee.** 16 Th. Sennesblätter, 10 Th. Hollunderblüthen, je 5 Th. Fenchel und Anis, 4 Th. Weinstein. Die zerschnittenen Sennesblätter werden zunächst angefeuchtet und mit dem Weinstein möglichst gleichmässig bestreut und gemischt, dann getrocknet und den übrigen Substanzen beigemengt. Zum Aufguss ein Theelöffel auf eine Tasse Wasser. Ersetzt den im vorigen Jahrhundert als Verjüngungsmittel gepriesenen St. Germain-Thee, *Species laxantes* St. Germain.

2) **Pulvis Liquiritiae compositus, Pulvis Glycyrrhizae compositus, Pulvis pectoralis Kurellae; Brustpulver.** Fol. Sennae, Rad. Liquiritiae  $\text{aa}$  2 Th., Fructus Foeniculi, Sulfur depuratum  $\text{aa}$  1 Th., Saccharum opt. 6 Th. Bei Erwachsenen theelöffelweise, bei Kindern messerspitzenweise, 1–3 mal täglich. Nimmt sich besser in der von Kurella angegebenen Form mit  $\frac{1}{5}$  Th. Wasser.

3) **Electuarium e Senna, Electuarium lenitivum; Senneslatwerge.** Fol. Sennae pulv. 10 Th., Syrupus simplex 40 Th., Pulpa Tamarindorum 50 Th., im Wasserbade erwärmt. Dicke, grünbraune Latwerge, die, für sich theelöffelweise mehrmals täglich genommen, ein beliebtes Abführmittel darstellt.

4) **Infusum Sennae compositum; Wiener Trank.** Fol. Sennae, zerschnitten, 5 Th., mit kochendem Wasser 30 Th. übergossen und 5 Min. im Wasserbade unter häufigem Umrühren stehen gelassen, ausgedrückt, in der Colatur Tartarus natronatus 5 Th., Manna communis 10 Th. gelöst, so dass die Colatur 40 Th. ausmacht. Klare, braune Flüssigkeit, die man als gelinde eröffnendes Mittel esslöffelweise, als Laxans zu 60,0–100,0 benutzt. Die ursprüngliche Aqua laxativa Viennensis, welche durch die Vorschrift der Pharmakopoe genügenden Ersatz findet, war ein complicirter Aufguss von Sennesblättern, Korinthen und Coriander, mit Zusatz von Manna und Tartarus depuratus. Infusum Sennae compositum verdirbt leicht und darf nicht auf längere Zeit verordnet werden.

An Stelle des Infusum Sennae compositum oder neben demselben haben ausländische Pharmakopöen verschiedene Lösungen von Magnesium sulfuricum oder Natrium sulfuricum in Sennesblätteraufguss mit Manna oder Succus Liquiritiae, z. B. die Potio nigra Anglorum (Black draught), das Apozema purgans, die Mixtura Sennae composita u. a. m.



5) **Syrupus Sennae; Sennasyrup.** Derselbe wird bereitet, indem man Fol. Sennae 10 Th. und Fructus Foeniculi 1 Th. nach Durchfeuchtung mit 5 Th. Weingeist mit kochendem Wasser 45 Th. 20 Min. in geschlossenem Gefässe digerirt und in 95 Th. der ohne Pressen erhaltenen Colatur 65 Th. Zucker auflöst. Eine Mischung des braunen Syrups mit aa Syrupus Mannae giebt den in der Kinderpraxis theelöffelweise für sich oder als purgirenden Zusatz zu Mixturen häufig verwendeten **Syrupus Sennae cum Manna**.

Die Cathartinsäure ist von Hiller in alkalischer Lösung subcutan zu 0,2—0,3 gut purgirend gefunden, doch ist dieselbe bei habitueller Verstopfung wegen zu grosser Dosen kaum brauchbar.

#### Verordnungen:

- |   |  |
|---|--|
| <p>1) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Infusi foliorum Sennae Spiritu extractorum</i> (e 8,0) 150,0<br/> <i>Acidi tartarici</i> 2,0<br/> <i>Syrupi Cerasorum</i> 30,0<br/> <i>M. D. S.</i> Stündlich 1 Esslöffel.<br/>           (Krahmer.)</p> | <p><i>Natrii sulfurici</i><br/> <i>Mellis depurati</i> aa 15,0<br/> <i>M. D. S.</i> Alle 2 Std. 2 Esslöffel.<br/>           (Infusum Sennae salinum Ph. Russ.) Billig.</p>   |
| <p>2) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Infusi fol. Sennae Spiritu Vini extract.</i> (e 2,0) 75,0<br/> <i>Syrupi mannati</i> 25,0<br/> <i>M. D. S.</i> Stündlich 1 Theelöffel. (Abführmittel für kleine Kinder.)</p>                             | <p>5) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Infusi foliorum Sennae</i> (e 15,0) 500,0<br/> <i>Natrii sulfurici</i> 15,0<br/> <i>M. D. S.</i> Zu 2 Klystieren. (Lavement purgatif Ph. Gall.)</p>   |
| <p>3) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Infusi Sennae compositi</i> 30,0<br/> <i>Syrupi mannati</i> 10,0<br/> <i>M. D. S.</i> Stündlich 1 Theelöffel. (Hydromel infantum Ph. Austr.)</p>   | <p>6) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Fol. Sennae</i> 10,0<br/> <i>Rad. Rhei</i> 15,0<br/> <i>Affunde</i><br/> <i>Aq. fervidae q. s. ad colaturam</i> 100,0<br/> <i>Natrii sulfurici</i> 15,0<br/> <i>Mannae</i> 60,0<br/> <i>Cola. M. D. S.</i> Morgens auf 2 Mal zu nehmen. (Apozema purgans s. Médecine noire Ph. Gall.)</p> |
| <p>4) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Foliorum Sennae</i> 15,0<br/> <i>Affunde</i><br/> <i>Aq. fervidae q. s. ad colaturam</i> 150,0</p>   |  |

#### Cortex Frangulae, Cortex Rhamni Frangulae; Faulbaumrinde.

Den Sennesblättern in der Wirkung am nächsten steht die von dem Stamme und dickeren Zweigen des bei uns einheimischen Faulbaumes, *Rhamnus Frangula* L., eines Strauches aus der Familie der Rhamneen, gesammelte Rinde.

Sie bildet fusslange, gerollte, 1,5 dicke Stücke, ist aussen grau oder matt-bräunlich, mit zahlreichen, oft Querbänder bildenden Wärrchen versehen, bei älteren Exemplaren rissig, innen dunkelbraun, von gelbem, fasrigem Längsbruche. Frisch riecht sie widerlich und schmeckt etwas süsslich und bitter. Das wirksame Princip der Faulbaumrinde scheint in einer der Cathartinsäure sehr ähnlichen oder mit ihr identischen glykosidischen Säure (Frangulasäure nach Wiggers), welche darin reichlicher als in den Sennesblättern vorkommt, zu bestehen (Kubly), während der gelbe, schön krystallisierende Farbstoff, das Frangulin oder Rhamnoxanthin (Avornin von Kubly?), welcher ebenfalls glykosidischer Natur ist, ohne Wirkung auf den Darm ist. Frische Rinde wirkt emetisch und stärker irritirend auf den Darm, weshalb nur mindestens 1 Jahr in den Apotheken aufbewahrte in Anwendung kommen sollte. Auch die

Frangulasäure, die zu 0,5 beim Erwachsenen purgirend wirkt (Björnström), soll aus frischer Rinde dargestellt weit irritirender sein als aus alter. Die aus derselben beim Kochen mit Salzsäure resultirende Frangulinsäure ist ebenfalls purgirend. Die Wirkung resultirt sowohl bei Einführung in den Darm als bei Einspritzung in die Venen (Bäumker).

Die in früheren Jahrhunderten (z. B. von Dodonaeus in der 2. Hälfte des 16. Jahrh.) bereits gebrauchte Faulbaumrinde ist durch Schinz (1838) und Gumprecht (1843) wieder in Anwendung gezogen und kommt jetzt als Purgans (ähnlich wie Senna) nicht selten in Gebrauch. Sie färbt den Speichel gelb, bewirkt im Wesentlichen von Seiten des Tractus dieselben Erscheinungen wie Senna; die Stühle erfolgen bei mässigen Gaben ohne Kolikschmerzen, welche nach grösseren Dosen nicht minder heftig wie bei Senna auftreten. Der Farbstoff geht in den Harn über, der durch Alkalien gelb gefärbt wird. Die von Gumprecht behauptete diuretische Wirkung der Faulbaumrinde ist problematisch. Das purgirende Princip scheint in den Beeren von Rhamnus Frangula nur in geringer Menge oder gar nicht vorhanden zu sein, findet sich dagegen in den Samen (Binswanger). Die Rinde von jüngeren Zweigen ist minder wirksam.

Besondere Vorzüge besitzt das Mittel vor der Senna nicht, wenn man von der Billigkeit absieht. An Sicherheit der Wirkung steht es der Senna keinesweges nach. Gumprecht rühmte es besonders bei habitueller Obstipation und Hämorrhoidal-leiden und gab es im Decocto-Infusum (mit Herba Millefolii, Cort. fruct. Aurantii oder Fructus Carvi) tassenweise.

Meist giebt man eine Abkochung von 8,0—15,0—30,0 auf 150,0—180,0, zweckmässig mit Syrupus corticis Aurantii als Corrigens, nöthigenfalls mit Zusatz von Natriumsulfat, wenn stärkere Wirkung erwartet wird (Kersten). Aufguss ist wenig wirksam.

Ogilvie empfiehlt ein Fluid-Extract zu 10,0—12,0, bei Kindern zu 5,0, Reich eine Tinctur zu 1—2—4 Theelöffel für sich oder in kohlensäurehaltigem Wasser.

#### **Fructus Rhamni catharticae, Baccae Spinae cervinae, Baccae Rhamni catharticae; Kreuzdornbeeren.**

Die im September gesammelten reifen Beeren des Kreuzdorns, Rhamnus cathartica L., eines in ganz Europa einheimischen Strauches aus der Familie der Rhamneen, dienen im frischen Zustande zur Darstellung des durch Auflösen von 65 Th. Zucker in 35 Th. Saft gewonnenen, violettrothen **Kreuzdornbeeren-syrups**, Syrupus Rhamni catharticae s. Syrupus Spinae cervinae s. Syrupus domesticus, der namentlich als Volksmittel bei Erwachsenen esslöffel-, bei Kindern theelöffelweise als Abführmittel gegeben wird, übrigens als Kindermittel zwar besser als Syrupus Rhei, aber schlechter als Syrupus Mannae schmeckt.

Die reifen Kreuzdornbeeren sind kugelförmig, erbsengross, am Grunde von einer kleinen achtstrahligen Scheibe gestützt, fast schwarz, glatt; sie enthalten grünlich violetten, sauer reagirenden Saft und in 4 Fächern je einen knorpligen, dreieckigen Samen. Sie sind ohne Geruch, aber von widrigem, süsslich bitterem Geschmacke. Die damit verwechselten Früchte von Rhamnus Frangula enthalten nur 2—3 zusammengedrückte, hellbraune Samen. 20—25 Kreuzdornbeeren purgiren ziemlich heftig und 30,0 Saft haben starke drastische Wirkung (Binswanger). Ueber das wirksame Princip sind wir ziemlich im Unklaren, da der als Rhamnocathartin von Hubert, Winckler und Binswanger beschriebene unkrystallisirbare Bitterstoff, welcher nach Strohl und Wieger zu 0,5 flüssige Stühle bedingt, die spät eintreten, aber lange anhalten, offenbar

nicht rein war. Nicht mit der Purgirwirkung in Zusammenhang stehen die Farbstoffe, von denen in den reifen Beeren besonders das Rhamnin von Stein (Xanthorhamnin von Jellatly, Rhamnegin von Lefort), in den unreifen dessen bei Behandlung mit Säuren neben einem eigenthümlichen Zucker auftretendes, vielleicht mit Quercetin identisches Spaltungsproduct, das Rhamnetin von Stein (Rhamnin von Fleury, Chrysorhamnin von Kane), vorhanden sind. Ein aus den (ausserdem auch in den Früchten anderer Rhamnusarten, z. B. den Avignonkörnern und Persischen Gelbbeeren, sich findenden) Farbstoffen dargestellter Farblack ist das sog. Saftgrün.

### Aloë, Aloë Capensis s. lucida; Aloë.

Unter der Bezeichnung Aloë versteht man den zur festen Consistenz eingekochten Saft der Blätter verschiedener in tropischen und subtropischen Ländern, besonders Afrikas, wild wachsender und auf einzelnen Westindischen Inseln cultivirter, lilienartiger, strauchiger oder krautiger Gewächse aus der Gattung Aloë L. und den davon durch neuere Botaniker abgetrennten Gattungen Pachydendron und Gasteria. Die bei uns ausschliesslich benutzte Sorte, welche von ihrer Herkunft als Capaloë bezeichnet wird, stammt von Aloë spicata L. fil., Pachydendron Africanum Haw., P. ferox Haw., Gasteria Lingua Duv. und vielleicht noch von einigen anderen Species.

Die mehr als fusslangen Blätter der die Aloë liefernden Liliaceen bestehen aus einer etwa 1 Mm. dicken, festen, von Chlorophyll grünen Aussenschicht (Rinde), einem voluminösen, farblosen, saftreichen Mark und den zwischen beiden belegenen Gefässbündeln, welche letzteren nach aussen zu von einem einfachen oder vielfachen Kreise ziemlich grosser Parenchymzellen (Bastlager) umgeben sind. Die letzteren führen den gelben, safranähnlich riechenden Saft, welcher eingetrocknet die Aloë bildet, während das Mark Schleim enthält. Durch verschiedenartige Behandlungsweise des Saftes in den einzelnen Gegenden entstehen verschiedene, in ihrem Aussehen differirende und auch in ihrer Wirkung ungleiche Sorten. Die officinelle Capaloë wird in der Capcolonie, besonders in der Herrenhuter Colonie Betheldorp an der Algoabay, durch Auspressen der vom Mark befreiten Rinde und Gefässschicht und Eindicken des Saftes erhalten. Die Capaloë bildet den Hauptrepräsentanten der als Aloë lucida bezeichneten Handelssorten der Aloë, welche sich durch ihre röthlich gelbe Farbe und ihre an dünneren Schichten hervortretende Durchsichtigkeit charakterisiren und im Gegensatz zu den dunkleren, undurchsichtigen, bräunlichen und leberähnlichen oder schwärzlichen Sorten, die man als Leberaloë, Aloë hepatica, zusammenfasst, unterscheiden. Die Capaloë bildet kantige, glänzende, in dünnen Splittern braungrün durchscheinende, grünlich dunkelbraune, oft von grünem und gelblichem Staube bedeckte und häufig vermöge ihrer Hygroskopicität znsammengeflossene Stücke von grossmuschligen, glasglänzendem Bruche, eigenthümlichem und äusserst bitterem Geschmacke, welche sich in kaltem Wasser theilweise, unter Hinterlassung eines weichen Harzes, lösen, mit heissem Wasser eine trübe und mit Spiritus eine fast klare Lösung geben. Das grüngelbe Pulver backt bei 100° nicht zusammen und verändert seine Farbe nicht. Mikroskopisch bildet dieselbe eine homogene, amorphe Masse. Zur Aloë lucida gehört die der Capaloë sehr nahestehende Aloë Socotorina (von Aloë Perryi), deren Pulver braungelb und die in dünnen Splittern braun oder granatroth durchscheinend ist; doch scheint auch Leberaloë aus Socotora zu kommen (Flückiger). Alle übrigen Aloëarten gehören der Leberaloë an, geben ein braungelbes Pulver, zeigen opake (Arabische oder Bombayaloë) oder wachsglänzende (westindische Aloë, Barbados Aloë) Bruchflächen und unter dem Mikroskope ausserordentlich zahlreiche Krystalle. Diese Sorten kommen theilweise in England in Gebrauch, sind aber in ihrer Wirkung schwächer als Aloë lucida. Die nicht ständig im



Handel vorkommende Aloë von Curaçao bildet den Uebergang zwischen Aloë lucida und Aloë hepatica. Eine als Rossaloë, Aloë caballina, bezeichnete Sorte (von matt schwarzbrauner Farbe und erdartigem Bruche) ist wegen der darin enthaltenen Verunreinigungen (Sand u. s. w.) völlig ausser medicinischem Gebrauche.

In den verschiedenen Aloësorten kommen eigenthümliche Bitterstoffe vor, welche nach der Aloësorte, aus der sie dargestellt werden, verschiedene Namen erhalten haben, ausserdem eine in kaltem Wasser unlösliche Harzmasse und Spuren eines ätherischen Oels.

T. und H. Smith isolirten 1850 aus Barbadosaloë eine als Aloin oder Barbaloin bezeichnete, in kleinen, hellgelben Prismen oder rhombischen Blättchen krystallisirende Substanz von äusserst bitterem Geschmacke, welche sich schwer in kaltem, leicht in heissem Wasser oder in Alkohol löst. Aehnliche krystallinische, aber vom Barbaloin verschiedene Stoffe, das Socaloin und Nataloin, wurden von Flückiger in der Aloë von Socotora und Natal nachgewiesen. Diese Stoffe finden sich in den undurchsichtigen Aloësorten, sowie in dem flüssigen Saft verschiedener Aloëarten, in krystallisirtem Zustande, worauf z. Th. die Undurchsichtigkeit der Leberaloë beruht. Die Eigenthümlichkeit, dass die Aloë lucida keine Aloinkrystalle enthält, steht wahrscheinlich mit der Bereitungsweise im Zusammenhange, wobei Aloin in eine amorphe Modification, sog. Aloëtin von Robiquet, übergeht. Das Barbaloin ist kein Glykosid und liefert beim Behandeln mit Salpetersäure Chrysaminsäure oder Tetranitrodioxyanthrachinon und bei Destillation mit Zinkstaub Anthracen und Methylanthracen. Neben Barbaloin enthält die Barbadosaloë nach Tilden noch amorphes Anhydrid des Barbaloins. Nach Kosmann ist in Aloë Capensis kein Aloin vorhanden, sondern eine gelbe, amorphe Masse, die durch Kochen mit verdünnter Schwefelsäure in zwei Säuren, Aloëresinsäure und Aloëretinsäure, und in Aloëretin gespalten wird. Eine ganz ähnliche Zusammensetzung besitzt nach Kosmann auch das Aloëharz, wie man den in Wasser unlöslichen Theil der Aloë (20–40 % der Droge) im Gegensatze zu dem als Aloëextract bezeichneten, in Wasser löslichen Theil nannte. Das Aloëharz hat die Eigenthümlichkeit, in einer concentrirten wässrigen Lösung des Aloëextracts sich ziemlich leicht zu lösen, aber bei Zusatz von mehr Wasser sich auszuscheiden.

Dass das Barbaloin als das active Princip der Barbadosaloë anzusehen ist, lässt sich nicht bezweifeln. Schon T. und H. Smith beobachteten nach 0,03 zweimal in 12–24 Std. Stuhlgang, nach 0,12 Abführen und nach 0,24 drastische Action in einem Falle, wo Elaterin zu 0,015 ohne Wirkung blieb. Das Barbaloin wird in England als Mittel bei habitueller Stuhlverstopfung zu 0,1–0,15 nicht selten in Anwendung gebracht (Craig, Dobson, Harley). Die Angabe Robiquets, dass krystallisirtes Aloin nicht purgire, wohl aber die durch Kochen der Lösung resultirende Modification, ist schwer erklärlich, da nach den Versuchen von Craig die bei monatelangem Stehen von Barbaloinlösung resultirende amorphe harzige Substanz nicht stärker und nicht schwächer als schön krystallisirendes Aloin wirkt. Da Aloin nicht erheblich stärker als Barbadosaloë und kaum stärker als Aloë lucida wirkt, ist Kondrackis Vermuthung (1874), dass neben den Aloinen noch ein in Wasser löslicher, nicht krystallinischer Bestandtheil an der Wirkung der Aloësorten theilhaftig sei, nicht von der Hand zu weisen, zumal wenn man bedenkt, dass Socaloin und Nataloin ebenfalls purgire. Auch der in Wasser unlösliche Theil der Aloë ist keineswegs völlig ohne purgirende Wirkung, aber entschieden schwächer als Aloë selbst; nach von Cube entsprechen 2,85 etwa 0,3–0,4 Aloëextract. Socaloin und Nataloin stehen in ihrer Activität dem Barbaloin nach; nach Dobson und Tilden wirken sie erst zu 0,25–0,3, nach Kondracki selbst nicht zu 0,5–1,0.

In kleinen Dosen (0,05–0,1) wirkt Aloë nach Art der Bitterstoffe; in Gaben von 0,2–0,5 purgirend. Bei längerem Gebrauche kleiner Gaben tritt mitunter flüssige Defäcation ein.

Die abführende Wirkung der Aloë, welche sich nach Rutherfords Versuchen mit einer chologogen verbindet, hat die Eigenthümlichkeit, dass sie sehr spät erfolgt, meist in 10—12, bisweilen erst nach 16—24 Std., was z. Th. mit der Individualität, z. Th. mit dem Vorhandensein grösserer oder geringerer Mengen von Galle zusammenhängt. Schon Wedekind (1827) zeigte die Erfolglosigkeit der Aloë bei Ikterischen, so lange grauweiße Stühle existiren, und gab an, dass Klystiere mit 7,5—15,0 Extractum Aloës nicht anders wie lauwarme Klystiere wirken. Sokolowsky und v. Cube bestätigten letzteres und fanden weiter, dass Zusatz von Ochsen-galle zu einem solchen Aloëklystier die Purgirwirkung nach Art interner Dosen von Aloë hervorruft (nicht aber Zusatz von Speichel und pankreatischem Saft, auch nicht von taurochol- und glykochol-saurem Natrium). v. Cube wies dasselbe Verhalten bei Thieren experimentell nach. Die Aloëstühle sind selten wässrig, meist dünnflüssig oder breiig, in der Regel von dunkler Farbe; Kolikschmerzen gehen nur in leichter Weise voraus, dagegen besteht gewöhnlich mässiger Tenesmus.

Als eigenthümliche Nachwirkung der Aloë bei wiederholter Darreichung wird kürzer oder länger dauernde Blutüberfüllung der Mastdarmgefässe bezeichnet, als Folge deren sich bei Vorhandensein von Ektasien der Haemorrhoidalvenen Haemorrhoidalblutungen einstellen können. Mit Hyperämie im Rectum kann auch gleiche Hyperämie in den benachbarten Sexualorganen sich verbinden, wodurch die emmenagoge und abortive Wirkung grösserer Aloëdosen sich erklärt, welche in einigen Ländern zu ausgedehnter gewissenloser Anwendung des Mittels zur Verhinderung des Familienzuwachses geführt hat.

Vielleicht erklärt sich auch die jedenfalls inconstante Wirkung als Aphrodisiacum, welche der Aloë in früherer Zeit vindicirt wurde, aus der Hyperämie der im kleinen Becken belegenen Organe. Die Anschwellung der Haemorrhoidalvenen in Folge von Aloë beweist, mit der späten Wirkung zusammengenommen, dass die Aloë besonders die unteren Partien des Darmcanals afficirt.

Aloë wird gewöhnlich als Purgans bei habitueller Obstipation für Personen im vorgerückten Lebensalter empfohlen, wo sie übrigens meist mit anderen Stoffen (Rheum, Jalape) gegeben wird. Längerer Gebrauch ist insofern unbedenklich, als Aloë keine Tendenz zu Obstipation erzeugt und die Verdauung nicht beeinträchtigt.

Ob auch relativ kleine Dosen Haemorrhoidalblutungen erregen können oder bei sonst gesunden Individuen Haemorrhoiden erzeugen, wie dies Fallopiä bei 90 % der Aloëconsumenten gesehen haben will, steht dahin. Jedenfalls ist ihre Wirkung auf den Uterus nicht zu leugnen, obschon dieselbe auch anderen Laxanzen, selbst der Senna, zukommt. Man vermeidet sie deshalb zweckmässig während der Gravidität und ebenso bei männlichen Individuen, welche an Haemorrhoidalknoten leiden. In früherer Zeit glaubte man sie besonders indicirt bei Obstipation im Gefolge von Ikterus; doch fehlt bei mangelnder Galle im Darm ihre Wirkung, die jedoch durch Combination mit Fel Tauri (Kirchner) erzielt werden kann.

Besonderen Ruf geniesst Aloë seit langer Zeit bei Suppressio mensium und stockenden Haemorrhoidalblutungen, auf welche die frühere Medicin allerlei psychische Verstimmungen mit Kopfschmerzen, Druck im Epigastrium u. s. w. bezog, welche der Aloë weichen sollten. Jedenfalls ist gerade hier ein enormer Missbrauch damit getrieben.

Alle übrigen Verwendungen der Aloë sind ohne besondere Bedeutung. Ein Anthelminticum von Bedeutung ist sie nicht (Küchenmeister) und ihre An-

wendung in Klystierform (gegen Oxyuris) oder gar in Einreibung in die Bauchhaut (gegen Spulwürmer) ist aufgegeben. Als Amarum und Tonicum in kleinen Dosen wird sie wenig benutzt, am häufigsten vielleicht noch in Verbindung mit Eisenpräparaten, wo man die Absicht hat, die durch stärkere Eisensalze manchmal resultirende Digestionsstörung und Obstipation zu verhüten. Früher benutzte man Aloëpulver und spirituöse Lösungen zum Verbande schlecht aussehender Geschwüre.

Man giebt die Aloë als Amarum zu 0,02—0,05, als Purgans zu 0,2—1,0 stets in Pillenform (mit etwas Mucilago Gummi Arab. oder mit Extracten oder Sapo).

Die Anwendung im Klystier ist aus physiologischen Gründen verwerflich. Die Pillen werden bei Obstruction am besten Abends genommen, weil zu dieser Zeit die Gallensecretion am reichlichsten functionirt.

Das Aloin von T. und H. Smith wird in England bei habitueller Stuhlverstopfung meist in Pillenform gegeben. Craig reicht es in Verbindung mit Ferrum sulfuricum siccum, selbst bei Gravidae und Haemorrhoidariern; Dobson zieht Seife als Pillenconstituens wegen grösserer Sicherheit der Wirkung vor. Fronmüller empfahl das Aloin subcutan zu injiciren (zu 0,1—0,8), wobei Entzündung der Injectionstelle nicht eintrete. Hiller sah nach 1 Ccm. warm bereiteter Glyceriallösung (1:8) in 4—6 Std. reichliche breiige Stuhlentleerung mit mässigem Leibweh. R. Kohn hat Aloin vergeblich subcutan angewandt.

#### Präparate:

1) **Extractum Aloës; Aloëextract.** Durch Lösen in 5 Th. siedendem Wasser und Eindampfen dargestelltes trocknes Extract, welches ein gelbbraunes Pulver bildet und in Wasser sich trübe löst. Es enthält neben dem Aloin auch eine Quantität Harz. Dosis und Gebrauchsweise sind wie bei Aloë. Früher war auch ein braunschwarzes, in Wasser ebenfalls trübe lösliches, trocknes Extract, durch Lösen von 8 Th. Aloë in 32 Th. Wasser, Zusatz von 1 Th. Acidum sulfuricum und Abdampfen in einem Porzellengefässe erhalten, als Extractum Aloës acido sulfurico correctum officinell. Dasselbe war ein Liebmittel Heims u. a. Aerzte, die es in höheren Dosen als das Extr. Aloës verordneten. Die Wirkung der Aloë ist nicht corrigirt, sondern z. Th. durch Zersetzung des grössten Theiles des Aloins zerstört.

2) **Tinctura Aloës; Aloëtinctur.** Mit 5 Th. Spiritus bereitet; dunkelgrünlich-braun. Sie enthält das sämmtliche Aloëharz und einen Theil des Aloins; ihre Purgirwirkung ist deshalb schwach. Man giebt sie als Stomachicum und Emmenagogum zu 5—30 Tropfen mehrmals täglich. Gamberini verwendete sie zur Einspritzung bei hartnäckigem Tripper.

3) **Tinctura Aloë composita; Zusammengesetzte Aloëtinctur.** Aus Aloë 6 Th., Rad. Gentianae, Rad. Rhei, Rhizoma Zedoariae, Crocus, aa 1 Th. mit 200 Th. Spiritus dilutus bereitet, von gelbrothbrauner Farbe, safranartigem Geruche, stark bitter, mit Wasser ohne Trübung mischbar. Ersetzt das alte Lebenselixir, Elixirium ad longam vitam, das besonders im höheren Alter zur Kräftigung der Digestion und Erhaltung regelmässiger Leibesöffnung und der Gesundheit überhaupt in früherer Zeit in Ansehen stand. Man gab es zu  $\frac{1}{2}$ —1 Theelöffel.

Unter dem Namen Elixir proprietatis Paracelsi oder saures Aloëelixir war früher ein Macerat von Aloë, Myrrha aa 2 Th., Crocus 1 Th., mit 24 Th. Spiritus und 2 Th. Acidum sulfuricum dilutum officinell. Dieses Elixir ist (wie die Tinctura Aloës composita) ein Rest alten und thörichten medicinischen Humbugs, der noch jetzt von Seiten einzelner Koryphäen der Medicin als Purgans und Pellens theelöffelweise Anwendung findet. In Frankreich wird es durch das complicirtere Elixir de Garus s. Elixir cordiale ersetzt; bei uns manchmal noch durch ein pulverförmiges Gemisch ähnlicher Substanzen, das als Species hierae picrae bezeichnet und mit Spiritus Juniperi digerirt



wird, oder durch ähnlich componirte Pillen (sog. *Pilulae aloëticae* s. *Rufii*, *Pilulae benedictae* u. a.). Den genannten Tincturen analog wirken auch der vielfach verrufene Daubitzsche Kräuterliqueur und zahllose andere Präparate. Allen diesen Composita wünscht die rationelle Pharmakodynamik selbstverständlich baldige glückliche Reise!

### Verordnungen:

- |   |  |
|---|--|
| <p>1) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Extracti Aloës</i><br/> <i>Fell. tauri inspiss.</i> <math>\overline{\text{aa}}</math> 3,0<br/> <i>M. f. pilul. No. 50.</i> <i>Consp. cort. Cinn.</i><br/> <i>D. S.</i> Dreimal täglich 3 Stück. (Abfuhrmittel bei Ikterus u. s. w.)</p> <hr/> <p>2) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Aloës</i> 1,2<br/> <i>Rad. Rhei pulv.</i><br/> <i>Sapon. med.</i> <math>\overline{\text{aa}}</math> 2,0<br/> <i>Extracti Taraxaci q. s.</i></p> | <p><i>ut f. pilul. No. 60. Cons. pulv. rhizom. Irid. D. S.</i> Morgens und Abends 6—8 Stück. (Phoebus.)</p> <hr/> <p>3) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Extracti Aloës</i> 6,0<br/> <i>— Rhei comp.</i> 3,0<br/> <i>— Colocythid. comp.</i><br/> <i>Ferri pulver.</i> <math>\overline{\text{aa}}</math> 1,5<br/> <i>M. f. pilul. No. 100. Cons. D. S.</i><br/>         Abends 1—2—3 Stück.<br/>         (Pilulae aperitivae Stahl.)</p> |
|---|--|

**Herba Gratiolae; Gottesgnadenkraut.** — Das im Juni und Juli gesammelte blühende Kraut der auf dem ganzen europäischen Festlande und in Nord-Amerika vorkommenden Scrophularinee *Gratiola officinalis* L. hat bis 50 Cm. hohe, oben vierkantige, hin und wieder verästelte Stengel, gegenständige, sitzende, lanzettliche, gesägte, 2 Cm. lange, 3—5nervige Blätter und einzelne, achselständige, weisse, am Grunde mit gelblichen Papillen versehene Blüthen. Es ist ohne Geruch, schmeckt widrig bitter und brennend scharf. Die Wurzel treibt lange, blassbräunliche Ausläufer, die wirksamer als das Kraut sein sollen und auch Volksmittel bei Amenorrhoe sind. Als wirksames Princip muss nach den Untersuchungen von Walz das amorphe, zu gelbem Pulver zerreibliche, in Wasser und noch besser in Spiritus lösliche Gratiolin, welches durch Behandeln mit wässrigen Säuren oder Alkalien in Zucker und einen bitteren Stoff, das Gratiolin, zerfällt, angesehen werden, indem Gratiolin zu 0,3 bei Kaninchen heftigen Durchfall und hochgradige Entzündung der Gastrointestinalschleimhaut hervorruft, während die übrigen von Walz aufgefundenen reinen Stoffe, das ebenfalls glykosidische Gratiolin und die Gratiolinsäure (Gratiolacrin), nicht auf den Organismus von Einfluss sind.

Ursprünglich gegen Flechtenausschläge mit Erfolg von hohen Herrschaften angewendet (daher nach Krahmer der Name Gottesgnadenkraut) und vor 70 bis 80 Jahren bei Geisteskranken u. s. w. als Drasticum viel benutzt, ist das Mittel ganz obsolet und überflüssig. In seiner Wirkung reiht es sich der Jalape an. Bei seiner Anwendung ist grosse Vorsicht nöthig, da das Gottesgnadenkraut nicht allein entzündungserregend auf den Tractus wirkt, sondern auch in einzelnen Fällen auffallende Erscheinungen bedingen kann. So sah Bouvière bei Application im Klystier bei hysterischen Personen ausgeprägte Nymphomanie auftreten. Man gab das Kraut in Pulverform zu 0,3—1,0, für sich oder in Verbindung mit Calomel, auch in Abkochung (4,0—10,0 auf 200,0 Colatur). Auch ein aus frischem Kraute bereitetes spirituöses Extract, *Extractum Gratiolae*, wurde früher zu 0,05—0,4 als Purgans benutzt.

Ebenfalls völlig obsolet ist die *Herba Lini cathartici*, das Kraut des bei uns einheimischen Purgirflachs, *Linum catharticum* L., dessen purgirende Wirkung, bei etwa 4,0 hervortretend, durch einen indifferenten, bitteren Stoff, Linin, bedingt wird (Pagenstecher).

### **Tubera Jalapae, Radix Jalapae; Jalapenknollen, Jalapenwurzeln.**

Die Droge bildet die über Feuer getrockneten, milchsafthaltigen, knollig verdickten Wurzeln von *Ipomoea Purga* Hayne

*Convolvulus Purga* Wenderoth s. *Ipomoea Schiedeana* Zucc), einer am östlichen Abhange der Mexicanischen Anden wildwachsenden und cultivirten Convolvulacee, und ist von der mexikanischen Stadt Xalapa als Jalapenwurzel bezeichnet.

Die *Tubera Jalapae* sind kuglige, birnförmige oder längliche, compacte, schwere Stücke von weniger als 1 Cm. Durchmesser bis über Faustgrösse, äusserlich grobrunzelig, höckerig und schmutzig graubraun gefärbt, ohne Blattnarben oder Nebenwurzeln, auf dem Querschnitte schmutzig hellgrau und von zahlreichen concentrischen Zonen von dunklerer Farbe, welche aus glänzenden Harzzellen bestehen, durchzogen. Das sehr dichte Gewebe bricht glatt, mehlig oder hornartig. Die *Tubera Jalapae* haben einen an Rauch erinnernden Geruch und einen faden, später kratzenden Geschmack.

Der wirksame Bestandtheil ist das Harz, von dem gute Jalape mindestens 10% enthalten muss und neben welchem viel Stärkemehl (bis 18%, in sehr grossen Körnchen) und unkrystallisirbarer Zucker (bis 19%) vorkommen.

Das officinelle **Jalapenharz**, **Resina Jalapae**, **Extractum Jalapae**, welches durch Ausziehen mit 6 Th. Alkohol, Auswaschen mit Wasser und Erwärmen im Wasserbade erhalten wird, bildet auf dem Bruche glänzende, braune, leicht zerreibliche Massen. Es charakterisirt sich dadurch, dass es sich nicht in Schwefelkohlenstoff und — mit Ausnahme eines geringen Theiles — auch nicht in Aether löst. Der in Aether lösliche Theil ist das Gammaharz von Sandrock, der unlösliche das Convolvulin von Mayer (Rhodeoretin, Jalapin von Buchner), welches der hauptsächlichste purgirende Bestandtheil der Jalapenknollen ist. Die Unlöslichkeit in Aether kommt auch dem Tampicin zu, einem dem Convolvulin sich sehr ähnlich verhaltenden, angeblich etwas schwächer purgirenden Stoffe, welchen *Spirgatis* aus der von *Ipomoea simulans* Hanb. abgeleiteten *Tampico Jalape*, die lange, leichte, holzige, stark zusammengefallene Stücke bildet und sehr harzarm ist, isolirte. Dem Gammaharz von Sandrock kommt purgirende Wirkung erst zu 0,5, welche jedoch viel später eintritt als nach der 4fach geringeren Dosis Convolvulin (Buchheim und Hagentorn), zu. Letzteres wirkt nach verschiedenen Beobachtern (Wibmer, Mayer, Bernatzik) in Dosen von 0,18—0,25 abführend, wobei die grösseren Gaben auch heftiges Leibschneiden bedingen. Bei Thieren können starke Mengen Tod und Gastroenteritis hervorrufen (Köhler und Zwicke). Andre Effecte wie Purgiren hat Convolvulin nicht; es wirkt weder diuretisch (Bernatzik) noch neurotisch (Zwicke), noch auch bei localer Application auf Haut, Membrana Schneideri und Conjunctiva erheblich reizend (Buchheim und Hagentorn).

Das Convolvulin ist das Anhydrid einer Säure, welche daraus durch Behandeln mit Alkalien entsteht, der Convolvulinsäure, die, wie das Convolvulin selbst, beim Kochen mit verdünnten Säuren in Zucker und Convolvulinol zerfällt, welches letztere wiederum durch Alkalien in eine Säure, die Convolvulinolsäure, sich verwandelt. Alle diese Stoffe wirken schwächer (z. B. Convolvulinsäure nach Buchheim und Hagentorn zu 0,5, nach Bernatzik zu 0,6) oder gar nicht (Convolvulinolsäure nach Bernatzik) purgirend, so dass die drastische Wirkung der Jalape auf das Convolvulin als solches, nicht aber auf dessen Zersetzungsproducte, zurückzuführen ist.

Die purgirende Wirkung der Jalape (und des Convolvulins) ist als örtliche anzusehen, da sie sich nicht bei subcutaner Application von 0,5 Convolvulin oder bei Einspritzung von 0,1 in die Venen einstellt. Dieselbe kommt nur zu Stande, wenn Convolvulin im Darne mit Galle in Berührung kommt, wobei letztere nur lösend, nicht aber verändernd auf das Harz wirkt (Buchheim und Hagentorn, Köhler und Zwicke).

Convolvulin erscheint nicht als solches im Harn, ebensowenig eines  
Husemann, Arzneimittellehre. II. Band. 2. Auflage.

seiner Verwandlungsproducte; mit den Faeces werden nur geringe Mengen Convolvulin fortgeschafft. Convolvulinsäure ist in den Stühlen nach Einverleibung von 10,0 nur qualitativ nachweisbar. Die Wirkungen der Jalape sollen bei Herbivoren schwächer als bei Carnivoren sein (Gilbert, Donné).

Beim erwachsenen Menschen zeigt sich die purgirende Wirkung der Jalape mit Sicherheit nach 1,0–2,0 der Wurzel und nach der Hälfte des officinellen Harzes.

Kleinere Gaben (0,2–0,4 Jalapenpulver) machen nur breiige Stühle, nach grösseren sind dieselben flüssig und erfolgen unter Kolikschmerzen und Tenesmus. Erbrechen gelbgefärbter Massen ist dabei keine Seltenheit. Besondere Neigung zur Obstipation bleibt nicht zurück. Der Stuhl erfolgt meist in 2 bis 3 Std., nachdem schon  $\frac{1}{4}$ – $\frac{3}{4}$  Std. nach dem Einnehmen sich deutliche Steigerung der peristaltischen Bewegung zu erkennen giebt. Die Angabe Willemins, dass die Zahl der Stuhlgänge nicht mit der Dosis in gleichem Maasse wachse, so dass 0,5 drei, 1,0 dagegen nur vier Defäcationen bedinge, deutet nichts für die Jalape Charakteristisches an, da andere Drastica sich in gleicher Weise verhalten. Nach Rutherford wirkt Jalape auch cholagog.

Jalapae ist in der Kinderpraxis als Drasticum beliebt und wird nicht selten auch bei hartnäckiger Hartleibigkeit Erwachsener gebraucht, weil sie keine Tendenz zu Verstopfung macht. Bei Kindern giebt man das Mittel oft zur Entfernung von Helminthen nach zuvoriger Anwendung von Santonin; directe anthelmintische Wirkung scheint es nicht zu besitzen. Als Cholagogum oder Antihydripticum leistet es nicht mehr als andere Drastica. Zu sog. Derivation auf den Darmcanal (bei Hirnerscheinungen, Entzündungen u. s. w.) dient es in der Praxis häufig.

Eine Contraindication der Anwendung bilden entzündliche Zustände des Darmrohrs, da grössere Dosen Jalape Gastroenteritis bedingen können.

Die purgirende Dosis der Tubera Jalapae beträgt für den Erwachsenen 1,0–2,0. Man giebt sie auf einmal oder in getheilten Dosen, in kurzen Intervallen, in Pulverform, welche auch bei Kindern, denen 0,5–1,0 zu reichen ist, wegen des geringen Geschmackes der Droge wohl angewendet werden kann.

Das Mittel wird, wie das ja bei den meisten Purganzen geschieht, oft mit anderen gleichwirkenden Stoffen combinirt, am häufigsten mit Calomel oder mit Tartarus depuratus. Als Corrigentien, deren es kaum bedarf, dienen Gewürze und Zucker oder Oelzucker, auch Brausepulver.

Die Resina Jalapae wird als Drasticum zu 0,3–0,5 gegeben. Zu gelinder Reizung des Darmcanals gebraucht man nur  $\frac{1}{3}$  der angegebenen Dosis. Ipecacuanha und Rhabarber sollen die Wirkung erheblich steigern (?).

Das Harz lässt sich ebenfalls in Pulverform administrieren, wenn man es mit Gummi Arabicum oder süssen Mandeln (sog. Resina Jalapae praeparata) verreibt, wird aber meist in Pillen gegeben, zu deren Darstellung entweder das Harz selbst oder die daraus bereitete:

**Jalapenharzseife, Sapo jalapinus**, dient. Letztere stellt eine graubraune Masse dar, welche durch Auflösen von Resina Jalapae und Sapo medicatus aa 4 Th. in Spiritus dilutus 8 Th. und Abdampfen im Wasserbade auf 9 Th. erhalten wird. Sie wird häufig — wie im officinellen Extractum Rhei compositum — mit anderen drastischen Extracten verbunden und kann für sich zu 0,5–1,5 als Purgans genommen werden. Sie dient als Grundlage der früher



officinellen Jalapenpillen, *Pilulae Jalapae*, welche aus 3 Th. Sapo jalapinus und 1 Th. Jalapenpulver bestehen und gegen habituelle Obstipation allabendlich zu 4—5 Stück in Anwendung kommen. Aus dem Harze wurde früher auch die Jalapenharztinctur, *Tinctura resinae Jalapae*, durch Maceration mit 10 Th. Spiritus dargestellt. Sie diente unter dem Namen Blutreinigungstropfen, wie die *Tinctura Jalapae composita* s. *Eau-de-vie allemande* (!), früher in einzelnen Gegenden als Emmenagogum und selbst als Abortivum. Zum Abführen giebt man 10—30 Tropfen mehrmals täglich. Bei Kindern wendet man sie auch wohl in Form der Abführmaccaronen an, welche durch Befeuchten der Unterfläche auf Oblate gebackener Maccaronen mit einigen Tropfen Jalapentinctur dargestellt werden und ein sehr appetitliches Purgans bilden.

### Verordnungen:

- |   |  |
|---|--|
| <p>1) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Tub. Jalap.</i> 2,0<br/> <i>Kali sulfurici</i> 1,0<br/> <i>M. f. pulv. D. S.</i> In Oblate auf einmal zu nehmen. (<i>Pulvis Jalapae compositus</i> Ph. Dan.)</p> | <p>2) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Tuberum Jalapae</i> 1,0<br/> <i>Tartari depurati</i><br/> <i>Rhiz. Zingiberis</i> aa 2,0<br/> <i>M. f. pulv. D. S.</i> Auf einmal zu nehmen. (<i>Pulvis Jalapae compositus</i> Ph. Brit.)</p> |
|---|--|

*Resina Scammoniae*; *Scammoniumharz*. — Ganz analog dem Jalapenharze war früher ein aus der Wurzel von *Convolvulus Scammonia* L., einer in Vorderasien und auf den griechischen Inseln verbreiteten Windenart, dargestelltes Harz, daneben auch der im Handel fast immer in verfälschtem Zustande vorkommende und deshalb als Medicament verwerfliche getrocknete Milchsafft der Pflanze, das sog. *Scammonium* (*Gummi resina Scammonii*), im Gebrauche. Der wirksame Bestandtheil dieser Droge ist das noch in manchen anderen Windenarten vorkommende Glykosid Jalapin (*Pararhodeoretin* oder *Scammonin*), welches sich vom Convolvulin, dem es in seinem chemischen Verhalten und seiner Wirkung auf den Organismus sehr nahe steht, durch seine Löslichkeit in Aether unterscheidet. Bei Behandlung mit Alkalien verwandelt es sich unter Aufnahme von 3 Aeq. Wasser in Jalapinsäure, und durch Einwirkung von verdünnten Mineralsäuren spaltet es sich in Zucker und Jalapinol (oder Jalapinolsäure). Jalapin wirkt zu 0,12—0,25 in 3—4 Std. stark purgirend, während Jalapinsäure erst zu 0,6, Jalapinolsäure gar nicht purgirend ist. Letztere ruft bei Thieren, in die Venen als Natriumsalz injicirt, Convulsionen hervor. Jalapin wirkt nicht entzündungserregend auf den Darm und entfaltet seine abführende Action nur, wenn es im Darne in Contact mit Galle, welche dasselbe in gleichem Maasse wie Convolvulin löst, kommt. Im Urin sind weder Jalapin noch Jalapinsäure nachzuweisen, in den Faeces, auch nach Anwendung grösserer Dosen, nur geringe Mengen (*Buchheim* und *Hagentorn*, *Bernatzik*).

Die Effecte der *Resina Scammoniae* gleichen denen der *Resina Jalapae* vollständig, auch sind Anwendung und Dosis dieselben. Nur der Geschmack des *Scammoniumharzes* ist etwas besser. In England und Frankreich bedient man sich gern einer *Emulsio resinae Scammoniae* (*Lac Scammoniae*), durch Verreiben von 0,5 *Resina Scammoniae* mit 15,0 Zucker, 120,0 Kuhmilch und 5,0 Bittermandelwasser bereitet, wovon man stündlich 1—2 Esslöffel giebt.

Sonstige purgirende *Convolvulaceen*. — Das Jalapin ist auch das wirksame Princip der sog. *Stipites Jalapae* s. *Radix Jalapae levis* s. *Radix Orizabensis*, der nicht knolligen und mehr faserigen Wurzel einer im Bezirk der Jalapenpflanze wachsenden und dort als *Purga macho* unterschiedenen *Convolvulacee*, die als *Convolvulus Orizabensis* Pell. bezeichnet wird. Da das Pulver besser als das der echten Jalape schmeckt und die Droge 12% Harz liefert (Flückiger), kann sie statt der echten Jalape angewendet werden (*Bernatzik*). Die weisse Jalape, *Rad. Jalapae albae* s. *Mechoacanhae albae*, von *Convolvulus Mechoacanha* (Mexico), ist minder kräftig; eine daraus erhaltene Harzsäure führt selbst zu 1,5 nicht ab (*Buchheim*). — Aus der Familie der *Convolvulaceen* stammt auch die durch die Jalape völlig

verdrängte Turpithwurzel, *Radix Turpethi* — von *Ipomoea Turpethum* R. Br. (Ostindien, Australien) —, welche 4% eines Harzes enthält, dessen in Aether nicht löslicher Antheil, ein dem *Convolvulin* verwandtes Glykosid, wie dieses zu 0,25 sicher purgirend wirkt, während der in Aether lösliche Theil zu 1,20 nicht abführt (Vogl). Die der Turpithwurzel zugeschriebenen stark irritirenden Wirkungen auf Haut und Schleimhäute gehören nur der *Radix Turpethi purii* oder *Radix Thapsiae* an.

### **Podophyllinum; Podophyllin.**

Das in Amerika als drastisches Abführmittel viel gebrauchte Podophyllin, ein aus dem Wurzelstocke von *Podophyllum peltatum* L., einer in den Vereinigten Staaten einheimischen und als Mayapple bezeichneten Berberidee, hat auch neuerdings bei uns, besonders als Chologogum, Eingang gefunden.

Das aus dem weingeistigen Extracte des Rhizoms mit Wasser abgeschiedene Podophyllin ist ein gelbes Pulver oder eine lockere, gelbliche oder bräunlich-graue, amorphe Masse. Buchheim hielt das Podophyllin für das Anhydrid einer unwirksamen Säure, der Podophyllinsäure, welche bei Einwirkung von Kali auf Podophyllin entstehe, indessen ist das käufliche Podophyllin ein variables Gemenge verschiedener Harze und daher in seinem Verhalten gegen Lösungsmittel sehr verschieden. Nach Podwyssotzki besteht es aus einer krystallinischen Fettsäure, einer in gelben Nadeln krystallisirenden Substanz mit den Eigenschaften des Quercetin, einer unwirksamen Harzsäure (Podophyllinsäure) und zwei stark wirkenden Körpern, Podophyllotoxin und Pikropodophyllin, welche beide in Aether, Chloroform und Alkohol leicht löslich, in Wasser fast unlöslich sind und krystallisirt erhalten werden können.

Das Podophyllin steht in seiner Wirkung dem *Convolvulin* nahe, unterscheidet sich jedoch dadurch, dass es auch bei subcutaner Application Reizung des Darmcanals verursacht.

Das Auftreten von Kolik, Tenesmus und Vomiturition mit nachfolgendem Tode wurde zuerst von Percy und Anstie bei Subcutanapplication alkalischer oder spirituöser Podophyllinlösung dargethan. Nach Podwyssotzki wirkt Pikropodophyllin auf Katzen und Hunde nur bei interner Anwendung in Oel-lösung emetokathartisch, dagegen Podophyllotoxin auch bei Subcutanapplication toxisch, wobei nach dem Tode fleckige Röthung, Succulenz und mässige Schwellung der Magenschleimhaut und starke Durchfeuchtung der mit Schleim und abgestossenem Epithel bedeckten Darmschleimhaut in ihrer ganzen Ausdehnung, bei Hunden auch Substanzverlust im Ileum constatirt werden. Podophyllotoxin kann schon zu 0,001—0,005 Katzen tödten, während vom Pikropodophyllin 0,3 erforderlich sind. Pikropodophyllin wird auch im Darne nur zum kleinen Theile resorbirt.

Die Hauptvorzüge, welche man dem Podophyllin andern Abführmitteln gegenüber beilegt, sind die gallige Beschaffenheit der Stühle und der Umstand, dass die Wirkung, welche nach medicinalen Dosen meist nach 10—12 Std., oft noch später erfolgt, sich nicht leicht abstumpft, so dass Podophyllin auch bei habitueller Verstopfung brauchbar ist.

Während Bennett (1869) dem Podophyllin chologoge Wirkung auf Grund physiologischer Versuche absprach, zeigte Rutherford (1879) die stark erregende Wirkung des Mittels auf die Lebersecretion, die jedoch bei purgirenden Dosen weniger als bei kleinen hervortritt. Auffallende Kleinheit der Leber bei sehr dunkler Färbung und Blutreichthum derselben, so wie pralle Füllung der Gallenblase findet sich auch bei den mit Podophyllotoxin vergifteten Thieren

(Podwyssotzki). Gerade die auffallend gallige Beschaffenheit der Stuhlgänge und bei grösseren Dosen auch des Erbrochenen bei medicinischem Gebrauche gab Ernst Schmidt (1866) Veranlassung das Mittel in Deutschland einzuführen. Als Nebenerscheinungen treten bei grösseren Dosen (0,25—0,4), bei einzelnen Personen auch nach kleineren Gaben, Leibschneiden, Uebelkeit, Schwindel, profuse Schweisse und anhaltende wässrige Stühle hervor (E. Schmidt); Schmerzen und Koliken können selbst 1—2 Tage anhalten (Phillips). Das Podophyllin irritirt beim Verstäuben auch die Augenbindehaut und bewirkt Chemose und Myose (Webster).

Man giebt Podophyllin entweder als einmaliges drastisches Purgans oder wiederholt bei habitueller Obstipation, namentlich bei Störungen der Leberfunction, chronischem Erbrechen nach der Mahlzeit und Hypochondrie mit Schlaflosigkeit. Wegen der durch Podophyllin leicht hervorgerufenen Koliken ist eine Verbindung mit Extractum Hyoscyami oder Extractum Belladonnae zweckmässig.

Das von Dyes bei Rheumatismus acutus gegebene Präparat ist nach Phillips nicht antipyretisch, aber im Typhus, wenn ein mildes Laxans indicirt ist, in mässigen Dosen von Nutzen und ausserdem besonders geeignet, um bei Säuglingen lettige Stühle oder Mastdarmvorfall zu beseitigen.

Als einmaliges drastisches Purgans giebt man 0,06—0,12, bei habitueller Obstipation 0,005—0,08, je nach Bedürfniss alle 12—24 Std. In letzterem Falle ist die Darreichung in Pillenform angezeigt, wodurch auch die beim Einnehmen in Podophyllinpulvern häufig vorkommende Salivation verhindert wird. Bei Neugeborenen gab Phillips 0,002—0,003.

#### Verordnung:

R  
*Podophyllini* 0,45  
*Extracti Hyoscyami* 0,3  
*Saponis medicati q. s.*

ut. f. pil. No. 20. Consp. D. S. Abends  
 1 Stück (Marchant).

**Anhang:** An das zuerst von der eklektischen Schule als gallentreibendes Mittel in Aufnahme gebrachte Podophyllin reihen sich verschiedene sog. Resinoide aus nordamerikanischen Pflanzen an, welche gleichzeitig cholagog und purgirend wirken, jedoch hinsichtlich der letzteren Action dem Podophyllin nachstehen und ihre Einwirkung auf die Lebersecretion im entschiedenen Maasse hervortreten lassen. Hierher gehören in erster Linie die Resinoide aus dem Rhizome von *Iris versicolor* (Fam. Irideae) und aus der Wurzel von *Evonymus atropurpureus*, welche als Iridin und Evonymin bezeichnet werden. Beide sind nach Rutherford kräftige Cholagoga, die besonders bei biliösen Zuständen sich eignen und zu 0,1—0,25 intern für sich oder in Verbindung mit Extractum Hyoscyami (zum Verhüten von Leibschmerzen) oder auch abwechselnd mit salinischen Purganzen, wo die purgirende Wirkung nicht eintritt, gegeben werden. Das Evonymin ist nach den neuesten Untersuchungen von Hans Meyer ein glykosidisches Herzgift. In analoger Weise wirken auch das Juglandin, ein Resinoid aus der Wurzel der Butternuss, *Juglans cinerea*, in Amerika zu 0,1—0,3 bei Verstopfung und Dysenterie gebräuchlich, das Hydrastin aus der Wurzel von *Hydrastis Canadensis*, dem die eklektischen Aerzte auch tonisirende Wirkung zuschreiben, das Baptisin aus der Wurzel von *Baptisia tinctoria*, das Menispermmin aus der Wurzel von *Menispermum Canadense*, das Phytolaccin aus der Wurzel von *Phytolacca decandra* und das Leptandrin von *Leptandra Virginica*. Das Phytolaccin ruft zu 0,1 bei habitueller Obstipation stets reichlichen Stuhlgang hervor. Das Leptandrin wirkt ausserordentlich milde auf den Darm und wird in Amerika als Ersatzmittel des Rhabarbers in der Kinderpraxis häufig benutzt.



**Fructus Colocynthis, Colocynthis, Poma Colocynthis; Coloquinten, Coloquinten.**

Die Droge stellt die getrockneten und geschälten Beerenfrüchte von *Citrullus Colocynthis* Arnott (*Cucumis Colocynthis* L.), der in einem grossen Theile von Vorderasien und Nordafrika wildwachsenden, in Spanien und auf Cypern cultivirten Coloquintengurke, dar.

Dieselben sind kuglig, von der Grösse eines Apfels, und besitzen ein weisses, schwammiges, äusserst bitteres Mark, das sich leicht in drei Verticaltheile zerbrechen lässt, in welchen zahlreiche braune oder weisse Samen an wandständigen Placenten sich befinden. Je reichlicher das Mark entwickelt und je weniger zahlreich die Samen sind, um so besser sind die Coloquinten. Eingeschrunpfte harte, bräunliche Früchte sind verwerflich.

Man benutzt nur das von den Samen befreite Mark, welches, behufs Anwendung in Pulverform mit  $\frac{1}{5}$  Gummi Arabicum zu einer Paste verarbeitet, den Namen *Fructus Colocynthis praeparati* oder *Trochisci Alhandal* führt. Das drastische Princip bildet das Colocynthin von Herberger und Walz.

Dasselbe ist ein krystallisirendes, weissgelbes, in Wasser und noch leichter in Alkohol lösliches, in Aether unlösliches Glykosid, welches stark bitter schmeckt und durch verdünnte Mineralsäuren in Colocynthein und Traubenzucker zerfällt. Das geschmackfreie, in Aether und kochendem Alkohol, aber nicht in Wasser lösliche Colocynthin von Walz scheint auf die Wirkung der Coloquinten ohne Einfluss zu sein. Colocynthin und Colocynthein wirken beide drastisch und bedingen zu 0,03 beim Menschen in 8 Stunden Kolik und Diarrhoe (Sokolowski). Colocynthin wirkt zu 0,06 bei Hunden purgirend; 0,3—0,5 verursachen bei Kaninchen Gastroenteritis und Tod.

Kleine Dosen Coloquinten (0,06—0,2) machen wässrige und schleimige Stühle ohne Beschwerden, während nach grösseren Dosen nicht selten erhebliche Kolikschmerzen vorkommen.

Bei einzelnen Personen scheinen schon auffallend kleine Gaben wirksam zu sein. So soll die Dosis von 2 Tropfen Coloquintinctur bei mehrmaliger Wiederholung Leibscherzen und Diarrhoe bedingt haben. Linnés Ausspruch: „Colocynthis teterrime olens solo odore purgans et vomitoria est“ ist offenbar übertrieben.

In sehr grossen Dosen können die Coloquinten durch erschöpfende Durchfälle oder heftige Reizung und Entzündung des Darmes den Tod herbeiführen; die Stühle werden dann manchmal blutig gefärbt, nicht selten treten Wadenkrämpfe ein und das tödtliche Ende erfolgt binnen 24 Stunden, oder es tritt nach heftiger drastischer Action fieberhafter Zustand mit enormer Schmerzhaftigkeit des Unterleibes auf. Todesfälle nach  $1\frac{1}{2}$  Theelöffel Coloquintinctur (Christison), selbst nach 3,0—4,0 (Roques) sind verbürgt. Coloquinten wirken auf Schweine, Pferde und Schafe wenig toxisch. Die Angabe, dass dieselben am Cap eingemacht gegessen würden, ohne Schaden zu thun, ist vielleicht Verwechslung mit einer ähnlichen Cucurbitacee; dagegen dienen die Samen in Nordafrika allerdings als Nahrungsmittel. Bei Hunden beträgt die geringste letale Gabe 13,0—14,0 Coloquinten in Substanz.

Auf die Gallensecretion wirken Coloquinten in stärkerem Maasse vermehrend als Jalape und Crotonöl (Rutherford).

Tidy fand bei Hunden, welche er mit Coloquinten vergiftete, neben Entzündung des Rectums auch bisweilen solche der Nieren und Blase, was für directe Wirkung auf die uropoëtischen Organe zu sprechen scheint.

Die Coloquinten sind ein geschätztes Abführmittel, welches manchmal noch Leibesöffnung schafft, wo z. B. bei Geisteskranken oder bei habitueller Obstipation Rhabarber, Aloë oder Jalape unwirksam sind. Doch ist gerade bei letzterer Affection Vorsicht zu empfehlen, da es nicht an Fällen fehlt, wo längerer Gebrauch coloquintenhaltiger Abführmittel, z. B. der Morisonschen Pillen, die ausserdem noch Gutti enthalten, zu Ulcerationen im Darme führte. Am günstigsten wirken Coloquinten entschieden bei Wassersucht mit oder ohne chronische Nierenaffectionen, wo sie nicht allein reichliche flüssige Stühle bedingen, sondern auch manchmal entschieden zur Vermehrung der Harnmenge führen.

Man darf sich indessen hier nicht zu allzugrossen Dosen versteigen, weil solche namentlich bei an sich geschwächten Individuen zu Collapsus Veranlassung geben können. Die von Christison empfohlene Einreibung der Tinctur in die Schenkel dürfte wohl kaum zum Ziele führen. — Auch in Fällen wo man ableitend auf den Darmcanal wirken will, z. B. bei Hirnaffectionen, sind die Fructus Colocyntidis empfehlenswerth. Auch stehen sie als Emmenagogum in Ruf — schon Hippokrates wandte mit Coloquintenabkochung getränkte Pessarien an — und haben, als solches in England als Volksmittel angewendet, schon mehrfach Vergiftungen bedingt. Der Gebrauch der Tinctur gegen Nachtripper hat wohl keine specielle Indication. Ebenso sind die Coloquinten kein eigentliches Bandwurm-mittel, sondern nur zur Entleerung der getödteten Tänien brauchbar, wofür jedoch mildere Abführmittel ausreichen.

Contraindicationen der Coloquinten bilden entzündlichen Zustand des Darmrohres und bestehende Gravidität, auch bedeutenden Schwächezustand bei Hydropischen.

Man verordnet die Fructus Colocyntidis zu 0,03—0,3 (ad 0,3 pro dosi, ad 1,0 pro die!) als Drasticum.

Am gebräuchlichsten ist die Pulverform, doch ziehen Manche (besonders bei Hydropischen) Abkochungen mit Wasser oder Bier (Hufeland) vor, wobei man 1,0—4,0 des von den Samen befreiten Markes auf 200,0 Colatur rechnet, wovon man dreimal täglich 1 Esslöffel nehmen lässt. Solche Coloquintenabkochungen werden auch als Klystier benutzt.

#### Präparate:

1) **Extractum Colocyntidis; Coloquintenextract.** Durch 6tägige Maceration von 2 Th. Coloquinten mit 15 Th. verdünntem Weingeist und 3tägige Maceration des Rückstandes mit 5 Th. Weingeist und 5 Th. Wasser dargestelltes trockenes Extract, gelbbraun, in Wasser trübe löslich. Dosis 0,005—0,05 (ad 0,05 pro dosi, ad 0,2 pro die!). Als Purgans meist in Verbindung mit anderen purgirenden Extracten. Eine solche Verbindung von Coloquintenextract 3 Th., Aloë 10 Th., Resina Scammoniae 8 Th., Extractum Rhei 5 Th. bildet das zu 0,015—0,1 in Pillenform benutzte, früher officinelle Extractum Colocyntidis compositum. Zur Minderung der Kolikschmerzen verbindet man das einfache und zusammengesetzte Coloquintenextract mit Extractum Belladonnae oder Extractum Hyoscyami (letzteres z. B. in den Pilulae Colocyntidis et Hyoscyami Ph. Br.).

2) **Tinctura Colocyntidis; Coloquintentinctur.** Macerationstinctur der Coloquinten mit den Samen, mit 10 Th. Spiritus bereitet, gelb, sehr bitter. Zu 0,5—2,0 (ad 2,0 pro dosi! ad 6,0 pro die!) Wurde früher auch zu Einreibungen (z. B. nach Heim mit 3 Th. Oleum Ricini) theils zur Zertheilung von Geschwülsten, theils wegen vermeintlicher diuretischer Effecte benutzt.

Reines Colocynthin (von Merck) empfiehlt Hiller in Weingeist, Glycerin und Wasser im Verhältniss von 1:300 gelöst, zu 0,01 subcutan Morgens und

Abends bei habitueller Stuhlverstopfung, doch ruft die Injection heftigen localen Schmerz hervor, weshalb sich die völlig schmerzlose Application derselben Menge in 5,0—10,0 der genannten Lösung empfiehlt, welche in  $\frac{1}{2}$ —1 Std. reichliche breiige Stuhlentleerung mit mässigen Kolikschmerzen bedingt.

### Verordnungen:

1)	R	2)	R
	<i>Fructum Colocynthis a semin. liberatorum</i> 4,0 (gm. 4)		<i>Extracti Colocynthis</i> 1,0 (gm. 1)
	<i>coque c. Aq. font. q. s. ad colaturam</i> 200,0		<i>Extracti Aloës</i> 2,0
	<i>Sub finem coctionis adde</i>		<i>Extracti Hyoscyami</i> 0,5
	<i>Fructum Anisi</i> 4,0		<i>M. f. pilul. No. 30. Consp. D. S. Abends</i>
	<i>Colaturae refrigeratae adde</i>		1 Pille. (Bei habitueller Obstipation.
	<i>Syrupi Sacchari</i> 25,0		Soll eine Steigerung der Dosis nie bedürfen (?). Epenstein.)
<i>M. D. S. Dreimal täglich 1 Esslöffel.</i>			

Sonstige purgirende Cucurbitaceen. — Aus der Familie der Cucurbitaceae stammen noch zwei früher viel gebrauchte Drastica, die *Radix Bryoniae*, von *Bryonia alba* L., der bei uns in Hecken wachsenden Zaunrube, und das *Elaterium*, der aus dem Saft der Frucht von *Ecbalium officinale* Nees (*Momordica Elaterium* L.), der in Griechenland und Südeuropa wilden Springgurke oder Eselsgurke, gewonnene Bodensatz.

Die *Radix Bryoniae*, deren wirksamen Bestandtheil, das Glykosid Bryonin, Walz isolirte, ist in ihrer Wirkung, vielleicht nach der Jahreszeit der Einsammlung, sehr ungleich. Früher galt sie besonders als *Drasticum hydragogum* und kam namentlich bei Geisteskrankheiten, Epilepsie und ähnlichen Leiden in Anwendung. Der frisch ausgepresste Saft (zu 5,0—15,0) wurde zu Frühlingscuren benutzt; die trockne Wurzel gab man zu 0,3—0,5 in Pulverform, oder im Aufguss (4,0—15,0 auf 120,0—180,0 Colatur). Aeusserlich wirkt sie etwas hautröthend und wurde früher bei Rheumatismus und Gicht, in Scheiben geschnitten aufgelegt, benutzt, weshalb sie auch Gichtrube heisst.

Von *Elaterium* kommen im Handel zwei Sorten vor, welche der Farbe nach als *Elaterium album* und *nigrum* unterschieden werden. Das erstere, auch als *Elaterium Anglicum* bezeichnet, ist bei Weitem kräftiger als das Malteser oder schwarze. *Elaterium album* ist offenbar der stärkste aller drastischen Stoffe, welcher nur von dem darin neben verschiedenen anderen Bitterstoffen (Prophetin, Elaterinsäure, Hydroelaterin, Elaterid) enthaltenen und ebenfalls in Anwendung gezogenen krystallinischen, in Wasser unlöslichen, in Aether leicht löslichen Elaterin an Activität übertroffen wird. Es ist aber auch das reinere *Elaterium* in seiner Zusammensetzung sehr schwankend, indem es bald 15—26 (Morries), bald 40 (Hennel), bald 50 % Elaterin enthält. Es hängt dies offenbar nicht mit Differenzen der Bereitungsweise, sondern mit dem differenten Gehalte des Fruchtsaftes an Elaterin in verschiedenen Jahreszeiten zusammen, der im Juli 4—5 %, im August nur 0,69 % und im September gar kein Elaterin (dagegen viel anderen Bitterstoff) enthält (Köhler). Das Elaterin kommt im Handel in so verschiedener Reinheit vor, dass man die purgirende Dosis mit Sicherheit nicht feststellen kann. Es giebt Sorten, welche schon zu 0,003 Erbrechen und Purgiren herbeiführen (Christison, Duncan, Buchheim und Wolodsko), während andere Sorten selbst nicht zu 0,015 drastisch wirken (Nickels, Hasse). Abgesehen von dieser Unsicherheit der Wirkung ist der Gebrauch des Elaterins auch seiner Gefährlichkeit halber zu widerrathen, insbesondere bei alten Leuten, die schon nach sehr geringen Mengen Hyperkatharsis bekommen, collabiren und zu Grunde gehen können, wie in einem Falle von Craig (1862) eine 70jährige Dame an 0,001 Elaterin. Von physiologischem Gesichtspunkte aus ist zu erwähnen, dass die Wirkungen des Elaterins auf den Darm sich nur entfalten, wenn es intern applicirt wird, und zwar auch dann nur, wenn es dabei mit Galle in Berührung kommt (Buchheim und Wolodsko, Köhler). Grössere Dosen bewirken bei Thieren entschiedene Entzündung im Magen und Darm. Beim Menschen ist das Purgiren stets mit starken Kolik-



schmerzen verbunden. Bei zwei Schülern Schroffs, welche 0,05 Elaterin versuchsweise nahmen, waren wiederholtes Erbrechen und Diarrhoe die Hauptsymptome, denen sich bei dem Einen noch Kopfweh und Eingenommenheit des Kopfes, bei dem Anderen Niesen und Epistaxis anschlossen. 0,15 Elaterium können den Tod eines Erwachsenen herbeiführen (Beck). Bei anderer Application entbleibt entweder jede Wirkung (so bei Einreibung, endermatischer Anwendung, Inoculation) oder es treten (bei Subcutanapplication oder Injection in die Venen) nervöse Erscheinungen, wie Verlust des Bewusstseins und der Sensibilität, auch Tetanus und Dyspnoe, daneben Speichelfluss auf (Köhler). Buchheim stellt das Elaterin zu den Anhydriden, indem es, mit Kalihydrat behandelt, in einen gelblich-weißen Körper von sauren Eigenschaften, Buchheims Elaterinsäure, die zu 1,0 nicht purgirend wirkt, übergeht. — Die Indicationen für Elaterium sind im Allgemeinen dieselben wie die der Coloquinten. Besonders Ruf genießt es als Antihydopicum. Für Elaterium album giebt die British Pharmacopoeia 0,004—0,03 als Dosis an; nach Scoresby Jackson sind als gewöhnliche Dosis 0,008—0,015 erforderlich. Zur Verordnung dürfte sich nur die Pillenform eignen (mit Extractum Gentianae). Will man das Mittel versuchen, so muss man stets mit der kleinsten Gabe beginnen, um mögliche Intoxication zu vermeiden. Die betreffenden Dosen sind nicht in zu nahen Zwischenräumen zu geben. Sollte das Mittel heftige Entzündung und Hyperkatharsis bedingen, so sind Opium, demulcirende Getränke und Klystiere, Katalpasmen auf das Abdomen indicirt.

#### Gutti, Gummi Guttae, Cambogia; Gummigutt.

Die officinelle Sorte des als Malerfarbe vorzugsweise verwendeten Gutti oder Gummigutti, das sog. Siam-Gutti oder Röhrengutti, wird von einem in Siam und Ceylon wachsenden Baume aus der Familie der Clusiaceae, *Garcinia Morella Desrousseaux* (*Garcinia Gutta* Wight, *Garcinia elliptica* Wall., *Hebradendron cambogioides* Graham), von welchen eine Varietät mit gestielten männlichen Blüten ( $\beta$  pedicellata) auf Singapore cultivirt wird, abgeleitet.

Es stellt bis gegen 7 Cm. dicke, meist walzenförmige, auf der Oberfläche bestäubte, manchmal streifige, solide, selten hohle Stücke von schön rothgelber Farbe dar, welche sehr leicht in flachmuschelige, glänzende Splitter brechen; es ist vollkommen dicht, selbst in kleinen Stücken kaum durchscheinend, zerrieben von citronengelber Farbe, ohne Geruch und von anfangs kaum bemerkbarem, dann fast süßem, endlich kratzendem Geschmacke. Gutti ist ein Gummiharz, das sich deshalb in Alkohol und Aether nicht vollständig mit schön rubinrother Farbe löst und mit Wasser eine hellgelbe Emulsion bildet. Kaustische oder kohlen saure Alkalien geben dunklere, klare Lösungen, aus denen Säuren den Farbstoff präcipitiren. Ob andere Sorten, z. B. Ceylon-Gutti, eine andere Abstammung besitzen, ist zweifelhaft, aber irrelevant, weil kein anderes Gutti in unseren Handel gelangt. Mit Stärke verfälschtes Gummigutt ist an der durch Iod erzeugten grünen Färbung leicht zu erkennen.

Das Röhrengutti besteht nach Christison aus 73% des als Harzsäure zu betrachtenden Farbstoffes, der Gambogiasäure oder des gummiguttgelb, welche nicht so drastisch wie das Gutti selbst wirkt, aus 25% Gummi und 5% Wasser.

Die nicht in Wasser, aber in Aether oder Alkohol lösliche Gambogiasäure verbindet sich mit Basen zu gelbgefärbten amorphen Verbindungen, von denen die der Alkalien in Wasser löslich sind. Schon Christison fand, dass dieselbe nicht gleichwerthig als Drasticum mit der Gutti selbst, aus der sie dargestellt wurde, sei, und spätere Untersuchungen von Buchheim und verschiedenen seiner Schüler (Pabo, Daraszkievicz, Untiedt und Schaur) bestätigten

das Factum. Ausleerungen erfolgen nach Gambogiasäure bei Einzelnen auf 0,3—0,4 in wenigen Stunden, Anderen machen 0,6—0,8 nur Gefühl von Schwere im Abdomen, und selbst nach 1,0—2,0 erfolgen bei verschiedenen Personen von etwas Nausea und Mattigkeit begleitete diarrhoische Stühle erst nach 10—12 Stunden. Bei Hunden wirkt Gambogiasäure meist brechennerregend, aber selbst zu 1,2 nicht constant drastisch. Der Contact mit Galle ist zum Zustandekommen der purgirenden Wirkung der Gambogiasäure unerlässlich. Subcutane Application bedingt bei Hunden locale Abscesse. Ebenso variabel wie die Gambogiasäure selbst wirken die gambogiasauren Salze; das Kaliumsalz wirkt gar nicht, das Magnesiumsalz zu 0,4—0,5 und das Natriumsalz in höherer Gabe (bisweilen selbst nicht zu 1,2) abführend. Im Harn und unter normalen Verhältnissen der Gallenabsonderung auch in den Faeces findet sich Gambogiasäure nicht wieder; bei Einspritzung von gambogiasaurem Natrium in das Blut tritt ein harzartiger, von der Gambogiasäure verschiedener Körper im Urin neben kohlen-sauren Alkalien auf (Schauf). Tiedemann und Gmelin wollen Gambogiasäure nach Guttigenuss im Urin wiedergefunden haben.

Gutti bedingt zu 0,1—0,3 mässige, nicht beschwerliche Leibesöffnung; höhere Dosen bewirken Erbrechen.

Der längere Gebrauch soll nach Pereira Darmentzündung mit Ulceration und selbst den Tod veranlassen können; dagegen giebt Rayer an, dass täglich 2,5 sechs Wochen lang ohne Nachtheil genommen seien. Cholagog wirkt Gutti nicht (Rutherford).

Das Gummigutt wirkt im Wesentlichen den Coloquinten gleich und wird wie diese besonders wegen der flüssigen Stühle, die es bedingt, als Antihydropicum benutzt; doch ist der Wassergehalt der Stühle nach Gutti nicht grösser als nach anderen Drastica. Galle fehlt darin (Radziejewski).

Bei älteren Aerzten fand Gutti ausserdem bei chronischen Hautaffectionen, Gemüthsverstimnungen und besonders oft zur Entfernung von Bandwürmern Anwendung. In Italien und Frankreich (Malgaigne) hat man es auch bei Ruhr u. a. entzündlichen Affectionen des Tractus, jedoch in sehr kleinen Dosen, benutzt. Bei Hydropischen tritt oft auch nach grossen Dosen (0,8—1,2) kein Purgiren ein, dagegen vermehrte Diurese (Abeille).

Als Drasticum reicht man Gutti zu 0,1—0,3 pro dosi mehrmals täglich, am besten in Pillen, auch in Pulvern und Emulsion. Bei Ruhr giebt man 0,1—0,2.

Als maximale Einzelgabe ist 0,3, als Tagesgabe 1,0 zulässig. Das Gutti bildete in früherer Zeit den Hauptbestandtheil vieler marktschreierisch angepriesener drastischer Pillen, z. B. der Morisonschen und Moerikeschen Pillen, ebenso diverser älterer Bandwurmmittel, wo man Gutti mit anderen Drastica oder mit Rhizoma Filicis combinirte. In England und Frankreich sind noch jetzt abführende Pillengemenge aus Gutti, Aloë u. s. w. unter verschiedenen Namen (Pilulae Bontii, Pilulae Cambogiae compositae) gebräuchlich. Als Diureticum wird Gutti entweder mit Scilla, wie in den Heimschen Pillen, oder auch mit Alkalien gegeben; man muss hier mit kleineren Tagesgaben beginnen und allmählig steigen. Früher waren auch Lösungen in Alkohol mit Zusatz von Alkali (Tinctura Gutti kalina) gebräuchlich.

#### Verordnung:

1)	R	<i>Pulv. fol. Digitalis</i>
	<i>Gutti</i>	<i>Extr. Pimpinellae</i> aa 1,5 (dgm. 15)
	<i>Bulbi Scillae</i>	<i>F. pilul. No. 60. Consp. D. S.</i> 3mal
	<i>Stibii sulfurati aurantiaci</i>	täglich 2—3 Stück. (Heims <i>Pilulae hydragogae.</i> )

**Oleum Crotonis; Crotonöl.**

Als das stärkste der officinellen Drastica, welches vor den übrigen sich auch durch stark hautreizende Wirkung auszeichnet, schliesst das Crotonöl die Reihe der darmreizenden Stoffe ab. Dasselbe ist ein fettes Oel, welches aus den Samen einer auf der Malabarküste und verschiedenen ostasiatischen Inseln wachsenden, in Ostindien, Cochinchina und China cultivirten baumartigen Euphorbiacee, *Tiglim officinale* Klotzsch (*Croton Tiglim* L.), durch Auspressen gewonnen wird.

Die Crotonsamen, auch als Purgirkörner oder Granatill, *Grana Tiglii* s. *Grana Moluccana*, bezeichnet, sind den Ricinussamen ähnliche, stumpfeiförmige, der Länge nach durch einen etwas zugeschärften Rand in zwei ungleiche Hälften getheilte Nüsschen mit dunkel graubrauner oder gelblicher, wenig und kleingefleckter, zerbrechlicher Schale und weisslichem, derbem, anfangs ölig, später scharf schmeckendem Kerne. In gleicher Weise verhält sich dem Geschmacke nach das gelbbraune oder dunkelbraune, sauer reagirende Crotonöl, das sich in 36 Th. Spiritus und leicht in Aether löst. Der Oelgehalt der Samen schwankt zwischen 30 und 60 %. Auch das Holz, früher als *Lignum Pavanae* oder *Lignum Moluccanum* bezeichnet, besitzt scharfe Eigenschaften, wahrscheinlich auch die Blätter und grünen Theile der Pflanze. Die Samen sind mindestens ebenso scharf und giftig wie das Oel, so dass schon ein einziger frischer Samen bedenkliche Gastroenteritis mit choleriformen Erscheinungen veranlassen kann (Wallich). Vier Samen sollen den Tod eines Menschen, zwanzig den eines Pferdes bewirken. Schon das Auspacken der Samen kann bei den damit beschäftigten Arbeitern Entzündung der Augen und Irritation der Schling- und Athemwerkzeuge bedingen.

Als der wirksame Bestandtheil des Crotonöls ist nach den neuesten Untersuchungen von Buchheim eine eigenthümliche scharfe Säure, die Crotonolsäure, anzusehen, welche in dem Crotonöl des Handels theils frei, theils als Glycerid, aus welcher Verbindung sie durch die Alkalien der Darmsäfte frei gemacht wird, sich findet. Diese Säure wirkt sowohl auf die äussere Haut als auf den Darmtractus in hohem Grade reizend und ist mit dem Crotonol von Schlippe identisch, in welchem man früher das hautreizende Princip des Crotonöls sah, während man zufolge ungenügender Versuche Schlippes an Thieren demselben die drastische Wirkung absprach und letztere in Zersetzungsproducten der Crotonolsäure suchte, welche beim Verseifen des Oels im Darme entstehen.

Das Crotonöl ist ein Gemenge von Glyceriden verschiedener Säuren aus der Reihe der fetten Säuren (Stearin-, Palmitin-, Myristin- und Laurinsäure), verschiedener flüchtiger Fettsäuren (Essig-, Butter-, Baldriansäure und einer eigenthümlichen, von Geuther als Tiglinsäure bezeichneten), die durch Einwirkung des atmosphärischen Sauerstoffs auf die festen Fettsäuren sich bilden, der Oleinsäure, der Crotonolsäure und von etwas Cholesterin. Die Crotonolsäure giebt wie die Ricinolsäure bei trockner Destillation des neutralen Natriumsalzes Oenanthol und beim Kochen mit Salpetersäure Oenanthylsäure, dagegen beim Kochen mit Kalihydrat (statt Sebacylsäure) eine der Korksäure nahestehende Säure, welche Buchheim Crotonylsäure nennt. Die Crotonolsäure wird äusserst leicht durch überschüssiges Kalihydrat zersetzt und färbt sich dabei dunkel; das dabei gebildete Zersetzungsproduct ist von bitterem Geschmacke und ohne purgirende Wirkung. Die entgegengesetzte, früher von Buchheim und Krich



und neuerdings von Radziejewski vertretene Ansicht, dass das Crotonöl diesem Zersetzungsproducte seine drastische Wirkung verdankt, erklärt sich daraus, dass das bei den Versuchen gebrauchte Product noch unzersetzte Crotonolsäure enthielt. Letztere bildet eine farblose oder schwach weingelbe, terpenthinähnliche Masse von eigenthümlichem Geruche, welche etwa zu 4% frei im Crotonöl vorkommt. Durch Schütteln mit Weingeist lässt sich die freie Crotonolsäure dem käuflichen Oele entziehen, das zurückbleibende, hellere und dem Ricinusöl ähnliche Oel ist zu 1 Tropfen drastisch, — weil durch das Alkali des Darmsaftes wieder Crotonolsäure frei wird —, entbehrt dagegen der irritirenden Wirkung auf die Haut, weil diese nur der freien Crotonolsäure zukommt. Die aus dem mit Alkohol geschüttelten Oele dargestellte Crotonolsäure bewirkte in Versuchen von Buchheim und Krich (1857) bei Ersterem zu 0,046 mit *Sapo med.* in Pillen) Kratzen im Halse, Nausea, Borborygmen und in 2 Stdn. eine halbflüssige Stuhlentleerung, bei Krich Aufstossen und zu 0,092 auch Stuhlentleerung. Auch die crotonolsauren Verbindungen mit Natrium und Magnesium wirken zu 0,04–0,06 purgirend oder emetokathartisch, nicht aber Crotonolamid und Crotonolsäure-Aethyläther (selbst nicht zu 0,35). Die nach Buchheims neueren Versuchen sich ergebende Anschauung, dass die Crotonolsäure das drastische und dermerethistische Princip des Crotonöls sei, macht allen bisherigen Schwierigkeiten in der Theorie der Wirkung des Crotonöls ein Ende. Natürlich fallen damit Dominés Crotonsäure (angeblich flüchtig) und das krystallinische Crotonin von Brandes, welches schon Weppen als crotonol-saures Magnesium erkannte.

Das Crotonöl äussert irritirende Einwirkung auf die Haut und auf verschiedene Schleimhäute. Auf der Haut erzeugt es einen ekzematösen Ausschlag, welcher mit dem durch Emetin und Brechweinstein hervorgerufenen die meiste Analogie zeigt.

1–2 Tropfen Crotonöl erzeugen, pure auf die äussere Haut eingerieben, schon nach 5–10 Min. Brennen, Prickeln und Jucken, das stundenlang anhalten kann; die Stelle röthet sich, erscheint angeschwollen, und auf derselben entstehen kleine Vesikeln, die anfangs mit Serum, später mit Eiter sich füllen und in 3–5 Tagen zu oberflächlichen Schorfen eintrocknen. Wiederholte Application auf dieselbe Stelle steigert den Effect nicht; tiefer gehende Ulcerationen, wie Brechweinstein, bringt *Oleum Crotonis* nicht hervor; ebensowenig hinterbleibt nach der Application eine Narbe. Nach Inoculation von Crotonöl entsteht eine enorme Papel, welche in eine grosse Pustel übergeht. Mit einem Tropfen Oel lassen sich mehr als 50 Pusteln hervorbringen. Bisweilen erfolgt nach Einreibung von Crotonöl auch Bildung von Ekzembläschen an entfernten Körperstellen.

Ob bei externer Application Resorption des activen Bestandtheiles des Oeles eintritt, ist fraglich. Die älteren Angaben, dass nach Einreibung von Crotonöl auf die Bauchhaut Purgiren eintrete, sind durch neuere Versuche nicht bestätigt. Krich rieb sich 3 Tropfen, 9 Stunden später 6 Tropfen und am anderen Morgen 12 Tropfen in die Haut des Abdomens ein, ohne dadurch purgirende Wirkung zu erzielen. Nach M. Langenbeck erzeugen 1,2, binnen 14 Tagen am Abdomen inoculirt, keine Durchfälle, doch scheint der Stuhlgang bei habitueller Obstipation zur Norm zurückzukehren. Nach Anglada u. A. soll auch Einreibung von Crotonöl auf die Zunge Purgiren bedingen können.

In kleinen Mengen in den Mund gebracht, erregt Crotonöl brennende Empfindung und anhaltendes Kratzen im Halse, welches stundenlang anhält und durch tiefe Inspirationen gesteigert wird (Schroff). In den Magen und Darmcanal gelangt, bedingt es nach Maassgabe der angewandten Menge Reizungserscheinungen von der verschiedensten Intensität. Bei medicinalen Dosen von 0,03–0,1 beschränken sich die Wirkungen, von Brennen im Magen, Kollern im Leibe und Kolikschmerzen, abgesehen, auf 5–10 flüssige Darment-

leerungen, welche in vielen Fällen schon  $\frac{1}{2}$  Stunde und noch früher nach dem Einnehmen, fast immer aber vor Ablauf von 2 Stunden auftreten.

Die Crotonstühle enthalten ebensoviel Wasser wie die Entleerungen nach Gutti; ausserdem Peptone, Galle, das saccharificirende Ferment des Darmsaftes, Leucin und Tyrosin, endlich unveränderte Muskelbündel (Radziejewski). Tenesmus und Brennen im Rectum sind bei der Defäcation nicht bedeutend. In vielen Fällen erregt schon 1 Tropfen Ekel und Erbrechen, welche bei grösseren Gaben niemals fehlen. Dem ersten Stuhlgange, der in der Regel fester als die späteren ist, geht bisweilen Unruhe, Beschleunigung des Athems und gesteigerte Pulsfrequenz voraus. Am zweiten Tage besteht meist nur noch etwas Appetitlosigkeit. In einzelnen Fällen, wo das Crotonöl in der angegebenen Dosis kein Purgiren verursacht, kommt es zu nervösen Erscheinungen, welche sich durch heftige Präcordialangst, allgemeine Unruhe, Herzklopfen, Kopfschmerz, Schwindel, leichte Ideenverwirrung, Mattigkeit, Schmerzen in den Gliedern und fliegende Hitze zu erkennen geben. Dieselben Erscheinungen treten auch bei grossen vergiftenden Dosen ein, wobei sich gleichzeitig Brechdurchfälle und hochgradiger Collapsus (mit Cyanose, kalten Schweissen, Anaesthesie) einstellen, die den Tod herbeiführen können. Schon durch 20 Tropfen innerlich kann der Tod eines Erwachsenen bedingt werden. Die Erscheinungen bei Thieren sind im Wesentlichen dieselben. Duméril, Demarquay und Lecoq fanden bei Hunden nach 2–6 Tropfen Crotonöl in Emulsion zuerst geringe Verminderung der Temperatur, dann Zunahme von 1,3–1,4°; nach 12 Tropfen Sinken um 1–5,3°.

Auch selbst gegen Crotonöl bestehen sehr verschiedene Grade der Empfänglichkeit und bei wiederholter Darreichung kann sich sogar eine gewisse Toleranz ausbilden (Taylor). Andererseits kann auf  $\frac{1}{3}$  Tropfen Crotonöl bei Erwachsenen sehr heftiger Brechdurchfall mit starkem Collapsus folgen (Cowan). Diese Differenzen kommen auch bei Thieren vor, so dass 20–30 Tropfen auf Pferde nicht toxisch influiren (Wibmer), während bei anderen 15 Tropfen den Tod bedingen (Taylor); einzelne Kaninchen ertragen 7 Tropfen, andere sterben nach 2 Tropfen.

Bei der Section intern mit Crotonöl Vergifteter findet sich in der Regel lebhafte Entzündung im Magen und Darm, besonders im Dünndarm. Entzündliche Erscheinungen im Tractus, sowie Erbrechen und Durchfälle bei Lebzeiten beobachteten Conwell, Hertwig und Kramer auch bei Thieren nach Einspritzung von Crotonöl in die Venen; Buchheim sah dagegen in seinen Versuchen nur Erscheinungen, die auf Fettembolie in Lungen und Hirn hindeuten.

Die chologoge Action des Crotonöls ist geringer als die der Coloquinten (Rutherford).

Die purgirende Wirkung des Crotonöls tritt auch bei Einführung in das Rectum ein, doch ist dazu eine grössere Menge (3–5 Tropfen) erforderlich.

Das Crotonöl wird wegen seiner intensiven irritirenden Wirkung niemals als längere Zeit zu nehmendes Drasticum, sondern nur zur Erzielung einmaliger Leibesöffnung bei hartnäckiger Obstipation, wenn andere Purgantien nicht zur Beseitigung angehäufter Kothmassen genügen, gegeben.

Es qualificirt sich das Mittel deshalb besonders zum Versuche bei mechanischer Darmverengerung (Ileus), bei hartnäckiger Verstopfung im Gefolge von Hirn- und Rückenmarkskrankheiten und bei Colica saturnina, bei welcher sich schon durch eine einzige Dosis, fast immer aber nach der zweiten, Stuhlgang und Besserung der Schmerzen einstellt (Tanquerel des Planches). Vielfach im Gebrauch ist Crotonöl bei Obstipation von Geisteskranken, wo die zuverlässige Wirkung sehr winziger Mengen und die Möglichkeit, solche mit den gewöhnlichen Speisen beizubringen, das Medicament anzeigt.

Aeusserlich kann es zur Hervorrufung von Hautentzündung in allen Fällen dienen, wo man Brechweinstein anwendet, vor dem es den Vorzug, tiefgehende Ulcerationen nicht zu erzeugen, besitzt; besonders häufig wird es zur Einreibung in den Hals (bei chronischer Laryngitis) und hinter die Ohren (bei Ophthalmie und Zahnschmerzen) gebraucht.

Die purgirende Dosis des Crotonöls ist  $\frac{1}{6}$ —1 Tropfen. Als höchste Einzelgabe ist 0,05, als höchste Tagesgabe 0,1 zulässig. Am zweckmässigsten giebt man dasselbe mit Zucker verrieben in Pulverform oder in fetten Oelen gelöst.

Eine Lösung von 1 Tropfen in 30,0 Mohnöl bildet das sog. *Oleum Ricini artificiale Ph. paup.*, welches nicht einmal den Vorzug der Billigkeit vor gewöhnlichem Ricinusöl hat. Ausser den angegebenen Formen ist Crotonöl auch in Gallertkapseln (mit Ricinusöl), in Syrupen, wo wegen Ausscheidung des Oels an der Oberfläche genaue Dosirung unmöglich ist, sowie in Emulsion gegeben. Nicht unzweckmässig ist die Pillenform (mit *Sapo medicatus* oder abführenden Extracten mit *Pulv. Althaeae*). Auch eine Crotonseife, *Sapo Crotonis*, ist zu 0,1—0,2 als Purgans vorgeschlagen, jedoch sehr unzuverlässig.

Aeusserlich gebraucht man *Oleum Crotonis* zu Klystieren (zu 1—2 Tropfen in Emulsion) oder zu hautreizenden Einreibungen (entweder für sich oder verdünnt mit fetten oder ätherischen Oelen, *Spiritus* oder *Glycerin*).

#### Verordnungen:

- |  |   |
|--|---|
| <p>1) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Olei Crotonis</i> gtt. 1<br/> <i>Sacchari lactis</i> 3,0</p> <p><i>M. f. pulv. Div. in part. aeq. No. 3.</i><br/> <i>D. S.</i> 2stdl. 1 Pulver.</p> | <p><i>M. D. S.</i> Zweistündlich 1 Esslöffel voll. (Bei Bleikolik. Tanquerel des Planches.)</p>   |
| <p>2) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Olei Crotonis</i> gtt. 2<br/> — <i>Ricini</i> 60,0</p>  | <p>3) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Olei Crotonis</i> 1,0<br/> — <i>Cajeputi</i><br/> <i>Spiritus diluti</i> aa 0,35<br/> <i>M. D. S.</i> Zur Einreibung. (<i>Linimentum Crotonis Ph. Br.</i>)</p> |



## Dritte Abtheilung. Allgemeine Arzneimittel, Pansomatica.

---

### VIII. Classe. Plastica, Plastische Mittel.

Diese Classe umfasst die bei Schwächezuständen benutzten Medicamente, welche früher insgemein unter der Bezeichnung Tonica oder Roborantia zusammengefasst wurden. Es gehören dahin theils directe Ersatzmittel organischer oder unorganischer Bestandtheile des Körpers, die bei gewissen Krankheitszuständen in ihrer Menge vermindert sind, wie z. B. Eisen im Blute bei Chlorose, theils Stoffe, welche Zunahme der Körperkraft durch Hebung der Digestion bedingen. Diese letzteren von den directen Plastica als besondere Classe abzutrennen, halten wir für um so weniger erlaubt, als z. B. im Kochsalz eine Substanz existirt, welche sowohl durch Besserung der Digestion als auch als integrierender Bestandtheil des Organismus eingeführt werden kann.

Wir handeln die zu dieser Classe gehörigen Stoffe in der Reihenfolge ab, dass wir zuerst die sog. bitteren Medicamente besprechen, denen wir dann gewisse peptische Secrete anschliessen, welche zur Hebung der Verdauung da, wo sie in krankhaften Zuständen fehlen, von aussen eingeführt werden müssen. Von diesen bildet die Ochsen-galle ein directes Bindeglied zwischen den Plastica amara und Plastica peptica und die Chlorwasserstoffsäure den Uebergang zu den unorganischen Bestandtheilen des Organismus, welche in gewissen Krankheiten des Körpers fehlen. Das Extractum carnis führt von diesen zu den eigentlichen Nahrungsmitteln über, denen wir dann einige Genussmittel, Kohlehydrate und Fette anschliessen.

---

#### 1. Ordnung. Plastica amara, bittere plastische Mittel.

Ueber die Wirkung der bitteren Mittel wissen wir bis jetzt mit Bestimmtheit nur, dass sie bei Einführung per os zunächst

vermehrte Absonderung von Speichel bedingen, wodurch möglicher Weise die Digestion der Amylaceen gefördert werden kann, dass aber die vielfach vermuthete reflectorische Vermehrung der Absonderung von Magensaft höchst unwahrscheinlich ist, indem unter dem Einflusse von Bitterstoffen die Verdauung von Eiweissstoffen geradezu verzögert wird (Buchheim und Engel). Schnellere Verdauung von Proteinsubstanzen oder Amylum in Verdauungsflüssigkeiten ausserhalb des Körpers bedingen die Amara ebenfalls nicht (Buchheim und Engel). Ferner steht fest, dass die Amara Gährungsprocesse zu beschränken im Stande sind, und zwar sämmtlich in höherem oder geringerem Grade, ein Umstand, der für die Anwendung derselben bei Verdauungsstörungen spricht, welche von abnormen Gährungsvorgängen im Magen abhängen oder von solchen begleitet sind.

Der therapeutische Werth der Amara beschränkt sich aber keineswegs auf derartige chronische Magenkatarrhe mit Fermentation, sondern es können dieselben, wie die tägliche praktische Erfahrung lehrt, bei Dyspepsien verwendet werden, welche, ohne an Gährungserreger gebunden zu sein, mit allgemeinem Schwächezustande und vorzüglich mit Anämie verbunden sind. Es gehört dahin besonders die Dyspepsie Chlorotischer, ferner die Verdauungsschwäche, welche in der Reconvalescenz von schweren acuten Krankheiten (Typhus, Pleuritis u. s. w.) oder nach schweren Verletzungen etc. sich findet, endlich die Dyspepsia potatorum. Dass bei dieser Wirkung die zuerst von Traube vermuthete, dann für zwei Bitterstoffe (Columbin und Cetrarin) von H. Köhler nachgewiesene Blutdrucksteigerung im Spiele ist, welche auch eine Erklärung dafür bieten kann, dass plethorische Individuen in der Regel Bitterstoffe nicht gut toleriren, gilt wenigstens nicht für alle Bitterstoffe. Eine Contraindication bilden entzündliche und ulcerative Processe im Magen, so dass die Anwendung beim acuten Magenkatarrh zu vermeiden ist. Vor allzu grossen Dosen der Amara hat man sich überhaupt zu hüten, da dadurch oft geradezu Störungen der Digestion resultiren.

Die der Ordnung der Amara angehörigen Drogen, denen sich übrigens, ausser den schon betrachteten Aloë und Rheum, noch einige andere später zu erörternde wichtige Medicamente (Chinarinden, Brechnuss) anreihen, gehören sämmtlich dem Pflanzenreiche an und verdanken ihre Wirksamkeit zum grössten Theile indifferenten Stoffen, zum kleineren Alkaloiden (Berberin) oder Säuren (Cetrarin). Eine Differenz der Wirkungsweise nach der chemischen Verschiedenheit der wirksamen Stoffe ist bis jetzt nicht nachgewiesen. Man ist gewohnt, nicht die Art des Bitterstoffes, sondern die in den Drogen neben dem bitteren Princip enthaltenen Stoffe, welche die Wirkung modificiren oder ihrerseits eine besondere Action auszuüben im Stande sind, zum Eintheilungsprincip zu machen. Man unterscheidet danach:

1) *Amara mera s. pura*, rein bittere Mittel, in welchen neben dem Bitterstoffe keine bemerkenswerthe Menge einer anderen wirksamen Substanz, insbesondere weder Tannin noch Stärkemehl noch ätherisches Oel noch anorganische Salze, in erheblicher Quantität, sich findet: Quassia, Gentiana, Centaurium minus, Trifolium fibrinum u. a.

2) *Amara mucilaginosa*, schleimig bittere Mittel, welche neben Bitterstoff noch Amylum in grösserer Menge enthalten und deshalb bei vorhandenen Darmkatarrhen stopfend und gleichzeitig auch in gewisser Weise nutritiv wirken, weshalb man dieselben einerseits bei Ruhren, andererseits bei Phthisis verwendet. Hierher gehören besonders Colombo und Lichen Islandicus.

3) *Amara aromatica s. excitantia*, aromatisch-bittere Mittel, welche neben Bitterstoff noch grössere Mengen von ätherischem Oele enthalten und in Folge davon in grösseren Dosen erregend auf die Gefässthätigkeit, daneben aber durch reflectorische Vermehrung des Magensaftes in ausgezeichneter Weise digestiv wirken; z. B. Cort. Aurantii, Lupulus, Absinthium, Calamus, Millefolium, Cascarilla u. s. w.

4) *Amara salina s. resolventia*, lösende bittere Stoffe, welche eine grössere Menge von Salzen einschliessen und in Folge davon die Leibesöffnung zu fördern im Stande sind, weshalb man sie als Digestiva bei Neigung zu Obstipation und träger Defaecation benutzt. Es gehören hierher Löwenzahn u. a. zu den sog. Frühlingscuren in Anwendung gezogene bittere Kräuter, welchen man in alter Zeit besondere Wirkung auf die Leberfunction zuschrieb.

Endlich hat man noch die durch Gerbsäuregehalt ausgezeichneten *Amara adstringentia s. tannica*, adstringirend-bittere Mittel, unterschieden, wozu hauptsächlich antitypisch wirkende Drogen gehören.

Bei Anwendung der bitteren Mittel combinirt man dieselben häufig mit einander oder mit anderen Tonica, besonders Eisen. Die reinen Amara giebt man gern mit aromatischen Stoffen, theils zur Erhöhung ihrer digestiven Wirksamkeit, theils zur Verbesserung des Geschmackes.

#### **Radix Gentianae, Radix Gentianae rubrae; Enzianwurzel.**

Die Droge stellt die im Herbste und Frühjahr gesammelten, meist der Länge nach gespaltenen Wurzeläste und Wurzelstücke von *Gentiana lutea* L., *G. Pannonica* Scop., *G. punctata* L. und *G. purpurea* L., auf den Gebirgen Mittel- und Südeuropas, besonders den Alpen und Voralpen, wachsender Gentianen, dar.

Die Wurzel von *Gentiana purpurea* ist über 6 Dm. lang und oben gegen 4 Cm. dick, mehrköpfig, wenig verzweigt, von glattem, nicht holzigem, aber faserigem Bruche und zeigt getrocknet eine schmutzig gelbbraune, oben mehr oder weniger quer geringelte, sehr stark längsrunzlige Rinde, die auf dem gelbbraunen Querschnitte durch einen dunkeln Cambiumring von dem Kerne geschieden ist. Sie riecht eigenthümlich unangenehm, schmeckt anfangs süsslich, dann sehr bitter, ist zähe und biegsam und zieht begierig Feuchtigkeit an. Neben der in Folge ihrer Verwendung zur Darstellung eines durch Fermentation gewonnenen Branntweins (Enziangeist) in einzelnen Gebirgsgegenden fast ausgerotteten Wurzel von *Gentiana lutea* werden auch die kleineren, im Bau gleichen, zum Theil selbst stärker bitteren Wurzeln der drei genannten anderen Species von *Gentiana* gesammelt. Der wenig bezeichnende Name *Radix Gentianae rubrae* statuirte einen Gegensatz zu zwei nicht mehr officinellen, von Umbelliferen stammenden Wurzeln, *Radix Gentianae albae* (von *Laserpitium latifolium* L.) und *nigrae* (von *Peucedanum Cervaria* L.).

Die Bitterkeit der Enzianwurzel wird durch das in der frischen Wurzel zu 0,1 % vorkommende und nur aus dieser krystallinisch zu erhaltende Gentiopikrin bedingt.



Dieser von Kromayer 1862 entdeckte Bitterstoff löst sich leicht in Wasser und verdünntem Weingeist, in absolutem Alkohol erst beim Erhitzen, nicht in Aether, dagegen mit gelber Farbe in kaustischen Alkalien, und zerfällt beim Kochen mit verdünnter Schwefelsäure, Salzsäure und Oxalsäure in Glykose und gelbbraunes Gentiogenin. Er ist völlig verschieden von der nicht bitteren und auf den Organismus in keiner Weise einwirkenden Gentiansäure, welche, mit Gentiopikrin gemengt, die als Gentianin und Gentisin beschriebenen Körper darstellt. Zucker und Pektin finden sich reichlich, ätherisches Oel in sehr geringer Menge; Amylum fehlt.

Eine stark beschränkende Wirkung der Enzianwurzel auf die Fäulniss thierischer Stoffe erweisen ältere Versuche von Ebeling (1772), der dieselbe derjenigen der Chinarinde nahestehend und die von Quassia, Colombo und Salix übertreffend fand. Besonders erhebliche Wirkung auf den Thierkörper kommt dem Enzian und dem Gentiopikrin nicht zu. Ein Gemenge von Gentiansäure und Gentiopikrin (Gentianin) bewirkt nach Magendie zu 0,12 (in Alkohol gelöst) leichtes Wärmegefühl im Magen und, zu mehreren Dgm. in die Venen von Hunden gespritzt, keine Symptome. Auf die Darmausscheidungen ist Gentianin ohne Wirkung, ebenso wird die Milz dadurch nicht verkleinert. Grosse Mengen sollen die Verdauung stören und bei sensiblen Personen Kopfweg und Congestion hervorbringen können.

Vom therapeutischen Gesichtspunkte ist Enzian das vorzüglichste Amarum, das sich als Stomachicum bei atonischer Dyspepsie und chronischen Digestionsstörungen und ihren Folgezuständen bewährt und fast alle übrigen bitteren Mittel, selbst diejenigen, welche, wie Lignum Quassiae, grössere Intensität der Bitterkeit zeigen, ersetzen kann. Er fehlt kaum in einem der zusammengesetzten bitteren Präparate und ist ein Bestandtheil des früher als Specificum gegen Gicht empfohlenen Portlands antarthritic powder, wie Enzian selbst auch von Alters her bei gichtischen Affectionen in Ansehen stand.

Seine antiperiodische Wirkung ist wie die des als Medicament ganz entbehrlichen Bitterstoffs (Pool, Lange) höchst unbedeutend. Wegen ihres Vermögens, Flüssigkeiten zu imbibiren und dadurch aufzuquellen, hat Winkel Enzianwurzel nach Art der Laminaria als Erweiterungsmittel des Muttermundes empfohlen, zumal da sie vermöge ihres Bitterstoffes gleichzeitig antiseptisch wirke; doch ist ihr Quellungsvermögen viel geringer als das von Laminaria.

Die Radix Gentianae wird selten als solche in Pulverform (zu 0,25—1,0) oder im Decoct oder Infus (1:10—15) esslöffelweise mehrmals täglich gegeben.

#### Präparate:

1) *Extractum Gentianae*; *Enzianextract*. Wässriges, dickes Extract, braun; klar löslich. Innerlich zu 0,5—2,0 mehrmals täglich, in Pillen oder Lösung.

2) *Tinctura Gentianae*; *Enziantinctur*. Macerationstinctur, mit 5 Th. Spir. dil. bereitet, gelblich braunroth, stark bitter. Innerlich zu 20—50 Tropfen mehrmals täglich für sich oder mit anderen bitteren Tincturen.

3) *Tinctura amara*, *Tinctura stomachica*; *bittere Tinctur*, *Magentropfen*. Macerationstinctur aus Enzian, Tausendguldenkraut aa 3 Th., Pomeranzenschalen 2 Th., Pomeranzen und Zittwerwurzel aa 1 Th. mit 50 Th. Spir. dil. bereitet, grünlichbraun, bitter aromatisch. Zu 20—50 Tropfen innerlich mehrmals täglich.

Ein spirituöser Auszug der Enzianwurzel mit Natriumcarbonat oder Ammoniak ist in Frankreich als Elixir antiscrophuleux im Gebrauch.

**Folia Trifolii fibrini**, Herba Trifolii fibrini, Herba Trifolii, Herba Menyanthis;  
Fiebertkleebblätter, Bitterklee, Biberklee, Fiebertklee, Dreiblatt.

Der Fiebertklee stellt das dreitheilige Blatt einer im nördlichen Europa auf Sumpfwiesen wachsenden Gentianeae, *Menyanthes trifoliata* L., mit dem bis 1 Dm. langen und 5 Mm. dicken Stiele dar. Die Blättchen sind fast sitzend, rundlich eiförmig, bis 8 Cm. lang und halb so breit, ganzrandig oder grob gekerbt, mit breiter Spitze endigend, glatt, schmecken bitter und besitzen keinen erheblichen Geruch. Der Bitterstoff ist das 1860 von Kromayer entdeckte *Menyanthin*, eine amorphe, gelbliche, terpenhinartige Masse, die sich schwer in kaltem, leicht in kochendem Wasser und Weingeist, nicht in Aether löst und beim Erhitzen mit verdünnter Schwefelsäure sich in Zucker und ein flüchtiges, bittermandelölähnlich riechendes Oel, *Menyanthol*, verwandelt. Neben *Menyanthin* findet sich noch ein in Aether löslicher, kratzender Stoff.

Es ist ein billiges Amarum, dem man bei Wechselfieber nicht allzu viel Wirkung zutrauen darf, obschon es in einzelnen Gegenden Volksmittel ist. Als Zusatz zu bitteren Species ist es am gebräuchlichsten; auch kann der Saft der frischen Pflanze bei Frühlingscuren mit verwendet werden.

#### Präparat:

**Extractum Trifolii fibrini; Fiebertkleeextract.** Mit siedendem Wasser bereitetes dickes Extract, schwarzbraun, trübe löslich. Wie *Extractum Gentianae* benutzt.

**Herba Centaurii**, Herba Centaurii minoris; Tausendgüldenkraut.

Das bei uns allgemein und fast in ganz Europa verbreitete, mit den rosenrothen Blüten gesammelte Kraut von *Erythraea Centaurium* Pers. (*Gentiana Centaurium* L.), aus der Familie der Gentianeae, besitzt wenig Geruch und einen stark bitteren Geschmack, welcher nicht von dem von Méhu daraus dargestellten *Erythrocentaurin*, das sich durch die Eigenschaft, am Sonnenlichte roth gefärbt zu werden, auszeichnet, sondern von einem der Untersuchung noch bedürftigen Bitterstoffe herrührt. Es dient besonders als Zusatz zu bitteren Theespecies und Tincturen. Ein daraus bereitetes, rothbraunes, in Wasser klar lösliches, wässriges Digestionsextract, *Extractum Centaurii*, das man zu 0,5—2,0 in Pillen oder Lösung gab, ist nicht mehr officinell.

**Anhang:** Die Familie der Gentianeae liefert ausser Enzian, Fiebertklee und Tausendgüldenkraut noch diverse zu den *Amara pura* gehörende Drogen. Statt *Centaurium* hat die britische Pharmacopoe die von den Vorbergen des Himalaya stammenden *Stipites Chiratae* (*Chirayta* oder *Chiretta*), von *Ophelia Chirata* Griseb., welche nach Flückiger und Höhn analog dem rothen Enzian eine eigenthümliche Säure, die *Opheliasäure*, und einen glykosidischen Bitterstoff, *Chiratin*, enthält. In Nordamerika vertreten die *Herba Chironiae angularis*, von *Sabattia angularis* Pursh., in Chile das als *Cachen-Laguen* bezeichnete Kraut von *Chironia* s. *Erythraea Chilensis* die Stelle des Tausendgüldenkrautes im Arzneischatze. Allen diesen Gentianeae werden tonische und febrifuge Wirkungen nachgerühmt. Die orangegebe Wurzel von *Frasera Carolinensis* Walter (F. Walteri Michaux) wird als amerikanische Colombo (vgl. S. 650) bezeichnet, unterscheidet sich aber von der echten Colombo durch den mangelnden Stärkmehlgehalt. — Die Wurzel und das Kraut von *Gentiana cruciata* L. (in Deutschland einheimisch) ist von Ungarn aus als *Prophylacticum* der Hundswuth empfohlen, ohne natürlich mehr als andre mit Unrecht gepriesene *Antilyssa* zu leisten.

**Herba Cardui benedicti**, Folia Cardui benedicti; Cardobenediktenkraut.

Als Cardobenediktenkraut sind die Blätter und blühenden Zweige der Spinnendistel, *Cnicus benedictus* Gaertner (Cen-

taurea benedicta L.), officinell, welche ihre Wirksamkeit dem von Nativelle entdeckten, nach Scribe auch in anderen Centaurea-Arten enthaltenen Cnicin verdanken.

Die ursprünglich in Persien, Vorderasien und Griechenland einheimische, in Südeuropa verwilderte, bei uns in Gärten cultivirte Composite hat beinahe fusslange, buchtig fiedertheilige, bodenständige Blätter, mit rundlichen, stacheligen Sägezähnen und geflügeltem Stiele; die grossen einzelnen Blütenköpfchen, welche gelbe, röhrenförmige Zwitterblüthen einschliessen, sind von breiten, eiförmigen, scharf zugespitzten, spinnwebig behaarten Deckblättern umhüllt und in den derbstacheligen Hüllkelch eingeschlossen. Neben dem in kaltem Wasser wenig, in kochendem besser, in Weingeist sehr gut löslichen Cnicin finden sich im Cardobenediktenkraut reichliche Kalium-, Magnesium- und Calciumsalze, so dass die Droge zu den Amara salina gehört. Das Cnicin soll zu 0,36 innerlich brennende Hitze im Pharynx und Oesophagus, mit Constrictionsgefühl verbunden, Wärmegefühl im Epigastrium, Erbrechen, Kolik, Durchfall und manchmal einen 2—3 Stunden dauernden febrilen Zustand hervorbringen (Scribe) und zu 0,3—0,5 in wässriger Lösung (1 : 100) gegeben Wechselfieber sicherer als Salicin heilen (Bouchardat). Diuretische Effecte, welche den Cardobenedikten zugeschrieben werden, scheint Cnicin nicht zu haben, und würden, wenn sie existiren, den Salzen zuzuschreiben sein.

Während die Cardobenedikten im Mittelalter als ganz besonders heilkräftig galten und z. B. von Matthioli bei Pest, ansteckenden Fiebern und Krebs empfohlen werden, gebraucht man sie jetzt nur als Amarum bei Verdauungsschwäche, z. B. bei Dyspepsia potatorum.

Die Benutzung bei chronischem Bronchialkatarrh, Phthisis, Hydrops, oder selbst bei Convulsionen dürfte kaum Berechtigung haben.

Das Kraut kann im Infus und Decoct, zu 10,0—15,0 pro die, gegeben werden, doch sollen grosse Mengen dieser Auszüge leicht Erbrechen machen.

#### Präparat:

**Extractum Cardui benedicti; Cardobenediktenextract.** Dickes Heisswasserextract, mit grünlich brauner Farbe trübe löslich. Zu 0,5—1,0 in Pillen oder in aromatischen Wässern (Aqua Ment. pip., Aq. Amygd. am.) gelöst.

**Anhang:** Mehrere verwandte Syngenesisten scheinen ähnlich zu wirken, sind aber ausser Gebrauch, z. B. die früher gegen Wechselfieber empfohlene Centaurea Calcitrapa L., welche nach Scribe Cnicin enthält. Die den Cardobenedikten zugeschriebene Wirkung gegen den Krebs wird von Andren der Krebsdistel, Onopordon Acanthium L., beigelegt. Die Samen der Frauen- oder Mariendistel, Silybum Marianum Gaertn., welche den Rademacherianern als Mittel bei Uterin- und Lungenblutungen (als in eigenthümlicher Weise dargestellte Tinctur zu 15—30 Tr. 3—4 Mal täglich) gilt, enthalten ausser einem bitteren noch einen kratzenden Stoff und lassen sich bei Bronchialkatarrh mit Nutzen geben.

#### Lignum Quassiae; Quassiaholz, Fliegenholz, Bitterholz.

Im Handel finden sich zwei Arten Bitterholz, von denen das eine, früher allein officinelle Lignum Quassiae Surinamense s. Lignum Quassiae verum von einem in Surinam und auf den Antillen einheimischen, in Nordbrasilien und Cayenne gezogenen, kleinen, 3 Meter hohen Baume aus der Familie der Simarubeen, Quassia amara L. (mit prächtig rothen, grossen Blüthen), stammt, während die zweite Sorte, das Lignum Quassiae



Jamaicense s. Lign. Quassiae novae s. Lignum Picraenae, von einem 4—8 mal so hohen Baume Jamaicae, Picraena excelsa Planch. s. Quassia excelsa Sw. (mit unansehnlichen Blüten), kommt.

Das Holz beider Bäume ist weisslich, gut spaltbar und lässt auf dem Querschnitt unter der Loupe Jahresringe (bei Lignum Quassiae verae regelmässiger und kleiner und mehr kreisrund, beim Lignum Picraenae mehr wellenförmig) und Markstrahlen erkennen. Das Holz der Quassia amara ist dicht, die höchstens 2 Mm. dicke, spröde Rinde, welche das Holz an Bitterkeit übertrifft, graugelblich; auf dem Querschnitte sind oft von einem Pilzmycelium herrührende, blauschwarze Zickzacklinien oder Flecken vorhanden. Letztere fehlen auch im Jamaica-bitterholz nicht, das schwachgelbliche Farbe zeigt, während die bis 1 Cm. dicke Rinde bräunlich bis braunschwarz ist.

Das wirksame Princip der Quassia ist ein als Quassiin bezeichnetes indifferentes, aus alkoholischer Lösung krystallisirender Bitterstoff.

Eine genaue physiologische Prüfung des Quassiins und der Quassia fehlt. Bekannt ist, dass eine Abkochung des Holzes, welches daher den Namen Fliegenholz erhalten hat, Fliegen zu tödten (nicht allein zu betäuben) im Stande ist und als ein für Menschen nicht gefährliches Fliegengift Anwendung verdient. Die toxische Wirkung bei höheren Thieren ist eine relativ schwache. Die Angabe von Härtl (1826), wonach 0,06—0,12 alkoholisches Extract von Wunden aus bei Kaninchen Schwäche, Appetitmangel und Tod in 36 Stunden bedingt, steht im Widerspruche mit neueren Versuchen, wonach 0,4 Quassin beim Kaninchen innerlich nur 5stündiges Unwohlsein, so zwar, dass das Stehen auf den Hinterbeinen nicht möglich war und die Bauchlage eingenommen wurde, bedingt (Schroff) und 2,0—3,0 Mercksches Quassiin intern applicirt auf Hunde nicht toxisch wirken (Th. Husemann). Auf den Stuhlgang ist es ohne Einfluss. Von Menschen werden auch starke Gaben in der Regel gut ertragen und selbst die intensive Bitterkeit ruft meist wenig Belästigung hervor. Schwindel, Gesichtsröthung, Schwäche des Pulses und allgemeine Mattigkeit, welche Giacomini bei Versuchen mit Quassia-Aufguss an sich selbst beobachtet haben will, sind von keinem späteren Autor verbürgt; ebenso wenig die nach Barbier bei reizbaren Frauen danach auftretenden unwillkürlichen Muskelbewegungen.

Ueber die Wirkung auf die Fäulniss animalischer Stoffe liegen ältere Versuche von Ebeling (1772) vor, welche darthun, dass Quassia trotz ihrer Bitterkeit, hinsichtlich derer sie sich zunächst den Coloquinthen stellt und die meisten anderen Amara (Colombo, Salix, China, Gentiana) übertrifft, viel geringere antiseptische Wirkung als dies und die Chinarine besitzt.

Die Quassia theilt die Indicationen der bitteren Mittel im Allgemeinen, und besitzt trotz ihrer intensiveren Bitterkeit keine Vorzüge vor einheimischen Amara pura. Bei atonischen Zuständen der Verdauungswege wird sie am häufigsten verwendet.

Ursprünglich war sie in Surinam Volksmittel gegen Intermittens, und einem Neger Quassi, der damit Wechselfieber curirte und von welchem Rolander einen blühenden Zweig des Baumes erhielt, zu Ehren, gab Linné, der die Anwendung des übrigens schon früher in Europa bekannten Mittels sehr befürwortete, dem Baume den Namen Quassia. Die antitypische Wirksamkeit ist nicht grösser als die von Gentiana. Der wässrige Aufguss ist zum Klystier gegen Oxyuris und zur Befechtung von Verbandstücken im heissen Sommer, um das Auftreten von Fliegenmaden zu verhüten, gebraucht. Kraus empfahl sie aus homöopathischen Ideen (indem der lange fortgesetzte Gebrauch Amblyopie veranlassen soll) gegen Photophobie, wo sie wohl eben so wenig hilft wie die Impfung von Quassiaextract als Prophylacticum der Cholera (Honigberger).

Das Lignum Quassiae wird meist in Form flüssiger wässriger Auszüge gegeben. Die Maceration (2,5—5,0 auf 150,0—200,0) extrahirt zwar weniger

Quassin als die Abkochung, wird aber als besser zu vertragen von verschiedenen Seiten empfohlen, und kann als Vehikel für andere in gleicher Richtung wirkende Substanzen, z. B. Alkalicarbonate, dienen. Eine weinige Maceration passt in manchen Fällen von Atonie des Magens noch besser.

Die sog. Quassia becher, aus Quassiaholz gedrechselte Becher, in welchen man Wasser oder Wein lässt, um den Bitterstoff zu extrahiren, von dem schon in kurzer Zeit merkbare Mengen in die Flüssigkeit übergehen, haben kaum medicinische Bedeutung.

#### Präparat:

**Extractum Quassiae**, Extr. ligni Quassiae; **Quassiaextract**. Dickes Heisswasserextract, braun, in Wasser mit brauner Farbe trübe löslich. Zu 0,2 bis 0,5 in Pillen mehrmals täglich.

**Anhang:** Der Quassia botanisch und pharmakodynamisch nahestehend sind verschiedene aus dem tropischen Amerika stammende Drogen. So Cortex Simarubae, die Wurzelrinde von Simaruba medicinalis und officinalis DC., in Jamaica und Guyana einheimisch, zuerst als Ruhrwurzel von A. von Jussieu (1718) empfohlen, jetzt als bitteres Mittel wenig benutzt; daraus dargestelltes alkoholisches Extract tödtet subcutan Tauben nach vorhergehendem heftigem Erbrechen und flüssigen Dejectionen (Th. Husemann); grössere Gaben des Decoctes rufen auch bei Menschen Erbrechen hervor. Ferner die Quassia enthaltende Rinde von Bittera febrifuga Bel., von Delioux als Mittel gegen Wechselfieber benutzt, und die Cedronnüsse oder Cedronsamen, von Simaba Cedron Planch., so wie die derselben nahestehenden Valdivianüsse, welche im tropischen Amerika als Antiperiodicum und Mittel gegen den Biss giftiger Thiere im Ansehen stehen. Den aus demselben isolirten auf Warmblüter schon zu wenigen Mgm. höchst giftig wirkenden Bitterstoffen Valdivin und Cedrin fehlt die letztere Wirkung ganz, während nur dem Cedrin antitypische Action zukommt (Dujardin-Beaumetz und Restrepo).

#### **Radix Colombo**, Radix Columbo s. Calumbo; **Colombowurzel**.

Diese Droge, welche ihren Namen von der auf Ceylon gelegenen Stadt Calumbo führt, wird von einem an der Ostküste von Afrika (Mozambique) und auf Madagaskar einheimischen und auf den Inseln des ostindischen Archipels und auf der Malabarküste cultivirten Klimmstrauch aus der Familie der Menispermeeen, *Iateorrhiza Calumbo* Miers, abgeleitet.

Als Stammpflanzen der Colombo werden auch *Iateorrhiza Miersii* Ol. und *I. palmata* Miers (*Menispermum palmatum* Roxb. s. *Cocculus palmatus* Wall.) angegeben. Im Handel kommt die Colombowurzel meist der Quere, selten der Länge nach zerschnitten vor und besteht zumeist aus rundlichen oder elliptischen Scheiben von  $\frac{1}{4}$ —3 Cm. Dicke und 3—6 Cm. Durchmesser. Die Schnittfläche ist nicht eben, sondern hat in der Mitte eine Vertiefung. Die Droge zeigt nach aussen eine runzlige Schicht gelblich braunen Korkes, welche die etwa 5 Mm. breite, schön gelbe, nach innen immer heller werdende Rinde bedeckt, die durch eine sehr feine, aber scharf ausgeprägte, dunkelbraune Linie von dem tiefgelben, dicken, lockeren Holzkerne getrennt wird. Die Colombo ist mehlig und leicht zu gelbgrauem Pulver zu zerstoßen, welches einen schleimigen und stark bitteren Geschmack besitzt. Mit Iodlösung färbt sich Colombo ihres starken Amylumgehaltes wegen intensiv blau. Die dunkelbraune feinstrahlige Cambiumzone lässt die Colombo leicht von den vielfachen Verwechslungen unterscheiden, welche im Handel vorkommen und unter denen die mit gelbgefärbten Stücken von der stark drastisch wirkenden Wurzel von *Bryonia alba* L. und *B. dioica* L. die gefährlichste ist.

Die Wirksamkeit der Colombo ist theilweise bedingt durch

das reichlich in ihr enthaltene Stärkemehl, theils durch drei verschiedene Bitterstoffe, das basische Berberin, das indifferente Columbin und die Colombosäure.

Das Stärkemehl der Colombo, welches nach *Planche* 33% der Droge ausmacht, bildet deutlich geschichtete, vorwiegend kuglige Körnchen, welche nächst denen des Kartoffelstärkemehls zu den grössten Formen der Stärke gehören. Das in der Colombo von *Boedeker* zuerst nachgewiesene Berberin, über dessen grosse Verbreitung in den verschiedensten Pflanzenfamilien bereits S. 20 die Rede war, ist ein Alkaloid, das in gelben, bitterschmeckenden Nadeln krystallisirt, die sich in kaltem Wasser schwierig, in warmem ziemlich und in Alkohol leicht, in Aether gar nicht lösen. Das Berberin wirkt auf Thiere toxisch und bei subcutaner Application als Sulfat zu 0,1 unter Erscheinungen von Prostration und Sinken der Temperatur bei Kaninchen tödtlich, während intern grosse Dosen (0,8) keine erheblichen Störungen bedingen (*Curci*). Nach *Falck* und *Guenste* bedingt es bei Thieren Contraction der Milz, nach *Curci* solche der Gedärme in eigenthümlicher Weise und wirkt ausserdem auf rothe Blutkörperchen in der Weise ein, dass das Hämoglobin den Sauerstoff fester bindet und das Oxydationsvermögen des Bluts verringert wird. Bei Menschen bewirkt das Alkaloid selbst zu 0,5–1,0 in einigen Stunden breiige Stühle ohne Leibschmerzen. Chlorwasserstoffsäures Berberin und Berberinsulfat können zu 4,0 (*Berg*) und bei längerem Gebrauche selbst bis zu einer Gesamtmenge von 50,0 (*Macchiavelli*) ohne Störungen genommen werden. Im Urin konnte *Berg* es nicht wiederfinden. Kurz nach seiner Entdeckung in der Berberitzenwurzel durch *Buchner* ist das Berberin als vorzügliches Stomachicum und Chologogum (als Ersatzmittel des Rhabarbers) gerühmt; *W. Reil* empfahl es gegen Diarrhoe der Phthisiker und Diarrhoea infantum und nach meinen eigenen Erfahrungen ist das Mittel bei atonischen Dyspepsien in der Dosis von 0,05–0,2 von ausgezeichnetem Effect, während die stopfende Wirkung bei Diarrhöen (*Curci*) nicht selten ausbleibt. *Curci* glaubt Berberin besonders bei chronischer Dysenterie indicirt, um auf die bestehenden Geschwüre einen vernarbenden Einfluss auszuüben. Von anderen italienischen Aerzten (*Maggiorani*, *Macchiavelli*) ist Berberinum hydrochloricum mit grossem Erfolg gegen Malaria-Milzgeschwülste angewendet. — Das von *Wittstock* 1830 entdeckte Columbin krystallisirt in weissen Säulen oder Nadeln, schmeckt intensiv bitter, löst sich fast gar nicht in kaltem Wasser und nur sehr wenig in Alkohol und heissem Wasser, wohl aber in Aether. Zu 0,1–0,2 ist es bei Menschen und Thieren ohne toxische Wirkung (*Schroff*, *Falck*). Bei Thieren wirken kleine Mengen erhöhend, grosse herabsetzend auf den Blutdruck (*H. Köhler*). — Die von *Boedeker* entdeckte Colombosäure ist ein amorphes, bitteres Pulver, das sich in Wasser ebenfalls nur schwierig, besser in Weingeist löst und welches vielleicht in der Colombo mit Berberin verbunden ist.

Die Colombowurzel findet ihre besondere Indication bei Complication von Verdauungsstörungen mit Diarrhöen und kann auch bei chronischen Durchfällen jeder Art, insbesondere bei solchen nach dem Ablaufe dysenterischer Processe, und selbst bei Durchfällen der Phthisiker nicht ohne Erfolg gegeben werden.

Die Colombo wurde zuerst von *Redi* (1675) als Antibezoardicum empfohlen; später setzte man in Folge einer Verwechslung die durch strohgelbes Holz ausgezeichnete *Radix Lopez* (angeblich von *Toddalea aculeata*) an deren Stelle. Von vielen Seiten wird der Colombo besondere Wirksamkeit gegen Erbrechen zugeschrieben; *Pereira* empfahl sie in Verbindung mit Brausepulver bei Vomitus während der Gravidität und Dentitionsperiode und selbst bei Erbrechen in Folge von Nierenaffectionen. Als Stomachicum ist Colombo besonders zu empfehlen, weil der Magen selbst grössere Dosen erträgt. Die günstigen Effecte bei Ruhr haben ihr den Namen Ruhrwurzel eingetragen, den sie übrigens mit verschiedenen anderen Wurzeln, z. B. *Ipecacuanha*, theilt.



Man giebt die Colombo zu 0,3—2,0 in Pulver, häufiger im Aufguss (der besonders Berberin enthält) oder in Abkochung (die Berberin und Stärke enthält), wobei 1 Th. auf 10—20 Th. Colatur kommt.

Das früher officinelle *Extractum Colombo*, ein trocknes wässrig spiritüoses Extract, gab man zu 0,5—1,0 in Pulver, Pillen oder Mixturen (mit *Aqua Cinnamomi* oder anderen aromatischen Wässern.)

**Anhang:** An die Colombo schliessen sich verschiedene berberinhaltige Drogen an, welche auch als Amara dienen, jedoch wegen fehlender Stärke nicht so günstige Effecte auf den Darm besitzen. Dahin gehört die in Amerika als tonisirendes Mittel und in Abkochung auch gegen aphthöse Geschwüre benutzte Wurzel des sog. Goldzwirns, *Coptis trifolia*, die ebendasselbst wie Colombo gebrauchte sog. Gelbwurzel, die Wurzel von *Xanthorrhiza apiifolia* (Ranunculaceae) und das in Ceylon angewendete sog. ceylonische Colomboholz von *Coscinum* s. *Menispermum fenestratum*. Hierher gehört auch die in einzelnen Staaten der nordamerikanischen Union bei Malariafiebern und Typhen gebrauchte Oregontraube, *Berberis* s. *Mahonia aquifolium*.

#### Lichen Islandicus; Isländisches Moos, Isländische Flechte.

Ebenfalls durch gleichzeitigen Gehalt von Bitterstoff und Stärkemehl ausgezeichnet ist die im hohen Norden in der Ebene ausserordentlich häufige, im mittleren und südlichen Europa auf Gebirgen (Alpen, Harz u. s. w.), auch in Virginien und an der Südspitze von Südamerika vorkommende Flechtenart *Cetraria Islandica* Ach. (*Lichen Islandicus* L., *Physcia Islandica* DC.); doch unterscheidet sie sich von Colombo dadurch, dass der Bitterstoff, das Cetrarin (Cetrarsäure), die Eigenschaften einer Säure besitzt, während das Stärkemehl nur theilweise dem gewöhnlichen Amylum angehört, theilweise dagegen dem Inulin analog sich verhält.

Die bitter-schleimige Droge besteht aus dem ganzen, mit oder meistens ohne Früchte (Sporangien) gesammelten Thallus, der in der käuflichen Waare meist mit denen anderer Flechten, besonders Cladonien, Moosen und Fichtennadeln verunreinigt ist, die natürlich vor der medicinischen Benutzung zu entfernen sind. *Cetraria Islandica* ist eine mehrere Zoll hohe Parmeliacee mit buschartig aufrechtem, blattartigem Stamme, der unten schmaler, zusammengerollt oder rinnenförmig, weisslich und theilweise blutroth erscheint, oben breiter, unregelmässig, fast dichotomisch gelappt, glänzend braungrün oder kastanienbraun, auf der Rückseite blasser und gewöhnlich mit weissen, eingesenkten Punkten gezeichnet ist. Die Lappen sind am Rande mit braunen, steifen Wimpern besetzt, die oft in sackartige Höhlungen (Spermogonien) enden, in denen kleine stabförmige Zellen (Spermastien) sich befinden. Die braunen Früchte (Apothecien) bilden sich vorn an den Enden der Lappen. Die trockne Flechte weicht von der frischen nur durch grössere Steifigkeit und Brüchigkeit ab. Mit Wasser befeuchtet wird Isländisches Moos weich und lederartig; die wässrige Abkochung gelatinisirt beim Erkalten.

Die Cetrarsäure krystallisirt in Nadeln, ist in kaltem Wasser fast unlöslich, in kaltem Alkohol wenig löslich, bildet aber mit Alkalien in Wasser leicht lösliche, gelbe, sehr bitterschmeckende Salze. Die Lösungen derselben bräunen sich, wobei der Geschmack verschwindet.

Man nahm in dem Isländischen Moos früher nur eine besondere Stärkemehlart, Lichenin oder Flechtenstärke, an. Nach Th. Berg (1873) ist das Lichenin indess ein Gemenge von einem in kaltem Wasser aufquellenden, nicht darin löslichen und durch Iod nicht blau werdenden Körper, dem eigent-

lichen Lichenin, und einer in kaltem Wasser löslichen, mit Iod sich bläuenden Stärke, von denen letztere zu 10—12 %, ersteres zu 20 % (jedoch in einer unlöslichen Modification) in der Droge existirt. Das Lichenin ist die Ursache des Gelatinisirens der Abkochungen des Isländischen Mooses. Es geht bei Behandlung mit verdünnter Schwefelsäure in Zucker über, der iodbläuende Stoff schon bei längerem Kochen mit Wasser.

Das Isländische Moos kann je nach der Form, in der es dargereicht wird, als reines Amarum (bei Anwendung eines Macerats) oder als Mucilaginosum (in künstlich des Bitterstoffs beraubten Präparaten) oder als beides zugleich (in den aus dem Moose direct dargestellten Abkochungen und Gallerten) benutzt werden. Seine Hauptverwendung findet es bei Phthisis oder mit Abmagerung verbundener Bronchoblenorrhoe, wo es besonders indicirt erscheint, wenn gleichzeitig atonische Verdauungsschwäche ein Amarum und vorhandene Diarrhoe ein demulcirendes Mittel indicirt. Auch bei chronischem Durchfall mit Digestionsstörungen ist es verwendbar.

Das in Island und anderen nordischen Ländern häufig als Nahrungsmittel seit alter Zeit benutzte Isländische Moos wurde zuerst 1673 von Olaus Borrichius und 1683 von Hjærne als Medicament empfohlen und gelangte später durch Linnés Bemühungen (1737) zu grossem Ansehen, in welchem es auch heute noch beim Volke steht, das in ihm ein Specificum gegen Schwindsucht erblickt. Ein solches ist es natürlich nicht; wohl aber ein zur Bekämpfung der obengenannten Symptome geeignetes Mittel. Der Nährwerth des Flechtenstärkmehls ist kein grösserer als der der Amylaceen überhaupt und gewiss ein geringerer als derjenige unserer Cerealien, welche es in Zeiten der Noth im Norden ersetzen muss. Dagegen lässt sich, da der grösste Theil des Flechtenstärkmehls aus dem nur schwierig in Zucker sich umwandelnden Lichenin besteht, gegen die Verwendung des nach vorheriger Auslaugung des Bitterstoffs mit Pottasche aus Lichen Islandicus dargestellte Brod als diätetisches Mittel bei Diabetikern (Bugge) nichts einwenden. — Die Anwendung des Isländischen Moos bei Keuchhusten und Wechselfieber hat keine Bedeutung. Gegen letztere Affection ist auch unreine Cetrarsäure (Rigatellis Lichenina amarissima oder Sale amarissimo antifebrile und Herbergers Cetrarin) angeblich mit Erfolg, selbst bei Quartana, zu 0,12 zweistündlich versucht.

Man verordnet das Isländische Moos zu 15,0—30,0 pro die in Form von Species, Decoct oder Gallerte.

Zum Decoct rechnet man 1 Th. auf 10—15 Th. Col., zur Gallerte 1:3—6. Decocte mit 8 Th. Wasser werden beim Erkalten unangenehm dicklich. Im Decoct findet sich sowohl die Cetrarsäure als die Flechtenstärke; will man nur die erstere ausziehen, so ist ein Infus zu verordnen; soll dagegen nur das Stärkemehl wirken, so lässt man die verordneten Species im Hause des Kranken zuerst infundiren und nach Abgiessen der Flüssigkeit abkochen, oder verordnet entbittertes Isländisches Moos (s. u.).

#### Präparat:

**Gelatina Lichenis Islandici; Isländische Moosgallerte.** Lich. Island. 3 Th. mit Aq. comm. 100 Th.  $\frac{1}{2}$  Std. im Dampfbade stehen gelassen, colirt, die Colatur mit 3 Th. Zucker versetzt und unter fortwährendem Umrühren auf 10 Th. abgedampft. Thee- bis esslöffelweise innerlich.

Man combinirt das Isländische Moos und sein Präparat oft mit anderen Nutrientien, z. B. Abkochungen mit Milch oder Molken, die Gelatine mit Leberthran (Alquié) oder mit Gummi Arab. und Zucker (sog. Pasta Lichenis Islandici), beide auch mit Chocolate (Pasta Cacao cum Lichene Islandico oder P. C. c. Gelatina Lichenis Islandici.)

Früher war auch das entbitterte Isländische Moos, Lichen Is-

**landicus ab amaritie liberatus, Lichen ablutus s. edulcoratus s. praeparatus**, officinell, welches man durch Maceration von 5 Th. Lich. Isl. mit 30 Th. lauwarmem Wasser und 1 Th. Liqueur Kalii carbonici, Beseitigung der den Bitterstoff als cetrarsaures Kalium enthaltenden Flüssigkeit und Trocknen des Rückstandes erhielt. Das Präparat schmeckt freilich angenehmer als gewöhnliches Isländisches Moos, enthält aber nur die amylumartigen Stoffe desselben und kann nur durch diese, nicht aber zugleich als *Amarum stomachicum* wirken. Dasselbe gilt von der früher ebenfalls officinellen trocknen gezuckerten Isländischen Moos-Gallerte, *Gelatina Lichenis Islandici saccharata sicca s. Gelatina Lichenis Islandici pulverata s. Saccharuretum s. Saccharolatum Lichenis Islandici s. Pulvis pectoralis Trosii*, einer aus entbittertem Isländischem Moos dargestellten und mit Zucker zur Trockne verdampften Gelatine. Diese eigenthümliche Arzneiform bildet ein graubraunes, süß und schleimig schmeckendes Pulver, welches man thee- und esslöffelweise zur Darstellung von Decocten (mit 10–30 Th. Wasser) oder Gallerten mit 5–8 Th. Wasser verwenden kann. In heissem Wasser gelöst und mit 4 Th. Syrupus simplex versetzt, giebt es den sog. *Syrupus Lichenis Islandici*.

#### Verordnung:

℞  
*Lichenis Islandici*  
*Herbae Polygalae amarae* aa 50,0  
*Rad. Liquiritiae* 25,0

C. c. m. f. spec. D. S. Den vierten Theil  $\frac{1}{2}$  Std. mit 1 Schoppen Wasser zu kochen und mit der Hälfte Milch tagsüber zu verabreichen.

**Anhang:** Wie Isländisches Moos sind auch verschiedene andere Flechten, welche Bitterstoffe enthalten, benutzt. So galt z. B. *Sticta pulmonacea* Ach., welche eine der Cetrarsäure ähnliche, als Stictinsäure bezeichnete Säure enthält, als Specificum gegen Lungenschwindsucht. Die bei uns ausserordentlich verbreitete Wandflechte, *Parmelia parietina* L., welche Chrysophansäure enthält, ist als Ersatzmittel des Chinins bei Intermittens gerühmt, wogegen man auch einen als Pikrolichenin bezeichneten Bitterstoff aus *Variolaria amara* Ach. empfohlen hat (Alms).

#### **Folia Farfarae, Herba Farfarae vel Tussilaginis; Huflattigblätter, Huflattig, Rosshuf.**

Die langgestielten, rundlich herzförmigen, ausgeschweift eckigen, gezähnten, unten von langen, dünnen, nicht verzweigten Haaren weissfilzigen, oben hellgrünen, handgrossen Blätter der bei uns allgemein an Ackerrändern wachsenden Composite *Tussilago Farfara* L. standen — wie die in älterer Zeit officinellen, im ersten Frühling vor den Blättern erscheinenden gelben Blüten, *Flores Farfarae* — früher in Ansehen als Mittel bei chronischen Bronchialkatarrhen und Schwindsucht. Die im Mai gesammelten Blätter, welche bisweilen mit den jüngeren (nierenförmig-herzförmigen, unten grauwoelligen) Blättern von *Petasites officinalis* Moench und den (nierenförmigen) Blättern von *Petasites tomentosus* DC. verwechselt werden, besitzen geringe Bitterkeit und enthalten ausserdem Pflanzenschleim. Sie sind ein Bestandtheil des officinellen Brustthees (S. 633) und dienen als Hausmittel bei Hustenreiz und Verschleimung. Bodard und Deschamps empfahlen sie als Specificum gegen Scrophulose.

**Anhang:** In ähnlicher Weise verhalten sich die bitter-schleimig schmeckenden Blätter von *Pulmonaria officinalis* (Fam. Boragineae), welche als *Herba Pulmonariae* oder *Folia Pulmonariae maculatae* bezeichnet wurden, die neuerdings von I. Hoppe wieder empfohlenen *Folia Scabiosae*, die Blätter von *Knautia arvensis* Coul. (Fam. Dipsaceae), die *Herba Pulmonariae Gallica* s. *Auriculae muris majoris* von *Hieracium murosorum* L. (Fam. Compositae) u. a. einheimische Kräuter, welche früher bei



chronischen Bronchialkatarrhen Benutzung fanden. Ein Bestandtheil des S. 633 besprochenen Brustthees war in früherer Zeit auch die *Herba Hederæ terrestris*, das blühende Kraut einer bei uns sehr gewöhnlichen, im Frühjahr blühenden Labiate, der Gudelrebe, *Glechoma hederaceum* L., welches neben wenig Bitterstoff und ätherischem Oele verhältnissmässig viel Salze, namentlich Kaliumnitrat, enthält. Die Familie der Labiaten lieferte ausserdem noch eine Anzahl von Husten- und Schwindsuchtsmitteln, von denen indess nur die *Herba Marrubii albi*, weisser Andorn, von *Marrubium vulgare* L., worin ein krystallinischer Bitterstoff, Marrubiin, existirt, noch hie und da Gebrauch findet. Zu den Labiaten gehört auch das als *Herba Galeopsidis* früher officinelle, durch Schwindel und Betrug in die Heilkunde importirte Kraut *Galeopsis ochroleuca* Lam. s. *grandiflora* Roth, welches sehr wenig ätherisches Oel, das beim Trocknen ganz verschwindet, Spuren von Bitterstoff neben etwas Salzen enthält. Es ist in einzelnen Gegenden am Rhein Volksmittel gegen Phthisis und wurde im Anfange dieses Jahrhunderts als Lieberische Auszehrungskräuter oder Blankenheimer Thee (weil auf der Eifel bei Blankenheim gesammelt) zu theuerem Preise durch einen Regierungsrath Lieber in Camberg en gros vertrieben, bis die preussische Regierung dem Schwindel durch eine Bekanntmachung ein Ende machte. Im Aufguss oder Decoct (zu 25,0—50,0 auf 200,0) mit oder ohne Zusatz von Süssholz, Eibisch verwerthet, thut es weder Schaden noch Nutzen.

Ebenfalls den Bitterstoffen sich anreihend ist das seit 1858 aus dem tropischen Amerika in Europa eingeführte, aber bald vergessene Schwindsuchtsmittel *Lignum Anacahuite*, welches neben Bitterstoff und etwas Gerbsäure grössere Mengen Calciumoxalat enthält (Buchner) und von der ostmexicanischen *Cordia Boissieri* A. DC. stammt.

Hierher gehört auch die *Herba Polygalæ*, *Polygalæ amarae*, Kreuzblumenkraut, das Kraut der bei uns einheimischen *Polygalæ Polygala amara*, welches sich durch intensive Bitterkeit vor anderen naheverwandten Species (*P. vulgaris* L., *P. major* L.) auszeichnet. Der Bitterstoff, welcher in der Pflanze, wenn dieselbe an sumpfigen Orten wächst, oftmals zu fehlen scheint, ist als *Polygamarin* bezeichnet und soll ein grünliches, krystallinisches Pulver darstellen (Reinsch). Das Mittel wurde zuerst von Collin gegen Schleim-schwindsuchten empfohlen, wogegen man es im Decoct (15,0—30,0 auf 200,0 Col. pro die) verabreichte. Möglicherweise enthält es, wie die verwandte *Senega*, etwas Saponin. Statt der eigentlichen *Polygala amara* wurde auch die Wurzel von *Polygala vulgaris*, welche mehr schleimig als bitter schmeckt, als *Radix Polygalæ Hungaricæ* in Anwendung gebracht (van Swieten). Das früher officinelle *Extractum Polygalæ amarae*, welches zu 0,3—0,6 in Pillenform oder Lösungen zur Anwendung kam, ist ganz absolet.

**Fructus Aurantii immaturi**, *Aurantia immatura*, *Poma Aurantii*; Unreife Pomeranzen. **Cortex fructus Aurantii**, *Cortex pomorum Aurantii*; Pomeranzenschale.

Diese Drogen sind Theile des Orangenbaumes, *Citrus vulgaris* Risso s. C. *Bigaradia Duhamel*, und gehören zu den am häufigsten in Anwendung gebrachten *Amara aromatica*, indem sie die Basis für viele zusammengesetzte aromatisch bittere Tincturen bilden. Das ätherische Oel, dem sie ihr Aroma verdanken, ist das S. 413 schon abgehandelte *Oleum corticis Aurantii*; der Bitterstoff scheint das von Lebreton entdeckte *Hesperidin* oder *Aurantiin* zu sein, welches zwar an sich ohne Geschmack ist oder gar süsslich schmeckt, aber beim Kochen mit Essigsäure bitteren Geschmack annimmt.

Die unreifen Pomeranzen sind die besonders in Südfrankreich gesammelten, von selbst abgefallenen, unreifen, etwa kirschengrossen Früchtchen, welche kuglige oder etwas längliche Form besitzen, auf der graugrünlchen oder fast bräunlichen Oberfläche durch zahlreiche vertiefte Punkte (Oeldrüschen) uneben erscheinen und aus 8 oder 10, selten 12 in der Mittelsäule zusammenstehenden Fächern bestehen, welche nicht von den zahlreichen, wenig entwickelten Eichen ausgefüllt werden. Sie sind von aromatischem Geruche und aromatisch-bitterem Geschmacke, welcher seinen Sitz vorzugsweise in den äusseren Schichten hat, die das ätherische Oel als rothbrauner Balsam durchtränkt. — Die Pomeranzenschalen, die Fruchtschalen der reifen Orangen, kommen im Handel in elliptischen, etwas convex-concaven, bis 5 Mm. dicken, zähen Scheiben vor, welche den vierten Theil des Perikarpiums darstellen und aussen gelbbraun und höckrig, innen weiss und schwammig sind. Zum medicinischen Gebrauche dient ausschliesslich die äussere gelbe, als *Flavedo corticis Aurantii* s. *Cortex Aurantii expulpatus* s. *mundatus* bezeichnete Partie, da sich nur in dieser die zahlreichen Oelräume finden und die Bitterkeit derselben grösser als die des weissen Parenchyms (*Albedo*) ist. Die den Orangenschalen nahe stehenden höchst aromatischen *Curaçaoschalen*, *Cortex Aurantii Curasaviensis*, unterscheiden sich durch geringere Dicke, grössere Härte und schmutziggrüne Färbung der Oberfläche. Man gebrauchte die letztere Bezeichnung zuerst für die Schalen einer auf den Westindischen Inseln und besonders auf Curaçao cultivirten grünfrüchtigen Varietät von *Citrus vulgaris*, statt deren jetzt übrigens häufig die Schalen unreifer südfranzösischer Orangen oder auch einer in Südfrankreich cultivirten Orangenspielart vorkommen. Minder aromatisch und bitter sind die nur 1 Mm. dicken und lebhafter gelbrothen Apfelsinenschalen.

Das Hesperidin, welches sich nicht in den Staubfäden und Blumenblättern, wohl aber im Fruchtknoten der Orangen, besonders aber in unreifen Pomeranzen findet, bildet zarte, seideglänzende, zu warzenförmigen Büscheln vereinigte Nadeln, löst sich in 60 Th. kochendem Wasser, wenig in kaltem, leicht in heissem Alkohol, gut in Essigsäure und wässrigen Alkalien, gar nicht in Aether und ätherischen Oelen. Es spaltet sich mittelst Schwefelsäure in einen dem Mannit isomeren Zucker und Hesperetin (Hoffmann). Nach anderen Angaben soll ein besonderer, als *Aurantiin* bezeichneter Bitterstoff in den *Fructus Aurantii* existiren. Auch in den Kernen der Apfelsinen und Citronen findet sich ein besonderer mikrokrySTALLINISCHER Bitterstoff, das *Limonin* (Bernays, K. Schmidt). Die äussere Fruchthaut enthält auch etwas Gerbsäure.

Nicht mehr officinell sind die *Folia Aurantii*, Pomeranzenblätter (mit blattartig geflügeltem Blattstiele), welche man früher, wie übrigens auch die Orangenschale (Hufeland), nicht selten im Thee (2.0—4.0 auf die Tasse) als Nervinum bei hysterischen Krämpfen und Epilepsie meist in Verbindung mit Baldrian gab. Sie enthalten nach Raybaud  $\frac{1}{3}\%$  ätherisches Oel.

Eigentliche physiologische Prüfung der Orangenpräparate liegt nicht vor. Krahmer giebt an, dass grössere Mengen merklich erhitzen wirken und Gefässaufregung und Kopfschmerzen verursachen und dass heissbereitete Infuse der getrockneten Schalen, Macerationsauszüge frischer Früchte und die officinellen Tincturen bei reizbaren Individuen höchst unbequeme Erscheinungen von Erhitzung und Beunruhigung hervorrufen und dass dieselben selbst an Alkoholenuss gewöhnten Personen oft recht schlecht bekommen. Für die sehr beliebten weinigen Auszüge der Pomeranzen (Bischof u. a. Getränke), welche auch bei atonischer Dyspepsie medicinisch verwendbar sind, soll man deshalb nur die wenig erhitzen Macerate der Fruchtheile benutzen, die man dem Weine nach Wohlgeschmack zusetzt.

Die in Rede stehenden Drogen kommen fast ausschliesslich in Form ihrer Präparate in Anwendung. Gegen Epilepsie gab man Orangenschalen in Pulver oder im Aufguss. Die unreifen Pomeranzen dienten früher als Fontanellkugeln.

#### Präparate:

- 1) *Tinctura Aurantii*, *Tinctura corticis Aurantii*; *Pomeranzentinctur*, *Pome-*

ranzenschalentinctur. Mit 5 Th. Spiritus dilutus bereitet, bräunlich. Für sich zu 20—60 Tropfen, meist als Zusatz zu magenstärkenden Mixturen.

2) **Syrupus Aurantii corticis**, Syrupus corticis Aurantii; **Pomeranzenschalensyrup**. Filtrirte Lösung von 60 Th. Zucker in 40 Th. eines Macerats von 5 Th. Cort. Aurantii mit 45 Th. Weisswein; gelbbrauner, sehr angenehm schmeckender, als Zusatz zu Mixturen besonders beliebter Syrup.

3) **Elixir Aurantiorum compositum**, Elixir Aurantii compositum, Elixir viscerale Hoffmanni, Elixir stomachicum, E. balsamicum; **Pomeranzenelixir**, Hoffmannsches Magenelixir. Cort. fruct. Aur. 50 Th., Cort. Cinnam. 10 Th., Kalium carbonicum 2,5 Th. mit 250 Th. Vinum Xerense 8 Tage macerirt und in der auf 230 Th. gebrachten Colatur aa 5 Th. Extractum Gentianae, Extr. Absinthii, Extr. Trifolii und Extr. Cascariillae gelöst, dann filtrirt. Klar, von brauner Farbe, eigenthümlichem, aromatischem Geruche und bitterem Geschmacke. Zu 1—2 Theelöffel 2—3mal täglich, bei Dyspepsie sehr beliebt, oft in Verbindung mit Tinctura Rhei vinosa. Das Ppt. ersetzt eine Reihe älterer Vorschriften zu magenstärkenden Elixiren, unter denen das sog. Elixir viscerale Kleinii statt Kaliumcarbonat Kaliumacetat enthält, die Tinctura stomachica aromatica und ähnliche Vorschriften.

Auf die aus den Orangenschalen dargestellten Zuckerwerksformen (Confectio s. Conditum Aurantii, überzuckerte Orangenschalen, Magenmorsellen u. s. w.), ist ein besonderer medicinischer Werth nicht zu legen. Ein früher officinelles Extractum Aurantii, ein wässrig spirituöses, dickes, rothbraunes Digestionsextract, fand als Stomachicum zu 0,5—2,0 mehrmals täglich meist in wässriger Solution, sowie als Constituens für Pillen Anwendung.

#### **Rhizoma Calami, Radix Calami; Kalmuswurzel, Kalmus.**

Die Droge ist das ungeschälte Rhizom einer ursprünglich in Mittelasien und Indien einheimischen, seit Ende des 16. Jahrhunderts in Europa eingeführten, jetzt überall in Teichen vorkommenden Aroidee, *Acorus Calamus* L.

Das im Herbste von den bei uns einheimischen Pflanzen gesammelte, von Wurzeln, Blattscheiden und Stengeln befreite, kräftig aromatisch riechende und zugleich scharf und bitter schmeckende Kalmusrhizom bildet bis 2 Dm. lange, fast cylindrische, durchschnittlich 1,5 Cm. dicke, häufig der Länge nach durchschnittenen Stöcke. Oberseits wird es durch Blattnarben in dreieckige graue Felder getheilt, die mit den braunen Stammstücken abwechseln; unterseits erheben sich die in Zickzacklinien geordneten, dunkelbraunen, scharfrandigen Wurzelnarben nur wenig aus der braunen längsrunzligen Rinde, welche auf dem Querschnitt dunkler als der ungefähr dreimal breitere Gefäßbündelcylinder erscheint. Geschälte Stücke sind röthlichweiss und stehen im Geruch und Geschmack dem ungeschälten Kalmus nach.

Die wirksamen Bestandtheile der Kalmuswurzel sind ein als Acorin bezeichneter Bitterstoff und das als Kalmusöl, *Oleum Calami*, officinelle ätherische Oel.

Das Acorin ist nach Faust ein stickstoffhaltiges Glykosid, welches eine honiggelbe, weiche, harzartige Masse von bitter aromatischem Geschmacke bildet, sich leicht in Weingeist und Aether, nicht in Wasser löst und beim Kochen mit verdünnter Schwefelsäure in Zucker und einen harzartigen Körper zerfällt. Das Kalmusöl, welches in der Kalmuswurzel zu etwa 1% sich findet, ist gelb oder bräunlichgelb, etwas dicklich und zeigt den angenehmen Geruch der Droge mit bitterem Beigeschmacke; die chemische Zusammensetzung scheint zu variiren und das Oel bald aus einem Kohlenwasserstoff (Gladstone), bald aus sauerstoffhaltigen Oelen (Schnedermann) zu bestehen. Neben Acorin und Kalmusöl findet sich auch Benzoësäure und Stärkemehl in der Kalmuswurzel.



Die Kalmuswurzel ist eines der bei atonischer Dyspepsie und Magenkatarrhen empfehlenswerthesten Amara, das vorzüglich gut (auch im kindlichen Lebensalter) ertragen wird. Auch wird Kalmus äusserlich zu aromatischen Bädern bei scrophulösen und rachitischen Kindern, Lähmungen u. s. w., als Zusatz zu Zahnpulvern und als Kaumittel bei Zahnschmerz und Fötor oris gegeben. Das Acorin scheint auch antitypisch zu wirken; bei Tataren und Kosacken dient gerösteter und gemahlener Kalmus in Branntwein als Volksmittel gegen Intermittens. Auch bei Gicht mit Oedem wurde die Droge benutzt. Neuerdings hat man sogar einen aus Kalmus hergestellten Liqueur, den Kalmüs, als Mittel gegen Vergiftung mit Pulvergasen, der sog. Minenkrankheit, empfohlen (Josephson).

Man giebt die Kalmuswurzel innerlich zu 0,5–2,0 mehrmals täglich, am zweckmässigsten in Pulver oder im Aufguss (1:10), auch in spirituösem oder weinigem Macerat. Auch verzuckelter Kalmus, sog. *Confectio Calami*, ist als Digestivum gebräuchlich. Zu Bädern setzt man wässrigen Aufguss von  $\frac{1}{2}$  bis 2 Pfund auf 2 Liter Wasser zu. Das *Oleum Calami* ist zur Darstellung von *Rotulae Calami*, welche angenehmer als Pfefferminzkügelchen schmecken, sowie innerlich zu 2–10 Tropfen in Oelzucker, äusserlich in spirituöser Lösung (1:200) gegen Gicht empfohlen (Schneider).

#### Präparate:

1) **Extractum Calami; Kalmusextract.** Wässrigspirituöses Extract von gewöhnlicher Consistenz, rothbraun, in Wasser trübe löslich. Innerlich bei Dyspepsie zu 0,5–1,0 mehrmals täglich in Pillenform, auch als Constituens für Eisenpillen sehr gebräuchlich.

2) **Tinctura Calami; Kalmustinctur.** Bräunlichgelbe Tinctur, mit 5 Th. Spir. dil. bereitet. Innerlich zu  $\frac{1}{2}$ –1 Theelöffel voll für sich oder als Zusatz zu Mixturen; äusserlich als Zusatz zu Zahntincturen und Collutorien. Ein ähnlicher Auszug von Kalmus, Zittwer und unreifen Orangen bildete die wie Kalmustinctur benutzte, nicht officinelle *Tinctura Calami composita*.

#### **Cortex Cascarillae, Cortex Elutheriae s. Eleutheriae; Cascarillrinde.**

Verschiedene strauchartige Euphorbiaceen Westindiens, besonders der Bahama-Inseln, welche der Gattung *Croton* oder *Clusia* zugerechnet werden, jetzt vorzugsweise *Croton Elutheria* Bennett (Benennung von der Insel *Elutheria* stammend, daher mit *th* zu schreiben), aber auch *Croton Cascarilla* Don., *Croton Sloanei* Benn., vielleicht auch *Croton lineare* Jacq., liefern eine ursprünglich von den Spaniern zum Parfümiren des Rauchtabaks verwendete und als feine Rinde (*cascarilla*, wie sie auch die Chinarinde nannten) bezeichnete, aus aussen von hellgrauem Korke bedeckten, an den entblössten graugelblichen oder braunen Stellen längsstreifigen und querrissigen, auf der Innenfläche bräunlichen und gleichmässig feinkörnigen, 1–3 Mm. dicken und nicht über 10 Dm. langen, geraden oder gebogenen Röhren bestehende Droge von widrig bitterem, scharf gewürzhaftem Geschmacke und beim Zerkleinen und Erwärmen angenehm aromatischem Geruche. Der kurze, unebene, ölgänzende Bruch ist in der inneren Hälfte sehr feinstrahlig. Sie unterscheidet sich nicht schwer von der Copalchi- oder Mexikanischen Bitter- oder Fiebertinde (*Quina blanca* der Mexikaner), von *Croton Pseudochina* Schlecht (*C. niveus* Jacq.), welche viel stärkere, bis fusslange, und oft über 4 Mm. dicke, geschlossene oder gerollte, auf der Oberfläche mit ziemlich tiefen, unregelmässigen Längsfurchen versehene, auf dem Bruche grobstrahlige Röhren darstellt und weniger bitter und gewürzhaft, aber schärfer schmeckt.

Die wirksamen Principien sind das Cascarillin, ein indifferentes, krystallinischer, in Wasser kaum, dagegen in Alkohol und Aether löslicher Bitterstoff, und das zu ca. 1% in der Rinde sich findende Cascarillöl, wahrscheinlich ein Gemenge von einem bei 173° siedenden Camphen, einem oder mehreren

höher siedenden Kohlenwasserstoffen und einem schwer flüchtigen, dickflüssigen, sauerstoffhaltigen Bestandtheile (Völckel), und mehrere Harze.

Genauere physiologische Prüfung fehlt, was umso mehr zu beklagen ist, als nicht nur der Rauch, sondern auch der innerliche Gebrauch von Cascarillpulver Störungen im Organismus hervorrufen kann. Erbrechen und Uebelkeit sind bei manchen Personen, wie ich selbst beobachtete, constant Folge selbst sehr kleiner Dosen des Pulvers (0,5); bei anderen tritt höchst lästige Beunruhigung, zeitweise Schlaflosigkeit oder doch durch schreckhafte Träume gestörter Schlaf, Muskelzittern und Zucken, insbesondere nach dem Rauchen, auf (Krahmer). Es dürfte daher, da die Rinde weder als Stomachicum, noch als Febrifugum oder Antasthmaticum mehr als andere Mittel leistet, die obnehin jetzt nur noch schwache Benutzung mit Fug und Recht aufgegeben werden können. Bei chronischen Durchfällen steht sie der Colombo bei Weitem nach. Man beschränkt sich daher am besten auf die Verordnung als Zusatz zu Schnupfpulvern oder Räucherspecies.

Dosis des Pulvers 0,5—1,0. Die zweckmässigste Form zur innerlichen Anwendung ist ein Infusodecoct (1:10), doch ist auch weinige Digestion und Latwergenform empfohlen.

#### Präparat:

**Extractum Cascarillae; Cascarillextract.** Tiefbraunes, dickes Heisswasser-extract, in Wasser trübe löslich. Bestandtheil des Elixir Aurantii compositum; diente früher auch als Pillenconstituens für tonisirende Mittel, und äusserlich zu Zahnfleischlatwergen.

Die früher officinelle Cascarilltinctur, Tinctura Cascarillae, diente zu 30 bis 60 Tropfen als Zusatz magenstärkender Mixturen.

**Anhang.** Als exotisches aromatisch-bitteres Mittel erwähnen wir hier noch die Angusturarinde, Cortex Angusturae, von Galipea officinalis Hancock, einem zur Familie der Diosmeae gehörigen, an den Ufern des Carony (Nebenfluss des Orinoco) wachsenden, kleinen Baumes. Dieselbe hatte bis zum Anfange dieses Jahrhunderts sehr grosse Bedeutung als Arzneimittel in remittirenden und intermittirenden Fiebern (sog. Quina del Carony oder Cascarilla del Angostura), bei Typhus und Ruhren, gerieth aber in Folge der absichtlichen Beimengung einer ähnlich aussehenden ostindischen, durch darin enthaltenes Brucin intensiv bitteren und giftigen Rinde, der Rinde von Strychnos nux vomica, die seitdem als falsche Angusturarinde, Cortex Angusturae spurius, bezeichnet ist, durch welche in den verschiedenen Ländern (Ungarn, Schweiz, Hamburg, Russland) Vergiftungen, zum Theil mit tödtlichem Ausgange, herbeigeführt wurden, in Misscredit. Die echte Angusturarinde enthält einen durch Gerbsäure fällbaren, indifferenten, krystallinischen, in Wasser schwer, in Alkohol und Aether leicht löslichen Bitterstoff, das Angusturin oder Cusparin von Saladin, das auch in grossen Mengen nicht erheblich auf den Organismus einwirkt und neben welchem vielleicht noch ein zweiter Bitterstoff sich findet, sowie ein nach Liebstockel riechendes ätherisches Oel. Gerbsäure scheint in der Rinde zu fehlen. Man gab sie meist in Abkochung.

#### Herba Absinthii, Summitates Absinthii; Wermut, Wermuth, Wermuthkraut.

Die Droge ist das blühende Kraut des Wermuts, Absinthium vulgare Lam. s. Artemisia Absinthium L., das einen indifferenten Bitterstoff, Absinthiin, und ein ätherisches Oel, Wermutöl oder Absinthöl, enthält.

Die in fast ganz Europa und im nördlichen Asien verbreitete Composite, deren mit silbergrauem, seidenhaarigem Filz überzogene, fiederspaltige Blätter im Spätsommer zur Zeit der Blüthe gesammelt werden, ist in allen ihren Theilen

äusserst bitter und scharf aromatisch. Die wilde Pflanze zeichnet sich vor der cultivirten durch Bitterkeit aus. Der von Mein entdeckte, nicht glykosidische Bitterstoff, das Absinthiin, scheidet sich aus weingeistiger Lösung in blassgelben Tropfen aus, die allmählig undeutlich krystallinisch erstarren, schmeckt intensiv bitter, riecht gewürzhalt, und löst sich kaum in kaltem, wenig in heissem Wasser, leicht in Weingeist und Aether; beim Kochen mit verdünnten Mineralsäuren entstehen braune, harzartige Producte, aber kein Zucker (Kromayer). Ausserdem enthält das Wermutkraut, und zwar vorzugsweise die Blätter, ein ätherisches Oel, das Wermutöl, von brennendem Geschmacke und dunkelgrüner Farbe, die an der Luft noch dunkler wird, in verschiedenen Mengen (0,5—2 %), die nach Standort und Klima (in nördlichem Klima mehr) differiren. Nach Gladstone besteht es aus einem Kohlenwasserstoffe, einem sauerstoffhaltigen Oele von der Zusammensetzung des Camphers und dem auch im Kamillenöl sich findenden, mit einem höheren Siedepunkt begabten Coerulein oder Azulen. Von sonstigen Bestandtheilen, wie Harze, Gerbstoff, Säuren, ist das Vorhandensein von Bernsteinsäure interessant, jedoch für die Wirkung indifferent; Salze, insbesondere Salpeter, sind reichlich vorhanden.

Ueber die physiologische Wirkung des von Leonardi als treffliches Fiebermittel bezeichneten Absinthiins fehlen exacte Untersuchungen. Dass dasselbe in grossen Gaben Schwindel und Betäubung erzeuge (Leonardi), leugnet Righini. Der Bitterstoff geht in Milch und Fleisch von Kühen über, welche Wermut gefressen haben. Ueber die Wirkung des Absinthöls haben die verschiedenen Untersuchungen nicht zu gleichen Resultaten geführt. Nach Magnan bewirken 3,0—4,0 bei Hunden und anderen Säugethieren Tremor und elektrische Stösse in Hals- und Vorderbeinmuskeln, noch grössere Gaben Trismus und Tetanus, abwechselnd mit anfallsweise auftretenden klonischen Convulsionen, Schäumen des Mundes, stertoröses Athmen, unwillkürlichen Abgang der Faeces und der Samenflüssigkeit; in den längeren oder kürzeren Pausen der Intoxication kommen eigenthümliche Hallucinationen vor; die Section der vergifteten Thiere ergiebt Hyperämie der Hirn- und Rückenmarkshäute, namentlich in der Gegend der Medulla oblongata, Lungencongestion und Ekchymosen der Pleura und des Pericardiums, ausnahmsweise auch hämorrhagische Entzündung der Magenwandungen. Hiermit stimmen auch die beim Menschen nach grossen Dosen (15,0) beobachteten Erscheinungen von Trismus, klonischen Krämpfen, Schäumen des Mundes, Anaesthesie und Bewusstlosigkeit (W. Smith). Nach Kobert und Böhm kommt es bei Vergiftung von Warmblüthern mit Absinthöl zunächst zu Depression und Reflexverminderung und erst ganz zuletzt bei collossalen Dosen zu anfallsweise auftretenden heftigen Krämpfen epileptoider Art und deutlicher Erhöhung der Reflexaction; auch ist Hyperämie der Hirnhäute nicht zu constataren. Kleine Dosen steigern den Blutdruck, grosse setzen ihn beträchtlich herab durch Einwirkung auf das vasomotorische Centrum; der Puls wird anfangs beschleunigt, die Respiration gesteigert und bei Infusion rasch dyspnoisch und aussetzend. Die Körpertemperatur sinkt, am stärksten bei Inhalation von Absinthöl. Das Oel ruft selbst zu 10,0 intern keine Durchfälle hervor, vermehrt vorübergehend die Zahl der im Blute kreisenden Leucocyten beträchtlich und wird unverändert durch die Lungen und im verharzten Zustande durch die Nieren ausgeschieden, welche davon wenig afficirt werden (Kobert und Böhm).

Magnan schreibt das Auftreten epileptiformer Krämpfe durch den zu reichlichen Genuss spirituöser Getränke, welche Wermutöl enthalten, namentlich des in Frankreich so sehr beliebten Absinths, dem Oele zu. Das letztere Getränk soll auch bei habituellem Gebrauche eher zu chronischer Vergiftung als andere Spirituosa führen (Decaisne) und besondere Formen des Alkoholismus, z. B. Hyperaesthesie und Hyperalgie an den Unterextremitäten und am unteren Theile des Abdomen (Lancereaux) und Hallucinationen, die sich durch das Sehen von Flammen oder scharfen Waffen an Stelle von Mäusen und anderen kleinen Thieren charakterisiren (Motet), bedingen.

Die nach Wermutpräparaten beobachteten Nebenerscheinungen, wie Gefässerregung, Ideenverwirrung, Schwindel, Kopfschmerz (Kraus), scheinen auf das ätherische Oel bezogen werden zu müssen, wenn sie nicht etwa Folge der Darreichung in spirituösem Vehikel oder bestimmter Idiosynkrasien (einzelne Personen erbrechen stets nach Wermut) sind. Welchem Bestandtheile die übrigen



keineswegs sehr erheblichen anthelmintischen Wirkungen des Absinth, da lebende Spulwürmer 48 Stunden in Wermutaufguss leben (Küchenmeister), beizulegen sind, ist nicht festgestellt.

Therapeutisch kommt Wermut jetzt nur bei dyspeptischen Zuständen, Pyrosis und Gastralgie in Anwendung.

Der Gebrauch gegen Intermittens, Gelbsucht und Epilepsie ist obsolet. Bei Chlorose, Anämie und Scrophulose wird er als digestionsbeförderndes Mittel manchmal neben Eisenpräparaten benutzt. Ausserlich benutzt man die Herba Absinthii zu aromatischen trocknen und feuchten Umschlägen bei Sugillationen, Exsudaten und Paralysen; im Klystier gegen Oxyuris.

Man giebt das Kraut nur selten in Pulverform (zu 1,0–2,0) oder im Aufguss (7,5–15,0 auf 200,0 Colatur). Den frisch ausgepressten Saft nimmt man hie und da zu Frühlingscuren (zu 30,0–60,0).

#### Präparate :

1) **Extractum Absinthii; Wermutextract.** Wässrigspirituöses Extract von gewöhnlicher Consistenz und grünbrauner Farbe, in Wasser trübe löslich. Innerlich in Pillen oder Mixturen zu 0,5–2,0 mehrmals täglich; häufig als Excipiens für Eisenpillen benutzt.

2) **Tinctura Absinthii; Wermuttinctur.** Braungüne, stark bittere Tinctur, mit 5 Th. Spiritus dilutus bereitet. Innerlich mehrmals täglich zu 20–60 Tropfen.

Früher waren auch zusammengesetzte Tincturen in Gebrauch, so die Tinctura Absinthii composita (Wermut mit Pomeranzenschale, Kalmus, Enzian und Zimmtkassie) und die Tinctura Absinthii alcalina s. Tinctura amara Biesteri (mit Kaliumcarbonat bereitet), welche in gleicher Dosis wie die einfache Wermuttinctur bei atonischer Dyspepsie in Anwendung gebracht wurden.

3) **Elixir amarum; bitteres Elixir.** 10 Th. Wermutextract und 5 Th. Pfefferminzölzucker, mit 25 Th. Wasser verrieben, Tinctura aromatica, Tinctura amara aa 5 Th., innerlich theelöffelweise 3–4 mal täglich. Ersetzt das früher officinelle, kein Wermutextract enthaltende gleichnamige Präparat, das eine Lösung von gleichen Theilen Fieberklee- und Pomeranzenextract in aa 8 Th. Pfefferminzwasser und verdünntem Weingeist unter Zusatz von  $\frac{1}{2}$  Th. Spiritus aethereus darstellte.

Dem Wermut nahestehend sind verschiedene alpine Species der Gattung *Artemisia*, z. B. *A. mutellina*, *A. spicata*, *A. Vallesiaca* und *A. rupestris*, bekannt unter dem Namen Gonippräuter, Herba Genippi, welche wegen ihres unseren Wermut an Feinheit übertreffenden Aroma zur Bereitung des sog. Extrait d'Absinthe benutzt werden. Schroff empfiehlt *Artemisia mutellina* bei grosser Empfindlichkeit des Magens und Darmcanals hysterischer Frauen mit Tendenz zu Diarrhoe. In ähnlicher Weise kann auch die ebenfalls in den hohen Alpen wachsende *Synanthere Achillea moschata* L., die Ivapflanze, welche in Graubünden zur Darstellung verschiedener geistiger Getränke dient, in denen theils die Bitterstoffe Ivaïn und Moschatin, theils das penetrant riechende und pfefferminzartig schmeckende Ivaöl, das hauptsächlich aus einem sauerstoffhaltigen Oele besteht, prävaliren. Auch ein weniger Auszug ist als *Stomachicum* gebräuchlich.

Auch in der bei uns sehr verbreiteten Schafgarbe, *Achillea Millefolium* L., sind ähnliche Bestandtheile, nämlich ein eigenthümlicher, als Achilleïn bezeichneter Bitterstoff, der sich leicht in Wasser, schwierig in Alkohol löst und durch längeres Kochen mit verdünnter Schwefelsäure in Zucker und Achilletin spaltet, und ein blaues ätherisches Oel vorhanden. Das Achilleïn soll zu 0,5 Kältegefühl und Schwere im Epigastrium, zu 1,25–5,0 in getheilten Dosen Appetitvermehrung und bei der Diastole etwas Unregelmässigkeit des Pulses hervorbringen und zu 2,0–4,0 bei Intermittens und chronischen Leber- und Milztumoren und als *Stomachicum* Günstiges leisten (Puppi). Sowohl der Bitterstoff als das ätherische Oel finden sich weit reichlicher in den früher officinellen

Schafgarbenblüthen, Flores Millefolii, Summitates Millefolii, als in dem ebenfalls officinellen Schafgarbenkraut, Herba Millefolii, welches deshalb auch minder stark riecht, dagegen einen grossen Reichthum von Chlorüren, Phosphaten und Nitraten, namentlich Kalisalzen darbietet und daher auch zu Frühlingscuren sich vorzüglich eignet. Im Alterthum benutzte man die Blätter als Wundmittel, daher die Bezeichnung Achillea. Jetzt benutzt man den sog. Schafrippentheee zu 15,0—30,0 pro die im Aufguss bei Hämorrhoiden und Amenorrhoe. Ein früher officinelles wässriges Extractum Millefolii, aus Flores und Folia bereitet, kann bei dyspeptischen Zuständen zu 0,05—0,2 pro dosi mehrmals täglich in Pillen oder Mixturen gegeben werden.

### Radix Taraxaci cum herba, Herba Taraxaci; Löwenzahn.

Von der allgemein bekannten und verbreiteten Synantheree Taraxacum officinale Weber (Leontodon Taraxacum L.), welche in der nördlichen Hemisphäre in verschiedenen Varietäten vom Meere bis in die höchsten alpinen Gegenden vorkommt, ist die frische mit dem daran sitzenden Erdstamm und den Wurzelblättern im Frühling eingesammelte Wurzel officinell.

Die frische Löwenzahnwurzel ist fleischig, aussen gelbbraun und im Frühjahr stark milchsaftig, von süsslich-bitterem Geschmack; die Wurzelblätter sind rosettenförmig gestellt, schwertsägeförmig, buchtig gezähnt, in den Blattstielen verschmälert, glatt und im frischen Zustande glänzend grün. Früher war auch die im Herbst gesammelte und getrocknete, weit bittere Wurzel als Radix Taraxaci, Löwenzahnwurzel, officinell, welche man innerlich in Abkochung (1:6—10) oder im Klystier verordnete. Sie war der Hauptbestandtheil der im vorigen Jahrhundert viel gebrauchten Visceralklystiere, mit denen man vermeintliche Darminfarcte beseitigen wollte und die man selbst zu Hunderten im Verlaufe chronischer Unterleibskrankheiten gab. Zu diesen nach ihrem im Anfange des 18. Jahrhunderts in Hessen-Homburg als Leibarzt thätigen Erfinder Joh. Kämpf auch als Kämpfsche Klystiere bezeichneten Injectionen benutzte man meist eine Abkochung des sog. Species ad Clyisma viscerales Kämpfii (Species viscerales s. pro clysteribus), ein Gemenge bitterer, aromatischer und schleimiger Kräuter und Wurzeln, unter denen ausser Taraxacum besonders Marrubium, Rhizoma Graminis, Radix Saponariae und Baldrianwurzel zu nennen sind.

Die wirksamen Principien der Löwenzahnwurzel sind ein indifferent Bitterstoff, Taraxacin, und die in grosser Menge darin enthaltenen Kali- und Kalksalze, neben welchen sich Zucker und Inulin findet.

Das Taraxacin bildet, aus frischem Milchsafte dargestellt, weisse, in kochendem Wasser und Aether leicht lösliche, warzenförmige Massen von bitterem Geschmacke; aus getrocknetem Milchsafte, dem sog. Leontodonium von Kromayer, wird es amorph erhalten. Der Milchsafte ist hauptsächlich eine Emulsion von Harz und einem als Taraxacerin bezeichneten wachsartigen Körper. Die Blätter enthalten Inosit und einen reducirenden Zucker. Die chemischen Bestandtheile des Löwenzahns variiren in den verschiedenen Jahreszeiten sehr, ebenso nach dem Standorte. Auf fettem Boden ist die Pflanze am zuckerreichsten, im Frühjahr am salzreichsten, im Herbst am bittersten. Nach Frickhinger giebt die Wurzel im Frühjahr 7,8 %, im Herbst 5,5 % Asche.

Die Löwenzahnwurzel bildet im frischen Zustande den Hauptrepräsentanten der Amara resolventia, deren Wirkung als Com-

bination des tonisirenden Einflusses des Taraxacins und der abführenden Action der Salze zu betrachten und deren Anwendung bei sog. Plethora abdominalis bei gleichzeitiger Dyspepsie vorwiegend gebräuchlich ist.

Die frische Löwenzahnwurzel kommt vorzugsweise in Betracht bei den sog. Frühlingscuren oder Curen mit Kräutersäften (vgl. S. 175), welche bei Hämorrhoidariern und Hypochondern manchmal von eclatantem Nutzen sind, wenn dieselben hinlänglich lange gebraucht und mit einer regelmässigen Diät und angemessener Bewegung im Freien verbunden werden.

Man glaubte dabei in früherer Zeit dem Löwenzahn eine die Gallensecretion vermehrende Wirkung beilegen zu müssen, welche jedoch experimentell an Thieren nicht auffällig hervortritt (Rutherford). Als indicirt können die Kräutercuren bei habitueller Obstipation betrachtet werden, wenn die letztere mit atonischer Verdauungsschwäche sich verbindet, oder schwächliche Constitution der Patienten eingreifendere Mineralwassercuren nicht thunlich erscheinen lässt. Sie sind auch gegen manche andere Affectionen, z. B. bei Gallensteinen, Acne, selbst bei Melancholie in Anwendung gezogen und gelten überhaupt als blutreinigend.

Die Radix Taraxaci cum herba dient nur zur Darstellung des Presssaftes, statt dessen man auch nach Menke die Leontodon-Blüthenstiele von Hämorrhoidariern aussaugen lassen kann.

#### Präparat:

**Extractum Taraxaci, Löwenzahnextract.** Dickes, wässriges Macerations-extract, aus der im Frühjahr gesammelten und getrockneten Pflanze, braun, in Wasser klar löslich. Innerlich bei Plethora zu 0,3—1,0 in Lösung oder Pillen, häufiger als Pillenconstituens für trockne Medicamente. Mit  $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$  Wasser bildet dasselbe das zu 12,0—50,0 pro die innerlich gegebene Extractum Taraxaci liquidum s. Mellago Taraxaci, worunter man früher auch den Presssaft der jungen Pflänzchen verstand. Aehnlich ist die quacksalberisch vertriebene Solution of Leontodon Taraxacum (Dandelion) von Evans.

**Anhang.** Von nicht officinellen salinisch-bitteren Stoffen, von denen insbesondere der frische Saft zu Frühlingscuren in Anwendung gezogen wird, sind noch zu erwähnen die Herba Fumariae, Erdrauch, das Kraut von Fumaria officinalis L., einer im grössten Theile der nördlichen Hemisphäre verbreiteten, als Unkraut auf Feldern gemeinen Fumariacee, welches salzig-bitteren Geschmack und frisch widrigen, narkotischen Geruch besitzt und ein nicht in Wasser, dagegen in Alkohol und Aether lösliches Alkaloid, das Fumarin, neben der (auch im Isländischen Moos und diversen Pilzen vorkommenden, künstlich durch Destillation von Apfelsäure zu erhaltenden) Fumarsäure und verschiedenen Salzen (Chlorkalium, Kaliumsulfat u. s. w.) enthält. Der Erdrauch ist neuerdings durch Hannon wieder gegen Plethora abdominalis und chronische Hautaffectionen gerühmt.

In gleicher Weise dient Radix Cichorii, Wegwartwurzel, die sehr bittere Wurzel der in Europa und Asien einheimischen, blaublühenden Composite Cichorium Intybus L., deren Bitterstoff noch nicht untersucht ist, früher in Form von Extracten oder Syrup gegen Darmkatarrhe und Atrophie benutzt. Die cultivirte Wurzel, welche sehr fleischig wird und dabei eine grössere Quantität Inulin producirt, dient zur Verfertigung des Deutschen oder Cichorienkaffee, dessen längerer Gebrauch von Einzelnen als Hämorrhoidal-congestion erregend bezeichnet wird. Auch das frische Kraut Herba Cichorii findet zu Frühlingscuren Anwendung.



**Glandulae Lupuli, Lupulinum; Hopfenmehl, Lupulin, Hopfendrüsen.**

An die bitter-aromatischen Mittel schliesst sich das meist in anderer Richtung, zur Beschwichtigung sexueller Aufregung und Bekämpfung schmerzhafter Erectionen im Verlaufe von Gonorrhoe, gebrauchte Hopfenmehl, die Harzdrüsen aus dem als Hopfen, Strobili s. Coni s. Amenta Lupuli, bezeichneten Fruchtstande von *Humulus Lupulus* L. (Fam. Cannabineae).

Der früher officinelle, in getrocknetem Zustande frisch grünlich-gelbe, zapfenförmige, lockere Fruchtstand (die weiblichen Blüthen) cultivirter Pflanzen des in ganz Europa verbreiteten und in den meisten Ländern im Grossen gebauten Hopfens ist das bekannte Material zum Würzen des Bieres, welches in der Medicin jetzt viel weniger Verwendung findet als die durch Absieben gewonnenen, besonders an den Früchtchen und der Spindel des Fruchtstandes, weniger an der Basis der blattartigen Organe befindlichen Balsam- oder Harzdrüsen, welche das Lupulin bilden. Letzteres stellt ein braungelbes, von Wasser erst allmählig benetztes, von Aether und Weingeist rasch durchdrungenes Pulver dar, welches mikroskopisch sich aus isolirten, eiförmigen, eine trübe, dunkelbraune oder rothgelbe, dicke Flüssigkeit einschliessendes Säckchen gebildet erweist, deren Oberhaut quer in zwei Halbkugeln getheilt erscheint. Sowohl die Strobili als die Glandulae Lupuli riechen aromatisch und schmecken gewürzhaft bitter. Beiden gemeinsam sind ein Bitterstoff, das in den Zapfen zu 0,04 %, in den Drüsen zu 0,11 % enthaltene Hopfenbitter oder Lupulit, eine in Wasser fast gar nicht lösliche, sauer reagirende krystallinische Substanz, die sich mit verdünnter Schwefelsäure in ein aromatisch riechendes Harz (Lupuliretin) und in eine Säure (Lupulinsäure) spaltet (Issleib), und ein ätherisches Oel, das scharf und brennend schmeckende Hopfenöl, ein Gemenge mehrerer Kohlenwasserstoffe und sauerstoffhaltiger Körper, aus welchem bei Oxydation Baldriansäure und ein gelbes Harz resultirt, welche Producte in geringer Menge auch in den Harzdrüsen existiren (Personne). Im Lupulin findet sich Wachs, in den Hopfenzapfen Gerbsäure, beide für die Wirkung indifferent. Wilder Hopfen liefert kein Lupulin.

Vom Hopfenöl wirken 20 Tropfen nicht giftig auf Kaninchen (Wagner), während das Oel bei Menschen heftiges Kopfweh und Ohnmachtsgefühl bedingt (Jaunecy). Man schreibt dem Hopfen narkotische Wirkungen zu, hauptsächlich gestützt auf Beobachtungen, wonach Arbeiter in Hopfenmagazinen in Betäubung und Coma verfallen seien, was natürlich dem Hopfenöle zur Last fällt, das bei Inhalation wie andere ätherische Oele asphyxirend wirken kann. Hier-von hat man auch therapeutisch Nutzen gezogen, indem man früher Personen, welche an Schlaflosigkeit litten, auf mit Hopfen ausgestopften Kopfkissen (*Pulvinaria Lupuli*) schlafen liess. Vom Hopfenmehl ertragen Kranke mitunter 10,0—12,0 pro die, ohne darnach irgend welche narkotische Symptome zu zeigen, während andere schon nach 1,0—2,0 Schwere des Kopfes und der Glieder, Müdigkeit, Appetitmangel und Sinken der Pulsfrequenz bekommen (Barbier). Nach Frommüller bringen selbst 15,0 Lupulin keinen Schlaf zuwege.

Man giebt Lupulin bei schmerzhaften Urethral- und Blasen-leiden zu 0,5—1,0 Abends vor dem Schlafengehen.

Kleinere Dosen haben in der Regel keinen Effect, der auch bei grösseren nicht constant ist. Die Beobachtungen verschiedener Syphilidologen sind selten rein, da sie das Mittel mit Campher und Opium in Pillenform geben. Die Darreichung in Pulverform lässt sich recht gut bewerkstelligen. Die äusserliche Anwendung des Lupulins bei unreinen Geschwüren (Hammick, Freake) kann in Form von Streupulver oder Salbe (1:2—5 Th Fett) geschehen.

Der Hopfen fand früher innerlich im Aufguss (zu 8,0—15,0 pro die) bei Indigestion, Dyspepsie, Scrophulose, Rheumatismus u. a. Leiden mannigfache Anwendung, dient aber jetzt höchstens noch als Bestandtheil von Kräutern-

fomenten bei Quetschungen, zu Kataplasmen oder zu Bädern nach Art des Kalmus (1—2 Pfd. auf ein Bad). Die Anwendung der Dämpfe von Hopfen-aufgüssen bei Phthisis ist ganz obsolet.

## 2. Ordnung. *Plastica peptica*, verdauende plastische Mittel.

Diese kleine Ordnung schliesst besonders einige dem Tierreiche entnommene und in geeigneter Weise präparirte Verdauungssäfte ein, welche vorwaltend als Ersatzmittel der entsprechenden Verdauungssäfte im menschlichen Körper in Krankheiten dienen, wo diese in ungenügender Weise secernirt werden, übrigens überhaupt bei atonischen Dyspepsien in Anwendung gezogen sind.

### *Pepsinum*; Pepsin.

Eine nicht unbedeutende Rolle in der Behandlung von Dyspepsien spielen die die Umwandlung der Eiweissstoffe in lösliche Peptone bedingenden Fermente, unter denen das aus dem Magen von Säugethieren isolirte Pepsin die hauptsächlichste Rolle spielt.

Das Pepsin ist ein feines, fast weisses, nicht hygroskopisches, fast geruch- und geschmackfreies, in Wasser nicht klarlösliches Pulver. Von gutem Pepsin muss 0,1 in 150,0 Wasser und 2,5 Salzsäure gelöst, 10,0 gekochtes und in linsengrosse Stücke geschnittenes Eiweiss bei oft wiederholtem kräftigem Schütteln innerhalb 4—6 Std. bei 40° zu einer schwach opalisirenden Flüssigkeit auflösen. Diesen Anforderungen entsprechen die meisten der in Deutschland verbreiteten guten Pepsinsorten, z. B. das Pepsin von Witte in Rostock, das Andernacher Pepsin, das *Pepsinum pulveratum* von Simon, das *Pepsinum optimum* von Wittich und Benkendorff. Die französischen Pepsine, z. B. das *Poudre nutritive* de Corvisart, sind mit Amylum zur besseren Conservirung versetzt und daher von geringerer Wirksamkeit. Viele deutsche Präparate enthalten übrigens Beimengungen von Milchzucker, da man im Stande ist, Präparate darzustellen, welche weit mehr als ein den Anforderungen der Pharmakopoe entsprechendes leisten und die doppelte, ja selbst die  $2\frac{1}{2}$ -fache Menge geronnenes Hühnereiweiss unter gleichen Bedingungen lösen, wie letzteres schon 1866 von einem aus Edam in den Handel gebrachten Präparate durch Hollmann constatirt wurde und wie dies auch z. B. bei dem Andernacher *Pepsinum purissimum* von Finzelberg der Fall ist. Von englischen Pepsinen scheint die *Pepsina porci* von Bullock das kräftigste zu sein (Dowdswell). Das Verdienst der Einführung des Pepsins in die medicinische Praxis gebührt Corvisart (1854), dessen günstige Resultate bei Verdauungsstörungen Tosi und Strambio, Ross, Nelson u. A. bestätigten. Barthez und Rilliet fanden es auch bei Diarrhöen im kindlichen Lebensalter (in Folge von Dyspepsie) wirksam, Gross bei *Vomitus gravidarum*. Basslinger und Eder empfahlen, Pepsin gleichzeitig mit solchen Medicamenten zu geben, welche bei längerem Gebrauche die Digestion stören, z. B. Copaivabalsam, Sublimat und Cubeben.

Die Formen der Dyspepsie, welche das Pepsin am besten zu bekämpfen im Stande ist, lassen sich zwar wohl theoretisch durch Mangel an Pepsin oder Unthätigkeit des im festen Zustande in den Pepsindrüsen enthaltenen Ferments oder endlich durch Verdauungsschwäche, so dass die Digestion bei der Bildung von Parapepton oder Syntonin stehen bleibt (Sée), aber sehr schlecht praktisch abgrenzen. Am meisten Erfolg haben wir selbst bei Verdauungsbeschwerden chlorotischer und tuberculöser Personen, bei Kindern und im höheren Lebens-

alter, ferner bei chronischem Magenkatarrh von Potatoren gesehen. Nach Sée bewährt es sich weniger bei echter einfacher Dyspepsie als bei Atonie des Magens und des Darmes, wo in der Regel Erfolg nicht ausbleibt. Basslinger und Eder empfehlen Pepsin auch bei Krebs und Magengeschwüren sowie bei Diabetes. Leven und Sémerie wollen die therapeutischen Wirkungen des Pepsins, ebenso des analog wirkenden Papains und Pankreatins, von denen weiter unten die Rede sein wird, nicht auf die Peptonisation der eingeführten Albuminate, sondern auf die durch die Fermente bewirkte Irritation der Magenschleimhaut mit gleichzeitiger Secretionsvermehrung, welche beim Pepsin sich mit Hyperämie der Leber und der Nieren und mit verstärkter Gallen- und Harnabsonderung compliciren, beziehen.

Man reicht das Pepsin als Digestivum zu 0,3–0,6 kurz vor oder nach der Mahlzeit. Man verordnet in Pulver (mit Milchzucker) oder in Gelatinekapselform. Zusatz von Säuren (Citronensäure, Weinsäure bei Anwendung in Pulverform) oder gleichzeitige Application von Salzsäurelösung ist wohl in allen Fällen empfehlenswerth. Inwiefern der Zusatz von Amara, Strychnin, Atropin (bei Cardialgie) und ähnlichen Stoffen, welche Corvisart, Caspari u. A. befürworten, die Wirkung fördert, steht dahin.

Eine besondere Anwendung von Pepsin hat man zur Zerstörung von Krebsgeschwülsten gemacht, indem man mit Säuren versetzte Pepsinlösungen subcutan injicirte, um durch die verdauende Kraft dieses künstlichen Magensaftes dieselben zu zerstören (Thiersch, Nussbaum, Lussana); doch scheint die Wirkung eine verhältnissmässig langsame. Besondere Empfehlung hat auch die Behandlung von ulcerirten Krebsen mit künstlichem oder natürlichem Magensaft (vom Hunde), die schon früher Physick versuchte, von Seiten italienischer Aerzte gefunden, und neuerdings empfiehlt Stöhr künstliche Verdauungsflüssigkeit (1,0 Pepsin, 5–10 gtt. Salzsäure, 150,0 Aq.) zur Aetzung von Schanker- und Eitergeschwüren, deren Eiter dadurch sehr rasch der Inoculabilität beraubt wird, bei phagedänischem Schanker und Lupus, unter Hinweis auf die Schmerzlosigkeit der Application. Bei diphtheritischen Membranen ist Pepsin nutzlos.

#### Präparat:

**Vinum Pepsini.** Vinum pepticum, Essentia Pepsini; **Pepsinwein.** 50 Th. Pepsin, mit 50 Th. Glycerin und 50 Th. Wasser zu dünnem Brei verrieben, dazu 1845 Th. Weisswein und 5 Th. Salzsäure; die Mischung unter öfterem Umrühren 6 Tage bei Seite gestellt und filtrirt. Dieses Präparat enthält auch den zweiten Factor der Magenverdauung, wodurch es sich vor dem Pepsinpulver auszeichnet, neben welchem noch stets Salzsäure verordnet werden muss, um peptonisirend zu wirken. Das früher officinelle Vinum Pepsini wurde nach einer von Liebreich angegebenen Formel durch Abschaben der mit kaltem Wasser abgespülten Innenfläche eines Schweinemagens oder Rinderlabmagens, Mischen von 100 Th. des so erhaltenen Schleimes mit 50 Th. Glycerin und Aq. dest., dreitägiges Maceriren der Mischung mit 1000 Th. Weisswein und 5 Th. Salzsäure bei nicht über 20° und Filtriren dargestellt und entsprach im Wesentlichen der 1870 von Schering in den Handel gebrachten Pepsinessenz, deren ausserordentlich starke digestive Wirkung gegenüber den mit Gewürzen und grossen Spiritusmengen versetzten Pepsinelixiren schon früher Hager zeigte. Man giebt das Vinum Pepsini thee- bis esslöffelweise nach der Mahlzeit. Viele Pepsinweine des deutschen Handels sind übrigens vollkommen wirkungslos, ebenso diverse Pepsinpastillen. Der in England unter dem Namen Rennet wine vielbenutzte weinige Aufguss getrockneter Säugethiermagen steht dem Vinum Pepsini in seiner digestiven Wirksamkeit bedeutend nach.

**Anhang.** Statt des Pepsins aus Säugethiermagen hat man solches auch aus dem Magen von Vögeln als stärker digestiv wirkend dargestellt und unter dem Namen Ingluvin in den Handel gebracht. Mehr Verwendung fand in den letzten Jahren das vegetabilische Pepsin oder Papain, Papainum, welches aus dem Saft der grünen Früchte von Carica Papaya durch Zusatz von Alkohol direct abgeschieden werden kann und welches nach Brunton in seiner peptonisirenden Wirkung auf Fleisch und hartgekochtes Eiweiss die besten Pepsinpräparate übertrifft und sich vor Pepsin und Pankreatin dadurch



auszeichnet, dass es nicht bloss in saurem oder alkalischem Medium peptonisierend wirkt. Albrecht benutzte dasselbe mit gutem Erfolge bei einfachen dyspeptischen oder katarrhalischen Magendarmleiden künstlich ernährter kleiner Kinder, auch bei Erwachsenen und bei Kindercholera. Rossbach empfahl dasselbe zur Beseitigung diphtheritischer Exsudate auf den Mandeln, da es in 5% Solution Diphtheritismembranen weit rascher als Kalkwasser auflöste. In Frankreich benutzt man entweder ein mit leicht angesäuertem Stärkmehl (1:10) versetztes Papain oder verschiedene wahrscheinlich direct aus dem Saftte bereitete pharmaceutische Präparate von Trouette, wie Papainoblaten, Cachets de Papaine, die zu 2 Stück pro dosi gegeben werden, Papain-trochischen, Dragées de Papaine, zu 1—5 Stück verwendet, einen mit Himbeersyrup und Zuckerwasser bereiteten Papainsyrup, Sirop de Papaine, der zu einem Thee- bis einen Esslöffel voll genommen wird, Papainwein (mit Malaga) und Papainelixir (mit Anisette), von denen die Cachets und die alkoholischen Präparate am wirksamsten zu sein scheinen. Das vegetabilische Pepsin wirkt auch auf Helminthen lösend, gegen welche der Saft von Carica Papaya in Brasilien Volksmittel ist (Moncorvo).

**Pankreatin, Pancreatinum.** — Unter diesem Namen sind verschiedene, theils trockene, theils flüssige Präparate im Handel, von denen die ersten eingedickte und getrocknete wässrige Auszüge der Bauchspeicheldrüse von Säugethieren (Schaf, Kalb, Rind oder Schwein), die letzteren mit Aether oder Glycerin gemachte Auszüge desselben Organs darstellen. Dieselben sollen z. Th. nicht nur das peptonisierende Ferment des Pankreas (Trypsin), sondern auch dessen saccharifizierendes Ferment einschliessen und ausserdem das Vermögen des Pankreassaftes, Fette zu emulgiren und resorptionsfähig zu machen, bewahrt haben. So soll das Pankreatin von Th. Dufresne die 9fache Menge Amylum, das 30fache vom Eiweiss und das 40fache Fett verdauen und auch dem Trommsdorffschen Pankreatin wird die Fähigkeit vindicirt, bei Blutwärme 30—35 Th. coagulirtes Eiweiss in Pepton und 6—8 Th. Amylum in Zucker zu verwandeln, sowie 10 Th. Schweinefett zu emulgiren. Die durch Extrahiren fein zerhackter Bauchspeicheldrüsen mit 250 Th. Glycerin erhaltenen Auszüge (Pancreatinum liquidum von Wittich) enthalten das diastatische und peptonisierende Ferment. Wie Pepsin hat Pankreatin für sich oder in Verbindung mit ersterem, z. B. in den Pepsin-Pankreatin-Pastillen, welche 0,025 Pepsin und 0,035 Pankreatin enthalten, Benutzung bei Dyspepsien jeder Art gefunden und obschon gegen dessen Anwendung der Umstand geltend gemacht ist, dass das Trypsin im Magen unter dem Einflusse der Pepsinverdauung zerstört werde, liegt eine Reihe günstiger Beobachtungen bei Schwächezuständen der Verdauung in der Reconvalescenz von febrilen und entzündlichen Krankheiten, bei Abdominalphthise und Erbrechen in Folge von Irritabilität des Magens, sowie endlich bei Vomitus und Atrophie im Säuglingsalter (Lees) vor.

**Acidum hydrochloricum, Acidum hydrochloratum, Acidum muriaticum;**  
**Reine Salzsäure, wässrige Chlorwasserstoffsäure.**

Wir reihen an das Pepsin den zweiten Factor der Eiweissverdauung, die in ihren Eigenschaften und sonstigen Wirkungen der Schwefelsäure und den übrigen ätzenden Säuren (vgl. S. 426) naheverwandte Salzsäure, welche in der Form, wie sie officinell ist, jedoch kaum als Causticum anwendbar erscheint und ihre hauptsächlichste Anwendung als Plasticum pepticum findet. Die von ihrer Darstellung aus Kochsalz sog. Salzsäure, eine wässrige Lösung des als Chlorwasserstoff oder Chlorwasserstoffsäure benannten Gases, ist unter zwei Formen officinell, nämlich als die in der Ueberschrift aufgeführte **reine Salzsäure** und als **unreine Salzsäure, Acidum hydrochloricum crudum** s. **hydrochloratum crudum** s. **muriaticum crudum**, welcher letzteren auch die

älteren Bezeichnungen Spiritus salis s. Spir. salis acidus s. fumans Glauberi, Acidum salis culinaris s. communis s. marini, angehören. Im Allgemeinen findet die reine Salzsäure sowohl äusserlich als innerlich vorzugsweise Verwendung; doch kann man, wenn man die Salzsäure extern verwerthet, auch die etwas stärkere und billigere rohe Säure benutzen, namentlich da, wo intensivere oder extensivere Wirkung erreicht werden soll.

Chlorwasserstoffsäure bildet sich entweder durch directe Vereinigung von Chlor und Wasserstoff oder bei Einwirkung von Chlor auf organische oder unorganische Wasserstoffverbindungen oder beim Zusammentreffen beider Elemente im status nascendi, wie dies namentlich bei der Zersetzung von Chlormetallen mittelst Schwefelsäurehydrat der Fall ist. Sie ist ein farbloses, an der Luft stark rauchendes, auf die Athemwerkzeuge höchst lästig wirkendes und stechend riechendes, nicht brennbares Gas von 1,247 spec. Gew., welches sich zu einer farblosen Flüssigkeit durch einen Druck von 40 Atmosphären bei 10° verdichten lässt. Es ist in Wasser leicht löslich, welches bei 0° unter Wärmeentwicklung 480 Volumina absorbiert. Das mit Chlorwasserstoffgas bei 0° gesättigte Wasser besitzt das spec. Gew. von 1,21 und enthält 42% Chlorwasserstoff. Diese wässrige Salzsäure dunstet allmählig Chlorwasserstoff ab und verliert beim Erwärmen so lange Gas, bis ihr spec. Gew. auf 1,1 und ihr Procentgehalt an Säure auf 20% gesunken ist und bei 110° die ganze Flüssigkeit mit gleichbleibender Concentration destillirt.

Die rohe Salzsäure des Handels, welche in grossen Mengen als Nebenproduct in Sodafabriken bei Zersetzung von Kochsalz mit Schwefelsäure gewonnen wird, besitzt das spec. Gew. von 1,168—1,170, was einem Gehalte von 29 bis 33% Chlorwasserstoff entspricht. Sie ist oft eisenhaltig und dadurch gelblich, an der Luft rauchend und von eigenthümlich safranartigem Geruche. Arsenikhaltige Säure ist zu verwerfen. Die reine Salzsäure, welche durch Destillation der rohen gewonnen wird, hat das spec. Gew. von 1,124 und einen Gehalt von 25% Chlorwasserstoff, ist klar und farblos, raucht an der Luft nicht und verflüchtigt sich beim Erhitzen vollständig.

In Eialbumin erzeugt Salzsäure, jedoch erst bei ziemlich reichlichem Zusatze, weissliche, in Wasser und verdünnter Salzsäure schwer lösliche Flocken (Hoppe-Seyler); grosse Mengen kalter Salzsäure von 0,1% Chlorwasserstoffgehalt wandeln Eiereiweiss in Syntonin oder einen syntoninähnlichen Stoff um (Kühne). Bei längerem Contact mit Salzsäure wird Eiweiss roth oder blau gefärbt und in eine blaue Lösung verwandelt; kochende Salzsäure löst geronnenes Eiweiss bei Luftzutritt mit schwarzbrauner, ohne Luftzutritt mit strohgelber, aber später in Blau und schliesslich in Schwarz übergehender Farbe; in der schwarzen Masse sind Ammoniak und Huminsäure (Mulder), Leucin, Tyrosin und Leucinimid (Bopp) vorhanden. Auch in Serumalbuminlösung giebt überschüssige conc. Salzsäure Flocken, die sich wieder lösen; aus der Lösung fällt Wasser salzsaures Syntonin (Hoppe-Seyler). Fibrin quillt in rauchender Salzsäure zur Gallerte auf, die sich allmählig zu schön dunkelblauer Flüssigkeit löst, und giebt beim Kochen mit derselben Leucin und Tyrosin (Bopp). Verdünnte Salzsäure wandelt Fibrin in der Kälte nach tagelangem Stehen, bei 60° ziemlich rasch zum grössten Theil in Syntonin um (Kühne).

Die Wirkungsweise der Salzsäure auf die Gewebe des Körpers ist im Wesentlichen der der Schwefelsäure gleich, jedoch bedeutend geringer, so dass sie in kleinen Dosen die Verdauung nicht beeinträchtigt und unter pathologischen Verhältnissen sogar geradezu fördert.

Ein intensives Causticum ist die officinelle Salzsäure nicht. Auf die unverletzte Haut gebracht, ruft dieselbe mehr Reizungserscheinungen als eigentliche Corrosion hervor. Einmalige Application erzeugt höchstens Prickeln und Wärme, wiederholte unter nicht sehr lebhaftem Brennen weisse Knötchen, mit

Anschwellung und Röthung der Umgebung, worauf in 1–2 Tagen Induration und bräunliche Verfärbung folgt, die in einigen Wochen schwindet. Auf frischen Wunden bedingt ein Tropfen officineller Salzsäure lebhaftes Brennen und einen weissen, härtlichen, von einem schmalen, entzündlichen Saume begrenzten Fleck, der etwa die vierfache Grösse des Tropfens besitzt und sich später als trockner Schorf löst (Krahrmer). Aehnlich ist die Einwirkung auf Geschwüre; auch auf der Zunge entsteht ein weisser, empfindlicher Fleck.

Die Ingestion grösserer Mengen in den Magen kann wie die von Schwefelsäure zu Corrosion der mit der Säure in Contact gekommenen Partien und selbst zum Tode führen, doch ist letzteres selten der Fall und selbst Mengen von 45,0–60,0 der officinellen Säure können überstanden werden. Die Erscheinungen sind dieselben wie beim Sulfoxysmus; die Schorfe in der Nähe der Lippen, ebenso im Munde und Schlunde, sind grau oder grauweiss und bieten Aehnlichkeit mit diphtheritischen Membranen; die Magencontenta sind meist gelblich oder gelblichgrün. Chlorwasserstoffdämpfe wirken bei Einathmung intensiv reizend auf die Luftwege, selbst noch bei Verdünnung mit dem 1500fachen Volumen atmosphärischer Luft. Sowohl bei Einathmung als bei Einführung grösserer Mengen in den Magen scheint Aufnahme der Säure als solche in das Blut stattzufinden, indem einerseits danach eigenthümliche narkotische Symptome, Neigung zu Sopor, selbst Convulsionen vorkommen, welche vielleicht auf Alteration der rothen Blutkörperchen durch die Säure beruhen, andererseits bei interner Vergiftung Elimination durch die Lungen stattfindet. Aeltere Autoren (Boerhave, van Swieten) legten der Salzsäure stimulirende Action bei, so dass sie bereits in kleinen Gaben den Puls beschleunige und Röthung des Gesichts bedinge, in etwas grösseren sogar rauschähnliche Zufälle herbeiführe. Bobrick nahm bei sich nach 1,2 Salzsäure (mit 150,0 Flüssigkeit verdünnt) anfangs Steigen der Pulszahl um 6 Schläge wahr, welche  $\frac{3}{4}$  Stunden anhielt und mit erheblicher Zunahme der Spannung der Arterie und Abnahme der Höhe der Pulswelle verbunden war und später (nach 1 Stunde) einer geringen Abnahme der Pulszahl (um 4 Schläge) Platz machte. Auch bei Fröschen sah Bobrick nach Salzsäure anfangs Zunahme der Frequenz und Energie des Herzschlages, erst später Sinken desselben. Diese Phänomene hängen von den Nervencentren, nach deren Abtrennung sie ausbleiben (Bobrick), ab.

Die vorzüglichste Differenz, welche die Salzsäure anderen Mineralsäuren gegenüber zeigt, sind ihre Beziehungen zur Digestion, welche ihr eine Stellung unter den Plastica peptica geben und sie für sich oder in Verbindung mit Pepsin zu einem trefflichen Medicamente bei Dyspepsien machen, zumal bei solchen, welche mit Affectionen der Brust- oder Abdominalorgane sich verbinden (Prout, Budd, Caron, Trousseau).

Dass der Magensaft freie Salzsäure enthält, kann nach C. Schmidts Untersuchungen nicht mehr bezweifelt werden, und ebenso steht es fest, dass die Digestion der Eiweisskörper durch Neutralisation der Salzsäure gestört und aufgehoben wird, dass dagegen durch Verstärkung der Säuremenge, jedoch nicht über eine bestimmte Grenze hinaus, die Ueberführung der Eiweisskörper in lösliche Modificationen mit grosser Energie vor sich geht. Auf diese Weise finden die Effecte bei Dyspepsie in Folge verminderter Abscheidung von Magensaft ihre Erklärung, zumal da Salzsäure bereits für sich Albuminate zu lösen vermag. Bei derartiger Dyspepsie, wie sie bei sonst kräftigen Individuen in Folge sitzender Lebensweise vorkommt, ist Chlorwasserstoffsäure ganz besonders empfehlenswerth. Hierauf beschränkt sich ihre Wirksamkeit indessen nicht; besonders indicirt ist sie ausserdem noch bei Pyrosis und Dyspepsien, welche auf abnormen Gährungsprocessen im Magen beruhen, weil sie, wie alle übrigen Säuren, das Vermögen besitzt, Gährungsprocesse zu sistiren, und weil sie dabei gleichzeitig in normaler Weise verdauend auf das gährungsfähige Material wirkt. In solchen Fällen beseitigt sie dann auch natürlicherweise die Neigung zur Gasbildung und Diarrhoe, welche derartige Dyspepsie begleitet. Prout und Begbie rühmen die Salzsäure auch bei den die oxalsäure Diathese begleitenden Ver-



dauungsstörungen. Man muss übrigens bei Dyspepsien einerseits sich vor zu grossen Dosen, andererseits vor zu ausgedehntem Gebrauche hüten, weil, wenn Salzsäure auch viel besser als Schwefelsäure ertragen wird, doch bei längerem Gebrauche Intoleranz entsteht. Ob neben dieser Wirkung auf die Digestion bei Dyspepsien auch noch ein direct plastischer Einfluss der Säure stattfindet, lassen wir dahin gestellt sein. Bei kleineren Gaben wird die Salzsäure offenbar nicht als solche resorbirt, sondern als Chlornatrium, und müsste dieselbe also dieselben entfernten Wirkungen wie dieses hervorrufen (Rabuteau), doch sind die Dosen, in denen man Salzsäure giebt, zu klein, um erhebliche Chlornatriumwirkung zu gestatten.

Die übrigen Indicationen zur inneren Anwendung der Salzsäure verhalten sich denen der Schwefelsäure gleich. Ausgedehnteren Gebrauch hat sie bei Diarrhöen und als Antipyreticum, hier besonders im Typhus, gefunden.

Von Darmkatarrhen beseitigt sie am besten diejenigen, welche auf abnormen Gährungsprocessen beruhen; sie kann deshalb auch bei Diarrhöen in der ersten Lebensperiode gegeben werden, besitzt jedoch keine Vorzüge vor kleinen Calomeldosen. Manchmal sieht man günstige Erfolge bei Diarrhöen Tuberculöser und bei Cholérine. Auch bei Typhus ist sie nicht nur als Antipyreticum, sondern auch als den Durchfall beschränkendes Mittel und in der Absicht, der Blutdissolution entgegenzuwirken, gegeben. Die Benutzung als Antipyreticum überhaupt hat ihren Höhepunkt erreicht; Traube will sie auf die biliöse Pneumonie beschränken, wo energische Antiphlogose schadet und der gleichzeitige Magenkatarrh andere Antipyretica verbietet. Die Benutzung bei Scropheln und Scorbut (Wright, de Meza), Diabetes (Basham), Cholera asiatica (Krug), Keuchhusten (zu 20–30 Tropfen pro die nach Thiel), gegen Auflockerung der Schleimhaut und dyskrasische Geschwüre des Larynx und der Trachea (Meinhard), gegen Syphilis (Zeller) und gegen Lithiasis (Copeland) sind antiquirt.

Aeusserlich hat Salzsäure als Aetzmittel besonders bei Noma Empfehlung gefunden, in Verdünnung als adstringirendes und etwas reizendes Medicament bei Salivation und Geschwüren im Munde oder Rachen.

Selbst kleinere Warzen und Excrescenzen bedürfen einer wiederholten Betupfung mit officineller Salzsäure, um zu schwinden. Die Anwendung zum Zerstören von Zahnnerven (Zahnwehmittel von Newton, mit  $\frac{2}{3}$  Tr. Benzoës comp.) ist nicht sehr zweckmässig, da die Zahnschubstanz dadurch angegriffen wird. Die Anwendung von Salzsäure zum Aetzen bösartiger Hornhautgeschwüre ist ganz obsolet, ebenso die Anwendung in Verdünnung (1:50) zur Auflösung von Eisansplitteln in der Cornea. Auch von dem Gebrauche zur Aetzung von Diphtheritis faucium (Bretonneau) ist man zurückgekommen. Bei Pernionen rühmte Thorel Salzsäure in Verbindung mit Glaubersalz. Waschungen mit verdünnter Salzsäure bei Fusschweissen (Kletzinsky), Injectionen bei Gonorrhoe haben keine Bedeutung mehr.

Innerlich giebt man Salzsäure zu 0,25–1,0 vorzugsweise in Lösung, stets stark verdünnt, am zweckmässigsten in schleimigem Vehikel (1,0–5,0 auf 100,0 Flüssigkeit).

Tropfen lässt man meist mit Syrup anfertigen; zu Limonaden rechnet man 4,0–6,0 auf 1000,0. Pillen oder Bissen (mit Pflanzenpulver q. s.) sind nicht unzuweckmässig, da durch Einnehmen flüssiger Säureverdünnungen die Zähne stumpf und bei wiederholtem Gebrauche geschädigt werden. Das nachträgliche Ausspülen des Mundes mit einer Lösung von Natriumcarbonat ist daher stets empfehlenswerth.

Aeusserlich ist zum Aetzen das stärkere und billigere Acidum hydrochloricum crudum zu verwenden. Zur Application in Mund- und Gurgelwässern gebraucht man 1,0–3,0 auf 100,0 Wasser mit 25,0 Rosenhonig oder Syr. Rubi

Idaci, zu Pinselsäften 1 Th. Salzsäure auf 20–50 Th. Syrup oder Honig. Zum Fussbade nimmt man 25,0–50,0. Zu einmaliger Entfernung des sog. Weinstains oder Zahnsteins kann 1 Tropfen mit 30,0 Wasser dienen; auch hier ist Nachspülen mit alkalischer Flüssigkeit zweckmässig.

#### Präparat:

**Acidum hydrochloricum dilutum**, **Acidum muriaticum dilutum**; **Verdünnte Salzsäure**. Acid. hydrochlor. und Aq. dest. aa; klar, farblos, von 1,061 spec. Gew. Wie Acidum hydrochloricum innerlich, jedoch in doppelt so grosser Gabe.

**Fel Tauri s. Bilis bovina.** — Aus Ochsen-galle bereitete man früher zwei Präparate, von denen das eine, das **Fel Tauri inspissatum**, Extract-consistenz besitzt, während das andere, das **Fel Tauri depuratum siccum**, ein weissgelbes Pulver bildet. Das letztere stellt im Wesentlichen die in der Galle enthaltenen gallensauren Alkalisalze dar und ist auch wohl deshalb als **Natrium choleïnium** bezeichnet.

Die Ochsen-galle ist ein Gemenge von Gallenschleim, Fetten, darunter das sog. Gallenfett oder Cholesterin, etwa 1% Calcium-, Magnesium-, Kalium- und besonders Natriumsalzen (Phosphat und Chlorür), Gallenfarbstoffen (Biliverdin Cholepyrrhin, Bilifulvin) und einer wässrigen Lösung der Natriumsalze zweier stickstoffhaltiger organischer Säuren, der Glykochol- und Taurocholsäure, welche letztere auch Schwefel enthält. Beide Säuren zerfallen beim Kochen mit Barytwasser in stickstofffreie Cholsäure oder Cholalsäure und einen für jede Säure verschiedenen stickstoffhaltigen Paarling (Glycin oder Glykokoll bei Glykocholsäure und Taurin bei Taurocholsäure). Im Blute verbrennt die Cholsäure wahrscheinlich zu Kohlensäure und Wasser, das Glykokoll zu Harnstoff; das Taurin erscheint theils unverändert, theils nach Aufnahme von CONH (Carbaminsäurerest) als Taurocarbaminsäure, bei Kaninchen auch, theils als unterschweflige, theils als Schwefelsäure (Salkowski).

Die Bedeutung der Galle für die Verdauung ist so bekannt, dass eine ausführliche Darstellung überflüssig erscheint. Auf die Verdauung der Eiweisskörper wirkt Galle höchstens indirect fördernd. Gelangen grössere Mengen Galle in den Magen, so wird die Verdauung entschieden gestört und selbst bei längere Zeit fortgesetzter Zufuhr geringer Mengen Galle nimmt der Appetit ab und kommt es zu Uebelkeit und widrigem, fast fauligem Aufstossen. Beimischung von Galle oder Magensaft verhindert die Verdauung der Eiweisskörper. Zusatz von Galle oder gallensauren Salzen zu Peptonlösung bewirkt einen Niederschlag, welcher Gallenbestandtheile und Parapepton enthält. Möglicherweise fixirt sie die Eiweissstoffe dadurch an der Darmwand und dient so indirect dazu, die Verdauung derselben durch Pankreas- und Darmsaft vollständiger zu machen. Für die Verdauung von Amylum ist Galle wirkungslos; Hunde mit Gallen fisteln verdauen sowohl Eiweisskörper wie Amylaceen in normaler Weise. Die hauptsächlichste Bedeutung der Galle als Verdauungssaft bezieht sich auf die Fette. Nach Unterbindung des Gallenganges enthalten die Chylusgefässe blasse, fettarme Flüssigkeit, während über die Hälfte der mit der Nahrung eingeführten Fettmenge unverdaut abgeht. Die Galle wirkt nicht chemisch auf die Fette ein. Die verdauungsbefördernde Wirkung der Galle beruht in ihrer Fähigkeit, sich mit Fett sowohl als mit Wasser zu mischen; indem die Darmschleimhaut sich mit Galle imbibirt, wird sie dadurch besser befähigt, Fetten den Durchgang zu gestatten. Nach Wistinghausens Versuchen übt die Galle eine mechanische Attraction auf Fette aus. Ein weiterer für die Verdauung wichtiger Umstand ist die antiputride Wirksamkeit der Galle, wodurch sie die faulige Zersetzung des Chymus hindert. Endlich wirkt Galle beschleunigend auf die peristaltische Bewegung, wie sich dies auch daraus ergibt, dass bei Einbringung grösserer Dosen Ochsen-galle häufig Durchfall, selbst Erbrechen entsteht und dass bei mangelndem Gallenzufluss (bei katarrhalischem Ikterus) stets Obstipation vorhanden ist. — Die in den Darm ergossene Galle wird bekanntlich zum grossen Theile wieder resorbirt. Werden gallensaure Alkalien in das Blut von Thieren eingespritzt, so erfolgt danach Verlangsamung des Herzschlages und bei grösseren Dosen Stillstand des Herzens. Hieraus erklärt sich die beim Ikterus constante Pulsverlangsamung und Erniedrigung der Temperatur. Bei

Einführung von Galle oder gallensaurem Natrium (selbst zu 2,0) in den Magen von Thieren (Katzen) tritt nur Durchfall und Abmagerung in Folge gestörter Verdauung ein, dagegen keine Veränderung der Herzthätigkeit und des Nervensystems, auch keine Auflösung oder Veränderung der rothen Blutkörperchen oder fettige Degeneration der Gewebe (Leyden).

Nach den physiologischen Wirkungen der Galle im Darne würde ihre hauptsächlichste therapeutische Verwendung auf solche krankhafte Affectionen sich vorzugsweise erstrecken müssen, bei denen die Aufsaugung der Fette verringert ist, doch wird im Allgemeinen die Ochsen-galle nach Art der Amara überhaupt bei atonischer Dyspepsie gegeben. Sie muss sogar als den Bitterstoffen nachstehend bezeichnet werden, weil sie bei längerem Gebrauche selbst in kleinen Dosen die Magenverdauung stört. Bei Dyspepsie mit Obstipation passt sie am besten, weshalb sie auch bei Bleikolik Empfehlung gefunden hat. Als Ersatz der nicht in den Darm gelangenden Galle bei Ikterus kann sie nicht empfohlen werden, weil die Resorption der frisch eingeführten Galle möglicherweise das allgemeine Uebelbefinden steigert; doch machen verschiedene Aerzte von ihr ausgedehnten Gebrauch. Rationell dagegen ist es, sie bei Ikterus zur Beseitigung der Obstipation solchen Purganzen (Aloë, Jalape), welche nur mit Beihilfe der Galle purgirend wirken, hinzuzusetzen. Ebenso lässt sich Ochsen-galle als Zusatz zu Opiumpillen benutzen, um der Verstopfung entgegenzuwirken (Clay). Der Gebrauch gegen Diabetes (Canstatt, Lange), Lungentuberculose, Helminthen oder gar gegen fieberhafte Zustände entbehrt der Begründung.

Äusserlich ist frische oder eingedickte Galle bei Drüsengeschwülsten, Hornhauttrübung, Hypertrophie der Mandeln und Brustdrüse (Bonorden), auch bei Eingeweidewürmern (nach Brera in die Bauchhaut eingerieben) benutzt. In einzelnen Gegenden ist frische Ochsen-galle Volksmittel gegen Frostbeulen. Im Klystier ist Galle bei habitueller Verstopfung, namentlich bei der Gravidität, empfohlen.

Innerlich giebt man *Fel Tauri inspissatum* zu 0,5—1,0 mehrmals täglich in Pillenform oder in einem aromatischen Wasser mit Zusatz von *Spiritus aethereus*; äusserlich in Pinselsäften (mit  $\frac{1}{2}$  Wasser), Salben und Linimenten, oder in Klystieren (5,0—10,0 auf das Klystier). Statt eingedickter Ochsen-galle kann man auch frische Galle, *Fel Tauri recens*, innerlich und äusserlich, natürlich in 3—5fach grösseren Mengen anwenden. Freie Säuren, saure oder metallische Salze sind zu meiden. Das *Fel Tauri depuratum siccum*, welches hauptsächlich wohl wegen des widrigen Aussehens der Ochsen-galle als Ersatzmittel derselben in Gebrauch gezogen ist, wird zu 0,3—0,6 mehrmals täglich in Pillen (für sich mit *Mucil. Gi. Arab.*) gegeben.

### 3. Ordnung. *Plastica directa*, direct plastisch wirkende Mittel.

Wir fassen unter dieser Bezeichnung diejenigen *Plastica* zusammen, welche auf den gesammten Stoffwechsel eine directe Einwirkung ausüben, die theils in Ersatz verloren gegangenen gleichartigen oder analogen Materials besteht, theils aber auch bei einzelnen Stoffen durch besondere physikalische und chemische Eigenschaften bedingt wird. Die hier abzuhandelnden Stoffe sind entweder selbst Bestandtheile des thierischen Organismus oder einer Umwandlung in solche fähig. Wir betrachten zunächst die unorganischen, denen wir dann die organischen folgen lassen.



**Natrium chloratum, Natrium muriaticum purum; Natriumchlorid, Chlornatrium.**

Das Natriumchlorid bildet kleine, farblose, durchsichtige, würfelförmige Krystalle oder ein krystallinisches Pulver von salzigem Geschmacke, welches sich in 27 Th. kaltem oder heissem Wasser, nicht in Weingeist löst, an der Luft sich nicht verändert und beim Erhitzen wegen des in den Hohlräumen der Krystalle eingeschlossenen Wassers heftig verknistert, in Glühhitze schmilzt und verdampft und beim Erkalten wieder krystallinisch erstarrt. Dasselbe dient zur Darstellung der medicinischen Seife, wird aber in der Therapie in allen Fällen zweckmässig durch das nicht völlig chemisch reine Chlornatrium ersetzt, welches im Handel vorzugsweise als Sool- oder Siedsalz, Küchensalz, Kochsalz, Sal culinaire, aber auch als Steinsalz oder Bergsalz, Sal gemmae s. fossile s. montanum, endlich auch als Seesalz, Sal marinum, vorkommt. Das Steinsalz findet sich in mächtigen Lagern, meist zwischen Schichten von Gyps eingelagert, in verschiedenen Gegenden, so bei Stassfurt, Hall in Tirol, Wieliczka (Galizien), Cheshire u. s. w. und bildet in reinstem Zustande schöne grosse kubische Krystalle. Das Küchensalz wird aus den natürlichen Salzsoolen oder Salzquellen gewonnen, welche dadurch sich bilden, dass unterirdische Süsswasserquellen Steinsalzlager oder natriumchloridhaltige Gesteine durchströmen, und welche in ihrem Gehalte an Natriumchlorid (sog. Löthigkeit der Soolen) zwischen 6 und 26% variiren. Aus starklöthigen Soolen wird direct, aus schwachlöthigen Soolen nach vorgängiger Concentration durch Verdunstung an der Luft (Gradiren) das Kochsalz durch Abdampfen (Versieden) gewonnen. Es enthält bis zu 2–3% Verunreinigungen, die aus Chlormagnesium, welches das Feuchtwerden des Kochsalzes bedingt, Natriumsulfat, Calciumsulfat und Calciumcarbonat bestehen. Die nach der Gewinnung des Kochsalzes aus Salzsoolen zurückbleibende Flüssigkeit stellt die sog. Mutterlauge dar, ein dickliches, ölig anzuführendes Liquidum von verschiedener Farbe und sehr hohem spec. Gewichte. Die Mutterlaugen enthalten 30–40% feste Bestandtheile, vorwaltend Chlornatrium, Chlorcalcium und Chlormagnesium, auch Kalium-, Calcium- und Magnesiumsulfate, auch Iod und Brom. Der Kochsalzgehalt solcher Mutterlaugen schwankt in sehr bedeutenden Grenzen, zwischen 0,34% (Kreuznach) bis 24% (Ischl, Friedrichshall). Die durch Eindickung der Mutterlaugen zu gewinnenden Krystalle oder Krystallkrusten werden als Mutterlaugensalz bezeichnet. Das Seesalz, welches aus dem Meerwasser in wärmeren Ländern vermittelst spontaner Verdunstung, in nördlichen Klimaten durch Concentration vermittelst Gefrierenlassen und nachfolgendes Absieden gewonnen wird, unterscheidet sich vom Kochsalz durch grössere Krystalle und etwas bitterlichen Geschmack. Es kann 3–10% fremde Salze enthalten, unter denen Spuren von Bromalkalimetallen sich befinden.

Das Kochsalz ist ein natürlicher Bestandtheil sämmtlicher Vegetabilien, unter denen von Landpflanzen die Familien der Gramineen und Cruciferen es am reichlichsten zu enthalten scheinen. Es bildet einen integrirenden Bestandtheil des Thierkörpers, dessen einzelne Theile jedoch eine differente Menge davon enthalten. Am reichlichsten findet sich Chlornatrium in den Thränen (bis 0,13%). Die Asche des Blutes enthält mehr Chlornatrium als sonstige Salze zusammengenommen (57,6% nach Lehmann).

Die Bedeutung des Kochsalzes für die normale Ernährung des Organismus ist von jeher anerkannt und dasselbe früher als einer der nothwendigsten Lebensreize bezeichnet worden. Wir fassen die Hauptwirkung des Kochsalzes mit Voit in Vermehrung des Eiweissumsatzes durch Steigerung der Geschwindigkeit des Stoffkreislaufs von Zelle zu Zelle. Wie ausserhalb des Organismus ziehen Kochsalzlösungen auch in demselben Wasser an und steigern auf diese Weise die Geschwindigkeit des Säftestromes und dadurch die Verbrennung, die in der Zeiteinheit um so reichlicher ausfallen muss, je häufiger ein und dasselbe Stofftheilchen unter die Bedingungen der Oxydation gebracht wird. Rabuteau constatirte bei Selbstversuchen Zunahme der Harnstoffausscheidung bei sonstigem völligem Normalverhalten des Körpers um fast 20% in einer Periode, wo er zu seiner gewöhnlichen Nahrung täglich 10,0 Seesalz hinzufügte; in derselben Zeit

war auch die Temperatur um  $\frac{1}{2}^{\circ}$  höher als sonst. Ebenso fand Kaupp, dass mit Zunahme der Salzzufuhr um 1,0 die Harnstoffmenge um 0,04 wächst, während die übrigen gelösten Harnbestandtheile abnehmen. Die Entziehung von Salz aus Rücksichten der Oekonomie, welche russische Edelleute an ihren Leib-eigenen übten, soll nach Barbier zu einem Zustande von Hydrämie und Scorbut geführt haben. Wenn andererseits einzelne Völkerschaften, z. B. die Tlascalaner (Prescott), kein Salz zu ihrer Nahrung benutzt haben sollen, wenn das Urvolk des Indogermanischen Stammes, die Arier, ebenfalls kein Salz besaßen (Fick): so ist die Einföhrung auf einem anderen Wege, bei Küstenbewohnern z. B. durch die salzhaltige Atmosphäre, anzunehmen. Directe Versuche von Klein und Verson beweisen, dass schon wenige Tage nach Entziehung der Kochsalzzufuhr Völle des Magens, Eingenommensein des Kopfes und allgemeine Mattigkeit sich einstellen. Nichtsdestoweniger bleibt nach Kemmerichs Versuchen selbst bei monatelanger Kochsalzentziehung und gleichzeitiger kaliumreicher Kost die Kochsalzmenge im Blute ziemlich unverändert, obschon der Chlorgehalt des Harnes bis auf ein Minimum fällt, ja unter Umständen sogar seine saure Reaction verliert (Klein und Verson). Bei Albuminurie kommt Schwinden von Eiweiss im Urin unter der Benutzung grosser Dosen von Seesalz vor (Plouviez), während bei Kochsalzentziehung manchmal, jedoch nicht constant (Stockvis), Eiweiss im Urin auftritt (Wundt und Rosenthal). Möglicherweise ist als Ursache dieser gesteigerten Verbrennung in zweiter Linie ein Einfluss des Kochsalzes auf das Blut und die Blutkörperchen zu betrachten. Wie schon Hewson fand, verzögert Chlornatrium — wie übrigens bekanntlich auch Natrium- und Magnesiumsulfat, sowie verschiedene andere Salze — die Coagulation des Blutes und röthet — wie auch Chlorkalium, Chlorammonium und Chlormagnesium (Rabuteau) — das letztere. Die Zahl der rothen Blutkörperchen und der Faserstoff werden vermehrt, wie Poggiale bei Versuchen von Plouviez über Kochsalzdiät fand, wobei er gleichzeitig Abnahme des Eiweiss- und Wassergehaltes des Blutes constatirte. Inwieweit die Vermehrung der Blutkörperchen auf einer Conservation der rothen Blutkörperchen beruht, wie Rabuteau aus dem Umstande schliessen will, dass Kochsalzlösungen minder rasch als gewöhnliches Wasser unter dem Mikroskope die Destruction der rothen Blutkörperchen hervortreten lassen, steht dahin.

Ein weiteres Moment, welches die plastische Action des Chlornatriums mitbedingt, ist die dadurch hervorbrachte Vermehrung der Nahrungsaufnahme in die Säftemasse, welche theils auf directem Lösungsvermögen nicht zu starker kochsalzhaltiger Lösungen für Eiweissstoffe (Frerichs, Liebig), theils auf Vermehrung der Secretion des Speichels und des Magensaftes beruht. Wie früher Bardeleben fand, dass directe Einführung grösserer Mengen von Kochsalz (wie auch von Kalium- und Natriumsulfat und wohl jeder Reiz mechanischer oder chemischer Art) bei Magen fistelunden die Menge des Magensaftes vermehrt, hat sich neuerdings Rabuteau ebenfalls beiunden davon überzeugt, dass auch stärker gesalzene Kost den Magensaft vermehrt und gleichzeitig auch die Acidität desselben steigert. In den Darmcanal gelangt somit ein weit leichter assimilirbarer Chymus, dessen Resorption vielleicht noch durch die Verstärkung der Endomose vermöge des in das Blut aufgenommenen Chlornatriums beschleunigt wird. Sedetschny wies auf die Bedeutung des Kochsalzes für den Uebergang von Calciumphosphat, Lablin auf diejenige für Eisenpräparate im Darm hin. Factisch ist, dass Hausthiere, welche Salz in grösserer Menge verzehren (bei Fütterung mit sog. Viehsalze), Vermehrung der Fresslust in auffälligem Maasse bekommen, wobei dieselben gleichzeitig in ihrem ganzen Verhalten eine erfreuliche Besserung zeigen, die sich am Verhalten des Felles, der Körperkraft und des Fleisches, das bei geschlachteten Thieren sich als weit saftiger herausstellt, zu erkennen giebt. Nach Saive ist sogar die Fruchtbarkeit und die Milchsecretion bei Kühen unter Fütterung mit Viehsalz vermehrt. Dagegen tritt keine erhebliche Zunahme des Körpergewichtes ein (Boussingault, Dailly), was sich einfach durch den gesteigerten Verbrennungsprocess erklären lässt. Bei Menschen haben die Resultate directer Untersuchungen über den Einfluss vermehrter Kochsalzzufuhr auf das Körpergewicht differente Resultate gegeben; die Möglichkeit vermehrter Anbildung unter gewissen Verhältnissen ist nicht ausgeschlossen.

Das als Wirkung des Kochsalzes hinlänglich bekannte Gefühl des Durstes ist entweder aus der local reizenden Einwirkung auf die sensiblen Nervenenden im Munde und die oberen Partien des Tractus oder aus der Vermehrung der Wasserausscheidung durch die Nieren erklärt worden. Die vermehrte Einwirkung der Kochsalzzufuhr auf die Harnmenge ist neuerdings von Falck (1872) in Versuchen an hungernden Thieren erwiesen. Kaupp wollte Abnahme des Harnvolumen nach vermehrter Chlornatriumaufnahme gefunden haben. Nach Voit tritt Vermehrung der Harnmenge erst ein, wenn längere Zeit Kochsalz einge-führt wurde und Kochsalzgleichgewicht sich eingestellt hat.

In wie weit die längere Zeit fortgesetzte vermehrte Zufuhr von Kochsalz schädliche Folgen für den Organismus hat, ist noch nicht als festgestellt anzusehen. Man hat das Entstehen des Scorbutis bei Seefahrern (Wallfisch-fängern u. s. w.) dem Geuss des Pökelfleisches zugeschrieben und dabei entweder direct den Ueberschuss der zugeführten Natronmenge (Becquerel und Rodier) oder die Entziehung der Kalisalze (Garrod) als Ursache betont. Jedenfalls sind bei solchen Strapazen, wie sie in früherer Zeit Seefahrten mit sich brachten, zur Entstehung des Scorbutis auch manche andere Schädlichkeiten prädisponirend. Unmöglich ist indessen ein Einfluss des Kochsalzes auf die Entstehung des Scorbutis nicht, da nach Experimenten von Prussac (bei Fröschen, welche in conc. Kochsalzlösungen gebracht oder denen solche in die Lymphsäcke des Rückens gespritzt werden) massenhafte Auswanderung der rothen Blutkörperchen durch die unverletzten Gefässe (Blutung per diapedesin), wie solche den Scorbut charakterisirt, stattfindet.

Die günstigen Effecte des Kochsalzes auf Verdauung und Stoffwechsel beziehen sich auf kleinere Quantitäten (1,0–4,0). Grössere Mengen (mehr als 3 % in Verdauungsflüssigkeiten) wirken auf Eiweissstoffe nicht mehr lösend, sondern coagulirend. Stärkere Gaben Kochsalzlösung bewirken mitunter wässrigen Durchfall. In Substanz in grösseren Mengen ( $\frac{1}{2}$ –1 Pfd.) oder auch in conc. Lösung verabreicht, bedingt Kochsalz Erbrechen und manchmal hochgradige Gastritis, die selbst zum Tode führen kann. In China dient es sogar zum Selbstmorde. Aehnliche entzündliche Erscheinungen bedingt Kochsalz in Substanz oder conc. Lösung auch auf anderen Schleimhäuten. Selbst auf zarten Hautstellen kann trocknes Kochsalz Hyperämie und bei längerer Einwirkung Erythem und Bläschenbildung hervorrufen.

Erbrechen und Durchfall zeigen sich auch bei Hunden nach Einspritzung von 15,0–30,0 Chlornatrium in den Magen. Circulation, Blutdruck und Temperatur werden bei subcutaner Application etwas kleinerer Dosen wenig verändert (Podcopaew). Kaninchen scheinen nach 2,0–3,0, in den Magen gespritzt, bisweilen unter Convulsionen zu Grunde gehen zu können (Guttmann). Auf Hunde wirkt Chlornatrium entschieden giftiger als Natriumphosphat und tödtet durch Lungenödem (Falck). Injection grösserer Mengen in die Vena cruralis bei Hunden bedingt Steigen des Pulses, oft auf die doppelte Schlagzahl, die jedoch in 2–3 Minuten wieder normal wird, Ptyalismus, Gurren im Magen und sehr kurzdauernde Milzverkleinerung (Podcopaew). Bei tödtlichen Dosen kommt es meist zu klonischen Krämpfen, welche jedoch bei gleichzeitiger Darreichung von Wasser ausbleiben. Auf die Reizbarkeit des Muskels und Herzens influirt Kochsalz selbst in grossen Dosen nicht nachtheilig. Bei Fröschen bedingt Eintauchen einer Pfote in eine conc. Kochsalzlösung Unruhe des Thieres und Anschwellung des Beines; während ein  $\frac{1}{4}$  stündliches Verweilen in derselben keine schädlichen Folgen hat, treten bei längerem Aufenthalte flimmernde Muskelzuckungen, und wie dies zuerst Kunde als Einwirkung des Kochsalzes bei Fröschen beobachtete, Katarakt ein (Guttmann).

Von der äusseren Haut aus findet bei Application von Kochsalzlösungen (in Bädern) Resorption des Chlornatriums nicht statt. Conc. Lösungen bedingen ein Gefühl von Brennen und bei längerer Einwirkung auch eine gelinde Röthung. Nach Clemens Untersuchungen imbibirt sich im Kochsalzbade die Epidermis mit Kochsalz, welches sie später wieder an die Badeflüssigkeit abgibt. Das in das Corium gedrungene Kochsalz wirkt erregend auf die dort belegenen Nervenfasern, woraus Erhöhung der Tastempfindlichkeit der Haut (Beneke und Sant-lus), sowie Steigerung der Temperatur mit vermehrter Kohlensäureausscheidung (Zuntz und Röhrig) resultirt. Bei anhaltendem Gebrauche von Salzbadern



(künstlichen oder natürlichen) bilden sich Hautausschläge, vielleicht in Folge von Retention von Salzpartikelchen im Unterhautzellgewebe, aus, besonders bei zu starker Concentration und am raschesten bei sehr empfindlicher Haut. Der Umsatz der stickstoffhaltigen Bestandtheile scheint durch Kochsalzbäder weniger gefördert zu werden, als der der stickstofffreien, da die Harnstoffausscheidung nicht erheblich vermehrt wird.

Das Kochsalz wird sowohl vom Magen als von den Luftwegen aus rasch resorbirt und ist bereits nach wenigen Minuten im Speichel und Urin nachweisbar. Das nach Einführung grösserer Kochsalzmengen resorbirte Kochsalz wird nicht vollständig wieder ausgeführt, vielmehr bleibt nach Aufhören der Zufuhr und bei Anwendung nicht gesalzener Diät stets eine gewisse Menge Kochsalz im Blute zurück, die nach Lehmann und Marcel 4—5‰ beträgt, während der Ueberschuss durch Schweissdrüsen, Nieren, Thränen, Schleim u. s. w. aus dem Körper fortgeschafft wird. Nach Falck findet sich nach Einführung nicht letaler Dosen in die Venen nach 10 Std. nicht allein die ganze zugeführte Menge in dem alkalisch reagirenden Harn wieder, sondern noch 8—10% mehr.

Die therapeutische Anwendung des Kochsalzes als Medicament ist eine viel beschränktere, als die Billigkeit und die entschiedene Wirksamkeit des Mittels verdiente. Fast die häufigste Verwendung findet es als Volksmittel bei Haemoptysis, Lungenblutungen und Nasenbluten, wo es theelöffelweise in Substanz oder mit wenig Wasser in der That oft, jedoch nicht constant, stillend wirkt. Meist bezieht man die Effecte auf die nausöse Beiwirkung des Kochsalzes, welche allerdings bei der gewöhnlichen Art der Anwendung (1—2 Theelöffel voll Kochsalz pure oder mit wenig Wasser genommen) meist ziemlich deutlich hervortritt. Möglicherweise handelt es sich dabei um reflectorische Verengung der Gefässe in Folge des auf die Magennerven gesetzten Reizes. Als Emeticum bei Vergiftungen lässt es sich im Nothfalle gebrauchen, doch hat man sich vor allzu starken Dosen zu hüten, weil dieselben leicht zu Gastritis führen können. Als Antidot bei Vergiftung mit Silbersalpeter, wo es zur Bildung von schwerlöslichem Chlorsilber führt, ist es mit Eiweiss, Milch u. s. w. in gleichem Maasse brauchbar. Von Piorry, Gintrac u. A. ist Kochsalz (zu 15,0 pro dosi) auch bei Intermittens, wogegen man in Russland 15,0—30,0 in 24,0 warmen Wassers trinken lässt, empfohlen. Ferner ist es Volksmittel gegen Eingeweidewürmer, deren Production angeblich durch kochsalzarme Nahrung stark gefördert wird. Dass die Anwendung von Heringen und Sardellen als Vorbereitung für Bandwurmcuren auf deren Kochsalzgehalte beruht, ist klar. Auch zur Tödtung verschluckter Blutegel hat es Empfehlung gefunden.

Als Purgans ist Chlornatrium nicht zu verwenden. Besondere Anwendung fand es in der Cholera, indem man Kochsalzlösung in die Venen einspritzte, um die Transsudation in den Darm zu hemmen und um erregend auf die Circulation zu wirken; doch hat sich das Verfahren in keiner Weise bewährt, wenn auch in einzelnen Fällen von Asphyxie vorübergehend Besserung eintrat.

Aus den oben über die physiologische Action mässig verstärkter Kochsalzzufuhr gemachten Bemerkungen geht hervor, dass es vorwaltend indicirt sein muss, um durch Vermehrung des Magensaftes die Verdauung zu heben und um die Verbrennung im Blute zu fördern. Hieraus ergeben sich einerseits Indigestion und chronischer Magenkatarrh, andererseits alle Krankheiten, bei denen Steigerung der Oxydationsvorgänge im Blute nützlich sein kann, als Angriffspunkt für die Kochsalztherapie. Dass der Genuss von kochsalzhaltigen Nahrungsmitteln bei Magenkatarrh Günstiges wirken kann, lehrt der Gebrauch der marinirten Heringe bei derartigen Zuständen. Auch Durchfälle im frühesten Lebensalter, welche mit Dyspepsie im Zusammenhange stehen, weichen oft dem Zusatze von Kochsalz zur Milch (Rabuteau). Martin Solon, Cantani, Bouchardat u. A. befürworten die Anwendung des Seesalzes bei Diabetes, durch welche sie stets Abnahme, bisweilen Schwinden des Zuckers im Urin gesehen haben wollen. Das Salz hat wiederholt bei Phthisis Lobpreisung gefunden, sei es als Seewasser mit Brunnenwasser verdünnt (Lobethalsche Schwindtsuchtsessenz) oder in Form der Milch mit frischen Kräutern und Salz gefütterter Ziegen (Amédée Latour) oder als Syrupus Natrii chlorati (Natr. chlor. 125 Th., Aq. dest. 200 Th., Sacch. 400 Th., Aq. Laurocerasi 30 Th.) nach Pietra Santa,

oder endlich als Zusatz zur Nahrung; doch sah Cotton im Brompton Hospital keine durchgreifenden Erfolge. Berechtigt ist offenbar die Anwendung zur Fortschaffung von Ablagerungen krankhafter Art, z. B. bei Fettsucht, ferner bei Scrophulose und den mit dieser verbundenen chronischen Entzündungen, vielleicht auch bei Rheumatismus.

Bei letztgenannten Affectionen gebraucht man Kochsalz meist zu Bädern (3—10 Pfd. Salz auf das Bad) und in der That macht die Steigerung des Stoffumsatzes unter dem Gebrauche derselben die Salzäder nicht nur zu einem Hauptunterstützungsmittel der innerlichen Einführung von Kochsalz, sondern auch zu einem für sich genügenden Mittel zur Fortschaffung abgelagerter Exsudate, und daher besonders indicirt bei Scrophulose und den mit dieser verbundenen chronischen exsudativen Entzündungen, mögen dieselben auf der Haut und den Schleimhäuten, am Periost oder in den Synovialhäuten oder in den Lymphdrüsen ihren Sitz haben, ferner bei Exsudaten im Gewebe des Uterus und seiner Adnexa, sowie bei Oophoritis chronica, endlich bei rheumatischen und gichtischen Exsudaten. Vielleicht hierin, vielleicht aber auch in dem directen Reize begründet sind auch die günstigen Effecte bei manchen Hautaffectionen, z. B. inveterirtem Eczema rubrum mit starker Hautinfiltration. In der Regel wendet man hier jedoch nicht bloss Küchensalz, sondern Mutterlaugen verschiedener natürlicher Salzsoolen oder die letzteren selbst an.

Weitere äusserliche Anwendung findet Kochsalz zur Hervorrufung eines gelinden Reizes der Haut zum Zwecke der Ableitung, z. B. zu trockenen Umschlägen (abgeknistert und noch heiss in Flanell) bei Croup, Rheumatismus, Oedem, zu reizenden Fussbädern ( $\frac{1}{2}$ —1 Pfd. auf das Fussbad) bei Kopfcongestion, Menostase, ferner zu Waschungen bei Erfrierungen und Rheumatismen, wobei sich Lösung in Franzbranntwein die Gunst des Publikums erworben hat. Besonderen Werth legte man früher dem Auswaschen vergifteter Wunden mit Kochsalzwasser bei, indess ist die Wirkung bei Schlangenbiss und Biss toller Hunde gewiss von sehr untergeordneter Wichtigkeit; jedenfalls würde, um ätzend zu wirken, die Application von Kochsalz in Substanz vorzuziehen sein. Sehr gebräuchlich ist Einspritzung von Kochsalzlösungen (1 Theelöffel bis 2 Esslöffel auf das Klystier) in das Rectum, um Defaecation zu bedingen oder als Belebungsmittel bei Erstickten oder Berauschten zu wirken. Der Anwendung von Kochsalzlösungen nach dem Touchiren der Conjunctiva mit Höllenstein ist bereits gedacht. Die Benutzung zu Collyrien (1:10—25) bei Conjunctivitis und Hornhautgeschwüren, sowie zur Injection in die Blase bei Cystitis chronica ist ohne besondere Bedeutung. Dagegen ist es in verstäubter Lösung (1:50—500) bei chronischen Bronchialkatarrhen oft von ausserordentlicher Wirkung (Waldenburg). Mit 2 Th. Eis bildet Kochsalz eine vorzügliche, von Baudens bei eingeklemmten Brüchen empfohlene Kältemischung.

**Anhang.** Während Kochsalz, wie bemerkt, verhältnissmässig selten als solches medicamentöse Verwendung findet, ist es um so mehr in Form natürlich vorkommender Kochsalzwasser geschätzt, welche entweder ausschliesslich oder vorwiegend zum Trinken (Kochsalztrinkquellen) oder zum Baden (Salzbäder oder Soolbäder), meistens gleichzeitig äusserlich und innerlich verwendet werden. Im Allgemeinen enthalten die Kochsalzquellen neben dem Chlornatrium noch andere Chloride (Calcium- und Magnesiumchlorid), ferner Sulfate und Carbonate der Alkali- und Erdmetalle, viele auch Ferrocarbonat. Diese Verbindungen üben indessen auf den therapeutischen Effect nur wenig Einfluss; vielleicht bedingen die Sulfate und auch das Chlormagnesium — welches sogar für sich neuerdings als salinisches Abführmittel in Vorschlag gebracht ist (Rabuteau) —, dass derartige Wasser in grösseren Mengen constanter purgiren als einfache Kochsalzlösungen. In einzelnen hierher gehörigen Wässern finden sich auch Iod und Brom, deren Bedeutung für die Heilwirkung höchstens bei den Trinkquellen sich geltend machen könnte. Endlich ist in manchen Kohlensäure enthalten, welche für die Trinkuren insofern von Bedeutung ist, als der Geschmack solcher Wasser in hohem Grade angenehmer ist als der nicht kohlen säurehaltiger. Salzquellen, welche 2% und darüber an Kochsalz enthalten, pflegt man in der Regel als Soolen zu bezeichnen, doch nimmt man es mit dieser Benennung nicht so genau.

**A. Kochsalztrinkquellen.** Die physiologische Wirkung dieser Quellen, welche meist kalt oder lau sind und nur wenige Thermen einschliessen, ist im Wesentlichen die des Kochsalzes, welche bei den kohlen säurehaltigen durch die Kohlensäure vermöge ihrer Einwirkung auf die Secretionen und auf das Nervensystem theilweise gesteigert, theilweise auch modificirt werden. Die Kochsalztrinkquellen werden als besonders indicirt bei Functionsstörungen im Bereiche der Abdominalorgane und damit im Zusammenhange stehenden Veränderungen der Circulation, Innervation und Ernährung betrachtet und kommen namentlich bei denjenigen Zuständen in Gebrauch, die man als Abdominalplethora und Hämorrhoidalleiden zu bezeichnen, und welchen man eine bleibende Ausdehnung des Capillargefässnetzes und der Venen in den oberen oder unteren Partien des Unterleibes, meist hervorgegangen aus dem Drucke angehäufter Darmcontenta, ungenügender Defäcation und gestörtem Gleichgewicht zwischen Nahrungsaufnahme und Ausscheidung, als anatomisches Substrat zuzuweisen pflegt. Die stets mit den Symptomen eines chronischen Magen- und Darmkatarrhs bei Trägheit der Peristaltik verbundene sog. Plethora abdominalis, deren Krankheitsbild durch Organleiden, z. B. Intumescenz der Leber und durch allerlei Störungen der Circulation (Herzklopfen, Congestionen) und des Nervensystems (Hyperaesthesien, psychische Verstimmung, Hypochondrie) sich complicirt, soll besonders in solchen Fällen den Gebrauch der Kochsalztrinkquellen erheischen, wo die allgemeine Ernährung gelitten hat und Neigung zu Schwächeständen besteht, welche eine reconstituirende Cur erfordert, während man sie bei sehr robusten Personen nur zur Vorbereitung von Curen mit Bitterwässern empfiehlt. Ferner passen Kochsalztrinkcuren bei chronischen Magen- und Darmkatarrhen. Einzelne haben auch bei chronischen Katarrhen der Respirationsorgane und selbst bei Tuberculose, andere als Unterstützungsmittel der Soolbäder bei Scrophulose und Exsudationsprocessen einen nicht unbegründeten Ruf.

Die hauptsächlichsten Kochsalztrinkquellen finden sich in Kissingen in Unterfranken (Rakoczy, Pandur und Maxbrunnen, die ersteren beiden eisenhaltig, sämmtlich reich an Kohlensäure, neben zwei zu Bädern benutzten erbohrten Quellen, von denen der Schönbrunnsprudel durch Reichthum an Kohlensäure sich Rehme und Nauheim nähert), Homburg vor der Höhe (mit fünf ebenfalls eisenhaltigen Quellen, worunter der dem Rakoczy ähnliche, aber viel salzreichere und stärker purgirende Elisabethbrunnen die bedeutendste ist), und Soden am Taunus (mit 24 Quellen, vorzüglich bei chronischen Respirationskatarrhen und selbst bei tuberculösen Affectionen, wobei das ausgezeichnet milde Klima in Anschlag zu bringen ist, bei diversen Affectionen mit krankhaft gesteigerter Erregbarkeit des Gefäss- und Nervensystems und bei chronischen Vaginal- und Cervicalkatarrhen und Uterusinfarcten mit Erfolg benutzt). Ferner gehören dahin Cronthal am Taunus, Wiesbaden (Kochbrunnen, warm), Nauheim (Curbrunnen und Salzbrunnen, neben den zu Bädern benutzten Quellen), Rehme (Bülowbrunnen), Mondorff im Luxemburgischen, Niederbronn im Elsass und diverse andere unter den Soolbädern zu erwähnende Orte, wo ebenfalls Trinkcuren instituiert werden.

Die Art der Anwendung dieser Quellen richtet sich nach den einzelnen Fällen; je nachdem man mehr auf Rückbildung oder Anbildung neuen Materials zu wirken nöthig hat, verwendet man grössere oder geringere Mengen.

**B. Kochsalzbäder.** Die Wirkung der kochsalzhaltigen Bäder ist natürlich nicht durch Resorption von Kochsalz, sondern durch die erregende Wirkung desselben auf die Hautnerven zu erklären. Die Soolbäder sind zuerst durch Tolberg in Elmen (um 1800) als Curmittel bei Scrophulose, Hautausschlägen, Gicht, Rheumatismus u. s. w. erkannt, später besonders durch Reil in Halle zu Ansehen gelangt und nehmen jetzt der Zahl nach die erste Stelle unter den Badeorten ein. Ausser Kochsalz enthalten sie sämmtlich grössere oder geringere Mengen von Calcium- oder Magnesiumchlorid; in einzelnen findet sich Iod (als Iodmagnesium, Iodcalcium und Iodnatrium) und Brom (als Brommagnesium und Bromnatrium) oder Lithium oder freie Kohlensäure, deren besondere Wirkung zum Theil streitig ist. Soweit es sich um ausschliessliche Benutzung zu Bädern handelt, scheinen die mineralischen Stoffe ohne Bedeutung, während die Kohlensäure theils durch ihre reizende Wirkung auf die Hautnerven die Effecte des Kochsalzes unterstützt, theils auch sedativ zu wirken scheint.



Die kochsalzhaltigen Badequellen theilen wir mit Niebergall in einfache kalte, in Kochsalzthermen, in iod- und bromhaltige kochsalzhaltige Badequellen und in Thermalsoolen mit reichlicher Kohlensäure.

1) Die **einfach kalten Soolen**, welche, um zu Soolbädern Verwendung zu finden, mindestens 2% Kochsalz enthalten müssen, zerfallen in schwache (mit 2–3% Kochsalz) und starke (über 3%), welche Einteilung jedoch für die Badepraxis ziemlich gleichgültig ist, da man schwache Soolen (Kissingen, Kreuznach, Dürkheim u. a.) durch Zusatz von Salz oder gradirter Soole oder Mutterlauge verstärkt, während andererseits sehr starke Soolen (Ischl, Reichenhall) mit Wasser zu Bädern verdünnt werden. Alle diese Bäder finden besonders zur Beseitigung von Exsudaten und namentlich bei Scrophulose Anwendung. Zu den hauptsächlichsten kalten Soolquellen gehören Rheinfelden (im Aargau, die stärkste aller Soolquellen), Ischl (im Salzkammergut, ausgezeichnet durch die reizende Gegend und erdige salinische Quellen), Salzungen (in Sachsen-Meiningen), Frankenhäuser (am Kyffhäuser), Arnstadt (in Thüringen), Reichenhall mit der Badeanstalt Axelmannstein (im bayrischen Hochgebirge), Kreuth (im bayrischen Hochgebirge), Bex (Waad), Julishall bei Harzburg (vielbesuchte Sommerfrische), Nenndorf (bei Hannover, neben Schwefelquellen), Rothenfelde (bei Osnabrück), Elmen (bei Schönebeck), Colberg (am Ostseestrande, mit Seebädern), Kösen im Saalthal, Pymont (neben Stahlquellen), Wittekind (bei Halle), Hubertusbad (am Fusse der Rosstrappe), Aussee und Gmunden (in Steiermark), sowie Salzhausen (bei Giessen).

Kochsalzquellen von einem unter 1% betragenden Gehalte an Chlornatrium werden an manchen Brunnenörtern ebenfalls zu Bädern benutzt, z. B. in Homburg, Schmalkalden, Neuhaus (Unterfranken), Niederbronn (Elsass), Soden bei Aschaffenburg und Cannstadt (am Neckar).

2) Die **Kochsalzthermen**, zu denen Cannstadt (mit einer Temperatur von 20° C.) den Uebergang macht, zeichnen sich durch relativ geringen Gehalt an Chlornatrium aus, der in Wiesbaden (Kochbrunnen) 0,68%, in Baden-Baden 0,287% und in Bourbonne-les-Bains (im Depart. der Obermarne) 0,6% beträgt. Die Temperatur schwankt zwischen 50 und 68°. Von diesen besitzt Wiesbaden allein 23 verschiedene Quellen, von denen der Kochbrunnen auch getrunken wird. Die Kochsalzthermen schliessen sich in ihrer Wirkung den indifferenten Thermen an und dienen vorzugsweise bei Rheumatismus, Gicht und Lähmungen.

3) Zu den **iod- und bromhaltigen Kochsalzquellen** gehören von deutschen Badeörtern Dürkheim (in der Pfalz, mit Traubencur), Krankenheil bei Tölz (im bayrischen Hochgebirge) und besonders Kreuznach und das demselben benachbarte Münster am Stein, deren vorzügliche Wirkung bei Scrophulose, Lupus und Sexualkrankheiten des weiblichen Geschlechts bekannt ist.

4) Als **Thermalsoolbäder mit reichlicher freier Kohlensäure**, welche übrigens die in den Stahlquellen vorhandene lange nicht erreicht, sind Rehme (Oeynhausien), Nauheim (Hessen) und Soden am Taunus zu bezeichnen. Der Kochsalzgehalt ist am kleinsten in Soden (1,45%), am grössten in Rehme (3,12), zwischen beiden steht Nauheim in der Mitte (2,7%). Der Kohlensäuregehalt schwankt zwischen 606,5 Cc. (Rehme) und 756 Cc. (Soden) in 1000 Theilen; die Temperatur zwischen 30,5° (Soden) und 35,3° C. (Friedrich-Wilhelmssprudel in Nauheim). Diese Bäder passen besonders, wo Scrophulose mit Nervenaffectionen und Modification des Kräftezustandes verbunden ist, bei chronischen Affectionen der weiblichen Sexualorgane, mit denen sich Nervenleiden combiniren, auch in der Reconvalescenz von Krankheiten und bei Rheumatismus.

C. **Seebäder**. Eng an die Soolbäder schliessen sich ihrer chemischen Beschaffenheit nach die Seebäder an, deren therapeutische Effecte im Wesentlichen auf Beschleunigung des Umsatzes (Vermehrung der Harnstoffausscheidung und Verminderung der Ausscheidung von Harnsäure und Phosphaten nach Beneke), in den meisten Fällen mit Gewichtszunahme, beruhen, jedoch durch die niedere Temperatur und die Bewegungen des Wassers, den sog. Wellenschlag, ausserdem aber durch den Aufenthalt am Seestrande, wodurch die Seebäder sich den klimatischen Curorten anreihen, wesentlich mitbedingt werden. Die chemischen

Bestandtheile des Seewassers, worunter Natriumchlorid, Magnesiumchlorid, Calciumsulfat und Calciumcarbonat die bedeutendsten sind, variiren in den zu Seebädern benutzten Meeren der Menge nach nicht unbeträchtlich. Den verhältnissmässig geringsten Gehalt an festen Bestandtheilen besitzt die Ostsee, welche Schwankungen von 0,6—2 % darbietet, je nachdem die untersuchten Stellen der Nordsee näher oder ferner liegen (Reval 0,62, Crantz 0,7, Travemünde 1,67 und Apenrade 2,16 %). Die Nordsee bietet 3—3,9 % Salzgehalt und Schwankungen in diesen Breiten selbst an denselben Localitäten zu verschiedenen Zeiten; ähnlich verhält sich der Atlantische Ocean (Brighton 3,53—3,87, Havre 3,82, Arcachon 3,87 %), während im Mittelmeer der Salzgehalt am bedeutendsten (zwischen 3,7—4,8) schwankt (Nizza 4,5 %). Ausser den erwähnten Salzen findet sich Iod und Brom in relativ geringen Mengen (Brom zu 0,018—0,031 %). Die Temperatur der Seebäder schwankt zwischen 16 und 22° C. Sie ist am höchsten im Mittelmeere (22,5—27° C.), am niedrigsten in der Ostsee (16 bis 17° C.); zwischen beiden stehen der Atlantische Ocean (20—23°) und die Nordsee (15,1—18,6° nach Mess). Das Meer besitzt die Eigenthümlichkeit, im Herbst höhere Temperaturen darzubieten als im Sommer, weshalb gerade der September zu Seebadecuren verwerthet wird, obschon der viel geringere Wellenschlag in diesem Monate (Mess) früheres Baden räthlich erscheinen lässt. In den kälteren Meeren beträgt der Unterschied zwischen Luft und Wassertemperatur oft gegen 7° C. zu Gunsten der letzteren; das Wasser ist am Morgen fast immer mehrere Grade kühler als am Mittag (Mess). Der Wellenschlag setzt den Körper des Badenden einer doppelten Einwirkung aus, nämlich einer Peitschung und Reibung der oberen Körperhälfte durch das Wasser der kommenden und einer Reibung der unteren Körperhälfte in entgegengesetzter Richtung durch die sich zurückziehende Welle. Der Wellenschlag ist in der Ostsee und im Mittelmeer weit schwächer als in der Nordsee. Die Seeluft enthält nach neueren Untersuchungen eine grössere Menge von Ozon (nach Verhaege im Verhältniss von 6,2:4,5), verstäubtes Wasser und Salztheilchen, dagegen weniger Kohlensäure und Verunreinigungen durch Staub und fremde Gase. Anwesenheit von Iod in der Seeluft ist mit Sicherheit nicht constatirt. Von wesentlichem Einflusse auf die Effecte der Seebadecur sind die intensiven Luftströmungen am Strande, indem sie durch gesteigerte Wärmeentziehung ohne anstrengende Selbstthätigkeit des Organismus den Stoffwechsel beschleunigen (Beneke). Auch diese Luftströmungen sind an der Ostsee und am Mittelmeersrande viel weniger bedeutend als an der Nordsee.

Die Seebäder finden ihre hauptsächlichsten Indicationen in folgenden Momenten. Zunächst dienen sie zur Abhärtung der Haut bei Neigung zu Schweissen, Erkältungen und Rheumatismus, wo sie besonders auch zu Nachcuren passen, welche man 14 Tage nach dem Gebrauche warmer Bäder durch das Nehmenlassen von 12—18 Seebädern instituit. Noch häufiger und fast mit noch eclatanterem Nutzen verwendet man sie bei allen chronischen Nervenkrankheiten, indem sie vermöge der starken Reizung der peripherischen Hautnerven nicht allein functionelle Veränderungen, sondern auch durch ihren Einfluss auf den Stoffwechsel materielle Veränderungen in der Nervensubstanz zu bewirken vermögen. Endlich kommen sie wegen ihres Einflusses auf den Stoffwechsel bei Scrophulose und Blutkrankheiten, sowie bei allen möglichen Schwachzuständen (wie die Soolbäder) in Anwendung.

Besondere Vorsicht ist bei Seebädern überall nöthig, namentlich in Hinsicht auf die Dauer des Bades, welche bei Kranken nicht über 4—5 Minuten auszudehnen ist. Das Tragen einer Wachstafetkappe ist für Frauen dringend anzurathen, da das Seewasser lange an den Haaren klebt. Bei Kindern sollte in der Regel das Seebad nur als Luftcur benutzt und die etwaige nothwendige Abhärtung durch kalte Waschungen angestrebt werden. Auch bei Leuten über 60 Jahren passt nur die Luftcur, nicht das Baden, welches zu Congestionen zu Lungen und Gehirn und selbst zu Apoplexie führen kann. Jeder irgendwie höhere Grad von Anämie contraindicirt Seebäder und selbst Strandcuren; ebenso auf Structurveränderungen oder auf abdominalen Stasen beruhende Digestionsstörungen, sowie chronisch-pneumonische Infiltrate oder Neigung zu Hämoptoë, ferner Tendenz zu Kopfcongestionen, Herzklappenfehler und frische Rheumatismen, wo der exsudative Process noch nicht abgelaufen ist. Im Allgemeinen

sind für schonungsbedürftige Kranke die Ostseebäder vorzuziehen, während bei verhältnissmässig gutem Kräftezustande den Nordseebädern der erste Rang gebührt.

Als die hauptsächlichsten Seebäder nennen wir:

a. Ostseebäder: Crantz in Ostpreussen, Zoppot und Westplatte in der Nähe von Danzig, Rügenwalde, Colberg (auch Soolbad), Diewenow, Misdroy und Swinemünde auf der Insel Wollin, Häringsdorf auf der Insel Usedom, Putbus auf Rügen, sämmtlich an der pommerischen Küste, Warnemünde und Doberan (heiliger Damm) in Mecklenburg, letzteres das eleganteste Ostseebad, Travemünde im Lübeckschen, Düsternbrook bei Kiel und Borbye bei Eckernförde, endlich Marienlyst auf Seeland.

b. Nordseebäder: Westerland auf Sylt, Wyck auf Föhr, beide zu Schleswig gehörend, Cuxhaven an der Mündung der Elbe, Helgoland, Dangast, Wangeroog und Spiekeroog an der oldenburgischen Küste, Norderney an der ostfriesischen Küste, das bedeutendste Seebad der deutschen Küsten, Insel Borkum (ebendasselbst), Scheveningen (Holland), Blankenberghe und Ostende (Belgien).

c. Von englischen Bädern heben wir Margate, Ramsgate, Hastings in Sussex, St. Leonards, Eastbourne, Brighton (das fashionable Seebad Englands), Torquay und die Insel Wight hervor, welche zum Theil wegen ihres milden Klimas auch Winterstation für Brustkranke sind; von französischen die am Canal belegenden und den Nordseebädern am nächsten kommenden Calais und Boulogne, die Seebäder der Normandie Dieppe, Fécamp, Havre und Trouville, sowie die besonders zu Curen im späten Herbst brauchbaren südlicheren Bäder Biarritz und Arcachon. Die Mittelmeerbäder haben für uns kein Interesse.

Die in der neueren Zeit mehrfach in Gebrauch gezogenen Bäder von erwärmtem Seewasser (warme Seebäder) sind in ihren Effecten den schwächeren Salzquellen (Ostsee) oder den mittelstarken Soolbädern (Nordsee) völlig gleich. Auch die Effecte innerlich genommenen Seewassers, das in grösseren Mengen purgirend wirkt, schliessen sich denen der zu Trinkcuren benutzten Salzquellen an, doch ist Seewasser als Curmittel dieser Art nicht eben einladend.

**Natrium carbonicum crudum**, Natrum carbonicum crudum s. crystallisatum crudum, Sal Sodae crudus, Soda cruda; **Soda**, rohes krystallisirtes kohlen-saures Natron. **Natrium carbonicum**, Natron carbonicum purum s. depuratum, Sal Sodae depuratus, Alkali minerale depuratum; **Natriumcarbonat**, reines krystallisirtes kohlen-saures Natron, reine Soda. **Natrium carbonicum siccum**, Natrum carbonicum siccum s. depuratum siccum, Natrum carbonicum dilapsum, Carbonas Sodae exsiccata, Soda dilapsa; **entwässertes Natriumcarbonat**, getrocknete Soda, getrocknetes kohlen-saures Natron. **Natrium bicarbonicum**, Natrum carbonicum acidulum, Natrium hydrocarbonicum, Bicarbas natrius cum aqua; **Natriumbicarbonat**, doppeltkohlen-saures Natron, zweifach kohlen-saures Natron, saures kohlen-saures Natron.

An das Chlornatrium schliessen sich zunächst die Alkalicarbonate an, von denen die dem Natriummetalle angehörigen in vierfacher Gestalt Aufnahme in die Pharmakopoe gefunden haben.

Die sog. Soda, welche sich in einigen Seen Aegyptens und Ungarns findet und daselbst in Form von Salzkrusten, die durch Verdunsten in heisser Jahreszeit entstehen und gleichzeitig Chlornatrium und Natriumsulfat enthalten, natürlich (das Nitrum der Alten) vorkommt (daher die Bezeichnung Sal Alkali minerale) oder (in Ungarn) durch Auslaugen natronhaltigen Erdreiches (sog.



Szeg Soda) gewonnen wird, wurde früher meist aus der Asche von Strandpflanzen, wie *Salsola* und *Salicornia* (sog. Barilla-Soda), oder Seetangen (sog. Kelp-Soda) dargestellt, wird aber jetzt fast ausschliesslich nach dem Verfahren von Leblanc durch Glühen von Natriumsulfat, das man durch Zersetzen von Kochsalz mit Schwefelsäure erhält, mit Calciumcarbonat und Kohle fabrikmässig gewonnen. Die Soda des Handels bildet grosse farblose Krystalle oder Krystallbruchstücke, welche für medicinische Anwendung nur zulässig sind, wenn sie mindestens 3% wasserfreies Natriumcarbonat und keine metallischen Verunreinigungen einschliessen. Von den beigemengten fremden Salzen (hauptsächlich Glaubersalz und Kochsalz) durch Umkrystallisiren befreit, giebt sie das Natrium carbonicum (Dinatriumcarbonat), welches farblose, durchscheinende, an der Luft verwitternde Krystalle von alkalischem Geschmacke bildet, welche mit 2 Th. kaltem und  $\frac{1}{4}$  Th. heissem Wasser eine durch Alkalinität ausgezeichnete Lösung liefern. Sie entspricht der Formel  $\text{CO}^3\text{Na}^2 + 10 \text{OH}^2$  und einem Gehalte von 37% wasserfreiem Natriumcarbonat. Wird das Salz in Form groben Pulvers bei 25° der Verwitterung überlassen und dann bei 40–50° so lange getrocknet, bis es die Hälfte seines Gewichtes verloren hat, so stellt das resultirende trockne, weisse Pulver das Natrium carbonicum siccum der Phk. dar, welches ziemlich genau der Formel  $\text{CO}^3\text{Na}^2 + 2 \text{OH}^2$  entspricht und 74% wasserfreies Natriumcarbonat enthält, wie solches beim Erwärmen auf 90–100° erhalten wird.

Das Natriumbicarbonat (Mononatriumcarbonat),  $2 \text{CO}^3\text{NaH}$ , welches durch Leiten eines Kohlensäurestromes über eine Mischung von 1 Th. krystallisirtem und 2 Th. wasserfreiem Natriumcarbonat erhalten wird, bildet weisse, krystallinische Krusten oder kleine, farblose, viereckige Tafeln, welche in trockner Luft sich nicht verändern und von mild salzigem, kaum alkalischem Geschmacke sind. Es löst sich in 13,8 Th. kaltem Wasser, nicht in Spiritus. Wässrige Lösungen geben beim Erwärmen Kohlensäure ab, wobei das auch natürlich als sog. Trona in Aegypten vorkommende Natriumsesquicarbonat entsteht.

Das Natriumcarbonat gehört zu den Constituentien des Organismus und insbesondere des Blutes, in dem es sich im Serum vorzugsweise findet, während in den Blutkörperchen das Kali vorwaltet. Es existirt im Blute vorzugsweise als Bicarbonat, welches die Alkalinität des Blutes bedingt. Die Wichtigkeit der Alkalicarbonate für die Erhaltung des Organismus als Träger der Kohlensäure einerseits und als Hauptbedingung für den flüssigen Zustand des Eiweisses und Faserstoffes im Blute ist zwar nicht zu verkennen, doch ist über die physiologischen Effecte und die Wirkung in gewissen Krankheiten keineswegs völlige Klärung erfolgt, welche sogar die Stellung der betreffenden Stoffe zu den Plasticis nicht als ganz unbedenklich erscheinen lässt. Im Allgemeinen repräsentiren die Natriumcarbonate die Wirkung der Natriumsalze, besonders auch, insofern es sich um die relative Indifferenz grosser Dosen derselben gegenüber den Kaliumsalzen handelt. Wie andere Natriumsalze conserviren sie in schwachen Lösungen die Erregbarkeit von Nerven und Muskeln, welche Kaliumsalzlösungen in gleicher Concentration vernichten, und sind in schwachen Solutionen sogar im Stande, die in concentrirten Lösungen verloren gegangene Erregbarkeit willkürlicher quergestreifter Muskeln und des Froschherzens wieder herzustellen (Stiénon). Mit den Kaliumcarbonaten theilen die Natriumcarbonate das auch den Aetzalkalien zukommende Vermögen, das in Wasser sonst nur aufquellende Mucin in Lösung zu bringen.

Bei Einführung kleinerer Mengen von Natriumcarbonat und Natriumbicarbonat in den Magen werden dieselben unter dem Einflusse der Chlorwasserstoffsäure in Chlornatrium umgewandelt, wobei namentlich aus dem Bicarbonat Kohlensäuregas frei wird, und gehen als solches in das Blut über. Von anderen Schleimhäuten und nach interner Ingestion solcher Mengen, zu deren Sättigung die Säure des Magensaftes nicht mehr ausreicht, sowohl vom Magen als vom Darne aus gehen sie zum grössten Theile als

Bicarbonat in das Blut und von da ab in den Urin über, dem sie neutrale oder selbst alkalische Reaction verleihen können.

Dauernde schwache Alkalescenz des Urins kann schon bei Einführung von 2mal täglich 3,0, während der Mahlzeit genommen, eintreten, während bei einer Tagesgabe von 5,0 der Harn nur temporär 2—3 Stunden nach dem Einnehmen alkalisch wird (Rabuteau). Bei leerem Magen macht bereits 1,0 den Urin alkalisch. Bei Einführung in Lösung tritt die Alkalescenz des Urins rascher auf, auch scheint erhöhte Temperatur des Vehikels den Uebergang zu beschleunigen. Bei älteren und geschwächten Personen scheint das Phänomen länger anzuhalten (Grossmann).

Auf die äussere Haut in concentrirter Solution angewendet, verseift Natriumcarbonat die Fette des Hautsecrets und kann bei längerer Dauer der Application auch in gelindem Grade kaustisch wirken. In diluirten Lösungen ist es ohne erhebliche Wirkung. Alkalibäder scheinen etwas erregend auf die peripherischen Nerven zu wirken, jedoch schwächer als Kochsalz; nach dem Bade reagirt der Urin regelmässig alkalisch (Grossmann).

Den Natriumcarbonaten kommt bei interner Einführung wie dem Kochsalz doppelte Wirkung auf die Ernährung zu, einmal durch locale Action im Magen als digestionsbeförderndes Mittel, andererseits durch Beeinflussung der Verbrennung im Blute.

Indem sich im Magen stets vermöge Einwirkung der Chlorwasserstoffsäure Kochsalz bildet, wirkt dieses durch Vermehrung des Magensaftes und directe lösende Wirkung auf die Albuminate (vgl. p. 674) peptisch. Bei gewissen krankhaften Verhältnissen (Magenkatarrh), wo vermöge vermehrter Absonderung der Schleimdrüsen eine mechanische Hemmung der Labdrüsensecretion besteht, kann Natriumcarbonat auch direct durch Lösung des Schleims wirken und dadurch die normale Secretion wieder herstellen. Endlich ist bei perversen Gährungsprocessen auch die Neutralisation der dabei gebildeten, vorzugsweise fetten Säuren von Gewicht, besonders für die Umwandlung der Amylaceen durch den verschluckten Speichel, dessen Einwirkung schwache alkalische Beschaffenheit voraussetzt. Ein Theil des Alkalicarbonats kann auch ungesättigt in die oberen Partien des Darmes gelangen und hier die Wirkung der Pankreasfermente unterstützen. — Dass das nach Ingestion von Natriumcarbonat resultirende Kochsalz nach seiner Resorption die Umsetzung befördert, ist nach den S. 673 gemachten Angaben zweifellos. Dasselbe gilt aber auch in gewissem Grade für die Natriumcarbonate, von denen bereits 1825 Chevreul nachwies, dass sie den oxydirenden Einfluss des Sauerstoffs auf gewisse organische Verbindungen ausserhalb des Organismus in hohem Grade steigern. Es bestätigt sich dies durch die bekannte Verbrennung zu Kohlensäure, welche Essigsäure, Apfelsäure und diverse fette Säuren erleiden, wenn sie in Verbindung mit Alkalien ins Blut gelangen, während sie unverbunden nicht verbrannt werden.

Jedenfalls betrifft die durch die vermehrte Zufuhr von Alkalicarbonaten gesteigerte Oxydation in geringerem Grade die Eiweisskörper. Was die Ausscheidung des Harnstoffs anlangt, so fanden Rabuteau und Constant nach Versuchen mit 5,0 pro die eine Abnahme desselben, während bei kleinen Mengen eine Zunahme der Harnstoffausscheidung eintreten soll. Grossmann sah Harnstoffvermehrung (nach Emser Wasser) und vindicirt den Alkalicarbonaten eine durch Steigerung der Verbrennung im Blute bedingte Förderung des Umsatzes. Nach Münch tritt bei Einverleibung von 3,0—9,0 zuerst Verminderung der Ausgabe und Körpergewichtszunahme, später Vermehrung der Ausgabe und Gewichtsverlust ein; die Ausgabevermehrung, welche die Mehraufnahme übertrifft, bezieht sich jedoch nur auf Wasserausscheidung durch den Harn, während Harnstoff, Kochsalz, Phosphorsäure und Schwefelsäure nur höchst unbedeutende Veränderungen erleiden.

Dagegen stimmt die Mehrzahl der Beobachter darin überein, dass vermehrte Zufuhr von Natriumcarbonat die Harnsäure-Ausscheidung vermindert, was, insofern dieselbe als Product unzureichender Sauerstoffaufnahme anzusehen ist, auf eine unter diesen Verhältnissen gesteigerte Oxydation zurückzuführen

ist. Vermehrung der Kohlensäureausscheidung unter dem Einflusse der Alkalicarbonate bedarf noch des Nachweises; die Zunahme derselben nach Einspritzung von Natrium lacticum in die Venen (Scheremetjewski) macht dieselbe wahrscheinlich.

In grösseren Dosen oder auch in häufiger wiederholten kleinen Gaben wirken Natriumcarbonate schwach abführend. Chologoge Action besitzen die Natriumcarbonate nur in höchst geringem Maasse (Rutherford). Ueber die Veränderung der Diurese durch die Natriumcarbonate sind die Angaben widersprechend, was sich partiell wohl aus der Verschiedenheit der eingeführten Mengen erklärt.

Nasse fand bei Thierversuchen sogar Verminderung der Galle. In Bezug auf die Diurese wird den Natriumcarbonaten im Allgemeinen vermehrende Wirkung zugeschrieben, welche bei klinischen Versuchen leicht als existent bewiesen werden kann, für den Gesunden indess für Dosen von täglich 5,0 von Rabuteau und Constant in Abrede gestellt wird, während Münch (1863) unter gewöhnlichen Verhältnissen, wenn nicht profuse Perspiration oder Diarrhoe hinderlich sind, eine vermehrte Ausgabe von Wasser als die Hauptwirkung des zu 3,0—9,0 eingeführten Carbonats erkannte, welcher jedoch eine (geringere) Abnahme der Ausscheidung vorausgeht.

Ein Einfluss auf die Abscheidung der Schleimhäute, in specie der Respirationsschleimhaut, wonach Alkalien Verflüssigung des Secrets bedingen, wird nach Beobachtungen an Kranken den Alkalicarbonaten meist zugeschrieben. Nach Rossbachs neuesten Untersuchungen beschränken indessen Alkalien die Schleimsecretion durch directe Wirkung auf die Drüsen der Respirationsorgane.

Virchow constatirte, dass Alkalien die Bewegung der Flimmerepithelien beschleunigen und dieselbe sogar wieder anzuregen vermögen, wenn sie sistirt ist.

Auf Puls und Temperatur übt Natriumcarbonat in kleinen und mittleren Gaben keinen erheblichen Einfluss aus.

Nach Rabuteau kann die Temperatur nach einer Tagesgabe von 5,0 um 0,4° sinken, auch soll der Puls dabei an Frequenz abnehmen.

Die Einführung sehr grosser Mengen Natrium carbonicum in Substanz oder selbst in concentrirter Lösung in den Magen kann zu Verätzung und selbst zum Tode führen, wobei eigenthümliche gelatinöse Erweichung beobachtet ist. Schädliche Folgen scheint auch der längere interne Gebrauch von Natriumcarbonaten haben zu können, welche in Ernährungsstörungen bestehen und namentlich unter den Erscheinungen des Scorbutus sich darstellen.

Derartige chronische Vergiftungen können einen doppelten Grund haben, einmal Digestionsstörungen in Folge anhaltender Neutralisation des Magensaftes, dann aber auch Veränderung der Blutbeschaffenheit, resultirend aus der physiologisch constatirten Verminderung des Blutfaserstoffs. Dieser Zustand des Blutes, welchen Nasse bei Thieren constatirte, soll sich besonders leicht bei Nierenkranken einstellen, bei denen die Elimination der Alkalisalze gestört ist, in Folge wovon sich dieselben im Blute anhäufen. Directe Untersuchungen über die Veränderungen des Blutes unter dem Gebrauche grösserer Mengen von Alkalicarbonaten stellte Löffler an 5 Personen an, welche 10 Tage 4,0—20,0 nahmen, wobei sich kirschrothe Färbung des Blutes, Zunahme der weissen Blutkörperchen und des Wassers, Abnahme der fixen Bestandtheile und des Fettes, endlich verminderte Festigkeit des Blutkuchens ergab. Das Auftreten consecu-



tiver Schwächezustände nach protrahirtem Natriumcarbonatgebrauche kann nach neueren Untersuchungen nicht mehr in Zweifel gezogen werden. Bei Constant entwickelte sich schon nach Ingestion von 50,0 Bicarbonat in 10 Tagen allgemeine Blässe und Abnahme der Muskelkraft. Wiederholte Fälle von Scorbut in Folge längeren Gebrauches von Natriumcarbonat sollen nach Lomikowski im Moskauer Hospital vorgekommen sein, welche ihn zu Versuchen an Hunden veranlassten, die bei täglicher Zufuhr von 50–60 Gm. Anorexie, Erbrechen, Durchfall, theilweise auch Albuminurie bekamen und in 4–5 Wochen zu Grunde gingen, worauf die Section Schwellung der Darmschleimhaut und Vergrösserung der Darmfollikel, Vermehrung und Vergrösserung der Malpighischen Körperchen in der Milz, Körnchendegeneration der Leberzellen, starken Katarrh der Harncanälchen und constant Schwellung und Lockerung des Zahnfleisches ergab. Die Veränderung des Blutes durch längere Zufuhr von Natriumcarbonat stellt sich nach Dubelir (1881) als Vermehrung der Alkalinität, die mit der täglichen Menge des eingeführten Natrons und der Zeitdauer der Einführung wächst, heraus, ohne dass das Kali in der Blutmasse durch Natron substituiert und letzteres im Blute angehäuft wird; der Eisengehalt wird nicht vermindert und der Gehalt des Blutes an festen Bestandtheilen, sowie an Stickstoff, nicht in solchem Grade verändert, dass er die normalen Grenzen überschritte.

Die therapeutische Anwendung des Natriumcarbonats und Natriumbicarbonats ist eine sehr ausgedehnte und selbst in der Gegenwart, wo die alten Hypothesen von Neutralisation einer Acidität des Blutes durch Alkalien in verschiedenen Krankheiten im Grabe ruhen, gehören sie zu den wichtigsten Medicamenten. Ganz besonders günstige Effecte erreicht man mit denselben bei Diabetes mellitus, Rheumatismus acutus, Gicht, Dyspepsie und chronischen Katarrhen, zumal der Respirationsorgane, sowie in manchen Fällen von Cholelithiasis.

Die Behandlung des Diabetes mit Alkalien basirt vor Allem auf der Theorie von Mialhe, wonach diese Affection auf ungenügender Alkalinität des Blutes beruhe, in Folge wovon der Zucker im Blute nicht zur Verbrennung gelange, sondern durch die Nieren ausgeschieden werde. Durch die Zuführung von Alkali sollte die Verbrennung der Glykose in reichlicherem Maasse bewirkt werden. Diese Theorie hat sich zwar als falsch erwiesen und namentlich haben directe Versuche von Poggiale dargethan, dass bei Hunden, welche gleichzeitig Glykose oder Amylaceen und doppeltkohlensaures Alkali in der Nahrung erhielten, nicht weniger Zucker im Blute unverbrannt blieb als bei Darreichung ohne Alkalien, während unter dem Einflusse von Weinsäure eine Verminderung der Zuckerausscheidung erhalten wurde. Nichts desto weniger lässt sich nicht leugnen, dass unter dem Einflusse von Alkalien bei Diabetikern sich die Zuckerproduction in vielen Fällen mindert und zwar nicht allein, wie Rabuteau behauptet, in Folge kleiner Dosen, welche nur durch das aus ihnen gebildete Kochsalz wirken, sondern auch nach grösseren Gaben. Manche salinisch-alkalische Quellen, wie z. B. Karlsbad, scheinen allerdings von noch besserer Wirkung zu sein als reine Alkalien, welche namentlich bei Einführung grösserer Mengen in den Magen auf die Dauer beeinträchtigend auf die Digestion wirken. Fälle von Diabetes mit erheblicher Consumption schliessen diese Behandlungsweise aus.

Die aus ähnlichen Voraussetzungen hervorgegangene Behandlung der Albuminurie mit grossen Dosen von Natriumcarbonat giebt keine so eclatanten Erfolge. Dagegen ist namentlich nach den Erfahrungen englischer Aerzte (Golding Bird, Garrod), welche durch französische Autoritäten (Jaccoud, Charcot und Vulpian) bestätigt werden, die Anwendung grosser Dosen von Alkalicarbonaten ausserordentlich nützlich bei Rheumatismus acutus, indem dadurch der Verlauf der Affection bedeutend abgekürzt, der Schmerz gelindert und, wie es scheint, Auftreten von Endocarditis seltener gemacht wird. Man bringt die Wirkung gewöhnlich mit der Abnahme des Faserstoffs im Blute in Verbindung. Es muss indessen hervorgehoben werden, dass in diesen Fällen vorzugsweise Kalicarbonat oder die im Blute sich in diese verwandelnden or-

ganisch-sauren Kalisalze in Anwendung gekommen sind und dass die später zu erwähnenden Wirkungen aller Kaliumverbindungen auf Herz und Temperatur bei den günstigen Effecten mit in Anschlag zu bringen sind. Ebenso dürften bei der von Mascagni und Popham vorgeschlagenen Behandlung der Pneumonie mit Alkalien die Kaliverbindungen den Vorzug verdienen, da nur sie auf den Fieberprocess einen Einfluss haben, während sie in Bezug auf die Veränderung des Secrets mit den Natronsalzen gleichstehen. Im Ganzen sind diese Behandlungsmethoden in Deutschland wenig gebräuchlich. Ebenfalls von England aus ist die Behandlung der Gicht mit Alkalicarbonaten gerühmt. Dieselbe ist in der That, namentlich bei acuten gichtischen Anfällen, von entschiedenem Nutzen und bewährt sich auch bei chronischer Gicht (Garrod), indem die Zahl der Anfälle dadurch verringert wird. Hier scheinen jedoch kleinere Dosen, die man in starker Verdünnung kurz vor der Mahlzeit häufiger wiederholt geniessen lässt, passender zu sein. Man giebt auch bei der Gicht dem Kaliumbicarbonat den Vorzug, weil es ein, freilich vom Lithium bedeutend übertroffenes, beträchtlicheres Lösungsvermögen für Urate besitzt und zugleich stärker die Diurese befördert als das entsprechende Natriumsalz. Möglicherweise ist die neutralisirende Wirkung bei Säurebildung im Magen, wie sie bei Arthritikern vorkommt, gleichzeitig nicht ohne Nutzen.

Aus ähnlichen Gründen wie bei den bisher besprochenen Krankheiten hat man auch bei Fettsucht von dem Natriumcarbonat Gebrauch gemacht. Rein empirisch ist dagegen der Gebrauch bei Cholera, gegen welche das Carbonat durch Hutchinson, das Bicarbonat durch Baudrimont, Aran und Pfeuffer Empfehlung fand. Man gab die Salze hier in grossen Dosen zu 8,0–15,0 im Tage und spritzte sie sogar (wie Kochsalz) direct in die Venen (Lizars). Rationell ist dagegen die Anwendung bei Säurevergiftungen, sofern nicht die entstehenden Salze, z. B. bei Oxalsäure, selbst als Gifte erscheinen; doch haben die Carbonate keinen Vorzug vor der Magnesia. Der Gebrauch bei Alcoholismus acutus (Fontenelle) und bei Chloroformasphyxie (Lizars) hat keine besondere Bedeutung. Von englischen Autoren ist Natriumcarbonat bei gewöhnlichen Fällen von Delirium tremens, unter Vermeidung der Opiumtherapie, empfohlen, nicht um direct auf das Nervensystem zu wirken, sondern um bestehenden acuten Magenkatarrh, auf welchen britische Aerzte den Ausbruch von Delirien bei Trinkern zurückführen, zu beseitigen. Dass sowohl bei acuten als bei chronischen Magenkatarrhen die Natriumcarbonate und namentlich das Bicarbonat zu den vorzüglichsten Heilmitteln gehören, unterliegt keinem Zweifel. Es gilt dies vorzüglich für solche Fälle, wo perverse Säurebildung in den ersten Wegen stattfindet und gleichzeitig weder Verstopfung noch Diarrhoe existirt; überhaupt bewährt sich das Salz als Digestivum bei Verdauungsstörungen chronischer Art in vorzüglicher Weise, besonders auch bei dem mit starkem Zungenbelag einhergehenden sog. Status gastricus, wo die unangenehmen Symptome, wie Völle im Magen, Aufstossen, selbst Erbrechen bald verschwinden und der Appetit in der Regel sich rasch wieder einstellt. Es ist dabei gleichgültig, ob das Leiden idiopathisch oder im Gefolge chronischer Ernährungsstörungen auftritt. Die günstigen Effecte sind hier offenbar nur zum Theil Wirkung des Alkalis und des aus demselben im Magen entstehenden Chlornatriums, zum grossen Theile kommen sie der Kohlensäure zu, welche unter der Einwirkung des sauren Magensaftes freigemacht wird. Namentlich gilt letzteres von der antiemetischen Wirkung des Natriumbicarbonats, die oft sogar bei tieferen Structurerkrankungen des Magens sich bewährt.

Auch bei chronischen Katarrhen anderer Schleimhäute sind die Natriumcarbonate von entschiedenem Nutzen. So bei Blasenkatarrh und chronischem Bronchialkatarrh (nicht aber bei Tuberculose, wo sie eher schaden als nützen). Hierher gehört auch einerseits die Anwendung bei Tussis convulsiva und Croup, andererseits auch wohl die empirisch festgestellte günstige Action bei Gallensteinen, die vorzüglich unter dem Gebrauche alkalisch-salinischer Mineralquellen hervortritt, indem von Lösung dieser Concremente ebenso wenig wie von directer Vermehrung der Galle die Rede sein kann, auch die Hemmung der Ausscheidung von Cholesterin durch den vermehrten Zufluss von Natriumcarbonat zur Leber problematisch ist, vielmehr ihr Haupteffect in Heilung chronischer Katarrhe der Gallengänge zu suchen ist. Auch bei chronischen

Katarrhen des Uterus und der Vagina stehen die Natriumcarbonate, zumal örtlich angewendet, in grossem Rufe.

Bei Behandlung harnsaurer Diathese und wassersüchtiger Zufälle, wogegen Natriumcarbonate auf Grundlage ihrer physiologischen Wirkung indicirt erscheinen, werden ihnen Kalium- und Lithiumcarbonat vorgezogen.

Aeusserlich braucht man Natriumcarbonat ähnlich wie Kali hydricum bei Krätze, auch bei Favus und manchen chronischen Hautaffectionen, die mit Abschuppung (Pityriasis, Psoriasis, Ichthyosis) oder vermehrter Absonderung von Hauttalg (Acne, Seborrhoe) verbunden sind, doch ist der Nutzen hier, ebenso wie bei Prurigo, nur palliativ und kein besserer als derjenige der viel billigeren Seife. Auch zur Beseitigung von Oedemen, sowie bei Gicht ist das Salz in Form von Bädern, Kataplasmen und Lotionen empfohlen. Die Anwendung von Bicarbonat zum Verbande von diphtheritischen Schankern (Robert), bei cariösem Zahnweh (Gascoin), wo Natr. bicarb. in Substanz oder Lösung bei saurer Beschaffenheit des Mundsecrets gerührt wird, bei Verbrennungen, Biss- und Stichverletzungen giftiger Thiere u. a. m. bedarf kaum einer besonderen Erwähnung. Auch Einträufung von Kalium- oder Natriumcarbonatlösungen bei Cornealtrübung (Himly) oder Anwendung von Salben bei Defluvium capillorum sind obsolet, während Injection in den Gehörgang bei verhärtetem Cerumen wenigstens keinerlei Bedenken hat und die Einathmung verstäubter Lösungen bei Bronchialkatarrhen mit zäher Secretion von entschiedenem Nutzen ist. Auch zur Nasendouche sind derartige Solutionen gerührt. Ebenso lässt sich Natrium carb., wenn es vom Magen nicht länger tolerirt wird, per clyisma oder inhalirt appliciren.

Von Wichtigkeit ist die pharmaceutische Verwendung der Natriumcarbonate zu Brausemischungen, insbesondere zu den sog. Saturationen und Brausepulvern, wozu das Bicarbonat wegen der Leichtigkeit, womit es einen Theil seiner Kohlensäure abgibt, vorzugsweise brauchbar ist.

Die Natriumcarbonate werden innerlich zu 0,5—1,5 mehrmals täglich gegeben, wobei zu bemerken ist, dass das Bicarbonat im Allgemeinen den Vorzug verdient, weil es vom Magen besser als Natrium carbonicum vertragen wird. Soll letzteres angewendet werden, so wird zu Lösungen das krystallisirte, zu Pulvern oder Pillen das entwässerte Salz benutzt. Das Natrium bicarbonicum kann sowohl in Pulver als in Trochisken und Lösungen administriert werden; Pillen sind unzweckmässig, weil sie sich in Folge von Kohlensäureentwicklung leicht aufblähen.

Bei der internen Darreichung der Natriumcarbonate und der Alkalien überhaupt ist zu beachten, dass sie nicht zu kurze Zeit vor oder nach der Mahlzeit gegeben werden dürfen, weil sie sonst durch Neutralisation der Magensäure leicht störend auf die Peptonisation im Magen wirken.

Bei Anwendung der Carbonate als Digestiva verbindet man sie gern mit aromatischen und bittern Mitteln. Zu vermeiden sind Metallsalze und Säuren, wenn man nicht geradezu Zersetzung beabsichtigt.

Aeusserlich kann zu Waschungen und Bädern recht gut das billigere Natrium carbonicum crudum benutzt werden. Zu Waschungen gebraucht man Lösungen von 1:20—50 Th. Wasser, zum Vollbade rechnet man  $\frac{1}{2}$ —1 Pfd., zu Fussbädern 100,0—200,0. Zu Solutionen, welche in Körperhöhlen eingeführt werden sollen, ist N. c. purum zu verwenden. Zu den hier in Gebrauch zu ziehenden Formen rechnet man 1:50—100 Th. Wasser. Zu Inhalationen in verstäubter Lösung sind sowohl das Carbonat als das Bicarbonat in wässriger Solution von 1:100—500 benutzbar.

#### Präparate:

1) Pulvis aërophorus, P. effervescens; Brausepulver. Natrum bicarbonicum



10 Th., Acidum tartaricum 9 Th., Saccharum 19 Th., höchst fein gepulvert und gut getrocknet gemischt, am zweckmässigsten nur zur Dispensation bereitet, da beim Feuchtwerden leicht Kohlensäure entweicht. Man benutzt dasselbe meist theelöffelweise in Wasser geschüttet als kühlendes Genussmittel, auch bei leichtem Status gastricus, wobei ausser der sich reichlich entwickelnden Kohlensäure auch das in der Vorschrift der Phkp. prävalirende Alkali von Nutzen sein kann. Um den Geschmack zu verbessern, kann man zu 10,0 1—2 Tr. Oleum Citri oder gleiche Mengen eines andern wohlriechenden ätherischen Oels oder kleine Quantitäten aromatischer Tinctur hinzusetzen. Zweckmässig dient Brausepulver als Excipiens für kleine Gaben unangenehm schmeckender Medicamente (Chinin, Morphin, Opium, Ferrum lacticum oder anderer Eisensalze), die sich in Brausemischungen besser nehmen lassen, doch ist dabei zu berücksichtigen, dass heroisch wirkende Arzneimittel der genauen Dosirung wegen für sich gesondert zu verordnen sind und nicht etwa als Schachtelpulver, welche geradezu Gefahren bedingen könnten. Will man Brausepulver als ein nach Art der Alkalien wirkendes Medicament verordnen, muss man eine geringere Menge Säure, z. B. 1,3 auf 2,0 Natriumbicarbonat, nehmen, wie im französischen Pulvis aërophorus alcalescens. Brausepulver mit prävalirender Säure (mit mindestens  $\frac{1}{2}$  Säure und Carbonat), die man als Brauselimonadenpulver, Pulvis ad potum effervescentem, bezeichnet, sind erfrischender.

2) **Pulvis aërophorus Anglicus; Englisches Brausepulver, Soda powder.** Natrium bicarbonicum pulveratum 2,0, in blauer oder rother Kapsel dispensirt, Acidum tartaricum pulv. 1,5 in weisser Kapsel. Beim Gebrauch löst man zuerst das in der farbigen Kapsel enthaltene Pulver in einem zu  $\frac{2}{3}$  gefüllten Glase Zuckerwasser auf, schüttet dann die Weinsäure hinzu und trinkt während des Aufbrausens. Zu gleichen Zwecken wie das vorige verwendet.

3) **Potio Riveri s. Riverii.** Citronensäure 4 Th. in Aq. 190 Th. in eine von dieser Quantität fast vollständig angefüllte Flasche gebracht und nach vollständiger Lösung Natr. carb. 9 Th. hinzugefügt, worauf das Gefäss sofort verschlossen wird. Man giebt die Mischung innerlich esslöffel- bis weinglasweise, bei dyspeptischen Zuständen aller Art, namentlich in der Reconvalescenz nach schweren Krankheiten. Die ursprüngliche Potio Riverii (vgl. S. 172), welche von Lazarus de la Rivière, einem um die Mitte des 17. Jahrhunderts lebenden Professor in Montpellier, herrührt, enthielt nicht Natrium-, sondern Kaliumcarbonat. Sie wird in Frankreich noch jetzt als Potio antiemetica Riverii in der Weise verordnet, dass man in gesonderten Gläsern einerseits Kaliumcarbonat 2,0 in 50,0 Wasser gelöst, andererseits eine Solution von Acidum citricum 2,0 in derselben Menge Wasser administriert, wovon 1—2 Esslöffel in ein Weinglas gebracht und während des Aufbrausens getrunken werden.

Früher waren auch noch unter dem Namen Trochisci Natri bicarbonici, Sodapastillen, Vichyplätzchen, mit Zucker bereitete Pastillen officinell, von denen jede 0,1 Bicarbonat enthielt. Trochisken mit etwas grösserem Gehalte (0,3) sind der Dosirung wegen zweckmässiger. Dieselben können die aus den Rückständen natürlicher, Natriumcarbonat reichlich enthaltender Quellen (Bilin, Vichy) bereiteten Pastillen ersetzen, welche noch geringe Mengen anderer Salze enthalten.

Wir erwähnen an dieser Stelle noch die als Sodawasser, Aqua Sodae, bezeichneten künstlichen Sauerlinge, welche man durch Uebersättigung wässriger Lösungen von Natriumcarbonat mit Kohlensäure unter künstlichem Drucke darstellt und als kühlendes Getränk bei Fieber, auch bei Digestionsstörungen benutzt, wobei gleichzeitig Kohlensäure und Alkali von günstigem Einflusse sind. Man rechnet dabei 4,0 auf ein Liter Wasser. Durch Zusatz von Kochsalz u. s. w. lassen sich Mischungen erhalten, welche auch curmässig nach Art von Mineralwässern zu benutzen sind (Natronkrene von Vetter, Werbers Aqua Natri carbonici etc.).

## Verordnungen:

1)	R	2)	R
	<i>Natrii bicarbonici</i> 5,0		<i>Natrii carb. sicci</i>
	<i>Aquae Menth. pip.</i> 175,0		<i>Pulv. rad. Rhei</i> 3,0
	<i>Syrupi Aurantii corticis</i> 25,0		— <i>Gentianae</i> 6,0
<i>M. D. S.</i> Stündl. 1 Esslöffel. (Bei			<i>Elaeosacchari Foeniculi</i> 3,0
Dyspepsie u. s. w.)		<i>M. f. pulv. D. in vitro. S.</i> Dreimal	
		täglich eine Messerspitze voll. (Bei	
		Dyspepsie.)	

Vorschriften zu Saturationen sind S. 172 mitgetheilt.

**Anhang: Alkalische Quellen.** An die Natriumcarbonate schliessen sich die alkalischen Quellen an, welche sich zum Theil durch einen grossen Reichthum an freier Kohlensäure auszeichnen und sich dadurch an die eigentlichen Kohlensäurewässer, die sog. Sauerlinge oder einfachen Sauerlinge, schliessen, denen die neben der Kohlensäure durch Alkalicarbonatreichthum ausgezeichneten als alkalische Sauerlinge gegenüber gestellt zu werden pflegen. Der laugenhafte Geschmack alkalischer Wasser wird in denselben durch die Kohlensäure, welche zwischen 460—1520 Cm. in 1000,0 Wasser schwankt, mehr oder minder verdeckt. Der Gehalt an Natriumbicarbonat variirt bedeutend (zwischen 0,06—0,7%). In Deutschland sind diese Quellen fast durchgängig kalt, in Frankreich warm. Der hauptsächlichste der hierher gehörigen Curorte ist das besonders bei Dyspepsien und Magenkatarrhen, Cholelithiasis, Diabetes, Stasen in den Abdominalorganen und Gicht benutzte Vichy im Dép. Allier (mit Quellen von einem Gehalte von mehr als 0,5% Natriumbicarbonat und verhältnissmässig wenig anderen fixen Bestandtheilen, und Temp. von 12—45° C.), dem sich als in gleichen Richtungen benutzt Vals anreihet. Von deutschen Bädern ist Neuenahr im Ahrthale (mit nur 0,01% doppeltkohlensaurem Natrium, viel Kohlensäure, warm), das neuerdings bei chronischen Katarrhen des Respirations- und Digestionstractus, auch bei Diabetes benutzt wird, bedeutend. Ferner sind zu nennen Bilin in Böhmen (mit 0,4% Natr. bic. neben Glaubersalz und Calciumcarbonat, vorzugsweise versandt, auch zur Darstellung der Biliner Pastillen, Pastilles digestives de Bilin, welche aus den Salzurückständen gemacht werden), Fachingen im Lahnthal (der stärkste alkalische Sauerling, ohne Glaubersalz, fast nur verschickt), Geilnau (ebendasselbst, mit viel Kohlensäure und etwas Eisen, nur versandt), Obersalzbrunn in Schlesien, Giesshübel bei Carlsbad (am reichsten an Kohlensäure, viel versandt).

Zu den alkalischen Quellen gehören ferner die sog. alkalisch-muriatischen Sauerlinge, welche neben dem Natriumbicarbonat und der Kohlensäure noch Chlornatrium (zwischen 0,017—0,046%) enthalten. Dahin gehören Ems im Lahnthal (Therme, mit Fürstenquelle, Kränchen und Kesselbrunnen zu Trinkcuren, Bade- und Bubenquelle u. a. zum Baden, besonders indicirt bei chronischen Schleimbautkatarrhen mit nicht zu starker örtlicher Hyperämie oder Erschlaffung, bei Hyperämie und Anschwellung der Leber, bei einfachen Vaginal- und Cervicalkatarrhen, nicht bei Tuberculose), und das als Genussmittel bekannte, aber auch bei Respirationskatarrhen, zumal in Verbindung mit Milch, sehr nützliche Selterswasser (aus dem Dorfe Nieder-Selters am Taunus). Zu derselben Kategorie sind auch zu rechnen die Natron-Lithiumquelle von Weilbach, Gleichenberg in Steiermark, und die auch durch Iod- und Bromgehalt ausgezeichneten Bäder von Luhatschowitz in Mähren, welches im Wesentlichen die Indicationen der Chlornatriumtrinkquellen zu haben scheint. Von den durch gleichzeitigen Gehalt an Alkalicarbonat und Natriumsulfat wirksamen, theilweise auch noch Chlornatrium enthaltenden sog. alkalisch-salinischen oder salinisch-alkalischen Quellen war S. 610 die Rede. Die entschieden günstigen Wirkungen dieser Quellen, z. B. Carlsbad bei Cholelithiasis, Leberaffectionen, bei chronischen Magenkatarrhen, selbst bei Magengeschwür, bei Blasen- und Prostataleiden, Diabetes stehen offenbar mit dem Gehalte an Natriumcarbonat im Zusammenhange.

**Kalium carbonicum crudum**, Kali carbonicum crudum, Cineres clavellati; **Pottasche**, rohes kohlen-saures Kali. **Kalium carbonicum**, Kali carbonicum purum; **Kaliumcarbonat**, reines kohlen-saures Kali. **Kalium bicarbonicum**, Kali bicarbonicum; **Kaliumbicarbonat**, saures oder doppelt-kohlen-saures Kali.

Wie die Verbindungen der Kohlensäure mit Natrium sind auch die entsprechenden Kaliumverbindungen in mehreren verschiedenen Formen officinell.

Das Kaliumcarbonat (Dikaliumcarbonat),  $K^2CO^3$ , findet sich neben Kaliumsulfat und Silicat, Chlorkalium, Magnesia und Calciumsalzen in der Holz-asche und der Asche von Binnenpflanzen überhaupt, deren wässriger Auszug nach Eindampfen und Glühen des Rückstandes die sog. Pottasche, das Kalium carbonicum crudum, bildet, für welches jetzt übrigens die bei der Rübenzucker-fabrikation entstehende Schlempe und der Schweiss der Schafwolle billigeres Darstellungsmaterial bieten. Es ist dies ein weissliches, meistens ins Bläuliche oder Grünliche schimmerndes Salz von ätzend alkalischem Geschmacke, welches ein trocknes, körniges, an der Luft zerfliessendes und in gleichen Theilen Wasser zum grössten Theile lösliches Pulver darstellt. Das officinelle Präparat soll 90% Kaliumcarbonat enthalten, während von dem als Kalium carbonicum officinellen, ebenfalls pulvrigen Präparate ein Gehalt von 95%  $K^2CO^3$  gefordert wird. Das letztere entspricht mehr dem früher gebräuchlichen Kali carbonicum depuratum s. Kali carbonicum e cineribus clavellatis als dem reinen Kaliumcarbonat (früher ebenfalls als Kali carbonicum purum bezeichnet), welches man durch Glühen von Kaliumbitartrat erhielt (daher die Benennung Sal Tartari und Kali carbonicum e Tartaro). Das Kaliumcarbonat schmilzt in starker Glühhitze unzersetzt und krystallisirt aus conc. wässriger Lösung in kleinen wasserhaltigen Krystallen. In Weingeist ist es unlöslich, während es in verdünntem Weingeist zerfliesst, indem es demselben Wasser entzieht. Im Contact mit Säure wird Kohlensäure unter Aufbrausen frei. Die Anwendung des Salzes zur Seifenfabrikation, Glasbereitung und anderen technischen Zwecken ist bekannt.

Das Kaliumbicarbonat (Monokaliumcarbonat) entsteht durch Einwirkung von Kohlensäuregas auf Kaliumcarbonat und stellt durchscheinende, farblose, luftbeständige, alkalisch reagirende Krystalle dar, welche sich langsam in 4 Th. Wasser, nicht in Weingeist lösen, mit Säuren aufbrausen und in der Hitze, ohne zu schmelzen, die Hälfte ihrer Kohlensäure abgeben.

Die Kaliumcarbonate stehen im Allgemeinen in ihrer Wirkung den Natriumcarbonaten gleich und haben wie diese therapeutische Anwendung gefunden. Im Allgemeinen kommen sie jedoch weniger in Gebrauch, weil sie bei innerer Anwendung viel leichter als die entsprechenden Natriumsalze die Verdauung stören und deshalb für längere Darreichung sich weniger gut eignen. Dass sie auf Urate besser lösend wirken, wurde bereits hervorgehoben, weshalb sie auch in früherer Zeit bei der Behandlung harnsaurer Diathese namentlich von englischen Aerzten bevorzugt wurden, die besonders bei Gicht von diluirten Lösungen des Kaliumcarbonats (8,0—16,0 auf 1 Liter Wasser pro die oder in Form des ähnlich zusammengesetzten Constitution water) ausgiebigen Gebrauch machten. Ferner treten bei den Kaliumverbindungen die diuretischen Wirkungen stärker hervor, wie dies auch Rabuteau bei physiologischen Versuchen constatirte. Endlich wirken die betreffenden Salze wie alle Kaliverbindungen in eigenthümlicher Weise auf die Muskeln und



insbesondere auf die Herzthätigkeit ein, die sie in kleineren Mengen erregen, in grösseren herabsetzen und selbst lähmen. Hieraus erklärt sich die sedative Wirkung, welche den Kaliumcarbonaten im Gegensatze zu den entsprechenden Natriumverbindungen bei schmerzhaften, fieberhaften Affectionen, z. B. Rheumatismus acutus, zukommt.

Obschon bereits im Jahre 1839 Blake zeigte, dass Kalisalze bei Injection in die Drosselader den Tod von Thieren durch Stillstand des Herzens veranlassen, ist doch die bedeutende Differenz der Kalium- und Natriumverbindungen hinsichtlich ihrer Wirkung auf Muskeln und Herz erst 1864 durch Grandeau allgemeiner zur Anerkennung gelangt. Grandeau wies auch die Lähmung des Herzens zuerst für Kaliumcarbonat nach. Podcopaew zeigte 1865, dass diese Action auch bei innerer und subcutaner Application sich geltend macht und dass bei Einspritzung grösserer Mengen von Kalisalzen in die Schenkelarterie Lähmung der Schenkelmuskeln, welche auf elektrischen Reiz nicht mehr reagiren, erfolgt, während die übrigen Muskeln intact bleiben. Ferner zeigte er, dass bei directer Application alle Kalisalze Muskeln lähmen, während Natronsalze die Muskelthätigkeit anregen und den durch Kali reizungsunfähig gemachten Muskeln, so lange nicht Todtenstarre eingetreten ist, die Reizbarkeit wiederzugeben vermögen. Auch die Nerven werden nach Podcopaew rascher durch Kalisalze als durch Natronsalze ermüdet. Guttman (1865) wies nach, dass das Kaliumcarbonat auch bei wiederholten kleineren Dosen das Herz zu lähmen im Stande ist, so dass demselben eine cumulative Wirkung zukommt, und dass die Kalisalze, wenigstens bei Kaltblütern, auch auf die Nervencentren lähmend wirken. Kemmerich (1868) wies zuerst nach, dass kleinere und mittlere Dosen von Kalisalzen nicht Sinken der Pulsfrequenz, sondern Beschleunigung bewirken, auf welche später kein Sinken unter die Norm folgt. Genauere Angaben über die Herzwirkung der Kalisalze finden sich beim Kalisalpeter. — Besonders günstige Effecte schreibt man den Kaliverbindungen in Hinsicht auf die Blutbildung und die Ernährung des Organismus zu. Da die Kaliverbindungen sich vorzugsweise in den rothen Blutkörperchen, die Natronverbindungen dagegen im Blutesum finden (Lehmann), liegt es nahe, ersteren besondere Beziehung zur Bildung der Blutzellen zuzuschreiben. Man hat dafür die günstige Wirkung gewisser Eisenpillen, welche Kali enthalten, bei Chlorose geltend gemacht, doch scheint diese nicht vom Kali abzuhängen, da Woronichin (1868) experimentell nachwies, dass Chlorkalium zwar die Resorption von Eisensalzen fördere, aber auch eine raschere Elimination durch den Darm bewirke, während Chlornatrium nicht nur die Resorption, sondern auch die Assimilation des Eisens begünstige. Die Theorie, dass der Scorbut durch Ueberwiegen der Natronsalze im Blute bedingt werde, hat zur Anwendung von Kaliumbicarbonat bei Scorbut geführt, doch sind die Resultate nicht zufriedenstellend. Erwähnung verdient noch, dass bei Mischungen von Blut und Kaliumsalzen die Ozonreaction deutlicher als bei Natrium und Blutmischungen hervortritt.

Die oben erwähnte herabsetzende Wirkung der Kalisalze auf Muskeln und Nerventhätigkeit verleiht einer alten Cur des Tetanus mit Kalibädern und innerlich dargereichtem Kaliumcarbonat (Methode von Stütz) wenigstens theoretisch eine gewisse Berechtigung, obschon man praktisch wohl kaum jemals noch Gebrauch davon macht. Die sonstige äusserliche Anwendung des kohlensauren Kalium stimmt mit der des Natrium carbonicum überein. Im Allgemeinen ist da, wo eine reizende Wirkung beabsichtigt wird, die Kaliverbindung vorzuziehen; so namentlich bei chronischen Hautaffectionen (Pityriasis, Seborrhoe), bei Leukomen u. s. w. Bei leichten Hautkrankheiten (Acne, Chloasma) nützen nicht zu verdünnte Lösungen allerdings; auch sind manche im Rufe stehende Schönheitswässer, z. B. Lilionese, nichts anderes wie derartige parfümirte Solutionen.

Auch bezüglich der Verordnung der Kaliumcarbonate gilt im Allgemeinen das von den Natriumcarbonaten Gesagte. Auch hier verdient zur innern Anwendung das Bicarbonat den Vorzug. Zu Pulvern ist nur dieses zu benutzen, weil Kaliumcarbonat an der Luft zerfliesst. Das letztere giebt man zweckmässig in etwas kleinerer Dosis als das entsprechende Natriumsalz, etwa zu 0,2—1,0

2—4mal täglich und zwar stets in stark verdünnter Lösung. Zu Bädern kommt ausschliesslich das billigere Kalium carbonicum crudum in Anwendung, wobei man 100,0—200,0 auf ein Vollbad und 5,0—20,0 auf ein Liter Wasser zu örtlichen Bädern rechnet. Noch billiger erreicht man denselben Zweck, wenn man der Pottasche gewöhnliche Holzasche substituirt, wozu man auf 1 Liter Flüssigkeit 2 Esslöffel voll Holzasche benutzt. Von den übrigen äusserlich zu verwendenden Formen gilt das beim Natriumcarbonat Bemerkte.

#### Präparat:

**Liquor Kalii carbonici**, Kali carb. solutum s. liquidum, Liquor Salis Tartari, Oleum Tartari per deliquium; **Kaliumcarbonatlösung**, kohlensaure Kalilösung. Lösung von Kal. carbonicum 11 Th. in 20 Th. dest. Wasser, von 1,330—1,334 spec. Gew. 3 Th. enthalten 1 Th. Kaliumcarbonat. Vorzugsweise zur Bereitung von Saturationen gebraucht, auch zu 10—20 Tropfen mehrmals täglich in Tropfen oder Mixturen (mit schleimigem oder aromatischem Vehikel) bei Hydrops, Lithiasis u. s. w. benutzt.

**Calcium phosphoricum**, Calcaria phosphorica; **Calciumphosphat**, phosphorsaure Kalkerde, phosphorsaurer Kalk.

Das Calciumphosphat ist der Hauptrepräsentant der als Bestandtheile des Organismus höchst wichtigen Kalksalze, welche von aussen eingeführt im Blute und in den Geweben sich zu Phosphat umsetzen.

Die Kalksalze — und zwar neben dem Phosphat auch noch Chlorcalcium und Calciumcarbonat — sind ein integrierender Körperbestandtheil sowohl im Thier- als im Pflanzenreiche, finden sich indessen keineswegs überall gleichmässig verbreitet. In den Pflanzen sind es vorzüglich die Samen, deren Asche die grösste Menge Calciumphosphat enthält. Im Thierreiche ist es besonders stark bei den Wirbelthieren vorhanden, unter denen die Vögel und die carnivoren Wirbelthiere die erste Stelle einnehmen, worauf die Reptilien, dann die Insecten und hierauf erst die Fische, in letzter Linie die Würmer folgen, woraus Dusart und Blache den Schluss ziehen, dass das Calciumphosphat sich bei den Thieren am meisten findet, deren Activität die grösste ist. Das Calciumphosphat findet sich bei Wirbelthieren zwar vorzugsweise im Skelett, aber auch im Blut und in den übrigen Körpertheilen. Die Wichtigkeit für den Organismus erhellt daraus, dass der Mensch täglich etwa 3,0 Calciumphosphat eliminirt. Thiere, denen der Kalk in der Nahrung entzogen wird, nehmen an Gewicht ab, verlieren den Appetit und gehen zu Grunde. Auffallend ist dabei die starke Brüchigkeit der Knochen (Chossat, Dusart). Für die Bedeutung des Calciumphosphats für das Wachsthum sprechen eine Reihe von Versuchen an Pflanzen (Boussingault, Ville) und der Umstand, dass dasselbe sich sowohl bei Pflanzen als Thieren besonders reichlich da findet, wo es sich um die Neubildung von Zellen und Geweben handelt (Samenkörner, Sperma, Knospen). Die innige Beziehung der stickstoffhaltigen Materien zu dem Calciumphosphat im Pflanzenreiche, welche stets im bestimmten Gewichtsverhältnisse stehen (Boussingault), sowie die Osteophytenbildung während der Gravidität, welche man mit einer Aufspeicherung von Calciumphosphat zum Zwecke der Ernährung des Fötus in Connex bringt, sind weitere beachtungswerthe Momente.

An die Kalisalze reihen sich Calciumphosphat u. a. Kalkverbindungen insofern nahe an, als sie ebenfalls in grossen Mengen auf die quergestreiften Muskeln und die Herzaction lähmend wirken, jedoch in weit weniger intensiver Weise.

Letztere Thatsache ist 1873 von Rabuteau und Ducoudray und gleichzeitig von Eulenburg und Guttman durch Versuche mit den Haloidsalzen des Calciums dargethan. Bei interner und subcutaner Application scheint das

Herz weniger afficirt zu werden als die Muskeln und die Giftigkeit den Kaliumsalzen gegenüber  $1\frac{1}{2}$ —4mal so gering zu sein. Nach Rabuteau geht dem Herzstillstande nach Chlorcalcium Pulsbeschleunigung voraus.

Zur Gewinnung des Calciumphosphats schreibt die Pharmacopoe vor, 20 Th. krystallinisches Calciumcarbonat mit  $\alpha\alpha$  50 Th. Salzsäure und Wasser zu übergiessen und nachdem die Einwirkung in der Kälte aufgehört hat, damit zu erwärmen, die klar abgegossene Flüssigkeit mit frisch bereitetem überschüssigem Chlorwasser zu vermischen und nach Erwärmen bis zum Verschwinden des Chlorgeruchs  $\frac{1}{2}$  Std. mit 1 Th. Kalkhydrat zu digeriren, hierauf der klaren, mit verdünnter Essigsäure schwach angesäuerten Flüssigkeit eine filtrirte Lösung von 61 Th. Natriumphosphat in 300 Th. siedendem Wasser nach und nach unter Umrühren zuzusetzen, die Mischung einige Stunden stehen zu lassen, den entstandenen krystallinischen Niederschlag auf einem angefeuchteten leinenen Tuche zu sammeln und nach Auswaschen und Abtropfen stark auszupressen, bei gelinder Wärme zu trocknen und zu Pulver zu verreiben. Das auf diese Weise erhaltene Präparat bildet ein leichtes, weisses, krystallinisches, in Wasser unlösliches Pulver, welches sich schwer in kalter Essigsäure, leicht in Salzsäure ohne Aufbrausen löst.

Das früher officinelle Calciumphosphat, welches in ähnlicher Weise, jedoch unter Anwendung einer geringeren Menge (50 Th.) Natriumphosphat und ohne Zusatz von Essigsäure bereitet wurde, war amorph und entsprach einer Mischung von sog. normalem oder neutralem Calciumphosphat,  $\text{Ca}^3\text{PO}_4^2$ , und anderthalbfach phosphorsaurem Calcium,  $\text{CaHPO}_4 + 2\text{OH}^2$ , welches letztere das gegenwärtig officinelle Salz darstellt, welches sich bisweilen im Harn, sowie in Harnsedimenten und Concretionen findet und sich beim Kochen mit Wasser in normales Calciumphosphat und saures Calciumphosphat,  $\text{CaH}^4(\text{PO}_4)^2$ , verwandelt. Das normale Calciumphosphat ist das die Hauptmasse der Bestandtheile der Knochen (etwa  $\frac{4}{5}$  der Knochenasche) bildende Kalksalz, welches auch (mit etwas Chlorcalcium und Fluorcalcium verbunden) im Mineralreich als Apatit und in den als Koprolithen bezeichneten Excrementen fossiler Saurier vorkommt. Er ist krystallinisch und im Wasser unlöslich. Das überphosphorsaure Calcium, welches beim Auflösen des neutralen oder einfach sauren in Säuren entsteht, findet sich in allen sauren thierischen Flüssigkeiten, krystallisirt in perlmutterglänzenden Blättchen und ist in Wasser leicht löslich. Es bildet den Hauptbestandtheil des aus Knochenmehl bereiteten, als Superphosphat bezeichneten Düngmaterials. Neben dem genannten Präparate hat die Pharmacopoe auch noch das jetzt wohl nur veterinär verwendete **rohe Calciumphosphat**, **Calcium phosphoricum crudum**, als weisses oder grauweisses, in Salzsäure unter schwachem Aufbrausen mit Hinterlassung eines geringen Rückstandes lösliche Pulver. Dasselbe entspricht den früher namentlich als Bestandtheil des Goelisschen Kinderpulver verwendeten weissgebrannten Knochen, *Ossa usta s. calcinata s. alba praeparata*, und dient zur Darstellung des in Frankreich officinellen *Phosphate de Chaux*, das durch Auflösung der calcinirten Knochen in Salzsäure und Fällen mit Ammoniak gewonnen wird und ein Hydrat des normalen Calciumphosphats darstellt. Frisch gefällt und noch feucht bildet dasselbe eine gelatinöse Masse, das *Calcium phosphoricum gelatinosum* von Collas.

Das Calciumphosphat wird im Magen unter dem Einflusse der dort vorhandenen Säuren, namentlich der Salzsäure, in saures Phosphat verwandelt und geht als solches in das Blut über. In grösseren Dosen ist diese Umwandlung nur partiell, während die Hauptmasse mit den Faeces wieder abgeht.

In gleicher Weise verhält sich neutrales Calciumphosphat. Die Stühle nehmen unter der Zufuhr grösserer Mengen trockne Beschaffenheit und weisse Färbung an (sog. *Album graecum* bei Hunden).

Das Calciumphosphat gehört zu den ausserordentlich häufig als directes Plasticum benutzten Medicamenten, dessen Hauptver-



wendung in Krankheiten des Knochensystems, welchen ein Mangel von Kalksalzen zu Grunde liegt, nämlich bei der Rachitis und Osteomalacie, sowie bei Knochenbrüchen im höheren Lebensalter im Falle ungenügender Callusbildung stattfindet.

Die ungewöhnliche Menge von Kalksalzen, welche bei der mit Knochenweichung verbundenen Rachitis des kindlichen Lebensalters durch die Nieren eliminirt wird, macht eine gesteigerte Zufuhr von phosphorsaurem Kalk rationell und wenn in früherer Zeit diese Therapie aus dem Grunde bemängelt wurde, dass unter dem ausschliesslichen Gebrauche des Kalks, ohne gleichzeitige Verbesserung und Regulirung der Diät, Rachitis nicht heile, so muss dies auf Grund der neueren Beobachtungen von Dusart und Blache hinfallig erscheinen. Das Fehlschlagen der Therapie in manchen Fällen erklärt sich aus der nicht genügenden Dosis. Auch bei Osteomalacie ist die Anwendung gewiss rationell. Für den Gebrauch bei Knochenbrüchen mit mangelhafter Callusbildung sprechen nicht allein höchst concludente klinische Beobachtungen Pariser Chirurgen, sondern auch directe Versuche an Thieren, in welchen die raschere Consolidation fracturirter Knochen bei Meerschweinchen constatirt wurde. Die günstigen Effecte bei diesen Knochenleiden gaben Piorry Veranlassung, auch bei Caries und insbesondere bei Caries der Wirbelsäule (Pott'sches Leiden) den phosphorsaurigen Kalk zu versuchen, und die von ihm gerühmten glänzenden Resultate bei letzterer Krankheit dürften zu einer ausgedehnteren Anwendung dringend auffordern.

Da das Calciumphosphat nicht nur mit der Ernährung der Knochen, sondern auch mit der Nutrition des gesammten Organismus in inniger Beziehung zu stehen scheint, so ist auch gegen die Anwendung bei Schwächezuständen aller Art, insbesondere bei Scrophulose und Chlorose, wie sie Beneke, Clarus und Dusart befürworten, nichts Erhebliches einzuwenden und jedenfalls ist das Mittel rationeller als viele andere moderne Plastica.

Wenn auch über den Einfluss des Medicaments auf den Stoffwechsel Versuche nicht vorliegen und vielleicht die Ansicht ihre Berechtigung hat, dass das Calciumphosphat im Thierkörper vor allem aus dem eingeführten Calciumcarbonat und der Oxydation phosphorhaltiger Albuminate resultire, so lehrt doch die praktische Erfahrung zur Genüge, dass scrophulöse Erscheinungen (Hautausschläge, Augenentzündung) unter dem Einflusse des Mittels verschwinden. Die von Manchen bezweckte Verkreidung der Tuberkeln wird man freilich nicht dadurch erreichen können. Blache hat neuerdings das Calciumphosphat als tonisirendes Mittel bei Körperschwäche während der Pubertätsperiode und im Greisenalter, so wie bei febrilen Affectionen betagter und erschöpfter Personen, in denen ein adynamischer Zustand sich geltend macht, besonders auch bei Adynamie im Typhus, empfohlen. Die Benutzung gegen Nachtschweisse der Phthisiker (Guyot) kann wohl nur in der allgemeinen tonisirenden Wirkung Erklärung finden. Stromeyer und Caspari rühmen das Mittel bei Nierenblutungen.

Die Darreichung des Calciumphosphats geschieht gewöhnlich in Pulverform zu 1,0—5,0 pro die. Kleinere Dosen sind unnütz. Zweckmässiger als die Pulverform ist offenbar die Lösung mit Hülfe irgend einer Säure, namentlich Salzsäure.

Wie wir oben gesehen haben, ist das officinelle Präparat in Wasser unlöslich und wird nur in so weit resorbirt, als die im Magen vorhandene Salzsäure dasselbe in Chlorcalcium und lösliches Superphosphat umwandelt. Bei den zur Wirkung durchaus nothwendigen grossen Gaben reicht die Salzsäure des Magensaftes oft nicht zur Umwandlung der gesammten Menge hin. Durch Verbindung des Calciumphosphats mit Chlornatrium (aa), sog. *Calcaria ph. salita*, erreicht

man vollständigere Resorption (Sabellin und Dorogow), indem das Kochsalz auf die Magensaftsecretion vermehrend wirkt. Einfacher ist jedenfalls der Zusatz von Chlorwasserstoffsäure, von der wenige Tropfen zur Lösung der nöthigen Mengen Kalkphosphat genügen.

Aus dem oben erwähnten gelatinösen Kalkphosphat, welches in verdünnter Milchsäure oder Salzsäure sich leicht löst, hat man in Frankreich verschiedene Präparate hergestellt, welche vorzugsweise saures Phosphat neben Calciumlactat und Calciumhydrochlorat enthalten, wie das *Lactophosphate de chaux* von Dusart und Blache und das *Chlorhydrophosphate de chaux* von Coirre, welche bei acuten und chronischen Inanitionszuständen als Specialitäten angepriesen wurden. Auch *Glycero-Phosphate de chaux*, nach Columer eine vollkommen stabile, in kaltem Wasser lösliche und wegen ihres schwach-süssen Geschmacks angenehm und längere Zeit zu nehmende Verbindung, wird zu 0,5—1,0 zweimal täglich vor dem Mittags- und Abendessen als Ersatzmittel des Calciumphosphats gerühmt und soll nach Lestage bei Rachitischen bessere Resultate als *Lactophosphate* und *Hydrophosphate de chaux* geben. Auch *Calciumsuperphosphat* ist als *Calcaria phosphorica acida* zu 0,1—0,2 3—4mal täglich in Glycerin oder Syrup gelöst bei rachitischen Affectionen benutzt. Sterling gebrauchte dasselbe mit saurem Kaliumphosphat gegen Zahncaries.

**Calcium carbonicum praecipitatum, Calcaria carbonica praecipitata s. pura; Calciumcarbonat, gefälltter kohlensaurer Kalk.**

Das durch Fällen von Chlorcalcium mit Natriumcarbonat erhaltene Calciumcarbonat ist ein weisses mikrokrySTALLINISCHES Pulver, welches sich in Wasser äusserst wenig, wohl aber in kohlensäurehaltigem Wasser löst und sowohl beim Glühen als bei Contact mit stärkeren organischen und anorganischen Säuren Kohlensäuregas entweichen lässt. Es ist in nicht reinem Zustande Bestandtheil einer Reihe von Mineralien, so findet es sich krySTALLISIRT im Kalkspath und Arragonit, krySTALLINISCH körnig im Marmor, derb im Kalkstein, erdig als Kreide. Die letztere, früher als gereinigte oder geschlemmte Kreide, *Creta elutriata s. depurata*, officinell, ist von dem officinellen Ppt. durch Abwesenheit der krySTALLINISCHEN Structur und minder lebhaft weisse Farbe zu unterscheiden. Sie kann ganz nach Art desselben dienen, z. B. als stets gleich zur Stelle befindliches neutralisirendes Mittel bei Vergiftungen mit Säuren, namentlich Oxalsäure, was auch von den S. 400 besprochenen animalischen Kalkpräparaten gilt.

Das Calciumcarbonat stimmt in seiner entfernten Wirkung mit dem Calciumphosphate überein, indem es sich, wenigstens theilweise, im Blute in letzteres umwandelt, als welches es im Urin sich findet. Es unterscheidet sich jedoch durch eine neutralisirende Wirkung auf die im Magen vorhandenen Säuren, welche Kohlensäuregas freimachen und sich mit dem Calcium verbinden, wodurch es sich den Carbonaten der Alkalien und der Magnesia anreihet und zu einem als Antacidum bei Pyrosis, Durchfällen, Meteorismus sehr geschätzten Medicament wird.

Selbst bei Cholera hat Calciumcarbonat Empfehlung gefunden, meist jedoch mit Opium verbunden; bei Durchfällen der Kinder giebt man es oft mit Wismutnitrat, dessen Wirkung es offenbar verstärkt, auch mit Gewürzen.

Man giebt Calciumcarbonat zu 0,5—2,0 mehrmals täglich in Pulver, Trochiscen oder Schüttelmixtur. Der Umstand, dass es ohne Belästigung des Magens wochenlang ertragen wird, lässt seinen Gebrauch sogar dem Kalkwasser vorziehen. Aeusserlich kann es nach Art der *Scepastica pulverina* als Streupulver bei Intertrigo u. s. w.

benutzt werden und dient auch wie die *Conchae praeparatae* (S. 400) als Constituens für Zahnpulver.

Eine Lösung von Calciumbicarbonat in Wasser, erhalten durch Sättigen von Kalkwasser mit Kohlensäure bei künstlichem Drucke, wird als *Car-rara water* in England zu  $\frac{1}{2}$ —2 Lit. täglich bei Dyspepsie, Magensäure u. s. w. benutzt.

#### Verordnungen:

- |   |  |
|---|--|
| <p>1) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Calcii carbonici</i> 10,0<br/> <i>Magnesii carbonici</i><br/> <i>Elaeosacchari Anisi</i><br/> <i>Sacchari</i> <math>\overline{\text{aa}}</math> 5,0<br/> <i>M. f. pulv. D. in scatula. S.</i> Messer-<br/>     spitzenweise. (Statt des aus <i>Con-</i><br/> <i>chae ppt.</i> bereiteten <i>Pulvis an-</i><br/> <i>tacidus s. pro infantibus Ph.</i><br/> <i>Wirt.</i>)</p> <hr/> <p>2) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Calcii carbonici</i> 15,0<br/> <i>Camphorae tritae</i> 1,0<br/> <i>M. f. pulv. D. in scatulae. S.</i> Zahn-</p> | <p>pulver. (<i>Pulvis dentifricius al-</i><br/> <i>bus camphoratus Ph. Hann.</i>)</p> <hr/> <p>3) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Calcii carbonici</i><br/> <i>Gummi Arabici pulv.</i> <math>\overline{\text{aa}}</math> 5,0<br/> <i>Conterantur cum</i><br/> <i>Aquae</i> 175,0<br/> <i>Aquae Cinnamomi</i> 5,0<br/> <i>Syrupi Sacchari</i> 10,0<br/> <i>M. D. S.</i> Esslöffelweise. (Statt der aus<br/> <i>Conch. ppt.</i> bereiteten <i>Mixtura alba</i><br/> <i>Ph. Norv.</i> und ähnlicher als <i>Mix-</i><br/> <i>tura cretacea s. Lac perlarum</i><br/>     bezeichneter Mixturen.)</p> |
|---|--|

**Anhang.** Erdige Mineralquellen. — Mit dem Namen der erdigen Mineralquellen belegt man verschiedene zu Curen benutzte Quellen, welche sich durch grossen Reichthum an Kalk und Magnesia charakterisiren, ohne dass andre pharmakodynamisch wichtige Stoffe darin enthalten sind, während man Quellen mit wirksameren Bestandtheilen, z. B. Eisen, trotz eines grossen Kalkgehaltes, der z. B. in Driburg 0,15% Calciumbicarbonat beträgt, nicht unter diese Kategorie bringt. In manchen erdigen Quellen finden sich geringe Mengen Eisen, Kochsalz, auch Natriumcarbonat; in einzelnen reichlich Kohlensäure, in anderen Stickstoff. Von den zu dieser Gruppe gezählten Quellen bilden Leuk im Canton Wallis und Weissenburg i. C. Bern, von denen das erstere vorzugsweise bei Rheumatismus und Gicht, Scrophulose und chronischen Hautkrankheiten, Ulcerationen u. s. w., das letztere bei Phthisikern Anwendung findet, eine besondere Untergruppe, da sie Calciumsulfat enthalten und Thermen sind, während die übrigen den Kalk als Bicarbonat enthalten und kalt, höchstens lau sind. Von den letzteren ist Lippspringe (bei Paderborn, mit der Arminiusquelle und Inhalationssalons, in denen das zerstäubte Mineralwasser und das vorwaltend aus Stickstoff bestehende Gasgemenge in demselben inhalirt werden) besonders von Lungenleidenden und Bronchialkranken aufgesucht, ebenso das Inselbad bei Paderborn; dagegen ist Wildungen in Waldeck (Helenen- und Thalquelle, mit Calcium-, Magnesium- und Natriumbicarbonat, Kochsalz und reichlicher Kohlensäure, Georg Victor-Quelle) vorzugsweise bei Blasenleiden mit Erfolg benutzt, gegen welche auch das ähnlich zusammengesetzte Herster Wasser bei Driburg Anwendung findet.

**Aqua Calcariae, Aqua Calcis s. Calcariae ustae, Calcaria soluta;**  
**Kalkwasser.**

Das Kalkwasser ist eine Lösung von Calciumhydroxyd (vgl. S. 453) in Wasser, welche in der Weise erhalten wird, dass man 1 Th. gebrannten Kalk mit 4 Th. Wasser löscht und mit 50 Th. Wasser versetzt, nach einigen Stunden die Flüssigkeit fortgiesst und den Bodensatz mit weiteren 50 Th. Wasser wäscht. Das Kalkwasser bildet ein klares, farb- und geruchloses Liquidum von schwach-alkalischem, herbem, etwas erdigem Geschmack und alkalischer Reaction, welches durch Erwärmen oder durch Einblasen von Luft getrübt wird, indem in



letzterem Falle Calciumcarbonat sich bildet. Der Kalkgehalt der Aqua Calcaria ist ein verhältnissmässig geringer, indem 1 Th. Kalkerde in 800 Th. Wasser bei gewöhnlicher Temperatur (und in 1250 Th. bei Siedhitze) sich löst.

Das Kalkwasser steht bezüglich seiner physiologischen und therapeutischen Wirkung dem Calciumcarbonat ziemlich gleich, zeigt jedoch eine wesentliche Differenz in der localen Wirkung, indem es örtlich auf Geschwürsflächen und Schleimhäuten eine trocknende, gelind adstringirende Wirkung entfaltet, welche ein Analogon zu der styptischen Action diluirter Caustica bildet. Es ist deshalb als Antacidum besonders in solchen Fällen geschätzt, wo gleichzeitig Diarrhöen bestehen, und findet ausserdem äusserlich nach Art der zusammenziehenden Mittel Anwendung, wobei es sich einen besonderen Ruf als Heilmittel bei Verbrennungen erworben hat.

In Folge seiner styptischen Wirkung macht das Kalkwasser bei längerem Gebrauche leicht Indigestion, Erbrechen und Obstipation, weshalb bei chronischen Krankheiten Calciumcarbonat oder Kalkzucker zweckmässiger in Anwendung gezogen werden. Als Antidot bei Vergiftungen mit Säuren ist es wegen seines geringen Gehaltes an Kalk ebenfalls unangemessen, da zur Bindung der Säuren ausserordentlich grosse Mengen des Mittels erforderlich sind. Sehr gut eignet es sich als Zusatz zur Milch bei Säuglingen, welche an Darmkatarrh leiden. Auch bei Geschwürsbildungen im Tractus, selbst bei Magengeschwür (Luca), lässt sich der Nutzen des Kalkwassers nicht bestreiten, indem es mit dem Secrete der Geschwüre sich verbindet und über denselben eine schützende Decke bildet. In wie weit das Mittel auch auf entfernte Schleimhäute bei interner Darreichung einen secretionsvermindernden Einfluss ausübt, ist nicht mit Sicherheit zu sagen, doch gilt es bei manchen Aerzten als ein Mittel gegen Keuchhusten und Bronchialkatarrh, sowie gegen Blasenkatarrh und Blasenvereiterung, welche Affectionen bekanntlich auch die Hauptindication zum Gebrauche der sog. erdigen Mineralwässer geben. Möglich ist, dass das Präparat die Säure des Harns abstumpft und dadurch auf den Verlauf von Blasenleiden von günstigem Einflusse ist, worauf auch sein oft gerühmter Nutzen bei Lithiasis beruhen mag, wogegen z. B. das aus gebranntem thierischem Kalk und Seife hauptsächlich bestehende, vom englischen Parlamente angekaufte Geheimmittel der Frau Johanna Stephens sich als völlig nutzlos erwiesen hat.

Ausserlich ist Kalkwasser als trocknendes Mittel bei stark secernirenden Geschwüren, auch bei nässenden Hautaffectionen, bei Erysipelas (Tournié), zur Verhütung von Pockennarben (J. Ball), seltener zu Injectionen bei Gonorrhoe (Behrend), Ruhr, Cholera benutzt. Heim rühmte es mit Milch gegen Brennen im Munde. Vorzüglich wirksam ist eine Mischung von gleichen Theilen Kalkwasser und Lein- oder Olivenöl bei Verbrennungen ersten und zweiten Grades (sog. Stahlsche Brandsalbe oder Linimentum ad ambustionem s. calcis).

Durch die Entdeckung von Küchenmeister, dass Kalkwasser von allen Substanzen am besten auf Croup- und Diphtheritismembranen lösend wirkt, fand dasselbe in Verstäubung, in Mund- und Gurgelwässern oder sogar Injectionen in den Kehlkopf (Gottstein) ausgedehnte Anwendung bei Diphtheritis, ohne dass sich jedoch ein eclatanter Vorzug dieser Behandlungsmethode herausstellte.

Küchenmeister empfiehlt Kalkwasser auch bei syphilitischen Mundgeschwüren, so wie im Klystier gegen Oxyuris.

Innerlich giebt man Kalkwasser zu 50,0—150,0 mehrmals täglich, die man am zweckmässigsten Morgens geniessen lässt,

am besten mit Milch, Molken oder Fleischbrühe verdünnt, bei schwachem Magen mit Zusatz von etwas Bittermandelwasser. Aeusserlich dient es vorzugsweise pure oder mit 1—5 Th. Wasser verdünnt.

**Anhang:** Von sonstigen, nach Art der besprochenen Kalksalze angewendeten Kalkverbindungen sind noch der Zuckerkalk, *Calcium saccharatum* s. *Calcaria saccharata*, und das dem Chlornatrium analog zusammengesetzte Chlorcalcium, *Calcium chloratum*, zu nennen. Der erstere, eine Verbindung von Rohrzucker mit Kalk, von etwas adstringirendem Geschmacke, welche sich schwierig in Wasser, leichter in zuckerhaltigem Wasser löst, ist namentlich von französischen Aerzten bei Rachitis und chronischen Durchfällen im kindlichen Lebensalter empfohlen, weil er vom Magen besser als Kalkwasser tolerirt wird. Man giebt ihn in Lösung mit 20—30 Th. Syrupus simplex theelöffelweise täglich als sog. Sirop de chaux. Nach Versuchen an Thieren erscheint der Zuckerkalk als Antidot der Carbonsäure (Th. Husemann) und dürfte auch bei Oxalsäurevergiftung dem Kalkwasser entschieden vorzuziehen sein.

Das Chlorcalcium, ausgezeichnet durch seine Zerfliesslichkeit und durch das colossale Sinken der Temperatur bei Auflösung in Wasser (13 Th. mit 10 Th. Schnee setzen die Temperatur auf  $-49^{\circ}$  herab), ist ein früher sehr häufig bei Scrophulose, Tuberculose, Magenaffectionen und andern Leiden, gegen welche Kalk Verwendung fand, benutztes Präparat, welches man zu 0,2—0,6 mehrmals täglich innerlich gab. Dasselbe scheint im Blute ebenfalls in Calciumphosphat umgewandelt zu werden (Werther). Grössere Dosen können Brechdurchfälle, Reizung der Nieren, Lähmung und Convulsionen bedingen. Aeusserlich ist es ein Lieblingsmittel der Rademacherianer, welche es, mit 24 Th. Wasser verdünnt, zur Zertheilung oder Maturation von Furunkeln, auch bei Geschwüren und schwammigen Excrescenzen benutzen. Heller empfahl das ausgeglühte warme Salz (*Calcium chloratum siccum*) bei Oedemen in Säcken aufzulegen, um das Wasser aus dem Zellgewebe dadurch anzuziehen; Sabbatini rühmte Bäder aus Chlorcalcium und Kochsalz bei Cholera. Nicht unzweckmässig dient käufliches Chlorcalcium, in offenen Schalen hingestellt, als Austrocknungsmittel in feuchten Zimmern. Bei der Verordnung ist es in diluirter wässriger Lösung möglichst ohne Zusätze zu geben, da es durch die meisten Salze organischer und unorganischer Säuren zersetzt wird; auch hat man sich vor der möglichen Verwechslung mit Chlorkalk (*Calcaria chlorata*) zu hüten.

Eine besondere Erwähnung verdient noch das Calciumhypophosphit, *Calcium hypophosphorum*, welches mit den analogen Salzen der unterphosphorigen Säure (PO) mit Natrium, Magnesium und Aluminium die in der neueren Zeit viel besprochene Gruppe der Hypophosphite bildet. Die beim Kochen von Phosphor mit den Hydroxyden der Alkali- oder alkalischen Erdmetalle neben Phosphorwasserstoff entstehenden Verbindungen, welche beim Erhitzen in Phosphate und Phosphorwasserstoff zerfallen und sich durch leichte Oxydirbarkeit auszeichnen, sind die Grundlage einer Therapie der Lungenschwindsucht u. a. Consumptionskrankheiten geworden, welche die Verbrennung im Blute zu Phosphaten und die Verwendung dieser zur Bildung von rothen Blutkörperchen zur Basis hat. Nach Versuchen von Rabateau findet allerdings keine totale Elimination der Hypophosphite als solcher statt, so dass partielle Verbrennung oder Assimilation angenommen werden kann, auch tritt bei Gesunden nach Einführung von täglich 3,0 Natrium hypophosphorosum Zunahme des Appetits, Pulsbeschleunigung, Steigen der Temperatur und Vermehrung der Harnstoffausscheidung um 20% ein. Churchill, der Vater der Hypophosphit-Therapie, will bei Kranken ebenfalls Besserung des Appetits, Zunahme der Kräfte und Anregung der Haematose und bei Phthisikern nach einiger Zeit deutliche Zeichen von Plethora, dar Röthung und Völle der Wangen und Röthung der Schleimhäute erkennbar, beobachtet haben; auch vindicirt er den Hypophosphiten günstige Einwirkung auf die Katamenien und Erleichterung der Dentition bei Kindern. Bei Gebrauch grösserer Dosen und bei zu langer Anwendung stellen sich dagegen nach Churchill Abnahme des Appetits, Sinken der Körperkraft, Somnolenz, Schwindel, Gesichtsstörungen, Ohrensausen, Brustschmerzen, Dyspnoe, ja selbst gastrointestinale Blutungen und Haemoptysis ein. Diese pathologischen

Erscheinungen dienen den Hypophosphiten nicht eben zur Empfehlung, auch haben Vigla, Dechambre u. A. den Nutzen bei Phthisis geradezu bestritten. Churchill reichte sie zu 0,3—0,5 in wässriger Lösung. Bei der Darreichung muss jeder Zusatz eines leicht sauerstoffabgebenden Stoffes wegen Explosionsgefahr vermieden werden; die Verordnung mit Kalium chloricum führte in Belgien zu Explosion und Verletzung des Apothekers. Rabuteau will die Hypophosphite bei Cholera und Rachitis versucht wissen; jedenfalls contraindicirt jeder febrile Zustand ihren Gebrauch.

### **Martialia, Eisenpräparate.**

Wir fassen unter dieser Bezeichnung das Eisen und dessen Verbindungen, soweit die letzteren bei Blutarmuth und Schwächezuständen Anwendung finden, zusammen. Die Bedeutung derselben für die Therapie, welcher sie (und zwar zunächst der Eisenrost) schon seit den Zeiten der ägyptischen Pharaonen dienten, ist so gross und die damit erzielten Erfolge sind so ausgezeichnet, dass die alten Sätze: *Qui nescit Martem, nescit artem* und: *In ferro est aliquid divini* volle Berechtigung haben. Die Eisenpräparate lassen sich am besten in zwei Hauptgruppen zerlegen, je nachdem sie ausschliesslich oder doch fast ausschliesslich entfernte Wirkung zeigen oder neben derselben ausgesprochene, auf Affinität zu Eiweissstoffen beruhende, locale Action besitzen. Die ersteren nennen wir milde Eisenmittel, *Martialia mitiora*, die letzteren stark wirkende Eisenmittel, *Martialia fortiora*. Die örtliche Wirkung ist bei grösseren Dosen und stärkeren Concentrationsgraden der *Martialia fortiora* eine kaustische, bei kleineren eine adstringirende. In den Magen eingeführt rufen grössere Gaben der *Martialia fortiora* Gastritis und selbst Gastroenteritis, manchmal selbst mit heftigen Diarrhöen verbunden, hervor. In mässigen Dosen bewirken dieselben häufig Störungen der Digestion, Druck und Schmerzen im Epigastrium und bei längerem Gebrauche hartnäckige Obstipation. Die letztere sehen wir auch als Folge längeren Gebrauchs milder Eisenmittel gewöhnlich auftreten, namentlich wenn diese in grösseren Mengen als nöthig eingeführt werden; hier hängt die Verstopfung wohl nur theilweise von dem Contacte der eingeführten Eisenpräparate, der Hauptsache nach aber von dem im Darne gebildeten Schwefeleisen ab, welches in ähnlicher Weise wie Wismutnitrat die Darmwandungen überzieht und einestheils die Schlüpfrigkeit der Darmschleimhaut mindert, andernteils direct beschränkend auf die Secretion wirkt. Auf der Affinität der *Martialia fortiora* zu den Albuminaten beruht der Gebrauch derselben als schwache Aetzmittel, als Medicamente, welche krankhafte Absonderungen des Darmes beschränken, als adstringirende Mittel bei Entzündungen der Haut und Schleimhäute, endlich als Haemostatica, in welcher letzteren Beziehung manche einen besonderen Ruf sich erworben haben.

Die Veränderungen, welche die Eisenmittel bei Einführung in den Magen erleiden, sind vielleicht nicht für alle Präparate die nämlichen. Gehen wir vom metallischen Eisen aus, so wird das-



selbe zunächst in der sauren Flüssigkeit des Magens oxydirt, indem das Wasser zersetzt wird, wobei der frei werdende Wasserstoff nicht selten in grösseren Quantitäten entweicht und zu lästigem Aufstossen Veranlassung giebt. Wird Eisenoxydul oder Eisenoxyd in den Magen eingeführt, so findet Gasentwicklung nicht statt. Im Uebrigen aber unterliegen diese Verbindungen denselben Veränderungen, welche das im Magen auf Kosten des Wassers oxydirte Eisen weiter erfährt. Nach den neueren Untersuchungen von Rabuteau und Cervello werden dieselben unter dem Einflusse der Salzsäure des Magensaftes zunächst in Eisenchlorür verwandelt. In analoger Weise wirkt auch die Salzsäure auf Verbindungen des Eisenoxyduls oder Eisenoxyds mit schwächeren organischen Säuren, indem es die letzteren frei macht und sich mit dem Eisen verbindet. Auch Eisensesquichlorid wird im Magen zu Eisenchlorür reducirt (Rabuteau). Die früher allgemein verbreitete Anschauung, dass sich die Eisensalze im Magen in Eisenchlorid verwandelten und dass dasselbe sich mit Eiweiss verbinde, um als Eisenalbuminat in die Circulation zu gelangen, erscheint hiernach als unhaltbar. Scherpff glaubt daher, dass im Magen das Eisen in einer äusserst verdünnten salzsauren Lösung, normaler Weise in Gesellschaft von Acidalbumin in die Blutmasse eintritt, wo es sich sogleich mit Beihülfe des Blutalkalis zu einer Alkali-eiseneiweissverbindung verändere. Neben der Resorption im Magen erscheint dann in den alkalisch reagirenden Darmpartien die Resorption als Alkali-eisenalbuminat möglich.

Eine besondere Art und Weise der Resorption hat man verschiedenen Doppelsalzen des Eisens beigelegt, z. B. dem Eisenweinstein (Mialhe) und dem Natriumeisenpyrophosphat (Jeannel), bei denen eine Einwirkung des Magensaftes vollständig in Abrede gestellt wurde. Indessen wird nach Quevenne aus dem Eisenweinstein im Magensaft Eisenhydroxyd gefällt, welches natürlicherweise, um wirksam zu werden, durch die Salzsäure in Lösung übergeführt werden muss. Die Annahme, dass die erwähnten Doppelsalze auch noch, nachdem sie den Magen passirt, im Darne als solche resorbirt werden und deshalb grössere Mengen von Eisen in das Blut brächten, ist bei längerem Verweilen im Magen mindestens zweifelhaft. Dass andererseits im Darne Aufsaugung von Eisenverbindungen statthat, steht fest und ist bezüglich des Eisenalbuminats und Eisenpeptonats von Scherpff nachgewiesen.

Die von der Salzsäure des Magens nicht veränderte Partie der eingeführten Eisenverbindungen unterliegt besonders im unteren Theile des Darmes der Einwirkung des Schwefelwasserstoffs, woraus die Bildung von Schwefeleisen resultirt, das sich den Faeces beimengt und diesen die schwarze Färbung verleiht, welche die Stühle bei längerem Eisengebrauche charakterisirt.

Auch von anderen Schleimhäuten und dem Unterhautgewebe kann Resorption von Eisensalzen erfolgen, dagegen nicht von der äusseren Haut.

Bei Thieren treten dieselben Erscheinungen, welche durch Einführung von Eisensalzen in das Blut bedingt werden, auch bei Application auf Wunden und Geschwüre hervor. Bei directer Einführung in den Kreislauf liegen Differenzen zwischen den einzelnen Eisensalzen vor, indem Eisenchlorid und die meisten Ferrisalze das Blut coaguliren, während Eisenchlorür und die meisten Ferro-

salze derartige Gerinnung nicht bedingen. Nach Blake sollen selbst kaustisch wirkende Ferrosalze im Blute ganz anders wirken als Ferrisalze; erstere sollen in hohen Gaben die Herzthätigkeit herabsetzen und den arteriellen Druck vermindern, in grösseren Dosen Herzstillstand bedingen, die Ferrisalze dagegen den Druck im Aortensysteme abnorm erhöhen und Störungen im kleinen Kreislauf bewirken. Gewiss ist, dass selbst von Ferrosulfat grosse Mengen (3,0—4,0 nach Papi, 15,0—30,0 bei grossen Hunden nach Blake) direct ins Blut eingeführt werden können, ohne den Tod herbeizuführen. Dasselbe gilt vom Eisenchlorür (Cervello).

Dass übrigens Eisensalze auf Thiere giftig wirken, betonen H. Meyer und Williams nach Versuchen mit Ferronatriumtartrat, welches bei Infusion zu 0,015—0,06 per Kilo Kaninchen, Katzen und Hunde tödtet, indem es analog der Action von Platin und Arsen directe Lähmung des Centralnervensystems und periphere Gefässlähmung bedingt, auf welcher letzteren die constant vorkommende Hyperämie und entzündliche Schwellung der Magen- und Darmschleimhaut beruht. Bei diesen Versuchen zeigte das dunkle, aber stets alkalische Blut hochgradige Kohlensäureverminderung bei normalem Sauerstoffgehalte.

Die Ausscheidung in die Blutmasse gelangter Eisenverbindungen geschieht vorzugsweise durch Galle und Harn.

Selbst nach Infusion von Eisensalzen ist die grösste Menge des eingeführten Eisens im Koth nachweisbar (Meyer), doch tritt auch bei Einführung unlöslicher Eisenpräparate Eisen im Harn auf (Dietl und Heidler). Quevenne, Melsen und Rabuteau constatirten nach Einführung von Iodeisen die in 2—3 Tagen beendete Elimination des gesammten Iods durch den Harn, während dieser nur Spuren von Eisen zeigte. Papi fand nach Einspritzung von Ferrosalzen dieselben unverändert in Galle und Faeces, dagegen nicht im Urin. Nach Schroff soll Eisen nach kleinen Gaben viel schneller und längere Zeit durch die Nieren ausgeschieden werden als bei grösseren und bei fortgesetztem Gebrauche ein merkwürdiges periodisches Schwanken bezüglich des Fehlens und Auftretens von Eisen im Urin sich geltend machen. Nach Quincke sind im Harn stets Ferro- und Ferrisalze neben einander vorhanden (erstere vielleicht vermöge Reduction durch die Harnsäure). Bei leicht löslichen Salzen, z. B. Eisenammoniumcitrat, findet sich Eisen schon in 1 Std. im Harn. Nach Hamburger ist das resorbirte Eisen im Harn nicht als solches nachzuweisen, sondern tritt als organische Verbindung in denselben über. Bistrow fand den normalen Eisengehalt der Milch nach interner Einführung von 1,0—3,0 Eisenlactat auf das Doppelte steigend, während die Milchmenge selbst darnach abnahm. Die Ausscheidung durch die Milch erfolgte erst nach 48 Stunden, was auf ein längeres Verweilen des Eisens in den Geweben hindeutet.

In Hinsicht auf die entfernten Wirkungen des Eisens liegen vorzugsweise Beobachtungen an Kranken und einzelne Thierversuche vor. Als auffallendste Erscheinung ergiebt sich Steigerung der Körpertemperatur, Vermehrung der Pulsfrequenz und Zunahme des Körpergewichts (Pokrowski).

In Pokrowskis Versuchen an Kranken machte sich die Temperatursteigerung, deren Maximum etwa 1° betrug, sowohl bei normalem Verhalten der Eigenwärme als bei vorher gesunkener Temperatur geltend, und zwar meist erst nach mehrtäggigem Gebrauch der Martialis, ausnahmsweise schon nach 5 Stunden. Die durch eine mässige Eisengabe gesteigerte Körperwärme konnte durch eine grössere Dosis noch eine weitere Erhöhung erfahren. Nach Aussetzen der Eisenzufuhr blieb die Temperatur, wenn dieselbe vorher normal gewesen war, noch längere Zeit abnorm hoch, während bei vorher abnorm gesunkener Temperatur dieselbe rasch nach dem Aussetzen des Eisens wieder abnahm. Die Pulsfrequenz steigt langsamer und nicht mit gleicher Regelmässigkeit (Pokrowski). Mit der gesteigerten Pulsfrequenz steigt bei Thieren nach mittleren Eisengaben auch der Blutdruck (Laschkewitsch). Auch Cervello (1880) fand bei Durchleitung von Eisenchlorür durch extirpirte Organe Contraction

der Gefäße, die bei längerer Dauer des Versuches in das Gegentheil umschlug. Dieser Wirkung scheint jedoch eine schwächende Action auf den Herzmuskel parallel zu gehn, so dass der Blutdruck bei Säugethieren anfangs sinkt, später aber durch Präponderanz der Wirkung auf die Gefäße in erheblicher Weise steigt. Pokrowski und Rabuteau schreiben dem Eisen auch eine Steigerung der Stickstoffausscheidung zu, was von Munk nach exacteren Versuchen in Abrede gestellt wird. Möglicherweise ist der günstige Einfluss auf den Organismus geradezu in Beschränkung des Stoffwechsels zu suchen, wofür der starke Fettansatz bei Kaninchen unter dem Einflusse von Eisensalzen (Schroff) zu sprechen scheint. Eine vermehrende Einwirkung auf die Katamenien findet bei gesunden Frauen nicht statt (Trousseau und Pidoux), wohl aber bei Amenorrhoe Anämischer. Der alte Glaube, dass Eisenpräparate die Milz verkleinern (Celsus), beruht auf Irrthum.

Therapeutisch finden sämtliche Eisensalze ihre Indication bei allen Zuständen, welche als Folge von Blutarmuth oder Verminderung der rothen Blutkörperchen im Blute anzusehen sind, besonders aber bei Chlorose und Leukämie.

Die Theorie der Eisenwirkung bei chlorotischen Zuständen ist keineswegs eine von allen Autoren in gleicher Weise aufgefasste, so übereinstimmend man im Allgemeinen auch über den Werth der Martialia bei der genannten Krankheit denkt. Dass es nicht die bei Eisencuren gleichzeitig gebrauchte roborirende Diät (Fleischkost, Milch, Bewegung in freier Luft) ist, auf welche die Curerfolge allein zu beziehen sind, lehrt die tägliche Erfahrung, und wenn Einzelne den Werth der Eisenmittel mit der Behauptung zu schmälern gesucht haben, dass mit der Nahrung allein dem Blute so viel Eisen zugeführt werde, als zur Erhaltung und Bildung der rothen Blutkörperchen nothwendig sei, so spricht dies nicht gegen den praktisch festgestellten Werth der Eisenmittel bei Chlorose, sondern höchstens gegen die Theorie ihrer Wirkung. Indessen ist es zwar richtig, dass der Bedarf des gesunden menschlichen Organismus an Eisen, welchen Boussingault auf 0,06 veranschlagt, durch die Nahrungsmittel gedeckt werden kann, wenn wir eisenreiche Nahrungsmittel, wie Rindfleisch, welches in 1000 Th. einen Eisengehalt von 0,68 besitzt, oder Leguminosen einführen. Bei der Chlorose und noch mehr bei der Leukämie ist das Eisendeficit aber doch zu bedeutend, wenn wir die von Becquerel und Rodier, Quincke u. A. angegebenen Zahlen zu Grunde legen, wonach die in der Norm beim Weibe in 1000,0 Blut vorhandene Eisenmenge (0,544—0,603) bei Chlorotischen auf 0,319—0,324 und bei Leukämischen gar auf 0,244 sinken kann. Bei dem constanten Verhältnisse des Eisengehalts im Thierkörper zur Blutmenge bzw. zum Haemoglobin und zur Menge der rothen Blutkörperchen liegt es nahe, bei den Heileffecten des Eisens in der Chlorose, deren Wesen ja in einer Verminderung der rothen Blutkörperchen besteht, zumal da wir nach Eisencuren bei Bleichsucht eine auf Vermehrung der Blutkörperchen beruhende lebhaftere Färbung des Gesichts bei gleichzeitiger Zunahme der Körperkraft und des Wohlbefindens auftreten sehen und in vielen Fällen direct eine Vermehrung des Haemoglobins (Hayem, Scherpff, Quincke), mitunter selbst um 25%—50%, mit Zunahme der Zahl der rothen Blutkörperchen, oder ihrer Dimensionen (Hayem) nachweisen können, an eine directe Aufnahme des Eisens in die Blutkörperchen und Förderung der Bildung neuer Blutzellen aus Leukocyten (Scherpff) zu denken. Die Zunahme der Blutkörperchen scheint übrigens nur bei Chlorotischen, nicht bei Gesunden (Cutler und Bradford) stattzufinden. Von Einzelnen (Richter) wird dagegen angenommen, dass das Eisen weniger blutkörperchenbildend als in Folge von Contraction der kleinsten Gefäße beschränkend auf die Zerstörung der rothen Blutzellen wirke, was freilich rein hypothetisch ist. Dass aber dem Eisen bei Chlorose noch ein anderer Einfluss zukommt, geht daraus hervor, dass in manchen, namentlich schweren Fällen nach dem Aussetzen des Eisengebrauches die Bleichsucht rasch recidivirt. Foà (1880) stellt nach Versuchen mit Ammoniumeisencitrat eine directe Vermehrung der rothen Blutkörperchen in Abrede und sieht das Wesen der Wirkung des Eisens darin, dass es alte Blutzellen zerstört und neue regenerirt, welche stärker functioniren, womit er auch die intensive Rothfärbung des Knochen-



marks und der Lymphdrüsen während der Eisenzufuhr in Zusammenhang bringt. Hayem legt weniger Gewicht auf die Vermehrung der Zahl als auf die Vergrößerung der Erythrocyten. Hier mag die Theorie von Sasse eine Erklärung bieten, wonach die Eisensalze als Ozonträger im Blute die Stelle der rothen Blutkörperchen zu ersetzen vermögen. Völlig ausreichend für die Erklärung der Eisenwirkung im Ganzen ist Sasses Theorie nicht, weil sonst wirkliche Heilungen von Chlorose durch Eisen, wie dieselben nicht Ausnahme, sondern Regel sind, nicht zu Stande kommen könnten und weil sonst dieselben Wirkungen ja auch durch Kochsalz erzielt werden müssten, was aber nicht der Fall ist. Völlig unrichtig ist es gewiss, wenn endlich einzelne Aerzte die Wirksamkeit der Eisenmittel auf Besserung der Verdauung zurückführen. Allerdings heilt Eisen manche atonische Dyspepsie, welche auf der Chlorose selbst beruht, aber ebenso häufig verschlimmert es gleichzeitig bestehende, nicht als Ausdruck des Grundleidens zu betrachtende Verdauungsstörungen, und in sehr vielen Fällen ist man genöthigt, bei Chlorotischen bei Darreichung der Eisenpräparate mit denselben Aromatica und Amara zu verbinden, um Indigestionen zu verhüten.

Wie bei der eigentlichen Chlorose leistet das Eisen auch vorzüglichen Nutzen bei Anämie, welche in Folge von stärkeren Blutverlusten entstanden sind und bei Verminderung der rothen Blutkörperchen in Folge chronischer Kohlenoxydvergiftung (sog. Anémie des cuisiniers), während bei Blutmangel in Folge von Inanition und in Folge langdauernder acuter Affectionen, wo neben den Blutkörperchen auch die Eiweissstoffe im Blute vermindert sind, die Anwendung von Eisen überflüssig und in der Regel zweckmässige roborirende Diät ausreichend ist. Ebenso haben die Martialien im Allgemeinen weniger Bedeutung bei sog. diathesischen Anämien, obschon in manchen Fällen auch bei diesen die Martialia als Unterstützungsmittel anderer Medicamente Dienste leisten können. Auf die betreffenden Diathesen selbst ist das Eisen entschieden ohne Einfluss.

Was die letzterwähnten Diathesen anlangt, so ist das Eisen bei manchen geradezu contraindicirt. Es gilt dies besonders von der Phthisis, wo in der Regel Martialia nur verschlimmernd wirken können, indem sie einerseits wahrscheinlich vermöge Steigerung des Blutdrucks die Tendenz zu Blutspeien vermehren, andererseits leichte febrile Erscheinungen steigern, ferner bei Syphilis, wo nach Bärensprung das Eisen die Symptome der latenten Krankheit wieder zum Vorschein bringen kann. Bei sog. acuter perniciöser Anämie reichen Martialia nicht aus. Nach Hayem wird bei kachektischer Anämie zwar der Farbstoffgehalt der rothen Blutkörperchen vermehrt, dagegen keine Vergrößerung der Blutkörperchendimensionen zu Wege gebracht, in welcher Hayem den wahren Werth der Martialia erblickt.

Bei andern Diathesen, z. B. bei Krebskachexie, ferner bei der auf intermittirendes Fieber folgenden Anämie ist ein Nutzen des Eisens zur Hebung der Kräfte unverkennbar, während die Bekämpfung des Krankheitsprocesses selbst in beiden Fällen sich als Illusion erwiesen hat. Aehnlich verhält sich das Eisen bei Diabetes und Basedowscher Krankheit, bei letzterer sind natürlich nur anämische Formen für Eisen geeignet. Bei Scrophulose und Rachitis bildet Eisen ein wesentliches Unterstützungsmittel der Therapie.

Die Eisenpräparate sind nicht nur im Stande, die Anämie selbst zu heben, sondern auch eine Reihe von Störungen, die mit derselben in Zusammenhang stehen, insbesondere anämische Neuralgien und andere Neurosen, ferner Digestionsstörungen, Menstruationsanomalien und namentlich Hydrops zu beseitigen.

Die günstigen Effecte bei anämischen Neuralgien geben eine Erklärung für die ältere Ansicht, dass die Martialien und namentlich einzelne Präparate Specifica bei Neuralgien überhaupt seien, wie dies z. B. Hutchinson von Eisencarbonat bei Prosopalgie behauptete; doch lehrt die Erfahrung, dass bei nichtanämischen Neuralgien und Neurosen Eisen nicht hilft. Neben sog. kachektischer Wassersucht wird Eisen bei Hydrops in Folge chronischer Nephritiden und von amyloider Entartung der Nieren unter gewissen Verhältnissen gerühmt (Nothnagel).

Die physiologischen Wirkungen der Eisenpräparate ergeben bestimmte Contraindicationen in Bezug auf deren Anwendung. Die durch Eisen gesteigerte Verbrennung verbietet seinen Gebrauch in allen Fällen, wo die Temperatur die Norm übersteigt (Fieber). Die Steigerung des Blutdrucks, welche Martialia hervorbringen, contraindicirt dieselben überall, wo eine Steigerung des Druckes im Aortensystem besteht. Endlich verbietet die störende Einwirkung auf die Verdauung Anwendung bei bestehenden katarrhalischen Affectionen des Magens und des Darmes.

Erhöhte Frequenz des Pulses giebt keine Gegenanzeige hinsichtlich des Eisengebrauches, da z. B. bei Chlorotischen der abnorm beschleunigte Puls unter Eisengebrauch zur Norm zurückkehrt; wohl aber lässt starke Spannung der Arterien Eisencuren als unräthlich erscheinen. Es gilt dies namentlich auch bei hydropischen Zuständen, welche mit Herzklappenfehlern in Verbindung stehen (Traube), — wie überhaupt das Eisen im Allgemeinen bei Herzfehlern verboten ist und nur ausnahmsweise (bei Insufficienz der Aortenklappen) zur Hebung anämischer Zustände Anwendung finden kann —; ferner bei robusten Personen mit normaler und abnorm hoher Blutfülle. In beiden Fällen kann die Steigerung des Blutdrucks zum Auftreten von Blutungen führen und wiederholt hat man in Stahlbädern bei robusten Personen, welche auf eigene Hand die Brunnencur gebrauchten, apoplektische Anfälle als Folge von Gefässzerreissung im Gehirne beobachtet. Diese durch Eisen veranlassten Haemorrhagien lassen den Gebrauch der Eisenmittel insbesondere bedenklich erscheinen, wo Tendenz zu Congestion nach dem Kopfe oder zu Blutungen (Nasenbluten, Blutspeien) vorhanden ist. — Nach Fothergill ertragen ältere Personen Eisenpräparate schlechter als jüngere und ist Eisen bei bestehenden biliösen Zuständen stets zu meiden. Die von Jackson vertretene Ansicht, dass Eisen bei Epilepsie die Anfälle vermehre, gilt keineswegs für alle Fälle und tritt mitunter, namentlich bei Hysteroepilepsie, das Gegentheil ein.

In Bezug auf die Gebrauchsweise der Eisenpräparate bestehen verschiedene Ansichten darüber, ob grosse oder kleine Dosen am zweckmässigsten seien. Auf Grundlage ausgedehnter Erfahrungen müssen wir uns für die kleinen Dosen aussprechen und die 2- bis 3malige Darreichung von 0,1 der meisten Eisensalze als die zweckmässigste Gebrauchsweise bezeichnen.

Der Umstand, dass von grösseren Eisendosen nur ein kleiner Theil resorbiert wird, während der grössere den Darm passirt, macht den Gebrauch grosser Gaben mindestens überflüssig. Es kommt aber noch hinzu, dass die Digestion durch solche mehr leidet, Appetit und Verdauung rasch abnehmen und die Obstipation hartnäckiger ist. Als die passendste Zeit zur Darreichung bezeichnet man jetzt fast allgemein die Zeit der Mahlzeit (Frühstück, Mittagessen, Abendessen) oder kurz nach derselben. Da die Salzsäure des Magensaftes offenbar mit der Resorption der Eisenpräparate in innigem Zusammenhange steht, sind die Stunden nach dem Essen offenbar die passendste Zeit. Nüchtern Eisen zu nehmen, ist nicht nur aus diesem Grunde unpassend, sondern auch, weil die Eisensalze, zumal die stärkeren, ihre Affinität zu Eiweissstoffen dann an der Schleimhaut selbst geltend machen, woraus Druck im Epigastrium, Magenschmerzen und selbst Erbrechen resultiren können.

Bei der grossen Zahl der Eisenpräparate fällt die Auswahl des richtigen Präparates oft schwer. Im Allgemeinen ist bei längerer Darreichung Gebrauch eines milden Eisensalzes vorzuziehen, wobei ziemlich gleichgültig ist, welche Verbindung man wählt, vorausgesetzt, dass diese eine passende Form der Darreichung zulässt. Die beste Form bilden die Pillen, neben welchen Pulver und bei den in Wasser schwerlöslichen Salzen auch Pastillen zulässig sind. Die Darreichung flüssiger Formen hat den Uebelstand, dass sich leicht Gelb- oder Braunfärbung der Zähne einstellt, die zwar in den meisten Fällen nach dem Aufhören der Eisenzufuhr wieder von selbst verschwindet. Manche Tincturen der stärker wirkenden Eisenmittel, z. B. Eisenchloridtinctur, können aber geradezu schädigend auf die Zähne einwirken und sind deshalb zu längerem Gebrauche verwerflich.

Die Wahl der Eisenpräparate ist vielfach Modesache gewesen, manchmal auch Folge von herrschenden Theorien über die Eisenwirkung. In früherer Zeit bevorzugte man die Ferrosalze, weil man glaubte, dass das Eisen als Oxydul in das Blut aufgenommen werde, indessen existirt dasselbe im Blute bald als solches, bald als Oxyd (Sasse), und auch Ferrisalze geben bei Chlorose vortreffliche Resultate. Nach Rabuteaus und Cervellos Untersuchungen ist das Eisenchlorür, da die meisten oder alle Eisensalze als solches resorbirt werden, theoretisch das beste Eisenpräparat. Viel mehr im Gebrauche stehen jedoch das gewöhnlich als mildestes Eisensalz betrachtete Ferrum lacticum, das Carbonat und Malat und neuerdings Eisensaccharat, Eisensyrup und Eisenalbuminat. Nimmt man die Diffusibilität der Eisenmittel als maassgebend, so würden Ferricitrat, Ferrosulfat, Eisenchlorid und die Doppelsalze des Pyrophosphats, auch Eisenalbuminat, welches sich jedoch bei der Diffusion spaltet, als die am leichtesten resorbirbaren Verbindungen in Betracht kommen, während Ferrolactat, Ferricitrat und Ferrovalerianat langsam und unvollständig, Ferrocacbonat, Ferrophosphat und Ferropyrophosphat überhaupt nicht diffundiren (Rosenthal); doch ist die Einwirkung des Magensaftes auf die letztgenannten Verbindungen zu berücksichtigen. Die Verschiedenheit der Beeinflussung diverser Eisenverbindungen durch letzteren beweisen die Versuche von Jandours, wonach Ferrocacbonat, besonders frisch gefällt, leichter als Eisenpulver und dieses leichter als Ferrum oxydulatum und Ferrum oxydatum gelöst wird. Die Bevorzugung einzelner Eisensalze bei bestimmten Krankheitszuständen (Neuralgien, Hydrops) hat keine rationelle Begründung. Die Darreichung von Eisensalzen in Mixturen hat, abgesehen vom Schwärzen der Zähne, auch noch den Umstand gegen sich, dass der Gebrauch der Eisenmittel längere Zeit hindurch fortgesetzt werden muss. Nicht unbeliebt sind Brausemischungen, die sich noch verhältnissmässig am besten nehmen lassen. Für die Darstellung von Pillen benutzt man in der Regel bittere oder aromatisch bittere Extracte, wie man überhaupt gewohnt ist, Martialien mit Amara oder Aromatica zu combiniren. Für manche Eisenverbindungen ist Honig oder Zuckersyrup als Vehikel für Pillen gebräuchlich, um die Oxydation derselben zu verhüten. Zu vermeiden sind überall gerbstoffhaltige Substanzen, weil dieselben zur Bildung einer sehr widrig schmeckenden Verbindung führen. Auch sind Alkalien und Erdsalze, wenn man nicht direct Zersetzung beabsichtigt, zu meiden. Kochsalz scheint die Assimilation des Eisens zu fördern (Woronichin). Sehr häufig combinirt man Eisensalze mit Chinin.

**Ferrum pulveratum**, Limatura Martis praeparata, Pulvis Ferri alcoholisatus; Eisenpulver, Eisenfeile. **Ferrum reductum**; Reducirtes Eisen.

Das gepulverte Eisen ist ein durch Pulvern von weichem Eisen (Eisenfeilspäne der Metallarbeiter, schwarzem Draht) erhaltenes, aschgraues, schwach



metallisch glänzendes, schweres Pulver, welches vom Magnet angezogen wird, beim Auflösen in verdünnter Salzsäure unter Entwicklung von Wasserstoff sich bis auf einen geringen kohligen Rückstand löst und beim Erhitzen unter Verglimmen in schwarzes Eisenoxyduloxyd übergeht. Das Eisenpulver des Handels (aus Fabriken zur Rente und Innichen in Tirol), welches aus Gusseisen bereitet wird, enthält viel Kohlenstoff und ist daher dunkelgrau bis schwarz. Auch das reinste Eisenpulver enthält fremde Beimengungen, wie Kohle, Schwefel, Arsen, Silicium, auch Mangan, Kupfer und Blei.

Das reducirte Eisen ist ein durch Reduction von Eisenoxyd oder Eisenoxalat im Wasserstoffstrome erhaltenes, graues oder schwarzgraues, höchst feines Pulver, welches ein Gemisch aus Eisenmetall und Eisenoxyduloxyd darstellt und daher leichter als *Ferrum pulveratum* ist. Es muss sich in verdünnter Salzsäure bis auf höchstens 1% Rückstand lösen. Auf andere Weise reducirtes Eisen, z. B. das von St. Henry (1858) empfohlene *Ferrum carbonogenio reductum*, hat keinerlei Vorzüge. Das durch Wasserstoff reducirte Eisen, *Ferrum hydrogenio reductum*, heisst auch nach dem französischen Apotheker Quevenne, der es 1840 mit Miquelard in die Praxis einführte, *Fer de Quevenne*.

Die beiden Präparate von metallischem Eisen, welche bei uns officinell sind, sind in ihrer Wirkung auf den Organismus als völlig gleich zu betrachten, obschon das letztere zwar kein Schwefeleisen enthalten kann und deshalb theoretisch weniger Schwefelwasserstoff im Magen entwickelt, und daher ebenfalls in der Theorie weniger leicht zu übelriechendem Aufstossen Veranlassung giebt als das niemals schwefelfreie *Ferrum pulveratum*. In Wirklichkeit ist aber die Bildung von Schwefelwasserstoff nach Einführung des Eisens weniger von dessen Verunreinigung mit Schwefel als von den gleichzeitig im Magen vorhandenen schwefelhaltigen organischen Substanzen abhängig, und in der That entstehen nach dem reducirten Eisen manchmal dieselben übelriechenden Ructus, welche den Gebrauch des *F. pulver.* manchen Personen unendlich machen. Von Vielen wird sogar behauptet, dass beim *Ferrum reductum* die Entwicklung von Gas eine grössere sei, doch löst der saure Magensaft genau dieselbe Menge *Ferrum reductum* wie *Ferrum pulveratum* (Jandours). Die Vortheile, welche beide Präparate darbieten, sind leichte Umwandlung in Chlorür im Magen und Freisein von tintenartigem Geschmacke, weshalb man dieselben in der Form von Pulvern (mit bitteren und aromatischen Mitteln) oder Pastillen geben kann. Man hat das gepulverte Eisen auch bei Atrophie und Chlorose der Kinder (hier nicht ganz zweckmässig mit Magnesia, welche durch Neutralisation der Magensäure der Lösung des Eisens entgegenwirkt) benutzt. Die Anwendung der Eisenfeile als sog. galvanisches Antidot bei Vergiftung mit Quecksilber-, Kupfer- und Bleisalzen ist wegen zu langsamer Wirksamkeit zu verwerfen; ebenso ist der Gebrauch gegen Ascariden und gegen Cholera theils überflüssig, theils nutzlos.

Pharmaceutisch dient Eisenfeile zur Bereitung von Stahlwein, *Vinum chalybeatum s. ferratum*, der durch Digestion mit weissem Wein erhalten wird und das Eisen als Ferrotartrat enthält. Man rechnet dabei 15 Th. Eisen auf 1000 Th. Wein und giebt das Präparat theelöffel- bis esslöffelweise. Das Volk nimmt statt Eisenfeile Schuhnägel oder Eisendraht. Durch Zusatz von Gewürzen, China, bitteren Stoffen lässt sich die Wirksamkeit verstärken (sog. *Vinum Chinae martiatum*). Aus *Ferrum reductum* wird Eisenchocolade gefertigt (1 Th. auf 200 Th. Vanillechocolade), wovon man 40,0 zu einer Tasse rechnet; mit Milch bereitet wird das Getränk schwarz.

*Ferrum oxydulatum s. oxydulatum nigrum*, *Aethiops martialis*, *Oxydum ferroso-ferricum*; Eisenoxyduloxyd, magnetisches Eisenoxyduloxyd, Eisenmohr. Das unter diesem Namen früher gebräuchliche Präparat, hauptsächlich aus  $F^3O^4$  bestehend, wurde wie metallisches Eisen benutzt.

*Ferrum oxydatum fuscum*, *Ferrum oxydatum hydratum*, *Ferrum hydricum*, *Crocus Martis aperitivus*; Eisenhydroxyd, Eisenhydrat. — Das früher officinelle Eisenoxydhydrat stellt ein rothbraunes Pulver dar, das

durch Fällen einer Lösung von 40 Th. Liquor Ferri sulfurici oxydati in der vierfachen Menge Wasser mit 32 Th., ebenfalls mit der vierfachen Menge Wasser verdünnten Liquor Ammonii caustici und Trocknen des Niederschlages bei gelinder Wärme erhalten wird. Es ist ein Gemisch von braunem oder amorphem Eisenoxydhydrat (Eisenoxydtrihydrat) und braunrothem oder metamorphem Eisenoxydhydrat (Eisenoxydbishydrat) und löst sich in Essigsäure und Salzsäure mit Leichtigkeit auf. Mit der Zeit geht es in das in Säuren sehr schwer lösliche rothe Eisenoxydhydrat (Eisenoxydmonohydrat) über. Da das Ferrum oxydatum fuscum ohne Geruch und Geschmack ist, eignet es sich gut zur Darreichung in Pulverform. Die besonderen Empfehlungen gegen Neuralgie, Cardialgie, Magenleiden (Hamilton) und Carcinoma mammae und uteri (Völckel, Carmichael), auch gegen Paralysis agitans, Tetanus, Intermitiens und Cholera, haben keine Bedeutung. Das Mittel ist jedenfalls in kleinen Dosen darzureichen, da die im Magen vorhandene freie Salzsäure nur zur Ueberführung weniger Decigramme in Eisenchlorür ausreicht und der Rest mit den Faeces (meist als Schwefeleisen) wieder abgeht. Die in England bei Neuralgien gebräuchlichen Dosen von mehreren Gramm sind gewiss überflüssig. Auch äusserlich fand Eisenoxydhydrat als Streupulver, Salbe und Pflaster bei Krebsgeschwüren u. s. w. Anwendung.

In letzterer Beziehung wurde früher auch das durch Glühen des Eisenoxydhydrates dargestellte rothe Eisenoxyd, Ferrum oxydatum rubrum s. Crocus Martis adstringens, benutzt, das im Magen nur sehr langsam löslich ist und innerlich gegen Magen- und Darmkatarrhe (als Protectivum), Krebs und harnsauren Gries (zur Beförderung der Oxydation im Blute durch neugebildete Blutkörperchen nach Cantilena) empfohlen wurde. Es dient auch zur Bereitung von Eisenpflastern oder Stahlpflastern, z. B. des in England gebräuchlichen Emplastrum Ferri s. roborans (mit 10 Th. Pflastermasse). Ferner ist es das Hauptingrediens der in Süddeutschland bei Pernionen oft benutzten Wahlerschen Frostsalbe. Natürlich vorkommendes Eisenoxyd ist der sog. Blutstein (Rotheisenstein), Lapis haematites, der seine Rolle als sympathetisches Mittel gegen Blutungen längst ausgespielt hat.

#### **Ferrum oxydatum saccharatum solubile; Eisenzucker.**

Dieses seit mehreren Jahren beliebte Eisenpräparat, welches nach Köhler und Hornemann Eisenhydroxyd mit 6 Aeq. Wasser, welches sich durch seine vollkommene Löslichkeit in Wasser auszeichnet, darstellt, wird von Hager u. A. für eine Verbindung von Zucker und Eisenoxyd erklärt, indem frisch gefälltes amorphes Eisenoxydhydrat bei Gegenwart von Alkali in Solutionen verschiedener Stoffe, u. A. Zucker und Glycerin löslich sei.

Das lösliche Eisensaccharat wurde 1866 von E. Fleischer in Dresden zuerst dargestellt und von Jordan und Timaeus in Zuckerkapseln verkauft. Ein Eisenpräparat von bestimmter Stärke stellte zuerst Siebert in Göttingen her. Nach der Vorschrift der Pharmakopoe wird das Präparat so bereitet, dass einer Lösung von 9 Th. Zucker in 9 Th. Wasser zunächst 30 Th. Eisenchloridlösung, dann nach und nach unter Umrühren eine in der Wärme bereitete und wieder erkaltete Solution von 24 Th. Natriumcarbonat in 48 Th. Wasser und nach Entweichen der Kohlensäure 24 Th. Natronlauge zugesetzt werden und die Mischung so lange stehen bleibt, bis sie klar geworden ist. Nach Zusatz von 9 Th. Natriumbicarbonat wird dieselbe sofort mit 600 Th. siedenden Wassers verdünnt, der entstehende Niederschlag mit heissem Wasser ausgewaschen, ausgepresst, in einer Porzellanschale mit 50 Th. gepulvertem Zucker vermischt, im Dampfbade unter Umrühren zur Trockne verdampft, zu Pulver zerrieben und diesem so viel Zuckerpulver zugesetzt, dass das Gewicht der Gesamtmenge 100 Th. beträgt. Der Eisenzucker enthält hiernach etwa 3% Eisen. Er ist braunröthlich und von mildsüßem, eisenartigem Geschmacke und löst sich in

20 Th. Wasser zu einer braunröthlichen, alkalisch reagirenden Flüssigkeit auf, in welcher Kaliumeisencyanat erst nach Zusatz von Salzsäure schmutziggrünliche und später tiefblaue Fällung erzeugt.

Die Bedeutung des Eisenzuckers für die Behandlung anämischer und chlorotischer Zustände besteht in dem angenehmen Geschmacke und in der milden Wirkung auf die Digestion, so dass er sogar bestehende Dyspepsie nicht steigert. Für die Kinderpraxis ist er offenbar ein sehr zweckmässiges Präparat. Dagegen sind manche ihm nachgerühmte Vorzüge, z. B. dass er die Zähne nicht schwärze, dass er als solcher in die Circulation aufgenommen werde, irrig.

Letzteres ist umsomehr zu bezweifeln, als organische und unorganische Säuren, Gerbsäure, Galle, sowie concentrirte Lösungen von Neutralsalzen, ferner Cetrarin, Salicin, Digitalin, Aloin und Alkaloide ihn in unlösliches Eisenhydroxyd verwandeln. Die stete Anwesenheit der ersteren im Magen dürfte sogar die Vorzüge des Präparates in Schatten stellen, während die letzteren Substanzen natürlich nicht neben dem Mittel zu geben sind. Das Eisensaccharat ist bei uns zuerst in der Form der Fleischerschen Zuckerkapseln von Lebert empfohlen, doch ist diese Form zur Schonung der Zähne am mindesten geeignet. Man kann es zu 2,0—3,0 als Beimengung zu den meisten Speisen (Mehlsuppen, Bouillon, Kaffee, Chocolate, Wein), auch in Aufgüssen der meisten Amara (Quassia, Gentiana, Colombo) administriren (H. Köhler und Hornemann).

Bei Arsenicismus acutus übertrifft das Präparat die Wirksamkeit anderer Eisenoxydhydrate und lässt sich theelöffelweise ( $\frac{1}{4}$  stdl., später seltener) darreichen, wobei Salze und Eiweiss zu meiden sind (H. Köhler).

#### Präparat:

**Syrupus Ferri oxydati solubilis; Eisensyrup.** Mischung gleicher Theile Eisenzucker, Wasser und Syr. simplex. 100 Th. Syrup entsprechen 1 Th. metallischem Eisen. Der Eisensyrup ist eine klare, rothbraune Flüssigkeit von süßem, wenig zusammenziehendem Geschmacke. Man giebt ihn zu einem und mehreren Theelöffeln voll.

**Ferrum carbonicum saccharatum; Zuckerhaltiges Ferrocarbonat, zuckerhaltiges kohlensaures Eisen. Pilulae Ferri carbonici; Eisenpillen.**

Zur Bereitung des zuckerhaltigen Ferrocarbonats filtrirt man 50 Th. Ferrosulfat mit 200 Th. siedendem Wasser in eine geräumige Flasche, welche eine klare Lösung von 35 Th. Natriumbicarbonat in 500 Th. lauwarmen Wassers gelöst enthält, füllt die Flasche ganz mit heissem Wasser und hebt nach längerem Stehenlassen von dem gebildeten Niederschlage die Flüssigkeit ab. Den durch wiederholtes Füllen der Flasche und Decanthiren von der Schwefelsäure befreiten Niederschlag bringt man in eine Porzellanschale, welche 10 Th. gepulverten Milchezucker und 30 Th. gepulverten Zucker enthält, verdampft die Mischung im Dampfbade zur Trockne, zerreibt sie zu Pulver und mischt derselben noch so viel ausgetrocknetes Zuckerpulver zu, dass das Gewicht 100 Th. beträgt. Das auf diese Weise erhaltene Ferrum carbonicum saccharatum bildet ein grünlichgraues Pulver von süßem, schwach adstringirendem Eisengeschmack, das sich unter starker Kohlensäureentwicklung in Salzsäure löst. In 100 Th. enthält dasselbe 10 Th. Eisen.

In gleicher Weise werden durch Zersetzung von Ferrosulfat durch Natriumbicarbonat die Pilulae Ferri carbonici dargestellt, indem der vom Wasser möglichst befreite Niederschlag in einer Porzellanschale mit 8 Th. Zuckerpulver



und 26 Th. gereinigtem Honig gemischt und die Mischung im Dampfbade rasch auf das Gewicht von 40 Th. gebracht wird. Die aus dieser Masse mit Zusatz gepulverter Eibischwurzel bereiteten und mit Zimmt bestreuten Pillen enthalten jede 0,025 Eisen.

Die leichte Zersetzlichkeit des Ferrocarbonats, welches rasch und theilweise schon während der Bereitung seine Kohlensäure verliert und sich in Eisenhydroxyd umwandelt, macht es nothwendig, dasselbe in Form der in der Ueberschrift genannten Präparate vorrätbig halten zu lassen, in welchem der Zucker die Verwandlung verhütet. Indessen ist selbst im zuckerhaltigen Ferrocarbonat eine nicht unbeträchtliche Menge (fast ebensoviel) Eisenhydroxyd vorhanden als Ferrocarbonat, ein Umstand, welcher sicher nichts schadet, da die Annahme, dass das in den Stahlwässern vorhandene Carbonat deshalb auch das beste Präparat des Eisens sein müsse, als irrthümlich bei Seite geschoben ist.

Das *Ferrum carbonicum saccharatum* ist zu 0,5—1,0 zu verordnen und wird entweder in Pulvern oder in Pastillen, die gewöhnlich in verschiedener Stärke in den Apotheken vorhanden sind, gereicht. Eine nicht unzweckmässige Form ist die der daraus dargestellten Pulveres *aërophori martiati*. Man kann solche derart darstellen, dass man ein Eisenoxydulsalz, wozu insbesondere *Ferrum sulfuricum* genommen wird, für sich mit Weinsäure oder Citronensäure versetzt und in Wasser auflöst, dann der Lösung Natrium bicarbonicum zusetzt. Eine solche eisenhaltige Brausemischung bildet auch die in Grossbritannien und Scandinavien noch jetzt gebrauchte und als Antiphthisicum und Antichloroticum gepriesene *Mixtura tonico-antihectica Griffithi* s. *Mixtura Ferri composita*. Durch Auflösen von Eisencarbonat in kohlensäurehaltigem Wasser (0,06 in 250,0) lässt sich auch künstliches Stahlwasser darstellen.

Die *Pilulae Ferri carbonici* ersetzen die unter dem Namen der Vallettschen Pillen bekannten Eisenpillen und die in ganz ähnlicher Weise, jedoch unter Anwendung von Kaliumcarbonat bereiteten Pillen von Blaud, denen Einzelne wegen ihres Kaliumgehaltes eine besonders günstige Wirkung auf die Bildung rother Blutkörperchen bei Chlorose zuschreiben.

**Anhang.** Eisenhaltige Mineralwässer. — An das Ferrocarbonat reihen sich die sehr häufig mit dem günstigsten Erfolge bei Chlorose und ähnlichen Zuständen benutzten eisenhaltigen Mineralwässer an, indem die Mehrzahl derselben, insoweit sie innerlich gebraucht werden, Ferrobicarbonat enthält, welches unter dem Einflusse freier Kohlensäure in Lösung erhalten wird. An einzelnen Orten finden sich auch natürliche Eisenquellen, welche Ferrosulfat enthalten, doch dienen dieselben mit Ausschluss von Ronneby in Schweden hauptsächlich zu Bädern, denen der adstringirenden Wirkung des Eisenvitriols wegen zwar wohl eine locale heilende Wirkung bei manchen chronischen Schleimhautentzündungen, nicht aber eine auf ihrem Eisengehalte beruhende entfernte Action zugeschrieben werden kann. Man hat diese Eisensulfat enthaltenden Wässer Eisenwässer oder Siderokrenen, die Eisenbicarbonat enthaltenden Stahlwässer oder Chalybokrenen genannt. Auch die Stahlwässer werden zu Bädern benutzt, deren günstige Wirkungen bei chlorotischen Neurosen vorwaltend auf den durch ihren Kohlensäurereichthum bedingten Reiz auf die peripherischen Nerven zu beziehen sind. Die Mehrzahl der Stahlwässer enthält im Pfund 3 Cgm. Eisen oder die doppelte Menge Ferrocarbonat. Einige enthalten auch Mangan, andere, wie Cudowa und Franzensbad, nennenswerthe Mengen von kohlensaurem Natrium, noch andere Kochsalz oder doppeltkohlensaures und schwefelsaures Calcium.

Die hauptsächlichsten deutschen Eisenwässer sind Pyrmont (mit 3 Stahlquellen, einer Kochsalzquelle und Soolbädern), Driburg, Elster (mit kohlensaurem Natrium, Chlornatrium und Lithium), Schwalbach, Reinerz und Cudowa in Schlesien, Alexisbad (mit einer eisensulfathaltigen Quelle), Lie-

benstein, Bocklet und Brückenau am Rhön, Freienwalde an der Oder, Petersthal, Griesbach, Rippoldsau und Antogast in Baden, denen sich verschiedene andere minder bedeutende anreihen. In Oesterreich sind Franzensbad und Pyrawarth, in der Schweiz St. Moritz und die Bonifaciussquelle zu Tarasp, in Belgien Spa zu nennen.

**Ferrum lacticum**, *Lactas ferrosus*; **Ferrolactat**, milchsaures Eisenoxydul, Eisenlactat.

Das Ferrolactat bildet grünlich weisse, aus kleinen nadelförmigen Krystallen bestehende Krusten oder ein krystallinisches Pulver von süsslichem, eisenartigem Geschmacke. Es löst sich langsam in 38,2 Th. Wasser zu einem grünlichgelben, schwach sauer reagirenden Liquidum, in 12 Th. heissem Wasser, kaum in Weingeist. Beim Erhitzen verbrennt es unter Entwicklung eines brenzlichen, caramellarartigen Geruchs zu rothem Eisenoxyd.

Das Präparat ist eines der mildesten Eisenpräparate, das, wenn auch die zu seiner Anwendung führende Theorie, dass Eisenmetall und Eisenoxydul im Magen in Lactat umgewandelt würden, irrig ist, doch wegen seiner günstigen Einwirkung auf die Digestion und den Appetit (Bouillaud) Empfehlung verdient.

Man giebt es zu 0,1–0,3 in Pulvern oder Pillen, selten in Lösung, in der das Salz leicht in Ferrilactat übergeht. Gebräuchlich sind auch die von Gélis und Conté angegebenen Dragées. Man hat das Salz auch in Bröckchen verbacken lassen. Auch in den in alter Zeit gebräuchlichen, durch Eintauchen von glühendem Eisen bereiteten Stahlmolken, *Serum lactis chalybeatum*, ist Ferrolactat vorhanden. — Als Einspritzung in erectile Geschwülste wurde es von Brainard versucht.

**Extractum Ferri pomatum**, **Extractum Ferri malici**, **Extr. Ferri cum succo pomorum**; **Eisenextract**, apfelsaures Eisen-Extract.

Dieses einzige extractförmige Eisenpräparat wird in der Weise bereitet, dass 50 Th. ausgepresster Saft von sauren Aepfeln mit 1 Th. oder genügenden Mengen von *Ferrum pulveratum* im Wasserbade erwärmt werden, bis die Gasentwicklung aufhört, die Lösung nach dem Erkalten mit Wasser zu 50 Th. verdünnt und nach dem Filtriren zur Consistenz eines dicken Extractes gebracht wird. Es bildet eine schwarzgrüne Masse, die sich in Wasser fast klar auflöst. Je nach der in den Aepfeln vorhandenen Säuremenge enthält das *Extractum Ferri pomatum* 7–8% metallisches Eisen, bisweilen aber viel weniger, ausserdem Zucker, Dextrin, Eiweiss. Es schmeckt süss dintenhaft und enthält ausser apfelsaurem Eisenoxydul auch apfelsaures Eisenoxyd und, wenn der Saft der Aepfel in Gährung übergegangen ist, auch milchsaures Eisensalz. In seiner Wirkung steht es dem Eisenlactat ziemlich gleich und gehört zu den mildesten Eisenpräparaten. Man giebt es in Pillen oder in Lösung, früher häufig in 10 Th. Malaga-Wein gelöst und mit 3 Th. *Tinctura Aurantii* aromatisirt als sog. *Tinctura Ferri vinosa cum Aurantiis*. In England wendet man ein mit Quittensaft dargestelltes *Extractum Ferri cydoniatum* an; die Versuche, die Früchte von *Sorbus aucuparia* (Janotta) oder *Prunus spinosa* (Enz) den Aepfeln zu substituiren, haben wenig Beachtung gefunden.

**Präparat:**

**Tinctura Ferri pomata**; **Apfelsaure Eisentinctur**. Eisenextract 1 Th. in 9 Th. Zimmtwasser gelöst, filtrirt; schwarzbraun, von mildem Eisengeschmacke, durch Wasserzusatz sich nicht trübend. Zu 20–60 Tropfen mehrmals täglich bei Chlorose; mit Digitalistinctur auch bei Herzkranken.

**Citrate**, **Citrate** und **Phosphate des Eisens**. An die Verbindungen der Milchsäure und der Apfelsäure mit Eisen schliesst sich eine An-

zahl nicht mehr officineller Verbindungen mit organischen Säuren und mit Phosphorsäure an, welche zu den mildwirkenden Eisenpräparaten gehören.

Hierher gehört in erster Linie das Ferricitrat oder citronensaure Eisenoxyd, *Ferrum citricum* s. *Ferrum citricum oxydatum*, das zuerst in Frankreich und Italien als sehr milde schmeckendes Eisensalz Anwendung fand und namentlich in kohlensäurehaltigem Wasser als Ersatz natürlicher Stahlwässer, *Aqua chalybeata cum Ferro citrico*, Anwendung fand. Neben dem Ferricitrat ist auch das Ferrocitrat oder citronensaure Eisenoxydul, *Ferrum citricum oxydulatum*, als Ersatzmittel für Eisensalicylat zu 0,1—0,6 in Pulvern, Pillen oder Pastillen angewandt (Bouchardat), doch geht dasselbe bei längerer Aufbewahrung in das Ferrisalz über. Letzteres bildet glänzende, durchscheinende, gesättigt braunrothe Lamellen oder Körner, welche sich in kaltem Wasser mit gelblicher Farbe vollständig lösen; die Lösung wird durch Zusatz von Säure oder Ammoniak sehr befördert. Nach Thierversuchen von Kölliker und H. Müller soll das Ferricitrat in verdünnter Solution stark diuretisch wirken, während es in concentrirter Solution die Harnsecretion beschränken und selbst Blutharnen bedingen soll. Man hat das Präparat deshalb auch als Diureticum und Tonicum bei Hydrops versucht.

Noch gebrauchlicher als die beiden Citrate ist das als Ferriammoniumcitrat oder citronensaures Eisenoxyd-Ammonium, *Ferrum citricum ammoniatum*, *Ferrum citricum cum Ammonio citrico*, *Ferri-Ammonium citricum*, bezeichnete Doppelsalz, welches 1844 von Béral und Haidlen in den Arzneischatz eingeführt wurde und eines der mildesten Eisenmittel darstellt, welches selbst bei dyspeptischen Zuständen phthisischer Personen und grosser Irritabilität des Magens (Cotton) gegeben werden kann, ausserdem durch das vollständige Fehlen eines styptischen Eisengeschmackes ausgezeichnet ist. In neuerer Zeit hat es sich in Italien den Ruf eines Specificum bei Cholera erworben. Es bildet amorphe, durchscheinende, rothbraune, dünne Lamellen, welche an der Luft Wasser anziehen und sich leicht und schnell in Wasser, dagegen nicht in Weingeist und Aether lösen. Man giebt es zu 0,2—1,0 in Pulver, Pillen, Pastillen und Solution. In der Cholera reichen Ruspini und Guglielmi im ersten Stadium 3mal stündlich 0,5 in Zuckerwasser, im zweiten 1,0 stündlich, im dritten 2,0 halbstündlich; gleichzeitig wird das Mittel im Klystier applicirt.

Ein ähnliches Doppelsalz von Ferricitrat und Magnesiumcitrat ist unter der Bezeichnung *Citras Ferri et Magnesiae* als nicht obstipirend wirkendes Eisenpräparat von Van den Corput empfohlen worden.

Ein analoges Weinsäure-Doppelsalz, der sog. Eisen Weinstein, *Tartarus ferratus* s. *martiatius* s. *chalybeatus*, *Ferro-Kalium tartaricum*, *Tartarus ferrico kalicus*, gehört zu den schon lange gebräuchlichen Eisenpräparaten. Das früher officinelle Präparat dieses Namens, welches durch Digestion von Eisenfeilen mit 5 Th. käuflichem Weinstein gewonnen wurde, stellt ein Gemenge von Eisenmetall, Eisenoxydul, Eisenoxyduloxyd, Ferrotartrat und Ferrokaliumtartrat dar, das sich in 16 Th. Wasser fast vollkommen löst. Man benutzte es zu 30,0—150,0 in Abkochung als Zusatz zu künstlichen Stahlbädern, die freilich wenig Nutzen schaffen können, da das Eisensalz von der äusseren Haut aus nicht resorbirt wird. Früher war dasselbe in Form von Kugeln, Globuli martiales, Stahlkugeln, Eisenkugeln, Boules de Nancy, officinell. Neuerdings empfiehlt Cozzolina, wie schon früher Ricord, Behrend u. A., 10—15% Lösungen zu Umschlägen bei Schanker zur Verhütung von Phagedänismus und diluirte Solutionen (1:50) bei chronischen Urethralblenorrhoen, auch Salben aus Eisen Weinstein bei atonischen Geschwüren.

Zum internen Gebrauche war früher ein in ähnlicher Weise mit reinem Weinstein dargestelltes *Tartarus ferratus purus*, der *Mars solubilis* oder das *Ferrum potabile Willisii* der älteren Zeit, reiner Eisen Weinstein, officinell, welchem man nicht allein diuretische Wirkung und eine Beschränkung der aufregenden Wirkung des Eisens zuschrieb, sondern welcher auch von Mialhe und Soubeiran als das beste Eisenpräparat überhaupt angesehen wurde, weil es vermeintlich als solches in das Blut gelange und dort verbrenne. Man giebt es zu 0,3—0,6 in Pulvern, Pillen oder Lösung, z. B. in Selterswasser oder Wein (statt des beim Eisenmetall erwähnten *Vinum chalybeatum*, in welchem dieses Salz enthalten ist). Mialhes Pastillen bestehen aus 50 Th. Eisenwein-



stein, 1000 Th. Zucker, 10 Th. arabischem Gummi, 30 Th. Vanillezucker und 100 Th. Wasser.

In der früher als Eisenpräparat gebräuchlichen *Tinct. Ferri tartarisati* s. *Tinctura Martis Ludovici* ist ein Gemisch von Eisen Weinstein mit Kalium- und Ferrosulfat enthalten.

Von sonstigen Verbindungen des Eisens mit organischen Säuren nennen wir nur das von Béral und Troussseau und Pidoux bei Chlorose mit Diarrhöe empfohlene Ferrotannat, gerbsaure Eisenoxydul, *Ferrum tannicum*, das neuerdings in England und Frankreich benutzte Ferrooxalat, oxalsaure Eisenoxydul, *Ferrum oxalicum* (Gibert, Henry und Caventon) und das von Guibert bei Neuralgien auf chlorotischer Basis vorgeschlagene Ferrovalerianat, baldriansaure Eisenoxydul, *Ferrum valerianicum*.

Unter den Verbindungen des Eisens mit Phosphorsäure ist das früher officinelle Ferrophosphat oder phosphorsaure Eisenoxydul, *Ferrum phosphoricum*, welches durch Wechsellöser von Ferrosulfat- und Natriumphosphatlösung erhalten wird, ein sehr feines, blaugraues Pulver, das in der Wärme blaugrünlich wird. Es ist in Wasser nicht löslich, wohl aber giebt es mit verdünnter Salzsäure beim Erwärmen eine goldgelbe Solution. Schon von Kopp (1801) als Eisenpräparat gerühmt, ist es wiederholt bei Rachitis und Scrophulose, sowie bei anderen Zehrkrankeheiten, bei Anämie und Blutungen, in der Reconvalescenz von schweren Krankheiten (Sandras) als vorzüglich wirksam bezeichnet. Man giebt es zu 0,1—0,5 in Pillen oder Pulverform.

Das namentlich von Engländern gegen Krebs innerlich (zu 0,3—0,5 3mal täglich) und äusserlich (in Salben von 1:4—8 *Axungia porci*) angewendete Eisenphosphat ist meist das Ferriphosphat, phosphorsaure Eisenoxyd, *Ferrum phosphoricum oxydatum*, gewesen, welches ebenfalls als *Ferrum phosphoricum* bezeichnet wird. Saures phosphorsaures Eisenoxydul, *Ferrum phosphoricum acidulum*, durch grosse Löslichkeit in Wasser und Fehlen des Eisengeschmackes ausgezeichnet, wurde von Routh als besonders wirksam bei Anämie gerühmt, indem auch die Phosphorsäure nutritiv auf Blut und Nerven wirke. Letzteres Salz ist in dem Zahnwehmittel von Schobelt, das tropfenweise auf Watte in hohle Zähne gebracht wird, enthalten.

Um ein lösliches phosphorsaures Eisenpräparat zu erhalten, hat zuerst Perroz und später besonders Leras auf das Doppelsalz von Natriumpyrophosphat und Eisenoxyd hingewiesen, welches anfangs in Lösung als Ferri-Natrium pyrophosphoricum oxydatum liquidum aufbewahrt, später auch in fester Form verordnet wurde.

Das als *Natrium pyrophosphoricum ferratum* s. *Pyrophosphas Ferri et Natrii*, *Ferrinatiumpyrophosphat*, bezeichnete Präparat, welches durch allmälige Mischung von Natriumpyrophosphat mit verdünnter Eisenchloridlösung und Ausfällen mit Weingeist erhalten wird, ist ein weissliches, amorphes Pulver, das sich in kaltem Wasser langsam zu einer grünlichen Flüssigkeit löst, welche durch Zusatz von Weingeist gefällt wird und beim Erhitzen einen weissen Niederschlag von Ferriphosphat absetzt. Das Salz ist wegen seiner leichten Verdaulichkeit sehr geschätzt und kann zu 0,2—0,5 gegeben werden. Man hat daraus künstliche Eisenwässer, die man wie Stahlwässer trinken liess (Leras), auch sog. *Pâtes alimentaires*, welche in Suppe genommen werden, dargestellt (Saquet). Das Salz soll keine Obstipation bedingen. Holdmann hat eine Lösung von Eisenpyrophosphat (3,0) und Eiweiss (4,0) in 120,0 Wasser zu  $\frac{1}{2}$ —1 Spritze voll subcutan empfohlen.

Die Verbindung eines Pyrophosphats mit einem Citrat bildet das 1857 von E. Robiquet vorgeschlagene *Ferrum pyrophosphoricum cum Ammoniac citrico* s. *Ferri-Ammonium pyrophosphoricum*, welches man durch Zersetzen von Eisenchloridlösung mit Natrium pyrophosphoricum und Eintragen des gut ausgewaschenen Niederschlags in eine mit *Liquor Ammonii* zersetzte concentrirte Citronensäurelösung, Verdampfen der gelblichen Flüssigkeit und Trocknen auf flachen Schalen erhält. Es bilden sich so grünliche Lamellen von mildem Eisengeschmacke, welche sich in Wasser leicht und vollständig, dagegen nicht in Weingeist lösen. Das Präparat enthält 16% metallisches Eisen, ist aber nicht ein Doppelsalz, sondern ein Gemenge von Ferri-

citrat und Pyrophosphat und den entsprechenden Ammoniakverbindungen. Man giebt es bei Anämie zu 0,2—0,5 in Pulvern, Pillen oder wässriger Lösung, welche wegen ihrer wenig belästigenden Wirkung auf Zunge und Magenschleimhaut von Griesinger sehr empfohlen wurde.

Das Präparat dient besonders zur Darstellung des theelöffelweise als Tonicum benutzten eisenhaltigen Malzextracts, Extractum Malti fer-ratum. Das früher officinelle Präparat enthielt 2% Ferri-Ammonium pyrophosphoricum. Eine dem Salze analoge Verbindung, das Ferrum pyrophosphoricum cum Natrio citrico (mit 26,6% Eisen), wird in wässriger Lösung von 1:6 als bestes subcutan zu applicirendes, keine örtliche Reizung bewirkendes Eisenpräparat empfohlen (Eulenburg und Neuss).

Eisenalbuminat, Ferrum albuminatum. — Von der Theorie ausgehend, dass die Eisensalze als Albuminat zur Resorption gelangen, hat man wiederholt Versuche gemacht, ein Eisenalbuminat von bestimmtem Gehalte in die Praxis einzuführen. Friese empfahl 1877 gelöstes Eisenalbuminat, Ferrum albuminatum solutum, in Verbindung mit sehr kleinen Mengen Phosphor als souveränes Mittel bei Rachitis und Chlorose. Das Friesesche Präparat wurde durch Zusatz von 10,0 Eisenchloridflüssigkeit zu Albumen ovi unius, Auswaschen des entstandenen dicken, braunrothen Niederschlages bis zur völligen Entfernung der Salzsäure und des Eisenchlorids mit destillirtem Wasser und 72stundenlanges Hinstellen mit 500,0 Wasser, dem 12 Tropfen Salzsäure hinzugesetzt sind, erhalten. Friese fügte zu 250,0 des Präparats, welches angeblich 2,8% Eisen enthielt, in Wirklichkeit aber eine sehr inconstante Zusammensetzung zeigt, 12 Tr. einer Lösung von 0,05 Phosphor in 30,0 Aether und liess von dieser Mischung dreimal täglich einen Esslöffel voll nehmen. Von constanterem Gehalte ist der aus einer klaren Lösung von trockenem Eialbumin (1:10) mit verdünnter Eisenchloridflüssigkeit dargestellte Liquor Ferri albuminati concentratus, von welchem ein Esslöffel 0,03 Eisen entspricht und der beim Gebrauche mit 4 Th. Wasser verdünnt werden muss. Derselbe gestattet auch Zusatz nichtsäurehaltiger Syrupe und bildet in dieser Form ein haltbares und wohlschmeckendes Eisenpräparat, dessen Wirksamkeit bei Chlorose nicht bezweifelt werden kann. Als Ferrum albuminatum solubile in lamellis oder Ferrum albuminatum siccum wird ein durch Verdampfen und Auf-trocknen auf Glasplatten in Form goldgelber, durchsichtiger Lamellen dargestelltes Ferrialbuminat von 3,34% Gehalt an metallischem Eisen bezeichnet. Auch ein zuckerhaltiges, pulverförmiges Präparat, das sich in Wasser nur z. Th. löst (Hager), kam in Pulver, Pastillen und Schüttelmixturen zur Verwendung. Die für die Albuminate besonders angeführte Thatsache, dass dieselben im Magen ohne Weiteres resorbirt würden, berichtigt sich nach Versuchen von Scherppff von selbst, indem die Lösung des Ferrialbuminats in sauren Flüssigkeiten nicht als eigentliche Solution betrachtet werden kann, da jede, auch schwache freie Säure spaltend unter Bildung eines Eisensalzes und Acidalbumin wirkt. Die Resorption erfolgt somit vorzugsweise vom Darne aus nach Bildung von Natrium-eisenalbuminat. Scherppff glaubt, dass das letztere, indem es bei directem Contact mit Blut die Integrität der Blutelemente nicht nur nicht angreift, sondern auch kleine, blasscontourirte Blutzellen zur Norm zurückführt, dass directes Eindringen in die Blutkörperchen selbst statthabe. Da Eisenalbuminat auch vom Unterhautbindegewebe resorbirt wird, liegt die Subcutanapplication desselben nahe, mit welcher Dömitz bei Beriberi auffallend günstige Effecte erzielt haben will. Neben Eisenalbuminat ist auch Eisenpeptonat, Ferrum peptonatum, empfohlen, das beim Mischen von Peptonsolution mit Eisenchloridlösung nach Neutralisation erhalten wird. Es diffundirt rascher als Eisenalbuminat und wird sowohl vom Darm als vom Unterhautbindegewebe aus resorbirt (Scherppff).

Ferrum chloratum, Ferrum muriaticum oxydulatum, Chloretum ferrosus; Eisenchlorür. — Das früher officinelle Eisenchlorür, welches als  $\text{FeCl} + 4 \text{OH}^2$  zu betrachten ist, wurde durch Auflösen von 110 Th. Eisendraht oder Eisenfeile in 520 Th. Salzsäure und schleuniges Abfiltriren der Lösung von dem nicht gelösten Eisen und Abdampfen erhalten, wobei eine feste, blassgrüne Salzmasse resultirt. Das Eisenchlorür ist von herbem Eisengeschmack und in

3,5 Th. Weingeist, sowie in gleichen Theilen Wasser unter Zusatz einiger Tropfen Salzsäure klar löslich. Es ist stark hygroskopisch und oxydirt sich an der Luft rasch, weshalb es sofort bei der Bereitung in kleine erwärmte Gläser gebracht werden muss. Die wässrige Lösung scheidet an der Luft ein basisches Chlorür aus und wird auch theilweise in Eisenchlorid umgewandelt.

Von therapeutischem Gesichtspunkte aus muss das Eisenchlorür als das rationellste sämmtlicher Eisenpräparate bezeichnet werden, da nach den Untersuchungen von Rabuteau und Cervello (1880) nicht nur das Eisen und seine Oxyde, sondern auch sämmtliche mildere Eisensalze und selbst das Eisenchlorid im Magen in Eisenchlorür übergehen, das im alkalischen Blute unter dem Einflusse der Eiweissstoffe, deren Coagulation es verzögert, gelöst bleibt. Bei Zusatz erheblicher Mengen zu Blut färbt es dasselbe rothbraun, aber selbst bei directer Einführung in die Jugularvene zu 0,5 wirkt es auf Hunde nicht toxisch (Cervello).

Da Eisenchlorür weder Hühner- noch Serumeiweiss coagulirt, muss es den milden Eisenpräparaten zugezählt werden, und in der That rühmen ältere Aerzte es geradezu in der Kinderpraxis, wo sie es gegen Rachitis und torpide Scropheln (Hufeland) und selbst gegen Magenerweichung (Pommer) und chronische Darmgeschwüre zu Felde führten. Selbst bei Tuberculose (Siebert) und bei Puerperal- und Wundfiebern (Simpson) sollte gerade dieses Eisenpräparat vorzügliche Dienste leisten. Gegen das Präparat spricht der Umstand, dass man bei seiner Darreichung ausschliesslich auf die flüssige Form angewiesen ist, da bei Anwendung in Pillenform der Tanningehalt der meisten Extracte zu einer Fällung führen würde, auch der herbe Eisengeschmack der Lösungen und die leichte Zersetzlichkeit beim Stehen an der Luft. Man giebt es in wässriger Lösung oder in schleimigen Vehikeln zu 0,1–0,3 innerlich, auch in Syrup (0,8 in 30,0 Syrupus simplex, kaffeeleffelweise; sog. Syrupus Ferri chlorati). Aeusserlich hat es als Gurgelwasser (1:20–30) gegen syphilitische Rachengeschwüre Anwendung gefunden (Fischer).

Eine 10% Eisen entsprechende wässrige Lösung des Salzes war früher als Liquor Ferri chlorati, Ferrum chloratum solutum, Liquor Ferri muriatici oxydulati, officinell, die man zu 5–20 Tr. 3–4mal täglich in Verdünnung mit Wasser oder im schleimigen Vehikel reichte. Cline rühmte das Präparat zu 10 Tr. alle 10 Min. gegen krampfhaftes Harnverhaltung. Eine mit wenig Salzsäure versetzte Lösung von frisch bereitetem Eisenchlorüre in 9 Th. verdünntem Weingeist bildete die wie der Liquor Ferri chlorati benutzte und von Bell bei Morbus Brighti empfohlene gelblichgrüne Chloreisentinctur, Tinctura Ferri chlorati.

**Liquor Ferri acetici, Ferrum aceticum solutum s. liquidum, F. oxydatum aceticum solutum; Ferriacetatlösung, Essigsäure Eisenoxydflüssigkeit.**

Die Ferriacetatlösung wird erhalten, indem man 10 Th. Eisenchloridlösung nach Verdünnung mit 50 Th. Wasser einer Mischung von 10 Th. Ammoniak und 200 Th. Wasser vorsichtig hinzufügt, so dass die Flüssigkeit alkalisch bleibt, das gefällte Eisenhydroxyd nach Auswaschen und Auspressen mit 8 Th. verdünnter Essigsäure bis zur vollkommenen Lösung stehen lässt und der Solution so viel Wasser zusetzt, dass ihr spec. Gew. 1,081–1,083 beträgt. Die Flüssigkeit ist rothbraun, riecht schwach nach Essigsäure, giebt beim Erwärmen einen rothbraunen Niederschlag und wird, mit Wasser bis zur gelblichen Farbe verdünnt, nach Zumischung einer kleinen Menge Salzsäure auf Zusatz von Kaliumsulfoeyanat blutroth gefärbt. Das Präparat enthält 4,8–5% Eisen, während der früher officinelle Liquor Ferri acetici 8% einschloss.

Der Liquor Ferri acetici, wie ihn Klaproth zuerst bereiten lehrte, enthält basisches Ferriacetat ( $\frac{2}{3}$  essigsaures Eisenoxyd), welches beständiger als das in granatrothen Krystallen zu gewinnende neutrale Ferriacetat ist. Das durch Abdampfen des Liquor Ferri acetici auf  $\frac{1}{4}$  unter 25° erhaltene rothbraune, krümliche Pulver, welches als Ferrum aceticum siccum bezeichnet wird, entspricht in seiner Zusammensetzung nicht dem  $\frac{2}{3}$  Eisenacetat.



Das Ferriacetat gehört zu den *Martialia fortiora* und findet als solches kaum jemals intern, sondern nur äusserlich als Adstringens und Haemostaticum Anwendung.

Mit 2 Th. *Ferrum hydricum* in aqua stellt es das von Duflos bei Vergiftung mit Salzen der arsenigen und Arsensäure vorgeschlagene, früher officinelle *Ferrum hydrico-aceticum* in aqua vor. Aeusserlich fand das Ppt. in Verdünnung mit 5—15 Th. Wasser besonders durch Carmichael und Rust zu Umschlägen bei Krebsen und zu adstringirenden Einspritzungen Empfehlung. Pavesi empfahl eine Einspritzung aus *Liquor Ferri acetici* und Chlornatriumlösung in Varicen und Aneurysmen statt Eisenchloridtinctur, um corrosive Wirkung und Embolien zu vermeiden.

#### Präparate:

**Tinctura Ferri acetici aetherea; Aetherische essigsäure Eisentinctur.** *Liquor Ferri acetici* 80 Th., *Spiritus* 12 Th., *Aether aceticus* 8 Th. Braune Tinctur, welche 4% metallisches Eisen enthält. Diese auch als *Spiritus aceticum aethereum martiatum* oder als *Tinctura martialis Klaprothi* bezeichnete Eisentinctur wird innerlich bei Chlorose zu 20—60 Tropfen mehrmals täglich, entweder unverdünnt oder in Syrup, als vom Magen besser tolerirtes Ersatzmittel der Bestucheffschen Tinctur gegeben. Zusatz von Alkali- und Erdsalzen, sowie gerbstoffhaltige Tincturen sind zu vermeiden.

Die *Tinctura Ferri acetici Rademacheri* ist eine spirituöse Tinctur, welche in derselben Dosis gegeben werden kann.

**Ferrum sulfuricum, Ferrum sulfuricum purum, Vitriolum Martis purum; Ferrosulfat,** reines schwefelsaures Eisenoxydul, reiner Eisenvitriol.

Das Ferrosulfat bildet ein krystallinisches Pulver von hellblaugrüner Farbe und zusammenziehendem, tintenartigem Geschmacke. Er löst sich in 1,8 Th. kaltem und in gleichen Theilen warmem Wasser zu einer grünen, an der Luft sich leicht trübenden Flüssigkeit, dagegen nicht in *Spiritus* und verwittert an trockner Luft leicht, wobei es durch Aufnahme von Sauerstoff sich mit einem gelben Pulver von Ferrisulfat überzieht. Erhitzt man Ferrosulfat auf 100° bis zum Gewichtsverlust von 35—36 Th., so verwandelt er sich in eine grünlich-weiße Masse, welche, zu Pulver verrieben, das entwässerte Ferrosulfat, **Ferrum sulfuricum siccum**, darstellt, das sich ebenfalls vollkommen, aber langsam in Wasser auflöst.

Das Ferrosulfat enthält 7 Atome Krystallwasser und wird durch Auflösen von Eisen in verdünnter Schwefelsäure erhalten. Beim Verwittern an der Luft und beim Erwärmen auf 100° gehen 3 Atome Krystallwasser verloren.

Der Eisenvitriol gehört zu den am stärksten local wirkenden Eisensalzen, indem er ähnlich wie das Kupfersulfat Eiweiss coagulirt. Schon kleine Gaben können bisweilen im Magen Empfindungen von Druck und Schwere hervorrufen; auch scheint er von allen Eisenpräparaten am meisten Verstopfung zu bedingen.

Grössere Mengen sind im Stande, bei Menschen Intoxication, selbst mit tödtlichem Ausgange, zu bedingen, wobei die Symptome corrosiver Vergiftung, heftige Leibscherzen und Blutbrechen, vorkommen. Tod ist erst nach sehr grossen Dosen (30,0) beobachtet; bei Thieren sind schon kleinere Dosen (8,0 bei Hunden) tödtlich. Als Gegengift ist kohlen-saures Natrium, *Magnesia*, Eiweiss oder Zuckerkalk (*Tourdes*) zu benutzen. Im Posenschen soll das Mittel viel zu abortiven Zwecken benutzt werden.

Im Ganzen wird der Eisenvitriol wegen seiner übrigen bei kleinen Dosen nicht constanten unangenehmen Nebenwirkungen auf den Magen seltener verwendet.

In einer Anzahl gebräuchlicher Pillen, zu deren Bereitung er benutzt wird, z. B. den Pillen von Bland, ist er in Ferrocarbonat übergeführt. Häufiger ist er als Adstringens bei Darmkatarrhen und Diarrhöen innerlich verwerthet, wo ihn z. B. Krahmer im kindlichen Lebensalter (zu 0,01—0,02 einige Male täglich gegeben) dem Calomel als gefahrloser vorzieht. Früher war Eisenvitriol ein Bestandtheil verschiedener Mittel gegen den Bandwurm, auch ist er ein solcher des Theriak; auch hat er Lobredner bei Diabetes, Phthisis, Intermittens, selbst bei Bleikolik (Gros) gefunden.

Aeusserlich ist der Eisenvitriol als mildes Causticum und als Adstringens wie Zink- und Kupfervitriol benutzt.

Die Aetzwirkung ist keine bedeutende und tritt nur nach Entfernung der Epidermis ein; die geätzten Flächen zeigen anfangs eine röthlich gelbe Färbung. Immerhin ist die caustische Action von einer solchen Intensität, dass das Verschlucken grösserer Mengen von Eisenvitriol heftige Gastritis und selbst den Tod herbeiführen kann. Von Affectionen, bei denen Eisenvitriol als Causticum Anwendung gefunden hat, heben wir Akne, Sykosis und verwandte Hautaffectionen, auch Erysipelas (Compressen mit concentrirten Lösungen aufgelegt nach Velpeau), Nasen- und Rachenpolypen, Pannus, Hornhautflecken hervor. Als Adstringens ist er u. a. zum Verbands von Schankern nach Abfallen des Schorfes, bei Prolapsus ani (Vincent), bei Vergoldern zur Prophylaxe der durch Cyankalium an den Händen hervorgerufenen Geschwüre (Van der Weyde u. s. w.) benutzt.

Innerlich giebt man Ferrum sulfuricum zu 0,03 bis 0,2 nur in Pillenform oder in Brausemischungen.

Pulverform und Lösungen sind des Geschmacks wegen zu vermeiden. Längere Verordnung ist unzweckmässig, weil das Salz sich leicht in Ferrisulfat umwandelt; ebenso sind gerbstoffhaltige Extracte zu meiden.

Aeusserlich wird Eisenvitriol in ätzenden oder haemostatischen Streupulvern (oft mit Alaun, Kohle oder Myrrha) und Injectionen und Umschlägen (1:5—10), in adstringirenden Einspritzungen (1:50—200), in Bädern (30—60,0 auf das Bad, oft mit 120,0 Potasche, hier billiger als Ferrum sulfuricum crudum), seltener in Salben (1:10—20) gegeben.

#### Präparat:

**Pilulae aloëticae ferratae, Pilulae Italicae nigrae; Italienische Pillen.** Ferrum sulfuricum siccum und Aloë pulv. aa mit Spiritus zur Pillenmasse gemacht und in glänzend schwarze Pillen geformt. Innerlich 1—2—4 Pillen pro dosi bei Chlorose.

**Ferrum sesquichloratum, Ferrum muriaticum oxydatum; Eisenchlorid, Eisensesquichlorid, Eisenperchlorid.**

Unter den als *Martialia fortiora* zu bezeichnenden Eisenpräparaten nimmt das Eisenchlorid und besonders dessen als *Liquor Ferri sesquichlorati* bezeichnete wässrige Lösung in der Gegenwart die erste Stelle ein, so dass es die übrigen *Martialia fortiora* fast völlig aus der Therapie verdrängt hat.

Das Eisenchlorid der Pharmakopoe wird durch Verdampfen von 1000 Th. des weiter unten zu betrachtenden *Liquor Ferri sesquichlorati* auf 483 Th. und Stehenlassen an einem kühlen und trocknen Orte, bis die Masse ganz erstarrt, ge-

wonnen und stellt eine gelbe, krystallinische, an der Luft zerfliessende, bei gelinder Wärme zu einer Flüssigkeit von tiefbraunrother Farbe schmelzende, in Wasser, Weingeist und Aether lösliche Masse dar. Das Präparat entspricht der Formel  $\text{Fe}^2\text{Cl}^6 + 12\text{OH}^2$  und ist sowohl vom wasserfreien Eisenchlorid, welches eisenschwarze, irisirende Krystalle bildet als von der in grossen rothen Tafeln krystallisirenden, weit mehr hygroskopischen Verbindung mit  $6\text{OH}^2$  zu unterscheiden. Das Eisenchlorid schmeckt ausserordentlich herbe.

Das Eisenchlorid giebt in conc. Lösung mit Hühnereiweiss und Blut ein festes Coagulum, welches in Säuren nicht ohne Zersetzung löslich ist. Im Körper wird es durch den Contact mit organischen Substanzen zu Eisenchlorür reducirt, als welches es in das Blut überzugehen scheint und im Urin auftritt (Rabuteau, Cervello). Die örtlichen Wirkungen müssen somit auf das freiwerdende Chlor und die gebildete Chlorwasserstoffsäure bezogen werden, während die entfernte Wirkung mit der des Eisenchlorürs übereinstimmen muss.

Auf der coagulirenden Wirkung auf Albuminate beruht die Anwendung als Aetzmittel und als Stypticum, von welchen besonders die letztere dem Liquor Ferri sesquichlorati einen ausserordentlichen Ruf verschafft hat. Ferner basirt darauf die Beschränkung von Secretionen und Entzündungen zugängiger Schleimhäute und die von Pravaz angegebene Behandlungsmethode der Aneurysmen und Varicen, welche jedoch wegen der damit verbundenen Gefahren verlassen werden muss.

Die durch Eisenchloridlösung hervorgebrachte Aetzung ist keine tiefe und kann deshalb nur bei unbedeutenden Neubildungen, z. B. bei Condylomen, fungösen Wucherungen, Caro luxurians, Pa'nnus (Föllin), wiederholte Application des Liquor von Nutzen sein. Bei Diphtheritis hat Eisenchlorid als Causticum (und auch als internes Mittel) einzelne Lobredner gefunden (Schaller, Crighton, Collan). Als Stypticum ist das Mittel, obschon eine contrahirende Wirkung auf die Gefässe sich nur in Concentrationen, welche coagulirende Wirkung haben, und auch dann weit schwächer als bei Silbernitrat und Bleiacetat geltend macht (Rosenstirn), mit grossem Erfolge bei den verschiedenartigsten Hämorrhagien benutzt, so z. B. gegen die profusesten Blutungen bei Carcinoma uteri et vaginae (Kiwisch, Marjolin), wo das Medicament ausserdem den grossen Vortheil bietet, dass es die jauchige Secretion beschränkt, bei Haemorrhagia uteri überhaupt, namentlich in der Nachgeburtsperiode bei Blutungen fungöser Geschwülste (Yvonneau), bei Blutungen nach Zahn-extraction, bei Epistaxis u. a. m. Die Anwendung bei chronischen Blennorrhöen der Urogenitalorgane, bei chronischen Darmkatarrhen und selbst bei Katarrhen der Respirationsorgane hat eine grosse Anzahl von Lobrednern gefunden und scheint das Mittel auch namentlich in solchen Fällen indicirt, wo die Affection sich mit Blutungen complicirt. Ebenso wirkt Eisenchlorid ausserordentlich günstig bei stark eiternden Geschwüren, insbesondere auch bei offenen (und nicht offenen) Frostbeulen (Schaller). Dagegen ist die Anwendung als Injection in Varicen und Aneurysmen zu widerrathen, wenn auch in der That in der Literatur verbürgte Heilungen von Aneurysmen vorliegen (so von Aneurysma der Supraorbitalis nach Deslongchamps, der Art. poplitea nach Niépce u. a. m.), und wenn man auch das Entstehen von hochgradiger Entzündung der Nachbarschaft und Gangrän durch Anwendung diluirter Lösung vermeiden kann, weil die Gefahr von Embolie, welche das Verfahren involvirt, nicht zu beseitigen ist. Indem sich in dem Sacke ein dichtes Blutcoagulum bildet, können Stücke desselben mit dem circulirenden Blute weiter geführt werden und in entfernten Organen Arterien verstopfen. Selbst bei Blutungen grösserer Gefässe in gewissen Partien des Körpers ist Vorsicht geboten. Ich kenne einen Fall, wo eine traumatische Verletzung der Oberlippe und des Pro-



cessus alveolaris des Oberkiefers mit reichlicher Menge Liquor Ferri sesquichlorati bepinselt wurde und der Tod in der Nacht darauf apoplektisch in Folge der Verstopfung einer Hirnarterie erfolgte. Auch die Einspritzung in den Uterus ist gefährlich und hat wiederholt Embolie und Tod im Gefolge gehabt. Nicht viel weniger Gefahren als die Behandlung von Aneurysmen hat die von Leclerc u. A. warm befürwortete Anwendung gegen erectile Geschwülste. Gegen das von Linon befürwortete Bedecken von Varicen mit in Eisenchloridlösung getauchten Compressen ist natürlich nichts zu erinnern.

Innerlich hat Eisenchlorid, abgesehen von Chlorose, Darmkatarrhen und Cholera (Buchheister), besondere Anwendung bei Erysipelas (Ch. Bell, Balfour), Scarlatina, Morbus Brighti (Beale), Rheumatismus acutus (Reynolds) und Hemicranie (Krahmer) gefunden. Die specifischen Wirkungen bei Erysipelas, insbesondere Erysipelas neonatorum und Erysipelas migrans, scheinen indessen keineswegs völlig verbürgt (Velpeau, Clarus). Die interne Anwendung gegen entfernte Blutungen, scorbutische Diathese u. s. w. scheint in manchen Fällen günstig wirken zu können, obschon die Umwandlung des Chlorides in Eisenchlorür die Deutung, dass es auch in entfernten Organen coagulirend wirke, unannehmbar macht.

Lendin empfiehlt Eisensesquichlorid in Fällen von Intermittens, wo Chinin den Dienst versagte.

Bei der internen Anwendung des Mittels hat man sich wohl davor zu hüten, dasselbe in zu hohen Gaben und in zu concentrirter Form darzureichen, weil es leicht zu Irritation des Darmcanals führen kann. Die allgemeine Ansicht, das Eisensesquichlorid müsse stopfend wirken, ist völlig irrig, es kann bei unzweckmässiger Darreichung sehr heftigen Darmkatarrh zuwege bringen, ja in grossen Dosen Gastroenteritis bedingen. Man bedient sich übrigens in der Rezeptur kaum je des Eisensesquichlorides als solchen, da es wegen seiner Hygroskopicität und seiner Zersetzbarkeit in Contact mit den indifferentesten Substanzen, z. B. mit Cellulose, weder zu Pulvern noch zu Pillen sich eignet, sondern benutzt sowohl zum internen als zum externen Gebrauche die officinellen

### Präparate:

1) **Liquor Ferri sesquichlorati**, Ferrum sesquichloratum solutum, Liquor Ferri muriatici oxydati, Oleum Martis; **Eisenchloridlösung**, flüssiges Eisenchlorid. Das Präparat wird erhalten, indem Schmiedeeisen in Form von Draht oder Nägeln mit dem 4fachen Gewichte Salzsäure in dem geräumigen Kolben so lange gelinde erwärmt wird, bis keine Einwirkung mehr stattfindet und die Lösung, welcher für je 100 Th. aufgelösten Eisens 260 Th. Salzsäure und 112 Th. Salpetersäure zugesetzt werden, in einem Glaskolben oder einer Flasche im Wasserbade erhitzt wird, bis sie röthlichbraune Farbe angenommen hat und kein Eisenchlorür mehr enthält, worauf man die Flüssigkeit im Wasserbade abdampft, bis das Gewicht des Rückstandes für je 100 Th. darin enthaltenen Eisens 483 Th. beträgt und schliesslich mit so viel Wasser verdünnt, dass sie 10 mal so viel wie das darin aufgelöste Eisen wiegt. Diese 10% Eisenchloridlösung, welche an die Stelle der früher officinellen 15% getreten ist, ist eine klare, tief gelbbraune Flüssigkeit von 1,280—1,282 spec. Gew. Das Präparat kann innerlich zu 5—10 Tr. pro dosi in starker Verdünnung gegeben werden, wird aber im Allgemeinen wegen seines herben unangenehmen Geschmackes nicht gern genommen. Als Stypticum applicirt man damit getränkte Charpie, welche vor der Application ausgepresst werden muss, oder ein Gemisch mit Collodium. Zum Touchiren von Frostbeulen, bei Impferysipel (Lodge) u. s. w. kann es unverdünnt aufgestrichen werden oder man applicirt eine damit getränkte Compressse. Zu Injectionen verdünnt man es mit 40—100 Th. Aqua destillata. Combinationen sind möglichst zu vermeiden, da organische Substanzen äusserst leicht zersetzend wirken. Ein Zusatz von  $\frac{1}{3}$ —1 Th. Salzsäure wird von Krahmer bei Migräne, wenn dabei starker

Orgasmas und Unruhe besteht, empfohlen. Eine Mischung des Liquor Ferri sesquichlorati mit 3 Th. Weingeist bildet die vielgebrauchte *Tinctura Ferri Perchloridi* s. *Sesquichloridi* der Engländer, welche zu 10—40 Tropfen (häufig in Verbindung mit Liquor Ammonii acetici, wodurch Wechsellöserung bedingt wird) angewendet wird.

2) *Tinctura Ferri chlorati aetherea*, *Spiritus Ferri chlorati aethereus*, *Liquor anodynus martiatus*, ätherische Chloreisenchlorid-; als Ersatz für die *Tinctura tonico-nervina Bestuscheffii*, Bestuscheffs Eisenchlorid-*tinctur*. Man erhält dieselbe, indem man 1 Th. Eisenchloridlösung, 2 Th. Aether und 7 Th. Weingeist in weissen, nicht ganz gefüllten, gut verkorkten Flaschen den Sonnenstrahlen aussetzt, bis die Mischung völlig entfärbt ist, und hierauf die Flaschen an einen kühlen Ort bringt und bisweilen öffnet, bis der Inhalt wieder eine gelbe Farbe angenommen hat. Das Präparat, welches 1% Eisen enthält, bildet eine klare, gelbe Flüssigkeit von ätherischem Geruche und brennendem, zugleich eisenartigem Geschmacke und von 0,850—0,854 spec. Gew. Die *Tinctur* ersetzt ein im vorigen Jahrhundert als Verjüngungsmittel für Personen, welche in *Baccho et Venere* des Guten zu viel gethan, in Ansehen stehendes Arkanum, das als Bestuscheffs Nerventinctur oder als de la Mottes Goldtropfen, *Tinctura aurea tonico-nervina Lamotti*, viele Abnehmer fand. Es darf dieselbe nicht als Eisenchloridlösung angesehen werden, da sich das Eisenchlorid am Sonnenlicht in Chlorür theilweise umsetzt, wobei das freiwerdende Chlor die benutzten Lösungsmittel gleichzeitig unter Bildung von Aldehyd und Chlorsubstitutionsproducten des Aethyläthers verändert. Gegenwärtig findet sie bei Anämie und dadurch bedingten Nervenleiden noch hie und da Anwendung zu 10—20 Tropfen, meist in Verbindung mit aromatischen Tincturen oder Wässern.

3) *Ammonium chloratum ferratum*, *Ammoniacum hydrochloratum ferratum*, *Ammonium muriaticum martiatum* s. *ferruginosum*, *Flores salis ammoniaci martiales*; Eisensalmiak. Durch Eindampfen von 32 Th Salmiak mit 9 Th. Eisenchloridlösung bereitet; gelbrothes, hygroskopisches, in Wasser leicht lösliches Pulver, das etwa 2,5% Fe enthält. An der Luft und am Lichte verändert es sich leicht. Es ist fraglich, ob der Eisensalmiak als eine chemische Verbindung anzusehen ist oder ob derselbe ein Gemisch von viel Chlorammonium mit wenig Eisenchlorid darstellt. Die Indicationen des ersteren (Bronchialkatarrhe und Anschwellungen von Organen, z. B. Milztumoren) in Combination mit Anämie und Cachexie bilden die Indicationen des Präparats, welches in grösseren Dosen die Verdauung leicht stört und selbst Diarrhoe bedingt. Stewart macht darauf aufmerksam, dass man bei Aorteninsufficienz sehr grosse Dosen Eisenchloridlösung geben kann, wenn man 0,03 Salmiak auf 1 Tropfen gleichzeitig giebt. Man giebt das Mittel zu 0,3—1,0 in Lösung (mit aromatischen Wässern und *Succus Liquiritiae* als *Corrigens saporis*), minder zweckmässig in Pillen. Die Pulverform wird durch die Hygroskopicität des Salzes verboten; auch spirituöse Lösungen (z. B. die früher gebräuchliche *Tinctura Ferri ammoniata* s. *Martis aperitiva*) sind unzweckmässig, weil darin im Licht das Eisenchlorid leicht in Eisenchlorür übergeht.

4) *Liquor Ferri oxychlorati*, flüssiges Eisenoxychlorid. — Das Präparat wird bereitet, indem man eine Mischung von 35 Th. Eisenchloridlösung und 160 Th. Wasser in ein Gemisch von 35 Th. Ammoniak und 320 Th. Wasser giesst, den entstehenden Niederschlag nach Auswaschen und Abpressen mit 3 Th. Salzsäure versetzt und 3 Tage stehen lässt, hierauf bis zur vollständigen Lösung gelinde erwärmt und die Flüssigkeit auf das spec. Gew. 1,05 bringt. Das flüssige Eisenoxychlorid bildet eine braunrothe, klare, geruchlose Flüssigkeit von wenig adstringirendem Geschmacke, welche nahezu 3,5% Eisen enthält und mit Spiritus und Zuckerlösung sich leicht mischt. Die auch als basische Eisenchloridlösung bezeichnete Solution entspricht im Wesentlichen dem eine Zeitlang vielgebrauchten *Liquor Ferri dialysati* s. *Ferrum oxydatum dialysatum dilutum* s. *Ferrum catalyticum*, an Stelle dessen es nach der Phkp. dispensirt werden soll. Das dialysirte Eisenoxyd hat seinen Namen davon, dass bei der Darstellung die Dialyse in Anwendung gebracht wird. Wird frischgefälltes Eisen-

hydroxyd sehr langsam in Eisenchloridlösung eingetragen und nach Verdünnung bis auf einen Gehalt von etwa 5% fester Stoffe auf einen Dialysator gebracht, so geht vorzugsweise die Salzsäure und nur wenig Eisenchlorid durch das Pergamentpapier, auf welchem als dunkelrothe Flüssigkeit eine wässrige Lösung von Ferrihydroxyd zurückbleibt, die jedoch niemals ganz frei von Eisenchlorür ist. Das Hydroxyd wird aus einer alkoholischen und wässrigen Lösung durch anorganische und organische Säuren (Essig und Milchsäure ausgenommen), Ammoniak und fixe Alkalien, durch viele Salze und verschiedene feste Körper gefällt; Gerbsäure färbt die Eisenlösung dunkelbraun, nicht blauschwarz, ohne zu fällen. Man hat das dialysirte Eisenoxyd, das übrigens im Handel in sehr verschiedener Stärke vorkommt, entweder als Tonicum bei Anämie und Chlorose oder als Stypticum bei profusen Diarrhöen und Choleradiarrhoe, auch als Haemostaticum bei Blutungen angewendet. Die styptische Wirkung ist indess eine ziemlich unbedeutende. Als Antidot der arsenigen Säure (Reed) ist es unbrauchbar, indem es bei Gegenwart von Säuren, Pepsin und Eiweissstoffen nicht im Stande ist, arsenige Säure in eine unlösliche Verbindung überzuführen. Auch bei Zusatz von Magnesiumsulfat, welches schon in den geringsten Mengen aus der Ferrihydratlösung das Hydroxyd abscheidet, bindet dialysirte Eisenflüssigkeit arsenige Säure nicht. Auch als intern zu nehmendes, tonisirendes Eisenpräparat wird das dialysirte Eisenoxyd von competenten Beurtheilern (Bouchardat, Personne, Rosenthal) als sehr unzuverlässig bezeichnet. Durch Personne ist es in künstlichem Magensaft vollkommen unlöslich und findet sich nach Einführung in den Magen von Hunden nach 2 Std. in flockigem Zustande in der unverdauten Nahrung, während nichts in Lösung gegangen ist. Subcutan zu 15–30 Tr. mit aa Wasser injicirt (Dacosta, Diehl) scheint es zu heftige örtliche Reizung zu veranlassen. Intern kann der Liquor Ferri oxychlorati, welcher übrigens nicht so stark wie das in Frankreich gebräuchliche Peroxychlorure de fer officinale von Béchamp ist, zu 10–15 Tropfen gegeben werden.

**Anhang:** In England wird in ähnlicher Weise wie der Liquor Ferri sesquichlorati eine Lösung von salpetersaurem Eisenoxyd als Liquor Ferri Perinitratris s. Sesquinitratris innerlich (auch bei Cholera und Intermittens) und äusserlich benutzt (Herz, Raynold).

**Ferrum iodatum, Ferrum hydroiodatum oxydulatum, Iodetum ferrosium;  
Eiseniodür, Iodeisen.**

Das Iodeisen wird jedesmal bei der Verordnung ex tempore in der Weise dargestellt, dass Ferrum pulveratum 30 Th., Iodum 82 Th., Aqua destillata 100 Th. in einer Glasflasche so lange erwärmt werden, bis eine grünliche Flüssigkeit resultirt, die durch ein vorher ausgewaschenes Filtrum filtrirt wird. 100 Th. Iodeisen entsprechen 82 Th. Iod. Die Phkp. schreibt vor, bei Verordnung von Iodeisen in flüssigen Mischungen das auf die angegebene Weise dargestellte Präparat zu benutzen, dagegen bei Verordnung in Pillenform die Flüssigkeit vorher noch bei gelinder Wärme zu concentriren. Die Vorschrift der Phkp. umgeht das Verdampfen zur Krystallisation, bei welchem sehr leicht unter Ausscheidung von Eisenhydroxyd eine Zersetzung stattfindet. Die durch das Abdampfen resultirenden blassgrünen Krystalle von Eiseniodür enthalten 4 Aeq. Krystallwasser. Weder diese noch die durch directe Vereinigung zu Eisenfeile mit Iod erhaltene wasserfreie braune Verbindung sind ihrer Zersetzlichkeit halber medicinisch zulässig. Ein haltbares pulverförmiges Präparat erhält man durch Eindampfen mit Milchzucker. Ein solches, welches 20% Eiseniodür, entsprechend 16,4% Iod und 3,6% Eisen, enthielt, war früher als zuckerhaltiges Iodeisen, Ferrum iodatum saccharatum, officinell. Das in 7 Th. Wasser fast klarlösliche Präparat wurde zu 0,2–0,8 in Pulvern, Pillen oder Lösung verwandt. Monti benutzt es als Antisyphiliticum bei kleinen Kindern, von 0,02 täglich 2mal bei Neugeborenen und 3–6mal täglich bei ältern Kindern auf 0,04 täglich 3–6mal steigend.

Eine besondere Stellung unter den Eisenpräparaten nimmt



das Iodeisen ein, welches die Wirkungen zweier mächtiger Arzneimittel, des Eisens und des Iods, mit einander verbindet und deshalb eben so wohl den alterirenden als den plastischen Mitteln zugerechnet werden könnte. Diese doppelte Wirkung ist um so erklärlicher, als das Iodeisen im Blute oder in den Organen eine Zersetzung erleidet, so dass das Iod rasch durch den Urin wieder ausgeschieden wird, während das Eisen langsamer durch Galle und Darm eliminirt wird (Quevenne, Melsens). Das Iodeisen erscheint deshalb bei Complicationen von Dyskrasien und Diathesen, welche den Gebrauch des Iods erheischen, mit Oligämie als das rationellste Präparat, welches auch bei derartigen Fällen sich praktisch in entschiedenster Weise bewährt.

Die theoretischen Bedenken gegen das Mittel, welches zuerst 1831 durch Pierquin, dann besonders von Thomson empfohlen wurde, sind vor der praktischen Erfahrung als irrelevant erfunden. Einige wollten es nicht als Eisenpräparat betrachten, weil es zu wenig Eisen enthalte, Andere, wie Ricord, bestritten die Iodwirkung, weil es keine Atrophie der Mamma bedinge, was andere Iodpräparate auch nur ausnahmsweise thun, und weil das Iod zu rasch eliminirt werde, um wirken zu können; doch sind die Verhältnisse der Iodelimination bei Iodkalium ganz ähnliche. Grössere Dosen erregen bei Hunden in den Magen gebracht Erbrechen und Durchfall, oft mit Blut untermischt; die Wirkungen bei Infusion in die Venen sind nach der Concentration verschieden, indem nach Einspritzung diluirter Lösungen nur Stuhlzwang und vermehrte Diurese, in conc. Solution embolische Erscheinungen auftreten (Cogswell). Grössere Dosen können bei Menschen Diarrhoe und Appetitlosigkeit bedingen. Der von Ricord auch bei längerem Gebrauche beobachtete pustulöse Hautausschlag, der sich meist im Gesicht fand und oft unter gelinden Fiebererscheinungen sich entwickelte, scheint weniger dem Mittel als der Krankheit der von Ricord ausschliesslich damit behandelten Syphilitiker zugeschrieben werden zu müssen.

Die besten Erfolge giebt Iodeisen bei Scrophulose, wenn die betreffenden Kranken blass und kachektisch erscheinen, und bei Chlorotischen, bei denen Residuen im kindlichen Lebensalter vorhandener Scropheln sich finden, während es bei anderen Affectionen, gegen welche es empfohlen wurde, entweder nur als Unterstützungsmittel anderer Curen Anwendung verdient oder ganz ohne Nutzen ist.

Letzteres gilt von den Empfehlungen bei Skirrhen (Thomson), Rheumatismen (Clendening), Hydrops, Scorbut (Dunglison), Caries und besonders bei Haemoptysis, chronischer Pneumonie und Tuberculose (Dupasquier), wo in der Regel die Reizungsphänomene schlimmer werden. Als Unterstützungsmittel anderer Curen ist Iodeisen bei Lupus hypertrophicus und mehreren anderen Hautleiden auf scrophulöser Basis zulässig. Man hat es auch bei Amenorrhoe (Pierquin), bei Gastrodynia chlorotica (Krieg), bei Milzhypertrophien (Schönlein), Galaktorrhoe (Guéneau de Mussy), Enuresis nocturna (Barclay) endlich äusserlich bei Tripper und atonischen Geschwüren (Ricord) hie und da mit Nutzen versucht.

Innerlich kann es zu 0,05—0,2 in Pillen (z. B. in den in Frankreich gebräuchlichen Iodeisenpillen von Blancard und Perrens), Pulver oder Solutionen gereicht werden.

Als Lösungsmittel wird Glycerin (Lambert-Séron) empfohlen. Zu Injectionen hat man wässrige Lösungen von 1:100 verwerthet, zu Salben rechnet man 1:5—10 Fett oder Paraffinsalbe.

## Präparat:

**Syrupus Ferri iodati; Iodeisensyrup.** Die Bereitung des Iodeisensyrups geschieht in der Weise, dass man 20 Th. Eisenpulver und 41 Th. Iod in 300 Th. Wasser unter Umschütteln bei gelinder Wärme zur Lösung bringt, letztere auf 650 Th. Zucker filtrirt und einmal mit demselben aufkocht. Der Syrup, welcher 5% Iodeisen enthält, ist frisch fast farblos, wird aber bei längerer Aufbewahrung gelblich. Wegen seiner leichten Zersetzbarkeit ist die Aufbewahrung in kleinen Gläsern, in denen ein Stück gereinigter Eisendraht befindlich ist, an trockenem Orte durchaus nöthig. Innerlich zu 1,0—5,0 mehrmals täglich, am besten mit der 3—5fachen Menge Syrupus simplex oder einem anderen (jedoch nicht gerbstoffhaltigen oder sauren) Syrup verdünnt.

Statt des ausserordentlich leicht zersetzlichen Iodeisens hat man neuerdings das iodsäure Eisenoxyd, *Ferrum iodicum*, als besser haltbar in Anwendung gebracht (M'Dowell). Das Brom Eisen, Eisenbromid, *Ferrum bromatum*, von welchem schon einige Decigramme, in die Venen gespritzt, den Tod von Thieren bedingen sollen, und welches auch in grossen Mengen im Magen energische Aetzwirkungen entfalten soll (Höring), ist bei Hypertrophie des Herzens und des Uterus (Magendie, Werneck), bei Anämie mit Nervenstörungen (Garnier und Prince), als Antiscrophulosum, bei Hysterie und Leukorrhoe (Glover), sowie äusserlich bei Flechten, Lymphdrüsenentzündungen und Erysipelas (Gillespie) angewendet. Das Cyaneisen, *Ferrum cyanatum* (Eisencyanürcyanid, Berliner oder Pariser Blau), kann wegen völliger Unlöslichkeit in den Körpersäften weder antichlorotisch noch antispasmodisch, höchstens mechanisch bei Diarrhöen wirken, und ist deshalb mit Recht vergessen.

## Verordnungen:

- |  |  |
|--|--|
| <p>1) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Ferri pulverati</i> 2,5<br/> <i>Pulv. rad. Gentianae</i><br/> — <i>cort. Cinnamomi</i><br/> <i>Sacchari albi</i> <math>\overline{\text{aa}}</math> 5,0<br/> <i>M. f. pulv. D. in scatula. S.</i> Dreimal<br/> täglich eine Messerspitze voll.</p> <hr/> <p>2) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Ferri sulfurici</i><br/> <i>Natrii carbonici</i><br/> <i>Extracti Gentianae</i> <math>\overline{\text{aa}}</math> 4,0<br/> <i>M. f. l. a. pilul. No. 60. Consp. pulv.</i><br/> <i>Cinnam. D. S.</i> Täglich 3—4 Pillen.<br/> (Lebert.)</p> <hr/> <p>3) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Ferri sulfurici</i><br/> <i>Kalii carbonici</i> <math>\overline{\text{aa}}</math> 15,0<br/> <i>Gummi Tragacanthae</i> 5,0<br/> <i>F. l. a. pilul. No. 100. Consp. cort.</i><br/> <i>Cinnam. D. S.</i> Dreimal täglich 3 bis<br/> 4 Pillen. (Niemeyers modificirte<br/> Blaudsche Pillen, welche ursprüng-<br/> lich mit Gi. Arabic. und Syr. spl. be-<br/> reitet werden.)</p> <hr/> <p>4) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Kalii carbonici</i> 1,0<br/> <i>Myrrhae</i> 2,0<br/> <i>Contere in</i><br/> <i>Aq. Rosae</i> 100,0</p> | <p><i>In lagenam immissa misce c.</i><br/> <i>Ferri sulfurici</i> 1,0<br/> <i>Sacchari albi</i> 6,0<br/> <i>antea in</i><br/> <i>Aq. destillatae</i> 40,0<br/> <i>solutis. M. D. S.</i> 4 Mal täglich 1<br/> bis 2 Essl. (<i>Mixtura Griffithi</i><br/> <i>Ph. Dan.</i>).</p> <hr/> <p>5) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Ferri carbonici saccharati</i><br/> <i>Natrii bicarbonici</i> <math>\overline{\text{aa}}</math> 5,0<br/> <i>M. f. pulv. Div. in partes aequales No. 8.</i><br/> <i>D. S. No. 1.</i></p> <hr/> <p><math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Acidi tartarici</i> 5,0<br/> <i>Elaeosacchari Citri</i> 2,5<br/> <i>M. f. pulv. Divide in partes aequales</i><br/> <i>No. 8. D. S. No. 2.</i> Ein Pulver<br/> No. 1 in Wasser aufzulösen und nach<br/> Hinzuschütten eines Pulvers von<br/> No. 2 während des Aufbrauens zu<br/> trinken.</p> <hr/> <p>6) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Ferri sulfurici</i> 2,0<br/> <i>Sacch. albi</i> 6,0<br/> <i>M. f. pulv. Div. in part. aeq. No. 12.</i><br/> <i>S. No. 1.</i></p> |
|--|--|

R  
*Natrii bicarbonici* 2,0  
*Sacch. albi* 6,0  
*M. f. pulv.* Divide in partes aequales  
 No. 12. S. No. 2. In Wasser von  
 jeder Nummer ein Stück zusammen  
 zu trinken. (Menzers Stahlpulver.)

7) R  
*Ferri sulfurici*  
*Natrii bicarbonici* 15,0  
*Acidi tartarici* 25,0  
*Sacchari albi* 30,0  
*M. f. pulv.* D. in scatula. S. Kaffee-  
 löffelweise in Zuckerwasser.  
 (Mialhes Eisenbrausepulver.)

8) R  
*Ferri lactici* 25,0  
*Sacchari albi* 300,0  
*Gummi Arabici q. s.*  
*ut f. pastillae ponderis* 0,60. *Obducantur*  
*Amylo et Vanilla saccharata.* D. S.  
 1—2 Stück zu nehmen. (Dragées  
 de Lactate de fer, deren jede  
 0,6 Eisenlactat enthält.)

9) R  
*Ferri lactici*  
*Extracti Gentianae* aa 2,0  
*Pulv. rhizom. Calami q. s.*  
*ut f. pilul.* No. 60. *Consp. pulv.* Cin-  
 nam. D. S. Dreimal täglich 2—4  
 Pillen steigend.

10) R  
*Ferri phosphorici* 1,0  
*Calcii phosphorici*  
*Natrii chlorati* aa 3,0  
*M. f. pulv.* Divide in partes aequales  
 No. 10. D. S. Zweimal täglich ein  
 Pulver.

11) R  
*Extracti Ferri pomati* 3,0  
*Pulv. rhizom. Calami q. s.*  
*ut f. pilul.* No. 60. *Consp. pulv. cort.*  
 Cinnam. D. S. Dreimal täglich 2  
 bis 5 Stück.

12) R  
*Tincturae Ferri pomati* 15,0  
 — *Digitalis*  
 — *Vanillae* aa 5,0  
*M. D. S.* Dreimal täglich 15—30 Tr.  
 (Bei Chlorose mit heftigen Palpita-  
 tionen oder Herzklappenfehler.)

13) R  
*Ferri pyrophosphorici cum Am-*  
*moniaco citrico* 3,0  
*salve in*  
*Aq. florum Aurantii* 120,0  
*Syrupi simplicis* 30,0  
*M. D. S.* 2—3 Mal täglich 1 Esslöffel.

14) R  
*Liquoris Ferri chlorati* 10,0  
*Aquae Cinnamomi* 125,0  
*Syrupi Aurantii florum* 25,0  
*M. D. S.* Dreimal täglich 1 Esslöffel.

15) R  
*Liquoris Ferri sesquichlorati* 5,0  
*D. S.* 1—2 Tropfen in einem Ess-  
 löffel Haferschleim, anfangs  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ ,  
 später 1—2—4 stdl. (Als Stypticum  
 bei Darmblutungen, Ruhr, profusen  
 Diarrhöen.)

16) R  
*Liquoris Ferri sesquichlorati*  
 2,5—7,5  
*Aq. dest.* 125,0  
*M. D. S.* Zur Einspritzung. (Als  
 blutstillende Injection.)

17) R  
*Liquoris Ferri sesquichlorati* 1,5  
*Aq. dest.* 100,0  
*M. D. S.* Zur Inhalation. (Bei Hä-  
 moptysis, Bronchorrhoe.)

18) R  
*Syrupi Ferri iodati* 10,0  
 — *Aurantii florum*  
 — *simpl.* aa 50,0  
*M. D. S.* Dreimal täglich 1 Esslöffel  
 voll.

19) R  
*Ferri pulverati* 2,0  
*Iodi* 4,0  
*Sacchari* 3,5  
*Rad. Liquirit. pulv.* 7,0  
*Aq. dest.* 2,5  
*M. f. pilul.* No. 100. *Consp. D. S.*  
 1—2 Pillen 2—3 mal täglich. (Pilu-  
 lae Ferriiodati Ph. Brit. Ersetzt  
 die Blancardschen Pillen und ähn-  
 liche Gemische.)



**Manganum sulfuricum; Mangansulfat.**

Als Mittel bei Chlorose sind das Mangansulfat und verschiedene andere Mangansalze von verschiedenen Aerzten mit Erfolg versucht worden, doch können die Erfahrungen über den Werth der Manganpräparate bis jetzt als nicht abgeschlossen bezeichnet werden.

Das Mangansulfat bildet rosenrothe, rhombische, verwitternde Krystalle, welche mit 0,8 Wasser eine neutrale Lösung geben, dagegen in Alkohol unlöslich sind. An Stelle dieses, dem Ferrosulfat entsprechenden und wahrscheinlich auch in seinem Verhalten gegen eiweissähnlichen und daher wahrscheinlich örtlich entzündungserregend wirkenden Salzes sind auch das Manganchlorür, Manganum chloratum (in Wasser und Weingeist löslich), das Mangancarbonat, Manganum carbonicum und ein Doppelsalz von Eisen- und Manganlactat, Ferro-Manganum lacticum, als milder wirkend in Anwendung gezogen.

Die zuerst von Hannon befürwortete Anwendung von Manganpräparaten in Fällen von Chlorose, wo Martialia nicht völlig zum Ziele führen, liegt aus doppelten Gründen nahe, insofern einerseits das Mangan ebenso gut wie das Eisen normaler Bestandtheil des Organismus ist und andererseits die nahe chemische Verwandtschaft beider Metalle auch gleiche physiologische und therapeutische Wirkung des Mangans und Eisens voraussetzen liess. Die bisherigen spärlichen physiologischen Untersuchungen weisen eine solche mit Sicherheit nicht nach. Bei directer Einführung in die Venen tödten milde Mangansalze (Lactat, Citrat) Kaninchen zu 0,25 und Hunde zu 1,0 in kurzer Zeit nach vorausgehender Herzlähmung unter Krämpfen und Pupillenerweiterung, während kleinere Dosen einen allgemeinen Schwächezustand, fettige Degeneration der Leber und Tod nach mehreren Tagen herbeiführen (Laschkewitsch). Die quergestreiften Muskeln werden durch Mangansalze nicht alterirt (Harnack). Die früher behauptete Vermehrung der Galle, deren Asche nach Weidenbusch verhältnissmässig viel Mangan enthält, wird von Rutherford in Abrede gestellt. Mangansulfat bewirkt in grösseren Dosen bei Thieren Verätzung der Magenschleimhaut (Gmelin), beim Menschen, zu 0,2—0,5 wiederholt gereicht, flüssige Stuhlentleerungen und Erbrechen. Bei Fütterung von Thieren mit mildwirkenden Mangansalzen steigt Harn und Harnmenge bei gleichbleibender Temperatur; im Harn findet sich wenig Mangan wieder (Laschkewitsch).

Noch weniger erwiesen als die Existenz einer sog. Manganchlorose und der Heileffekte von Mangansalzen bei einer solchen sind die günstigen Wirkungen bei Syphilis, Scrophulose, Krebs, Amenorrhoe und Hydrops, wo man Manganverbindungen zu 0,1—0,3 pro dosi in Pulvern oder Brausemischungen verwendet hat. Das Mangansulfat ist auch in Salbenform (1:5), worin es leicht Pusteln auf der Haut erzeugt (Hoppe), bei Scabies, Drüsenanschwellungen und Rheumatismus benutzt, auch in Lösung als Stypticum, wie Eisenvitriol und Eisenchlorid, an dessen Stelle Pétrequin Manganeisenchlorid, Mangano-Ferrum perchloratum, empfahl.

**Extractum carnis Liebig, Extractum carnis; Fleischextract, Liebigs Fleischextract.** — Den Uebergang von den unorganischen zu den organischen plastischen Mitteln bildet das früher officinelle vorzugsweise als Diäteticum, selten als eigentliches Medicament verwervthete Fleischextract, welches fabrikmässig nach dem von Liebig (1837) angegebenen Verfahren aus dem Muskelfleische verschiedener, zur Ernährung benutzter Säugethiere dargestellt wird und seine Wirksamkeit vorzugsweise den in ihm enthaltenen anorganischen Salzen dankt. Es bildet eine braune, etwas hygroscopische, nach gebratenem Fleische riechende und schwach salzig-säuerlich, eigenthümlich schmeckende Masse von der Consistenz eines weichen Extracts, hie und da mit körnigen Ausscheidungen durchsetzt, welche sich in Wasser klar und leicht löst und in wässriger Lösung nach Zusatz von etwas Kochsalz einen der Rindfleischbouillon ähnlichen Geschmack besitzt. Es wird besonders in Südamerika im Grossen fabricirt, namentlich zu Fray-Bentos an den Ufern des Uruguay in einer 1864

von Giebert gegründeten und von Liebig besonders patronisirten Fabrik, ausserdem von Buschenthal zu Montevideo in Uruguay, ebenso in Buenos Ayres; auch in Australien hat man Fleischextract nach Liebig's Principien bereitet. Zur Darstellung dient hauptsächlich das Muskelfleisch des Rindes und Büffels, in Australien auch das des Schafes. Die chemische Zusammensetzung des Fleischextracts ist nach der Beschaffenheit des dazu verwendeten Fleisches sehr verschieden. Dasselbe stellt im Wesentlichen nichts anderes als eine eingedickte Fleischbrühe, welcher kein Leim beigemischt ist, dar. Nach den Untersuchungen des Fray-Bentos-Fleischextractes, welche auf den preussischen landwirthschaftlichen Lehranstalten 1866 ausgeführt wurden, schwankt der Gehalt an Wasser zwischen 13 und 29 %, an unorganischen Bestandtheilen (Asche) zwischen 10,53 und 21,45 %, der der organischen Substanz zwischen 49 und 68 % und der Stickstoffgehalt der organischen Substanz zwischen 5 und 9,35 %. Nach Stöckel soll Ochsenfleisch keine Natriumsalze führen, und Liebig leugnete in dem Fray-Bentos-Extract das Vorkommen von Chlornatrium, welches jedoch nach den eben angeführten Analysen bis zu 6 % der Asche betragen kann. Jedenfalls sind in letzterer die Kalisalze prävalirend, indem das Kali 32—46,5 % derselben ausmacht. Daneben findet sich Natron (9—14 % der Asche), Kalk, Magnesia und Eisen; von Säuren ist die Phosphorsäure (23—38 % der Asche) vorwaltend; ausserdem finden sich Schwefelsäure, Kieselsäure und Chlor. Von organischen Bestandtheilen enthält das Fleischextract Milchsäure (2,87 %), deren Gegenwart wie diejenige von sauren Phosphaten die saure Reaction des Fleischextractes bedingt, Fett, leimartige Substanz, Kreatin, Kreatinin, Inosinsäure, Sarkosin, Inosit und Ameisensäure, nach J. Weidel auch eine dem Theobromin ähnliche organische Base, das Carnin. Diese letztgenannten Substanzen, welche man in der Regel als Extractivstoffe des Fleisches zusammenfasst, sind weniger für die Wirkung des Fleischextracts als für den Wohlgeschmack der daraus bereiteten Lösungen von Bedeutung, insbesondere besitzt Inosinsäure fleischbrüh-ähnlichen Geschmack und entwickelt beim Erhitzen auf Platinblech angenehmen Bratengeruch. Den wesentlichsten Antheil an der Wirkung des Fleischextracts auf den Thierkörper haben, wie Kemmerich 1869 zeigte, die Kalisalze desselben, und Fleischextract wirkt wie diese in kleinen Mengen pulsbeschleunigend und temperaturerhöhend, in grösseren Dosen dagegen tötet es durch Lähmung der Herzaction. Unterstützt wird die Wirkung der Kalisalze durch das Kreatinin, welches bei subcutaner Injection ebenfalls Steigerung der Herzaction und Temperatur bedingt, die jedoch nicht so exquisit wie die durch Fleischextract bedingte ist (Bogoslawski).

Das Liebig'sche Fleischextract ist zwar keineswegs als ein Nutriment oder Medicament zu betrachten, welches als vollständiges Ersatzmittel des Fleisches dienen kann und dessen gesammten Nährwerth repräsentirt; es ist jedoch offenbar das beste aller Fleischpräparate, welche zur Verwerthung wesentlicher nahrhafter Principien des Fleisches in einer die Digestionsorgane nicht beeinträchtigenden Form bis auf den heutigen Tag in Anwendung gezogen sind. Kemmerich und Mayer bewiesen die directe ernährende Wirkung des Fleischextracts durch Thierversuche, indem sich bei Fütterung mit Eiweissstoffen und Kochsalz keine Gewichtsvermehrung ergab, welche sich bei Zusatz von Fleischextract einstellte.

Man giebt das Fleischextract in der Form einer mit Kochsalz versetzten heissen, wässrigen Lösung, wobei man 2,5 Gm. auf eine grosse Tasse Bouillon rechnet. Als Tagesgabe bezeichnet Kemmerich 5,0 für den Erwachsenen; nach 3tägigem Gebrauche von 15,0 beobachtete er Herzklopfen und ekzematösen Ausschlag. Die übertriebene Anwendung bei Kindern ist jedenfalls zu widerrathen.

Fleisch, Caro. — Das als Nahrungsmittel benutzte Fleisch besteht zur Hauptsache aus den Muskelfasern, denen sich Bindegewebe, Fettzellen, Gefässe mit ihrem Inhalt, endlich auch Nervenzellen beimengen. Die Muskelfasern bestehen aus dem Sarkolemma, welches der leimgebenden Substanz nahe steht, und dem flüssigen Inhalte, der contractilen Substanz. In der Muskelflüssigkeit sind verschiedene Eiweisskörper vorhanden, zunächst das bei gewöhnlicher Zimmertemperatur gerinnende Myosin, welches sich in 10 % Kochsalzlösung

und, indem es sich in Syntonin verwandelt, in verdünnten Säuren löst, ferner Kalialbuminat, Serumeiweiss, ein rother Farbstoff, dann die obengenannten Salze und Extractivstoffe, welche als Abkömmlinge der Eiweissstoffe zu betrachten sind.

Der ganze Nährwerth des Fleisches kann dem Körper nur dann zu Theil werden, wenn wir dasselbe als solches, und ohne es durch Zubereitung bestimmter Bestandtheile zu berauben, einführen. Eine solche Beraubung findet aber in gewisser Weise schon durch die gewöhnlichen Proceduren der Kochkunst statt, und so ist denn als nahrhaftestes Fleisch unstreitig das rohe Fleisch, welches fein geschabt der Einwirkung des Magensaftes keine grösseren Hindernisse entgegengesetzt als gebratenes Fleisch, zu bezeichnen. Die Benutzung desselben als Nahrungsmittel für Greise und atrophische Kinder ist in hohem Grade zu empfehlen, und nur der einzige Umstand, dass der Gebrauch desselben mitunter in Folge der Verwendung finnigen Fleisches (auch im Rindfleisch kommt ja der *Cysticercus cellulosae* vor) Bandwürmer bedingt, ist bei dem gegenwärtigen Zustande unserer Schlachthygiene als Uebelstand hervorzuheben. Nächst dem rohen Fleische ist das gebratene das beste, indem namentlich beim Braten desselben in grossen Stücken im Innern die grössere Partie des Fleischsaftes zurückgehalten wird und weil bei Anwendung nicht zu grosser Hitze das Fleisch selbst leichter im Magensaft löslich wird, während bei längerem Erhitzen auf 100° die Fleischfasern hornartig fest und minder leicht verdaulich werden. Diese Verhältnisse sind für den Arzt von grosser Wichtigkeit, zumal bei der Behandlung von Reconvalescenten mit schwacher Verdauung. Gekochtes Fleisch passt für dieselben nicht und ist überhaupt ein schlechtes Nahrungsmittel, da durch das Erwärmen und Kochenlassen mit Wasser eine Auslaugung des Fleisches stattfindet, durch welches demselben wesentliche Nahrungsstoffe entzogen werden. Es sind dies namentlich die Salze, von denen über 82% (Keller) in das Wasser übergehen, während nur die Erdphosphate zurückbleiben; ausserdem wird, wenn die Erwärmung langsam stattfindet, auch ein grosser Theil der Eiweissstoffe des Muskelsaftes gelöst, welcher bei Anwendung stärkerer Hitze auch der Brühe nicht zu Gute kommt, sondern sich in Flocken ausscheidet (sog. Fleischschaum, vom Volke als Mittel bei Decubitus, Intertrigo u. s. w. für sich oder mit geschlagenem Eiweiss benutzt). Die durch Kochen von Fleisch in Wasser erhaltene Flüssigkeit ist als gewöhnliche Fleischbrühe oder Bouillon, Jus, Juscum, von der Liebig'schen Fleischbrühe, Infusum carnis salitum s. Infusum carnis frigide paratum, zu unterscheiden. Die letztere stellt einen unter Beihülfe von Salzsäure gemachten kalten wässrigen Auszug von gehacktem Fleisch dar, welcher, wenn er sorgfältig bereitet wird, nicht nur die Salze, sondern auch einen grossen Theil der Eiweissstoffe, und noch dazu in gelöster Form, enthält. Dieses röthlich aussehende Präparat, welches Verdeils Bouillon fortifiantie entspricht, ist ein vorzügliches Nahrungsmittel, das, um die Fällung der Eiweissstoffe zu verhindern, kalt und ohne Zusatz von Kochsalz genossen werden muss; es hat jedoch den Uebelstand, dass es schlecht schmeckt und nur kurze Zeit haltbar ist, namentlich im Sommer sehr leicht verdirbt. Man wird deshalb in der Regel bei Kranken zur gewöhnlichen Fleischbrühe zurückkehren, deren Nährwerth durch Verrühren mit einem Ei, durch Zusatz von Kohlehydraten u. s. w. erhöht werden kann und welche gut bereitet — am besten aus gehacktem Fleisch durch nicht zu intensives Kochen nach Art des sog. Beef-tea der Engländer — ein vortreffliches Restaurationsmittel für Erschöpfte, eine Wohlthat für alle Kranken, welche feste Kost nicht ertragen, das beste Mittel zu künstlicher Ernährung bei Patienten, welche nicht schlucken können oder wollen (sitophobische Geisteskranke), darstellt. Für diese Fleischbrühe bietet nur das oben besprochene Fleischextract einen Ersatz; denn es ist im Wesentlichen nichts Anderes wie eingedickte Fleischbrühe ohne Fett und ohne Leim, wie solcher, aus dem Bindegewebe des Fleisches durch Kochen entstanden, in der gewöhnlichen Fleischbrühe sich findet. Es gewährt den Vortheil, dass es sich Jahre lang, auch unter dem Einflusse von Luft, brauchbar erhält und dass man daraus durch Zusatz von heissem Wasser und Kochsalz Bouillon von beliebiger Stärke in kürzester Zeit herstellen kann. Ueber die Vorzüge des Geschmacks der frischen Bouillon vor der aus Fleischextract zu bereitlebenden kann zwar wohl kein Zweifel bestehen; dass es Personen giebt, welche die in der



letztangegebenen Weise gefertigte Bouillon oder Suppe, auch mit Zusatz von fein geschnittenen Daucuswurzeln oder anderem Gemüse, sich ernstlich verbitten, weiss jeder Arzt. Der Preis des Fleischextracts ist verhältnissmässig hoch; immerhin aber ist namentlich für Spitäler, in denen das gekochte Rindfleisch nicht hinreichend verworther werden kann, auch im Fleischextract ein Ersparungsmittel gegeben. Sicher ist Liebig's Verdienst unbestritten, aus Ländern, wo bisher das Fleisch grosser Säugethiere geradezu verloren ging und nur die Häute Verwendung fanden, auch ersteres zum allgemeinen Nutzen der Menschheit in Form des Fleischextracts verworther zu haben.

Für den Arzt ist die Bestimmung der Fleischsorten bei der Diät von Reconvalescenten und Erschöpften manchmal von Bedeutung. Früher hielt man das sog. weisse Fleisch (Geflügel, Kalbfleisch) für leichter verdaulich als das braune (Rindfleisch, Schöpfenfleisch). Diese Unterscheidung nach der Farbe ist vollständig unhaltbar. Man hat zunächst den Gehalt an Fett zu berücksichtigen, welches, wenn es in reichlicherer Menge vorhanden, leicht die Digestion stört, weshalb im Allgemeinen Gänse-, Schweine- und Hammelfleisch sich schlecht als Nahrungsmittel für Reconvalescenten empfehlen. Dann kommt die chemische Zusammensetzung, welche immerhin gewisse Differenzen zeigt, wenn auch die Schwankungen verhältnissmässig enge Grenzen zeigen. Bestimmend muss vor Allem der Gehalt an löslichem Albumin und an Extract sein. Von letzterem liefern die wilden Thiere im Allgemeinen mehr als die zahmen, worauf zum Theil der grosse Nahrungswerth des Wildprets beruht. Von löslichem Albumin enthält das Fleisch des Ochsen fast 2%, das des Kalbes nur 1,3%, weshalb der Nahrungswerth des Kalbfleisches ein geringerer als der des Rindfleisches ist; das Reh steht dem Ochsen nahe, das Huhn hat mehr lösliches Eiweiss (22,7%), weshalb auch die Hühnerbouillon kräftiger ist als Rindfleischbouillon. Hiernach ist Geflügel, Wildpret und Rindfleisch (roh oder leicht gebraten) am empfehlenswerthesten. Auch Fische enthalten viel lösliches Eiweiss; doch belästigen sie oft den Magen. In allen Fällen aber kommt es, wie oben dargelegt wurde, sehr auf die Zubereitung an, und zu langes Braten vermindert stets die Verdaulichkeit. Uebrigens ist die Saftigkeit und Zartheit des Fleisches nicht nur bei einzelnen Individuen derselben Species, sondern auch bei den einzelnen Muskeln desselben Thieres in höchstem Grade verschieden.

Man hat gewissen Thieren einen besonders grossen Nahrungswerth zugeschrieben, ohne dass dafür ein stricter Beweis vorliegt. Es gilt dies von den Krebsen, sowohl Fluss- als Seekrebsen (Hummer, Garneelen), ferner von den Muscheln, *Mytilus edulis* L., und Austern, *Ostrea edulis* L., deren Genuss indess dem Magen eines Reconvalescenten schwer zusagt; namentlich rufen Krebse leicht Indigestion und Urticaria hervor, während Garneelen, Muscheln und Austern unter gewissen, noch nicht gekannten Verhältnissen geradezu giftige Eigenschaften annehmen und choleraähnliche Erscheinungen und selbst den Tod herbeiführen können. Einige Bedeutung für die Therapie hat nur die ebenfalls, vorzüglich in katholischen Ländern als Fastenspeise benutzte Weinbergschnecke, *Helix Pomatium* L., welche übrigens auch durch das Fressen giftiger Kräuter (*Buxus*, *Atropa*) giftig werden kann. Dieselbe galt — wie auch andere Schnecken, z. B. die grosse Waldschnecke, *Arion empiricorum* L. — als Heilmittel bei Phthisis und Husten, wogegen man sie in Abkochung (sog. Schneckenbouillon) oder mit Zucker (Schneckensyrup) oder als Extract (sog. Helicin) gab. Diese Mollusken gehören, wie früher analog benutzte Reptilien und Batrachier, z. B. der als *Aphrodisiacum* im Orient noch heute geltende *Scincus marinus* L., die gegen Aussatz benutzte *Viper* u. a. m. den Zeiten an, wo auch der Mensch als *Mumia* in den Reihen der Drogen figurirte. Der Curiosität halber erwähnen wir noch, dass man den Vorschlag gemacht hat, Wasserschnecken (*Paludina vivipara* L.) mit Arzneimitteln (Opium, Iod) zu füttern, um sie als Opiat oder Kropfmittel zu gebrauchen.

**Peptone.** — Besondere Aufmerksamkeit haben in der neuesten Zeit als Ersatzmittel der Eiweissstoffe die Peptone erregt, worunter man im Allgemeinen die Producte versteht, welche aus dem Eiweiss der Nahrung unter dem Ein-

flüsse des Magensaftes und des Pepsins und im Darne durch den Pankreassaft sich bilden. Obschon man eine Zeit lang die Bedeutung der Peptone für den Organismus wesentlich unterschätzte, indem man dieselben nur als in Harnstoff zerfallende Zersetzungsproducte des Eiweiss, welche zum Aufbau der Gewebe nicht nothwendig seien, bezeichnete (Brücke, Fick) oder indem man betonte, dass Eiweissgenuss auch ohne Peptonisirung der Albuminate zu Steigerung der Harnstoffausscheidung führe und dass die zur Resorption gelangenden Peptone vermöge ihrer Leichtzersetzlichkeit in den Säften zuerst zerfielen und dadurch einen Theil des circulirenden Eiweisses von dem Untergange bewahrten und so nach Art des Leims als Sparmittel wirkten (Voit), ist man doch seit den Versuchen von Plosz und Maly wiederum allgemein zu der Ueberzeugung gelangt, dass das Pepton in vollkommener Weise das Eiweiss der Nahrung zu ersetzen vermag. Der Name Pepton wird übrigens im Handel verschiedenen Producten beigelegt, die nach längerer oder kürzerer Einwirkung künstlicher Verdauungsgemische auf Eiweiss resultiren. Durch tagelange Digestion entsteht ein Körper, dem sämtliche Eigenschaften der Fällbarkeit des Eiweiss fehlen, der nur durch Alkohol präcipitirt wird, sich in Wasser vollkommen löst, leicht diffundirt und mit Natronlauge und Kupfersulfat sich roth färbt (Pepton von Mulder). Hiervon unterscheidet sich das neuerdings bei uns vorzugsweise therapeutisch benutzte Pepton von Adamkiewicz, ein bei kürzerer (mehrständiger) Einwirkung der Verdauungsflüssigkeit entstehendes Product, welches, ausgenommen durch Kochen, durch alle bekannten Fällungsmittel des Albumins und bei syrupöser Consistenz selbst durch Wasser gefällt wird, dessen sämtliche Niederschläge sich aber beim Erwärmen wieder lösen. Dieses letztere Product, welches den Eiweisskörpern weit näher steht als Mulders Pepton, in welchem nach Henninger und Hofmeister bereits der Fäulniss nahestehende Zersetzungen (Hydrationen) stattgefunden haben, verweilt nach den Versuchen von Adamkiewicz kürzere Zeit im Darm als unverändertes Eiweiss, wird rascher resorbirt und unterliegt den Einflüssen des Stoffwechsels schneller, so dass die Harnstoffausscheidung schon in den ersten 12 Std. eine Steigerung erfährt, während die Indicanausscheidung nicht zunimmt. Der Vergleich der Mengen des ausgeschiedenen Stickstoffs und der Grössen der Körpergewichtszunahme bei Parallelfütterung ergab zugleich, dass das fragliche Pepton das Eiweiss an Nährwerth übertrifft. Dieses von Witte in Rostock fabrikmässig dargestellte Pepton, welches man am leichtesten aus Blutfibrin erhält und das bei zweckmässiger Darstellung kein Muldersches Pepton oder solches doch nur in Spuren enthält, bildet, durch Alkohol gefällt und bei etwa 30° vorsichtig getrocknet, eine spröde, gelbe und durchscheinende Masse, die zerrieben ein in Wasser, namentlich bei vorsichtigem Erwärmen lösliches, weisses, geruch- und geschmackfreies Pulver giebt. Dasselbe büst, im trocknen Zustande längere Zeit aufbewahrt, einen Theil seiner Löslichkeit in Wasser ein; Säuren und Alkalien befördern die Löslichkeit. Auf dieses Pepton bezieht sich der von Curschmann (1879) berichtete Fall monatelanger Ernährung einer Frau durch einen künstlichen After mit täglich 4mal 50,0 Pepton, Bouillon und Nestléschen Kindermehl bis zur völligen Genesung. Bei der Darreichung des Adamkiewiczschen Peptons ist natürlich nicht zu übersehen, dass dasselbe den Nährwerth des Fleisches erst dann repräsentirt, wenn man ihm dessen Extractivstoffe (Liebig's Fleischextract) zufügt. Für einen Erwachsenen von 70—80 Kg. Körpergewicht empfiehlt Adamkiewicz 100,0 Pepton, 300,0 Stärke, 90,0 Oel, Butter oder Schmalz und 30,0 Kochsalz mit 1 Liter Fleischbrühe vorsichtig erwärmt und schliesslich einige Male aufgekocht, tassenweise tagsüber verbrauchen zu lassen oder bei Ernährung vom Rectum aus warm mittelst eines Irrigators bis hoch in die Flexura sigmoidea zu injiciren. Zweckmässig erscheint auch die Peptonchokolade von Püschel, von der jede Tafel einen Nährwerth von 50,0 Muskelfleisch besitzen soll. Neben dem Adamkiewicz'schen Pepton ist übrigens in Frankreich, Holland und England noch viel Muldersches Pepton, z. B. Pepton von Sander in Amsterdam, Pepton von Catillon und Deffrène in Paris im Handel, welche Flüssigkeiten von sehr verschiedenem Peptongehalte darstellen und hierdurch, sowie theilweise durch unangenehmes Aussehen und widrigen Geruch nicht besonders empfehlenswerth sind. Man macht daraus auch in Paris Syrupe, Weine und Elixire, statt mit Salzsäure mit Weinsäure bereitet.

Als billigen Ersatz der Peptone empfiehlt Jaworski eine Lösung von 40,0 Salzsäure, 0,5 Pepsin und 1000,0 Brunnenwasser mit 500,0 gehackten Rindfleischs Nachts über an einem warmen Orte stehen zu lassen und am Morgen noch 1000,0 Brunnenwasser und Küchengemüse hinzuzufügen und das Ganze 1 bis 2 Std. zu kochen, nach dem Zerfliessen des Fleisches in Butter geröstetes Mehl zuzufügen und noch einmal aufzukochen, dann vor dem Gebrauche von einer Lösung von 40,0 Natriumcarbonat in 100,0 Wasser unter stetem Umrühren so lange zuzugießen, bis kein Brausen mehr eintritt und der saure Geschmack aufhört. Auch dieses billige, im Geschmack gewöhnlicher Fleischbrühe ähnliche Peptonnährmittel kann per anum gereicht werden. Gebrauchlicher als diese Mischung sind übrigens für die Ernährung vom Mastdarm aus die ebenfalls hierhergehörigen Pankreas- und Klystiere von Leube, ein Gemisch von 3 Th. höchst fein zerhacktem Rindfleisch mit 1 Th. Pankreas vom Rinde oder Schweine, mit heissem Wasser zu dünnem Brei verrührt. Die Möglichkeit, durch pankreatisiertes Fleisch im Klystier Kranke mit Oesophagusstricturen monatelang in genügender Weise zu ernähren, ist neuerdings mehrfach durch Sée nachgewiesen, doch tritt schliesslich stets Proctitis ein, welche die Fortsetzung der Klystiere und damit die Erhaltung des Lebens unmöglich macht.

Ein beachtungswerthes Fleischpräparat bildet auch Leubes *Solutio carnis*, Fleischsolution, welche durch mehrstündiges Kochen von gehacktem Fleisch im Papinschen Topfe in mit Salzsäure versetztem Wasser erhalten wird und die Fleischalbuminate in Syntonin und theilweise in Peptone übergeführt und die Muskelbündel in feinen Detritus verwandelt enthält. Dieselbe eignet sich nach Leube als vorzügliches Nährmittel bei organischen Erkrankungen des Magens, namentlich in frischen Fällen von Magengeschwür, als ausschliessliches Nahrungsmittel für sich oder in Bouillon (auch mit *E. carnis*). Auch bei manchen Formen der Dyspepsie, wo der Magen der Ruhe bedarf, empfiehlt sich dies Präparat.

Blut, *Sanguis*. — Von der immer mehr Bedeutung für die Therapie gewinnenden Transfusion abgesehen, nimmt das Blut als Medicament ziemlich untergeordnete Bedeutung ein, was sich zum Theil wohl daraus erklärt, dass grössere Mengen von Blut innerlich eingeführt in den meisten Fällen nur ungen und mit Widerwillen von Kranken genommen werden. Dass das Blut unserer verschiedenen Haustiere (Säugethiere, Vögel) nicht unbedeutenden Nährwerth besitzt, bedarf keiner Erwähnung, und die Versuche, dasselbe aus Schlachthäusern als Nahrungsmittel in Form von Suppen (Glück) für die ärmere Bevölkerung zu benutzen, verdienen gewiss Aufmunterung. In wie weit das Blut bei Erschöpfung, Chlorotischen, Blutarmen besser wirkt als Fleischpräparate, Milch und Eisen, ist jedoch nicht abzusehen. Man hat aus Blut verschiedene Präparate hergestellt, unter denen das im Wasserbade verdampfte Ochsenblut als *Extractum sanguinis bovini*, welches bei Rachitis, Scrophulose und Atrophie im kindlichen Lebensalter zu 0,5—4,0 3—4mal täglich in Pulverform verordnet wird (Mauthner), am meisten Bedeutung gewonnen hat; doch löst sich das Präparat schlecht in künstlichem Magensaft und kann selbst zu Digestionsstörungen führen. Aehnlich sind die aus Hammelblut mit Zusatz von Natriumphosphat dargestellten *Capsulus hématiques* von Foy. Tabourin hat neuerdings sein durch Digestion des ausgepressten Blutkuchens mit angesäuertem Alkohol, Ausfällen mit Alkali und Reinigen erhaltenes Haematosin (*Haemoglobin*) als leicht verdauliches Eisenpräparat bei Chlorose und Anämie empfohlen. Ueber die Verirrungen der Volksmedizin, welche das frische Blut Hingerichteter gegen Epilepsie und das Menstrualblut junger Mädchen gegen Warzen empfahl, haben wir Grund, den Mantel der Barmherzigkeit zu hüllen.

Ova *gallinacea*, Hühnereier, Eier. — Die Eier von *Phasianus gallus* L. s. *Gallus domesticus* Temm. bestehen, von der vorzüglich Calciumcarbonat enthaltenden Schale (*Testa*) und der Schalenhaut (*Pellicula*) abgesehen, aus dem Eiweiss, *Albumen ovi*, und dem Eigelb oder Eidotter, *Vitellus ovi*. Hartgesottene Eier geben 11 % Schale, 32 % Dotter und 57 % Eiweiss. Das Hühnereiweiss enthält 86—87 % Wasser und 13—14 % feste Bestandtheile; letztere bestehen zum grössten Theile aus löslichem Albumin mit wenig Fett, Zucker und



löslichen Chloralkalien, neben welchen sehr geringe Mengen von Carbonaten und Sulfaten vorhanden sind. Der Eidotter enthält nur 50% Wasser, ausserdem 16% Eiweiss (sog. Vitellin und Albumin) und 30% in Aether lösliche fette Körper und Farbstoffe, sowie  $1\frac{1}{2}\%$  anorganische Substanzen, welche überwiegend aus Phosphaten bestehen. Das Eierfett ist phosphorhaltig und giebt bei Behandlung mit Mineralsäuren Phosphorglycerinsäure.

Der Nahrungswerth der Eier macht dieselben in rohem oder weichgekochtem Zustande zu einem auch für Kranke, zumal Kinder, geeigneten Nahrungsmittel, mit welchem man sogar in den ersten Lebensperioden die Milch ersetzen wollte, wo diese wegen bestehender Magensäure und Durchfälle nicht passt (Jolly). Indessen werden grössere Mengen Eier, selbst weichgekochter, häufig nicht gut ertragen und scheinen dieselben, namentlich in kindlichem Lebensalter, nur in fein vertheiltem Zustande mit Fleischbrühe verrührt, passend. In England gelten rohe Eier als Mittel bei Ikterus.

Das Hühnereiweiss findet medicinische Verwendung als Gegengift bei den meisten kautischen Stoffen, am zweckmässigsten in der Form der von Orfila vorgeschlagenen Aqua albuminata (4–8 Eier auf 1–2 Liter lauwarmes Wasser). Da Eiweiss sowohl mit Basen als mit Säuren sich verbindet, kann es gegen Mineralsäuren, ätzende Alkalien und die meisten Metallsalze in Anwendung gezogen werden. Ferner dient Eiweiss als demulcirendes Mittel bei Ruhr und Durchfällen (zu 10–20 Eiern pro die mit 1 Liter Wasser innerlich und im Klystier) und äusserlich bei Verbrennungen, Decubitus u. s. w. (mit Fetten als Liniment oder zu Schaum geschlagen mit etwas Brantwein). Ferner ist es gegen Intermittens (zu 2–3 Eiweiss mit Zimmpulver) von Séguin, hie und da auch bei Ophthalmie benutzt. Mehr Bedeutung hat es pharmaceutisch zum Klären trüber Flüssigkeiten und zur Darstellung verschiedener Metallalbuminate (Eisenalbuminat, Sublimatalbuminat).

Der Eidotter dient medicinisch vorzugsweise als Demulcens bei Anginen und katarrhalischen Affectionen der Luftwege (mit Syrup, Honig oder heissem Zuckerwasser) und ist als Nutriens, mit Zucker, Milch oder Fleischbrühe verrührt, von vorzüglichem Werthe, da er auch von Kranken tolerirt wird, welche andere Nahrungsmittel nicht ertragen. So giebt man ihn bei Magenkrebs, Phthise, auch bei heftigen Durchfällen im kindlichen Lebensalter mit günstigem Erfolge. Man verbindet ihn bisweilen mit Zimmt- oder Pfefferminzwasser, auch mit Wein oder Franzbrantwein, letzteres z. B. in der Mixtura Spiritus Vini Gallici (aus aa 120.0 Sp. V. Gall. und Zimtwasser, 2 Eidottern, 15.0 Zucker und 2 Tropfen Zimmtöl bestehend und esslöffelweise gegeben). Mit Wasser verrührt und etwas Kochsalz versetzt bildet Eidotter den sog. Potus antatrophicus. Aeusserlich dient Eigelb bei Verbrennungen und Excoriationen entweder für sich oder mit fetten Oelen, z. B. mit aa Baumöl als Linimentum e vitello ovorum, wogegen man früher auch das aus dem gekochten Dotter durch Pressen erhaltene dickflüssige Eieröl, Oleum ovorum, das auch bei Hornhautgeschwüren Verwendung fand, benutzte. Pharmaceutisch wird Eidotter zum Emulgiren von Harzen oder Oelen gebraucht, wobei 1 Th. etwa  $\frac{1}{2}$  Th. Gummi Arabicum gleich kommt. Zur Darstellung von Salben, wozu man sowohl rohes als gekochtes Eigelb verwertete, ist er minder zweckmässig, weil er leicht auf der Haut auf-trocknet und dadurch unbequem wird.

Die Eierschalen sind innerlich als säuretilgendes Mittel, auch gegen Hustenreiz und bei Lithiasis benutzt. Die Schalenhaut rühmte Hennemann bei Ischurie zur Bedeckung der Glans, auch dient sie zum Schutze von Schnittwunden und Verbrennungen ähnlich wie Spinnweben und analoge Substanzen.

Serum lactis, Molken. — Die Molken oder süssen Molken bilden, in ähnlicher Weise wie das Fleischextract sich zum Fleische verhält, keinen vollständigen Ersatz für das zu seiner Darstellung benutzte Material, die Milch, welche hinsichtlich ihres Nährwerthes einen ausserordentlich hohen Rang einnimmt. Auch die Molken enthalten nur die Nährsalze der Milch, welche wie beim Fleisch vorzugsweise aus Kalisalzen und Alkali- und Erdphosphaten bestehen, neben Milchzucker und können deshalb auch zur Ernährung des gesunden und kranken Organismus nur als Unterstützungsmittel bei gleichzeitiger

gehöriger Zufuhr von Albuminaten und Kohlehydraten dienen. Nach Valentin enthalten Kuhmolken 93,3 % Wasser, 1,08 % Albumin, 5,1 % Milchzucker, 0,1 % Fett und 0,59 % Salze und Extractivstoffe; die Ziegenmolke ist ärmer an Milchzucker, dagegen reicher an Fett (0,37) und an Salzen (0,58), die Schafmolke ihrem Salzgehalt nach etwa der Ziegenmolke gleich, aber von geringerem Fettgehalte (0,25), dagegen bedeutend reicher an Eiweissstoffen (2,13).

Die officinelle Molke wird in der S. 183 angegebenen Weise aus der Kuhmilch mittelst Lab dargestellt und bildet eine gelblichweisse, süsslich-salzig, nicht sauer schmeckende Flüssigkeit. Der bei Behandlung von Milch mit Kälberlab resultirende Labkäse hat durch Küchenmeister bei Indigestion und Diabetes Empfehlung gefunden.

Genaue Untersuchungen über die Wirkungen der Molken bei Gesunden, namentlich in Hinsicht auf den Stoffwechsel, liegen bis jetzt nicht vor.

Dass die Molken bei Thieren nicht als ausschliessliches Nahrungsmittel dienen können, ist durch directe Versuche erwiesen (Lebert). Bei gesunden und kranken Menschen sieht man nach Mengen unter 100,0 selten ausser Beschleunigung der Peristaltik irgend einen Effect; grössere Mengen (500,0—1000,0 bis 1500,0) rufen oft Störung des Appetits und der Verdauung, mitunter Leibschmerzen und stärkeren Durchfall hervor. Die eingeführte grosse Wassermenge führt natürlich auch zu Vermehrung der Uropoëse und (da Molken warm getrunken werden) auch der Diaphorese.

Die Molken finden ihre hauptsächlichste Verwendung curmässig bei chronischen Krankheiten der Respirations- und Verdauungsorgane (sog. Molken-curen), welche man meist in besonderen Curanstalten, selten in der Heimath des Kranken durchmachen lässt; seltener bei acuten Leiden der Athemwerkzeuge (Bronchitis, Keuchhusten) oder bei Fieber.

In dem letzteren Falle dürften die sog. sauren Molken und Tamarindenmolken den Vorzug verdienen, während zur Cur im Allgemeinen nur die süssen Molken benutzt werden. Derartige Molken-curen lässt man am zweckmässigsten an Orten durchmachen, wo gleichzeitig ein günstiger Einfluss des Klimas zu hoffen steht. Man wählt deshalb sog. Sommerfrischen, wie sie theilweise die Alpen und Voralpen, theils aber auch unsere deutschen niedrigen Gebirge bieten. Besucht sind besonders Curorte in dem Canton Appenzell (Gais, Heiden, Weissbad, Wolfshalden) und einige andere Schweizer Molken-curorte (Horn, Rorschach, auch Interlaken), in Oesterreich Partenkirchen und Ischl, in Deutschland Kreuth und Reichenhall, Streitberg, Harzburg, Rehburg, Salzschlirf, Salzbrunn, Reinerz u. a. m. In den meisten dieser Orte dient die Milch von Kühen oder Ziegen zur Molken-darstellung, in Schlesien vielfach Schafmilch, ohne dass die Wirkung durch die Abstammung irgendwie beeinflusst würde. Uebrigens sind die meisten Badeörter jeder Art auch mit Vorrichtungen für Molken-curen versehen.

Dass die günstige klimatische Lage und die gesunde Luft an solchen Orten oft mehr thut als die Zufuhr der Molken, wenn Schwindsüchtige bei ihrem Gebrauch an Körpergewicht zunehmen, hat Lebert neuerdings betont und die Absurdität hervorgehoben, welche darin liegt, die leichtverdauliche Milch des grössten Theiles ihrer Nahrungsstoffe zu berauben, um sie so deteriorirt den Kranken zuzuführen. Diese Bemerkungen sind nicht ohne Werth, und ein nationalökonomischer Grund, wie beim Fleischextract, ist bei dieser Separation der Salze vom Casein u. s. w. nicht vorhanden. Dass Molken besser ertragen werden als Milch, ist ebenfalls nicht der Fall; bei den in Molken-curanstalten genossenen Mengen von 500,0—1000,0 täglich tritt häufig Inappetenz, Magen- und Darmkatarrh ein. Ein besonderer Einfluss auf den Hustenreiz ist nicht ersichtlich, die diaphoretische Action, welche das Trinken der grossen Menge warmer Flüssigkeit erzeugt, führt öfters zu Erkältungen. Ganz contraindicirt sind die Molken bei Anwesenheit disseminirter oder confluirender pneumonischer Herde oder bei Cavernen, überhaupt in Fällen, wo die Ernährung in irgend höherem Grade beeinträchtigt ist.

So scheint es allerdings gerechtfertigt, in vielen Fällen, wo Molken Ver-

wendung finden, sie durch Milch zu ersetzen. Eher könnten sie noch, was hier und da geschieht, bei einfacher knapper Kost Nützliches für Individuen mit Plethora abdominalis oder Gicht leisten. Der Gebrauch kühler Molken bei Erkrankungen der Atrioventricularklappen oder Ostien nach mehr ausgebildeter Compensation zur Beseitigung einer bestehenden Tendenz zur Obstipation führt oft nicht zum Ziele (Nothnagel). Das Heer sonstiger Krankheiten, Dyskrasien und Diathesen, wogegen Molken gebraucht werden, ut aliquid fecisse videamur, braucht hier nicht erwähnt zu werden.

Die Anwendung der Molken muss längere Zeit, nicht unter 4–6 Wochen geschehen. Man lässt sie warm und (wie Mineralwasser) des Morgens nüchtern gläserweise auf der Promenade, nicht gut mehr als 100,0 auf einmal, nach  $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$  stündiger Promenade eine weitere Quantität, anfangs nur 1 Glas, später mehr, selten mehr als 1000,0 im Tage trinken. Meist werden Molken anfangs nicht gut ertragen und erregen Uebelkeit, Indigestion und Kopfschmerz; in manchen Fällen hilft hier der Zusatz von kohlensäurehaltigen Mineralwässern. Man kann die Molke auch direct mit Kohlensäure imprägniren (sog. Serum lactis carbonico-acidulum). Bisweilen macht man sie auch zum Träger von Medicamenten, z. B. durch vorsichtigen Zusatz von Stahlwässern oder Kräutersäften. Tritt unter dem Gebrauche der Molken Diarrhoe ein, so setzt man aus oder giebt die Molke mit aromatischen Zusätzen (Aq. Cinnamomi) oder Alaunmolken; Obstipation wird durch Bitterwässer oder durch Zusatz von Milchzucker zur Molke beseitigt.

Die Anwendung von Molken zu angeblich kräftigenden und beruhigenden Bädern ist gewiss überflüssig; ebenso die in Klystieren und Gurgelwässern (bei chronischer Pharyngitis). Einzelne rathen Aufschnupfen der Molken bei chronischer Coryza an.

Milch, Lac. — Die Milch, bekanntlich ein Product der Drüsenzellen der Milchdrüsen, besteht wie das Blut aus Plasma und Körperchen, den vorzugsweise aus Fett gebildeten Milchkügelchen. Sie ist ein Gemenge von Albuminaten, vorzugsweise Casein (Kalialbuminat), Fett, Milchzucker und anorganischen Salzen. Diese Bestandtheile wechseln bei den einzelnen Thierarten. Die Frauenmilch enthält 88 % Wasser, 2,8 % Casein, 3,6 % Fett (Butter), 4,8 % Milchzucker und 2,4 % Salze; die Milch der hauptsächlich zur Milchproduction verwendeten Säugethiere ist im Allgemeinen reicher an festen Stoffen überhaupt und an Fetten und Albuminaten insbesondere, ärmer an Wasser und Milchzucker. Die Kuhmilch enthält durchschnittlich fast das Doppelte von Albuminaten (5,4 %), dagegen nur 4 % Milchzucker; ähnlich verhalten sich Ziegenmilch und Schafmilch. Näher stehen der Frauenmilch die Milch der Eselinnen und Stuten, die sogar weniger (2,0 resp. 1,6) Albuminate und mehr (5 %) Milchzucker enthalten. Die Asche der Frauenmilch enthält 26 % Chlorkalium und 21,4 % Kali auf fast 11 % Chlornatrium, sowie 19 % Phosphorsäure; die Asche der Kuhmilch ist ähnlich zusammengesetzt, enthält jedoch dem höheren Eiweissgehalte entsprechend bis 29 % Phosphorsäure. Die Fette der Milch, welche in der Kuhmilch die Glyceride der Butinsäure, Stearinsäure, Palmitinsäure, Myristinsäure und Oelsäure bilden, variiren erheblich nach Art der Nahrung und scheinen sich auch beim Stehen an der Luft durch Zerspaltung der Albuminate zu vermehren (Ssubotin, Hoppe-Seyler). Durch längeres Stehen scheiden sich die Milchkörperchen als sog. Rahm, Cremor, ab, welcher beim Volke als Mittel bei Excoriationen, gesprungenen Lippen u. s. w. in Ruf steht, zumeist aber in bekannter Weise zu Butter verarbeitet wird. Das Liquidum, welches aus dem Rahm nach dem Buttern zurückbleibt, ist die sog. Buttermilch, Lac ebutyratum, welche in ihrer Beschaffenheit variirt, je nachdem der Rahm vor oder nach dem Sauerwerden der Milch abgehoben wird. Unter dem Einflusse von Pilzen, wie zuerst v. Hessling nachwies, verwandelt sich Milchzucker in Milchsäure, welche das Casein coagulirt. Ist der Rahm, wie es meist geschieht, in dieser Periode entfernt, so stellt die Buttermilch eine Lösung von Milchsäure mit Beimengung von Casein und Salzen und meist auch kleinen Klümpchen Fett dar, während bei Anwendung von süßem Rahm die Milchsäure durch Milchzucker vertreten wird. Das Mittel wird selten von Aerzten verordnet, führt in grösserer Menge gelinde ab und wird, so weit meine Erfahrung reicht, fast immer gut



ertragen. Man kann es ohne Scheu und mit vielem Nutzen als kühlendes und nährendes Getränk bei Fieberkranken, Reconalescenten, Phthisikern u. s. w. geben.

Die sog. saure oder dicke Milch kann als kühlendes Mittel bei febrilen Zuständen gereicht werden, natürlich mit Vorsicht. Preyer will sie als schlafmachendes Mittel gereicht wissen. Das ausgeschiedene und gereinigte Casein hat Jozeau zum Ueberziehen von Pillen empfohlen.

Die süsse Milch wird vielfach als Nahrungsmittel für Kranke und zu sog. Milchcuren benutzt, bei denen insgemein die Kuhmilch angewendet wird, der man nur in seltenen Fällen andere Milchsorten substituirt. Die vorzüglich nährenden Eigenschaften, welche man z. B. der Milch der Eselinnen zuschreibt, die als besonders heilsam für Tuberculose beim Volke in Ruf steht, gehen aus der chemischen Analyse nicht hervor, welche darin einen geringeren Gehalt an Albuminaten nachweist; vielleicht ist sie leichter verdaulich als Kuhmilch. Für den Erwachsenen scheint die Milchsorte ziemlich irrelevant, nicht aber für den Säugling, dem die Muttermilch bekanntlich nicht ohne Weiteres durch Kuhmilch ersetzt werden kann, die vielmehr wegen ihres reicheren Gehaltes an festen Stoffen eines grösseren Wasserzusatzes bedarf und welcher, da in ihr die Albuminate in viel festeren Klumpen coaguliren als in der Frauenmilch, auch eine geringere Menge von Natrium oder Kalium carbonicum zweckmässig zugefügt wird. Selbst geringer Zusatz von Milchzucker ist hier empfehlenswerth.

Methodische Milchcuren kommen besonders bei Phthisis und Bronchoblennorrhoe, bei Lungenemphysem, bei Kachexie in Folge überstandener schwerer Krankheiten (Intermittens, Typhus, profuse Suppurationen), bei Chlorose (hier mauchmal mit höchst eclatantem Erfolge), ferner bei chronischen Krankheiten des Magens und der Leber, auch bei hartnäckigen Innervationsstörungen (Hysterie, Hypochondrie), endlich bei Diabetes und Hydrops (Karell) in Anwendung.

Im Allgemeinen erklärt man lebhafteres, continuirliches Fieber und das Vorhandensein von Digestionsstörungen als die Vornahme der Milchcuren contraindicirend, doch ist es Thatsache, dass selbst in acuten fieberhaften Krankheiten, namentlich bei etwas protrahirterem Verlaufe, der Genuss der Milch sehr wohl tolerirt wird und der Kräfteabnahme entgegenwirkt, dass beim Ulcus ventriculi — vielleicht von der Fleischsolution abgesehen — kein Mittel geeigneter ist, eine Vernarbung der Geschwüre zu fördern, als die Milch, dass endlich bei hartnäckigen Magen- und Darmkatarrhen ausschliessliche Milchdiät oft zum Ziele führt. Milch ist zu Curen für solche Kranke besonders empfehlenswerth, bei denen jede Indigestion mit grösster Sorgfalt zu meiden ist (Krahmer). Beim Hydrops bewährt sich die Milch sowohl bei vorgeschrittenen Herz- und Leberleiden als bei Morbus Brighti (Karell). Bei solchen Milchcuren ist es offenbar von Wichtigkeit, mit kleinen Mengen zu beginnen, etwa nach Karells Vorgange mit 3—4mal täglich  $\frac{1}{2}$ —1 Kaffectasse voll (60,0—120,0) abgerahmter Milch, die man in bestimmten Intervallen nehmen lässt, und allmählig erst zu steigern, so dass z. B. nach 14 Tagen schon 2 Flaschen im Tage consumirt werden. Die Cur ist meist anfangs mit Verstopfung verbunden, die man mit Wasserklystieren oder einer Dosis Ol. Ricini oder Rheum, auch durch den keineswegs schädlichen Genuss von gekochtem Obst. beseitigt. Verlangen nach consistenter Speise wird durch nicht ganz frische Semmel gestillt. Nach Karell soll die Milcheur sich nicht allein bei kachektischen Individuen, sondern auch bei robusten, zu Congestion geneigten Personen als Entziehungscur qualificiren.

In manchen Fällen benutzt man die Milch im erwärmten Zustande, um als Träger einer erhöhten Temperatur diaphoretisch und expectorirend zu wirken. So lässt man Kranke mit Bronchialkatarrhen oft die frisch gemolkene (kuhwarne) Milch trinken oder verordnet lauwarne Milch mit Selterswasser; ja man gebraucht sie auch noch stärker erwärmt bei acuter Laryngitis (Pseudocroup) mit Zucker als ein nicht selten zu leichtem Magenkatarrh führendes Diaphoreticum. In solchen Fällen leistet sie natürlich nicht mehr als erwärmtes Wasser.

Als Nahrungsmittel empfiehlt sich die Milch bei Kindern von 2—6 Jahren und darüber besonders bei bestehender Tendenz zu Diarrhoe, wo die stopfende

Wirkung noch durch Zumengung von mucilaginösen Stoffen oder Kalkwasser sich erhöhen lässt. Als flüssiges Nahrungsmittel empfiehlt sich die Milch zur Fütterung sitophobischer Geisteskranker. Die Einspritzung von Milch in die Venen bei Cholera (Bovell, Herapath) hat keine befriedigenden Resultate geliefert.

In besonderem Ansehen steht die Milch beim Volke als Antidot bei Vergiftungen. Ist sie auch kein Antidotum universale, so kann sie doch dem Eiweisswasser an die Seite gestellt werden, indem ihre Eiweissstoffe gerade so gut wie Hühnereiweiss mit Säuren, Alkalien und Metalloxyden sich zu verbinden vermögen. Sie passt somit vorzugsweise bei ätzenden Giften; aber auch bei den Intoxicationen mit solchen scharfen Stoffen, zu denen das Casein keine chemische Affinität besitzt, ist sie als Protectivum der Schleimhäute oft von Nutzen. Bei Vergiftung mit Phosphor und Canthariden ist Milch zu meiden oder doch höchstens abgerahmt zu geben.

Aeusserlich ist die Milch als Nutriens in Bädern versucht, natürlich ohne Erfolg, da von der Haut keine Aufsaugung des Caseins stattfindet. Im Klystier gegen Oxyuris und als demulcirendes Mittel bei Stomatitis und Angina (in Collutorien und Gargarismen), bei Entzündung des Meatus auditorius (Injection), bei Excoriationen, Ekzem und Impetigo (Kataplasmen), bei Ophthalmie (Collyrien) ist Milch ohne jeden Vorzug.

Abgerahmte Milch wird von Weir Mitchell kalt oder warm als ausschliessliche Nahrung bei gastrischen Störungen, Hydrops in Folge von Malaria und Nierenaffectionen und bei Nervenkrankheiten gebraucht, wobei er mit 1—2 Esslöffeln alle 2 St. beginnt und an den beiden folgenden Tagen um 1 Esslöffel steigt. Diese absolute Milchdiät wird 3 Wochen hindurch fortgesetzt und bei hartnäckiger Verstopfung die abgerahmte Milch mit gewöhnlicher vertauscht. Donkin rühmt curmässigen Gebrauch abgerahmter Milch bei Diabetikern.

Der Milchrahm ist von Biedert und Kehler im Gemenge mit Wasser oder Milch und Milchzucker in verschiedenen Verhältnissen bei chronischen Verdauungsstörungen der Kinder empfohlen.

Wir erwähnen noch die medicamentöse Milch, welche man entweder durch Mischen von Milch mit verschiedenen Arzneikörpern (z. B. Iod, Scammonium) oder in der Weise erzielte, dass man Ziegen oder Kühe active Medicamente (Iodkalium, Iodnatrium, Quecksilber, Arsen) beibrachte und deren Milch Kranken verabreichte (Labourdette u. A.). Da die Milch in allen Fällen nur einen geringen Bruchtheil der in den Organismus gelangten Medicamente eliminirt, scheint das Verfahren irrationell, zumal die Thiere, wenn sie grössere Mengen der betreffenden Stoffe erhalten, erkranken und schlechte oder gar keine Milch produciren. Die aus der Milch im Haushalt darzustellenden Getränke und Suppen können, wie der aus Süssmandeln, Milch und Zucker bereitete Syrupus lactis amygdalatus, hier übergangen werden.

Milchextract, condensirte Milch; Extractum lactis. — Zur Darstellung einer guten Milch, besonders in Städten, wo unverfälschte Kuhmilch schwer zu beschaffen ist, dient die zuerst in Amerika (Borden), jetzt in der Schweiz en gros fabricirte, durch Versetzen mit Zucker und vorsichtiges Abdampfen bereitete condensirte Milch, welche zur Benutzung natürlich mit Wasser verdünnt wird. Das früher gebräuchliche Lactolin, sowie de Lignacs Milchconserven sind dadurch völlig verdrängt.

Kumiss, Kumys. — Mit diesem Namen wird ein von den Kirgisen aus der durch ihren Zuckerreichthum besonders leicht zur Gährung neigenden Stutenmilch dargestelltes und als berauschendes Mittel benutztes gegohrenes Getränk bezeichnet, welches in der neueren Zeit als Schwindsuchtmittel einen besonderen Ruf erlangt hat. Der echte Kumys bildet eine weissliche Flüssigkeit von säuerlichem, etwas an Pferdeausdünstung erinnerndem Geruche und prickelndem, angenehm säuerlichem Geschmacke mit süssmandelartigem Nachgeschmacke, welche nach dem Gussse Aufstossen von Kohlensäure erregt. Derselbe enthält neben den sämmtlichen Bestandtheilen der Stutenmilch auch Alkohol und Kohlensäure, welche nach dem Alter des Getränkes, in welchem die Gährung fortschreitet, in verschiedener Menge vorhanden sind. In frischem Kumys aus Steppenstutenmilch finden sich 1,65% Alkohol, 2,05% Fett, 2,2%

Milchsäure, 1,2%, Milchzucker, 0,28% Salze und 0,78% Kohlensäure, in älterem 3,23% Alkohol und 2,92% Milchsäure (Hartier). Mit der Dauer der Gährung nehmen Alkohol und Milchsäure stets zu, so dass ersterer am ersten Tage 1,2 und am 9ten 1,9% beträgt; der Milchzucker nimmt stetig ab, während die Kohlensäure anfangs steigt, später sich etwas vermindert (Biel). Nach Doehmann enthält Kumys neben Parapepton des Caseins auch Pepton, dessen Menge nach 70stündiger Gährung 4,84% beträgt und bei Zusatz von Pepsin zu gährender Stutenmilch schon nach kürzerer Zeit zu der gleichen Höhe steigt. Nach Stahlberg ist es zur Production eines guten Kumys notwendig, nicht arbeitende Steppenstuten zu verwenden, nicht aber Zugpferde, da die Milch solcher viel weniger locker gerinnende Coagula von Casein liefert; dagegen ist eine besondere Fütterung, etwa mit *Stipa pennata* der Steppe, nicht notwendig, weshalb echter Kumys, wie dies die Heilanstalten Stahlbergs in Moskau und Wiesbaden beweisen, auch anderswo producirt werden kann. Nach Stahlberg erregen kleine Mengen (2—3 Glas) ein Gefühl von Kälte im Magen, dem bald angenehme Wärme folgt, ferner geringe Pulsbeschleunigung und geringe Anregung der geistigen Functionen (Fröhlichkeit, Leichtigkeit der Bewegungen). Mittlere Gaben (2—3 Flaschen pro die) vermehren den Appetit, bedingen deutlichere Pulsbeschleunigung und anfangs vermehrtes, später seltneres und tieferes Athmen. Grössere Mengen (4 Flaschen und mehr) bedingen ein Gefühl der Sättigung, so dass Bedürfniss nach fester Speise nicht mehr existirt. Ganz frischer Kumys regt den Stuhlgang an und bedingt Borborygmen, über 3 Tage alter wirkt verstopfend. Die Diurese wird durch Kumys erheblich gesteigert. Harnstoff und Phosphorsäureausscheidung nehmen zu, während die Harnsäure abnimmt. Die Temperatur sinkt. Bei Anwendung grösserer Mengen tritt in der Regel auch ein geringer Grad von Trunkenheit ein, welche entschiedene Neigung zum Schlaf bedingt, die, wie Unlust zu körperlichen Arbeiten, in der Regel während der Kumyscur constant ist; Schlaflosigkeit scheint nur ausnahmsweise vorzukommen. Constante Erscheinungen während der Kumyscur sind vermehrte Füllung der Hautcapillaren (Rosafärbung des Gesichtes, sog. Kumysteint) und rasche Zunahme des Körpergewichtes und Ablagerung von Fett im Unterhautzellgewebe, bei Frauen auch profusere Menstruation. Das Gesamtbild der Erscheinungen ist aus der combinirten Wirkung der Nährstoffe der Milch und des Alkohols (Abnahme der Temperatur) zu erklären. Nach Stahlberg sind Kumyscuren bei allen Krankheiten, welche durch Verbesserung der Blutmasse geheilt werden können, indicirt; so bei Anämie und Blutverlusten, übertriebener Lactation, profusen Eiterungen, acuten Krankheiten und Strazzen, ferner bei Chlorose, Scorbut, Hysterie und Hypochondrie auf anämischer Basis, endlich bei Adynamie in acuten Krankheiten, sowie bei Hypersecretion von Schleimhäuten (Magen- und Darmkatarrhen, Bronchialkatarrhen). Bei der Schwindsucht ist die Beschränkung der Secretionen und die vorzügliche nutritive Wirkung des Kumys der Grund der Besserung; der locale Process wird weniger beeinflusst, obschon Schrumpfung von Cavernen danach beobachtet sein soll. Diffuse käsige Infiltrate und Affectionen des Herzens, der Nervencentren, Nieren und Leber contraindiciren die Cur, nicht aber Haemoptysis. Die Cur erfordert Meiden ernster Beschäftigung, vielen Aufenthalt in freier Luft und in der Sonne, leicht verdauliche, nahrhafte Kost und viel Schlaf. Der Kumys muss in grösseren Mengen genommen werden. Meist beginnt man mit einer Flasche täglich, 1 bis 2stündlich ein Glas voll, und steigt allmähig um  $\frac{1}{2}$  bis zu 5 Flaschen täglich. Man trinkt ihn warm, jedoch nicht wärmer als 32°. In wie weit die aus andern Milcharten, vielfach unter Zusatz von Milchzucker, dargestellten Surrogate des Kumys (sog. Milchwein von With a. a. m.) den echten Kumys zu ersetzen vermögen, muss die weitere Erfahrung lehren. Schwalbe empfiehlt zur Bereitung von künstlichem Kumys 100 Ccm. condensirte Schweizermilch mit wenig kaltem Wasser gelöst, 1,0 Milchsäure, 0,5 Citronensäure in wässriger Lösung, 15,0 Rum und 1000—1500 Ccm. Wasser mit Kohlensäure imprägnirt in einer warmen Flasche 2—4 Tage stehen zu lassen, bis starke Schaumbildung und feine Gerinnung des Caseins eintritt. Lewschin bereitet künstlich Kuhkumys durch Lösen von 500,0 Milchzucker in 3000,0 Wasser, Mischen von 1000,0 mit 3000,0 sorgfältig abgerahmter, nicht saurer Milch, Zusatz von  $\frac{1}{2}$  Flasche schon fertigen Kumys und Hinstellen der Mischung bei 20—23°, bis Kohlensäure-



bläschen sich entwickeln, worauf man den Rest der Milchzuckerlösung und noch 6000,0 gut abgerahmte Milch zufügt und die Masse alle  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  Std. schlägt, wonach man dieselbe in gut zu verstöpselnde und verbindende Flaschen bringt, die man anfangs 6—8 Std. bei 20—24°, dann an einem kühlen Orte aufbewahrt.

**Oleum jecoris aselli, Oleum Morrhuae; Leberthran.**

Der Leberthran ist das aus den Lebern verschiedener im Atlantischen Ocean lebender Fische aus der Gattung *Gadus*, vorzüglich des als Fastenspeise in katholischen Ländern vielgebrauchten, als Stockfisch oder Laberdan bekannten *Kabliaus*, *Gadus Morrhua* L., und des jetzt als jugendliche Form des *Kabliaus* bekannten Dorsches, *Gadus Callarias* L., gewonnene flüssige Fett.

Der bei uns benutzte Leberthran stammt vorzugsweise aus Norwegen; nur selten kommt Thran aus Newfoundland oder andern Gegenden zu uns. An den Norwegischen Küsten (Finmarken, Norrland) und besonders an den Lofodischen Inseln scheinen, vielleicht mit Ausnahme einer kleinen Quantität Schellfische, *Gadus Aeglefinus* L., nur die genannten Fische benutzt zu werden, nicht aber *Gadus carbonarius*, der Köhler, *G. Pollachius*, *G. Merlangus* u. a. *Gadus*-Arten. Die Bereitung fällt in die Monate Februar bis Mai, wo der torsk, wie *Gadus Morrhua* (im Gegensatz zu dem kleinen Dorsch, småtorsk, unserm Dorsch) heisst, in beträchtlichen Mengen an den Norwegischen Küsten sich aufhält. Nach der Bereitungsart sind zwei Sorten, der sog. Fabrikthran und Bauernthran (Privatindustriethran), zu unterscheiden, von denen ersterer allein officinell ist. Der Fabrikthran wird so gewonnen, dass die gleich nach dem Fangen der Fische herausgenommenen Lebern in frischem Wasser abgewaschen, von der Gallenblase und kranken Theilen befreit und dann in Kessel gebracht werden, die man mit Dampf von bestimmter Temperatur erhitzt; der aus den geborstenen Zellen ausgeflossene Thran wird abgeschöpft, filtrirt und durch Stehenlassen geklärt. Die Erhitzung der Gefässe geschieht am besten von aussen; das in einzelnen Fabriken übliche Einleiten von Dampf in die Kessel giebt wegen rückbleibenden Wassers ein weniger haltbares Product. Die Klärung des Thrans geschieht namentlich auch zur Abscheidung des Stearins, auf welche man besondere Sorgfalt verwendet (Abkühlung auf — 5°), da ein Thran, welcher in niederer Temperatur stark sedimentirt, nach der Phkp. unzulässig ist. Der so bereitete Thran ist farblos oder hellgelb und entspricht dem *Oleum jecoris album* der Nordischen Pharmacopöen, welches sich als klar durchsichtiges, etwas dickflüssiges Liquidum von mildem, im Halse wenig Kratzen hinterlassendem Fettgeschmack, ganz schwachem Fischgeruche, sp. Gew. von 0,923 und neutraler oder schwachsaurer Reaction charakterisirt, das sich leicht in Aether, wenig (2 $\frac{1}{2}$ %) in kaltem und etwas mehr (4%) in heissem Alkohol löst und an der Luft langsam eintrocknet. Der sog. Bauernthran wird selten oder nie aus frischen Lebern gewonnen, sondern meist in der Art, dass die ausgenommenen Lebern auf Tonnen gefüllt, diese verspundet und nach Schluss des Fischfanges, somit erst nach Wochen und Monaten, mit nach Hause genommen werden. Der dabei freiwillig ausgeflossene Leberthran stellt das *Oleum jecoris flavum* der Nordischen Phkpp. dar, welches von gelber oder orange gelber Farbe, vollkommen klar und durchsichtig ist, jedoch stärkeren, etwas bitteren Fischgeschmack, deutlicheren Fischgeruch, etwas höheres spec. Gew., saure Reaction und etwas grössere Löslichkeit in Alkohol besitzt. Nach Abzapfen des gelben Leberthrans wird der Rückstand in Töpfen auf offenem Feuer erhitzt, wobei ein dunkler gefärbter Thran, den man nach dem Eintreten der im Handel beliebten Farbennüancen abschöpft, das *Oleum jecoris aselli fuscum*, sich bildet. Dieser Thran umfasst zwei Hauptsorten, das *Ol. jec. fuscum clarum* und das *Ol. jec. fuscum empyreumaticum*, besser Gerberthran, *Ol. jec. nigrum* (Friededt), genannt. Die ersterwähnte Thran-sorten ist entweder orangeroth oder malagafarben, oder wie man sich im Handel ausdrückt, blank oder braunblank, stets klar und durchsichtig, aber von

weit unangenehmerem Geruche und Geschmacke und viel stärker saurer Reaction. Das *Oleum nigrum* ist braun oder braunschwarz, etwas ins Dunkelgrün spielend und zum inneren Gebrauche untauglich (Fristedt).

Der Leberthran bildet hauptsächlich ein Gemenge von Glyceriden verschiedener fetter Säuren, namentlich Oelsäure, Palmitinsäure und Stearinsäure mit Gallenbestandtheilen, welche für die besondere Wirkung des Leberthrans von grosser Bedeutung sind; ausserdem finden sich Iod und Trimethylamin in geringen Mengen darin, welche man ebenfalls für einzelne therapeutische Effecte des *Oleum jecoris* verantwortlich gemacht hat.

Unter den Fettsäureglyceriden waltet Olein vor; Stearin variiert an Menge nach der Bereitungsweise natürlich erheblich. Gallenfarbstoffe (früher als *Gadu* bezeichnet) finden sich in den dunkleren Sorten mehr als in den helleren; doch geben die letztern echten Sorten, z. B. von H. Meyer in Christiania, die darauf beruhenden Reactionen zur Erkenntniss der Echtheit (Violett-, später Rothfärbung mit Schwefelsäure) auf das Deutlichste. Iod findet sich in *Oleum fuscum clarum*, über welches allein Untersuchungen vorliegen, höchstens zu 0,04%, meist noch in kleinerer Menge; wie Stein zeigte, findet es sich nicht frei, sondern chemisch mit dem Fette verbunden, so dass es nur nach Verseifung entdeckt werden kann. Neben Iod findet sich auch meist Brom.

Das Trimethylamin,  $C^6H^{13}NO^4$ , welches früher vielfach mit dem gleichen Elementarzusammensetzung besitzenden Propylamin verwechselt wurde, ist eine künstlich darstellbare Base, welche sich ausser im Leberthran, worin sie Winkler zuerst auffand, auch in der Häringslake, in Maikäfern und Flusskrebsen, sowie in verschiedenen Pilzen (Mutterkorn, Fliegenpilz) und Dikotyledonen (*Chenopodium vulvaria*, Blüten von Weissdorn u. a. Pomaceen), auch im Destillate fauler Lebern findet. Das Trimethylamin ist eine wasserhelle, zwischen 4 und 5° siedende, stark ammoniakalisch und zugleich fischartig riechende Flüssigkeit, die sich in Wasser, Weingeist und Aether in jedem Verhältnisse löst und durch flammende Körper sich entzündet. Mit Salzsäure bildet sie ein leicht zerfliessliches, weisses Salz. Sowohl die Base als das chlorwasserstoffsäure Salz sind in Frankreich auf Grundlage einer älteren Empfehlung des russischen Arztes Awenarius als Heilmittel bei Rheumatismus acutus und chronicus, wobei sie sich in allen Formen bewähren sollten, vielfach in Anwendung gezogen (Aïssa Hamdy, Béhier, Dujardin-Beaumetz). In der That setzt Trimethylamin bei Thieren schon in verhältnissmässig kleinen Dosen die Temperatur stark herab (Th. Husemann und Selige), während bei grösseren Dosen auch Sinken der Pulsfrequenz und Abnahme der Energie des Herzschlages eintritt. Toxische Dosen wirken bei Thieren wie Ammoniakalien, jedoch bedarf es zur Herbeiführung des Todes viel grösserer Mengen als vom Chlorammonium; der Tod erfolgt durch Lähmung der Respiration. Oertlich wirkt es sowohl bei subcutaner als bei interner Application irritirend. Bei Rheumatismus acutus werden Temp., Puls und Schmerzen vermindert, doch wird der Verlauf dadurch nicht abgekürzt (Martineau). Man giebt am besten das chlorwasserstoffsäure Salz, welches keine gastrischen Symptome erzeugt, die häufig nach Trimethylamin hervortreten, zu 0,5—1,0 in 200,0 Wasser mit Zusatz von Syr. Aur. cort.

Der Leberthran hat im Allgemeinen die Wirkung der Fette (S. 323), unterscheidet sich jedoch von den übrigen Fetten dadurch, dass er bei weitem leichter resorbirt und deshalb länger ertragen wird und dass er weit leichter oxydirbar ist als alle übrigen Fette (O. Naumann). Diese Eigenschaften, von denen er die erstern nach den Versuchen von O. Naumann den beigemengten Gallenbestandtheilen verdankt, machen seine ausgedehnte Verwendung als Unterstützungsmittel roborirender Curen und selbst

als Plasticum gerechtfertigt und haben ihm eine Sonderstellung unter den Pinguedines verschafft.

Naumann (1865) ermittelte über die Durchgängigkeit von thierischen Membranen für verschiedene Oele, dass der Leberthran alle von ihm untersuchten thierischen (*Oleum Aschiae*, *Ol. ceti*, *Ol. pedum tauri*, *Butyrum recens*) und vegetabilischen fetten Oele (*Ol. Papaveris*, *Ol. Olivar. Provinc.*, *Ol. Napi*) in dieser Beziehung übertrifft, dass diese leichte Permeabilität, welche die der Pflanzenöle um das 7—8fache, die des *Oleum Tauri* und der frischen Butter um das 6fache übertrifft, aber aufhört, sobald man den Leberthran seiner Gallenbestandtheile beraubt und aufs Neue eintritt, sobald man ihn wieder mit Galle imprägnirt. Dass mit Galle imbibirtes Pflanzenöl weit rascher thierische Membranen durchdringt als gewöhnliche Pflanzenöle, ist bereits früher von Wistinghausen ermittelt; doch erreicht die Diffusionsgeschwindigkeit auch nicht annähernd die des Leberthrans. Die Diffusion des braunen Leberthrans ist etwas rascher als die der helleren Sorten, jedoch ist die Differenz so unbedeutend, dass ersteres 7,8, letztere 7,1 mal rascher als Pflanzenöle thierische Membrane durchdringt. Bezüglich der Oxydationsfähigkeit der verschiedenen Fette fand O. Naumann, dass die aus der Leber von Fischen herrührenden flüssigen Fette bei weitem am raschesten durch Kaliumpermanganat oxydirt werden, nächstdem andere Fischöle und Walfischthran, weit schwieriger sonstige Fette, unter denen Ochsenklauenfett und Butter obenanstehen, und denen sich von Pflanzenfetten Leinöl anschliesst; Leberfette von Gans und Schwein werden leichter oxydirt als sonstiges Gänse- und Schweinefett. Directe Versuche über Leberthranresorption bei Katzen erwiesen den rascheren Uebergang gegenüber dem Ochsenklauenfett (Naumann). Die erörterten Momente genügen in der That zur Erklärung der Wirkungsdifferenzen, welche der Leberthran anderen Fetten gegenüber zeigt. Die rasche Resorption erklärt, dass er wochenlang zu 15,0—30,0 mehrmals täglich gegeben werden kann, ohne die Verdauung zu stören und ehe das Mittel mit dem Stuhlgang zum grössten Theile wieder abgeht. Die rasche Verbrennung ermöglicht grössere Ersparung von stickstoffhaltigem Material, das zur Zellenbildung verwendet werden kann. Klenckes Theorie, dass der Leberthran ein Surrogat der Galle sei, ist wohl dahin zu modificiren, dass er die zu seiner Resorption nöthige Gallenmenge selbst mitbringt. So lässt sich auch verstehen, weshalb Gallenfelstelhunde wochenlang am Leben bleiben, ohne abzumagern, wenn sie täglich grössere Mengen Leberthran (120,0) erhalten, während bei Aufhören mit der Leberthranzufuhr und Einführung anderer Kost sich Verdauungsstörungen einstellen.

Der Leberthran findet seine hauptsächlichste Anwendung bei Scrophulose, Rachitis, Knochenleiden und chronischen Hautaffectionen (*Impetigo*, *Lupus*) auf scrophulöser oder rachitischer Basis, scrophulösen Schleimhautaffectionen (*Ozaena*, *Blepharitis*), Lungenphthisis und analogen Affectionen mit Abnahme des Körpergewichts und der Körperkraft, ausserdem bei chronischem Rheumatismus und Gicht.

Der Leberthran passt, wie allgemein anerkannt wird, weniger bei torpider Scrophulose, wo man mit Iodpräparaten bessere Erfolge erzielt, als bei der erethischen Form; bei ausgeprägtem Fettreichtum torpid scrophulöser Individuen ist der Gebrauch sogar contraindicirt. Bei tuberculöser Phthisis hebt Leberthran zwar nicht die Lungenaffection, wohl aber fördert er bei angemessenem Gebrauche in ganz vorzüglicher Weise die Ernährung und kann dabei eine entschiedene Zunahme des Körpergewichts erfolgen. Es ist keineswegs, wie Krahmer annimmt, die Verordnung bei Phthisikern ein Act ärztlicher Grausamkeit. Andererseits aber sind die Daten aus englischen Hospitälern, wonach die Lebensdauer der Phthisiker durch Leberthran wesentlich verlängert werden kann, wegen der Unsicherheit der Diagnose im ersten Stadium nicht zuverlässig. Inwieweit die Heilung von Caries unter dem Monate und selbst Jahre lang fortgesetzten Gebrauch von Leberthran dem Mittel zugeschrieben



werden kann, ist nicht klar. Die günstigen Effecte, welche man manchmal durch Leberthrancuren bei scrophulösen Drüsenanschwellungen bedingt sieht, haben auch zu Versuchen bei Hypertrophien und Indurationen anderer Drüsen (Mamma, Testikel) und selbst bei Neubildungen geführt, doch sind die Wirkungen hier nicht eclatant. Bei einfacher Anämie leistet Eisen entschieden mehr, auch ist überall neben dem Leberthran nährnde Kost und überhaupt ein roborirendes Verfahren von entschiedener Bedeutung.

Auf welche Weise der Leberthran bei Scrophulose und andern Affectionen seine günstigen Effecte zu Wege bringt, ist von verschiedenen Seiten verschiede beantwortet. Wir fassen ihn als Nahrungsmittel auf, das vor anderen Fetten die erörterten Vorzüge besitzt. Dass es das Iod nicht ist, auf dem die Wirkung beruht, beweist der Umstand, dass es sich nur in winzigen Mengen darin findet und dass es in manchen Sorten ganz fehlt, welche nichtsdestoweniger dieselben Effecte hervorbringen. Noch weniger lassen sich die heilsamen Effecte durch den Gehalt an Phosphor (Delattre) oder von phosphorsauren Salzen (Bretonneau) erklären. Ob bei Rheumatismus das Trimethylamin im Leberthran von besonderer Bedeutung ist, ist offene Frage.

Wenn wir nach dem Gesagten dem Leberthran entschiedene therapeutische Bedeutung zulegen müssen, so giebt es doch eine Reihe von Umständen, welche den Gebrauch bei den genannten Krankheiten contraindiciren. Derselbe darf in den ersten sieben Lebensmonaten, wo er stets die Verdauung beeinträchtigt, nicht gegeben werden und ist bei allen Individuen mit unüberwindlichem, nicht im Laufe der ersten acht Tage verschwindenden Widerwillen gegen das Mittel, der constant zu Erbrechen des Mittels führt, ferner bei dem Bestehen von Digestionsstörungen und Neigung zu Diarrhoe, endlich bei allen febrilen Zuständen zu meiden.

Zu Leberthrancuren eignen sich am besten die Wintermonate, während dieselben im Sommer auszusetzen sind, da in der heissen Jahreszeit der nicht gehörig conservirte Thran leicht ranzig wird und dann nicht allein stärkeren Widerwillen weckt, sondern auch leicht zu Magen- und Darmkatarrhen Anlass giebt. Scrophulöse Kinder mit Tendenz zur Fettleibigkeit sind für das Mittel weniger passend, auch vermeide man es bei Phthisikern während der Perioden, wo Hämoptoe besteht.

Man giebt den Leberthran 2—3 Mal täglich thee- bis esslöffelweise je nach dem Alter der Kranken, und zwar am besten ohne jeden geschmacksverbessernden Zusatz.

Die meisten Künsteleien zur Verdeckung des Leberthranschmacks, an welchen sich die Kranken meistens sehr rasch gewöhnen, wenn man eine helle Sorte auswählt, führen zu Verschlechterung des Geschmacks. Es gilt dies besonders von der Leberthranchocolade und verschiedenen in Frankreich beliebten Zuckerwerkformen; auch von der Emulsion, welche in kurzer Zeit ranzig wird. Kinder gewöhnen sich sehr leicht an den Leberthran, wenn man etwas Wein nachtrinken und Brodrinde nachkauen lässt. Bei Erwachsenen empfiehlt Simon vor dem Einnehmen den Mund mit einer stark pfefferminzhaltigen Flüssigkeit auszuspülen oder einen Pfefferminzkuchen vorher zu essen. Grüner Käse entfernt den Geschmack sehr bald. Sehr gut gelingt die Verdeckung des Leberthranschmacks, wenn man den Leberthran auf einem Theelöffel voll Arrak oder Rum aus einem Liqueurglase nimmt. In Paris hat man neuerdings in Kinderhospitälern Leberthransemmeln eingeführt, welche von Kindern gern gegessen und gut ertragen werden, so dass täglich 4—5 Esslöffel voll ohne Mühe beizubringen sind (Carre und Lemoine). Durch Vermischen von 6 Th. Leberthran mit 1 Th. Cetaceum wird der sog. solidificirte Leberthran, *Oleum jecoris solidificatum* s. *Gelatina jecoris aselli*, gewonnen, den man in Oblate theelöffelweise nehmen lassen kann. Foster empfiehlt einen geringen Zusatz von Pfefferminzöl oder Aether zum Leberthran.

Bei den Leberthran curen ist es zweckmässig, Alles zu meiden, was zu Störung der Digestion Veranlassung geben kann. Man reicht ihn daher niemals nüchtern und vermeidet überhaupt zweckmässig die Darreichung am Morgen. Die äussere Anwendung des Leberthrans zu Einreibungen bei chronischen Hautausschlägen oder zu Umschlägen bei torpiden oder malignen Geschwüren, sowie bei Phthisis pulmonum, ferner im Clysmas bei Mastdarmgeschwüren und Beckenabscessen, wie sie von Malmsten und anderen nordischen Aerzten befürwortet ist, hat sich die Gunst deutscher Aerzte niemals erringen können. Die Einträufelung gegen Hornhautflecke führt wohl selten zum Ziel.

Zum inneren Gebrauche hat man den Leberthran manchmal mit ähnlich wirkenden Mitteln verbunden, so namentlich mit Iod und Eisen. Zur Herstellung eines *Oleum jecoris iodatum* nimmt man 0,05–0,1 auf 30,0 Leberthran oder nach Lebert 0,2–0,3 Iod und 5,0–10,0 Iodkalium auf das Pfund *Oleum jecoris aselli*. Eisenhaltiger Leberthran, der auf verschiedene Weise (mit Oleat, Benzoat) dargestellt werden kann, disponirt zu baldigem Ranzigwerden und hat einen äusserst unangenehmen Geschmack. Iodeisenleberthran von Draisma van Valckenburg enthält 2,5% Eisen und 1,25% Iod. Eine Verbindung von Leberthran mit Kalk, die bei Rachitischen nicht ungeeignet ist, empfiehlt Van den Corput in Form einer Leberthrankalkseife, von welcher er 6–8 mit *Oleum Anisi* versetzte Bissen von 0,3 Schwere nach der Mahlzeit verordnet.

**Anhang:** Statt des Leberthrans hat man auch den Rochenleberthran, *Oleum Rajae* (von *Raja clavata* u. a.), und verschiedene von Cetaceen (Döglingsleberthran, Wallfischleberthran, Delphinleberthran u. s. w.) oder Seefischen (*Oulachan Oil*) stammende Fette bei Scrophulose und Tuberculose benutzt. Ein weiteres Surrogat desselben ist das aus Ochsenfüssen bereitete Ochsenklauenfett oder Klauenöl, *Axungia* s. *Oleum pedum Tauri*, welchem Radcliffe Hall und Thompson als minder leicht die Digestion störend den Vorzug vor dem Leberthran bei Behandlung der Schwindsucht geben. Nach den oben angeführten physiologischen Daten müssen jedoch alle diese Fette als *Plastica* dem Leberthran nachstehen.

**Malzextract u. a. Präparate der Gerste.** — Zu den modernen Nahrungsmitteln, mit denen der Name Liebig's sich verknüpft, gehört auch das aus den zum Zwecke der Bereitung des Bieres gekeimten Samen verschiedener Arten von *Hordeum*, namentlich *H. vulgare* L. und *H. hexastichum* L. (Fam. Gramineae), dem sog. Malz, *Maltum*, dargestellte Malzextract, *Extractum Malti*, dessen Werth als *Plasticum* theils in den darin enthaltenen stickstoffhaltigen Bestandtheilen, Kohlehydraten und Erdsphosphaten, theils in dem Gehalte an Diastase beruht, deren Vermögen, das Stärkemehl in Zucker umzusetzen, die Assimilation der Amylaceen befördert.

Die Samenkörner der Gerste (Gerstenkörner, Gerste) stehen schon seit alter Zeit als Nahrungsmittel bei Volk und Aerzten in Ansehen, obschon sie unter allen Cerealien fast den geringsten Gehalt an Proteinverbindungen (10–13% bei 50–60% Amylum) besitzen. Sie dienten früher namentlich zur Darstellung einer schleimigen Abkochung, der *πικράνη* des Hippokrates, die als Getränk in fieberhaften und katarrhalischen Krankheiten verordnet werden kann, später auch zur Bereitung des Gerstenzuckers. Vom Fruchtgehäuse befreit und abgerundet bilden sie die sog. Graupen, Perlgraupen, *Hordeum perlatum*, welche vorzugsweise das Gerstenstärkemehl enthalten. Durch Mahlen fein gepulvert, liefert die Gerste das Gerstenmehl, *Farina Hordei*, ebenfalls fast nur aus Amylum bestehend und meist ökonomisch verworthen. Aus diesem wird das früher officinelle präparirte Gerstenmehl, *Farina Hordei praeparata*, dargestellt, das sich vom gewöhnlichen wesentlich dadurch unterscheidet, dass das Stärkemehl theilweise in Dextrin übergegangen und somit etwas leichter verdaulich ist. Man erhält die *Farina Hordei praeparata*, indem man Gerstenmehl 30 Stunden in ein Dampfbad stellt, bis nach Entfernung der oberen Schicht eine röthlich gelbliche Masse sich gebildet hat, welche dann pulverisirt wird. Die *Farina Hordei praeparata* ist übrigens aus der ärztlichen Praxis durch eine Reihe von Specialitäten, welche im Allgemeinen als Kindermehl bezeichnet werden, ersetzt, welche meist aus dem Mehle anderer Leguminosen bereitet

werden und meist ebenfalls das Amylum zum grössten Theil in Dextrin umgewandelt enthalten. Unter diesen ist Nestlé's Kindermehl, welches angeblich aus Weizenmehl und Schweizermilch bereitet wird, am bekanntesten. Andere Mittel dieser Art sind die Kindermehle von Frerichs, Giffey und Schiele, von Grob und Anderegg, Faust und Schuster und das dänische Kindermehl von Stage. Die Zusammensetzung dieser Kunstproducte ist auch bei demselben Präparate nicht immer gleich, das Nestlé'sche Kindermehl zeigt nach den Analysen Schwankungen von 5,30—6,36 Wassergehalt, 2,17 und 1,85 Salzgehalt, 3,67 und 4,75 Fettgehalt, 9,85 und 16,96 Albuminatgehalt und 79,01—76,08 Gehalt an Kohlehydraten, von denen mehr als die Hälfte in Wasser löslich erscheinen. Analoge Zusammensetzung zeigen auch die übrigen Nährmehle, welche übrigens besonders bei acuten und chronischen Diarrhöen von Säuglingen, wo das Aussetzen der Milchnahrung geboten scheint, Nutzen bringen. Die Ueberführung des Stärkemehls in Dextrin geschieht dabei in verschiedener Weise, theils auf trockenem Wege durch Rösten, theils unter Anwendung von Säuren, z. B. Kohlensäure. Besonders kräftige Wirkung in Beziehung auf die Ueberführung von Stärkemehl in Dextrin besitzt das Gerstenmalz, welches gleichzeitig auch Ueberführung des Dextrins in Zucker bewirkt, so dass nach Payen die ungekeimte Gerste 87% Stärkemehl und Cellulose, 5% Zucker und 4% Dextrin, die gekeimte 68% Stärkemehl und Cellulose, 15% Zucker und ebensoviel Dextrin enthält. Diese Umwandlung ist die Folge der Diastase oder des Maltins, von welcher Gerstenmalz bis 2% (mehr als andre gekeimte Cerealien) enthält und von der 1 Th. genügt, um bei 70° 2000 Th. Amylum allmählig in Dextrin und Zucker zu verwandeln. Nach dem patentirten Verfahren von Frerichs, Boie und Stromfeld werden, um in 100 Kgm. Mehl die Stärke in lösliche Kohlehydrate überzuführen, 6—8 Kgm. zerquetschtes Malz mit 40 Kgm. Wasser 2 Stdn. bei 50—60° digerirt, dann knetet man den filtrirten Malzauszug mit dem Mehle gut durch und setzt ihn der genannten Temperatur aus, worauf die Ueberführung des Amylums in Dextrin und Glykose in 1—2 Std. erfolgt, nach welcher Zeit das Präparat etwa 30% Dextrin, 30—35% Stärke- und 25—30% Eiweissstoffe nebst mineralischen Bestandtheilen enthält. Das Malz wurde früher zu 60,0—100,0 in Abkochungen bei chronischen Magenkatarrhen (Rush) und gegen Scorbut (Macbride) empfohlen, namentlich aber zu sog. Malzbädern benutzt, welche bei Rachitis und Scrophulose verordnet wurden. Zu letzteren kann man das bei 40—90° getrocknete sog. Darmmalz, das man der Farbe nach als gelbes und braunes (Färbemalz) unterscheidet, benutzen, während zur inneren Anwendung sich das wohlschmeckendere und süsse, ohne Anwendung künstlicher Wärme erhaltene Luftmalz besser eignet, welches im getrockneten Zustande ausser 1—2% Diastase 10% Dextrin, 3% Glykose, 11% Eiweissstoffe, 2% Fette und 3% Aschenbestandtheile enthält. Die digestive Wirkung der in dem Malz enthaltenen Diastase bei amyllumreicher Kost lässt sich ebensowenig wie die plastische Action der Proteinstoffe und der Nährsalze des Malzes in Abrede stellen. Besonderen Werth hat das Malz auch zur Bereitung des neben den Kindermehlen zur Auffütterung von Säuglingen vielbenutzten sog. Liebig's Nahrungsmittels für Kinder und Altersschwache, Pulvis nutritivus Liebig: feines Weizenmehl, auf der Kaffeemühle gemahlenes Malz aa 17,5, Lösung von Kaliumcarbonat (1:8) 30 Tropfen, Milch 175,0, Wasser 2,0. Die Mischung wird zuerst längere Zeit auf 60—70° erwärmt, um die Stärke des Weizenmehls durch das Malz in Zucker umzuwandeln, dann gekocht und durch ein feines Haarsieb gegeben. Diese Suppe kann einen Ersatz für Muttermilch bieten, deren Bestandtheile sie annähernd enthalten soll. Der Geschmack ist angenehm süss, und selbst neugeborene Kinder, welche die Suppe jedoch mit der gleichen Menge Wasser verdünnt erhalten müssen, geniessen dieselbe gern und gedeihen in der Regel bei dem Gebrauche sehr gut. Leichter auszuführen als die erste von Liebig gegebene Vorschrift ist die spätere, wonach zuerst das Mehl mit der Milch gar gekocht und dem heissen Brei das mit kaltem Wasser angerührte Malz zugesetzt wird, wo dann bei Stehen an mässig warmem Orte die Zuckerbildung reichlich erfolgt und der Brei dünnflüssiger und süsser wird, worauf man ihn aufkocht und durch das feine Sieb giebt.

Das früher officinelle Malzextract bildet eine gelbbraune, in Wasser mehr oder weniger klar lösliche Masse von süsslichem Geschmacke, welche durch-



schnittlich 8% Proteinsubstanzen, 25% Dextrin, 30% Glykose und 3,5% Aschenbestandtheile enthielt. Obschon der Nährwerth eines solchen Extracts nicht in Abrede zu stellen ist, enthalten doch die nach der früher üblichen Vorschrift bereiteten Malzextracte kein oder wenig Maltin, während sich unter Vermeidung des Eindampfens bei Siedhitze diastasereiche Malzextracte herstellen lassen, wie z. B. das Malzextract von Schering. Auch pulverförmige Malzextracte, wie sie von Liebig zuerst angegeben wurden, können diastatische Wirkung äussern. Man giebt das Malzextract theelöffelweise mehrmals täglich in Milch, Wein oder Bier. Um die Diastasewirkung hervortreten zu lassen, ist, da solche an einer mit Magensaft imprägnirten amyllumreichen Nahrung nicht zu Stande kommt, die Darreichung während der Mahlzeit empfehlenswerth, was durch Zusatz von Malzextract als Versüssungsmittel zu stärkemehlhaltigen Gerichten leicht möglich ist, denen das Präparat natürlich niemals bei Siedhitze, sondern stets nach Abkühlung auf 60° und darunter hinzugefügt werden muss.

Man hat das Malzextract vielfach als Excipiens von Arzneimitteln, insbesondere von Eisensalzen, Chininsalzen und Iodpräparaten benutzt. Das früher officinelle Extractum Malti ferratum wurde bereits S. 713 besprochen. Im Handel kommen ausserdem ein Extractum Malti saccharo-ferratum (3 Th. Eisensaccharat, 7 Th. Glycerin, 90 Th. Malzextract), ein Extractum Malti ferro-iodatum (mit 3% Iodeisensaccharat), ein Extractum Malti iodatum (mit 0,1% Iodkalium), ein Extractum Malti chininum mit 1% Chinintannat) und mehrere andere analoge Präparate vor. Die als Malzbonsbons im Handel vorkommenden Zuckerwerksformen gegen Husten und Brustleiden enthalten in der Regel kein Malzextract.

Mit dem oben besprochenen Malzextract sind nicht die als „Malzextract“ bezeichneten Biersorten identisch, unter denen das Malzextract von Hoff durch die Reclamen sattem bekannt ist. Diese Bezeichnung ist insofern nicht ungerechtfertigt, als das Bier, *Cerevisia*, einen gegohrenen Malzaufguss darstellt, welchem Hopfenaufguss oder Hopfenextract zugesetzt ist. Das Bier verhält sich zum Malz etwa, jedoch nicht ganz, wie der Kumys zur Stutenmilch, indem es zwar ebenfalls aus dem Zucker hervorgegangenen Alkohol und Kohlensäure neben Kohlehydraten, aber nicht die gesammte Menge der Eiweissstoffe des Malzes enthält. Die bitteren Braunbiere passen als diätetisches Heilmittel für schwache und Reconvallescenten weniger als die süssen oder wenig gehopften Biere (Mumme, Weissbier), da der Alkoholgehalt der ersteren, der bei gewöhnlichem Bier 1–3%, bei Bock, Salvator 4–5% und bei Englischem Porter und Ale oft bis 8% beträgt, zu gross ist und leicht Congestionen zum Kopfe macht, und da der an sich auf die Verdauung günstig influirende Zusatz von Hopfen häufig durch andere, selbst giftig wirkende Bitterstoffe (Pikrinsäure, Kockelskörner) in betrügerischer Weise ersetzt wird. Gutes Bier ist jedenfalls in mässigen Gaben ein sehr schätzbarer Bestandtheil der Krankendiät, welcher in Fällen, wo es sich um rasche Zunahme des Körpergewichts handelt, vor dem Weine verschiedene Vorzüge besitzt, auch meist besser tolerirt wird und als Getränk (auch mit Eiern als sog. Eierbier oder Warmbier) und in Suppen gegeben werden kann. Kohlensäurereiche Biere sind vielleicht bei chronischen Bronchialkatarrhen nicht ohne Nutzen und können auch die Diastasewirkung im Magen fördern, während die Eiweissverdauung, wahrscheinlich durch Bindung der Salzsäure mittelst der Phosphate, durch Bier beeinträchtigt wird, wie sich dies nicht nur bei künstlichen Verdauungsversuchen (Buchner), sondern auch bei Kranken durch Verdauungsverschlechterung bei bestehendem Magenkatarrh zu erkennen giebt.

Die zur Gewinnung des Bieres benutzte Bierhefe, *Fermentum s. Torula cerevisiae*, bekanntlich eine als *Cryptococcus cerevisiae* bezeichnete Alge, ist ihres Stickstoffgehaltes wegen als Plasticum innerlich zu mehreren Esslöffeln pro die, auch im Aufguss von Kleie, gegen Scorbut in Gebrauch gezogen (Neumann). Mehr Anwendung fand sie innerlich und äusserlich bei brandigen Affectionen; so mit Mehl gekocht, wobei Kohlensäure gebildet wird, bei brandigen Geschwüren, esslöffelweise mehrmals täglich mit Wasser und Zucker bei Angina gangraenosa oder Furunkeln. Die Em-

pfehlung bei Asiatischer Cholera (Crummey) und Diabetes (Wood) ist ohne Bedeutung.

**Cerealien.** — Neben der Gerste sind auch die Samen der sonstigen bei uns cultivirten, als Cerealien bezeichneten Gräser (Gramineen) als Nutrientien im Gebrauch und theilweise sogar wegen ihres grösseren Stickstoffgehaltes von bedeutenderem Nährwerthe. So enthält der sog. Weizen, die Samenkörner von *Triticum sativum* Lam. (T. vulgare Vill), 22% Proteinstoffe (auf 56 Th. Stärkemehl und 2—3% Mineralstoffe), welche indessen in der fein zerkleinerten Form, wie er zur Anwendung kommt, als sog. Weizenmehl, *Farina Tritici*, wegen des grösseren Gehaltes der Samenhüllen an stickstoffhaltigen Substanzen auf 7—14% herabgemindert sind. Diese Samenhüllen mit daran haftenden Stärkemehltheilchen bilden die sog. Weizenkleie, *Furfur tritici*, welche in Substanz genommen wohl nur vermöge mechanischen Reizes auf die Darmschleimhaut die Defécation fördert und deshalb in England und Amerika (auch in Abkochung und mit Schwarzbrotteig zu Brod verbacken) als mildes Purgans benutzt wird. Bei uns wird sie als Hausmittel in Abkochung bei Atrophie und Bronchialkatarrhen innerlich gebraucht oder zu Bädern (zu 1—2 Pfd. in einem Beutel) zugesetzt, von denen man sich tonisirende Wirkung bei schlecht genährten Kindern oder demulcirende Action bei Hautaffectionen verspricht. Sowohl Weizenkleie als Weizenmehl dienen nicht selten äusserlich zu Fomenten und Kataplasmen, so z. B. in Beuteln eingeschlagen bei Erysipelas (Volksmittel) und mit Wasser zu Teig gemacht (sog. *Cataplasma Fermenti*) bei Panaritien und schmerzhaften Geschwüren. Die *Farina Tritici* lässt sich mit Wasser verrieben auch als Antidot bei Vergiftung mit Iod, Quecksilber-, Kupfer- und anderen Metallsalzen benutzen und ist, mit Wasser und Milch gekocht, zu nährenden Suppen gewiss besser als blosses *Amylacea* (Arrow root u. s. w.) zu gebrauchen. Brodteig von ungesäuertem Brode (sog. *Euazyme*) ist zum Ueberziehen von Pillen statt Gelatine benutzt. Die Krume des aus Weizenmehl dargestellten Weissbrodes, *Mica panis albi*, dient als Pillenconstituens. Aufgüsse von gerösteten oder nicht frischen Semmeln sind als Getränk bei febrilen Affectionen in Gebrauch, doch ist im Allgemeinen das aus Schwarzbrod oder Roggenbrod dargestellte Brodwasser den Kranken angenehmer. Die meist aus Weingeist bereiteten Nahrungsmittel für Säuglinge (*Pulvis nutritivus* Liebig, Kindermehl u. s. w.) wurden bereits S. 741 besprochen. Das aus den Samenkörnern des Roggen, *Secale cereale* L., bereitete Roggenmehl, *Farina Secalis*, welches etwas weniger Proteinverbindungen als das Weizenmehl enthält, lässt sich im Ganzen wie letzteres benutzen und steht als äusserliches Medicament in Teigform als maturirendes Mittel (Schwarzbrotteig mit Honig) bei Abscessen und als deckendes Streupulver bei Rothlauf, Ekzem u. s. w. in der Volksmedizin in Ansehen. Noch weniger Proteinverbindungen als Roggen enthält der Hafer, die Samenkörner von *Avena sativa* L., welcher im geschälten Zustande die bei der Krankendiät unentbehrliche Hafergrütze, *Avena excorticata* s. *Semen Avenae excorticatum*, bildet, welche zu Krankensuppen und schleimigen Getränken die ausgedehnteste Anwendung findet. Haferschleim wird auch sehr häufig als Vehikel für scharfe Stoffe, Mineralsäuren u. s. w. benutzt. Sehr gut eignet sich Hafermehl seiner Billigkeit wegen zur Herstellung von Breiumschlägen. Ob Abkochungen der nicht geschälten Früchte wirklich Günstiges bei Hydrops leisten (Thémont), ist ebenso wenig wie die abführende Wirkung derselben wissenschaftlich erwiesen, ebenso wenig auch die Erfolge der Schnabelschen Hafercuren bei Diathesen und Dyskrasien. Reichlicher Genuss der Hafergrütze soll Entstehung von Darmconcrementen veranlassen können.

Die übrigen in einzelnen Theilen von Europa cultivirten Getreidearten (Mais, Spelz, Hirse, Sorghum) finden keine therapeutische Anwendung; dagegen ist der Samen des vorzugsweise im östlichen Asien und in Amerika gebauten Reis, *Oryza sativa*, der sog. Reis, *Semen Oryzae*, als diätetisches Arzneimittel viel benutzt, welches für sich oder mit Zusatz von Gewürzen (sog. *Reiscontent*, *Pulvis Content*), besonders mit Milch oder Wasser abgekocht, bei Schwächezuständen mit gleichzeitigen Diarrhöen passt. Der Nahrungswerth des Reis ist, soweit solcher von den Proteinstoffen abhängt, gering, da er 85% (in geschältem Zustande sogar 96%) Stärke auf etwa 7% Proteinstoffe

enthält weshalb er sich den Amylacea eher als den Cerealien anreicht. Das durch Absieben von Reis erhaltene Reismehl, *Pulvis Oryzae*, ist vorzugsweise Toiletteartikel. Reichlicher Genuss von rohem Reis soll durch Aufquellen im Darmcanal lebensgefährliche Verstopfung bewirken können (Hovell).

Aus dem Weizen hat man das Pflanzenfibrin in Gemein mit Pflanzenleim als Kleber, *Colla s. Gluten Triticum*, abgeschieden und zu Brod verbacken statt des gewöhnlichen Brodes in Anwendung bei Diabetes gezogen, um die Zuckerbildung zu verhüten. Taddeis Empfehlung des Klebers als Antidot bei Sublimatvergiftung ist der Geschichte anheimgefallen.

**Leguminosen.** — Nächst den Cerealien ist es besonders die Familie der Hülsenfrüchte oder schmetterlingsblüthigen Pflanzen, deren Samen sich durch einen grossen Gehalt an Eiweissstoffen, und zwar vorzugsweise Legumin oder Pflanzencasein, das sich im Organismus dem Pflanzeneiweiss analog verhält, auszeichnen, neben welchen auch Amylum sich findet. Als relativ billiges Nahrungsmittel eignen sich die hierher gehörigen Samen, z. B. die Erbsen, Bohnen, Vitsbohnen, zwar trefflich für Gesunde im Frieden und im Kriege (Erbsenwurst), sind dagegen für Kranke mit angegriffenen Verdauungswerkzeugen im Allgemeinen wenig empfehlenswerth. Zu den aus Leguminosensamen dargestellten Mitteln gegen Schwächezustände gehört die später wieder als *Revalenscière* aufgelebte *Revalenta* von Du Barry, über deren Werth die Wissenschaft längst den Stab gebrochen hat. Gewöhnlich wird dieselbe als Bohnenmehl bezeichnet, doch ist sie offenbar nicht immer gleich zusammengesetzt; häufig scheint sie das Mehl der in Südeuropa gebauten Kichererbse, *Cicer arietinum* L., zu enthalten. Ein durch feine Vertheilung ausgezeichnetes, auch für die Krankendiät brauchbares Präparat bildet die vielverbreitete Leguminose von Hartenstein und Vogler. Sehr empfohlen wird auch die Maltolleguminose von H. von Liebig, besonders da, wo es darauf ankommt, bei möglichst geringen Ansprüchen an die Verdauung die grössten Ernährungsergebnisse zu erzielen, z. B. bei entzündlichen oder ulcerativen Vorgängen im Magen und Darmcanal, bei Anämie, Chlorose, Scrophulose und Rachitis. Das Präparat gehört zu den oben erwähnten Nahrungsmitteln, in denen das Amylum vorzugsweise in Dextrin und Zucker übergeführt ist, und enthält ausserdem 21–23% Eiweiss. Bei künstlich ernährten Kindern wendet man Maltolleguminose zu  $\frac{1}{2}$  Theelöffel auf die Trinkportion von gleichen Theilen Milch und Wasser an, bei Erwachsenen meist mit Fleischbrühe als Suppe. Als ein sehr concentrirtes und selbst bei Magenleiden leicht verdautes Nahrungsmittel wird die Maltolleguminosenchocolade von H. von Liebig, welche nach Tichborne 21,80 Eiweissstoffe, 47,5 Kohlehydrate, 16,72 Fett, 2,03 Kalisalze und 1,45 Phosphorsäure enthält, bezeichnet (Fetzer). Man hat aus Erbsenmehl auch Peptone sowohl zum inneren Gebrauche als zur Ernährung vom Mastdarm aus dargestellt. Penzoldt empfiehlt 250,0 Erbsenmehl, 1000,0 Wasser, 1,0 Salicylsäure und 0,5 Pepsin unter Umrühren 23 Std. warm, jedoch unter 30° R. hinstellen und durch dichte Leinwand zu coliren, dann die erbsensuppenähnlich schmeckende Lösung im Wasserbade auf 2 Suppenteller voll einzuengen und mit Kochsalz und Gewürz zu versetzen. Ein Nahrungsklystier lässt Penzoldt aus 250,0 Erbsenmehl durch mehrstündige Maceration mit 500,0 Wasser, 1,0 Salicylsäure und 10 Tr. oder mehr Pankreatinglycerin bereiten. Verwendung findet noch hie und da das Bohnenmehl, *Farina fabarum*, das Mehl der Samen von *Phaseolus vulgaris* L. und *Phaseolus nanus* L., der sog. Vitsbohnen oder Schminkbohnen, *Fabae albae*, und zwar äusserlich in Fomenten oder Kataplasmen als zertheilendes Mittel bei Entzündungen von Drüsen (Orchitis, Mastitis). Dasselbe bildete früher mit Gersten-, Erbsen- und Lupinenmehl die *Farina quatuor resolutivum*. Es lässt sich auch als Pillenconstituens benutzen.

Wohl kaum den *Plastica* zuzurechnen ist der von der Pharmakopoe wohl nur im veterinärärztlichen Interesse aufgenommene **Bockshornsaamen**, **Semen Faenugraeci**, auch als **Semen Foeni Graeci** s. **Foenum Graecum**, Kuhhorn-, Hornkleesamen bezeichnet. Diese von der im Mittelmeergebiete wilden Leguminose *Trigonella Foenum Graecum* stammenden Samen sind graugelblich oder bräunlich, flachrautenförmig oder unregelmässig gerundet, 3–5 Mm. lang und bis 2 Mm. dick und werden durch eine oft nahezu diagonale Furche in zwei



ungleiche Hälften getheilt, in deren kleinerer das in die Ebene der Samenlappen und an den Rändern heraufgebogene dicke Würzelchen des gelben Keimes steckt, welcher sich nach dem Einweichen in Wasser aus einer ungefärbten, derben, schleimigen Haut und einer gelblichen, dünnen, zähen Samenschale herauslösen lässt. Sie sind von einem stark aromatischen, gleichzeitig an Steinklee und Urin erinnerndem Geruche und schmecken beim Kauen schleimig und bitter. Sie enthalten neben Eiweiss vorzugsweise Bassorin, dagegen kein Amylum, welches, wenn es sich in dem im Handel vorkommenden Pulver findet, auf Verfälschung mit Erbsenmehl deutet. Man benutzt die Samen in der Medicin höchstens noch zu zertheilenden Umschlägen wie Bohnenmehl oder in Abkochung zu erweichenden Klystieren. Früher setzte man sie auch Salben und Pflastern, z. B. dem *Emplastrum Foeni Graeci compositum s. malacticum*, zu.

**Semina Cacao, Nuclei s. Fabae Cacao, Cacaobohnen, Cacao.** Die schon beim *Oleum Cacao* S. 371 erwähnten *Semina Cacao* sind die Samen von *Theobroma Cacao* L. und verschiedenen anderen Arten der Gattung *Theobroma* (*T. bicolor* Humb., *T. glaucum* Karst. u. a. m.), welche ursprünglich in den Küstenländern und auf den Inseln des Mexikanischen Meerbusens einheimisch sind, jetzt aber in den amerikanischen Ländern zwischen dem 23° nördl. und 20° südl. Breite, auch auf verschiedenen ostasiatischen Inseln cultivirt werden. Dieselben bilden das Material zu dem unter dem Namen der *Chocolade* bekannten Getränke und kommen in den Handel entweder als an der Sonne getrocknete (*Sonnencacao*) oder meistens als vorher durch Eingraben in die Erde einem Gährungsprocesse unterworfenen und dadurch in ihrem Geschmacke sehr gemilderten Samen (sog. *Erdcacao* oder *gerottete Cacao*). Sie bestehen aus einer leicht zerbrechlichen Schale, welche bei der *Sonnencacao* fester adhärirt, und einem braunen, mit vielen weissen Häutchen durchzogenen Kerne. Die chemischen Bestandtheile der Cacaosamen sind, abgesehen von der Asche (3,5—3,8%), welche zu  $\frac{2}{5}$  aus an Kali, Kalk und Magnesia gebundener Phosphorsäure besteht, Fett (43—53%), Stärkmehl (10—18%), Proteinstoffe (13%), Zucker ( $\frac{1}{2}$ %), ein eigenthümlicher Farbstoff, das *Cacaoroth*, welches in der frischen Cacao sich nicht findet, und ein eigenthümliches Alkaloid, das *Theobromin*, welches sich durch seinen grossen Stickstoffreichthum auszeichnet und in den *Kotyledonen* zu 1,5, in den *Schalen* zu 1% enthalten ist. Es ist krystallinisch, sublimirbar, wenig in Wasser, Weingeist und Aether löslich; seine Salze werden von Wasser zersetzt. Es tödtet zu 0,06 Frösche, zu 0,5 Tauben und zu 1,0 Kaninchen, wirkt in Lösung vom Magen und vom Unterhautbindegewebe aus und geht in den Harn über. Bei rascher Resorption bedingen toxische Gaben Krämpfe; Herz, Muskeln, periphere Nerven und Peristaltik werden nicht gelähmt (*A. Mitscherlich*).

Die Cacaosamen sind nicht als blosse Genussmittel, welche nur durch das Theobromin auf das Nervensystem erregend wirken, sondern vermöge ihres Gehaltes an Proteinsubstanz, Kohlehydraten und Nährsalzen ein wirkliches Nahrungsmittel, das allerdings wegen seines Fettreichthums nicht immer leicht vom Magen ertragen wird. Man bedient sich deshalb auch sehr oft der ihres Fettes theilweise beraubten Bohnen, der sog. *entölten Cacao*, *Semen Cacao expressum s. ab oleo liberatum*. Man benutzt die Cacao stets geröstet, und zwar theils zur Darstellung von wässrigen *Decocten* (1 : 8—20), die man als vorzügliches Surrogat des Kaffee und Thee diätetisch benutzen lässt, theils zur Darstellung der verschiedenen *Chocoladen*, die man durch Zerstossen der enthülsten *Semina Cacao* im erwärmten Mörser gewinnt. Ohne weiteren Zusatz bildet der dabei entstehende und beim Erkalten festgewordene Teig die als *Constituens* für *Trochisken* und auch als pulverförmiges Vehikel für viele bittere Stoffe, z. B. *Chinin*, äusserst empfehlenswerthe *Pasta Cacao s. cacaotina*, *Cacaomasse*; mit Zusatz von Zucker die (meist aus entöltem Cacao bereitete) *Gesundheitschocolade*, *Pasta Cacao saccharata s. Chocolata medica s. simplex*; mit Zimmt u. a. Gewürzen die *Gewürzchocolade*, *P. C. aromatica*, von der als besondere Art die *Vanillechocolade* am meisten geschätzt wird; mit verschiedenen Heilmitteln (z. B. *Lichen Islandicus*, *Farina Hordei praeparata*, *Salep*, *Chinaextract*, *Eisen*) die

medicamentösen Chocoladen. Auch die bei der Chocoladebereitung abfallenden Cacaoschalen, *Cortex Cacao tostus*, lassen sich diätetisch als Surrogat des Kaffees benutzen und bilden die Grundlage mancher im Handel befindlicher Nahrungsmittel (*Cocoa u. a.*).

*Amylum Marantae*, *Amylum arrow*; Marantastärke, Arrow root, Pfeilwurzelmehl, Westindischer Salep. — Wir schliessen die vegetabilischen *Plastica* mit verschiedenen ausschliesslich innerlich verwertheten Stärkemehlarten, unter denen die aus den Wurzelstöcken diverser in tropischen Ländern der alten und neuen Welt theils einheimischer, theils cultivirter Arten der Gattung *Maranta* (Fam. *Marantaceae*), besonders von *Maranta arundinacea* L., gewonnene Marantastärke, meist Arrow root genannt, früher officinell war. Das Arrow root kommt zum grössten Theile aus Westindien, z. Th. aus Ostindien, Südamerika und Südafrika, wo ausser *Maranta arundinacea* auch *M. Indica* Tuss., *M. Alloya* Jacq. und *M. nobilis* L. zur Gewinnung benutzt werden sollen. Es bildet ein sehr feines, mattweisses Pulver, welches die chemischen Charaktere des Stärkemehls (p. 338) besitzt und zeigt sich mikroskopisch aus eiförmigen (bei *M. Indica* runden), einfachen Körnern bestehend, welche gewöhnlich am stumpfen Ende, seltener in der Mitte einen Querriss und ausserdem deutliche, feine, excentrische Schichten darbieten. Die Körner von *Maranta arundinacea* L. sind viel kleiner als Kartoffelstärkemehlkörner; noch kleiner sind die minder deutlich geschichteten von *M. Indica*. Im Handel kommen unter dem Namen Pfeilmehl oder Arrow root eine Menge anderer Stärkemehlarten vor, welche medicinisch nicht zulässig sind. Dahin gehören das Ostindische Arrow root, von *Curcuma angustifolia* Roxb. und *C. leuorrhiza* Roxb., welches aus glatten, elliptischen oder eirunden, oft an einem Ende stumpfspitzigen, einfachen Körnern besteht, die einen sehr grossen Kernpunkt am schmalen Ende und sehr deutliche, excentrische, mondformige Schichten darbieten; ferner das Brasilianische Pfeilmehl, *Tapiocamehl*, *Mandiocamehl*, *Cassavemehl*, *Amylum Manihot*, das aus den Wurzelknollen von *Manihot utilissima* Pohl (Fam. *Euphorbiaceae*) dargestellt wird und Körner bildet, welche aus 2–8 zusammenhängenden, auf der einen Seite quer gebogenen oder winkligen Körnern mit deutlicher Schichtung und centralem Kernpunkte bestehen. Andere Arrow root-Arten, z. B. Australisches, sog. *Ota-haiti Salep*, *Amylum Taccae*, von *Tacca oceanica*, und *Chile-Arrow root*, *Amylum Alstroemeriae* u. s. w., gelangen nicht in unseren Handel. Häufig kommen dagegen Verfälschungen des Arrow root mit Kartoffelstärkemehl vor, dessen Körner schon bei 40° (Arrow root erst bei 70°) im Wasser aufquellen, in verd. Salzsäure bei 40° sich auflösen, was diejenigen von Arrow root nicht thun, und einen dicken, schwach nach unreifen Vitsbohnen riechenden Kleister geben.

Das Arrow root geht wie alle Stärkemehlarten unter dem Einflusse des Speichels und Bauchspeichels im *Tractus in Dextrin* und *Glykose* über und gelangt als letztere in das Blut. Es folgt daraus, dass es allein gebraucht nicht zur Ernährung ausreicht, und in der That sieht man bei der Benutzung des Arrow root als ausschliessliches Nahrungsmittel für atrophische rachitische und scrophulöse Kinder, wo es besonders in Ruf steht, nicht selten Verschlimmerung des Zustandes. Man muss es daher stets gleichzeitig mit wirklichen *Plastica* (Milch, Bouillon) einführen, und nicht in zu grossen Mengen, höchstens zu 1 Theelöffel im Tage, verbrauchen lassen. Vorzugsweise passt es bei solchen Kindern, welche an Diarrhöen leiden, indem das Medicament nach Art aller *Amylacea* stopfend wirkt. Seine exclusive Stellung unter den *Amylaceen* lässt sich nur aus dem reinen und angenehmen Geschmacke des Marantamehles erklären. Letzterer empfiehlt dasselbe auch für Erwachsene unter manchen Verhältnissen. Es ist Thatsache, dass Kohlehydrate bei der Ernährung einen Ersatz für stickstoffhaltiges Material in beschränktem Maasse zu bieten vermögen. In Fällen, wo Magensaft in nicht genügender Menge ausgeschieden wird, um Eiweisskörper in Peptone überzuführen, kann man deshalb *Amylaceen* zur Erhaltung des Lebens einige Zeit verwenden. Ein solcher Zustand ist z. B. im Fieber vorhanden, wo deshalb von Alters her Abkochungen von *Amylaceen* in Ansehen standen (z. B. von Gerste, Brodkrumen), deren Bedeutung für die Diät von Fieberkranken um so höher anzuschlagen ist, als z. B. die Kalisalze im Fleische und in der Fleischbrühe die Pulsfrequenz zu steigern vermögen. Hier ist *Amylum*

Marantae von Nutzen, auf die Dauer aber genügt dasselbe ebenso wenig wie andere Bestandtheile der sog. reizlosen Fieberkost.

Sago. — Dem Amylum Marantae am nächsten verwandt und ökonomisch als Diaticum fast noch häufiger benutzt ist das theils in Form von Mehl (Sagomehl), theils von Körnern (Sago, Perlsago) vorkommende Mark der besonders auf den Holländisch-Ostindischen Inseln wachsenden Sagopalme (*Metroxylon Rumphii* Koen. s. *Sagus Rumphii* W. u. a. Arten), welches sich dadurch auszeichnet, dass es in siedendem Wasser bloss aufquillt, nicht zergeht. Auch Sago ist häufig verfälscht. Der Fibrinsago des Handels ist eine Mischung von Stärkemehl, Eiweiss, Gelatine und Zucker. — Als Portland Sago oder Portland Arrow root wird das Satzmehl aus den Wurzelknollen verschiedener Arum-Arten, u. a. auch des bei uns einheimischen *Arum maculatum* L., bezeichnet.

Racahout. — Ein Gemenge von Arrow root u. a. Amylumarten mit Cacaopulver und Gewürzen bildet das von Frankreich als theures und mässig gutes Nährmittel angepriesene Racahout de l'Orient (R. des Arabes, R. du serail). Das im Orient geschätzte, als Racahout bezeichnete Mittel, ebenfalls für Kinder empfohlen, ist das Satzmehl der Samen der in Südeuropa und Nord-Afrika einheimischen Eichenart *Quercus Ballota* L. Dieselben schliessen sich an den früher bei uns officinellen Eichelkaffee, *Glandes Quercus tostae*, die von ihrer lederartigen Fruchtschale befreien und nicht zu stark gerösteten Samen unserer einheimischen Eicheln (vgl. S. 508). Die Eicheln enthalten 38% Stärkemehl, welches beim Rösten theilweise in Dextrin übergeht, 9% Gerbsäure, 4% fettes Oel, 7% nicht krystallisirenden Zucker, einen eigenthümlichen mannitähnlichen Zucker (Quercit oder Eichelzucker) und eine geringe Menge ätherischen Oeles. Der Eichelkaffee, welchen man meist als Decoct, besser jedoch als Aufguss bereitet, wozu man 4,0–8,0 auf die Tasse rechnet, und mit Milch und Zucker geniessen lässt, ist bei scrophulösen Kindern, die sich an den Genuss desselben sehr bald gewöhnen, als diätetisches Hausmittel sehr empfehlenswerth, namentlich wenn Tendenz zu Darmkatarrhen und Durchfällen besteht. Auch Eichelchocolade, welche besser schmeckt, findet in gleicher Richtung Verwendung.



## **IX. Classe. Antidyscratica, Antidyskratische Arzneimittel.**

Die Bezeichnung dieser Classe, von rein therapeutischem Gesichtspunkte aus gewählt, da andere, auf der physiologischen Wirkung beruhende Namen, wie Antiplastica, für alle oder für einzelne unpassend sind, enthebt uns der Nothwendigkeit ausführlicher Vorbemerkungen. Die meisten hier abzuhandelnden Substanzen sind unorganische Körper, wenige stammen aus dem Pflanzenreiche. An die ersteren reihen sich manche bereits bei den Plastica besprochenen Stoffe, z. B. die Alkalien, eng an, an die letzteren manche auf Diurese und Diaphorese einwirkende Medicamente. Eine Eintheilung nach den einzelnen Krankheitszuständen (Syphilis, chronische Hautleiden, Scrophulose, Rheumatismus, Gicht, Krebs u. s. w.), gegen welche die Antidyscratica gebraucht werden, ist unthunlich, da viele gegen alle derartigen Zustände in Anwendung gebracht werden. Wir theilen sie daher nur in zwei Ordnungen nach ihrer Abstammung.

---

### **1. Ordnung. Antidyscratica anorganica; Anorganische antidyskratische Arzneimittel.**

**Stibium sulfuratum nigrum**, Stibium sulfuratum crudum, Antimonium nigrum s. crudum, Sulfuretum Stibii; **Spiessglanz**, Schwefelspiessglanz.

Von dem grossen Heere der Antimonialien, welches man im 16. und 17. Jahrhundert gegen alle möglichen chronischen und acuten Krankheiten des Blutes und der Organe ins Feld führte, ist als ausschliessliches Antidyscraticum nur das seiner Unlöslichkeit wegen am wenigsten wirksame, freilich auch am mindesten gefährliche Dreifach Schwefelantimon,  $\text{SbS}_3$ , übrig geblieben, während alle übrigen Antimonialien vorzugsweise als Emetica oder Expectorantia Anwendung finden. Das Antimonium crudum wird aus dem in vielen Gegenden Europas natürlich vorkommenden Grauspiessglanzerz durch Aussaigern gewonnen. Das reinste, von Blei und Arsen freie und deshalb ausschliesslich zum medicinischen Gebrauch dienende kommt aus Ungarn (sog. Rosenauer Spiessglanzerz). Das Spiessglanzerz bildet grauschwarze, strahligkrystallinische Massen von 4,6 bis 4,7 spec. Gew., welche unter Befeuchtung mit Wasser sich leicht zu einem grauen geschmack- und geruchfreien Pulver, dem Stibium sulfuratum laevigatum s. depuratum zerreiben lassen. Es ist in Wasser völlig un-

löslich, löst sich aber in conc. heisser Salzsäure und unter Bildung von Sulfosalzen in wässrigen Alkalien. Das auf nassem Wege gewonnene Antimonsulfür, welches nicht schwarz, sondern schön orangeroth und amorph ist, *Stibium sulfuratum rubrum*, ist nicht officinell. Von Wunden und Geschwüren findet Resorption von Schwefelantimon nicht statt; auch vom Magen aus werden gewiss nur winzige Mengen resorbirt, so dass die Annahme, dass die dem *Antimonium crudum* bei chronischen Haut- und Drüsenleiden, Scrophulose, Rheumatismus, Gicht und Syphilis zugeschriebenen Heileffekte auf dessen Verunreinigungen (Arsen) zu beziehen seien, nicht ganz zu beseitigen ist. Jetzt wird das A. c. fast ausschliesslich in der Veterinärpraxis benutzt. Die Dosis des *Stibium sulfuratum laevigatum* wird auf 0,3–0,6 und mehr mehrmals täglich angegeben, die man in Pulver oder Pillen reichen kann. Früher waren Abkochungen von *Antimonium crudum* mit Holztränken (*Decoctum Lusitanicum* u. a.), welche selbstverständlich nur geringe Mengen Antimon enthalten können, bei Syphiliden und chronischen Exanthenen gebräuchlich; jetzt haben weder diese noch andere in derselben Richtung verwendete alte Vorschriften, z. B. *Pulvis depuratorius Jasseri*, *Morsuli antimoniales Kunkelii*, Anrecht auf Berücksichtigung rationeller Aerzte.

Das Nämliche gilt von den als Schwefelantimoncalcium chemisch charakterisirten diversen Präparaten, welche gegen Rheumatismus, Gicht und chronische Hautausschläge gerühmt sind, z. B. der von Hufeland empfohlenen *Calcaria stibiata sulfurata* s. *Calcaria sulfurata Hoffmanni*, ebenso von dem durch Glühen von *Antimonium crudum* mit Hirschhörnern erhaltenen *Jamespulver*, *James powder*, *Antimonial powder*, welches in England zu 0,1–0,4 in Pillen, Pulver oder Bissen bei den genannten Krankheiten und als Diaphoreticum bei Bronchialkatarrhen in Ansehen steht.

#### Quecksilberpräparate, Mercurialia.

Die Gleichheit der Erscheinungen, welche nach längerem Gebrauche des Quecksilbers und seiner Verbindungen sich geltend macht, ebenso wie die Anwendung aller bei fast den nämlichen pathologischen Zuständen macht es zweckmässig, zur Vermeidung von Wiederholungen der Besprechung der einzelnen Präparate eine Darstellung der allen sog. Mercurialien gemeinsamen Verhältnisse vorzuschicken. Die Unterschiede der einzelnen sind vorzugsweise in den örtlichen Wirkungen begründet, auch sind die Verhältnisse der Resorption nicht für alle gleich, doch erscheint es auch hier angemessen, dieselben, wie die der Elimination, gemeinsam zu betrachten.

In Hinsicht auf die örtliche Wirkung reicht es nicht aus, wie bei den *Martialia*, in *Mercurialia fortiora* und *mitiora* zu unterscheiden, da neben kaustisch wirkenden Verbindungen (Quecksilberoxyd, Quecksilberchlorid, Quecksilberiodid), deren Wirkung auf Affinität zu Eiweissstoffen beruht, und neben örtlich völlig indifferenten Quecksilberverbindungen auch solche existiren, welche bei Einführung in den *Tractus Purgiren* erzeugen (Quecksilbermetall, Calomel). Die örtlich ätzend wirkenden Mercurialien können auch in entfernten Organen, z. B. den Nieren, zu Entzündungserscheinungen führen.

Durch Mialhe wurde die Ansicht aufgestellt und verbreitet, dass alle Quecksilberverbindungen — wenigstens bei Einführung in den Magen — in Quecksilberchlorid verwandelt würden, welches sich mit Eiweiss verbinde, worauf das Quecksilberchloridalbuminat in die Circulation gelange. Diese Theorie ist indess nicht ausreichend, da wenigstens für das Quecksilbermetall ein directer

Uebergang in Dampfform in das Blut erwiesen ist, ein Factum, welches auch für die Resorption anderer Quecksilbersalze, welche im Magen theilweise in Quecksilbermetall sich umwandeln, nicht ohne Bedeutung ist. Eine solche Umwandlung erleidet nicht allein das Quecksilberchlorür, sondern alle Oxydulsalze, indem sie im Contacte mit Eiweissstoffen sich theilweise in Oxydsalze unter Abscheidung von Quecksilbermetall verwandeln. Obschon nach Polotschnow Quecksilberalbuminat bei der Diffusion nur Eiweiss und kein Quecksilber abgiebt, wird dasselbe sowohl vom Magen als vom Unterhautbindegewebe aus resorbirt, so dass eine Quecksilberverbindung im Harn nachgewiesen werden kann, und es liegt somit die Möglichkeit vor, dass Quecksilberoxyd und viele Salze desselben, welche sich direct mit Eiweiss zu einem Albuminate verbinden, als solches in das Blut gelangen können, ohne dass zuerst Quecksilbersublimat und daraus wieder Quecksilberchloridalbuminat gebildet wird. Bei der Aufnahme dieser Verbindungen in das Blut sind offenbar die Alkalichlorüre von einer hervorragenden Bedeutung, insonderheit das Chlornatrium, welches sich mit Quecksilberchlorid zu einem leicht löslichen Doppelsalze, dem Natriumquecksilberchlorid, verbindet, das entweder als solches oder in einer von Quecksilberchloridalbuminat verschiedenen Eiweissverbindung in das Blut übertritt. Kochsalzlösung und ebenso Chlorammoniumsolution machen Sublimatalbuminat löslich und diffusionsfähig, offenbar, indem sich ein lösliches Quecksilberalbuminat bildet, indem man aus dieser Solution Quecksilber durch Schwefelwasserstoff nicht ausfällen kann.

Die Verhältnisse des Quecksilberchlorids und anderer Quecksilberverbindungen werden bei den einzelnen Präparaten besprochen. Die Bedeutung der Alkalichlorüre für die Aufnahme der Quecksilberverbindungen in das Blut zeigte zuerst Voit, welcher den Nachweis lieferte, dass alle Quecksilberoxydverbindungen und das Quecksilberiodid sich mit Leichtigkeit in Quecksilberchlorid und das Alkalisalz der betr. Säure umsetzen. Es ist also bei diesen sowohl im Magensaft als auch bei subcutaner Application die Bildung von Quecksilberchlorid durch das Chlornatrium des Magensaftes und des Blutes anzunehmen, wofür auch der Umstand spricht, dass dieselben sämmtlich ätzende Wirkung besitzen und dass sie auch in ihren entfernten Wirkungen nach Art des Sublimats sich verhalten. Auch beim Quecksilberoxyd selbst ist eine solche Umwandlung in Quecksilberchlorid im Magen wahrscheinlich. Bärensprung zeigte zuerst die Spaltung der Quecksilberoxydulverbindungen in Oxydverbindungen und Quecksilbermetall. Dasselbe gilt auch für das Quecksilberchlorür, welches in Berührung mit Eiweiss sich in Quecksilberchlorid und Quecksilber umsetzt, ferner für das Quecksilberiodür, aus welchem Iod freigemacht wird, das als Iodkalium resorbirt wird. Voit u. A. nahmen früher an, dass auch bei dieser Ueberführung, soweit sie im Magen stattfände, das Chlornatrium des Magensaftes die hauptsächlichste Rolle spiele, indess ist dies unwahrscheinlich, da nur concentrirte Kochsalzlösungen aus Calomel bei Gegenwart von Luft Sublimatbildung veranlassen, nicht aber solche, wie sie dem Gehalte des Magensaftes an Chlornatrium entsprechen (Blomberg). Für Calomel ist also nur eine theilweise Umwandlung in Sublimat im Magen gegeben, ein Theil wird zu Quecksilbermetall verändert, welches, wenn auch bei Schütteln von Quecksilbermetall mit conc. Kochsalzlösung bei Gegenwart von Sauerstoff sich Calomel und Sublimat bilden (Voit), doch im Magen dieser Umwandlung nur in sehr geringem Maasse zu unterliegen scheint. So erklärt es sich, dass Calomel u. a. sich ähnlich verhaltende Mercurialien nicht die kaustischen Effecte des Sublimats, wohl aber



die demselben und dem Quecksilbermetall gemeinsamen entfernten Wirkungen — und zwar relativ stärker — entfalten. Es erklärt sich ferner aus dem Verhalten des Calomels u. s. w. gegenüber den Eiweissstoffen, dass es trotz seiner Unlöslichkeit in Wasser auch bei subcutaner Application, d. h. ohne den Einfluss des Magensaftes resorbirt wird und entfernte Erscheinungen bedingt.

Wie sich die ins Blut gekommenen Quecksilberverbindungen — Quecksilberchloridnatrium und Hg — dort weiter verhalten, ist rein hypothetisch. Voit nimmt auch für letzteres eine Umwandlung in Chlorid unter dem Einflusse der Chloralkalien des Blutes an, Blomberg Oxydation zu Quecksilberoxyd und aus diesem directe Bildung von Quecksilberalbuminat, welches sich in den Chloralkalien auflöst. Dieses Quecksilberoxydalbuminat wird übrigens auch von Voit als das Endproduct des im Organismus circulirenden Quecksilbers betrachtet, wofür der Umstand spricht, dass dem Quecksilberchloridalbuminat durch Auswaschen mit Wasser alles Chlor entzogen werden kann.

Es muss noch hervorgehoben werden, dass bei Einführung von Quecksilbersalzen in den Magen nicht Alles zur Resorption gelangt, namentlich bei solchen, welche purgirend wirken, indem der Schwefelwasserstoff zu einer Bildung von unlöslichem und nicht durch Eiweissstoffe alterirtem Schwefelquecksilber führt.

Das resorbirte Quecksilber ist sowohl im Blute als in den verschiedensten Organen längere Zeit nachweisbar und wird hauptsächlich durch die Galle und die Darmdrüsen, theilweise auch durch den Urin, Speichel und selbst durch die Milch, wahrscheinlich auch durch die Perspiration ausgeschieden.

Bei Thierversuchen fand Riederer verhältnissmässig viel Quecksilber in der Leber, mehr als im Herzen, Muskeln und Gehirn; R. Overbeck constatirte es fast in allen Organen, am wenigsten in den Knochen. In dem Urin misslingt der Nachweis nur selten, häufiger im Speichel; bei Säugenden findet sich nach Quecksilbereinreibungen fast ebenso viel Q. in der Milch als im Harn (Mayencon und Bergeret). Im Darm und Koth findet sich Quecksilber in grossen Mengen constant auch bei externer Application. v. Vajda und Paschkis (1880) fanden Quecksilber im Harn bei Syphilitischen während Inunctionscuren 18 mal unter 24 Fällen, bei internen Sublimaturen 7 mal in 11 Fällen und bei Curen mit subcutan injicirtem Sublimat oder Quecksilbercyanid ausnahmslos. Nach O. Schmidt (1879) gelingt der Nachweis von Quecksilber im Harn beim Menschen nach zweimaliger Subcutaninjection von 0,01 Sublimat und lässt sich bei einer Tagesgabe von 0,01 die Quecksilbermenge im Harn vom 3. bis 8. Tage an quantitativ bestimmen. Bei Einreibungscuren mit grauer Salbe tritt die Abscheidung von neunenswerthen Quecksilbermengen verhältnissmässig langsam auf und bleibt bei Benutzung von 0,2 bis 0,4 lange unter den Werthen, welche 0,01 Sublimat entsprechen; bei sehr langer Inunctionscur kommt oft starke Quecksilberausscheidung im Harne vor. Bei Sublimaturen können sogar 14,1% wieder durch den Harn ausgeschieden werden (O. Schmidt). Auch in den Faeces scheint Quecksilber nach Einreibung grauer Salbe später aufzutreten als nach Subcutanapplication von Quecksilberchlorid. Dass die Speicheldrüsen in Bezug auf die Elimination des Quecksilbers eine nur untergeordnete Rolle spielen, beweisen ausser dem häufigen Fehlschlagen des Quecksilbernachweises auch directe Versuche O. Schmidts an Hunden. In allen Fällen persistirt nach Quecksilbercuren die Ausscheidung durch den Urin noch mehrere Tage nach dem Aufhören der Quecksilberzufuhr. Später geschieht dieselbe manchmal in grösseren Zwischenräumen, oft gelingt es nach monatelangem Cessiren der Elimination durch Darreichung von Bromkalium oder Iodkalium Spuren von Quecksilber im Urin auftreten zu lassen (Kletzinsky, Rabuteau). Die Deposition ist im Allgemeinen eine nicht so dauernde wie beim Silber oder Blei; doch wiesen v. Vajda und Paschkis Quecksilber im Harn noch 13 Jahre nach einer Schmiercur nach. Bei chronischem Mercurialismus hat man noch mehrere Jahre, nachdem die Patienten nicht mehr mit Quecksilber in Berührung gekommen waren, goldne Ringe durch Q. sich weiss färben gesehen.

Grosse Dosen löslicher Quecksilberpräparate können zu schwerer

Intoxication führen, welche sich vor allem durch heftige Entzündung im Verdauungstract charakterisiren. Auch die externe Anwendung corrosiver Quecksilberpräparate und die Subcutaninjection kann zu gleichen gastroenteritischen Erscheinungen führen, die offenbar, wie die bei Mercurialismus selten vermissten entzündlichen Erscheinungen seitens der Nieren, als Eliminationswirkung zu betrachten sind. Bei nicht allzu raschem letalem Verlaufe können auch Erscheinungen, welche bei längerer Zufuhr kleinerer Mengen von Quecksilberpräparaten resultiren, hinzutreten.

Wiederholt sind tödtliche Vergiftungen nach Einreibung von Sublimat- oder Quecksilbernitratsalben vorgekommen, wo post mortem hochgradige Magen-Darmentzündung neben fettiger Degeneration in Leber, Nieren und Muskeln constatirt wurden. Bei Kaninchen sind bei nicht zu kurzdauernder Vergiftung durch subcutan eingeführte Mercurialien Infarcte der Harncanälchen, Darm-diphtherie und Hyperämie des Knochenmarks die constantesten Erscheinungen (Heilborn). Bezüglich der Symptomatologie dieser Vergiftung wird das Nähere bei Sublimat angegeben werden. Versuche, welche v. Mering mit einer nicht ätzenden Quecksilberverbindung (Glykokollquecksilber) anstellte, ergaben eine lähmende Wirkung auf das Gehirn und später auch auf die übrigen Nervencentren, starkes und rasches Sinken des Blutdrucks in Folge von Abschwächung der systolischen Contractionen des Herzens, dessen Schlagzahl erheblich herabgesetzt wird und welches häufig plötzlich zu schlagen aufhört, Irregularität der Athmung bei Vermehrung der Frequenz, sowie allgemeine Schwäche und Hinfälligkeit, die bei Warmblütern nicht auf eine Herabsetzung der Muskelirritabilität, wie sie bei Fröschen Harnack nach Natriumquecksilberiodid und Natriumquecksilberpyrophosphat constatirte, bezogen werden kann.

Unter den Symptomen der allgemeinen Quecksilberwirkung allmählig resorbirter Mengen von Mercurialien nehmen — gleichgültig bei welcher Einführungsweise — entzündliche Erscheinungen im Munde und Vermehrung der Speichelsecretion als die zuerst und am häufigsten zu beobachtenden die oberste Stelle ein.

Die Stomatitis mercurialis ist die häufigste aller Formen der sog. chronischen Quecksilbervergiftung, Hydrargyrose, Mercurialismus s. Hydrargyrismus chronicus, mag dieselbe durch die Einwirkung von Mercurdämpfen u. s. w. oder durch die Anwendung des Quecksilbers als Medicament entstehen. Die ersten Erscheinungen sind Hitzegefühl im Munde und metallischer Geschmack, manchmal mit geringer Vermehrung der Mundflüssigkeit verbunden; dazu gesellen sich dann bei weiterer Zufuhr von Mercurialien Schwellung, Röthung und Empfindlichkeit des Zahnfleisches, das Gefühl, als ob die Zähne länger würden oder wackelten, zugleich ein eigenthümlicher fötider Geruch aus dem Munde (Halitus mercurialis), meist auch Zungenbelag, etwas erschwertes Kauen und deutliche Vermehrung der Speichelsecretion. Dies sind die praemonitorischen Symptome wirklicher Gingivitis und Stomatitis; hört die Einführung der Noxe nicht auf, so bildet sich bald ein schleimiger weisser Belag an den Zahnfleischrändern, wirkliches Lockerwerden der Zähne, dann Geschwüre am Zahnfleische und an anderen Stellen der Mundschleimhaut, Anschwellung der Zunge, ausserordentlich intensiver Foetor oris, wohl von flüchtigen Fettsäuren im Speichel abhängig, und wirklicher Speichelfluss (Salivatio, Ptyalismus). Bisweilen besteht dabei starkes Unwohlsein und Fieber. Sprache, Kauen und Schlucken sind in Folge der Anschwellung, an welcher Lippen, Wangen, Uvula, Gaumensegel, Tonsillen und die benachbarten Lymphdrüsen participiren, stark behindert. Die Geschwüre sind gezackt, mit unregelmässigen Rändern, oft livid, sondern ein dünnes Secret ab und bluten leicht; die Zähne schwärzen sich und fallen schliesslich aus. Die Menge des secernirten Speichels kann bei der ausgebildeten Stomatitis mercurialis bis zu 16 Pfd. im Tage betragen. Derselbe ist anfangs mehr schleimig, später mehr wasserhell, manch-

mal mit Eiter oder Blut gemengt; sein spec. Gew. wird anfangs durch vermehrten Gehalt an Eiweiss und Fett gesteigert, sinkt aber später unter die Norm. Die Reaction ist meist alkalisch, sehr selten sauer (Wright), das Ptyalin vermehrt. Der Speichel enthält dabei wohl stets Quecksilber. Die Dauer des Speichelflusses beträgt bei Aussetzen der Quecksilberzufuhr und passender Behandlung in der Regel 14–20 Tage. In sehr schlimmen Fällen kann die Stomatitis zu Gangrän der Weichtheile führen, ja es kann die Entzündung auf den Kiefer sich fortpflanzen und nekrotische Zerstörung der Processus alveolares oder selbst des Körpers der Kieferknochen bewirken, oder es kann, wovon mir selbst zwei Fälle bekannt sind, durch Verwachsung des Zahnfleisches und der Wangenschleimhaut Pseudankylose des Unterkiefers entstehen, welche chirurgische Eingriffe notwendig macht. Selbst tödtlicher Ausgang durch Consumption oder Pyämie wird angegeben.

Das Auftreten des Ptyalismus nach Einverleibung von Mercurialien lässt sich weder an eine bestimmte Zeit noch an eine bestimmte Dosis binden. Selten erscheint derselbe vor Ablauf von 24 Stunden nach Einführung von Mercurialien als Medicament. Metallisches Quecksilber und Calomel sollen angeblich leichter Speichelfluss herbeiführen. Einzelne Personen werden weit leichter als andere betroffen. Man schreibt im Allgemeinen den Frauen eine grössere Empfänglichkeit als den Männern zu; doch bezieht sich dies wohl nur auf die externe Anwendung des metallischen Quecksilbers in Salbenform, wodurch überhaupt Personen mit zarter Epidermis, indem diese dem Durchdringen des Quecksilbers geringeren Widerstand entgensetzt, rascher afficirt werden. Andererseits wird Kindern eine grössere Toleranz vindicirt, was sich aber wohl nur auf purgirende Dosen Calomel bezieht, die den kurzen Darm der Kinder rascher passiren können, ohne der Resorption zu unterliegen. Die Vergleichung der einzelnen Präparate ist misslich; von Quecksilber und Calomel werden stets viel grössere Dosen gegeben als von Sublimat, und wenn durch erstere eher Ptyalismus eintritt, so sind nichtsdestoweniger grössere Mengen Hg wirksam gewesen als bei der Sublimatcur. Man vergesse auch nicht, dass Calomel weit mehr Hg enthält als Sublimat. Die Thatsache, dass kleine nicht purgirende Dosen Calomel leichter Ptyalismus erregen als grosse purgirende, bedarf keiner Erklärung. Idiosynkrasien gegen Quecksilberpräparate sind sehr häufig beobachtet. Bei einzelnen Personen kann Quecksilberchlorür schon zu 0,2 Ptyalismus und mehrwöchentliche Stomatitis bedingen (Farquharson). Gutgenährte Personen werden weit weniger leicht afficirt als durch Hunger heruntergekommene (daher Verbindung von Quecksilbercuren mit Hungercuren, wenn man absichtlich Salivation erregen will). Nach Farquharson soll längerer Aufenthalt in den Tropen zu Idiosynkrasie gegen Quecksilbermittel Anlass geben können.

Die Mundentzündung scheint auch theilweise von dem directen Hineingelangen von Quecksilberverbindungen in den Mund bedingt zu sein; Application von Quecksilbersalbe in der Nähe des Mundes ruft sie am frühesten hervor.

Sonstige Organopathien durch Quecksilberanhäufung im Organismus kommen bei medicinaler Anwendung der Mercurialien gegenwärtig, wo der übertriebene Gebrauch derselben allgemein aufgegeben ist, nicht vor. Ausnahmsweise bildet sich dagegen gleichzeitig mit den Mundaffectionen ein stark febriler Zustand aus, sowie nach Beendigung desselben ein Zustand von allgemeiner Kachexie, vielleicht auf Anämie oder Hydrämie beruhend, vielleicht von Digestionsstörungen abhängig, welche häufig nach beendigter Stomatitis noch eine Zeit lang persistiren.

Jos. Herrmann u. a. Gegner des Quecksilbergebrauches haben dem Quecksilber eine Anzahl von Leiden imputirt, welche offenbar nicht ihm, sondern der Krankheit (Syphilis) angehören, gegen welche das Quecksilber benutzt wurde. Es gilt dies namentlich bezüglich der sog. mercuriellen Hautaffectionen, welche bei wirklicher reiner Hydrargyrose, wie man sie bei Arbeitern in Spiegel-fabriken besonders zu beobachten Gelegenheit hat, fehlen (Kussmaul). Auch



das Vorkommen von Hautgeschwüren ist beim Mercurialismus ausserordentlich selten und scheint fast ausschliesslich bei kachektischen Individuen beobachtet. Bei Menschen ist ausgebildete Leberaffection als Folge von Hydrargyrose nicht mit Sicherheit nachgewiesen; dagegen existiren Magen- und Darmaffectionen, die sich nicht selten bis zur Entzündung steigern, mit Erbrechen und Durchfall einhergehen und bisweilen den Charakter der Dysenterie tragen. Die von Einzelnen behauptete speichelflussähnliche Affection des Pankreas, durch welche der dünnflüssige Stuhl eine eigenthümliche Beschaffenheit annehmen sollte, scheint dagegen reine Erfindung zu sein. Leicht werden die Respirationsorgane betroffen und Lungentuberculose ist bei Quecksilberarbeitern nicht selten. Albuminurie und Diabetes kommen vor, haben aber nichts Specifisches. Abortus ist bei Arbeiterinnen in Spiegelfabriken und in Bergwerken häufig; die Kinder mercurkranker Eltern sind häufig schwächlich und zu Scrophulose geneigt. Conjunctivitis kommt bei Quecksilbercuren und auch bei Quecksilberarbeitern als Folge von Imprägnation des Organismus mit Q. vor, nicht aber Iritis. — Ausser der besprochenen Kiefernekrose giebt es kein mercurielles Knochenleiden; ebenso fehlen Lymphdrüsenerkrankungen. Dagegen wird Alopecie nicht selten beobachtet.

Für den sog. gewerblichen Mercurialismus von vorzüglicher Bedeutung, früher auch bei medicinaler Anwendung von Quecksilber, namentlich nach wiederholten grossen Schmiercuren (vgl. S. 762) beobachtet, sind Störungen der Nervenfunctionen, unter denen als häufigste Form das Quecksilberzittern, Tremor mercurialis, obenausst. Dieses Leiden, welches in seinen schlimmeren Formen neben Zittern auch klonische Krämpfe zeigt und sich der Chorea minor nähert, entwickelt sich meist zuerst an den Händen und Armen, seltener an den Beinen, recht früh an den Gesichtsmuskeln, bisweilen auch an den Muskeln des Kehlkopfes und Zungenbeins. Häufig begleiten denselben Kopfschmerzen und Herzpalpitationen (Erethismus mercurialis). Bei den meisten mercurialkranken kommen intercurrent Schmerzen, besonders in den Muskeln der Extremitäten, zur Beobachtung (Arthralgia mercurialis). Bisweilen entwickelt sich Paralyse der ergriffenen Muskeln. Selten sind schwere Formen von Neurosen, doch kommen sowohl Epilepsie als Delirien, Manie und Blödsinn sowohl als Asthma nach intensiver Einwirkung vor, welche selbst zum Tode führen, wie dies das bekannte Beispiel der beiden durch Bereitung von Quecksilbermethyl zu Grunde gegangenen Chemiker im St. Bartholomews-Hospital beweist.

Die Quecksilberkachexie charakterisirt sich durch erdfahles Aussehen bei allgemeiner Schwäche und ist meist mit Unruhe, Präcordialangst, Unregelmässigkeit der Herzthätigkeit, Palpitationen (sog. Mercurialerethismus) verbunden.

Ueber die Theorie der Wirkung der Quecksilbermittel sind wir verhältnissmässig noch sehr im Unklaren. Ein Einfluss auf das Blut und die Eiweissstoffe der Gewebe selbst ist als die Hauptsache zu betrachten und kann nicht bezweifelt werden, wenn auch manche Lücke hinsichtlich der Einzelheiten dieser Action noch auszufüllen ist. Daneben ist ein Einfluss auf das Nervensystem und in specie das Gehirn unverkennbar, dessen Erkrankungen durch Quecksilber nicht allein aus der veränderten Blutbeschaffenheit erklärt werden können. Endlich ist vielleicht noch eine Einwirkung bei der Ausscheidung des Metalls auf gewisse Drüsen, in specie auf die Speicheldrüsen und Nieren, anzunehmen. Eine directe vermehrende Wirkung der Quecksilberpräparate auf die Gallenabsonderung, wie sie häufig angenommen wird, ist mehr als zweifelhaft (Bennett).

Die Verhältnisse des Stoffwechsels unter dem Einflusse von Quecksilberpräparaten sind in neuerer Zeit der Gegenstand wiederholter Untersuchungen geworden, deren Resultate einander in manchen Punkten zu widersprechen scheinen,

jedoch nur scheinbare Widersprüche enthalten, insofern offenbar die Wirkungen mit der Dosis in nächster Beziehung stehen. Nach den Versuchen von Schlesinger (1879) lässt es sich nicht in Abrede stellen, dass sehr kleine Mengen löslicher Quecksilbersalze (Quecksilberchlorid, Chlornatrium) bei Thieren (Kaninchen, Hunden) mit dem Effecte gegeben werden können, dass dieselben unter reichlicher Anhäufung von Fett in verschiedenen Organen, welche auch in der Norm mehr oder weniger Fett enthalten, bedeutend an Körpergewicht zunehmen und gleichzeitig auffallende Vermehrung der rothen Blutkörperchen bedingen. Diese nur bei interner, nicht aber bei subcutaner Application, wo die entstehende locale Entzündung zu erheblicher Abnahme des Körpergewichts führt, und auch nicht bei allen Thierclassen erhalten werden kann, darf indessen nicht als eine eigentliche toisirende Wirkung aufgefasst werden, da, wie dies übrigens schon von v. Boeck im Laufe einer Inunctionscur beim Menschen nachgewiesen wurde, eine Zunahme der Harnstoffausscheidung nicht stattfindet, was auf einen die Oxydationsvorgänge hemmenden Einfluss hindeuten scheint, wobei der normale Zerfall der rothen Blutkörperchen beim Gesunden retardirt wird. Zunahme der rothen Blutkörperchen ist übrigens wiederholt (Wilbouchewitch, Keyes, Robin) nach verschiedenen Quecksilberpräparaten (Quecksilbersublimat, Quecksilberiodür, Quecksilberpeptonat u. a.) z. Th. mit Zunahme des Körpergewichts beobachtet worden und steht vermuthlich mit der nämlichen Einwirkung des Metalls, vielleicht aber auch mit der Heilung der Syphilis selbst im Zusammenhange. Dass bei grösseren Dosen eingreifendere Veränderungen des Stoffwechsels stattfinden, scheint nicht nur die bei chronischer Quecksilbervergiftung von Thieren constant herabgesetzte Körpertemperatur und die nach dem Tode aufzufindende fettige Degeneration der Leber, endlich das Auftreten von Baldriansäure, Leucin und einem dem Tyrosin ähnlichen Körper in dem Harn mercurialisirter Thiere (Overbeck) zu beweisen. Bei solchen grösseren Dosen verschiedener Mercurialien (Calomei, Sublimat, Quecksilberiodid) kann auch Ausscheidung beträchtlicher Mengen von Zucker durch den Harn bei gleichzeitiger Ablagerung von Kalksalzen in den gestreckten Harncanälen vorkommen (Sai-kowsky), während bei sehr kleinen Mengen weder Eiweiss noch Zucker im Harn auftreten (Schlesinger). Die Zunahme der rothen Blutkörperchen bei Syphilitischen und ebenso bei Thieren, welche sehr kleine Sublimatmengen intern bekommen, macht bei intercurrenten Gesundheitsstörungen einer Abnahme Platz (Robin). Bei den Beziehungen, welche man jetzt dem Knochenmarke zu den Blutkörperchen und deren Bildung zuschreibt, ist es von Interesse, dass starke Hyperämie des Knochenmarkes bei acuter Quecksilbervergiftung durch Subcutaninjection von Sublimat constant, bei chronischem Mercurialismus sehr häufig bei Kaninchen und Hunden vorkommt (Heilborn), wobei (wenigstens bei acuter Intoxication) der chemische Nachweis von Quecksilber im Knochenmark stets zu führen ist. Ueber die directe Einwirkung von Quecksilberalbuminat beim Contact mit Blut giebt Polotschnow an, dass bei Zusatz grösserer Mengen die Blutkörperchen allmählig zerstört werden, längliche Form und Auswüchse an den Enden bekommen und allmählig ihren Farbstoff verlieren, wobei die Wirkung im geraden Verhältnisse zu der Stärke der benutzten Albuminatlösung steht. Mit Quecksilberalbuminat gemischtes Blut röthet sich an der Luft nicht gut und verliert die Fähigkeit, Sauerstoff aufzunehmen, rascher.

Die Einwirkung des Quecksilbers auf das Gehirn zeigt sich bei Thieren nicht allein bei acuter Quecksilbervergiftung, sondern auch, wenigstens mitunter, bei chronisch mercurialisirten Thieren, durch exquisiten Tremor, den v. Mering wohl mit Recht auf eine directe Beziehung des Quecksilbers zum Kleinhirn zurückführt. Derselbe wird, wie auch häufig beim Menschen, von einem eigenthümlichen Erethismus begleitet, den v. Mering auf ein Ergriffensein des Grosshirns bezieht, während Heilborn u. A. denselben mit der fettigen Degeneration des Herzfleisches, welche manchmal sprungweise auftritt, in Zusammenhang bringen. Prävalent sind bei Thieren übrigens nach längerer Einführung kleinerer Quecksilbermengen Störungen, die auf die Gesamterkrankung des Organismus und auch die Eliminationswirkung hinweisen. Ausgesprochen sind namentlich die Ulcerationen und Schwellung der Mund- und Zahnfleischschleimhaut, während eigentliche Salivation nur höchst ausnahmsweise vorkommt, und die entzündliche, häufig diphtheritische Affection des Darms, wie dieselbe auch beim acuten Mer-

curialismus auftritt. Dass diese Localerkrankungen, zu denen in manchen Fällen noch Albuminurie hinzutritt, zu der Erschöpfung wesentlich beitragen, ist selbstverständlich. Dass der Speichelfluss nur reflectorisch durch entzündliche Affection der Mundschleimhaut bedingt werde, lässt sich nicht behaupten, weil Stomatitis bei Thieren fast immer und nicht selten auch beim Menschen ohne Ptyalismus vorkommen und andererseits beim Menschen auch Ptyalismus eintreten kann, ohne dass entzündliche Affection des Zahnfleisches nachweisbar ist.

Eine besondere Wirkung vindicirte man den Mercurialien früher auf die Leber und insbesondere auf die Gallenabsonderung. Obschon wohl kaum in Abrede gestellt werden kann, dass die Leber zu denjenigen Organen gehört, in denen das Quecksilber sich bei längerer Zufuhr besonders deponirt und die auch anatomische Veränderungen dadurch erfahren (Verfettung), ist der cholangoe Einfluss kleiner Dosen Quecksilberchlorür, das hier besonders in Frage kommt, und des metallischen Quecksilbers durch Versuche an Thieren (Mosler, Scott, Bennett, Rutherford) als nicht existirend erwiesen worden. Nach Rutherford besteht in dieser Beziehung ein wesentlicher Unterschied in der Wirkung des Quecksilberchlorids und Quecksilberchlorürs, insofern Sublimat schon zu 0,008 regelmässig verstärkte Gallensecretion hervorruft, während dem Calomel diese Wirkung abgeht. Mit einer geringen Menge Sublimat gemischt, steigert auch Quecksilberchlorür die Gallensecretion.

Die hauptsächlichste Anwendung finden die Mercurialien zur Beseitigung der Syphilis, bei welcher Affection sie allen zu den verschiedensten Zeiten gegen sie gerichteten Angriffen zum Trotz das zuverlässigste Heilmittel bilden. Ihre Anwendung erheischt indessen grosse Vorsicht und wird durch bestimmte Umstände, unter denen namentlich erheblicher Schwächezustand obenan steht, contraindicirt.

Kunstgerecht und methodisch angewandt war und bleibt das Quecksilber noch immer das wichtigste Antidot der Syphilis. Misserfolge liegen meist an der Gebrauchsweise, seltener an der Individualität, am seltensten an einer Unbezwunglichkeit der syphilitischen Dyskrasie. Ob es die letztere völlig tilgt oder, wie Bärensprung behauptete, selbst in Fällen sog. Heilung nur — meist lebenslänglich — latent macht, ist für den Praktiker irrelevant. Zuerst von dreisten Empirikern am Ende des 15. Jahrhunderts gebraucht und nur von einzelnen Aerzten (Marinus Brocardus, Almenar) gerühmt, wurde das Quecksilber seit 1518 durch die Holztränke verdrängt, blieb dann aber von der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts bis etwa 1820 das hauptsächlich benutzte Medicament, um von da ab etwa ein Decennium dem sog. simple treatment und dem Iod die erste Stelle zu lassen, welche es seitdem trotz zahlreicher Gegner unbestritten wieder einnimmt. Vor allen anderen Medicamenten hat Quecksilber den Vorzug, am sichersten, am schnellsten und meist auch am gründlichsten die Syphilis zu tilgen. Die Behauptung, dass es dieselbe verschlimmert und dass viele schwerere Erscheinungen der constitutionellen Syphilis Folge der Quecksilbercur seien, ist geradezu Absurdität, weil diese Phänomene auch bei simple treatment auftreten können. Andererseits kann nicht geleugnet werden, dass bei nicht gehöriger Vorsicht Quecksilbercuren die Gesundheit der Patienten zu schädigen vermögen. Namentlich die früher herrschende Ansicht, dass der durch Quecksilber hervorbrachte Speichelfluss kritische Bedeutung habe, gleichsam als ob das syphilitische Gift dadurch aus dem Körper herausgeschafft werde, und dass man also das Quecksilber zur Erzielung eines solchen zu verabreichen habe, hat bei Vielen zu langwierigen Ulcerationen im Munde und zum Verluste der Zähne geführt. Ebenso hinterbleibt bei manchen Kranken grosse Neigung zu schmerzhaften Affectionen der Muskeln (sog. Rheumatismus mercurialis), welche übrigens auch durch Holztränke hervorgerufen werden kann. Alle diese Nachtheile lassen sich bei Anwendung sorgsamer Kautelen vermeiden oder auf ein sehr geringes Maass beschränken.

Bezüglich der einzelnen Formen der venerischen Krankheiten betonen wir noch, dass Quecksilber bei Gonorrhoe und seinen Folgezuständen (spitze Condy-



lome), ebenso beim weichen Schanker völlig überflüssig, bei letzterem vielleicht sogar schädlich ist; ferner dass, obschon leichte Fälle von secundärer Syphilis von selbst oder unter einfacher diätetischer Behandlung heilen können, doch schwer ohne Mercurialien Beseitigung der secundär syphilitischen Phänomene erfolgt und dass Hautaffectionen und Condylome am leichtesten, die übrigen Symptome und namentlich auch das primär indurirte Geschwür am schwierigsten der Einwirkung des Mittels weichen; endlich dass auch die sog. tertiären Formen nicht völlig den Quecksilbergebrauch verbieten, sondern dass im Gegentheil auch diese durch Mercur am besten beeinflusst werden, jedoch in den meisten Fällen der gesunkene Kräftezustand der Kranken jede stark eingreifende Cur verbietet, weshalb hier Iodkalium und Schwitzcuren sich mehr empfehlen. Ob bei indurirtem Schanker Quecksilberbehandlung einzuleiten sei oder nicht, wogegen man geltend gemacht hat, dass trotz der Mercurialbehandlung oftmals andere Syphiliden doch auftreten und dass dieselbe dann einen nothwendig zu starker Abnahme der Kräfte führenden Eingriff darstellt, ist offene Frage. Bei manchen als tertiär bezeichneten syphilitischen Leiden, welche wichtige Organe bedrohen, z. B. Iritis syphilitica, Gehirnsyphilis, geben Manche der Einleitung einer Quecksilbercur den Vorzug, doch sind sie bei Iritis syphilitica nach mehreren eigenen Beobachtungen nicht absolut nöthig und auch bei Hirnsyphilis wird das viel leichter resorbirbare und den Organismus sättigende Iodkalium zunächst am Platze sein.

Als Contraindication der Quecksilberbehandlung der Syphilis ist jeder höhere Grad von Schwäche des Kranken anzusehen. Man vermeide dieselbe somit bei bestehender Anämie und bei Complication mit irgend welcher Kachexie (Tuberculose, Scrophulose), auch mit starkem Fieber und heftigem Magen- und Darmkatarrh. Scorbutischer Zustand des Zahnfleisches oder gangränöse und diphtheritische Beschaffenheit syphilitischer Geschwüre verbieten Mercurialien unbedingt. Da in der Gravidität durch Quecksilbercuren vielleicht Gefahren für das Leben des Fötus erwachsen, vermeidet man solche hier am besten.

In Hinsicht auf die Quecksilbercuren unterscheidet man Salivationscuren, wobei es sich darum handelt, Speichelfluss hervorzurufen und zum Theil auch längere Zeit zu unterhalten, und sog. Extinctionscuren, wobei die Absicht vorliegt, den Ptyalismus so viel als möglich zu verhüten und bei Eintreten desselben die Darreichung des Quecksilbers sofort auszusetzen. Die letzteren sind jetzt die allgemein gebräuchlichen und haben erstere fast ganz verdrängt. Für die Entscheidung der Frage, ob Syphilis wirklich gründlich nur durch Salivationscuren zu tilgen ist, während Extinctionscuren viel mehr zu Recidiven Anlass geben, liegt eine verlässliche Statistik nicht vor.

Andere Dyskrasien und Diathesen werden weit weniger häufig mit Quecksilber behandelt und theilweise sogar unter dem Gebrauche des Mittels verschlimmert.

Letzteres gilt besonders von der Tuberculose und überhaupt von allen Diathesen, mit denen eine erhebliche Abnahme der Körperkräfte verbunden ist. Bei Scrophulose sind manche milder wirkenden Quecksilberpräparate nicht ganz ohne Nutzen, doch dürfen sie nur in kleinen Mengen gereicht werden und niemals ist eine Sättigung des Körpers mit Mercur erlaubt. Sehr dubiös ist der Nutzen bei Rheumatismus und gegen chronische Exantheme, wo andere Behandlungsweisen als milder und weniger gefährlich den Vorzug verdienen. Völlig zu vermeiden ist die epidermatische Application auf einen grösseren Theil der Körperoberfläche bei Ausschlägen, welche mit theilweiser Entblössung der Cutis oder des Coriums verbunden sind, weil leicht Aufsaugung grösserer Mengen von Quecksilber stattfindet, welche zu heftigen Intoxicationen und selbst zum Tode führen kann.

Sehr gebräuchlich ist in einzelnen Ländern, namentlich in England, die Behandlung acuter inflammatorischer Krankheiten, und zwar insbesondere von Entzündung der serösen Häute und Schleimhäute, mit Mercurialien. Wenn sich auch ein Erfolg bei

manchen dieser Affectionen, z. B. bei Pericarditis, Peritonitis, in specie P. puerperalis, und Meningitis, nicht bestreiten lässt, so sind doch die Quecksilberpräparate keineswegs in allen Fällen zulässig, vielmehr sogar stets zu meiden, wo die Inflammation mit grösserem Kräfteverlust verbunden ist oder auf tuberculöser Basis beruht.

Es ist nicht zu verkennen, dass mit den hier besonders in Anwendung kommenden Präparaten, dem Calomel und der grauen Salbe, grosser Missbrauch getrieben ist. In allen leichteren Fällen der in Rede stehenden Entzündungen sind dieselben mindestens überflüssig. Sie passen vorzugsweise bei idiopathischen Entzündungen und auch hier nur in frischen Fällen, wo massenhafte Exsudation nicht stattgefunden hat. Bei Pleuritis, Pneumonie, Endocarditis ist man vom Gebrauche fast ganz zurückgekommen. Bei Peritonitis puerperalis sind es besonders die Formen, wo ein ausgesprochener Entzündungszustand des Uterus und seiner Adnexa besteht, welche die Anwendung des Mercuris, besonders in Form der grauen Salbe, indiciren. Der Grundgedanke bei Behandlung aller dieser Affectionen mit Mercur ist die Herabsetzung der Plasticität des Blutes, welche jedoch nur dann mit Sicherheit herbeigeführt werden kann, wenn der Organismus bis zum Eintreten der Anfänge der Stomatitis Quecksilber zugeführt erhält. Die Mehrzahl der Aerzte widerräth jedoch einen solchen Gebrauch und begnügt sich mit kleineren Dosen. Allerdings können solche auch Herabsetzung der Temperatur bedingen und dadurch von Nutzen sein, aber wir besitzen Antipyretica genug, um in dieser Beziehung von den Mercurialien zu abstrahiren.

Weniger gebräuchlich ist das Quecksilber bei parenchymatösen Entzündungen, doch giebt es einzelne Affectionen, bei denen namentlich die graue Salbe Vorzügliches leistet. So kann entzündliche Affection des Auges und namentlich der Iris nach Staaroperation durch starke Einreibung beseitigt werden und insbesondere scheint die örtliche Application bei Entzündung der Lymphgefässe und Lymphdrüsen, bei Phlegmone, Myositis, bei Mastitis und Orchitis kaum entbehrt werden zu können.

Ob hier ein örtlicher antiphlogistischer Effect vorliegt und wie ein solcher zu Stande kommt, ist nicht aufgeklärt. Man reicht hier jedoch mit solchen Mengen aus, welche keine Allgemeinwirkung zu Stande bringen, und sucht geradezu letztere zu vermeiden.

Besondere Erfolge schreibt man dem Quecksilber bei Entzündung der Leber zu und in der That spricht die praktische Erfahrung nicht gegen dessen Anwendung, wenngleich die Theorie von der cholagogen Wirkung der Mercurialien nicht aufrecht erhalten werden kann, in Folge deren man die Mercurialien überhaupt bei Störung der Gallenfunction, bei dem sog. biliösen Zustande, in Anwendung gebracht hat.

Die cholaloge Wirkung fehlt namentlich dem am meisten als Cholalogum verwertheten Calomel, das überdies meist in solchen Mengen gebraucht wird, dass danach keine entfernten Erscheinungen, wohl aber vermehrte Entleerungen eintreten. Die günstigen Wirkungen des Mittels bei katarrhalischem Icterus basiren offenbar nur auf Anregung der Peristaltik und vor anderen Purgantien hat es höchstens den Vorzug einer milden Wirkung, sowie den, dass das Abführen auch ohne Beihülfe der Galle erfolgt.

Wie gegen chronische Dyskrasien sind die Mercurialien auch gegen acute Erkrankungen des Blutes, wie solche bei den zymotischen Krankheiten vorausgesetzt werden müssen, verschiedentlich

in Anwendung gebracht; doch sind die Erfolge nicht derart, dass diese Behandlungsmethode empfohlen werden könnte.

Es giebt fast keine Infectionskrankheit, bei welcher nicht Calomel oder Sublimat empfohlen wurden. Man glaubte namentlich mit ersterem acute Exantheme, Typhus, gelbes Fieber, Pest, Ruhr, Cholera, auch Intermittens coupiren zu können, doch liegt kein vollgültiger Beweis dafür vor. Besserungen des Allgemeinzustandes können vielleicht durch eine vom Quecksilber herrührende Herabsetzung der Temperatur vorübergehend bewirkt werden, jedenfalls aber wird man wohlthun, bei irgend tieferen constitutionellen Leiden auf den Gebrauch der Mercurialien zu verzichten.

Obschon den Mercurialien directe Wirkung auf das Nervensystem nicht abgesprochen werden darf, sind die mit demselben erzielten Erfolge bei Neurosen doch keineswegs befriedigend.

Man hat Quecksilberpräparate, insbesondere Sublimat, auch Calomel und graue Salbe, sowohl bei Algien als bei Spasmen, Paralysen und Psychosen in Gebrauch gezogen, mit Erfolg offenbar jedoch nur in Fällen, wo derartige Leiden auf syphilitischer oder entzündlicher Affection in den Centralorganen des Nervensystems beruhten. Die Anwendung von Quecksilberpräparaten bei Epileptischen und Geisteskranken (früher selbst Jahre lang fortgesetzt), bei Tetanus, Hydrophobie und Schlangenbiss, ist als obsolet zu betrachten.

Endlich hat man Mercurialien bei verschiedenen parasitären Affectionen innerlich und äusserlich gebraucht.

Quecksilberdämpfe sind ein intensives Gift für kleine Articulaten, weshalb auch Epizoën leicht durch Quecksilber beseitigt werden können, doch ist dasselbe durch eben so sichere, aber gefahrlosere Mittel aus der Praxis fast ganz verdrängt. Auch Entozoën werden durch Mercur getödtet, obschon solche, wie bereits Bremser und Scopoli nachwiesen, auch bei Arbeitern in Quecksilbergewerken vorkommen. Das bei Spulwürmern benutzte Quecksilberchlorür wirkt weniger durch aus demselben im Darmcanal abgeschiedenes Quecksilbermetall als durch Beschleunigung der Peristaltik günstig.

### **Hydrargyrum, Hydrargyrum depuratum, Mercurius vivus; Quecksilber.**

Das durch Umschütteln des im Handel vorkommenden, meist aus dem natürlichen Zinnober gewonnenen unreinen Quecksilbers mit verdünnter Salpetersäure von den darin bis zu 2% vorkommenden fremden Beimengungen, besonders Amalgamen verschiedener Metalle, befreite Quecksilber bildet bei gewöhnlicher Temperatur eine zinnweisse, stark metallisch glänzende, geruch- und geschmackfreie, sehr bewegliche Flüssigkeit von 13,57 spec. Gew., die bei — 40° fest wird und in regelmässigen Oktaëdern krystallisirt, bei 360° siedet, aber auch bei gewöhnlicher Temperatur verdunstet und mit den Dämpfen kochenden Wassers sich völlig verflüchtigt. Durch Schütteln mit Flüssigkeiten oder durch Verreiben mit dickflüssigen (Fett, Terpenthin u. s. w.) oder pulverigen Stoffen (Magnesia, Kreide etc.) lässt sich Quecksilber zu einem mattgrauen Pulver (Aethiops) zertheilen, an welchem mit blossen Augen keine Kügelchen mehr wahrgenommen werden können. Derartiges fein zertheiltes Quecksilber, wie es in den officinellen Präparaten sich findet, wird alchymistischer Nomenclatur gemäss als getödtetes oder extinguirtes Quecksilber, *Mercurius extinctus*, bezeichnet.

Das metallische Quecksilber wird sowohl bei Einführung in den Magen, namentlich bei Anwendung von *Mercurius extinctus*, als bei epidermatischer Application und vom Mastdarm aus resorbirt und kann bei längerem Gebrauche zu den Erscheinungen des chronischen Mercurialismus führen. Wird flüssiges metallisches



Quecksilber in grösseren Mengen intern eingeführt, so passirt es in der Regel den Darm rasch, ohne entfernte Erscheinungen zu veranlassen. In extinguirtem Zustande bedingt es in kleinen Mengen gelind purgirende Wirkung.

Sowohl bei Menschen als bei Thieren (Orfila, Gaspard) kann Mercurius vivus zu  $\frac{1}{2}$ —1 Pfund in den Magen gebracht werden, ohne Vergiftungserscheinungen zu bedingen, selbst wenn ein Theil des Quecksilbers tagelang im Körper verweilt. Nach Ficinus soll sogar Quecksilber 4 Jahre lang im Körper zurückbleiben können, ohne Mercurialismus zu erregen; doch giebt es auch Fälle, wo bei Anwendung grösserer Quecksilberdosen gegen Ileus Speichelfluss auftrat (Borgstedt, Laborde). — Bezüglich der Resorption des Quecksilbers von der äusseren Haut aus, wie solche durch unzählige Fälle von Einreibung mit der grauen Quecksilbersalbe feststeht, gehen die Ansichten darüber aus einander, wie dieselbe zu Stande komme. Offenbar ist bei den genannten Einreibungen, welche das allgemeinste Mittel zur Bekämpfung der Syphilis darstellen, das durch Verdunstung in die Luft übergehende Quecksilber für das Zustandekommen des chronischen Mercurialismus von wesentlicher Bedeutung. Wir wissen längst durch Beobachtungen in Quecksilberbergwerken (Görbe, Krünitz) und besonders in Spiegelfabriken, dass die Einathmung von Quecksilberdampf zu chronischer Vergiftung führen kann, wie auch verschiedene Fälle vorliegen, wo die zufällige Verdunstung grösserer Mengen von Quecksilber, z. B. auf Schiffen, deren Lädung aus Quecksilber bestand und wo in Folge vom Bersten der Gefässe das Metall in den Schiffsraum gerieth und von dort aus verdunstete, oder in Localen, wo früher Spiegelfabriken gewesen waren, Mercurialismus chronicus erzeugte. Es kann sogar vorkommen, dass in einem Zimmer, wo ein Kranker mit Quecksilbersalbe im Bette eingerieben wird, andere in dem Raume fortwährend anwesende Personen, welche nicht mit der Salbe direct in Berührung gekommen sind, früher am Speichelfluss erkranken als der eingeriebene Patient. Je günstiger die Umstände bei Einreibungscuren für die Aufnahme von Quecksilber per os sind, um so leichter stellt sich Speichelfluss ein. Nichtsdestoweniger lässt sich nicht leugnen, dass auch auf anderem Wege von der Haut aus Quecksilber bei Einreibungen von grauer Salbe zur Resorption gelangen kann. Zunächst ist Unguentum cinereum, wie es noch die meisten Pharmakopöen vorschreiben, kein einfaches Gemenge von Quecksilber und Fett, sondern enthält, indem zur Darstellung alte Salbe verwerthet wird, auch fettsaures Quecksilberoxydul und bei sehr langer Aufbewahrung der Salbe selbst fettsaures Quecksilberoxyd (Kletzinsky, Blomberg). Wird derartige alte Salbe längere Zeit auf ein und dieselbe Hautstelle applicirt, so stellt sich Entzündung ein und auf geröthetem Grunde entwickeln sich manchmal unter lebhaftem Brennen und Schmerz kleine Bläschen (sog. Eczema mercuriale), welche beim Aussetzen der Einreibung eintrocknen, worauf die Epidermis sich in Fetzen ablöst. Es ist nun allerdings nicht unmöglich, dass von derartig veränderten Hautpartien die fettsauren Salze resorbirt werden, aber bei Einreibungscuren kommt es meist zum Speichelfluss, ohne dass sich eine solche Dermatitis entwickelt. Man hat früher wiederholt directes Eindringen des Quecksilbers bei forcirten Einreibungen durch Talg- und Schweissdrüsen behauptet, und in der That lassen sich in den Haarfollikeln und den genannten Drüsen nach Einreibung von grauer Salbe mikroskopisch Quecksilberkügelchen nicht selten entdecken, welche mitunter auch, vielleicht durch Ruptur der Drüsenwand, ausserhalb der Hautdrüsen im Corium und Unterhautzellgewebe sich finden. Diese Kügelchen nehmen, wie bereits Neumann betonte, allmähig an Menge ab. Fürbringer fand bei Versuchen, dass schon nach 8 Tagen beträchtliche Verminderung der eingedrungenen Quecksilberkügelchen unter gleichzeitiger Bildung von Quecksilberoxydulsalz und deutlicher Vergrösserung der Talgdrüsen neben fettigkörnigem Zerfalle der dem Quecksilber am nächsten liegenden Zellen eingetreten sei. Wenn somit wahrscheinlich ist, dass in den genannten Localitäten die Bildung einer löslichen Quecksilbersalzverbindung stattfindet, deren Resorption nichts im Wege steht, und dass in ähnlicher Weise auch von Schleimhäuten aus die Resorption des damit in Contact gebrachten Merkurs stattfinden kann, so lässt sich doch bei der grossen Flüchtigkeit

keit des Quecksilbers und bei dem Umstande, dass Quecksilberdampf Goldschlägerhäutchen und andere Membranen mit grosser Leichtigkeit durchdringt, ungeachtet der negativen Versuchsergebnisse Fürbringers, die Möglichkeit nicht bestreiten, dass auch eine Aufnahme in dieser Weise stattfindet. Es spricht hierfür besonders auch der Umstand, dass die Beschaffenheit der Haut selbst von wesentlichem Einflusse auf das Zustandekommen entfernter Quecksilberwirkungen ist, welche nach Einreiben der Salbe auf zarte Hautpartien weit rascher hervortreten. Dass beim Vorhandensein leichter Verletzungen ein Eindringen kleiner Metallkügelchen des eingeiebenen Quecksilbers in die Maschen des Coriums und selbst bis in die Capillaren statthat, hat Fürbringer nachgewiesen. Es ist hier auch an das Vorkommen von regulinischem Quecksilber in Knochen von Individuen hinzuweisen, welche Einreibungscuren unterworfen waren. Dasselbe gehört zwar zu den Seltenheiten, ist jedoch durch eine Anzahl exacter Forscher (Lobstein, Hyrtl, Bochdalek) beobachtet und kann nicht als Leichenerscheinung angesehen werden, da es auch an cariösen Knochenstücken bei Lebzeiten (Bochdalek) wahrgenommen ist. Uebrigens können sich Quecksilberkügelchen nur bei Anwendung von Quecksilbermetall im Organismus finden, da eine Reduction der Quecksilbersalze im Körper zu Metall unwahrscheinlich ist (Bärensprung). Während bei Einführung von Quecksilberkügelchen in die Circulation Verstopfung der Lungencapillaren und Pneumonie erfolgt, wird emulgrirtes Quecksilber im Blute binnen 24 Stunden bis 6 Tagen in eine lösliche Verbindung verwandelt (Fürbringer).

Der Uebergang von Quecksilber in Harn und Milch nach Anwendung von Quecksilbersuppositorien wurde von Hamburger dargethan.

Das Quecksilbermetall findet innerlich besondere Anwendung bei Ileus, wo man es als durch seine Masse und Schwere wirkend betrachtet und deshalb zu 100,0–300,0 auf einmal nehmen lässt, findet aber vorzugsweise äusserlich als Antiplasticum und Antisyphiliticum in Form der grauen Salbe Anwendung.

Bei Ileus und Volvulus ist das Quecksilbermetall gewissermassen das ultimum refugium, welches man in verzweifelten Fällen anwendet, wenn andere Mittel fehlgeschlagen sind. Wir kennen aus eigener Erfahrung mehrere Fälle von Ileus, wo wiederholt Quecksilbermetall mit Erfolg gegeben ist, und können die Befürchtung einer Darmzerreissung oder einer schädlichen Wirkung bei entzündlichem Zustande des Darmes nicht theilen. Wie das Quecksilber Einklemmung oder Achsendrehung der Darmschlingen beseitigt, ist freilich nicht klar; Einstülpungen können natürlich nur dann durch Quecksilber zurückgebracht werden, wenn dieselben von unten nach oben gerichtet sind. Andere Verwendungen des Mercurius vivus sind ohne Bedeutung, z. B. das Einschütten bei Harnröhrenstricturen, welche nicht mit Bougies zu passiren sind (Pauli), das Aufhängen von Quecksilber in einer mit Siegelack verschlossenen Federpose auf der Brust zur Beschränkung der Milchsecretion (van Holsbeck). Ebenso obsolet ist die früher bei Spulwürmern benutzte Aqua mercurialis simplex s. ad vermes s. Decoctum Mercurii, mit Quecksilbermetall gekochtes Wasser. Dagegen findet das extinguirte Quecksilber noch in einigen Formen hier und da Verwendung, besonders in England, wo die sog. Blue pills, Pilulae coeruleae s. Hydrargyri (aus 2 Th. Quecksilber, 3 Th. Rosenconserve und 1 Th. Süssholzpulver), zu 2–5–8 Stück, von denen jedes 0,06 Quecksilber enthält, als Laxans gewissermassen als Hausmittel verwendet werden. Man schreibt denselben in England ähnlich wie dem Calomel eine besondere Wirkung auf die Gallensecretion zu, welche jedoch nach Thierversuchen von Bennett nicht existirt. Auch gegen Syphilis lassen sie sich verwerthen, ähnlich wie die alten Pillen des Seeräubers Hayreddin Barbarossa, welche Quecksilbermetall mit Terpenthin enthielten und im Anfange des 16. Jahrhunderts für besonders heilkräftig galten. Analoge Pillencompositionen aus Mercurius extinctus sind die Pilulae aethiopicae (mit Goldschwefel, Guajak und Seife) und die Pilulae Hydrargyri ferruginosae von Collier (mit Rosenconserve und Eisenoxyd). Ferner findet sich der Mercurius extinctus in verschiedenen, früher officinellen, pulverförmigen Präparaten, so mit Zucker, Gummi, Kreide, Magnesia verrieben, als Mer-

curius gummosus Plenki (bei Syphilis in leichteren Fällen nicht unzweckmässig, wobei man mit 0,2—0,4 pro dosi beginnt und allmählig auf 1,0—2,0 steigt), als Hydrargyrum saccharatum und als H. cum creta oder cum magnesia. Bei Kindern gebrauchte man früher auch einen Syrupus Hydrargyri, welcher mit Gummi und Zucker extinguiertes Quecksilber und Syrupus simplex enthielt.

### Präparate:

1) **Unguentum Hydrargyri cinereum**, Ungt. Neapolitanum, Ungt. mercuriale cinereum s. coeruleum, U. mercuriale s. Hydrargyri; **Graue Quecksilbersalbe**, graue Salbe, Quecksilbersalbe, Franzosensalbe, Reitersalbe. Dieselbe wird durch intimes Verreiben mit 10 Th. Quecksilber mit einem durch Zusammenschmelzen dargestellten Gemische von 13 Th. Schweineschmalz und 7 Th. Hammeltalg als bläulichgraue Salbe, in welcher Quecksilberkügelchen mit blossen Auge nicht mehr zu erkennen sind, erhalten. Der früher übliche Zusatz alter Salbe ist für die entfernte Wirkung des Präparats vollständig indifferent, ruft aber leicht örtliche Reizung der Haut hervor, die zweckmässiger vermieden wird. Die Salbe ist das zur Behandlung der Syphilis am meisten und am zweckmässigsten verwendete Mercurpräparat. Sie ersetzt alle früher gebräuchlichen Salben, die man in andern Verhältnissen des Quecksilbers zur Salbengrundlage (1 : 1, 1 : 4) und mit Zusatz reizender Stoffe (Terpenthin, Sublimat) bereitete und als U. cinereum fortius und mitius bezeichnete. Die graue Salbe kommt jetzt meist nur noch selten, und zwar nur in sehr hartnäckigen Formen, in Form der grossen Schmiercur oder Inunctionscur, für welche insgemein die Vorschriften von Louvrier und Rust befolgt werden, in Gebrauch. Dieselbe gehört zu den Salivationscuren und besteht aus 8—9, nie über 12 typischen Einreibungen von anfangs 4,0—6,0, später 8,0 Ungt. cin. (nach Louvrier aus  $\frac{aa}{aa}$  Quecksilber und Fett bereitet) nach vorausgeschickter Vorbereitungscur (dünne Suppen, Holztränke, Bäder) und mit Interposition von Laxantien, bei Aufenthalt in einem nie gelüfteten Zimmer von + 22—25° C. und einer aus Fleischbrühe bestehenden Kost. Statt deren kommen die kleinen Schmiercuren, wie sie zuerst Hagueneau und Cullerier in die Behandlung der Syphilis einführten, bei uns meist nach den sehr zweckmässigen Angaben von Sigmund eingerichtet, in Benutzung. Die Einreibungen, von denen 20—30 zur Cur gehören, werden mit 1,2, höchstens 2,5 Gm. grauer Salbe in den späten Abendstunden vorgenommen, wobei jede Einreibung mindestens 10 Min. dauert und, wo es nur irgend angeht, von den Händen des Patienten ausgeführt werden soll. Die in der Nacht in ein leinenes oder wollenes Tuch eingeschlagenen Theile werden Morgens mit lauwarmem Wasser abgewaschen, das Zimmer auf 20—23° C. gehalten und regelmässig gelüftet. Die Diät wird während dieser Cur zwar beschränkt, jedoch nicht so, dass eine starke Schwächung der Kranken erfolgt, die Wäsche häufig gewechselt, dem Auftreten von Speichelfluss durch adstringierende Mundwässer und sorgfältiges Reinigen der Zähne mit Kohlenpulver entgegengewirkt, Mund- und Rachengeschwüre durch Mundwässer von Sublimat (1:3000) oder Liquor Natri chlorati (mit 25—50 Th. Aqua destillata verdünnt) beseitigt. Die Cur wird am besten im Frühling oder Sommer vorgenommen; im Winter sind die Pat. nach Beendigung derselben noch eine Zeit lang vor den Einflüssen rauher Witterung zu schützen. Als Einreibungsstellen dienen der Reihe nach die beiden Unterschenkel, Oberschenkel, beide Brust- und Bauchhälften, Rückenfläche, Vorder- und Oberarm. Will man dem Speichelfluss sicherer vorbeugen, so sind die dem Mund und der Nase näherliegenden Partien mit Einreibungen zu verschonen und die eingeübten Stellen mit Leder dicht zu bedecken, damit nicht Quecksilberdampf direct dem Munde zugeführt wird und dort Entzündung erregt (Kirchgässer).

Andern Quecksilbercuren gegenüber verhält sich die kleine Schmiercur als bei weitem sicherer wirkend, so dass sie in allen Fällen, wo der Kräftezustand des Pat. ihren Gebrauch zulässt, indicirt erscheint. Wo bestehender Magen- und Darmkatarrh die innere Anwendung eines Quecksilbersalzes verbieten, kommt nur sie oder die hypodermatische Application löslicher Quecksilbersalze in Frage. Dass die Cur nicht gut im Privathause durchgemacht werden kann und dass sie



den Pat. seinen gewohnten Beschäftigungen entzieht, kann gegenüber den vorzüglichen Heilwirkungen derselben nicht als ein gegen ihre Anwendung sprechendes Moment betrachtet werden.

Alle übrigen Anwendungsweisen der grauen Salbe bei Syphilis sind von untergeordneter Bedeutung. Lebert empfahl Suppositorien von 0,05—0,3 Gehalt (mit 1,5 Ol. Cacao oder  $\text{aa}$  0,75 Ol. Cacao und Cera flava bereitet, bei Brennen im Rectum auch mit 0,01 Morphin), welche Abends eingeführt werden und von denen 25—30 zu einer gewöhnlichen Cur verbraucht werden. Auch rühmt er Subcutaninjectionen von 1 Th. Ungt. cin. mit 4 oder 9 Th. Mandelöl, zu  $\frac{1}{2}$ —1 Spritze voll pro dosi, welche vor den Sublimatinjectionen den Vorzug der Schmerzlosigkeit haben sollen. Innerlich gaben Cullerier, Sédillot u. A. graue Salbe zu 0,1—0,2 mehrmals täglich in Pillenform (mit Pulv. Alth.) bei Syphilis.

Zur Erzielung allgemeiner Wirkungen bei nichtsyphilitischen Affectionen, insbesondere bei Entzündungskrankheiten, reicht man meistens mit 2—3 täglich gemachten Einreibungen von 2,0—3,0 grauer Salbe aus, die man, sobald die Vorboten des Speichelflusses eintreten, aussetzt. Will man nur örtliche Antiphlogose bewirken, z. B. bei Drüsenentzündungen oder bei Inflammationen der Luftwege, bei Panaritien, Phlegmone u. s. w., so genügt es mehrmals täglich eine Linse bis eine Bohne gross einzureiben. Bei Peritonitis benutzt man 4—6 mal täglich 2,0—4,0. Die von einzelnen Seiten empfohlene Behandlung der Scabies mit grauer Salbe ist entschieden zu widerrathen, da sehr häufig acute Hydrargyrose dadurch bedingt wird. Als Mittel gegen Morpionen und andere Epizoön ist die früher allgemein benutzte graue Salbe durch den Perubalsam zu ersetzen. Zur Verhütung der Narbenbildung bei Variola scheint Quecksilberpflaster geeigneter als graue Salbe. Ueberall aber ist, wo man Quecksilbersalbe epidermatisch anwendet, mit grösster Vorsicht auf das Auftreten der Vorboten von Stomatitis zu achten, zumal da bei einzelnen Personen schon minimale Quantitäten Wackeln der Zähne herbeiführen; besonders leicht tritt dies bei Einreibung am Halse in der Nähe des Mundes ein, wo man in der Regel Iodtinctur oder Iodkaliumsalbe zweckmässiger anwendet. Zusätze von andern Medicamenten zum Unguentum cinereum, sei es, um dessen reizende Wirkung zu erhöhen, z. B. von Sublimat (1:250—500), rothem Präcipitat, Iod, Terpenthin, Campher, Liquor Ammonii caustici (1:5—20), oder um die Wirkung abzuschwächen, z. B. verschiedener Narcotica, sind zwar gebräuchlich, aber meistens entbehrlich.

Anderweitige Applicationsweisen der Salbe bei nicht syphilitischen Affectionen sind ziemlich irrelevant. Der innerliche Gebrauch gegen Phthisis (Murawiew) ist geradezu eine Absurdität. Wolfring empfiehlt eine mit Vaselin bereitete Salbe zur Application auf die Conjunctiva bei Infiltration der Hornhaut, plastischen Iritiden und acuter Chorioiditis mit Glaskörpertrübung. Suppositorien aus grauer Salbe gegen Oxyuris (von Hildenbrand), Pessarien und Vaginalkugeln bei Krankheiten des Cervix uteri (Simpson) sind ebenfalls entbehrlich. Einbringung auf Bougies in die Urethra bei Gonorrhoe (Piakoff) führt sehr häufig nicht zum Ziele.

Vielfach wird das Unguentum cinereum als Vehikel für in Salbenform zu applicirende narkotische Substanzen benutzt, welchem Gebrauche jedoch das Wort nicht geredet werden kann, da Axungia porci oder Unguentum cereum genau das Nämliche leisten.

2) **Emplastrum Hydrargyri**, Empl. mercuriale; **Quecksilberpflaster**. Die Bereitung geschieht durch genaue Verreibung von 150 Th. Quecksilber mit 50 Th. Terpenthin und etwas Terpenthinöl, Zumischen von 300 Th. Bleipflaster und 150 Th. gelbem Wachs und Ausrollen in Stangenform. Das Pflaster ist von grauer Farbe und lässt bei Besichtigung mit blossen Auge keine Quecksilberkugeln erkennen. Man benutzt dasselbe besonders als zertheilendes Pflaster bei Drüsenentzündungen, sowie, in geschmolzenen Zustande aufgestrichen und mehrere Tage liegen gelassen, als Mittel, um papulöse und pustulöse Hautausschläge (Variola, Herpes, Zoster) zur Rückbildung zu veranlassen und die davon zu befürchtende Narbenbildung zu verhindern, in derselben Absicht auch bei variolöser Augen- und Augenliderentzündung (wobei es zweifelhaft ist, ob dem Quecksilber ein besonderer Antheil an der Wirkung zukommt), seltener bei gich-

tischen Gelenkentzündungen, syphilitischen Geschwüren, Exostosen, Tophi, die in der That dabei manchmal schwinden; fast nie zur Erzielung entfernter Wirkungen bei Syphilis, gegen welche man früher Unterhosen aus Empl. mercuriale machte. Das Pflaster ersetzt das alte Emplastrum de Vigo, von dem Leibbarzte des Papstes Julius II. so genannt, ein sehr zusammengesetztes Quecksilberpflaster. Das in Frankreich als Sparadrap de Vigo bei ulcerirenden Syphiliden gebräuchliche Pflaster ist Empl. adhaesivum mit 20% Hydrargyrum.

In Frankreich wendet man neuerdings statt der grauen Salbe eine Quecksilberseife, Savon napolitain (du Docteur Vincent), von der jedes Stück 4,0 Quecksilber enthält, zu Inunctionscuren an.

### Hydrargyrum oxydatum; Quecksilberoxyd.

Das Quecksilberoxyd ist unter zwei Formen officinell, nämlich als das unter dem Namen Mercurius praecipitatus ruber, rother Quecksilberpräcipitat, längst bekannte **rothe Quecksilberoxyd**, **Hydrargyrum oxydatum** s. H. oxydatum rubrum, und als das erst neuerdings von Pagenstecher in die Therapie eingeführte **gelbe Quecksilberoxyd**, **Hydrargyrum oxydatum flavum**, oder, wie die Phkp. es nennt, **Hydrargyrum oxydatum via humida paratum**.

Quecksilberoxyd kommt in zwei Modificationen vor, als krystallinisches rothes, gepulvert rothgelbes, durch Erhitzen von Quecksilberoxydnitrat erhaltenes, und als amorphes gelbes, durch Fällung von Quecksilberoxydsalzlösungen mit Alkalien entstehendes. Es hat das spec. Gew. von 11,0, wird beim Erhitzen dunkelzinnberroth, fast schwarz und zerfällt in der Glühhitze in metallisches Quecksilber und Sauerstoff. Von Wasser wird es in geringer Menge gelöst, in Salzsäure und Salpetersäure ist es völlig löslich. Das gelbe Oxyd ist bei weitem chemisch wirksamer als das rothe und bildet beim Schütteln mit Lösungen anorganischer und organischer Säuren sehr rasch weisse Salze, während rothes Oxyd erst allmählig und besonders in der Wärme in solche übergeht. Auch wird gelbes Oxyd am Tageslichte weit rascher zu Quecksilberoxydul oder Metall reducirt. Man bereitet das gelbe Oxyd durch Mischen einer Lösung von 2 Th. Sublimat in 20 Th. warmem Wasser mit einer kalten Mischung von 6 Th. Liquor Natri caustici und 10 Th. Wasser, so dass die Temperatur 30° nicht übersteigt, und Trocknen des mit lauwarmem Wasser ausgewaschenen Präcipitats.

Das Quecksilberoxyd gehört zu den milderen Aetzmitteln in Folge seiner Affinität zum Eiweiss; die Wirkung beschränkt sich auf die Applicationsstelle und dringt nicht tief ein. In kleineren Dosen in den Magen gebracht, verwandelt es sich wahrscheinlich in Quecksilberchlorid und wird resorbirt. Grössere Dosen können Gastroenteritis erzeugen.

Anwendung findet das rothe Quecksilberoxyd fast ausschliesslich äusserlich, und zwar entweder zur Aetzung oder Reizung von torpiden Geschwüren oder noch häufiger in der Augenheilkunde bei Blepharitis. Intern ist es eines der ältesten gegen Syphilis benutzten Mercurialien (De Vigo, Mathiolus) und auch neuerdings von Berg und Blasius gegen Syphilis gebraucht.

Intern lässt sich das rothe Quecksilberoxyd zu 0,006 bis allmählig steigend 0,03 (Maximaldosis 0,03 pro dosi, 0,1 pro die) geben, und zwar in Pulver oder Pillen. Bei der Bergschen Cur werden höhere Gaben als die in der Phkp. zugelassenen Maximaldosen gebraucht. B. verordnet das Mittel zusammen mit Stibium sulfuraturn nigrum, indem er anfangs 0,12 Präcipitat, 10,0 Schwefelantimon und 2,5 Zucker in 16 Pulver theilen und davon 1 Pulver 3mal täglich nehmen lässt, dann nach Verbrauch dieser Pulver die Gesamtmenge des Präcipitats

um 0,12 steigert und mit dieser Steigerung fortfährt, bis 0,6 pro die genommen werden, von wo ab dann stetige Verminderung der Präcipitatmenge um 0,12 (bis auf 0,12) eintritt. Die Cur wird durch Holztränke unterstützt. Die Anwendung in Pillenform ist übrigens vorzuziehen, da Pulver leicht Erbrechen und Durchfall erregen. Aeusserlich wird Präcipitat in Pulvern (nach Trousseau auch als Schnupfpulver bei Ozaena) oder in Salben und Augensalben (1:10—100 Paraffinsalbe) benutzt.

Da das auf nassem Wege dargestellte Präparat weit leichter chemische Verbindungen eingeht als das rothe, so muss es auch als kräftiger örtlich wirkend und als leichter resorptionsfähig betrachtet werden und scheint deshalb auch in beiden Beziehungen den Vorzug zu haben, weshalb es allein verordnet werden sollte.

#### Präparat:

**Unguentum Hydrargyri rubrum**, U. Hydrargyri rubrum fortius; rothe Präcipitalsalbe. Rothes Quecksilberoxyd 1 Th., Paraffinsalbe 9 Th.: von rother Farbe, zweckmässig nur beim Dispensiren zu bereiten. Bei schlechteiternden Geschwüren und bei Pannus.

Mehr gebräuchlich war die unter dem Namen *Unguentum ophthalmicum* s. *Balsamum ophthalmicum rubrum*, officinelle schwächere Salbe (1:50 Salbengrundlage), besonders bei Blepharitis ciliaris, auch bei chronischer Keratitis vascularis und Hornhautflecken. Ebenso wurde eine als *Unguentum ophthalmicum compositum* oder *Unguentum ophthalmicum St. Yves* bezeichnete Salbe, welche in 200 Th. 15 Th. Quecksilberoxyd, 6 Th. Zinkoxyd und 5 Th. Campher enthielt, benutzt. Man ersetzt beide zweckmässig durch magistrale Verordnung des auf feuchtem Wege bereiteten gelben Quecksilberoxyds mit Paraffinsalbe in dem für den Einzelfall passenden Verhältnisse.

Das gelbe Quecksilberoxyd ist auch der wirksame Bestandtheil der zum Verbands von syphilitischen und torpiden Geschwüren und zu reizenden Injectionen in Fistelgänge benutzten *Aqua phagedaenica* s. *A. phaged. lutea* s. *Lotio flava*, Altschädenwasser, *yellow wash*, einer Mischung von 1 Th. fein verriebenes Sublimat mit 300 Th. Kalkwasser, wobei in der Flüssigkeit ein orangegelbes Präcipitat von Quecksilberoxyd entsteht.

**Hydrargyrum chloratum**, H. chloratum mite s. mite laevigatum, H. muriaticum mite, Calomelas, Mercurius dulcis; **Quecksilberchlorür**, Calomel.

Eins der wichtigsten Quecksilberpräparate bildet das Quecksilberchlorür, welches fast noch mehr als vermöge seiner Quecksilberwirkung wegen der ihm speciell zukommenden Action auf den Tractus zu den am häufigsten, ja entschieden zu häufig angewendeten Medicamenten gehört.

Das officinelle Quecksilberchlorür oder Halbchlorquecksilber,  $Hg^2Cl$ , wird durch Sublimation eines innigen Gemenges gleicher Aequivalente Sublimat und Quecksilber erhalten und bildet strahlig krystallinische Stücken von 7,17 spec. Gew. oder ein etwas gelbliches bis weisses Pulver, das weder Geruch noch Geschmack besitzt und in Wasser, Alkohol und Aether unlöslich ist, beim Erhitzen nicht schmilzt und ohne Rückstand sich verflüchtigt, wobei ein Theil in Quecksilberchlorid und Quecksilbermetall zerfällt. Am Lichte wird es unter Ausscheidung von Quecksilbermetall grau, ebenso durch manche reducierend wirkende Stoffe; beim Kochen mit Salzsäure und selbst mit Wasser und in geringem Grade auch durch Einwirkung löslicher Chlormetalle — mehr durch Chlorammonium als durch Chloratrium — bei niedriger Temperatur erleidet es partielle Zersetzung in Quecksilber und Quecksilberchlorid. Alkalien und Erden zersetzen Calomel unter Bildung von Quecksilberoxydul. Beim Zusammentreffen mit blausäurehaltigen Flüssigkeiten entsteht lösliches Cyanquecksilber neben metallischem Quecksilber und Chlorwasserstoff.



Ausser den noch heute in der Receptur vorkommenden Namen Calomel und Mercurius dulcis, welche aus der Zeit der Alchymisten stammen, finden sich in jener Epoche noch verschiedene, jetzt ungebräuchliche, wie Draco mitigatus, Aquila alba, Manna metallorum, Panchymagogum Quercetani.

Neben dem in der Ueberschrift genannten gewöhnlichen Quecksilberchlorür ist noch das **Hydrargyrum chloratum vapore paratum** s. Calomelas vapore paratum officinell. Das meist als Calomel à vapeur bezeichnete, nach dem Verfahren von Josiah Jewell durch Verdichten von Quecksilberchlorürdämpfen gewonnene Präparat bildet ein weisses, nach starkem Reiben gelbliches Pulver, welches bei 100facher Vergrösserung deutliche Kryställchen zeigt. Weil es sich nicht klumpig zusammenballt, ist es von besonderem Werthe als Streupulver bei Conjunctivitis phlyctenulosa. Wegen seiner feinen Vertheilung ist das Calomel à vapeur auch bei interner Darreichung weit wirksamer, so dass es nur die halbe Dosis als Purgans oder Alterans erfordern soll. Nicht officinell ist das auf nassem Wege (durch Fällung einer Quecksilberoxydulnitratlösung mit Kochsalz) dargestellte Calomelas via humida paratum, welches ein sehr feines, amorphes, weisses Pulver bildet und das Calomel à vapeur sogar an Activität noch übertreffen soll.

Ueber die Verhältnisse der Resorption des Calomel ist schon S. 750 das Nöthige mitgetheilt. Dasselbe bildet den Hauptrepräsentanten der purgirenden Mercurialien, indem es in etwas grösseren Dosen (zu 0,06 und mehr einige Male 3stdl. gegeben) häufigere Stuhlentleerungen von eigenthümlicher Beschaffenheit (sog. Calomelstühle) hervorruft, während die wiederholte Darreichung kleinerer Mengen in kürzeren Intervallen die Erscheinungen der Hydrargyrose bedingt, welche nach grösseren Dosen nur dann eintritt, wenn dieselben keinen Durchfall bewirken und im Darmcanal längere Zeit verweilen.

Charakteristisch für die Calomelstühle ist die übrigens auch beim Sublimat öfters vorkommende grüne, manchmal ganz grasgrüne Beschaffenheit derselben und ihre dünne wässrige oder eigenthümlich gehackte Consistenz. Sie erfolgen meist ohne vorausgehende Leibscherzen, noch seltener geht Erbrechen voran. Ueber die Art und Weise des Zustandekommens dieser eigenthümlichen Stühle gehen die Ansichten aus einander. Man sah darin früher einen Beweis für die cholagoge Wirksamkeit des Calomels, das man stets als den Hauptrepräsentanten der gallenvermehrnden Wirkung der Mercurialien angesehen hat. Indess ist dies dubiös, u. A. glauben, dass das aus dem Quecksilber im Darne unter Einwirkung des Schwefelwasserstoffs gebildete Schwefelquecksilber zu dieser Färbung Veranlassung gebe. In den Stühlen findet sich Galle, Schwefelquecksilber und selbst metallisches Quecksilber, auch Leucin und Tyrosin; dagegen nach Wassilieff (1882) weder Indol noch Scatol. Nach Traube kommt bei Calomelgebrauch auch ähnliche Färbung in Form zweier der Mittellinie parallel laufender grüner Streifen auf der Zunge vor. Feinste Vertheilung von Calomel in gewöhnlichen Excrementen ruft Grünfärbung derselben hervor; ebenso färbt Calomel Galle rasch und andauernd grün (Hoppe-Seyler). Wassilieff nimmt daher an, dass das Calomel die Umwandlung der Gallenfarbstoffe in Hydrobilirubin, wodurch die braungelbe Färbung der Stühle bedingt werde, verhindere und das Vorhandensein unzersetzter Galle in den Calomelstühlen dereu eigenthümliche Färbung bedinge. Man pflegt die purgirende Action des Calomels auf das aus demselben gebildete Sublimat zu beziehen, doch wirkt auch fein vertheiltes Quecksilbermetall purgirend. Sicher leitet sich die etwaige cholagoge Action vom gebildeten Sublimat ab (Rutherford). Die Resorption vom Quecksilber erfolgt nicht bloss vom Darne aus, sondern, wie der Nachweis im Harn beweist, auch vom Unterhautzellgewebe aus und bei Einstreuung auf die Conjunctiva (Becker und Alsberg).

Verhältnissmässig wenig bei Syphilis in Gebrauch, hat Ca-

lornel namentlich in tropischen Ländern als Antiphlogisticum (in Verbindung mit grauer Salbe) Benutzung gefunden, wird aber am häufigsten als mildes Laxans verwerthet.

Bei Syphilis reicht man es am besten in kleinen Dosen, von 0,05—0,1 beginnend und allmählig bis 0,3—0,5 steigend, zweckmässig in Pillenform, bei Halsgeschwüren auch in Pulverform. Peter gab Calomel sogar zu nur 0,001 stündlich bei syphilitischen Neuralgien mit überraschendem Erfolge. In grossen Gaben wendete es Weinhold bei seiner äusserst angreifenden, stets mit starkem Speichelflusse verbundenen, nichts desto weniger häufig nicht gründlich heilenden Cur an. Hilty empfiehlt neuerdings Dosen von 0,5 in Gelatine-kapseln täglich 1mal, wobei 3,0—16,0 zur Cur ausreichen sollen. Bei Syphilis ist es übrigens nicht bloss innerlich, sondern in verschiedener Weise äusserlich, früher in Form von Salben (Pinel, Alibert) und der höchst unzweckmässigen, zu präcipitirtem unheilbarem Speichelfluss (Simon) führenden Einreibungen in die Mundschleimhaut von Clark, neuerdings auch subcutan (Scarenzio, Sigmund) und in Räucherungen (Lee und Pollard) angewendet. In letzterem Falle ist das bei Verflüchtigung des Calomels durch Hitze sich abspaltende Quecksilbermetall wohl vorzugsweise wirksam. Dass trotz der Unlöslichkeit des Calomels in Wasser dennoch im Unterhautbindegewebe Bildung einer löslichen Quecksilberverbindung und Resorption erfolgt, hat Bellini durch Thierversuche dargethan.

Dieselben Differenzen in der Art der Darreichung finden sich bei den einzelnen Anhängern der Behandlung entzündlicher Affectionen (cf. p. 757) mit Calomel, wo Einzelne 0,05—0,1 in kurzen Intervallen reichen, während die meisten nur einzelne grössere Calomeldosen geben, wo dann die günstige Wirkung vorzüglich auf die purgirenden Effecte zu beziehen ist.

Als Laxans steht Calomel dem Ricinusöl nahe und kann wie dieses selbst bei entzündlichen Zuständen des Darmcanals ohne Schaden gegeben werden, ja es wirkt sogar auf die Digestion weit weniger störend ein. Die meisten curativen Erfolge, welche dem Calomel bei entzündlichen Affectionen innerer Organe, sowie bei zymotischen Krankheiten nachgerühmt werden, gründen sich auf dessen abführende Wirkung, so dass es nicht als ein sog. Specificum, sondern als ein symptomatisch wirksames Mittel anzusehen ist. Als solches kann es nicht nur bei bestehender Obstipation, sondern auch bei manchen Diarrhöen von Nutzen sein. So erklärt sich z. B. die entschieden günstige Wirkung in manchen Fällen von Ruhr durch Fortschaffung putriden Secrets der vorhandenen Darmgeschwüre, in analoger Weise auch die nicht anzuzweifelnde Heilung mancher Fälle von Diarrhoe und Cholera nostras im kindlichen Lebensalter, selbst bei Säuglingen, durch eine kleine Dosis Calomel, deren Gebrauch sich wegen der Leichtigkeit, mit der das geschmackfreie Medicament auch kleinen Kindern beigebracht werden kann, besonders empfiehlt.

Eine detaillirte Aufzählung der einzelnen Krankheiten, gegen welche Calomel im Laufe der Zeiten in Gebrauch gezogen wurde, hat kein Interesse, da wir das ganze Register der menschlichen Krankheiten durchzugehen haben würden. In einzelnen Ländern besteht, wie Oesterlen sich treffend ausdrückt, eine wirkliche Calomelanomanie der Aerzte, welche nicht selten unheilvolle Folgen gehabt hat. Bezüglich der Behandlung des Typhus gilt das über die Mercurialien im Allgemeinen Bemerkte; die Anwendung ist unter allen Umständen auf frische Fälle mit nicht zu starkem Fieber und mässiger Darmaffection zu beschränken, auch sind Dosen von mehr als 0,5 zu meiden, da leicht Collapsus nach höheren Dosen eintritt. Die Verbindung von Calomel mit Chinin bei Wechselfiebern, welche Willis, Selle u. A. rühmten, ist ohne jeden Werth.

Die von H. Köhler für die Erklärung der günstigen Wirkung des Calomel bei Diarrhöen aufgestellte Vermuthung, dass Calomel faulige Zersetzung verhüte, erhält eine neue Stütze durch experimentelle Untersuchungen von Wassilieff (1882), wonach Calomel die Bildung der während der Verdauung von Eiweissstoffen mit Pankreassaft auftretenden festen und gasförmigen Fäulnisstoffe verhindert, während es die Einwirkung der Pankreasfermente und des Pepsins in keiner Weise stört. Die stopfende Wirkung bei Diarrhoea infantilis würde sich danach an die des Cotoins und Paracotoins (S. 516) schliessen. Auch auf Buttersäuregährung und auf die Bildung und Entwicklung von Bacterien wirkt Calomel vermuthlich in Folge der Abspaltung kleiner Mengen Sublimat sistirend (Wassilieff).

Aeusserlich benutzt man Calomel besonders als reizendes Streupulver, wo es theils auf mechanische Weise, theils durch das bei Berührung mit Eiweissstoffen leicht daraus in geringen Mengen sich bildende Sublimat wirkt. Besonders günstigen Erfolg hat es als Augenstreupulver bei Conjunctivitis pustulosa, so wie bei Condyloiden, welche vorher mit Salzlösung bestrichen worden sind.

Man hat Calomel auch zu Injectionen in die Urethra oder Vagina (Velpeau), bei Stockschnupfen und syphilitischen Geschwüren in der Nase (als Schnupfpulver mit  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  rothem Präcipitat), bei Anginen verschiedener Art (mit Zucker eingeblasen), bei Mastdarmfisteln (Williams, Salmon), bei Pruritus pudendorum (in Salbenform, 1:4—8 Th. Fett), bei schuppenförmigen Hautaffectionen und Eczema mammae (Velpeau), bei ägyptischer Augenentzündung und Trübungen der Hornhaut, sowie als Anodynum nach Touchiren mit Kupfersulfat (Pick) empfohlen, ohne dass jedoch das Calomel bei einem dieser Leiden mehr als eines der übrigen gebräuchlichen Mittel wirkte.

Die höchsten laxirenden Gaben wurden früher zur Abortivcur bei Typhus gebraucht. Bei Kindern ist die purgirende Dosis (0,03—0,06) nicht geringer, da sonst leicht Resorption erfolgt. Oft verbindet man Calomel als Laxans mit Rheum oder Jalape und als Antidyscraticum, um die Resorption nicht durch Purgirwirkung zu stören, mit Opium. In früherer Zeit war eine sehr beliebte Verbindung das wie Calomel benutzte Pulvis Plummeri s. alteraus Plummeri, Plummers Pulver, aus aa Cal. und Goldschwefel, auch mit Zusatz von Guajak 2 Th. bereitet. Eine ähnliche Composition in Pillenform wurde als Pilulae Plummeri bezeichnet.

Als laxirende Dosis des Calomels giebt man 0,1 bis höchstens 1,0, meist in Pulverform, auch in Pillen (z. B. in den aus C., Extr. Rhei comp., Resina Jalapae und Sapo med. componirten Pilulae purgantes cum Hydrargyro s. mercuriales), auch mit Brodteig gebacken (sog. Biscuits d'Olivier.) Zur Erzielung constitutioneller Effecte reicht man 0,004 (z. B. bei Croup) bis 0,2 in Pulver, Pillen oder Trochisken.

Zu Streupulvern nimmt man Calomel (meist Calomel à vapeur) gewöhnlich rein, zu Kehlkopfpulvern 1 Th. C. auf 2—10 Th. Zucker. Zu Salben rechnet man 1 Th. auf 5—10 Th. Fett. Anwendung des Speichels zu Linimenten ist sehr unappetitlich. Zu Subcutaninjectionen nimmt man 0,1—0,4 (Scarenzio) oder nur 0,02 (Zeissl) in Gummischleim oder in Glycerin und Wasser suspendirt.

Bei innerlicher Anwendung des Calomel ist gleichzeitige Darreichung aller Substanzen (auch in gesonderten Mixturen) zu meiden, welche eine Ueberführung desselben in Sublimat oder in ein leicht lösliches und daher entweder ätzendes oder leichter in die Circulation übergehendes Quecksilbersalz veranlassen können. Es gehören dahin von häufiger verordneten Medicamenten namentlich Chlorammonium, Chlorwasser und Präparate, welche Blausäure enthalten (Aqua Amygdalarum amararum, Aqua Laurocerasi, nach Delioux auch Amygdalin, welches mit Calomel eine Spaltung erleiden sollte). Auch vor Darreichung von organisch sauren Flüssigkeiten und Zukost (Apfelmuss, Stachelbeerencompot) ist zu warnen, da heftige Entzündungserscheinungen im Darm, selbst mit tödtlichem Ausgange, danach bei gleichzeitigem Gebrauche von Calomel entstanden sind (Bonnewyn u. A.). Desgleichen sind Alkalicarbonate und namentlich Ammoniak und organisch saure Ammoniaksalze zu meiden, weil sie aus



Calomel Quecksilberoxydul fällen, das im Darm zu Quecksilberoxyd verwandelt wird. Nach Hunt soll Natriumcarbonat die purgirende Wirkung des Calomel erhöhen. Iodüre und Bromüre müssen ebenfalls gemieden werden, da sie zur Bildung von Quecksilberverbindungen führen, welche auf Thiere toxisch wirken. Schwefelwasserstoffhaltige Mixturen machen Calomel unwirksam durch Bildung von Quecksilbersulfür und sind deshalb verwerflich. Chinin soll das Eintreten des Speichelflusses fördern (Harty).

Das Aufbewahren von Calomelpulvern für längere Zeit, wie solches in Polikliniken Sitte ist, kann wegen der möglichen Zersetzung unter dem Einflusse des Lichtes nicht gebilligt werden. Namentlich hat die Aufbewahrung von Calomel mit Zuckerpulver wiederholt zu Vergiftungen geführt, als deren Ursache Sublimatbildung nachgewiesen wurde.

Bei Anwendung von Calomel als Augenstreupulver hat man sich vor der internen Anwendung von Iod- und Bromverbindungen (z. B. Iodkalium, das so häufig bei Scrophulose indicirt ist) zu hüten, weil durch die Elimination des Iods oder Broms durch die Thränen dieselben in Contact mit Calomel kommen und zur Bildung kaustischer Mercurialien führen, wodurch äusserst hochgradige Conjunctivitis wiederholt eingetreten ist. Aehnliche Entzündung entsteht, wenn Calomel auf Geschwüre gestreut und gleichzeitig innerlich Iod- oder Bromkalium applicirt wird (Bellini).

Für die Receptur dürfte die von der Phkp. nicht mehr beliebte Bezeichnung Hydrargyrum chloratum mite vorzuziehen sein, um Verwechslung mit Hydrargyrum bichloratum zu verhüten.

#### Verordnungen:

- 1)  $\mathcal{R}$   
*Hydrargyri chlorati mitis* 0,05  
*Pulv. gummosi* 0,5  
*M. f. pulv. Dispensa tal. dos. No. 5.*  
*D. S. Dreistündlich ein Pulver.*  
 (Bei Diarrhoea infantilis.)

- 2)  $\mathcal{R}$   
*Hydrargyri chlorati mitis* 0,1  
*Extracti Opii* 0,02  
*Pulveris gummosi* 0,5  
*M. f. pulv. D. tal. dos. No. 5. D. S.*  
*Alle 3 Stunden ein Pulver. (Bei*  
*Ruhr, Bleikolik u. a.)*

- 3)  $\mathcal{R}$   
*Hydr. chlor. mit.* 0,1—0,2  
*Tuberum Ialapae* 0,5  
*Sacchari albi* 1,0  
*M. f. pulv. D. S. Auf einmal zu nehmen.*  
 (Calomel als Abführmittel.)

- 4)  $\mathcal{R}$   
*Hydrargyri chlorati mitis* 1,0  
*Extracti Opii* 0,2  
*Succi Liquiritiae depurati q. s.*  
*ut f. pilul. No. 20. Consp. D. S.*  
*Morgens und Abends 1 Pille. (Bei*  
*Syphilis und überhaupt zu alteriren-*  
*den Zwecken.)*

- 5)  $\mathcal{R}$   
*Hydr. chlor. mit.* 0,6  
*Pulv. rad. Alth.*  
*Extracti Conii aa* 2,0  
*Opii puri* 0,1  
*M. f. l. a. pilul. No. 36. Consp. D. S.*  
*Abends mit 4 Pillen anzufangen und*  
*täglich um 1 zu steigen. (Bei Syphi-*  
*lis. Simon.)*

**Hydrargyrum bichloratum**, Hydrargyrum bichloratum corrosivum, Mercurius sublimatus corrosivus, Hydrargyrum perchloratum; **Quecksilberchlorid**, ätzendes Quecksilberchlorid, ätzender Quecksilbersublimat, Aetzsublimat, Sublimat, Einfach Chlorquecksilber.

Diese schon den Arabern bekannte Quecksilberverbindung,  $\text{HgCl}_2$ , welche beim Auflösen von Quecksilber in Königswasser oder von Quecksilberoxyd in Salzsäure entsteht und meist durch Destillation von Mercurisulfat mit Kochsalz fabrikmässig dargestellt wird, bildet weisse, durchscheinende, krystallinisch strahlige Massen von 5,3 sp. Gew., welche sich in 3 Th. kochendem und 16 Th. kaltem Wasser,  $2\frac{1}{2}$  Th. kaltem Weingeist und 3 Th. Aether lösen. Das Quecksilberchlorid ist ohne Geruch und von widrig scharfem Metallgeschmacke. Die

wässrige Auflösung reagirt schwach sauer, wird aber bei Zusatz von Kochsalz neutral. Schweflige Säure, Zinnchlorür u. a. Reducentien scheiden daraus Quecksilberchlorür oder metallisches Quecksilber; Natron, Kali, Kalk fallen daraus Quecksilberoxyd, Ammoniak Mercuriammoniumchlorid.

Der Sublimat bildet mit dem Quecksilberoxyd die Hauptrepräsentanten der in Folge von Affinität zu Eiweissstoffen kautischen Mercurialien, welche bei interner Einführung in grösseren Dosen zu Corrosion im Magen Veranlassung geben können.

Quecksilberchlorid fällt wässriges Eiweiss weiss, selbst bei sehr starker Verdünnung. Der Niederschlag entsteht nicht in alkalischen Eiweisslösungen bei überschüssigem Kochsalz, in sauren Lösungen dagegen nur bei Gegenwart von Natriumchlorid (Lassaigne, Marle). Der im Eiweissüberschuss, nicht aber in überschüssigem Sublimat lösliche, käsige Niederschlag ist nach Lassaigne eine Verbindung von Sublimat mit Eiweiss und wird beim Trocknen gelblich durchscheinend hornartig, wobei er alles Chlor verliert und in Quecksilberoxydalbuminat sich verwandelt, wie solches auch direct durch Verreiben von feuchtem Quecksilberoxyd mit Eiweiss oder durch Fällen mit Mercurinitrat oder Acetat erhalten werden kann. Das Chlorquecksilber enthaltende Albuminat löst sich in feuchtem Zustande rasch in wässrigen Solutionen von Haloidsalzen (Kochsalz, Iodkalium, Bromkalium), ebenso in verschiedenen Säuren, jedoch nicht in Salzsäure, ferner unter rascher Abscheidung von metallischem Quecksilber in Kalilauge und Kalkwasser. Das chlorfreie Quecksilberalbuminat löst sich nicht in Solutionen von Haloidsalzen, wohl aber in Salzsäure und Essigsäure auf. Die Ansicht von Orfila, dass der mit Sublimat in Eiweiss erzeugte Niederschlag eine Verbindung von Calomel und Eiweiss sei, hat sich als irrtümlich erwiesen. Der Quecksilbergehalt des Albuminats ist nach den widersprechenden Resultaten der Analysen nicht constant. Serumeiweiss verhält sich dem Sublimat gegenüber wie alkalische Hühnereiweisslösung. Peptonlösung wird durch Zusatz 1% Sublimatlösung getrübt, nicht aber durch 0,03% Lösung; im Magensaft erzeugen nur mehr als 1% Lösungen Präcipitation (Marle). Der Peptonisirungsprocess wird schon durch sehr kleine Mengen Sublimat gehemmt, nicht durch Zerstörung des Pepsins, das, durch Sublimat ausgefällt, noch activ bleibt, auch nicht durch physikalische Veränderung des Eiweiss. Starker Zusatz von Kochsalz steigert die verdauungshemmende Wirkung des Sublimats, während schwacher ohne Einfluss bleibt.

In kleinen Dosen wird Sublimat sehr gut ertragen und steigert sogar den Appetit; mehrere Tage hindurch fortgebraucht bedingen solche das Auftreten von Schleim, Epithel und Sediment im Urin, bisweilen grüne diarrhoische Stühle, sowie Metallgeschmack, Brennen und Stechen im Munde mit Anschwellung der Speicheldrüsen (Mayençon und Bergeret). Etwas grössere Gaben als die medicinisch zulässigen können stärkere Reizung und Katarrh der Verdauungsorgane, selbst Magen- und Leibschmerzen, choleriforme Erscheinungen und Gastroenteritis bewirken; dazu gesellt sich Bronchialkatarrh mit schleimig eitrigem und oft blutigem Auswurfe, selbst Pneumonie. Die letztgenannten Symptome, meist an Kranken, welche Sublimatcuren mit Steigerung der Dose unterworfen waren, beobachtet, sollen nach Sublimat leichter als nach irgend einem anderen Quecksilberpräparate entstehen, während der Speichelfluss danach — ob im Verhältniss zu der wegen der kautischen Action kleinen Dosis des Präparats, ist freilich nicht ausgemacht — am spätesten auftreten soll. Speichelfluss kann übrigens schon nach 0,03—0,05, in 30 Stunden genommen, erfolgen (Kums).

Das Bild der durch toxische Dosen Sublimat bedingten Vergiftung ist das der Gastroenteritis; brennend scharfer, abscheulicher Metallgeschmack, krampfartige Contractionen im Schlunde, blutige Stühle mit Tenesmus sind meistens vorhanden; häufig wird die Urinsecretion stark vermindert oder ganz unterdrückt, in ersterem Falle enthält der Harn oft Eiweiss und Fibrincylinde als Zeichen von Nephritis. Bei acut verlaufenden Fällen kommt es zu Respirationsbeschwerden, Singultus und Collapsus; in protrahirten Fällen der Intoxication meist erst in 4 Tagen zu Stomatitis und Speichelfluss.

Die nach letalen Dosen von Sublimat post mortem sich findenden Erschei-

nungen in den ersten Wegen entsprechen im Allgemeinen denen der Gastroenteritis toxica; die als charakteristisch bezeichnete schiefergraue Färbung der Mundhöhlen- und Magenschleimhaut ist keineswegs immer constant. Häufig findet sich Nierenentzündung, bisweilen fettige Degeneration innerer Organe und Ekchymosirung im Pericardium.

Auch bei Thieren können durch Sublimat chronische und acute Vergiftungen herbeigeführt werden. Ganz besonders giftig erscheint Sublimat auf niedrigere Organismen. Es ist nach Bucholtz und Koch das Antisepticum par excellence, welches schon in einer Verdünnung von 1:20000 Bacterienentwicklung verhindert.

Als das beste Antidot bei acuter Sublimatvergiftung ist das Eiweiss anzuwenden, und zwar am besten unvermischt oder doch höchstens mit Milch verdünnt, da Dilution mit Wasser die Wirksamkeit des Gegengiftes verringert (van Hasselt). Man rechnet auf 0,2—0,3 Sublimat das Weisse von einem Ei (Peschier). Statt Eiweiss kann auch Milch oder Kleber benutzt werden; rationell ist auch das von Mialhe empfohlene hydratische Schwefeleisen, welches mit Sublimat Schwefelquecksilber und Chloreisen bildet. Minder empfehlenswerth ist Magnesiahydrat, weil dadurch ätzendes Quecksilberoxyd gebildet wird.

Der Sublimat ist bei der Behandlung von Syphilis ein verhältnissmässig sehr beliebtes Präparat, welches früher besonders durch die sog. Dzondische Cur und neuerdings durch die subcutanen Sublimatinjectionen von Lewin einen besonderen Ruf sich erworben hat.

Sublimat dämpft sehr rasch die sichtlichen Symptome der Lues, wird aber namentlich bei längerem Gebrauche steigender Dosen auf die Dauer nicht gut ertragen, so dass z. B. die Dzondische Cur oft zum Nachtheile der gründlichen Heilung unterbrochen werden muss. Speichelfluss kommt bei derartigen Curen nicht häufig vor, doch greift Sublimat nichtsdestoweniger die Zähne an (Simon) und bei Individuen mit schwachen Lungen entsteht nicht selten Hämoptysis, so dass Sublimatcuren nur bei Individuen mit robusten Verdauungs- und Athemwerkzeugen angewendet werden sollten, aber auch bei diesen schützt der Sublimat weder bei interner noch bei subcutaner Anwendung (Stöhr, Oedmansson) vor Recidiven gleich gut wie die Schmiercur. Die Ansichten der Syphilidologen über die Formen, welche Sublimat indiciren (nach Simon Hautausschläge und Condylome, nach Rust alle secundären Formen, welche rasch um sich greifen, nach Bonorden alle anomalen Formen) divergiren erheblich. Für die subcutane Behandlung eignen sich am besten die einfacheren Formen der zweiten Periode.

Der Gebrauch gegen andere Diathesen, unter denen Rheumatismus chronicus und acutus (Romberg) besonders zu nennen sind, gegen Neuralgien (Ischias), Hydrops, Cholera (Wynn, Taylor), Uterushypertrophie (Oldham), Amaurose (Deval), typhöse Pneumonie (Heine, Skoda), Croup (Braun), Hydrocephalus (Holland, Weiss) u. s. w., kann als obsolet bezeichnet werden.

Dagegen kommt Sublimat äusserlich als Aetzmittel und irritirendes Medicament in Anwendung und zwar besonders bei leichteren Hautaffectionen, z. B. bei Sommersprossen und Mitessern, bei Pityriasis simplex und versicolor, ferner bei Prurigo, seltener bei syphilitischen Geschwüren oder Condylomen, wo jedoch Calomel zweckmässiger ist, noch seltener bei Schleimhautentzündungen.

Als Aetzmittel eignet sich Sublimat nicht gut; bei Anwendung auf grössere Flächen ist wiederholt Resorption und Vergiftung beobachtet, auch hinterlässt er tiefe hartnäckige Geschwüre. Besondere Anwendungen sind von dem Mittel zum Entfernen von Schiesspulver (Busch), zur Verhütung von Decubitus (van Nes), bei Ophthalmie (Eulenberg) und bei Entzündung des äusseren Gehörganges, so wie (Sublimatsalbe als rasches Vesicans) bei Croup gemacht. J. Hunter empfahl Waschungen mit Sublimatlösung als Prophylacticum gegen syphilitische Ansteckung.

Zur innerlichen Darreichung, wo man den Sublimat zu 0,003



bis 0,03 verordnet, eignet sich am besten die Pillenform oder die von Bärensprung angegebene Quecksilberalbuminatmixture. Die Pharmacopoe gestattet als höchste Einzelgabe 0,03, als höchste Tagesgabe 0,1.

In früherer Zeit waren auch Lösungen gebräuchlich, z. B. in verdünntem Alkohol (sog. *Liquor van Swieten*, 0,6 Sublimat in 1 Lit. Kornbranntwein gelöst), doch schmecken dieselben abscheulich und stören leicht die Digestion. Bärensprungs Quecksilberalbuminatmixture enthält 0,1 Sublimat auf 1 Ei, 150,0 Wasser und 3,0 Salmiak, von welcher Mischung 2stündl. 1 Esslöffel voll gereicht wird. Dieselbe ist eine Modification einer früher von Mialhe angegebenen Mischung (*Liqueur mercurielle normale*), welche neben Salmiak auch Kochsalz enthält. In beiden wird durch Filtration ein Theil des Quecksilbergehaltes entfernt. Eine Lösung von Sublimat in Aether (*Aether mercurialis*) kann tropfenweise in schleimigem Vehikel gegeben werden. Lösung in Milch (*Mandon*) kann bei syphilitischen Säuglingen angewendet werden. — Sublimatpillen sind, wenn jede Zersetzung vermieden werden soll, mit *Bolus alba* anzufertigen. In den Dzondischen Pillen, welche mit *Mica panis albi* bereitet sind, und in den meisten mit Extract gemachten Pillen ist ein grosser Theil des Sublimats zersetzt. Bei dem curmässigen Gebrauche desselben steigt man allmähig mit der Dosis, indem man am zweckmässigsten mit 0,003 beginnt, bis zu 0,1; die Darreichung geschieht am zweckmässigsten etwa 1 Viertelstunde nach dem Mittagessen. Tritt dabei Reizung des Magens oder des Darmcanals ein, so wird ein Zusatz von Opium zu den Pillen gemacht oder Opiumtinctur zu einigen Tropfen gegeben. Die Diät ist bei dieser Cur die nämliche wie bei den kleinen Schmiercuren. Man vermeide die gleichzeitige Verabreichung grösserer Mengen von Kochsalz, da nach den Versuchen von Marle dadurch die Verdauung beeinträchtigt wird.

Zur äusseren Anwendung dienen vorzugsweise Lösungen in Wasser, welche je nach dem zu erreichenden Zwecke verschiedene Concentration besitzen, zum Aetzen auch Lösung in Collodium, sog. *Collodium causticum* (cf. S. 391).

Kaustische Lösungen, z. B. zum Zerstören von Condylomen und syphilitischen Geschwüren, werden meist mit Spiritus bereitet; sehr gebräuchlich ist in dieser Beziehung die modificirte Plencksche Solution, oder der *Liquor corrosivus camphoratus* s. *Solutio Freibergi* (1 Th. Sublimat auf  $\frac{1}{2}$  Th. Campher und 8 Th. Spiritus). Zur Bepinselung der Haut bei den obengenannten leichten Hautkrankheiten benutzt man wässrige Lösungen von 1 : 500—1000, welche auch zu Bepinselung der Mundhöhle, des Pharynx und Larynx dienen können. Für letztere empfiehlt sich ausschliesslich Glycerin als versüssender Zusatz. Zum Aetzen diente früher der *Liquor Hydrargyri corrosivi* s. *Aqua phagedaenica decolor*, eine Lösung von Salmiak und Sublimat in dest. Wasser, wobei ein leicht zersetzliches Doppelsalz (*Alembrothsaltz*) entsteht, welches auch in dem bei Ephemiden, *Pityriasis* u. a. Hautaffectionen in England benutzten sog. *Liquor Gowlandi* (Sublimat und Salmiak  $\overline{\text{aa}}$  1 : 200 Bittermandelemulsion oder *Aq. dest.*) vorhanden ist. Eine Lösung von 2 Th. Sublimat,  $\overline{\text{aa}}$  1 Th. Campher, Bleizucker und Alaun in  $\overline{\text{aa}}$  5 Th. Spir. und *Acid. aceticum* diente früher als *Liquor corrosivus* s. *ad condylomata* zum Aetzen von Feigwarzen. Zu Augentropfwässern und Bähungen rechnet man  $\frac{1}{2}$ —1 Th. Sublimat auf 100—300 Th. Wasser, zu Injectionen in die Urethra oder Vagina 1 Th. auf 50—500 Th. Flüssigkeit. Zu Sublimatbädern, welche ebenfalls zu antisypilitischen Curen empfohlen sind, hat man 2,0—10,0 Sublimat, vorher in 10,0—25,0 Wasser aufgelöst, benutzt, zu Localbädern 0,5—1,0.

Zur subcutanen Injection nimmt man am zweckmässigsten 1procentige Lösungen. Die Dosis des Sublimats beträgt dabei 0,005—0,01. Wegen des nicht selten nach Subcutaninjection auftretenden heftigen Schmerzes und wegen der häufig resultirenden localen Entzündung und Verätzung an der Einstichstelle giebt man jetzt allgemein zur Subcutaninjection einer Verbindung des Sublimats mit Chlornatrium, mit Eiweiss oder mit Pepton den Vorzug. Die erstere, das *Natriumquecksilberchlorid*, *Hydrargyrum bichloratum cum Natrio*

chlorato, ist in den Lösungen von Kratschmer und von J. Müller und Stern enthalten. Letztere benutzen Sublimat und Kochsalz im Verhältnisse von 1:10. Die zuerst von Bamberger empfohlenen Verbindungen mit Eiweiss und Pepton, das Sublimatalbuminat, Hydrargyrum bichloratum albuminat, und das Quecksilberpepton, Hydrargyrum peptonatum, leisten in Bezug auf die Verhütung örtlicher Reizungsercheinungen weniger als die Kochsalzverbindung und fast nicht mehr als Sublimat selbst. Zur Bereitung des ersteren fällt man verdünntes und filtrirtes Hühnereiweiss mit Sublimatlösung und löst den Niederschlag in kochsalzhaltigem Wasser in dem Verhältnisse, dass je ein Ccm. Flüssigkeit 0,01 Quecksilbersublimat enthält. Die gleiche Stärke besitzt auch das analog aus Fleischpepton dargestellte Quecksilberpepton von Bamberger. Petit bereitet dasselbe durch Verreiben von 1,0 Sublimat, 2,0 Chlornatrium und 1,0 trockenem Pepton, aus welcher Mischung bereitete Lösungen sich monatelang halten sollen. Auf alle Fälle muss man, mag man die letztgenannten Präparate oder wässrige Sublimatsolutionen benutzen, die Cur als unnütz betrachten, wenn nach 15 Einspritzungen Besserung der syphilitischen Erscheinungen nicht eintritt (Sigmund).

Zu Sublimatsalben, welche früher auch, z. B. in die Fusssohlen eingerieben, methodisch gegen Syphilis benutzt wurden (Cirillos Salbe, Unguentum Hydrargyri cinereum fortius), nimmt man am besten 1 Th. Sublimat auf 25 Th. Wachs-salbe. Eine besondere Form bilden noch die in Frankreich bei syphilitischen Nasen- und Rachengeschwüren benutzten und aus mit Sublimatlösung getränkten und mit Kalilösung (zur Bildung von Quecksilberoxyd, welches später reducirt wird) bestrichenen Tabaksblättern bereiteten Sublimatcigarren.

Bei Verordnung des Sublimats hat man so einfach wie möglich zu verfahren, da fast alle organischen Stoffe, Schwefel-, Brom- und Iodverbindungen, Alkalien, auch die meisten Metallsalze zersetzend einwirken.

#### Verordnungen:

- |  |   |
|--|---|
| <p>1) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Hydrargyri bichlorati corrosivi</i> 0,1<br/> <span style="margin-left: 150px;">(dgm. 1)</span><br/> <i>Argillae</i> 5,0<br/> <i>F. c. Aq. dest. pilul. No. 50. Consp.</i><br/> <i>D. S.</i> Tägl. 2 Stück, allmählig steigend.<br/>         (Statt der Dzondischen Pillen.)</p>                     | <p>4) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Hydr. bichlor. corros.</i> 0,05<br/> <i>Natrii chlorati</i> 0,5<br/> <i>Aq. dest.</i> 5,0<br/> <i>M. D. S.</i> Zu subcutanen Injectionen.<br/>         (Zu 5 Injectionen.)</p>   |
| <p>2) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Hydr. bichlor. corros.</i><br/> <i>Extracti Opii</i> aa 0,2 (dgm. 2)<br/> <i>Extracti Guajaci</i> 3,0<br/> <i>F. pilul. No. 20. Consp. D. S.</i> Mit<br/>         1 Pille zu beginnen und allmählig<br/>         auf 3 im Tage zu steigen. (Pilules<br/>         de Dupuytren. Gegen Syphilis.)</p> | <p>5) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Hydr. bichlor. corros.</i> 0,03<br/> <i>Aq. destill.</i> 200,0<br/> <i>M. D. S.</i> Zu lauwarmen Umschlägen<br/>         auf die Augen. (Bei Ophthalmia<br/>         neonatorum. Eulenberg.)</p>   |
| <p>3) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Hydr. bichlor. corrosivi</i> 1,0<br/> <i>Natrii chlorati</i> 10,0<br/> <i>Aq. destill.</i> 200,0<br/> <i>M. D. S.</i> Aeusserlich. (Verbandwasser<br/>         für syphilitische Ulcerationen. Müller<br/>         und Stern.)</p>  | <p>6) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Hydr. bichlor. corros.</i> 0,05<br/> <i>Emulsionis Amygdalarum amar.</i><br/> <span style="float: right;">300,0</span><br/> <i>Tincturae Benzoës</i> 1,5<br/> <i>M. D. S.</i> Waschwasser. (Bei Sommer-<br/>         sprossen, Akne etc. Aqua orien-<br/>         talis nach Hebra.)</p> |

**Hydrargyrum praecipitatum album**, H. amidato-bichloratum, H. ammoniato-muriaticum, Mercurius praecipitatus albus; **Weisser Quecksilberpräcipitat.**

Der weisse Quecksilberpräcipitat (nicht zu verwechseln mit dem Précipité blanc der Franzosen, worunter diese auf nassem Wege dargestelltes Calomel ver-

stehen) bildet ein weisses, lockeres Pulver, welches durch Zumischen einer wässrigen Sublimatlösung (1:20) zu Salmiakgeist und Trocknen des ausgewaschenen Niederschlages erhalten wird. Er ist eine Verbindung von Quecksilberchlorid und Quecksilberamid,  $\text{NH}^2\text{HgCl}$  (Mercuriammoniumchlorid), und giebt beim Erhitzen, ohne zu schmelzen, ein Sublimat von Quecksilberchlorür und Stickstoff und Ammoniakgas. Er führt daher auch den Namen unschmelzbarer Präcipität im Gegensatz zu dem früher gebräuchlichen schmelzbaren weissen Präcipitat,  $\text{N}^2\text{H}^6\text{HgCl}_2$ , welcher durch Fällen einer Lösung von gleichen Theilen Quecksilberchlorid und Chlorammonium mit einer Lösung von kohlensaurem Natrium resultirt und beim Erhitzen zu einer klaren, gelblichen Flüssigkeit schmilzt, ehe er sich zersetzt. Kochendes Wasser zerlegt den weissen Präcipitat in Chlorammonium und gelbes Quecksilberoxydamidchlorid. In Wasser und Weingeist löst er sich nicht, dagegen leicht in erwärmter Salpetersäure. Mit Natronlauge erwärmt, scheidet er gelbes Quecksilberoxyd ab.

Der weisse Präcipitat ist ein ziemlich entbehrliches Präparat, welches früher in Salbenform oder als Streupulver bei Hautausschlägen, besonders Krätze (Zellersche Krätzsalbe), bei Epizoen, bei Augenblenorrrhoe und Blepharitis, bei Photophobie und Iritis (A. v. Graefes Stirnsalbe; vgl. S. 156), auch bei syphilitischen Geschwüren, Anwendung fand. Bei anhaltender Einreibung kommt es zu Bläschenausschlag; auch soll dadurch Speichelfluss bedingt werden können.

#### Präparat:

**Unguentum Hydrargyri album**, Unguentum Hydrargyri praecipitati albi s. amidato-bichlorati; **Weisse Quecksilbersalbe**. Sehr weisse, aus 1 Th. Präcipitat und 9 Th. Paraffinsalbe ex tempore zu bereitende Salbe.

**Hydrargyrum iodatum**, Hydrargyrum iodatum flavum, Protoioduretum Hydrargyri; **Quecksilberiodür**, Gelbes Iodquecksilber.

Das Quecksilberiodür ist von Ricord in die Therapie der Syphilis eingeführt worden, ursprünglich in der Voraussetzung, gleichzeitig die Wirkung des Iods und des Quecksilbers zu erhalten; doch hat sich nicht gezeigt, dass das Präparat rascher oder sicherer wirke als andere Quecksilbermittel, obschon es besonders in Frankreich viele Verehrer besitzt.

Das Hydrargyrum iodatum flavum, welches ausser den oben angegebenen Benennungen noch manche andere, wie Hydrargyrum subiodatum und Iodetum hydrargyrosus, führt, wird durch vorsichtiges inniges Verreiben von 8 Th. Quecksilber und 5 Th. Iod erhalten und bildet ein feines, grünlich gelbes Pulver von 7.6 spec. Gew., das am Lichte braun wird und sich beim Erhitzen völlig verflüchtigt. Es kann als fast unlöslich in den gewöhnlichen Lösungsmitteln (Wasser, Weingeist, Aether) bezeichnet werden. Die Benennung gelbes Iodquecksilber ist nicht völlig zutreffend, da das Quecksilberiodür eher grün als gelb aussieht und das wirklich gelbe Iodquecksilber eine Verbindung von Quecksilberiodür und Quecksilberiodid ist. Aus dem Quecksilberiodür entsteht bei Contact mit Eiweiss unter theilweiser Reduction zu Quecksilbermetall eine lösliche Quecksilberverbindung; es zersetzt sich in conc. Kochsalzlösung in Quecksilberiodid und Quecksilber, welches erstere sich in einer den Kochsalzmengen in Blut und Magensaft entsprechenden Chlornatriumlösung unter Bildung eines Doppelsalzes löst (Blomberg). Nach Bellini entsteht aus Quecksilberiodür auch beim Schütteln mit Salzsäure eine geringe Menge einer löslichen Mercurverbindung, ebenso im Contact mit Alkalicarbonaten und in Berührung mit Leim, was beim Calomel nicht der Fall ist. Im Urin findet sich sehr rasch Iod (Bärensprung, Rabuteau). Bei Thieren bewirkt Quecksilberiodür Durchfall, jedoch keine Anätzung im Darne. Zu 0,2 unter die Haut gebracht, bewirkt es Entzündung und Abscedirung (Bellini).



In Frankreich benutzt man es sehr häufig bei Syphilis in Pillen von 0,05, wovon zuerst 1, dann 2 täglich gegeben werden; man reicht dieselben am besten Abends nach der Mahlzeit. Die Maximalgabe der Phkp. ist pro dosi 0,05, pro die 0,2. Bei der Darreichung sind alle Substanzen, welche eine rasche Ueberführung in Quecksilberiodid bedingen, namentlich Iodkalium, Natrium- und Ammoniumchlorid, zu meiden. Auch äusserlich ist Quecksilberiodür in Salben (1 : 5—25) oder in Pflasterform gegen Drüsenverhärtungen syphilitischer oder nichtsyphilitischer Natur benutzt. Tamanchef will durch 9wöchentliche interne Darreichung von täglich 0,045 Linsentrübung beseitigt haben.

## Verordnungen:

- |  |  |
|--|--|
| <p>1) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Hydrargyri iodati flavi</i><br/> <i>Lactucarii</i> aa 3,0<br/> <i>Extracti Opii aquosi</i> 1,0<br/> — <i>Conii</i> 6,0<br/> <i>M. f. pilul. No. 60. Consp. D. S.</i><br/> Abends <math>\frac{1}{4}</math> Std. nach dem Essen<br/> eine Pille, später Abends und Mor-<br/> gens 1 Pille. (Ricords Iodqueck-<br/> silberpillen.)</p> | <p>de protoiodure de mercure Cod.<br/> Franc.)</p>   |
| <p>2) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Hydrargyri iodati flavi</i> 5,0<br/> <i>Extracti Opii</i> 2,0<br/> <i>Conservae rosarum</i> 10,0<br/> <i>Pulv. rad. Liquiritiae q. s.</i><br/> <i>ut f. pilul. No. 100. Consp. D. S.</i> Abends<br/> nach dem Essen 1 Pille. (Pilules</p>   | <p>3) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Hydrargyri iodati flavi</i><br/> <i>Pulv. Zingiberis</i> aa 4,0<br/> <i>Conservae Rosarum</i> 8,0<br/> <i>M. f. pilul. No. 120. Consp. (Eng-<br/> lische, in derselben Weise zu ver-<br/> brauchende Pillen.)</i></p> |
| <p>4) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Hydrargyri iodati flavi</i> 0,3<br/> <i>Empl. saponati</i> 6,0<br/> <i>M. f. empl. (Bei chronischer Entzü-<br/> ndung und Verhärtung der Mamma.<br/> Wolf.)</i></p>   |  |

**Hydrargyrum biiodatum**, Hydrargyrum biiodatum rubrum, Mercurius iodatus ruber, Dentoioduretum Hydrargyri; **Quecksilberiodid**, rothes Quecksilberiodid, Rothes Iodquecksilber.

Diese dem Sublimat analog zusammengesetzte Verbindung des Quecksilbers mit Iod wirkt örtlich intensiver irritirend als das dem Calomel entsprechende Iodür und ist deshalb auch in kleineren Dosen (zu höchstens 0,03 pro dosi, 0,1 pro die) zu verordnen. Sie kommt indess weniger als solche wie als durch Lösen mit Hülfe von Iodkalium oder Iodnatrium gebildetes Doppelsalz in Anwendung.

Das rothe Quecksilberiodid, HgI, ist ein lebhaft scharlachrothes Pulver, welches durch Ausfällen einer Lösung von 4 Th. Sublimat in 80 Th. Wasser mit 5 Th. in 15 Th. Wasser gelösten Iodkalium erhalten wird. Es löst sich in 6000—7000 Th. Wasser, in 20 Th. siedendem und 130 Th. kaltem Alkohol. Im Magen wird das Quecksilberiodid wahrscheinlich unter dem Einflusse der Chloride in ein lösliches Doppelsalz übergeführt, welchem ebenfalls coagulirende Wirkung auf das Eiweiss zugeschrieben wird. Innerlich wurde es von Bielt in spirituöser Lösung bei Syphilis scrophulöser Individuen, von Fuller bei Epilepsie und Taubheit aus centraler Ursache, äusserlich in Salbenform (1 : 10—100) bei dyskrasischen Geschwüren, Lupus, Struma, Blepharitis chronica und Neuralgien (Romberg) in Anwendung gezogen. Zweckmässiger ist für den internen Gebrauch die Pillenform, gewiss aber nicht die von Wells empfohlene Darreichung in Leberthran oder in Iodeisensyrup.

Das oben erwähnte Doppelsalz von Quecksilberiodid und Iodkalium, Hydrargyrum biiodatum cum Kalio iodato s. Iodo-Hydrargyrus Potassii,

welches übrigens nach der zur Darstellung verwendeten Menge des Iodkaliums wechselnde Zusammensetzung besitzt, ist von Channing gegen Lungenphthise, von Gibert, Puche u. A. bei Syphiliden, von A. von Graefe bei Iritis syphilitica benutzt und äusserlich von Evans u. A. ganz wie Sublimat verwendet. Innerlich wird es meist in Lösung in Syrup (Gibert) verordnet. Zu subcutanen Injectionen ist es wegen starker Irritation ungeeignet.

#### Verordnung:

1)	R	M. D. S. Mit einem Theelöffel voll
	<i>Hydrargyri biiodati rubri</i> 0,25	beginnend, allmählig zu steigern.
	(cgm. 25)	(A. v. Graefe.)
	<i>Kalii iodati</i> 3,0	
	<i>Aq. destill.</i> 10,0	
	<i>Syrupi Sacchari</i> 50,0	

#### Hydrargyrum cyanatum, Hydrargyrum bicianatum, Bicyanetum Mercurii; Cyanquecksilber.

Dieses Präparat hat in neuester Zeit vielfach Anwendung zur Subcutanapplication gefunden, wozu es sich durch seine Löslichkeit in Wasser und die relativ geringe örtliche Irritation der Injection eignet (Cullingworth, Güntz, Sigmund).

Das Quecksilbercyanid bildet farblose, durchscheinende, säulenförmige Krystalle, welche sich in 6 Th. kaltem und 3 Th. warmem Wasser lösen. Das Salz ist auch in 6,8 Th. Weingeist, aber schwierig in Aether löslich.

Die Wirkung des Cyanquecksilbers ist in medicinalen Dosen offenbar nur die eines Mercurpräparates nach Art des Sublimats. Bringt man dagegen mehrere Dgm. in den Magen kleiner Säugethiere, so entwickelt sich unter dem Einflusse der Salzsäure soviel Cyanwasserstoff, um sofort letale Blausäurevergiftung zu bedingen. Bei dem hohen Atomgewichte des Quecksilbers müssten mindestens 0,4 Cyanquecksilber genommen werden, um tödtliche Blausäurevergiftung beim Menschen zu verursachen. Da aber schon geringere Mengen corrosiver Quecksilberpräparate toxisch wirken, entsprechen die bisher bekannten Cyanquecksilbervergiftungen in ihrer Symptomatologie und dem Leichenbefunde vollkommen der Sublimatvergiftung.

Früher wurde Quecksilbercyanid auch innerlich zu 0,004—0,008, allmählig bis auf 0,012 steigend, bei Syphilis und insbesondere bei Neuralgien auf syphilitischer Basis gegeben (Horn, Brera, Parent). Die subcutane Anwendung hat im Wesentlichen die Indicationen des Quecksilbersublimats und Quecksilberpeptonats. Schmerzen von 1—2 Std. Dauer sind Regel, dagegen kommt es selten zu hartnäckiger Infiltration oder Abscedirung, während die Haut sich häufig an der Injectionsstelle nekrotisch ohne Schmerzen abstösst. Nebenerscheinungen, wie Ohnmachten, Schwindel, Ohrensausen und Flimmern vor den Augen (Güntz) oder profuse und blutige Diarrhöen (Plumert), treten vereinzelt auf. Man injicirt das Präparat in wässriger Lösung (1:100), zu 0,01, bei ausgebreiteten Sclerosen in der Nähe grosser Drüsenpaquete auch wohl 0,02—0,03. Zweckmässig ist es, die Quecksilbercyanidlösung in verschiedene kleine Fläschchen zu vertheilen und aus jedem nur 2—3 mal zu injiciren, da leicht Zersetzung unter Blausäureentwicklung und Trübung statt hat.

Erichson empfahl Quecksilbercyanid zu 0,00125 mehrmals täglich (bei Kindern unter einem Jahre zu 0,0006) gegen Diphtherie. Die Maximaldosis für Erwachsene beträgt 0,03, die Tagesgabe 0,1.

Ausser den besprochenen Quecksilberverbindungen werden noch eine Reihe nicht officineller, insbesondere gegen Lues angewendet, von denen die folgenden Erwähnung verdienen.

*Hydrargyrum oxydulatum nigrum*; schwarzes Quecksilberoxydul. Diese Bezeichnung wird auf zwei Präparate angewendet, nämlich auf den durch Fällen von Quecksilberoxydulnitrat mit Kalilauge erhaltenen *Mercurius niger Moscatti* und auf den durch Fällen desselben Quecksilbersalzes mit Ammoniak gewonnenen sog. *Mercurius solubilis Hahnemanni*. Beide stellen schwarze, in Wasser und Weingeist unlösliche Pulver dar, welche zu 0,05—0,2 bei Syphilis und Variola, sowie in einer Mischung von 0,05 mit 5,0 Milchzucker federmesserspitzenweise bei *Ophthalmia neonatorum* (Eulenberg) gebraucht wurden. Im Hahnemannschen Quecksilber ist ausser Quecksilberoxydul eine als *Mercurio-Ammoniumnitrat* bezeichnete Verbindung,  $\text{NO}^3\text{N}^2\text{Hg}^2$ , vorhanden. Dasselbe löst sich zum grössten Theile in Essigsäure und conc. Säuren. Quecksilberoxydul ist auch in der früher zu Umschlägen auf syphilitische Geschwüre und Hautaffectionen benutzten *Aqua phagedaenica nigra* vorhanden. Diese schlechtweg auch als *Aqua nigra* oder *Aqua mercurialis nigra*, schwarzes Wasser, Gray lotion, Black wash, bezeichnete Flüssigkeit wird durch Mischen von 1 Th. Calomel und 60 Th. Kalkwasser, wobei sich ein vorzüglich aus Quecksilberoxydul bestehender Niederschlag bildet, erhalten.

Salzverbindungen des Quecksilberoxyduls sind das *Hydrargyrum aceticum oxydulatum*, Quecksilberoxydulacetat, und *H. phosphoricum oxydulatum*, Quecksilberoxydulphosphat. Beide Präparate, namentlich das letztere, sind schwer löslich und scheinen in ihrer Wirkung dem Calomel nahe zu stehen, in welches sie z. Th. im Magensaft übergeführt werden. Als *Antisyphilitica* sind sie ebenso wie das schwefelsaure Quecksilberoxydul, *Hydrargyrum sulphuricum oxydulatum*, ausser *Curs.* Dasselbe gilt von verschiedenen Verbindungen des Quecksilberoxyds mit organischen und unorganischen Säuren, von denen z. B. das phosphorsaure Quecksilberoxyd bei syphilitischen Kindern Anwendung fand und in Phosphorsäure gelöst besonders von Buchholz empfohlen wurde, während essigsaures Quecksilberoxyd mit Manna den Hauptbestandtheil der Keyser'schen Pillen und weinsaures Quecksilberoxyd den des Liqueur de Pressavin (*Eau végétomercurielle*) bildete.

Zu erwähnen ist noch das Quecksilberoxydulnitrat (*Hydrargyronitrat*, *salpetersaures Quecksilberoxydul*), *Hydrargyrum nitricum oxydulatum*, welches grosse, farblose, monoklinische Krystalle bildet, die von wenig Wasser unzersetzt gelöst werden, während durch mehr Wasser Zersetzung in ein sich abscheidendes basisches Nitrat von gelbgrüner Farbe, das sog. *Turpethum nitrosum*, und in ein in Lösung bleibendes saures Nitrat eintritt. Eine Auflösung von 10% Quecksilberoxydulnitrat in salpetersäurehaltigem Wasser bildet den früher officinellen *Liquor Hydrargyri nitrici oxydulati*, welcher leicht Sauerstoff aufnimmt und zu einer Lösung von Quecksilberoxydnitrat wird, wie solche früher als *Liquor Bellostii*, nach Augustin Bellosti, einem Professor in Montpellier, benannt, als Aetzflüssigkeit sehr gebräuchlich war. In Contact mit Proteinverbindungen erzeugt Quecksilberoxydnitratlösung eine rothe Färbung, welche sich auch beim Befeuchten der Haut einstellt, jedoch durch Reduction zu Quecksilbermetall bald in Schwarz übergeht. Bei Aetzen mit Quecksilberoxydnitrat entsteht ein rothbrauner, über die gesunden Partien erhabener Aetzschorf. Nach Rabuteau soll bei Personen, welche Iodkalium genommen haben, sich die Oberfläche von Geschwüren, auf welche das Mittel applicirt wurde, in Folge der Bildung von *Mercurbiiodid* intensiv roth färben. Der *Liquor Bellostii* wurde früher als Aetzmittel bei vergifteten Wunden, Erosionen des Muttermundes, primären syphilitischen Geschwüren, Furunkeln, Carbunkeln, *Acne rosacea* (Startin), phagedänischen Geschwüren, Muttermalern, Carcinomen u. s. w. benutzt und dient in Frankreich noch neuerdings in Form einer Salbe (10 Tropfen auf 30,0 Ungt. flavum) gegen parasitäre Hautkrankheiten, *Prurigo* und rebellische Syphiliden, auch bei *Blepharitis ciliaris*. Die Salbe entspricht im Wesentlichen der früher bei uns in derselben Richtung und als reizende Verbandsalbe gebräuchlichen gelben Quecksilbersalbe, *Unguentum mercuriale citrinum* s. *Balsamum mercuriale*, (durch Mischen von 1 Th. Queck-



silber und 2 Th. Acidum nitricum mit 12 Th. Schweineschmalz erhalten, von Ceratconsistenz), deren ursprünglich gelbe Farbe allmählig unter Reduction des Quecksilbers grau wird. Die Anwendung dieser Salben darf nur in sehr kleinen Quantitäten (von Erbsen- bis Nussgrösse) geschehen, weil bei Benutzung grösserer Mengen zum Einreiben auf ausgedehntere Körperpartien wiederholt intensive Vergiftung mit dem Charakter der mercuriellen Intoxication (Vidal, Dubar) und selbst mit tödtlichem Ausgange vorgekommen ist. Auch die Aetzung des Collum uteri mit Bellostescher Flüssigkeit hat zu mercurieller Intoxication Veranlassung gegeben und ist bei längerer oder intensiverer Benutzung des Mittels jedenfalls die höchste Vorsicht zu empfehlen. In der Berliner Charité hat man den Liquor Hydrargyri nitrici oxydulati früher curmässig gegen Syphilis verworther, wenn andre Mercurialien nicht helfen wollten, indem man täglich  $\frac{1}{4}$  Stunde nach dem Abendessen 1 Tropfen mit destillirtem Wasser verdünnt, vom 4. Tage ab auch nach dem Frühstück dieselbe Dosis, dann am 7. Tage Abends und am 11. Morgens 1 Tropfen mehr reichte und alle 7 Tage bis zum 30. Tage die Dosis um 1 Tropfen erhöhte.

**Hydrargyrum oleinicum oxydatum; Quecksilberoxydoleat.** Diese durch Auflösen von frischgefalltem Quecksilberoxyd in heisser Oelsäure erhaltene Verbindung, von welcher sich Präparate von 5–10% Quecksilberoxydgehalt darstellen lassen, wird von John Marshall und Berkeley Hill an Stelle der grauen Salbe empfohlen. Da concentrirte Präparate bei empfindlichen Personen  $\frac{1}{2}$ –1stündige heftige brennende Schmerzen und selbst gelinde Blasenbildung bedingen, sind 5–10procentige Präparate zu benutzen, die man zu 1,0–2,0 8–10 Min. lang einreibt, wonach meist schon in 3–4 Tagen leichte Stomatitis eintritt. Besonders gerühmt wird das Mittel bei örtlicher Application auf papulöse oder maculöse Syphiliden, sowie bei Onychia. Zur Beseitigung der Schmerzen kann Morphin zu 2% hinzugesetzt werden. Landsberg empfiehlt eine Salbe aus 2 Th. 10% Mercurioleat und 1 Th. Vaseline an Stelle der rothen Präcipitatsalbe bei Augenaffectationen; De Young 5% Oleat bei Alopecia areata und Acne indurata. Subcutan ist es ohne Werth (Fürbringer).

**Hydrargyrum oxydatum chinicum, chinasaures Quecksilberoxyd,** ist von Lewin zu Subcutaninjection bei Syphilis versucht.

**Hydrargyrum oxydatum subsulfuricum; basisch schwefelsaures Quecksilberoxyd.** Diese als gelber Präcipitat, Mercurius praecipitatus flavus, oder als Turpethum minerale bezeichnete Verbindung ist von erheblicher Schärfe und macht schon zu 0,1–0,2 heftiges Erbrechen, weshalb man sie früher als Emeticum benutzte. Auch diente sie als Niesmittel und innerlich als Alterans zu 0,01–0,03 pro dosi. Cazenave gebrauchte sie in Salbenform mit Schwefel bei chronischem Ekzem.

**Hydrargyrum bromatum, Quecksilberbromür und Hydrargyrum bibromatum s. perbromatum s. bromatum solubile, Quecksilberbromid.** Beide Verbindungen sind weiss, das Quecksilberbromür in Wasser unlöslich und dem Calomel, das Quecksilberbromid schwer in Wasser, leicht in Alkohol und Aether löslich und dem Sublimat in seiner Wirkung gleichstehend. Nach Bellini entsteht aus Quecksilberbromür im Contact mit Salzsäure eine sehr geringe Menge einer löslichen Mercurverbindung, dagegen mit Chloralkalien und Milchsäure mehr lösliches Doppelsalz als beim Calomel und Quecksilberiodür, ebenso mit Alkalicarbonaten mehr als beim Quecksilberiodür, dem es sich in Berührung mit Leim gleich verhält. Quecksilberbromid giebt mit Chloralkalien und Chlorwasserstoffsäure mehr gelöstes Quecksilbersalz als Quecksilberiodid, mit Alkalicarbonaten und Eiweissstoffen dieselbe Menge. Bei Application auf Wunden oder Unterhautzellgewebe wirkt Quecksilberbromid stärker kaustisch als Iodid (Bellini). Das Quecksilberbromür wirkt zu 0,2–0,3 gelind purgirend und angeblich auch etwas diuretisch; Quecksilberbromid macht schon zu 0,2 bei Menschen heftige Gastroenteritis. Beide Präparate sind als Antisyphilitica namentlich in Frankreich benutzt; das Quecksilberbromid auch von Werneck in Pillen zu 0,002–0,004 pro dosi oder in ätherischer Lösung innerlich, ferner

von Prieger und Höring äusserlich und innerlich wie Sublimat bei Favus und andern Hautkrankheiten.

Chlorioduretum Hydrargyri, Ioduretum Mercurii chlorati, Hydrargyrum biiodatum cum Hydrargyro chlorato, Quecksilberchloriodür. Diese Verbindung hat in Frankreich, wo sie zunächst von Rochard bei Psoriasis und Acne als Iodure de chlorure mercurieux Empfehlung fand, sich bei manchen Aerzten als Alterans bei Secundärsyphilis, Scrophulose und Hautaffectionen Eingang zu verschaffen gewusst. Meist wird sie gleichzeitig äusserlich (in Salbenform) und innerlich in Pillen (wie Sublimat verordnet) angewendet. Rochards Salbe bestand aus 1 Th. Iod, 3 Th. Calomel und 50 bis 100 Th. Ung. simplex. Statt der auf diese Weise dargestellten, sehr inconstanten Verbindung haben Soubeiran und Planche eine constantere und krystallinische durch Einträufeln von Iodtinctur auf mit Wasser gekochtes Quecksilberchlorür erhalten, der kautische Wirkung zukommt.

Von geringer praktischer Bedeutung sind die von v. Mering wegen ihrer höchst unbedeutenden Irritation bei Subcutanapplication empfohlenen Verbindungen des Quecksilbers mit Amidosäuren, unter denen das Glykokollquecksilber in Bezug auf seine Indifferenz gegen Eiweiss das Alanin- und Asparaginquecksilber übertrifft. Ebenso ist der von Prümers aus gleichen Gründen empfohlene Aethylsublimat (Quecksilberaethylchlorid), Hydrargyrum bichloratum aethylatum, in welchem ein Atom Cl des Mercurchlorids durch Aethyl ersetzt ist, nicht in Aufnahme gekommen. Man kann letzteren, der in den Harn nicht als solcher übergeht, zu 0,005 pro dosi in wässriger Lösung (0,5—1:100) subcutan an Stelle des Sublimats verwenden.

Auch die sog. Sublimat-Alkaloide, welche durch Vermischung von Lösungen chlorwasserstoffsaurer Alkaloidsalze mit Quecksilberchlorid entstehen, z. B. das chlorwasserstoffsaurer Morphin-Quecksilberchlorid, Chloridum Hydrargyri et Morphini, von Hebra zu 0,005—0,02 bei Syphilitischen versucht, das entsprechende Chininsalz, von Hamilton bei Lupus, Ophthalmie und Syphiliden zu 0,003—0,006 benutzt, sowie das Nicotinsalz, nach Hebra bei Syphiliden zu 0,002—0,004 von raschem Erfolge, sind mehr eine therapeutische Spielerei.

Hydrargyrum sulfuratum nigrum, schwarzes Schwefelquecksilber; Hydrargyrum sulfuratum rubrum, Cinnabaris. — Zu den sehr entbehrlichen Quecksilberpräparaten gehört das Quecksilbersulfür, welches früher nicht nur als amorphes, schwarzes, sondern auch als krystallinisches, rothes Schwefelquecksilber officinell war. Das erstgenannte Präparat wegen seiner Farbe auch Aethiops mineralis oder Quecksilbermohr genannt, ein Gemenge von Quecksilbersulfür und Schwefel, ist wegen seiner Unlöslichkeit in Wasser und Chlorwasserstoffsäure als internes Medicament ganz irrelevant, und weder die älteren Empfehlungen der späteren Paracelsisten und ihrer Nachbeter bei Scrophulose, Crusta lactea, Anginen, noch die neueren von Cadet gegen Cholera (zu 0,5 bis 1,5 als Heilmittel oder zu 0,2 pro die als Prophylacticum) halten eine ernste Kritik aus; ebenso wenig die äusserliche Anwendung bei Typhus und Variola (Serre, Becquerel) oder bei Favus (Faivre). Dasselbe gilt auch von dem als Hydrargyrum stibiato-sulfuratum s. H. sulfurato-stibiatum s. Aethiops antimonialis bezeichneten Gemenge gleicher Theile von schwarzem Schwefelquecksilber und schwarzem Schwefelantimon, dessen Ruf bei Scrophulose, chronischen Hautausschlägen, Photophobie und Arthritis trotz P. Frank und Jüngken als verklungen zu betrachten ist. Die Dosis betrug 0,1—0,2.

Der Zinnober ist die scharlachrothe krystallinische Modification des schwarzen Schwefelquecksilbers, aus dem er, durch Sublimation oder auf nassem Wege durch Schütteln mit einer conc. Lösung von Fünffach-Schwefelkalium dargestellt (künstlicher Zinnober), erhalten werden kann, während er in der Natur nur unrein vorkommt. Er verhält sich Wasser und Säuren gegenüber wie Quecksilbermohr und geht deshalb bei interner Einverleibung mit den Faeces unverändert ab, ohne örtliche und entfernte Erscheinungen zu veranlassen. Die medicinische Ver-

wendung des Zinnobers beschränkt sich deshalb auch jetzt auf Fumigationen, welche man meist als örtliches Mittel bei syphilitischen Geschwüren der Haut, der Nase, des Mundes und des Rachens bis in die neuere Zeit hinein (Cullerier, Werneck, Ricord, Colles, Hawkins, Paschkis) empfohlen hat. Nach Paschkis (1878) sind die bei allgemeinen Zinnoberräucherungen befürchteten schweren Salivationen bei Reinhalten des Mundes u. s. w. keineswegs häufig; dagegen ist der Mund mittelst eines Schwammes vor Dämpfen der schwefeligen Säure zu schützen. Die Menge des zu einer Räucherung dienenden Zinnobers ist 5,0—15,0, die Dauer der Räucherung 10—25 Minuten. Die Wirksamkeit örtlicher Fumigationen, wobei die Dämpfe durch Röhren zu den betr. Theilen geleitet werden, lässt sich nicht in Abrede stellen. Dieffenbach empfahl die Dämpfe von Zinnobercigarren, jede 0,18—0,36 Zinnober enthaltend, bei Ozaena syphilitica durch die Nase streichen zu lassen; in Persien raucht man Zinnober und Arsenik mit Tabak bei Syphilis mit grossem Erfolge (Polack). Rockwell rühmte Zinnoberräucherungen bei Croup. Biett gab denselben mit Schwefel in Salbenform bei Syphiliden u. a. Hautausschlägen. Schuh tätowirte nach Cheiloplastik die Lippen mit Quecksilbersulfur.

**Auro-Natrium chloratum**, Aurum chloratum s. muriaticum natronatum, Aurum sesquichloratum natronatum; **Natriumgoldchlorid**, Chlorgoldnatrium.

Von den in früherer Zeit als mit ausserordentlicher Wirksamkeit begabt betrachteten Verbindungen des Goldes wird gegenwärtig ausschliesslich das in der Ueberschrift genannte Doppelsalz in Anwendung gezogen, indem es namentlich von französischen Aerzten gegen Syphilis und chronische Hautkrankheiten (Chrestien, Lallemand), neuerdings auch bei uns gegen Krankheiten des Uterus (Martini) verordnet wird.

Das Chlorgoldnatrium wird durch Auflösen von 65 Th. reinem Golde in 65 Th. Salpetersäure und 240 Th. Salzsäure, Verdünnen der Lösung mit 200 Th. Wasser, Zusatz von 100 Th. Natriumchlorid und Verdunsten zur Trockne dargestellt. Es bildet ein goldgelbes, an der Luft kaum feucht werdendes, in 25 Th. Wasser vollständig lösliches Pulver von unangenehm, metallischem, scharfem und styptischem Salzgeschmack. Das Präparat der Pharmakopoe entspricht nicht dem chemisch reinen krystallinischen Natriumgoldchlorid (Aurum muriaticum natronatum crystallisatum), sondern ist ein Gemenge, in welchem 30% Gold enthalten sind und das Kochsalz im Ueberschuss sich findet.

Die Goldsalze hatten ihre Blütheperiode zur Zeit der Alchymisten, welche in dem edelsten aller Metalle auch das vorzüglichste aller Medicamente sahen und nach einem flüssigen Präparate desselben, dem Aurum potabile, suchten, um dadurch Körper und Geist in ewiger Jugendfrische zu erhalten. Schon 1540 als Antisyphiliticum empfohlen, geriethen die Goldsalze später als Medicamente in Vergessenheit, bis sie neuerdings Gozzi und namentlich Chrestien aufs Neue anwandten. Ausser dem Natriumgoldchlorid, welches auch als Sal auri Figuieri bezeichnet wird, sind noch als Medicament das metallische Gold, Aurum praecipitatum s. metallicum purum, ferner das Goldoxyd, Aurum oxydatum, das Cyangold, Aurum cyanatum, das Iodgold, Aurum iodatum, der Goldsalmiak, Auro-Ammoniumchloratum, und das Knallgold, Aurum fulminans s. ammoniatum, endlich der Cassiussche Purpur oder das Goldstannat, Purpura mineralis Cassii, von Aerzten benutzt worden, ohne dass sich irgendwie eine Nothwendigkeit ergäbe, diese ohnehin durch einen theueren Preis sich in der Regel der Anwendung entziehenden Präparate bei Krankheiten zu gebrauchen. In Deutschland hat neuerdings wohl nur Becker in Mühlhausen sich des Goldes als Medicament bedient, doch sprechen seine Mittheilungen, namentlich in Bezug auf die Effecte des Goldes bei Geschwülsten und Neubildungen, keineswegs für die Goldtherapie. Verschiedene der benutzten Goldpräparate sind sogar wie das metallische Gold in den Magen- und Darmsäften vollständig unlöslich und somit unresorbirbar, obschon die Autoren, welche sie anwenden, danach entfernte Erscheinungen haben auftreten sehen wollen.



Das Natriumgoldchlorid entbehrt nicht vollständig der kaustischen Wirkung und unterscheidet sich dadurch von vielen andern Goldverbindungen, mit denen es die Eigenschaft, die Haut gelb und später violett oder schwärzlich (in Folge von Reduction) zu färben, sowie die entfernten Wirkungen theilt. Unter den letzteren ist der Ptyalismus bemerkenswerth, welcher von dem Quecksilberspeichelfluss sich durch viel späteres Auftreten und Mangel von Mund- und Zahnfleischentzündung unterscheiden soll.

Nach den Hauptanhängern der Goldtherapie sollen die Goldsalze in kleiner Dosis Appetit und Verdauung steigern, etwas stopfend wirken, alle Secretionen gleichzeitig vermehren und ausser Ptyalismus auch reichlichen Schweiß, besonders Nachts, und gesteigerte Diurese bewirken, bei Frauen die Menstruation, bei Männern den Geschlechtstrieb vermehren, ja bei letzteren sogar schmerzhaften Priapismus bedingen, auch die Gehirnthatigkeit im hohen Grade erregen. Nach 3—4 Wochen sollen Fieber, Kopfschmerz, Reizung des Magens und Darmcanals (Cullerier) und bei Kranken mit Knochen- oder Drüsenanschwellungen Entzündung in den kranken Theilen entstehen (Percy). Nach Martini können kleine Mengen Natriumgoldchlorid monatelang ohne Beschwerden ertragen werden; Ptyalismus von mehreren Wochen Dauer sah Martini erst nach dem Gebrauche von 10,0 (in Pillen mit Extractum Dulcam., worin das Salz zum grossen Theile reducirt ist). Thierversuche über die Wirkung kleiner Dosen liegen nur in sehr beschränkter Zahl von Rabuteau vor, wonach bei Ratten nach etwa 1,0 Goldchlorid (allmählig mit dem Futter beigebracht) der Tod in etwa 14 Tagen erfolgt, nachdem Appetitverminderung und in der Mitte des Experiments convulsivische Zuckungen eingetreten; beim Sectionsbefund ist die Gelbfärbung der Magen- und Dünndarmschleimhaut, die stärkere Contourirung der Epithelien und die Grünfärbung der Axencylinder, welche Rabuteau von Reduction des resorbirten Goldpräparates herleitet, bemerkenswerth.

Grössere Dosen des Natriumgoldchlorids können Gastritis bedingen und vielleicht den Tod zur Folge haben. Die Beobachtungen über Vergiftung durch Goldpräparate beziehen sich indess meist auf Goldchlorid oder Knaalgold, welche zu 0,04—0,06 Leibweh, Durchfall, Ohnmachten und Krämpfe mit nachfolgendem Tode, im Zusammenhange mit Perforation des Magens, bedingt haben sollen.

Dass das Goldsalz bei interner Application (wahrscheinlich als Albuminat) resorbirt wird, machen nicht allein die durch dasselbe bedingten entfernten Erscheinungen, sondern auch der directe Nachweis von Gold im Urin nach dem Gebrauche von Goldchlorid (Orfila) zweifellos. Die Ausscheidung ist vermuthlich eben wie beim Silber eine sehr langsame, indem die eben erwähnten Versuche von Rabuteau eine Reduction in den Geweben wahrscheinlich machen, ein Umstand, welchen Rabuteau benutzt, um überhaupt gegen die therapeutische Anwendung der Goldpräparate zu polemisiren, da dieselben im Gegensatze zu den relativ leicht eliminirten Quecksilbersalzen wohl niemals wieder aus dem Körper verschwänden.

Ausser den oben genannten Affectionen sind die Goldpräparate noch bei einer Menge anderer Krankheiten innerlich benutzt, so gegen Mercurialdyskrasie, Scrophulose, Drüsenanschwellungen, Krebs, Hydrops, Chlorose, Indigestion, Rheumatismus, Cholera, Phthisis und verschiedene Nervenleiden, wo indessen ein Erfolg fast nirgends sich herausstellt. Selbst bei Syphilis ist es ohne sicheren Nutzen und kann sogar die primären Affectionen steigern (Trousseau und Pidoux). Krebse und andere Geschwülste können unter dem Gebrauche des Goldes schmerzhaft werden und ulceriren (Percy, Becker).

Das Auro-Natrium chloratum wird in der Regel zu 0,003—0,006 1—2mal täglich verordnet. Als höchste Einzelgabe lässt die Pharmacopoe 0,05, als höchste Tagesgabe 0,2 zu.

Bei der leichten Reduction von Goldsalzen im Contact mit organischen Substanzen ist jeder Zusatz von letzteren zu meiden, weshalb die Darreichung in Pulverform (mit Zucker) oder in Pillen mit Pflanzenextracten unzweckmässig erscheint. Auch die in Frankreich übliche Form der Pastillen mit Chocolate schützt nicht vollständig vor Reduction. Am rationellsten ist die Auflösung in destillirtem Wasser (1:250) ohne weiteren Zusatz, welche in einem schwarzen Glase verordnet werden muss. Die ersten Empfehler des Goldsalzes liessen dasselbe in die Zunge und in das Zahnfleisch einreiben, wobei indessen sehr

leicht eine Schwarzfärbung der Zähne entsteht. Bei dieser obsoleten Verabreichungsweise ist die Benutzung von Veilchenwurzpulver, Stärkemehl oder von Kohle selbstverständlich von reducirender Wirkung, nichtsdestoweniger aber beizubehalten, weil sonst leicht zu starke chemische Alteration der Mundschleimhaut entstehen könnte.

Häufig wird in unsern Officinen das Natriumgoldchlorid statt des bei den Aetzmitteln erwähnten Goldchlorids, welches sich jedoch durch stärkere Kausticität auszeichnen, abgegeben.

**Anhang: Platinsalze.** Wie das Chlorgoldnatrium ist auch die entsprechende Verbindung des Platins, Platino-Natrium chloratum, Natrium-platinchlorid, sowie das Platinchlorid, Platinum chloratum, gegen Syphilis (Jung, Höfer, Cullerier), Epilepsie (Prevost) und Skirrhen (Duttenhofer) in Anwendung gezogen. Letzteres wirkt weit intensiver ätzend als die entsprechende Goldverbindung und erzeugt einen stark in die Tiefe dringenden, bei Anwendung von 2,0 in 6—8 Stunden 2—3 Cm. dicken Schorf, dessen tiefere Schichten fettig entartet erscheinen, mit intensiver Injection und selbst Extravasation in der nächsten Umgebung, so dass das Platinchlorid dem Sublimat in seiner Wirkung nahe kommt (Bryk). Länger fortgesetzte kleine Gaben sollen ähnlichen Speichelfluss bedingen wie Goldsalze. Nach Kebler (1871) wirkt Natriumplatinchlorid bei Thieren ebenso giftig wie Arsenik, lähmt bei Fröschen die Centren der Willkürbewegung bei gleichzeitiger Reizung der Krampfcentren und Herabsetzung der Erregbarkeit der willkürlichen Muskeln (nicht des Herzmuskels) und erzeugt bei Warmblüthern Erbrechen, einfache und blutige Durchfälle, Hyperämie der Abdominalorgane, Ecchymosen der Magen- und Darm-schleimhaut sowie der Blase neben cerebraler Depression (Apathie), welche Erscheinungen zum grössten Theile von peripherer Lähmung der Gefässe abgeleitet werden sollen. Höfer benutzte Platinchlorid gegen Syphilis innerlich in wässriger Lösung (0,025 in 180,0 Wasser gelöst pro die) oder in Pillen (zu 0,025—0,05 pro die), das Platindoppelsalz bei Gonorrhoe zu Injectionen (1:125). Fricke stellt jedwede Wirkung der Platinsalze auf syphilitische und venerische Affectionen, Afterproductionen und Degenerationen in Abrede.

**Iodum, Iod. Kalium iodatum, Kali hydroiodicum, Ioduretum kalicum, Potassii Iodidum; Kallumiodid, Iodkalium.**

Der Häufigkeit ihrer Anwendung nach nehmen unter den Antidyscratica nächst den Mercurialien die Iodverbindungen, und unter diesen Iod und Iodkalium, die erste Stelle ein. Wir handeln die beiden Präparate als Repräsentanten der Iodverbindungen gemeinsam ab, weil sie sehr häufig gleichzeitig zur Verwendung gezogen werden und weil sie bezüglich ihrer Wirkung auf den Körper im Wesentlichen übereinstimmen. Sie unterscheiden sich nur dadurch, dass das Iod ähnlich wie Chlor und Brom eine auf Affinität zum Wasserstoff und Bildung von Iodwasserstoffsäure beruhende örtliche kaustische Wirkung hat, welche dem Iodkalium, das sich zur Haut und Schleimhaut ähnlich dem Chlornatrium verhält und in Substanz oder conc. Lösung entzündungserregend wirkt, fehlt, und dass bei sehr grosser Gabe das Iodkalium auch die den Kaliverbindungen zukommende Wirkung auf Muskeln und Herz entfaltet.

Das Iod ist das 1812 von Courtois in der Asche der Seepflanzen entdeckte, zur Gruppe der Halogene gehörige Element, welches, an Alkali- und Erdmetalle gebunden, sich vor Allem im Meerwasser und, daraus abstammend, in Seepflanzen und Seethieren findet, ausserdem in denselben Verbindungen auch

in manchem Steinsalz, den meisten Salzsoolen und Mineralwässern, auch in Folge der Nahrung spurweise im Thierkörper (Rabuteau), nirgends aber frei, vorkommt. Es bildet undurchsichtige, schwarzgraue, metallglänzende, trockne und zerreibliche, krystallinische Tafeln oder Blättchen, welche das spec. Gew. 4.948 besitzen, unangenehm chlorähnlich riechen und scharf schmecken. Es löst sich in etwa 4000 Th. Wasser und in 10 Th. Alkohol mit rothbrauner Farbe, leicht in Glycerin, sehr leicht in Aether (mit brauner Farbe), Chloroform, Benzol und Schwefelkohlenstoff (mit röthlich violetter Farbe). Es verdunstet schon bei gewöhnlicher Temperatur sehr lebhaft, schmilzt bei  $107^{\circ}$  und siedet bei  $186^{\circ}$ ; sein Dampf ist veilchenblau. Die tiefblaue Färbung, welche Stärkemehl durch Iod annimmt, ist die empfindlichste Reaction desselben. Das Iod wird besonders in Schottland und Irland fabrikmässig in sehr grossen Mengen dargestellt, doch ist dies — bis zu 7% Wasser enthaltende — Englische oder unreine Iod nicht das officinelle, sondern das resublimirte oder Französische Iod, Iodum Gallicum s. bis sublimatum, welches nicht an den Wänden des Aufbewahrungsgefässes haftet.

Das Kaliumiodid, welches als solches im Meerwasser und in Mineralquellen, sowie in der Asche von Seepflanzen sich findet, bildet farblose, an trockner Luft nicht feucht werdende, kubische Krystalle von scharfsalzigem, bitterlichem Geschmack, welche mit 0,75 Th. Wasser und mit 12 Th. Spiritus eine neutrale oder doch kaum alkalische Lösung geben. Feuchte Iodkaliumkrystalle werden allmählig an der Luft durch die Kohlensäure zersetzt unter Bildung von Iodwasserstoff, welcher sich mit dem Sauerstoff der atmosphärischen Luft in Iod und Wasser umsetzt.

Lösungen von Iodkalium vermögen eine grosse Menge Iod aufzulösen, wobei sich eine dunkelbraune Flüssigkeit bildet, welche wahrscheinlich ein Kaliumpolyiodid enthält. Solche Lösungen, welche zuerst von Lugol medicinische Verwendung fanden, werden als Lugolsche Lösung, auch als Ioduretum Kalii iodati s. Superiodetum Kalii bezeichnet.

Die örtlichen Effecte des Iods bei Application auf die äussere Haut haben etwas Charakteristisches durch die gelbe und bei intensiverer und wiederholter Einwirkung kastanienbraune Färbung, welche die Epidermis dadurch annimmt und bis zu der in der Regel bald erfolgenden Abstossung beibehält. Die fragliche Färbung lässt sich durch Ammoniak beseitigen.

Die gelbe Färbung tritt auch bei Application von Iodwasserstoffsäure hervor. Im Allgemeinen muss die örtliche Wirkung des Iods als wenig in die Tiefe gehend und gewissermaassen an der Grenze zwischen erethistischer und kaustischer Action stehend bezeichnet werden. Bringt man Iod in Substanz auf die äussere Haut, indem man gleichzeitig dessen Verdunstung nach aussen hindert, so ist das Resultat die Bildung mehrerer kleiner oder einer grösseren Blase mit theilweise geronnenem, theils flüssigem und rothe und weisse Blutkörperchen enthaltendem Exsudate und dunkelbraun gefärbter Oberfläche; die Wirkung ist in einigen Stunden beendet und nicht ohne Schmerzen. Werden diluirte Iodlösungen, z. B. Iodtinctur, auf die äussere Haut eingerieben, so bedingt die erste Application keinerlei schmerzhaftes Empfindung; bei wiederholter Bestreichung derselben Stelle entwickelt sich bei intensiverer Bräunung sehr starke Empfindlichkeit, Prickeln, Stechen und Hitze; dabei wird die Oberhaut pergamentartig und spröde und stösst sich allmählig, oft in grösseren Lamellen, ab. Auch Ioddämpfe wirken gelbfärbend und irritirend auf die Haut und erzeugen selbst kurzdauerndes Erythem und papulösen Ausschlag.

Die örtlichen Wirkungen des Iods stehen offenbar im Zusammenhange mit dessen Verhalten zu den Eiweissstoffen. Ob ein Albumiodat von constanter Zusammensetzung existirt, ist freilich zweifelhaft, da die Bildung des Iods durch Eiweiss, wie solche sich sofort dadurch zu erkennen giebt, dass beim Eintropfen von Iodsolutionen in Eiweisslösungen die gelbe oder braune Farbe beim Schütteln verschwindet, eine sehr lockere ist und sowohl durch Coagulation als durch Dialyse aufgehoben wird. Man kann dem geronnenen Iodalbumin durch Kochen mit Alkohol und fortgesetztes Auswaschen sämmtliches Iod wieder entziehen.



Mit Iod behandelte Albuminlösung reagirt alkalisch und dialysirt, ein Verhalten, welches das Vorhandensein einer oder mehrerer wirklicher Verbindungen von Iod mit Eiweiss darthut, und die Annahme, dass das Iod von dem Alkali des Eiweiss gebunden sei, oder dass Iodwasserstoffsäure entstehe, als irrig erscheinen lässt, indem Iod, zu neutralisirten Eiweisslösungen gesetzt, dieselben sofort coagulirt und Iodwasserstoffsäure dem Eiweiss sofort saure Reaction ertheilt (Böhm und Berg). Auch Leim ist im Stande, beträchtliche Mengen Iod zu binden, ebenso Lösung von krystallisirtem Hämoglobin, wobei die gebildete Verbindung das Verhalten des Oxyhämoglobins beibehält, dagegen keine Iodreaction zeigt (Böhm).

Aehnliche Verfärbung kommt auch bei Application auf Schleimhäute vor — ebenso wie auf Wunden und Geschwürsflächen —, während nur bei Contact mit Iod in Substanz und sehr conc. Lösungen wirkliche Corrosion, durch grössere Mengen diluirter Lösung dagegen Entzündung hervorgerufen wird.

Auf Wunden und Geschwüren bildet sich bei Application von Iodtinctur eine schützende Decke durch Coagulation der Eiweissstoffe der Secrete, welche theilweise wohl vom Alkohol herrührt. Bei Einführung per os tritt nach Versuchen von Joerg u. A. beim Menschen nach kleinen Dosen (0,05—0,1) ausser scharfem Geschmacke und Kratzen im Halse höchstens etwas Uebelkeit ein, bei grösseren (0,2) Erbrechen und leichtes Gefühl von Oppression, nach weiterer Dosensteigerung (0,3) Durchfall, Kolik, Durst, Salivation, Steigerung der Pulsfrequenz und Gefühl von Hitze im Kopfe. Bei acuten Vergiftungen mit grösseren Mengen Iod in Form der Iodtinctur zeigt sich das bekannte Bild der Gastroenteritis toxica neben Schwindel, Kopfschmerzen, heftiger Agitation und bisweilen Convulsionen; charakteristisch ist die braungelbe oder bei Gegenwart von stärkemehlhaltigen Nahrungsmitteln blaue Färbung des Erbrochenen. Bei Thieren, welche mit conc. Iodlösungen vergiftet wurden, finden sich Geschwüre im Magen und Dickdarm mit gelbbraunen Rändern. Als Gegengift des Iods ist Abkochung von Stärkemehl, auch Eiweiss brauchbar.

Auch Ioddämpfe bewirken Entzündung der Schleimhäute, mit denen sie in Contact kommen, so Conjunctivitis mit starker Thränenabsonderung. Bei Einathmung erfolgt selbst bei starker Verdünnung leicht Niesen, Hustenreiz, Schnupfen und Bronchialkatarrh; concentrirtere Dämpfe können Brustschmerzen, Athemnoth, selbst Betäubung und eine Art von rauschähnlichen Zufällen (vielleicht in Folge insufficierter Blutlüftung) bedingen.

Die dem Kaliumiodid von Einzelnen zugeschriebene corrosive oder heftig entzündende Wirkung auf Schleimhäute ist irrig und beruht zum Theil auf Verunreinigungen des käuflichen Salzes.

Reines Kaliumiodid wirkt durchaus dem Kaliumchlorid analog und tödtet, wie dieses, Kaninchen zu 2,0—8,0 intern, während es bei Hunden in dieser Dosis nur Erbrechen bedingt; der Tod ist hier nicht die Folge örtlicher Verätzung, sondern der auf Herz und verlängertes Mark gerichteten Kaliwirkung. Die von Devergie als Befund der Iodkaliumvergiftung bei Thieren bezeichneten Echyosen und Erweichungen sind vielleicht Folge von Beimengung von iod-saurem Kalium (Melsens, Mialhe). Während Kaliumiodid und Kaliumiodat allein bei Einführung in den Magen nur als Kalisalze wirken, ruft die gemeinsame Einführung beider in sonst nicht toxischen Mengen in weniger als  $\frac{1}{4}$  Stunde die Erscheinungen der Gastroenteritis ex iodio hervor, und zwar mit Blaufärbung des Mageninhalt, weil Salzsäure nicht aus jedem einzelnen dieser Salze für sich, wohl aber aus einem Gemenge beider Iod frei macht, welches in statu nascendi kaustisch und irritirend wirkt (Rabuteau). In gleicher Weise entstehen heftige Zufälle, wenn Kaliumiodid gleichzeitig mit chloresäurem Kalium in den Magen gebracht wird, indem Kaliumiodat sich bildet, welches unter dem Einflusse der freien Säure des Magens beträchtliche Mengen Iod frei macht (H. Köhler). Im Gegensatz hierzu scheint mit Kaliumcarbonat vermischtes

Iodid leichter als reines Iodkalium von Hunden tolerirt zu werden (Rozsahegyi).

Iod wird sowohl von der äusseren Haut (vermöge seiner leichten Verflüchtigung) als von den serösen und Schleimhäuten resorbirt. Iodkalium wird bei Application in Lösungen oder in Salbenform von der äusseren Haut nicht resorbirt, dagegen kann daraus durch die Säuren des Schweißes namentlich in der Achselhöhle (Caracciola) oder aus Lösungen durch Dissociation Iod frei werden, dessen Aufsaugung durch die Haut Nichts im Wege steht. Von serösen Häuten, Schleimhäuten und vom Unterhautbindegewebe aus wird Iodkalium rascher als Iod resorbirt (Rozsahegyi).

Die positiven Angaben über die Resorption des Iodkaliums in Bädern (Mor. Rosenthal) beweisen natürlich niemals die Resorption desselben als solches durch die unversehrte Haut; bei sorgfältiger Ausschlüssung aller Fehlerquellen, namentlich auch der Einathmung von Dämpfen, sind die Resultate in der Regel negativ (Braune, Parriset und Melsens). Das Auftreten von Albuminurie nach Bepinseln mit Iodtinctur, wie dies nicht nur bei Bepinselung der Kopfhaut mit Ekzem behafteter Kinder (Simon), sondern auch bei intacter Epidermis und selbst bei Erwachsenen (Jacubasch, Zesas) vorkommt, beweist den Uebergang des Iods von der Epidermis aus, der übrigens auch durch directe Versuche von Rozsahegyi (1878) erwiesen wird, nach denen bei Application von Iodtinctur schon in  $2\frac{1}{2}$  Stdn. Iod im Harn auftrat, während nach Iodglycerin die Aufnahme in geringerem Maasse erfolgt. Ferrand will Iodvergiftung durch Tragen in Iodkaliumlösung getauchter und getrockneter Hemden beobachtet, Röhrig Uebergang von Iodkalium nach Application verstäubter Lösung auf die Haut beobachtet haben. Auf die Haut gestreutes Iodkalium oder auf derselben eingetrocknete Lösung wird allmähig partiell zersetzt, wobei Iod frei und resorbirt wird (Roussin). Vom Mastdarm aus erfolgt die Resorption (und Elimination) ebenso rasch wie vom Magen aus (M. Rosenthal, Welander), desgleichen von der Respirationsschleimhaut (Demarquay), Vaginalschleimhaut (Hamburger) und vom Collum uteri aus (Breisky), dagegen nur unsicher von der Blaseschleimhaut.

Im Blute scheint das resorbirte Iod als Iodnatrium zu existiren und als solches scheint es auch in den Harn überzutreten (Bachrach). Die Elimination findet bei Application auf die Magenschleimhaut im Urin, Speichel und Milch, in der Galle (nach vielfachen Versuchen an Menschen und Thieren), in den Thränen, im Nasenschleim und im Bronchialschleim, bei nicht interner Application auch auf der Magen- und Darmschleimhaut (Melsens, Rozsahegyi) statt, beginnt sehr rasch und ist je nach der Dosis und anderen Verhältnissen in verschiedenen, jedoch im Allgemeinen kurzen Fristen beendet.

Der von Einzelnen behauptete Uebergang in den Schweiß wird von Bergeron und Lemattre und neuerdings von Rozsahegyi bestritten, dagegen findet bei interner Einführung von Iod Ausscheidung durch die Froshaut statt. Die Elimination erfolgt in der ganzen Länge der Schleimhaut des Darmtractus, am meisten jedoch im Magen. Nach Kletzinsky erscheint bei andauerndem Iodkaliumgebrauche regelmässig  $\frac{2}{3}$  der eingeführten Iodosis im Urin, die Mehrausscheidung von Kali in letzterem bleibt anfangs hinter dem Aequivalente der Iodausscheidung zurück und erreicht erst später die Höhe der letzteren, was auf eine Spaltung im Blute hindeuten würde. Schauenstein und Späth fanden Iodkalium bei Schwängern sogar im Fruchtwasser und im Meconium des neugeborenen Kindes wieder. Unter gewöhnlichen Verhältnissen scheint am meisten Iod durch den Harn, am wenigsten durch den Darm aus-

geschieden zu werden. Bei Einspritzung von Lugolscher Solution in Ovarien-cysten erfolgt die Ausscheidung des Iods vorzugsweise durch den Magen und erst in zweiter Linie durch den Harn. Im Sperma scheint Iod sich nicht wieder zu finden (Rabuteau), wohl aber im Menstrualblute (Rozsahegyi).

Die Elimination beginnt in der Regel 10—15 Minuten nach interner Einführung in Harn und Speichel. Nach den Versuchen von Rozsahegyi erscheint das Iod am raschesten (schon nach 4 Minuten) bei Infusion in die Venen, dann bei Resorption vom Magen, Mastdarm, serösen Häuten und der Hautdecke, am spätesten nach Application auf Wundflächen; Iodalkalien erscheinen, von der Application auf die Haut abgesehen, rascher als in Substanz applicirtes Iod. Selbst bei grossen Dosen (1,0—10,0 Iodkalium) ist die Elimination in 6 Tagen vollendet, und der grösste Theil der eingeführten Iodverbindung verlässt in den ersten 24 Stunden den Körper wieder (Bernatzik, Cl. Bernard, Rabuteau). Rozsahegyi fand Iod auch im Blute, auf serösen Häuten, in Milz, Lungen, Kammerwasser und Glaskörper. In Bezug auf die Aufnahme des Iods in den einzelnen Organen constatirte Heubel (1866), dass Speicheldrüsen und Nieren am meisten, Pankreas und Gehirn am wenigsten aufnehmen. Adamkiewicz wies Iod im Inhalte der Talgdrüsen bei Iodakne nach, Buchanan in der Hydrocele und in der Synovialflüssigkeit bei Gelenkwassersucht, Bernatzik fand es im pleuritischen Exsudate wieder. Rozsahegyi konnte es selbst bei längerer Darreichung im Eiter eines Abscesses nicht nachweisen. Der zuerst von Wöhler constatirte Uebergang in die Milch ist mitunter so bedeutend, dass der Nachweis auch im Harn des Säuglings möglich ist; ja bei grossen Dosen kann es bei letzteren durch den Genuss der iodhaltigen Muttermilch zu Iodschnupfen und Iodexanthem führen. Den raschesten Nachweis von Iod im Harn führte Purkyne bei einem mit Blasenekstrophie behafteten Manne, wo die Iodreaction nach 0,6 Iodkalium in 3 Minuten gelang. Demarquay konnte bei Application von Iodkalium auf die Mastdarmschleimhaut Iod in 2—4 Minuten im Harn nachweisen, ebenso in 5—6 Min. nach Inhalation zerstäubter Lösung. Vorhandene Albuminurie stört den Uebergang in den Harn (Rozsahegyi). Vorhandene Diarrhoe steigert die Iodabgabe im Darne (M. Rosenthal). Bei Fiebernden erfolgt die Ausscheidung im Harn constant etwas später als bei Nichtfiebernden (Bachrach, Schulze).

In Bezug auf das Verhalten des Iods im Harn ist hier die merkwürdige Thatsache zu erwähnen, dass Harnsäure und harnsaure Salze grosse Mengen Iod zu binden im Stande sind, wodurch bei Zusatz von Iodtinctur zum Harn die dadurch bedingte Färbung völlig verschwindet, ein Verhalten, welches weder dem Harnstoff noch anderen Harnbestandtheilen zukommt.

Nach der Einführung einer einmaligen grossen Dosis oder wiederholter kleiner Gaben treten eine Reihe entfernter Erscheinungen auf, welche man meist im Gegensatz zu der als Iodismus acutus bezeichneten Gastroenteritis durch das Verschlucken von Iodtinctur als chronische Iodvergiftung, Iodismus chronicus, bezeichnet hat und welche man theils als Folge der eingeführten Kaliverbindung, theils als solche der Ausscheidung des Iodkaliums an verschiedenen Stellen des Körpers und der daselbst vor sich gehenden Freimachung von Iod betrachtet. Zu ersteren gehören namentlich Veränderungen der Circulation, zu letzteren Alterationen der verschiedensten Schleimhäute, insbesondere der Respirationsschleimhaut, und wahrscheinlich auch die durch Iodkaliumgebrauch bedingten Exantheme.

Von besonderem Interesse ist die sehr genau von E. Rose (1868) beschriebene Symptomatologie durch Einspritzung grosser Gaben Lugolscher Solution in Ovarien-cysten. Nach Roses Beobachtungen sind bei Vergiftungen mit diesem Präparate, aus welchem offenbar viel leichter als aus dem Kaliumiodid Abspaltung freien Iods erfolgt, das aber der Menge des darin enthaltenen Iodkaliums nach auch Kaliumwirkung auszuüben vermag, der Puls frequenter,



die Arterien klein, hart und endlich unfühlbar, der Herzschlag irregulär und aussetzend; dazu kommt allgemeine Eiseskälte, Blässe der Haut, Cyanose des Gesichts und der unteren Extremitäten. Ein eigentliches Iodfieber, wie es ältere Beobachter als Symptom des chronischen Iodismus anführen, existirt bei der acuten Vergiftung durch Kaliumpolyiodid nicht; eigentliche Temperaturerhöhung kommt dabei nicht vor, ist übrigens auch bei den früher beschriebenen Fällen von chronischer Iodvergiftung (Fonssagrives, Champouillon) nicht constatirt. Als Eliminationswirkung erscheint in den Beobachtungen von Rose vorzugsweise heftiges Erbrechen, indem in dem Erbrochenen von dem in der Ovariencyste retinirten Iod über die Hälfte sich wiederfand, und zwar in den ersten Tagen auch freies Iod. Der Iodgehalt des Erbrochenen nimmt in tödtlich verlaufenden Fällen bis zum Ende zu, während der Iodgehalt im Harn sich verringert. Das Erbrochene charakterisirt sich durch den Gehalt von ganzen Haufen von Labdrüsenklumpen, die oft bis zu ihrem Grunde abgestossen werden, wodurch natürlich anhaltende Verdauungsstörung und Appetitlosigkeit resultirt, welche den Tod durch Inanition zur Folge haben kann. Diese Gastritis ex iodio findet sich weder bei acuter Vergiftung mit Natriumpolyiodid an Thieren (Böhm und Berg), noch bei Menschen bei längerem innerem Gebrauche von Iodkalium, obschon hier nach einiger Zeit in der Regel Verschlechterung des Appetits eintritt und nach den neuesten Versuchen von Böhm eigenthümliche circumscripate Atrophien der Drüsenpartie der Magenschleimhaut bei fortdauernder Einführung von Iodpräparaten bei Thieren resultirt.

Dass auch bei der Wirkung des Iodkaliums in grossen Dosen der Iodcomponent eine Rolle spielt, beweist die Giftigkeit des Iodnatriums, welches nach Böhm und Berg (1876) zu 0,7—0,8 per Kilo in die Venen von Hunden injicirt Tod in 12—36 Stunden bedingt, während 2,0 Chlornatrium per Kilo gar keine Erscheinungen macht. Dieselben Erscheinungen wie Iodnatrium (Erbrechen, zunehmende Mattigkeit und Schwäche, Lungenödem und Hydrothorax) bedingt auch Natriumpolyiodid bei Infusion, wenn die injicirte Menge nicht mehr als 0,4 Iod per Kilo enthält; doch treten nach letzterem auch starkblutige Färbung der bei Vergiftung mit Iodnatrium hellgelben und klaren pleuritischen Ausschwitzungen u. Nierenblutungen auf, welche vorzugsweise die Marktheile betreffen, während die Epithelien intact und die Kapselräume der Glomeruli frei bleiben. Der von Rose als eigenthümliche Iodwirkung bezeichnete Gefässkrampf tritt weder nach Iodnatrium noch nach Natriumpolyiodid zu Tage, welche bei Infusion Verminderung des Blutdrucks nicht erzeugen (Böhm und Berg). Nach Rozsahegyí (1878) erhöht reines Iod bei Einspritzung in Venen den arteriellen Blutdruck durch Reizung des Herzmuskels zu frequenteren und oberflächlichen Contractionen, während Iodkalium in kleinen Gaben vorübergehende Pulsbeschleunigung mit folgender Verlangsamung unter Sinken des Blutdrucks und Erhöhen der Pulswelle bedingt und Iodnatrium in kleinen Dosen Verminderung der Pulsfrequenz, in grossen Steigerung derselben neben Erhöhung des Blutdrucks und der Blutwelle erzeugt. Nach Bogolepoff (1876) bedingt Iodkalium rasch eintretende Dilatation der peripherischen Gefässe und in Folge davon in mittleren Dosen Abnahme des Drucks und Steigerung der Pulsfrequenz, der Temperatur (oft um einige Grad) und der Secretion (Speichelfluss), bei wiederholten grösseren Dosen Lähmung des Herzens durch übermässige Anstrengung, bei colossalen Dosen Sinken des Pulses und des Druckes bis zum Tode. Nach H. Köhler (1877) besitzt Iodkalium in kleinen und grossen Dosen nur die Wirkungen der Kalisalze auf Kreislauf und Athmung und bedingt namentlich der letzte einen eigenthümlichen Scheintod, in welchem das Herz zwar vor der Respiration zu schlagen aufhört, jedoch durch künstliche Athmung wieder in Gang gebracht werden kann. Im Gegensatz hierzu beeinflusst weder Iodnatrium noch Natriumpolyiodid Kreislauf und Athmung, vorausgesetzt, dass nicht Pneumonie eintritt, während Iodammonium Pulsretardation, Blutdrucksteigerung, Athembeschleunigung, Gefässkrampf und bei grösseren Dosen Convulsionen bewirkt.

Unter den Erscheinungen der chronischen Iodvergiftung tritt als eins der ersten Symptome der sog. Iodschnupfen, Coryza ex iodio, auf, mit welchem meistens auch Röthung u. Anschwellung des Gesichtes u. der Augenlider, Thränenfluss und Schmerz in den Stirnhöhlen, auch ein geringer Grad von Angina sich verbinden. Nicht selten kommt es auch zu Katarrh der Bronchien, Schmerzen

in der Brust und Hustenreiz, in einzelnen Fällen selbst zu Aphonie oder zu Bronchopneumonie und Pleuritis, die sogar den Tod zur Folge haben können. Die von Einzelnen beobachteten asthmatischen Beschwerden, welche bisweilen Nachts exacerbiren sollen (Nélaton, Santtus), sind wohl nicht als nervöse Symptome, sondern als Folge der Schleimhautanschwellung zu betrachten. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Iodschnupfen eine Folge der Ausscheidungswirkung ist, indem auf den fraglichen Schleimhäuten Freiwerden von Jod, sei es durch die ausgeathmete Kohlensäure (Kämmerer) oder des salpetrigsauren Ammoniaks (Adamkiewicz) stattfindet.

Unter den Erscheinungen des chronischen Iodismus ist nächst dem Iodschnupfen das Iodexanthem die häufigste. Richtiger redet man freilich von Iodexanthemen, denn es giebt sehr verschiedene, in ihrer Genese offenbar verschiedene Formen. Eine häufige Form ist die Iodakne, welche offenbar mit der Ausscheidung der Iodverbindungen durch die Hautdrüsen zusammenhängt, in denen Adamkiewicz Iod nachwies. Fast ebenso häufig ist die Iodroseola; mitunter kommt es zu einer wirklichen Purpura, welche sehr lebhaft an die Extravasationen erinnert, die man bei Vergiftung mit Lugolscher Lösung im Binde- und Fettgewebe, oftmals von blutig-seröser Infiltration begleitet, constatirte (E. Rose). Dass das Iod hierbei als solches im Spiele ist, beweist der Umstand, dass die Exanthema, und insbesondere die Purpura, auch nach Iod selbst (Chaeteris) u. a. Iodverbindungen, und am raschesten und häufigsten nach solchen Präparaten auftreten, aus denen Iod am leichtesten in Freiheit gesetzt wird (Iodammonium). Thin wies bei verschiedenen dieser Affectionen circumscripte Gefässerkrankung nach. Mit den sog. idiosyncratischen Arzneiexanthemen haben diese Exantheme offenbar nichts zu thun, obschon allerdings einzelne Individuen dazu prädisponirt sind.

Von sonstigen Symptomen des chronischen Iodismus wird Speichelfluss aufgeführt, dem man eine besondere Gutartigkeit zuschreibt. Jedenfalls ist derselbe eine seltene Erscheinung, in der Regel findet sich Trockenheit im Munde und Schlunde und bei der subcutanen Intoxication mit Lugolscher Lösung fand E. Rose sogar Unterdrückung der Speichelsecretion mit Anschwellung der Parotiden. Von anderen Secretionen wird die Milchsecretion entschieden durch Iodkalium in grösseren Gaben gemindert; die Menstruation scheint eine Vermehrung zu erfahren. Rose beobachtete bei Vergiftung mit Lugolscher Lösung Bersten eines Graafschen Follikels und verfrühte Menstruation. Der Einfluss auf die Harnabscheidung und die Gallensecretion ist nicht ausgesprochen, doch kommen bei acuter Intoxication Hämorrhagien in den Nieren vor (Böhm und Berg). In den Fällen von Rose fand sich keine Nierenentzündung, doch war die Menge des eigenthümlichen braun gefärbten und eiweisshaltigen Urins selbst bei der ungemein gesteigerten Zufuhr von Wasser stark verringert. Mitunter kommt es zu Diarrhöen, doch treten diese selbst bei acuter Vergiftung mit Lugolscher Lösung erst sehr spät ein, so dass sie bei dem sehr geringen Iodgehalte der Entleerungen wohl kaum als Eliminationswirkung aufzufassen sind.

Die früher als Cerebralwirkung gedeuteten Phänomene des Collapsus im Laufe von Iodvergiftung (bei Einspritzung in Ovariencysten) stehen offenbar mit der Herzwirkung im Zusammenhang; das Erbrechen ist aus localer Destruction zu erklären (E. Rose). Auch die Ivresse iodique von Lugol, hauptsächlich durch Schwindel und Kopfschmerz charakterisirt, ist als nervöses Symptom problematisch. Die einzelnen Beobachtungen von Mason und Dürr über Convulsionen nach Iodgebrauch stellen das ursächliche Moment nicht ganz fest. Gegen eine directe Wirkung des Iods auf das Gehirn spricht auch der höchst geringe Iodkaliumgehalt des Gehirns nach Einführung in den Magen oder ins Blut (Heubel, Sartisson). Nichtsdestoweniger deuten verschiedene Beobachtungen an Thieren auf eine Wirkung grosser Dosen Iodkalium auf eine Beeinflussung der Nervencentren, wobei es fraglich bleibt, in wie weit dabei das Iod oder das Kalium die Ursache ist. Nach Benedict bedingt Iodkalium von den Centren ausgehende Paralyse und lähmt die Respiration früher als das Herz, welches auch später als die quergestreiften Muskeln abstirbt; Iodtinctur soll dagegen gleichzeitiges Absterben der Herzaction, Respiration und Muskelreizbarkeit bedingen. Die Lähmungserscheinungen sollen bei Fröschen rascher bei

directer Application von Iodkalium auf das durchschnittene Rückenmark, und zwar besonders auf das centrale Ende, auftreten. Nach Rozsahegyi ist Iodkalium ein Gift für die Nervencentren der quergestreiften Muskeln.

Von sonstigen Veränderungen unter dem Gebrauche von Iod ist hervorzuheben, dass man früher wiederholt Atrophie gewisser drüsiger Organe, namentlich der Brustdrüse und der Hoden, danach eintreten gesehen haben will; doch sind diese Beobachtungen nicht über allen Zweifel erhaben. Einzelne vindiciren dem Iod eine allgemeine atrophirende Action (Schwinden des Körpergewichtes), während Andere sowohl bei Kranken als bei Gesunden danach vermehrten Fettansatz und Zunahme des Gewichtes gesehen haben wollen.

Hinsichtlich der Einwirkung des Iods und Iodkaliums auf den Stoffwechsel, welche zur Erklärung der antidyskratischen Effecte der Präparate von besonderer Bedeutung sein würde, sind die Resultate der bisher angestellten physiologischen Versuche widersprechend.

Nach Versuchen v. Boecks mit Iodwasserstoffsäure findet wesentliche Veränderung der Harnstoffausscheidung nicht dadurch statt. Rabuteau sah dagegen unter dem Einflusse von 1,0 Iodkalium oder Iodnatrium Abnahme des Harnstoffes um fast 40 % in maximo, welche in geringem Grade noch mehrere Tage nach beendigtem Einnehmen des Mittels anhielt. Auch Milanesi bestätigte (1873) die Verminderung der Harnstoffausscheidung bei Kranken unter gleichbleibender Kost, doch betrug dieselbe nur 4—9—15 %. Rabuteau bringt mit dieser Herabsetzung des Umsatzes die durch kleine Dosen Iodkalium resultirende Zunahme des Körpergewichtes in Zusammenhang. Ob nicht differente Resultate bei kleinen und grossen Dosen sich ergeben, und in welchem Zusammenhange die Stoffwechselveränderungen mit der von Fubini und Fiori (1881) behaupteten Störung der Peptonisation durch Iodkalium stehen, müssen weitere Untersuchungen lehren. Neben dem Harnstoffe soll auch die Harnsäure unter Iodkaliumgebrauche abnehmen.

Die Empfänglichkeit der einzelnen Individuen gegen Iod und Iodkalium ist eine äusserst verschiedene.

Sollten auch die emetischen Wirkungen des Iodkaliums bei manchen Personen einerseits und andererseits die besonders von englischen und französischen Aerzten wiederholt beobachtete Toleranz von Patienten gegen enorme Dosen Iodkalium (15,0—30,0 pro die und darüber) hie und da ebenfalls mit verschiedenen Verunreinigungen in Connex stehen, so sind doch die Immunität Einzelner gegen grosse Dosen spirituöser Iodlösung (Iodtinctur) und die Idiosynkrasie Anderer gegen minutiöse Mengen von Iodkalium nicht erklärlich. Während nach Injection von 8,0—10,0 Iodtinctur oder Lugolscher Lösung in Abscesse Vergiftungserscheinungen vorkommen (Montcourrier, Dessaigne), reichte Guersent bei Kranken 180 Tropfen Iodtinctur pro die, bei einem Kranken im Ganzen 60,0 Iod innerlich ohne Schaden. Iodschnupfen und Gesichtsgeschwulst, sowie asthmatische Beschwerden sind schon nach 0,6 Iodkalium nach  $\frac{1}{4}$  Stunde (Mecklenburg) und nach dreimal täglich 0,12 Iodkalium in 12 Tagen (Duckworth) beobachtet.

Weder die beim Menschen nach grossen und kleinen Dosen beobachteten Phänomene, noch die physiologischen Versuche lassen eine Erklärung der vielfachen therapeutischen Erfolge, welche man mit Iod und Iodkalium erzielt und derentwegen man die Jodmittel als die hervorragendsten Resolventien des Arzneischatzes erklärt hat, zu.



Bei der Uebereinstimmung der therapeutischen Effecte sowohl des in Substanz eingeführten Iods als des Iodkaliums und anderer Iodverbindungen ist offenbar das Iod als solches das Wirksame. Die neueren Theorien über das Wesen der Iodwirkung und insbesondere über dessen resolvirende Action fassen daher vor Allem die Spaltung und das Freiwerden von Iod ins Auge, sind aber uneinig über den Ort dieser Spaltung einerseits und über das Freiwerden des Iods bedingende Agens andererseits. Buchheim und Kämmerer verlegen diese Wirkung ins Blut, wo nach ersterem das Ozon, nach letzterem die Kohlensäure das Iod abspalten und dessen Wirkung auf die organischen Bestandtheile des Blutes ermöglichen soll. Nach der Kämmererschen Ansicht, welche die an sich etwas zweifelhafte Bildung von Iodwasserstoffsäure im Blute zur Grundlage hat, aus welcher dann bei Zutritt von Luftsauerstoff freies Iod sich bilden soll, auf welches das freie Alkali des Blutes kaum einwirkt, soll das Iod in statu nascendi einerseits die im Blute vorhandenen Fermente (Krankheitserreger) und die Eiweisskörper des Blutes selbst verändern, dann durch Lockerung des Atomenverbands in den Eiweissmoleculen deren Verbrennung erleichtern und den Verbrauch an Blutbestandtheilen steigern, was freilich in entschiedenem Widerspruch zu den bisherigen Stoffwechseluntersuchungen nach Iodeinfuhr steht. Plausibler ist die Ansicht von Binz, welche sich auf das von Schönbein constatirte Freiwerden von Iod in wässriger Iodkaliumlösung bei Gegenwart von Protoplasma und freier Säure stützt, wonach in den Geweben selbst unter Mitwirkung der Kohlensäure das Iod in Freiheit gesetzt wird. Schönfeldt will dem Ozon ausschliesslich die Abspaltung des Iods vindiciren, Adamkiewicz vermuthet einen Antheil des salpetrigsauren Ammoniaks. In Bezug auf das Iodkalium betont Schönfeldt besonders die alkalische Haloidform, in welcher dasselbe in dem Chemismus der Gewebeelemente eingehen und durch seine diffundirende Kraft die Thätigkeit der Gewebe und in zweiter Linie die der Lymphgefässe erhöhen kann. Gewiss sind diese Theorien etwas mehr als die früher üblichen, wo man sich mit einer Wirkung durch Substitution oder Modification der Vitalität der betreffenden Gewebe begnügte, wodurch freilich nichts erklärt, sondern nur der Effect der Heilung umschrieben wird. Stern (1880) hält eine Erregung des Gefässsystems, wobei vorwiegend lymphoide Gebilde, bei stärkerer Einwirkung auch Muskel- und Fettgewebe derart betroffen werden, dass dieselben in einfache Wucherung oder entzündliche Schwellung gerathen, welche bei geringer Intensität direct zur Resorption, unter anderen Bedingungen zur Eiterung führt, für die primäre Wirkung der Iodmittel.

Zunächst gegen Kropf mit Erfolg in Anwendung gebracht, sind die Iodverbindungen später gegen Anschwellungen und Hypertrophien von Drüsen überhaupt und, da solche in der Regel auf scrophulöser Basis sich ausbilden, auch gegen die ihnen zu Grunde liegende Constitutionsanomalie, die Scrophulose, und andere von dieser abhängige Localkrankheiten gebraucht.

Bei Struma standen schon früher iodhaltige Seegewächse und Schwämme in grossem Ansehen. Schon um 1267 v. Chr. wandte man in China dieselben gegen Kropf an und später wurde der im 13. Jahrhundert von Arnoldus v. Villanova empfohlene gebrannte Badeschwamm als sog. Pulvis strumalis das Hauptmittel gegen diese Affection. Das zuerst von Coindet statt desselben benutzte Iod passt nur bei der Struma lymphatica oder der einfachen Hypertrophie der Schilddrüse, wo man das Mittel innerlich (Iodkalium) oder äusserlich (Bepinselung mit Iodtinctur) benutzt oder nach der neueren Empfehlung von Lutton und Lücke (Iodtinctur) in den Kropf selbst injicirt. Das letztere Verfahren soll auch bei sehr festen Geschwülsten rasch zum Ziel führen. Aneurysmatische Kröpfe, Cystenkröpfe und skirröse Entartung der Schilddrüse werden nicht durch Iod geheilt. — Bei scrophulösen Leiden gehören die Iodpräparate entschieden zu den besten Mitteln, und zwar vor Allem bei Drüsenaffectionen, wo man sie entweder innerlich (Iodkalium, Iodeisen, Iodblei u. a.) oder äusserlich (Iodtinctur, Iodkaliumsalbe) oder neuerdings auch subcutan (Lutton) anwendet. Wenn die Iodmittel auch bei sonstigen scrophulösen Localaffectionen

(Augenentzündung, Hautausschläge, Periostitis u. s. w.) nicht immer gleich brillante Erfolge bedingen, so ist ihre Wirksamkeit gegen dieselben doch nicht in Abrede zu stellen, und namentlich zeigt sich, wie die praktische Erfahrung täglich lehrt, ein entschieden günstiger Einfluss bei sog. torpider Scrophulose, während bei erethischen Scropheln Leberthran günstigere Effecte hat.

Die heilsamen Wirkungen bei Scrophulose und scrophulösen Drüsengeschwülsten führten zu Versuchen bei nahe verwandten Affectionen, insbesondere bei Tuberculose und bei Geschwülsten überhaupt, doch erwiesen sich die Iodpräparate hier theils unnütz, theils schädlich.

Bei Tuberculose sind die Iodpräparate in allen Formen geradezu schädlich. Die anfänglich versuchten Inhalationen von Iod wirken höchst irritirend und längerer Gebrauch von Iodkalium stört nicht nur den Appetit, sondern erzeugt nicht selten auch Bronchitis und selbst Blutspeien und fördert in der Regel die Ausbreitung des tuberculösen Processes. — Von Geschwülsten sind allerdings einfache Hypertrophien drüsiger Organe, z. B. der Brustdrüse, der Testikel, auch der Prostata (durch Einbringung von Iodsalbe in das Rectum) durch Iodmittel zu beseitigen, doch ist es wohl nie gelungen, eine maligne Form von Geschwülsten durch Iod zu heilen. Immerhin aber sind derartige Iodcuren versuchsweise, wo die Exstirpation nicht möglich ist, zulässig.

Die Erfolge bei manchen chronisch-entzündlichen Affectionen auf scrophulösem Boden führten auch zu der Anwendung der Iodverbindungen bei chronischen Entzündungen der verschiedensten Organe überhaupt und lässt sich ein sehr entschiedener Effect bei solchen und bei den Residuen derselben (Verdickung und Congestion) nicht in Abrede stellen.

Die Zahl der einzelnen hierhergehörigen Zustände, gegen welche Iodpräparate empfohlen sind, ist sehr bedeutend, da nicht nur Entzündungen parenchymatöser Organe, sondern auch solche der serösen Häute und Schleimhäute (selbst Croup, Diphtheritis, chronische Conjunctivitis und Urethritis) in das Bereich der Iodotherapie gezogen sind. Besondere Wichtigkeit dürfte Iod für chronische Entzündung und Entzündungsresiduen in den weiblichen Sexualorganen (Ovaritis, Oophoritis, Metritis und Endometritis chronica, Hypertrophia uteri, circumscripte Exsudate in der Bauchhöhle) besitzen, wo man fast immer zu demselben seine Zuflucht nimmt. Minder wesentlich ist der Gebrauch bei Periostitis (nach Graves besonders bei Entzündung des Alveolarperiosts), bei Hydrocephalus, pleuritischen Exsudat, Iritis chronica, bei chronischem Magenleiden, z. B. Erbrechen der Säuer (Neumann) und bei Cardialgie in Folge ulcerativer Processe im Magen (Brosius), bei Orchitis und Induration der Nebenhoden u. s. w. Ueberall ist der Gebrauch der Iodmittel nur auf chronische Entzündungen zu beschränken, nicht auf suppurative Entzündungen — wie dies von Upshur bei Behandlung des Eiterungsstadiums der Pneumonie geschah — auszudehnen.

Eine der hauptsächlichsten Anwendungen des Iods und besonders des Iodkaliums ist gegen Syphilis, in Bezug auf welche Affectionen die letztgenannte Verbindung nächst den Quecksilberpräparaten als das wichtigste und wirksamste Medicament erscheint.

Das Iodkalium wurde zuerst durch Wallace in Dublin mit glänzendem Erfolge angewendet und hat sich den ausgezeichnetsten Syphilidologen in trefflicher Weise bewährt. Die Antimercurialisten machen fast ausschliesslich von demselben Gebrauch. Ricord hat die Anwendung des Mittels auf die sog. tertiäre Syphilis (Knochensyphilis, Hirnsyphilis, Sarcocoele syphilitica, syphilitische Leber, Iritis und Neuralgien) beschränkt, und in der That leistet das Iodkalium hier die vorzüglichsten Dienste, wie sich dies namentlich durch das rapide Schwinden selbst alter Tophi und syphilitischer Knochenschmerzen zu erkennen

giebt. Indessen ist die Wirksamkeit des Iodkaliums nicht auf diese Formen beschränkt, und auch Haut- und Schleimhaffectionen, selbst indurirte Geschwüre heilen mitunter rasch bei dem Gebrauche des Mittels. In andern Fällen bleibt dasselbe jedoch, wie selbst die grössten Lobredner des Mittels, z. B. Moij's i-sovics, zugestehen, ohne Erfolg, und zwar häufiger als Mercurialien, doch beeinträchtigt eine solche Iodcur die Erfolge einer späteren Quecksilbercur nicht. Besonders indicirt sind Iodcuren bei starkem Gesunkensein der Kräfte, da das Iodkalium niemals so tief eingreifend auf den Organismus wirkt wie die Mercurialien, ferner in allen Fällen bei Syphilitischen, welche vorher erfolglos mit Quecksilber behandelt wurden. Herrmann u. A. haben die heilsamen Wirkungen in solchen Fällen auf die Beseitigung des im Organismus zurückgebliebenen Quecksilbermetalls zurückführen wollen, weil oft nach den ersten Dosen des Iodkaliums Quecksilber durch den Urin eliminirt wird. Die Wirkung des Iodkaliums als antisiphilitisches Mittel ist indessen nicht allein hierin begründet, da secundäre und tertiäre Kranke, welche nie mit Quecksilber in Berührung gekommen sind, durch Iodkalium geheilt werden. Endlich passt Iodkalium, und zwar in grossen Dosen, vermöge seiner raschen Resorption und Durchdringung der Gewebe bei Syphilitischen besonders da, wo es sich um Abwendung der Zerstörung eines Organs, z. B. der Nase, handelt.

Der Gebrauch des Iods bei andern Dyskrasien und Diathesen ist ziemlich irrelevant. Bei zymotischen Krankheiten (acute Exantheme, Typhus, Cholera) hat es sich trotz Arans und v. Willebrands Empfehlung nicht eingebürgert; ob es bei langwieriger Intermission die Milz verkleinert (Séguin u. A.), steht dahin. Bisweilen sieht man gute Wirkungen bei chronischen Exanthemen, doch steht der Effect dem Arsenik u. a. Mitteln nach. Man vindicirt hier dem Iod besonders günstige Action bei Infiltration und Verdickung der Haut, ohne dass die Praxis dies immer bestätigte. Auch bei Hautgeschwüren mit hypertrophischem, verdicktem Grunde (Fussgeschwüren) scheint Iodkalium nur vereinzelt Besserung zu bedingen. Bei Rachitis, Morbus, Brighti und Diabetes leisten Iodpräparate nichts Wesentliches. Die Anwendung des Iods bei Fettsucht, gegen welche neuerdings auch ein iodhaltiges Seegewächs, der Blasentang, *Fucus vesiculosus*, wieder sehr gepriesen wurde, hat einzelne Erfolge aufzuweisen.

Entschieden günstigen Erfolg hat der interne Gebrauch von Iodkalium bei chronischem Muskelrheumatismus, wo es mitunter die Muskelschmerzen rapide beseitigt (Magendie, Delioux).

Minder ausgesprochen ist (vielleicht in Folge zu kleiner Dosen) der bis jetzt beobachtete Nutzen bei acutem Gelenkrheumatismus. Nach Lasègue kann auch Arthritis deformans durch innerlichen Gebrauch von Iodtinctur (in Sherry zu 8–16 Tropfen genommen) geheilt werden. Eine Begründung der Anwendung von Iodkalium gegen rheumatische Affectionen findet Rabuteau in der Herabsetzung der Harnstoff- und Harnsäureausscheidung; Andere wollen das Iod besonders nützlich gefunden haben, wenn chronische Entzündung fibröser Gebilde den Rheumatismus complicirt. Immerhin ist das Medicament des Versuches werth.

Von besonderer Bedeutung erscheint die jetzt viel gebräuchliche Behandlung des Asthma mit Iodkalium (Lawrie, Trousseau, Hyde-Salter, Sée, Winternitz u. A.).

Nach den Erfahrungen von Sée wird nach dem Gebrauche des Mittels die Respiration in 1–2 Std. frei. Die Anfälle werden unterdrückt und das Athemgeräusch wird an den Stellen wieder hörbar, wo es verschwunden war. Frisches Emphysem verschwindet und die pfeifenden Rasselgeräusche cessiren. Auch bei chronischem Asthma werden die Paroxysmen und die habituelle Oppression beseitigt; dagegen persistirt bei katarrhalischem Asthma der Katarrh noch eine Zeitlang. Bei Phthisikern ist Iodkalium contraindicirt, weil es Lungenblutungen hervorruft (Sée). Lawrie, der 1875 zuerst auf die antiasthmatischen Wirkungen des Iodkalium hinwies, betrachtet die stimulirende und secretions-



erregende Wirkung des Mittels als das bei der Heilung des Asthma wesentliche Moment und sieht den sog. Catarrhus siccus als wesentliche Indication des Iodkaliums an.

Die Anwendung der Iodpräparate bei Nervenaffectionen (Neuralgien, Lähmungen, Chorea, Epilepsie, Krämpfen, oder gar Psychosen) kann als rationell nur da gelten, wo diese Leiden in chronischer Entzündung oder Exsudaten oder in einer durch Iod heilbaren Dyskrasie (Syphilis, Scrophulose) ihren Grund haben. In solchen Fällen sind die Resultate allerdings oft überraschend. Die gerühmten Erfolge des Iods bei chronischem Erbrechen, besonders aber bei Vomitus gravidarum, lassen sehr häufig im Stiche.

Durchaus rationell und praktisch bewährt erscheint die Anwendung des Iodkaliums bei chronischen Metallvergiftungen, (namentlich Hydrargyrose und Saturnismus), indem es das giftige Metall aus seiner organischen Verbindung freimacht und damit ein sehr leicht lösliches Doppelsalz bildet.

Wie Quecksilber im Harn mercurialisirter Personen lange Zeit nach Aufhören spontaner Quecksilberausscheidung auf Darreichung von Iodkalium wieder auftritt, ist dies auch mit Blei bei Saturnismus chronicus der Fall (Annuschat). Melsens konnte bei Thierversuchen das Auftreten chronischer Blei- und Zinkvergiftung in Folge von längerer Zufuhr von Zink- oder Bleisalzen durch gleichzeitige Darreichung von Iodkalium verhüten. Mit Bleisalzen gefütterte Thiere scheiden bei Iodkaliumzufuhr 4mal so viel Blei aus wie ohne dieselbe (Annuschat). Die besonders in England gebräuchliche Behandlung der Bleikolik mit Iodkalium verdient Nachahmung. Delieux empfahl Iodkalium auch gegen Argyrie.

Hieran reiht sich die Anwendung bei mercuriellem Speichelfluss, wo das Mittel meist in Form von Mundwässern benutzt wird und dem Kalium chloricum in seiner Wirkung nahesteht. Die Benutzung zur Beschränkung anderer Secretionen ist rationell und durch die Erfahrung bei Hypergalaktie festgestellt, während bei übermässiger Harnabsonderung das Iodkalium seinen Dienst in der Regel versagt.

Ein sehr brauchbares Mittel ist Iodkalium bei Wöchnerinnen, deren Kinder bei der Geburt verstorben sind oder deren eigener Gesundheitszustand das Stillen verbietet. Man kann hier mit einer einzigen grossen Gabe, aber auch durch wiederholte kleinere Mengen, die Milchsecretion sistiren; der früher gefürchtete Schwund der Brüste tritt danach nicht ein (Riesemberg, Roussel, Küncke u. A.). Auch die Anwendung als Emmenagogum (Brera, Magendie) kann für rationell gelten, da Iod auf die Reifung der Graaf'schen Follikel direct influirt (E. Rose) und auch pathologische Zustände des Uterus zu beseitigen vermag.

Endlich haben wir noch der Anwendung des Iods als Antidot bei Alkaloidvergiftungen zu gedenken.

Das Mittel wird, besonders in der Form der Lugol'schen Solution, nach der Empfehlung von Bouchardat und Donné häufig in Frankreich in Anwendung gebracht und selbst dem Tannin vorgezogen. Speciell ist dasselbe bei Vergiftung mit Strychnin, Brucin, Veratrin, Colchicin, Curare, auch bei Schlangenbiss (Brainard) empfohlen. Mit der Mehrzahl der Pflanzenbasen bildet Iod allerdings schwer lösliche Verbindungen, welche aus iodwasserstoffsaurem Alkaloid und Iodsubstitutionsproducten bestehen; vollständig unlöslich sind dieselben in den Darmsäften indessen nicht und ist daher stets für schleunige Entfernung aus dem Magen zu sorgen. Vorzüge vor Tannin besitzt Iod bei den meisten Vergiftungen mit Pflanzenstoffen nicht.

In der Mehrzahl der geschilderten Krankheiten findet das Iod

unter der Form der Iodtinctur und Iodkaliumsalbe, wenn es sich um die Beseitigung localer Leiden (chronischer Entzündungen, Exsudate, Hypertrophien) handelt, auch örtlich in der Nähe der afficirten Partien Anwendung, häufig sogar ausschliesslich. Ob schon bei Krankheitsprocessen, welche dicht unter der Haut belegen sind, ein Theil des Iods direct zu den pathologisch veränderten Geweben gelangen und dort wirken kann, beruht die Hauptaction doch unzweifelhaft auf der durch die vom Iod gesetzte Hautentzündung bedingten Derivation. Die hauptsächlichste äussere Anwendung, welche man vom Iod macht und wobei man sich entweder der mit Wasser verdünnten Iodtinctur oder der Lugolschen Lösung bedient, ist die Einspritzung in hydropische Cysten und in Abscesshöhlen, sowie in die verschiedensten Körperhöhlen beim Bestehen eitriger oder seröser Ergüsse, wohin namentlich die Hydrocele gehört, bei welcher die zuerst von Velpeau empfohlene Iodeinspritzung das wirksamste und allgemein gebräuchlichste Verfahren darstellt.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die günstige Wirkung des Iods hier auf dem Zustandekommen einer adhäsiven Entzündung und nicht, wie Rabuteau meint, auf einer durch das Iod bewirkten Modification der Tunica vaginalis beruht, denn die Erfolge fallen um so besser aus, je mehr man sich des Iods in Substanz, wie es ursprünglich geschah, bedient, während die Anwendung schwacher Lugolscher Lösung oft genug zu Recidiven führt. Auch haben andere irritirende und kaustische Injectionen, z. B. mit Chloroform oder Zinksulfat, den nämlichen Effect. In ähnlicher Weise wie bei Hydrocele hat man auch bei Hygroma, Ranula, Ascites und Eierstockwassersucht Iodinjektionen gemacht, doch ist bei Ascites das Auftreten von Peritonitis bedenklich und hier sowohl wie bei Einspritzung in Ovariencysten wegen der in denselben zurückbleibenden grösseren Mengen von Iod und Iodkalium das Auftreten von acuter Iodvergiftung zu fürchten, welche, wie wiederholte Erfahrungen lehren, selbst zum Tode führen kann. Der Umstand, dass bei Ovarialcysten das Verfahren sehr häufig nicht zum Verschwinden der Cysten führt, lässt dasselbe bei seiner grossen Gefährlichkeit — nach Velpeau kommen auf 64 Heilungen 36 Nichtheilungen und 30 Todesfälle — als unstatthaft erscheinen. Ganz verwerflich ist auch die Cur der Spina bifida durch Iodinjektion, wenn der Sack mit der Rückenmarkshöhle communicirt und mit Hydrocephalus sich verbindet, während bei einfacher Spina bifida Heilungen erzielt sein sollen (Velpeau, Chassaignac, Munro, Ellis, Watt). In der Behandlung des Empyems oder von Hydrarthros und ähnlichen Leiden ist das Iod jetzt durch Antiseptica (Borsäure, Carbolsäure) oder Iodoform verdrängt. Bourguet will auch bei Pseudarthrose durch Einspritzung von Iodlösung Consolidation erzielt haben.

Von der irritirenden Wirkung des Iods macht man auch noch in anderer Weise Gebrauch, z. B. bei Behandlung alter Geschwüre, Fistelgänge, bei chronischen blennorrhagischen Affectionen der Schleimhäute, sowie bei verschiedenen Hautaffectionen, unter denen besonders Lupus zu nennen ist, wo Bepinselung mit Iodtinctur namentlich zur Beseitigung junger Lupusknoten sich empfiehlt.

Bei Lupus äussert das Iod offenbar eine gelind ätzende Wirkung. Die einzelnen Hautaffectionen hier namhaft zu machen, gegen welche Iod extern benutzt ist, ebenso wie eine Aufzählung der Schleimhautaffectionen, bei denen Iodgebrauch statthat, verbietet die Rücksicht auf den Raum. Selbst Krätze (nach Cazenave tödtet Iodtinctur rasch den Sarcptes) fehlt in dieser Reihe nicht. Wir gedenken hier noch der Anwendung bei Erysipelas und Verbrennungen, wo das Mittel dem Höllenstein von Einigen sogar vorgezogen wird,

ferner bei Milzbrand, wo Davaine u. A. der subcutanen Injection Lugol'scher Lösung besondere Effecte zuschreiben. Man denkt hier, ebenso wie bei dem Gebrauche bei Furunkeln, Carbunkeln und Brand oder bei Stichwunden (Davies) meist an besondere, die Vitalität modificirende Actionen oder an die resolvirende Wirkung des Iods.

In neuester Zeit hat B. W. Richardson das Iod auch als gasförmiges Desinfectionsmittel nach Art des Chlors in Anwendung gebracht.

Bezüglich der Anwendungsweisen des Iods und Iodkaliums ist hervorzuheben, dass das erstere vorzugsweise, ja fast ausschliesslich äusserlich, das letztere vorwaltend innerlich benutzt wird.

Die Dosis des Iods zum internen Gebrauche beträgt 0,01—0,03 2—3mal täglich. Man gab dasselbe früher häufig in Pulver (z. B. mit 200 Th. Zucker als *Saccharure d'iode* von Hannon) oder Pillen, die nicht versilbert oder vergoldet werden dürfen, doch sind beide Formen bei der Verflüchtigung des Iods aus denselben fehlerhaft. Besser sind Lösungen, welche möglichst einfach zu machen sind, da das Iod im Contact mit den meisten unorganischen und organischen Substanzen sich zersetzt. Am gebräuchlichsten sind die oft erwähnten Auflösungen von Iod in Iodkaliumsolutionen (Kaliumpolyiodid); doch sind auch Aether, Alkohol, Mandelöl und Glycerin benutzt. Lösungen in fetten Oelen, z. B. in 15—20 Th. Mandelöl (Marchal de Calvi) oder Baumöl (Hannon) oder in Gemengen von beiden, sind als Iodöl, *Oleum iodatum*, zum Ersetze des Leberthrans empfohlen, welcher übrigens auch selbst als Vehikel für Iod gebraucht wird. Alle diese Lösungen dürfen nicht aus metallenen Löffeln, sondern nur aus gläsernen oder porcellanen genommen werden. Die interne Anwendung des Iods geschieht am zweckmässigsten während der Mahlzeit, um nicht zu intensiv auf die Magenschleimhaut zu wirken; doch sind Amylaceen unter allen Umständen zu meiden, weil sie die Resorption des Iods verhindern.

Das Iodkalium wird in der Regel zu 0,1—0,5 mehrmals täglich verordnet, doch werden diese Dosen namentlich bei Syphilis ausserordentlich häufig überschritten. Bei schweren Fällen, zumal bei drohender Zerstörung von Organen, sind Gaben von 0,6—2,0 3mal täglich anzuwenden.

H. Cooper behauptet, dass solche grössere Gaben weit weniger leicht Erscheinungen von Iodismus bedingen als kleinere. Im Allgemeinen aber thut man wohl, bei Syphilis mit einer Tagesgabe von 0,6, die man auf 3 Einzeldosen vertheilt, zu beginnen und allmählig zu steigen, bis der Kranke sich an Tagesgaben von 4,0—8,0 gewöhnt. Puche empfiehlt sogar Tagesgaben von 25,0—125,0, welche wohl von den Wenigsten ertragen werden und offenbar selbst in den schwersten Fällen überflüssig sind. Die Cur dauert bei Syphilis meist 4—6 Wochen. Bei Asthma giebt Sée anfangs 1,25 und steigt im Verlaufe von 2—3 Wochen allmählig auf 2,0—3,0 und geht dann wieder, ohne jemals mehr als einen Tag auszusetzen, auf 1,5 herunter.

Man giebt Iodkalium innerlich selten in Pulver, Pillen und Trochisken, meist in Solution, am besten in *Aqua destillata* oder in Syrup (*Syrupus simplex*, *Syrupus corticum Aurantii*).

Als externes Medicament dient Iod meist in der Form der Präparate; doch kommt es auch in Substanz und in Lösung — und zwar auch hier am meisten in Iodkaliumsolution gelöst — in Anwendung.

In Substanz empfohlen Hannon, Ricord u. A. das Iod zu 0,5—1,0 in Baumwolle eingefaltet und mit Wachstaffet oder Guttapercha bedeckt zur Application auf Drüsen und indurirte Theile. Damit nicht zu verwechseln ist *Greenhalghs iodirte Baumwolle*, *Gossypium iodatum*, bereitet durch



Tränken von 16 Th. Baumwolle mit einer Lösung von 1 Th. Iod u. 2 Th. Iodkalium in 16 Th. Glycerin und 4 Th. Spiritus, die zuerst bei Frostbeulen und Gebärmutterkrankheiten, später auch zur Desinfection putrider Geschwüre (Delpsch), zur Iodinalation und zur Vesication bei Drüsenanschwellungen, Rheumatismus und Pleuritis empfohlen wurde. Will man Iod inhaliren lassen, so lässt sich auch dazu die Lugolsche Solution zum innern Gebrauche in Verstäubung benutzen, doch wird man schwerlich Gewinn daraus ziehen. Iodcigarren (aus mit Iodkalium getränkten Tabaksblättern) entwickeln keine Ioddämpfe. B. W. Richardson verwendet sowohl zur Inhalation bei Cavernen als zur Desinfection in Krankenzimmern Lösungen von Iod in Amylwasserstoff (1:24); zu letzterem Zwecke benutzt er mit der Lösung getränktes Filtrirpapier, das behufs spontaner Evaporation an verschiedene Stellen der zu desinficirenden Räume gebracht oder darin verbrannt wird. 30,0 der Solution sind zur Desinfection von 4 Cub.-Fuss ausreichend. Salben und Pflaster (1:10—100 Th. Fett) sind entbehrlich; die früher gebräuchliche Benutzung von Ungt. und Empl. merc. als Basis ist unchemisch und unzweckmässig. Zur Behandlung des Lupus ist (neben Iodtinctur) die von Max Richter empfohlene Lösung von Iod und Iodkalium in Glycerin gebräuchlich. Zu Iodbädern rechnet man 10,0—15,0 Iod und 20,0—30,0 Kalium iodatum für den Erwachsenen; statt Iodkalium lässt sich auch ein Zusatz von Chlornatrium anwenden. Nicht ungebräuchlich ist eine Combination von Iod und Tannin (vgl. Verordnungen), wobei nach Socquet eine chemische Verbindung sich bilden soll.

Zur äusseren Anwendung hat Lugol verschiedene starke Lösungen abgegeben, von denen sein Soluté ioduré rubéfiant 30,0 Iod, 60,0 Iodkalium und 375,0 dest. Wasser enthielt. Eine Lösung von aa 1 Th. Iod und Iodkalium in 2 Th. Wasser ist Lugols Soluté ioduré caustique (bei Lupus etc.). Zur Injection ist die unter den Recepten befindliche Vorschrift von Guibourt empfehlenswerth.

Das Iodkalium, welches äusserlich meist in der Form der Salbe (vgl. Präparate) benutzt wird, kann auf die Haut auch in spirituösen Einreibungen (1—3:20 Th. Spiritus oder Sp. Lavandulae) oder in Waschungen (1:50—100 Th. Wasser) oder in Bädern (50,0—120,0 auf das Vollbad), auch in Pflasterform applicirt werden; doch darf man davon keine entfernten Wirkungen erwarten. Zu Mund- und Gurgelwässern (bei mercurieller Stomatitis) nimmt man Lösungen von 1—5:100 Th. Aehnliche, oder auch concentrirtere Lösungen (selbst von 1:3 Th.) können zu parenchymatösen Injectionen, wie sie Jacobowitsch bei hypertrophischen Tonsillen empfahl, und zu subcutaner Injection benutzt werden.

### Präparate:

1) **Tinctura Iodi**, Solutio Iodi spirituosa; **Iodtinctur**. 1 Th. Iod in 10 Th. Spiritus ohne Erwärmen gelöst und decanthirt. Tief rothbraune Flüssigkeit von 0,895—0,898 spec. Gew., welche nicht auf längere Zeit vorrätzig gehalten werden darf, weil, namentlich unter dem Einflusse von Licht, Iodwasserstoff und Iodsubstitutionsproducte des Alkohols entstehen, weshalb Verordnung auf längere Zeit und Aufbewahrung an hellen Orten zu vermeiden ist. Die Iodtinctur ist das am häufigsten äusserlich benutzte Iodpräparat, welches innerlich vereinzelt Liebhaber bei Magenkatarrhen und andern Affectionen findet, welche die Tinctur zu 2—5 Tr. pro dosi (meist im schleimigen Vehikel) 2—3mal täglich verordnen. Aeusserlich wird sie besonders zu Einpinselung der Haut benutzt und zwar namentlich in der Absicht, um entzündliche Producte in der Nachbarschaft der Applicationstelle zu beseitigen, oder um direct destruierend zu wirken. Letzteres ist z. B. der Fall bei Lupus, wo die Iodtinctur indessen meist nicht tief genug ätzt, bei Chloasma, Sykosis, Warzen, Hühneraugen und Muttermälern; ersteres bei einer so zahlreichen Reihe von Affectionen, dass nur die hauptsächlichsten genannt werden können. Am häufigsten kommt sie bei Drüsenentzündungen und Bubonen, sowie bei schmerzhaften rheumatischen Affectionen, aber auch als ableitendes Mittel bei inneren Entzündungen, z. B. Croup, Pleuritis, Bronchitis, Tuberculose, Gelenkentzündung in Gebrauch. — Besondere Anwendung findet sie in dieser Form bei Erysipelas, wo sie Morgan, Norris u. A. dem Höllen-

stein vorziehen, ferner bei Decubitus (Walter) und als Abortivmittel bei Panaritien und Variolapusteln. Acton empfiehlt Bepinselungen des Perineum mit Iodtinctur bei Stricturen und hartnäckiger Gonorrhoe. Hierher gehört auch die Bepinselung der Augenbrauen und Lider mit Iodtinctur bei Photophobie, welche nach 2—3maliger Wiederholung des Verfahrens in manchen Fällen schwindet. Auch auf Schleimhäute bringt man Iodtinctur in Form von Bepinselungen, z. B. bei Amenorrhoe und andererseits auch bei Metrorrhagien, mit grossem Erfolge bei Hypertrophie der Mandeln, folliculärer und granulöser Entzündung des Pharynx und chronischer Kehlkopfentzündung (Waldenburg); hier ist jedoch Verdünnung mit gleichen Theilen Glycerin zweckmässig. Prolapsus uteri will Andreeff durch wiederholte Bepinselungen des Fornix mit einer Mischung von 2 Th. Iodtinctur und 1 Th. Spiritus dilutus bei gleichzeitigem Gebrauche kühler Vaginaldouchen und horizontaler Lage geheilt haben. Neben den Bepinselungen kommt die Iodtinctur bei Application auf die Haut seltener in Form von Umschlägen (bei Bubonen) oder als Collodium iodatum, welches jedoch intensive Schmerzen erzeugen soll, zur Benutzung. Auf Schleimhäute bringt man dieselbe auch in Form von Collutorien und Gargarismen (bei mercurieller und syphilitischer Mund- und Halsentzündung, sowie zur Verhütung des Speichelflusses), Ohrtropfen (mit aa Laudanum bei Verdickung des Trommelfells nach Detschy), Klystieren (bei Cholera, Ruhr, Hepatitis, Ikterus nach Delioix) und Injectionen. Die letztere Form kommt besonders in Gebrauch zur Erzielung adhäsiver Entzündung bei Wassersucht seröser Häute (Hydrocele, Ranula), Abscessen, Fistelgängen und in Form subcutaner Injection zur Zertheilung von Drüsengeschwülsten, Kropf u. s. w. (Lücke). Mit aa Wasser und etwas Iodkalium wird Iodtinctur zur Ausspritzung bei erweichten Drüsenumoren am Halse (Bertherand) und in Atherome nach vorheriger Punction, verdünnter auch bei chronischer, auf Caries beruhender Otorrhoe (Ladreit de la Charrière) empfohlen. Verwendung der Iodtinctur zu Bädern ist meist durch Iodkalium ersetzt. Inhalationen lassen sich mit Iodtinctur dadurch bewerkstelligen, dass man ein gläsernes Inhalationsröhrchen mit Watte füllt, auf welche einige Tropfen Iodtinctur gebracht werden.

Die Iodtinctur macht alle übrigen mit anderen Lösungsmitteln bereiteten sog. Tincturen, z. B. Magendies Tinctura Iodi aetherea und Titons Tr. Iodi chloroformisata, entbehrlich.

2) **Unguentum Kalii iodati; Kaliumiodidsalbe, Iodkaliumsalbe.** Kaliumiodid 20 Th., in 10 Th. Wasser gelöst, Paraffinsalbe 270 Th. Weisse Salbe, welche namentlich zu Einreibungen bei Drüsengeschwülsten (1 Linse bis eine Bohne gross 2—3 Mal täglich) verordnet wird. Die früher mit Schweineschmalz bereitete Iodkaliumsalbe enthielt auf 20 Th. Iodkalium 1 Th. Natriumhyposulfit, um das ohne diesen Zusatz unvermeidliche Ranzigwerden beim Aufbewahren und die damit verbundene Gelbfärbung durch Freiwerden von Iod zu verhüten, wozu man in älterer Zeit der Salbe etwas Magnesia oder Kalilauge zusetzte oder statt Schmalz Adeps benzoatus nahm. Mit 5 Th. Iod versetzt bildet die Salbe das früher in gleicher Weise gebrauchte Unguentum Iodi compositum s. Ung. Kali hydroiodici iodatum.

Ausser den genannten Präparaten wurde früher auch eine Mischung von Seife, Weingeist und Iodkalium als Sapo iodatus s. Balsamum iodatum s. Linimentum saponatum iodatum, sowie ein Gemenge von 1 Th. mit etwas Spiritus verriebenem Iod mit 19 Th. Schweineschmalz als Unguentum Iodi Rademacheri in gleicher Weise benutzt.

#### Verordnungen:

- 1) R  
 Iodi 0,5 (dgm. 5)  
 Kalii iodati 0,75  
 Aq. dest. 50,0
- M. D. S. 2 Mal täglich 5—10—15 Tr.  
 (steigend). (Liquor Iodi Ph. Br.  
 s. Solution of iodine. Aehnlich

ist die von v. Willebrand bei Typhus und Intermittens empfohlene Lösung, welche etwas mehr (1 Gm.) Iodkalium enthält. Mit Wasser verdünnt giebt sie Lugols Solution zum inneren Gebrauche nach Vorschrift 2.)

- |   |   |
|---|---|
| <p>2) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Iodi</i> 0,05—0,08<br/> <i>Kalii iodati</i> 0,1—0,15<br/> <i>Aq. dest.</i> 250,0<br/> <i>M. D. S.</i> Anfangs <math>\frac{2}{3}</math>, später die ganze<br/>         Solution tagsüber weingläserweise<br/>         zu verbrauchen. (Lugols Iodso-<br/>         lution zum inneren Gebrauche.)</p> <hr/> <p>3) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Iodi</i><br/> <i>Kalii iodati</i> <math>\overline{\text{aa}}</math> 5,0<br/> <i>Spiritus</i> 50,0<br/> <i>Aq. destill.</i> 150,0<br/> <i>M. D. S.</i> Aeusserlich (Injectionsflüssig-<br/>         keit von Guibourt).</p> <hr/> <p>4) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Iodi</i><br/> <i>Kalii iodati</i> <math>\overline{\text{aa}}</math> 5,0<br/> <i>Glycerini</i> 10,0<br/> <i>M. D. S.</i> Aeusserlich (Max Richters<br/>         kaustische Iodlösung: bei Lu-<br/>         pus u. s. w.)</p> <hr/> <p>5) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Kalii iodati</i> 5,0<br/> <i>Aquae destill.</i> 175,0<br/> <i>Syrupi simpl.</i> 25,0<br/> <i>M. D. S.</i> Dreimal täglich <math>\frac{1}{2}</math>—1 Ess-<br/>         löffel. (Bei Dyskrasien, Syphilis etc.)</p> <hr/> | <p>6) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Kalii iodati</i> 2,0<br/> <i>Syrupi Aurantii corticis</i> 100,0<br/> <i>M. D. S.</i> Mehrmals täglich <math>\frac{1}{2}</math> Ess-<br/>         löffel voll. (Syrupus Kalii iodati<br/>         nach Ricord.)</p> <hr/> <p>7) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Kalii iodati</i> 2,0<br/> <i>Aquae Selteranae</i> 250,0<br/> <i>M. D. S.</i> Tagsüber zu verbrauchen.<br/>         (Sog. Aqua Selterana iodata.)</p> <hr/> <p>8) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Kalii iodati</i> 5,0<br/> <i>Infusi foliorum Salviae</i> 200,0<br/> <i>M. D. S.</i> Gurgelwasser. (Bei Ptyalis-<br/>         mus mercurialis.)</p> <hr/> <p>9) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Tincturae Iodi</i> gtt. 30<br/> <i>Aq. destill.</i> 250,0<br/> <i>Tragacanthae</i> 1,2<br/> <i>M. D. S.</i> Esslöffelweise. (Bei Ma-<br/>         gen und Darmaffectionen. Rade-<br/>         macher.)</p> <hr/> <p>10) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Tincturae Iodi</i> 10,0<br/> <i>Iodi</i> 0,5<br/> <i>Tincturae Gallarum</i> 5,0<br/> <i>M. D. S.</i> Zum Bepinseln. (Bei Con-<br/>         dylomen. Sigmund.)</p> <hr/> |
|---|---|

### Iodoformium; Iodoform.

Ein in der Gegenwart ausserordentlich beliebtes Iodmittel bildet das von Einzelnen geradezu für eine Panacee angesehene Iodoform.

Diese im Jahre 1822 von Serullas entdeckte Verbindung, welche in ihrer Zusammensetzung dem Chloroform entspricht und ein dreifach iodirtes Elayl,  $\text{CHI}_3$ , darstellt, bildet safranartig riechende, citronengelbe, glänzende, fettig anzufühlende, sehr kleine Krystallblättchen oder Tafeln von unangenehm, an Iod erinnerndem Geschmacke, die sich in 14.000 Th. Wasser, in 50 Th. kaltem und etwa 10 Th. kochendem Weingeist, sowie in 5,2 Th. Aether, auch in Chloroform, ätherischen und fetten Oelen und am leichtesten in Schwefelkohlenstoff lösen. Das Iodoform sublimirt bei 100°, verflüchtigt sich schon bei gewöhnlicher Temperatur und mit den Dämpfen des Wassers, schmilzt bei 115° zu einer braunen Flüssigkeit und entwickelt bei stärkerer Erhitzung Ioddämpfe, Iodwasserstoff und andere Zersetzungsproducte.

Das Mittel wurde 1856 von Bouchardat wegen seines grossen Gehalts an Iod, welcher 97% beträgt, zum Ersatz des Iodkaliums empfohlen, konnte jedoch trotz der Befürwortung durch Righini (1862) u. A. nicht zur allgemeinen Anwendung gelangen, bis 1878 Moleschott den Gebrauch in einer grossen Anzahl von Krankheiten rühmte und Mosetig (1879) das Mittel für den antiseptischen Wundverband verwendete.

Die Wirkung des Iodoforms wird zum grössten Theile durch das im Organismus frei werdende Iod bedingt, doch besitzt das-



selbe offenbar ausserdem noch eine eigenthümliche herabsetzende Wirkung auf die Nerven und insbesondere auf die Gehirnthätigkeit, wodurch es sich dem Chloroform nähert, ohne jedoch dessen anästhesirenden Effect auch nur annähernd zu erreichen. Oertlich irritirende Eigenschaften kommen dem Iodoform nicht zu.

Nach den älteren Versuchen an Thieren wirkt Iodoform bei Hunden zu 1,0 tödtlich und sind Abgeschlagenheit und Erbrechen, später klonische und tonische Convulsionen die hauptsächlichsten Erscheinungen; Entzündung der Magenschleimhaut tritt bei interner Application letaler Dosen nicht auf. Binz und Moeller (1878) fanden bei Hunden und besonders bei Katzen auffallende narkotische Wirkung und bei Vergiftung fettige Entartung in Leber, Nieren, Herz und Muskeln. In Versuchen von Högyes (1879) erfolgte nach wiederholten kleinen Gaben Abmagerung des Körpers, Tod in Folge von Herz- und Athemparalyse ohne vorausgehende Krämpfe, bei Kaninchen auch ohne eigentliche Narkose.

Die Aufnahme des Iodoforms, welche nicht allein vom Magen, sondern auch von Abscesshöhlen und Wunden aus erfolgt, steht offenbar bei der Schwerlöslichkeit in Wasser mit der Lösung in Fett, in welcher das Iodoform übrigens nur bei Einwirkung des Tageslichtes grosse Tendenz zur Dissociation zeigt, im Zusammenhang. Nach Högyes bildet sich nach der Aufnahme Iodalbumin, aus welchem dann das Iod wieder frei wird, um durch den Harn eliminiert zu werden und ist nach vergleichenden Versuchen mit Iodalbumin oder Iodöl die Localwirkung des Iodoforms als protrahirte Iodwirkung zu betrachten, bei welcher das freiwerdende Iod sich langsam mit dem Albumin der Säfte der Applicationsstelle verbindet und ohne locale Gewebsstörung resorbiert wird. Auch die entfernten toxischen Wirkungen sind nach Högyes vorwaltend oder ganz als Iod-effect anzusehen. Ob eine vollkommene Spaltung auch bei grösseren Dosen erfolgt, steht dahin, da bei solchen in einzelnen Fällen höchst exquisiter Iodoformgeruch der Perspiration zu beobachten ist.

Die Dämpfe des Iodoforms wirken auf Thiere betäubend, ohne dabei Irritation der Respirationsschleimhaut zu bedingen (Righini). Beim Menschen ist die Resorption des Iodoforms von verschiedenen Schleimhäuten und auch von der äusseren Haut aus constatirt. Siegen fand bei sich nach 0,2 intern in 30 Min. starke Iodreaction im Harn. Nach Moleschott tritt Iod nach internem Gebrauche von 0,2 Iodoform schon in 15 Min., im Speichel nach 2 Stunden oder noch früher ein und erscheint auch nach äusserer Anwendung in Salbenform oder als Iodoformcollodium, jedoch erst nach 25 Std.; die Ausscheidung hält mit Intermissionen 5 Tage an. Auch bei Application auf geschwürige Stellen, Wunden und in Abscesshöhlen findet sich nach einiger Zeit constant Iod im Harn; ebenso bei Application in Scheide und Collum uteri (Kisch). Das Iod ist im Harn nur theilweise in Verbindung mit Alkalien, theils als organische Verbindung vorhanden (Harnack). Auftreten von Iod im Speichel und Urin constatirte Demarquay auch nach Iodoformsuppositorien. Iodoformgeruch des Athems, wie solchen Righini nach interner Verabreichung grösserer Dosen (3,0 pro die) wahrnahm, kommt bei medicinalen Dosen nicht oder doch nur höchst ausnahmsweise vor. Grosse Dosen können Uebelkeit, Erbrechen und Durchfall erzeugen. Bisweilen treten nach Iodoform riechende Ructus, hier und da nach längerem Gebrauche Kopfweh und Palpitationen (Landsberg), mitunter auch, jedoch weit seltener als nach dem Gebrauche von Iodalkalien, Acne und Coryza ein (Berkeley Hill). Vereinzelt sind bei längerer Darreichung psychische Störungen und comatöse Zustände constatirt. Wie früher schon Maitre narkotische Phänomene nach mehreren Gramm Iodoform eintreten sah, beobachtete neuerdings Oberländer (1878) nach dem Gebrauche von 42,0 in 80 Tagen, bei einer anderen Kranken sogar schon nach Einnehmen von 5,0 in 7 Tagen Anfälle von mehrtägigem Coma mit intercurrenter Agitation und Geistesverwirrung, welche mit Kopfschmerz, Doppelsehen und Erbrechen eingeleitet wurden und nach längerer Zeit einen Zustand von Schwäche und Schwindel hinterliessen. Hieran reihen sich verschiedene Fälle von Intoxicationen durch den Gebrauch theilweise allerdings collossaler Dosen (100,0—150,0) zum Verbande von Wunden

oder Abscesshöhlen, wo in einigen (2—9) Tagen Aufregung und Delirien (Verfolgungswahn) mit nachfolgendem comatösem oder cataleptischem Zustande oder unmittelbar Coma und schliesslich Tod durch Lungenödem eintrat, nach welchem keine Veränderungen in der Schädelhöhle wohl aber mitunter die bekannten Erscheinungen der fettigen Degeneration sich fanden (Henry, Miculicz, Scheve, König, Czerny u. A.). Auch leichte Iodoformvergiftungen, welche sich durch Mattigkeit, Appetitlosigkeit, Uebelkeit, Erbrechen, Fieber u. s. w. äussern, kommen nach dem antiseptischen Iodoformwundverbande vor. Letztere mögen vielleicht von dem abgespaltenen Iod herrühren, erstere halten wir mit Behring für ein dem Iodoform selbst zukommendes Phänomen, da andere Iodverbindungen, welche, wie Iodkalium, weit leichter Iod abspalten, niemals psychische Störungen machen.

Das Iodoform ist innerlich bei sehr vielen Affectionen benutzt, welche man mit Iodkalium zu behandeln pflegt, hat aber nur bei der Behandlung der Syphilis ausgedehntere Verwendung.

Moretin und Humbert, Maître, Glover, Cogswell, Righini u. A. gebrauchten nicht ohne Nutzen Iodoform bei Kropf, Scrophulose, Phthisis, Leiden des Blasenhalses und der Prostata, Amenorrhoe, Prosopalgie und Gastralgie. Bei Syphilis hält Sigmund das Iodkalium dem Iodoform gleichwerthig, während Oberländer bei Verabreichung von 0,4—0,8 pro die entschiedene Abkürzung der Heilungsdauer gegenüber der Iodkaliumbehandlung betont.

Innerlich wird Iodoform zu 0,02—0,2 mehrmals täglich verabreicht, am zweckmässigsten in Pillen.

Grössere Dosen bewirken leicht Nausea. Die maximale Einzelgabe der Pharmakopoe beträgt 0,2, die maximale Tagesgabe 1,0. Bei Intermittens und Chlorose verbindet man es in Amerika mit Ferrum hydrogenio reductum (Condies Chill pills). Die von Whistler angegebenen weichen Gelatinepastillen (aus 1 Th. Gelatine,  $2\frac{1}{2}$  Th. Glycerin und  $2\frac{1}{2}$  eines aromatischen Wassers, mit Cochenille gefärbt, von 0,2 Iodoformgehalt), eignen sich besonders bei syphilitischen Mund- und Halsaffectionen.

Aeusserlich benutzt man Iodoform theils als Streupulver, theils in verschiedenen Lösungen (in Aether, Aetherweingeist, Chloroform, Glycerin, Glycerinalkohol, Collodium, Oel) zum Einreiben, Fomentiren oder Bepinseln, ferner in Form von Salben, Stäbchen, mit Iodoform imprägnirter Baumwolle oder Gaze, von Suppositorien und Vaginalkugeln, selten von Clystieren oder subcutanen Injectionen.

Als Streupulver dient Iodoform fein zerrieben besonders zur Application auf syphilitische Geschwüre, sowohl primäre als schlecht heilende eiternde Bubonen (Oberländer), bei indolenten Geschwüren, z. B. bei hartnäckigen Fussgeschwüren (Cottle, Czobos), sowie bei dem antiseptischen Wundverbande.

Die externe Application von Iodoform hat entweder den Zweck, die Resorption von Exsudaten in analoger Weise wie Iodtinctur und Iodsalbe zu fördern, oder den Heiltrieb von Geschwüren und Wunden zu steigern. Am häufigsten wird es bei Syphilitischen und Scrophulösen verwendet, ohne dass jedoch sein Gebrauch sich auf diese beschränkte. Bei der seit 1879 aufgekommenen antiseptischen Wundbehandlung mittelst Iodoform spielt neben der Förderung der Verheilung auch die antiseptische Action des Mittels eine Rolle.

Dass das Iodoform in der That bei äusserer Application eine sehr hervorragende resolvirende Action besitzt, ist eine Thatsache, von welcher seit Empfehlung des Mittels durch Moleschott in dieser Richtung sich die Praktiker genugsam überzeugt haben. Nicht allein Lymphdrüsentumoren schwinden durch Iodoformsalbe oder Iodoformcollodium, sondern auch seröse Ausschwitzungen oder Residuen von Entzündungen der verschiedensten Organe, z. B. Orchitis und

Epididymitis, chronische Gelenkentzündungen, Pleuritis, Pericarditis, ja sogar Hydrocephalus acutus scheint in einigen Fällen durch Iodoformcollodium geheilt zu sein (Moleschott, Coesfeld). Besonders empfohlen wird Iodoform in dieser Richtung auch bei Hyperplasie des Uterus in Folge von Metritis, sowie bei puerperalen oder traumatischen Beckenexsudaten (Kisch, Cristoforis). Moleschott constatirte auch Besserung in einem Falle lienaler Leukämie, während Coesfeld bei chronischer Spinalmeningitis und beim Cephalhämatom keinen Effect constatirte. Zur äusserlichen Anwendung auf Geschwüre führte zuerst theils die Analogie mit dem Chloroform, welche eine Herabsetzung der Sensibilität und Schmerzempfindung erwarten liess. So wandte es Demarquay bei Mastdarmkrebs, Blasen und Prostataleiden, Nieszkowsky bei Mastdarmlisteln, Greenhalgh bei Krebsgeschwüren und insbesondere bei Uteruskrebs, Besnier, Warner, Boyer, Berkeley Hill u. A. bei schmerzhaften Geschwüren überhaupt an. Von besonderer Wichtigkeit ist offenbar auch die desodorisirende Wirkung bei fötiden Ulcerationen, z. B. beim Uteruscarcinom, wo der Iodoformgeruch prävalent wird, noch mehr aber die zuerst von Besnier, später namentlich von Hill und Mracek für Schankergeschwüre constatirte rasche Reinigung und Granulation, welche auch an alten Haut- und Schleimhautulcerationen jeder Art hervortritt, während bei acuten Ulcerationen und entzündeten Geschwüren Iodoform eher schadet als nützt. Besonders günstige Wirkung wird gerühmt bei Ozaena und Geschwüren in der Nase oder postnasalen Katarrhen (Woakes), Rachen- und Kehlkopfgeschwüren (James, Cozzolini), bei chronischer Mittelohreiterung (Czarda), bei excoriirter Entzündung des Augensclerale, chronischem Lidexzem, atonischen Cornealgeschwüren oder Hornhauterweichung (Rava), endlich bei ulcerirender Endometritis und Muttermündgeschwüren (Kisch, Cristoforis, Dujardin-Beaumetz). Weitere Verwendung fand das Mittel bei Tinea favosa und Chloasma (Cottle), bei Lupus (Riehl), bei Struma (Nowatschek), bei trachomatösem Pannus (Brethauer), bei Interostalneuralgien, Cardialgie, Ischias und Gelenkneurosen (Moleschott), bei Behandlung der blossliegenden Zahnpulpe (Scheff) mit Carbonsäure, um periostale Reizung zu verhüten, endlich selbst nach Punction der Hydrocele in Pulver in die Scheidenhaut gebracht zur Bewirkung adhaesiver Entzündung (Hayes). Mosetig schrieb zuerst dem Mittel eine seither von vielen Chirurgen bestätigte besondere Vis antituberculosa zu, die sich in Beseitigung fungöser Granulationen und beginnender Knochenkrankheiten unter Iodoformbehandlung zu erkennen giebt, doch ist der antiseptische Effect auch bei nicht fungösen Affectionen ausgesprochen, wie dies auch die Versuche von Panneth (1881) darthuen, wonach Iodoform in grossem Ueberschusse Spaltpilzentwicklung und Fäulnisserscheinungen verhindert oder doch bedeutend verzögert. Sicher ist Iodoform allen übrigen Antiseptica in Bezug auf reizlose Heilung mit Mangel fast jeder Secretion oder Reaction (König) überlegen. Die Effecte der Iodoformbehandlung sind durch zahlreiche Beobachtungen nach den schwersten Verletzungen und Operationen, z. B. Laparotomie, bei fungös erkrankten Gelenken, kalten Abscessen, Empyemen sicher gestellt.

Zum antiseptischen Wundverbande empfiehlt Mosetig das Iodoformpulver (nach sofortiger Reinigung der Wunde mit frischem Wasser, Stillung der Blutung und Trocknen der Wundfläche) vermittelt einer Streubüchse aufzupudern und die Wunde mit einem reichlich mit Iodoform bestreuten Wattebausche zu bedecken und nach Hinzufügung einer weiteren Watteschicht mit Percha lamellata zu umschliessen. Obschon Mosetig, Leisrink u. A. beim Iodoformverbande von Abscessen 60,0—80,0 benutzten, ohne dass Intoxicationerscheinungen eintraten, ist bei dem wiederholten Vorkommen letaler Iodoformvergiftung die Menge des zu verwendenden Iodoforms möglichst niedrig zu nehmen, was namentlich unter Ersetzung eines Theils des Iodoformpulvers durch Iodoformgaze leicht möglich ist. Jüterbock empfiehlt an Stelle feingepulverten Iodoforms krystallinisches als minder leicht resorbirbar. Entweder eingeblasen oder auf Wattetampons eingeführt, ist Iodoformpulver theils bei Ozaena und Affectionen der Nase und postnasalen Katarrhen, sowie bei Affectionen des äusseren und mittleren Gehörgangs in Anwendung gezogen. Auch bei Lupus benutzte Riehl Iodoformpulver, ebenso Cristoforis bei Uterinaffectionen. Aetherische Lösung (1:6—12) ist theils zur Bepinselung von Schankergeschwüren, welche



darüber noch mit Lint verbunden werden (Berkeley Hill), theils in Fistelgänge gespritzt (Oberländer), theils bei Nasenaffectionen (Browne) oder verstäubt bei Vaginismus (Dujardin-Beaumetz) benutzt. In Chloroform (6—12) gelöstes Iodoform applicirt Cottle auf SchankerGeschwüre, auch lässt sich die Lösung bei Rheumatismus und Algien verwenden. Mischungen mit Glycerin (1:10) oder mit Glycerin und Alkohol dienen besonders zu Application bei Uterinaffectionen, letztere im Verhältniss von 1 Th. Iodoform zu 1 Th. Alkohol und 5 Th. Glycerin (Kisch) oder auch schwächer mit 4 Th. Weingeist und 12 Th. Glycerin (Icard). Iodoformglycerin benutzte auch Thomann bei Syphilis subcutan (zu 0,3 in 6 Cem.) und selbst in höheren Dosen (0,75), ohne dass es zu örtlicher Entzündung oder zu entfernten Erscheinungen kam. Oelige Lösungen, durch gelindes Erwärmen mit 100—200 Th. Olivenöl oder mit Beihülfe von Aether in stärkerer Concentration (1 :  $\alpha\alpha$  6 Aether und Oleum olivarium bereitet und zum Verband von Geschwüren und bei Scheidenaffectionen (Martineau), auch zur Subcutaninjection benutzt, sind weniger beliebt. Zu Salben behufs Application auf die Haut oder auf ulceröse Leiden nimmt man 1 Th. auf 5—15 Fett, Glycerinsalbe oder Unguentum Paraffini. Als Collodium iodoformiatum empfahl Moleschott 1 Th. Iodoform auf 15 Th. Collodium, doch kommen auch stärkere Präparate (1:10) in Anwendung. Im Klystier hat man Iodoform mit Hülfe von Eiweiss in Wasser vertheilt, verwendet. Bei Suppositorien rechnet man 0,2—1,0 auf 5,0 Cacaobutter. Die zum antiseptischen Verbande benutzte Iodoformgaze, welche Billroth auch nach der Operation von Zungencarcinom verwendet, werden bereitet, indem man 6 Meter Gaze in eine mit 50,0 Glycerin versetzte Lösung von 60,0 Colophonium in 1200,0 94% Alkohol taucht, dann ausdrückt und in halbtrocknen Zustande mit 50,0 pulverisirtem Iodoform bestreut. Iodoformstäbchen lässt Mosetig aus  $\frac{9}{10}$  Iodoform und  $\frac{1}{10}$  Cacaobutter in der Länge von 5—6 Cm. und verschiedener Dicke zur Einführung in Fistelgänge bereiten.

Eine unangenehme Zugabe ist für den äusseren Gebrauch der für manche Patienten höchst lästige Geruch desselben. Zur Verdeckung dient bei Salben und flüssigen Formen am zweckmässigsten Zusatz von Pfefferminzöl (etwa 5 Tr. auf 2,0 Iodoform). Bei der Verwendung gepulverten Iodoforms zum Adsperso empfiehlt Mosetig in die Streubüchse Tonkabohnen zu legen, von denen eine frische Bohne 150,0—200,0 Iodoform desodorisirt.

**Anhang.** Sonstige Iodverbindungen. Ausser dem Iodkalium und Iodoform haben noch verschiedene andere Iodpräparate analoge medicinische Verwendung gefunden. Hierher gehört in erster Linie die Iodwasserstoffsäure, Acidum hydroiodicum, welche zu 4,0—15,0 pro die in wässriger Verdünnung bei Syphilis empfohlen wurde. Obschon die Säure leicht resorbiert wird, so dass der Nachweis von Iod im Speichel bald geliefert werden kann, ist die antisypilitische Wirkung doch ziemlich unsicher. Bei längerem Gebrauche treten Magenstörungen wie nach anderen Säuren ein. In die Venen bei Thieren gespritzt wirkt sie den Mineralsäuren analog und bewirkt Dyspnoe, Convulsionen und complete Reflexlosigkeit; tödtlicher Effect tritt dabei schon nach geringeren Dosen, 0,1 per Kilo, als bei anderen Säuren ein (H. Köhler).

Von den Verbindungen des Iods mit Alkalimetallen sind das Natriumiodid (Iodnatrium), Natrium iodatum, und das Ammoniumiodid (Iodammonium), Ammonium iodatum, als Ersatzmittel für Kalium iodatum benutzt. Obschon das Iodnatrium mehr Iod als das Kaliumiodid enthält und leichter als solches Iod abgibt und obschon die Wirkung des ersteren auf den Magen milder zu sein scheint, so dass grössere Dosen gegeben werden können (Gamberini, Rabuteau), ist das Mittel als Antisyphiliticum wenig verbreitet. Beck bezeichnet es geradezu als unwirksam. Auch soll nach längerem Gebrauche Cardiopalmus auftreten (Rossbach). Im Gegensatze hierzu wird dem Iodammonium, besonders bei tertiärer Syphilis, von manchen Aerzten (Carat) wegen rascherer und energischerer Wirkung und wegen der erforderlichen kleineren Dosen (0,5—5,0 gegen 1,0—10,0 Iodkalium) der Vorzug gegeben, obschon es stärker irritirend wirkt (Milne Edwards, Vavasseur) und wegen seiner Leichtzersetzlichkeit wahrscheinlich auch leichter Iodismus erzeugt. Nach Carat spaltet es sich sowohl bei Einreibung einer Salbe und nach einem Bade auf der Haut als auch im Magen und erscheint als Iodnatrium im Harn und

Speichel; Tagesgaben von 5,0 bedingen leichte Mattigkeit, Insomnie und geringe dyspeptische Erscheinungen, solche von 7,0 daneben Zittern der Finger, heftigen Kopfschmerz, Pulsbeschleunigung, Temperatursteigerung und vermehrte Diurese. Auch bei Thieren bedingen toxische Dosen die charakteristischen Erscheinungen der Ammoniumvergiftung (H. Köhler). Nicht ganz unberechtigt ist der äussere Gebrauch bei Tumoren scrophulöser oder syphilitischer Art, auch bei Milzgeschwülsten (Warring, Curran). Man giebt es innerlich entweder in Lösung (zu 0,5 per Esslöffel) oder in Pillen mit Gummischleim, äusserlich als Salbe oder Liniment oder in Form der sog. Iodkaliumsäckchen, die mit 10,0 Iodkalium und Chlorammonium gefüllt werden. Zum Iodammonium gehört auch die früher officinelle farblose Iodtinctur, *Tinctura Iodi decolorata*, eine durch Digestion von je 10 Th. Iod und Natriumhyposulfit bis zur Lösung, Zusatz von 16 Th. *Liquor Ammonii caustici spirituosus* und 175 Th. *Spiritus*, dreitägiges Hinstellen am kühlen Orte und Filtriren bereitete klare, farblose Flüssigkeit, welche wie Iodtinctur äusserlich bei Drüsengeschwülsten von amerikanischen Aerzten empfohlen wurde, weil bei ihrer Anwendung Braunfärbung der Hautstellen nicht eintritt. Das Iod ist in derselben nicht frei, sondern an Ammoniak gebunden, dessen Geruch prävalirt. Auch *Calciumiodid*, *Calcium iodatum*, ist als internes Iodpräparat bei Scrophulose (A. Malet) empfohlen.

Die Verbindungen der Alkalien mit Iodsäure, namentlich das iodsäure Kalium, *Kalium iodicum*, haben durch Demarquay und Gustin medicinische Anwendung gefunden, jedoch nicht als eigentliche Iodpräparate, sondern nach Art des chloresäuren Kali bei Speichelfluss und Diphtheritis (als Mundwasser zu 0,25 bis 1,0 pro dosi). Zum innerlichen Gebrauche eignen sie sich nach Melsens nicht, weil sie toxische Eigenschaften besitzen, doch werden solche von Rabuteau in Abrede gestellt. Nach Letzterem findet im Organismus eine Umwandlung der Iodate zu Iodüren statt und wird bei Einführung kleiner Mengen die gesammte Quantität als Iodnatrium im Urin und Speichel ausgeschieden; bei Zufuhr grösserer Mengen tritt auch iodsäures Salz im Harn auf. Ogle wandte die Iodsäure zu 0,1—0,3 pro dosi innerlich und äusserlich bei Scrophulose an. Von dem in gleicher Richtung bei Drüsenhypertrophien durch Ogle gebrauchten *Ferrum iodicum* war bereits S. 722 die Rede. Nach Binz ist die Iodsäure und ihre Salze ein treffliches Antisepticum, indem sie theils nach Art der Chloresäure activen Sauerstoff abgiebt, theils Iod frei macht. Zusatz von Natriumiodat zu Harn (1 : 200) verhindert wochenlang dessen Fäulniss. Auch bei septisch fiebernden Thieren bedingt Natriumiodat zu 0,1 Entfieberung, die sehr rasch eintritt und vergeht, ohne sich mit Narkose zu combiniren, wie solche danach bei nicht fiebernden Thieren zur Erscheinung gelangt (Binz und D'ham).

Verschiedene Verbindungen von Iod mit Schwermetallen haben, wie auch Calciumiodid und Lithiumiodid (Issersohn), die Eigenthümlichkeit, dass nach eingetretener Spaltung das Iod sehr rasch eliminirt wird, während der Metallcomponent noch längere Zeit im Organismus zurückgehalten wird (Melsens, Bachrach). Von den therapeutisch verwendeten Iodmetallen ist, vom Iodeisen abgesehen, Iodblei, *Plumbum iodatum*, das am meisten gebrauchte, neben welchen Iodzink, *Zincum iodatum*, zuerst bei chronischer Entzündung der Tonsillen (Cogswell und Ross), später bei Scrophulose, *Ophthalmia scrophulosa* (Bredow), Lupus (Durant) vorzugsweise äusserlich (in Lösung oder Salbe), auch als Zinkpräparat innerlich gegen Chorea benutzt und Iodkadmium, *Cadmium iodatum*, von Garrod und Guibert als vorzügliches Iodmittel bei Drüsenschrophulose gerühmt, zu nennen sind.

Das Iodblei bildet ein pomeranzengelbes Pulver, welches mit 1300 Th. kaltem und 200 Th. heissem Wasser eine farblose Lösung giebt, in der Wärme schmilzt und unter Entwicklung violetter Dämpfe sich zersetzt. Es ist 1831 von Cottereau und Verdé de Lisle bei Scrophulose und anderen Krankheiten, welche die Anwendung von Iod erfordern, zuerst empfohlen und später theils äusserlich, theils innerlich von Guersant, Lisfranc, Velpeau, Ricord, Lebert, Ross, Pereira, Schönfeldt u. a. bei Bubonen und chronischen Testikelanschwellungen, chronischer Periostitis und Ostitis, Anschwellungen des Uterus und der Brustdrüsen, bei Lupus, Sclerosis, Balggeschwülsten, selbst gegen

Skirrhren gerührt. Barudel benutzte es zu Injectionen gegen acute und chronische Urethritis. Schönfeldt befürwortet den Gebrauch bei Geschwülsten überhaupt, um über deren homöo- oder heteroplastische Natur Sicherheit zu erhalten. Im Ganzen scheint Iodblei innerlich in verhältnissmässig grossen Dosen gut ertragen zu werden. O'Shaughnessy will sogar Dosen von 0,6 ohne nachtheilige Wirkung ertragen gesehen haben, während andererseits Velpeau Reizungserscheinungen seitens des Magens nach Gaben von 0,015 bis 0,03 beobachtete. Katzen toleriren 0,7 Iodblei, ohne dass Intoxication hervortritt, sterben aber nach 1,2 (Paton), ohne dass entzündliche Erscheinungen im Tractus vorkommen. Hunde scheinen selbst 4,0–8,0 zu toleriren, doch resultirt durch längere Darreichung von Iodblei bei Thieren ein Zustand chronischer Bleivergiftung (Cogswell). Man benutzt das Iodblei innerlich zu 0,1–0,3 mehrmals täglich in Pulver, Pillen oder in Iodkaliumsolution gelöst; äusserlich in Salben (1:5–10, oft mit Zusatz von Opiumtinctur oder Belladonnaextract) und in Pflastern (1:2–10 Th.).

Von organischen Verbindungen des Iods empfahl Bellini Iodamylum als Antidot bei Vergiftungen mit Alkali- und Erdsulphiden und mit Alkaloiden auch als Ersatz des Iodkaliums bei Saturnismus und Mercurialismus chronicus. Quesneville hat auch ein Amylum iodatum solubile (Dextrinum iodatum) durch längeres Sieden der unlöslichen Iodstärke dargestellt und in Form eines Syrops verwendet. Guerri empfahl mit Iodtinctur vorsichtig gemischtes Hühnereiweiss auf flachen Schalen sorgfältig getrocknet, als Iodeiweiss, Albumen iodatum, zu 0,5–1,0. Obschon Iodalbumin nach Högyes bei Thieren Iodoformerscheinungen, Schläfrigkeit, fettige Degeneration bewirkt und im Organismus Iod frei werden lässt, das durch die Nieren eliminiert wird, ist doch das gelbliche, geschmack- und geruchfreie Präparat von Guerri wenig zur Anwendung gekommen. Zur Darreichung bei syphilitischen Kindern eignet sich das durch Versetzen von 90 Th. erwärmter Milch mit 10 Th. Iodtinctur bis zur Entfärbung dargestellte Lac iodatum, Iodmilch, welche ein Iodcaseat enthält und zu  $\frac{1}{2}$ –1 Esslöffel beim Erwachsenen 2–3mal täglich gegeben werden kann (Perier). Die Iodmilch mit Kaliumiodid oder Tange gefütterter Kühe oder Ziegen als Medicament ist selbstverständlich nur als Spielerei zu betrachten. An diese Präparate schliessen sich noch der bei Chlorotischen benutzte Iodkleber von Gagnages, die Iodchocolade von Soubeiran und die Iodkohle von Magnes. Das letztere Präparat erinnert an die durch Verbrennen von Seethieren und Seepflanzen erhaltenen iodhaltigen Medicamente, welche unter dem Namen Spongia usta (Carlo Spongiae) und des Aethiops vegetabilis (gebrannte Seetange) bei Kropf- und Drüsenleiden in Ansehen standen.

Eine beschränkte Anwendung, theils intern in Pillenform, theils in Form von Salben (1:10–20) oder Seifen, fand der früher officinelle, durch Erhitzen von 1 Th. Schwefel mit 4 Th. Iod erhaltene Iodschwefel, Sulfur iodatum, nämlich bei Hautkrankheiten, insbesondere Ekzem, Lepra und Lupus. Das Präparat, welches eine schwarzgraue, glänzende, dem Schwefelantimon ähnliche Masse bildet, ist sehr zersetzlich und giebt an der Luft Ioddämpfe ab, welche auch die Haut braun färben und irritiren. Dämpfe von Chloriod empfahl Turnbull bei torpiden Ophthalmien.

Der Iodgehalt verschiedener Mineralwässer wurde bereits oben betont. Dasselbe findet sich als Iodmagnesium, Iodnatrium oder Iodcalcium besonders in kochsalzhaltigen Quellen. Soweit dieselben in erheblicherer Quantität getrunken werden, ist die Wirkung durch das Iod naheliegend, während bei ausschliesslichem Gebrauche zu Bädern wohl von einer eigentlichen Iodwirkung nicht die Rede sein kann. Am bekanntesten ist von solchen iodhaltigen Soolen Kreuznach, welches jedoch der Stärke nach (in 1000 Th. 0,0014 Iodmagnesium in der Oranienquelle und 0,0039 in der Elisenquelle) erst die 17. Stelle unter den iodhaltigen Soolen einnimmt (Niebergall). Weit reicher sind Saxonles-Bains (mit 0,11 ‰ Iodcalcium), Hall in Oberösterreich (0,042 ‰ Iodmagnesium), die Adelheidsquelle bei Heilbronn (0,028 ‰ Iodnatrium), ferner noch Wildegg (im Canton Aargau), Salzbrunn, Dürkheim, Krankenheil u. a. m. Viel reicher an Iod sind übrigens die Mutterlaugen der Soolen. So enthält die Kreuznacher Mutterlauge 3,89 ‰ Bromkalium und 0,80 ‰ Iodkalium.



Um Iodmineralwasser künstlich zu ersetzen, sind differente Vorschriften gegeben, von denen die *Aqua Selterana iodata* (S. 798) sehr zweckmässig ist.

**Barium chloratum, Baryta muriatica, Terra ponderosa salita; Bariumchlorid, Chlorbarium, salzsaurer Baryt, salzsaure Schwererde.** — Diese fast ganz obsolete Verbindung, welche durchsichtige rhombische Tafeln oder glänzende Schuppen bildet, die sich an der Luft nicht verändern und in  $2\frac{1}{2}$  Th. kaltem und  $1\frac{1}{2}$  Th. kochendem Wasser löslich sind, galt besonders gegen Ende des vorigen und im Anfang dieses Jahrhunderts als vorzügliches Antiscrophulosum, auch gegen andere Dyskrasien, z. B. Syphilis und Hautkrankheiten, und fand ausserdem bei Struma, Caries, Gonorrhoe, Tumor albus, auch bei exaltirtem Geschlechtstriebe Anwendung (Crawford, Lisfranc, Hufeland u. A.). In grösseren Dosen ist dasselbe ein intensives Gift, welches auf die Centralorgane des Nervensystems und das Herz in eigenthümlicher Weise einwirkt. Nach den Versuchen von Böhm und Mickwitz (1875) erhöhen Bariumsalze die Erregbarkeit krampfrender Centren im verlängerten Mark und in den oberen Theilen des Rückenmarks nach Art des Pikrotoxins, bewirken hochgradige Steigerung der Peristaltik und wiederholte flüssige Defäcationen und bedingen eine enorme Steigerung des Blutdrucks, unabhängig vom vasomotorischen Centrum durch Contraction der peripheren Gefässe, mit gleichzeitiger starker Pulsbeschleunigung, daneben Athemnoth, bedeutende Prostration und Schwäche. Die früher von Onsum aufgestellte Hypothese, dass das Chlorbarium in Folge von Wechselersetzung mit den Sulfaten des Blutes durch embolische Verstopfung der Lungenarterien den in manchen Fällen sehr rasch eintretenden Tod herbeiführen, scheint unrichtig zu sein. Beim Menschen sind 15,0 (Wach), vielleicht aber viel geringere Mengen tödtlich; Hunde und Kaninchen sterben schon nach 1,0 und bei Einspritzung in die Venen sogar nach 0,1—0,2. Das Mittel ist um so weniger empfehlenswerth, als bei sehr vielen Personen auch kleine Dosen (nach Ferguson schon 0,2 mehrmals täglich) Druck im Magen, Uebelkeit, Erbrechen und einen bedenklichen Schwächezustand bewirken können. Ob, wie südfranzösische Aerzte (Pirondi) behaupten, das Klima auf die Empfänglichkeit gegen Chlorbarium Einfluss hat, so dass z. B. in Montpellier 3mal mehr als in Paris gegeben werden könne, ist sehr zu bezweifeln; jedenfalls aber sind Dosen von 3,0, wie sie Lisfranc bei Tumor albus gab, durchaus unzulässig. Als höchste Einzelgabe ist 0,12, als maximale Tagesgabe 1,5 zu betrachten. Man gab Chlorbarium meist in destillirtem Wasser oder aromatischen Wässern gelöst in Tropfenform. Die äusserliche Anwendung in Augentropfwässern (bei Ophthalmia scrophulosa) und Verbandwässern (bei Geschwüren) ist ohne Bedeutung.

Das statt des Chlorbariums empfohlene Iodbarium, *Barium iodatum*, besitzt ausser der toxischen Barytwirkung noch die örtliche kaustische Wirkung des Iods (Jahn) und ist höchstens äusserlich bei scrophulösen Leiden zu benutzen, ohne irgend welche Vorzüge zu besitzen. Ebenso überflüssig sind andere Bariumsalze, *Barium iodicum*, *B. nitricum* u. s. w., welche die toxischen Wirkungen des Chlorbariums in gleichem Maasse besitzen.

**Acidum arsenicosum, Arsenicum album, Oxydum Arsenici album; Arsenige Säure, weisser Arsenik. Liquor Kalii arsenicosi, Solutio arsenicalis Fowleri, Solutio Fowleri, Tinctura Fowleri, Tinctura mineralis Fowleri, Kali arsenicosum solutum; Fowlersche Lösung, Fowlersche Tropfen.**

Zu den wichtigeren Mitteln dieser Abtheilung gehören auch die Arsenverbindungen, von denen die Phkp. nur die als gefährliches Gift lange bekannte arsenige Säure und eine Verbindung dieser Säure mit Kalium, letztere in Lösung, aufgenommen hat.

Die arsenige Säure, (Arsenigsäureanhydrid, Arsenitrioxyd,  $As_2O_3$ ), wird durch Rösten von Arsenkies oder arsenhaltigen Kobalt und Nickelerzen, Conden-

sation der Dämpfe in gemauerten Canälen, den sog. Giffhängen, Sublimation des so erhaltenen Giftmehls (Hüttenrauch) über freiem Feuer und Condensation in ringförmigen freien Aufsätzen, in denen sie zu einer glasartigen Masse von muschligem Bruche zusammenschmilzt, gewonnen. Die officinelle arsenige Säure stellt weisse, porzellanartige oder durchsichtige Stücke dar, welche in einem Glasrohre vorsichtig erhitzt ein weisses, in glasglänzenden Octaëdern oder Tetraëdern krystallisirendes Sublimat geben und, auf Kohle erhitzt, sich unter Verbreitung eines knoblauchartigen Geruches vollständig verflüchtigen. Sie löst sich langsam in 15 Th. kochendem Wasser auf. Alkohol löst sie leichter als Wasser und noch weit reichlicher lösend wirken verdünnte Mineralsäuren, namentlich Salzsäure, oder wässriges Ammoniak, woraus sie unverändert in Octaëdern krystallisirt.

Die officinelle Kaliumarseniatlösung wird nicht durch einfache Auflösung von Kaliumarseniat in Wasser gewonnen, sondern dadurch, dass man aa 1 Th. arsenige Säure und Kalium carbonicum mit 1 Th. Wasser bis zur vollkommenen Lösung kocht, hierzu 40 Th. Wasser und nach dem Erkalten 15 Th. Spir. Melissa comp. und soviel Wasser fügt, dass das Gewicht des Ganzen 100 beträgt. Dies Präparat, welches somit in 100 Th. 1 Th. arsenige Säure enthält, bildet eine klare, farblose Flüssigkeit, in welcher Salzsäure keine Gelbfärbung, dagegen Schwefelwasserstoff eine reichliche Fällung von Schwefelarsen hervorbringt. Die gewöhnlich als Fowlersche Tinctur bezeichnete Solution verewigt den Namen eines englischen Arztes aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts, welcher eine ähnliche Lösung gegen Wechselfieber empfahl. Die in der ersten Auflage der Ph. Germ. officinelle Lösung war etwas stärker (1 : 90) und enthielt keinen weingeistigen Zusatz, der entschieden die Haltbarkeit verstärkt, während ohne denselben sowohl in Solutio Fowleri als in Lösungen arseniger Säure (trotz deren antiseptischer Wirkung) sich leicht Algen entwickeln, die eine Zersetzung bedingen.

Der arsenigen Säure kommt eine örtliche und eine entfernte Wirkung zu. Die erstere ist eine kaustische, beruht jedoch nicht auf Eiweisscoagulation. Das Kaliumarseniat äussert keine locale kaustische Action, stimmt aber in seiner entfernten Wirkung mit der arsenigen Säure überein.

Arsenige Säure fällt Eiweiss nicht und die Annahme einer Zersetzung desselben durch Entziehung von Schwefel (Liebig, Heller) ist irrig. Nichts destoweniger ist die kaustische Wirkung der arsenigen Säure so gross, dass man sie früher als Causticum bei Geschwülsten häufig verwendete. Auch bei acuter Vergiftung mit gepulverter arseniger Säure findet man nicht selten an den Stellen, wo Arsenpartikelchen ungelöst liegen geblieben sind, Zeichen von Corrosion. Eigentliche Gastroenteritis toxica, wie man früher annahm, erzeugt arsenige Säure nicht; vielmehr sind die fälschlich für Entzündungserscheinungen gehaltenen enormen Hyperämien im Tractus als Zeichen entfernter Wirkung aufzufassen, da sie auch bei Vergiftung durch Subcutanapplication oder Infusion eintreten, wo die durch den Darm eliminirten Mengen arseniger Säure zu gering sind, um so hochgradige Entzündung hervorzurufen, wie sie in solchen Fällen häufig besteht (Böhm und Unterberger). Die kaustische Action der arsenigen Säure charakterisirt sich durch hochgradige Entzündung mit bedeutender Anschwellung und raschem Absterben der betreffenden Partien.

Die arsenige Säure besitzt eine hemmende Wirkung auf den Fäulnissprocess und verschiedene Gährungsvorgänge.

Die fäulnisswidrige Wirkung des Arsens beweist die Möglichkeit, durch Einspritzung von Lösungen arseniger Säure in die Adern Leichname auf längere Zeit conserviren zu können, ohne dass dieselben der Fäulniss unterliegen. Der Anwendung zur Aufbewahrung von Thierhäuten, Vogelbälgen u. dgl. in Museen liegt neben der antiseptischen Action die deletere Wirkung der arsenigen Säure auf Milben und Articulaten zu Grunde. Bei acuter Arsenikvergiftung kommt es nach dem Tode häufig zu den ersten Erscheinungen der Fäulniss und erst später

sistirt dieselbe und tritt eine eigenthümliche Mumification ein. Die Wirkung als Antisepticum ist somit eine beschränkte; Zusatz von Arsenlösung zu faulendem Material hemmt die Fäulniss nicht. Auf die Bildung von Schimmelpilzen und von Bacterium Termo hat arsenige Säure anscheinend einen geradezu begünstigenden Einfluss (Böhm und Johannsohn, Fleck); in Lösungen entwickeln sich sehr leicht Pilzmycelien und im Darm mit Arsen Vergifteter kommen massenhafte Vibrionen und Monaden vor (C. E. Hofmann). Hemmende Wirkung zeigt die arsenige Säure auch auf Hefegährung, doch nimmt dieselbe nach einigen Tagen bedeutend ab; völlige Aufhebung findet nur bei längerer Einwirkung sehr grosser Arsenmengen statt, dagegen keine Auflösung der Hefezellen, während deren Vitalität und Vermehrung beschränkt wird (Buchheim und Savitsch, Böhm, Schäfer und Johannsohn). Beim Hinstellen von Hefe mit Wasser und Lösung arseniger Säure findet auf der Oberfläche nicht die Bildung von Schimmel, sondern die von Zoogloeaformen und Kugelbacterien statt. Beim Auftreten von Bacterien entwickelt sich Arsenwasserstoffgas, das beim Auftreten von Fadenpilzen nicht gebildet wird. Das Ferment der Ammoniakgährung des Harns und das der Milchsäuregährung werden ebenfalls durch arsenige Säure in ihrer Entwicklung gehindert, dagegen ist auf Emulsin und Myrosin Arsen ohne Einfluss (Böhm und Johannsohn); desgleichen auf peptonisirende und zuckerbildende Fermente (Böhm und Schäfer).

Die Resorption der arsenigen Säure und des arsenigsäuren Kalium erfolgt von allen Schleimhäuten aus, ebenso von Wunden, Geschwüren und excoriirten Stellen. Die Elimination geschieht vorzugsweise durch die Nieren, ausserdem auch durch Haut und Darmschleimhaut, durch die Galle (Taylor) und selbst durch die Lungen (Flandin). Deposition in innern Organen, z. B. der Leber, scheint nur auf kürzere Zeit stattzufinden und die Elimination der gesammten eingeführten Arsenmenge meist in 14 Tagen (Orfila, Geoghegan), ausnahmsweise in etwas längerer Frist (in 25 Tagen nach MacLagan) vollendet.

In der toxikologischen Literatur finden sich zahlreiche Fälle von Arsenvergiftung nach Anwendung der arsenigen Säure als Aetzmittel oder nach der Anwendung in Salbenform bei Hautausschlägen, z. B. Scabies, sowie nach Einführung des Giftes in Vagina und Uterus. Im Blute ist Arsen nach Einverleibung löslicher Arsenikalien rasch nachweisbar, dagegen nicht in der Lymphe. Arsenik geht in alle Organe, selbst in die Knochen (Hertwig, Taylor, E. Ludwig), bei Vögeln selbst in Schnäbel und Klauen, sowie in die Eier (Taylor) über; Mareska und Lardos constatirten es auch in der Placenta, im Fötus, nicht aber in der Amniosflüssigkeit. Skolosuboffs Behauptung, dass das Gehirn vorzugsweise zur Deposition diene, ist von E. Ludwig widerlegt, nach dessen Untersuchungen die Muskeln 3mal, die Leber 89mal und die Nieren sogar 135mal so viel Arsenik wie das Gehirn bei acutem Arsenicismus enthalten. Die Elimination durch die Nieren beginnt bei arseniger Säure in der Regel nach 6—8 Std., bisweilen erst am zweiten Tage, bei Kaliumarseniat schon nach einer Stunde. Chatin constatirte Arsen im Serum einer Vesicatorblase, was für die Elimination durch die Haut spricht. Ausnahmsweise scheint Arsen länger als 25 Tage im Körper zu verweilen; so fanden Flandin und Danger dasselbe spurenweise bei Schafen 35 Tage nach der Einführung.

Im Organismus wird nach Binz und Schulz die arsenige Säure z. Th. zu Arsensäure oxydirt, welche ihrerseits wieder eine Reduction zu Arsen erfährt.

Diese Angabe, auf welche Binz und Schulz eine besondere Theorie der Arsenikvergiftung gegründet haben, ist keineswegs unbestritten; namentlich will Dogiel eine Oxydation der arsenigen Säure im Thierkörper nicht constatirt haben. Binz und Schulz haben den Nachweis der Reduction von Arsensäure zu arseniger Säure im Thierkörper und den der Oxydation der arsenigen Säure



zu Arsensäure beim Contact der ersteren mit frischem Protoplasma constatirt, doch giebt nicht alles Protoplasma das nämliche Resultat, das z. B. in verschiedener Weise an Darm- und Lebersubstanz, dagegen nicht an Hirn- und Muskelsubstanz hervortritt. Gekochte Lebersubstanz giebt mit arseniger Säure keine Arsensäure. Wie arsenige Säure soll sich auch nach Binz und Schulz das Kaliumarseniat verhalten, welches in Kaliumarsenit übergeht.

Im Darmcanal geht die arsenige Säure vorwaltend in Natriumarseniat über, das als solches zur Resorption gelangt. Ein Theil wird durch den Schwefelwasserstoff in gelbes Schwefelarsen verwandelt, welches sich häufig bei acuter Arsenvergiftung in den Eingeweiden constatiren lässt.

Die Erscheinungen, welche Arsenik und lösliche Arsenikalien überhaupt hervorbringen, sind nach der ingerirten Menge verschieden. In grösseren Mengen sind sie intensive Gifte nicht allein für den Menschen, sondern für alle Wirbelthiere und wirbellosen Thiere und selbst für Pflanzen. Die Symptome des acuten Arsenicismus beschränken sich nach Vergiftung mit weissem Arsenik in Substanz oft auf die der Gastroenteritis toxica mit heftigem Durst, Trockenheit im Halse und häufig sehr intensiven Schmerzen im Magen und Abdomen, womit in der Regel Nephritis mit verminderter Harnsecretion, nicht selten auch als weiterer Ausdruck entfernter Wirkung Schmerzen in den Extremitäten, häufig Ameisenkriechen und Abnahme des Gefühls in den Extremitäten, Schwindel, Eingenommensein des Kopfes, Delirien, Lähmungserscheinungen sich compliciren. Solche nervöse Symptome können nach Beseitigung der Darmerscheinungen auch persistiren und bei Vergiftung mit nicht ätzenden Arsenikalien, seltener auch bei Intoxication mit arseniger Säure, ohne Symptome von Entzündung des Tractus vorkommen (sog. Arsenicismus cerebrospinalis). Bei der Section findet sich bei Menschen und Thieren ausser dunkelblutrother Färbung, Ekchymosirung und Schwellung der Schleimhaut des Magens und des Darms bei nicht allzukurzer Dauer der Intoxication auch fettige Degeneration der Leber, der Nieren und des Epithels der Harncanälchen, des Herzfleisches, der quergestreiften Muskeln und selbst des Epithels der Magendrüsen. Sehr auffallend ist die mumienhafte Verschrumpfung und Vertrocknung der Leichname mit Arsen vergifteter Menschen und Thiere, welche sich selbst Jahre lang in diesem Zustande erhalten können.

Bezüglich der Behandlung des acuten Arsenicismus muss auf die Abschnitte über Antidotum Arsenici und Magnesia verwiesen werden. Leichtere Intoxicationserscheinungen können schon durch 0,01 arseniger Säure bedingt werden und treten nach 0,02—0,03 stets hervor; Kaliumarseniat ist seiner leichteren Löslichkeit wegen giftiger als arsenige Säure, wenn letztere nicht gelöst ist. Vom gepulverten Arsen können 2,0, vom gelösten Arsen schon 0,1—0,2 den Tod herbeiführen. Die enorme Giftigkeit des Arsenwasserstoffs ist bekannt. Die Symptome und der Leichenbefund decken sich vollständig bei interner Einführung und bei Infusion gelöster arseniger Säure. Vom Magen aus wirkt letztere deleterer als bei subcutaner Application oder bei Infusion.

Bei Einführung kleiner medicinaler Dosen von Arsenikalien kann durch dieselben in einzelnen Fällen ein Zustand chronischer Vergiftung herbeigeführt werden, welcher mit Röthung der Binde-

haut des unteren Augenlides, Trockenheit des Auges, der Nase und des Schlundes und mit leichter Heiserkeit, bisweilen mit Magenschmerzen und Diarrhoe beginnt, und wenn das Mittel nicht fortgelassen wird, zu einem ähnlichen Bilde von chronischem Arsenicismus führen soll, wie es bei Hüttenarbeitern beobachtet ist.

Bei Arbeitern in Arsenhütten entwickeln sich nach der Schilderung von Klose in Reichenstein zunächst juckende pustulöse Hautausschläge (früher unzweckmässig als *Eczema arsenicale* bezeichnet), Anschwellungen der Haut am Scrotum und in den Achselhöhlen, sowie Geschwüre an den Fingern und Kahlköpfigkeit; dann ausser diesen, wohl vorzugsweise auf die verstäubte arsenige Säure zu beziehenden Phänomenen, die bei Vergiftung durch längere Zeit hindurch fortgesetzte interne Anwendung kaum in ausgedehnterem Maasse vorkommen, Verdauungsbeschwerden, Dysurie und selbst Ischurie, Neuralgien (Ischias, Propalgie), Paralyse der Extremitäten, mit Ameisenkriechen, Verminderung der Sensibilität und Kältegefühl (analog den Residuen bei acutem Arsenicismus), endlich hektisches Fieber und Hydrops. Aehnliche Symptome sind auch nach dem Bewohnen von Zimmern, welche mit arsenhaltigem Anstriche oder arsenhaltigen Tapeten bekleidet sind, beobachtet. Bei der Behandlung von Lymphomen mit steigenden Dosen von Fowlerscher Solution kommt es zu Schlaflosigkeit, Unruhe, Aufregtheit oder melancholischer Gemüthsstimmung und Muthlosigkeit, constant zu fieberhaften Erscheinungen (Arsenifieber), welches entweder als continuirliches, mit Steigerung am Abend und Abfall am Morgen, oder paroxystisch unter dem Bilde einer Quotidiana auftritt (Winiwarter).

Gewissermaassen paradox erscheint diesen chronischen Intoxicationen gegenüber die Möglichkeit, dass durch allmählig gesteigerte Dosen von Arsenikalien eine Toleranz des Organismus selbst gegen solche Gaben, die unter gewöhnlichen Verhältnissen letal wirken würden, acquirirt werden kann, wie dies zahlreiche Erfahrungen am Krankenbette und besonders die in Steiermark herrschende Unsitte der Arsenophagie beweist, wobei sogar der Consum des Arsens in kleinen Mengen in manchen Fällen zu einer Zunahme des Körpergewichts und der Körperfülle, zu einem vorzüglichen Aussehen der Haut und Haare, ja selbst zu Erleichterung der Respiration und beschwerlicher körperlicher Arbeiten führen kann.

Wie grosse Mengen Arsen von einzelnen Kranken auf die Dauer tolerirt werden können, ohne chronischen Arsenicismus zu bedingen, beweist die Angabe von Hebra, der bei einzelnen Psoriasiskranken 2000 Asiatische Pillen, entsprechend 10,0 Acidum arsenicosum, ohne Schaden nach und nach consumiren liess.

Die Unsitte des Arsenikessens besteht vorzugsweise im nördlichen und nordwestlichen Theile von Steiermark, wo man sich der arsenigen Säure oder (seltener) des gelben Schwefelarsens bedient. Die Arsenikesser fangen mit der Dosis von der Grösse eines Hirsekorns an und steigen allmählig bis 0,2 — 0,4, ja selbst 1,0 (Knapp) und 1,5 (Heisch), welche Mengen entweder täglich oder ein um den andern Tag oder 1—2mal wöchentlich genommen werden. Gleich nach dem Genusse vermeiden sie das Trinken; eine besondere Diät wird meist nicht eingehalten, nur Einzelne hüten sich vor Fettgenuss. Dagegen ist es in einzelnen Bezirken Sitte, den Arsenikgenuss zeitweise auszusetzen und zwischendurch Aloë zu nehmen, wodurch vielleicht die Befreiung des Organismus vom Arsen bewerkstelligt wird. Die Arsenikesser sind durchgängig kräftige und gesunde Männer, zu Strapazen im hohen Grade befähigt; es giebt darunter Personen, welche von ihrem 18. Lebensjahre an bis zum hohen Alter Arsen consumiren. Frauen geniessen selten Arsen, und wo es der Fall ist, in der Absicht, sich eine stärkere Körperfülle zu verschaffen. Bei Männern ist bisweilen Schwerathmigkeit Veranlassung zur Arsenophagie, meist der Wunsch

grössere Arbeitsleistungen ausführen und namentlich Berge mit Leichtigkeit besteigen zu können. Beim Aussetzen fühlen die Arsenikesser häufig Schwäche, die sie zu erneutem Genusse antreibt. Auch die Pferde werden in Steiermark, wie übrigens auch in manchen andern Ländern, mit Arsen gefüttert. Die oft angezweifelte Thatsache des Arsenikessens ist durch den Nachweis von Arsen Spuren im Urin eines steirischen Arsenessers erwiesen (E. Schäfer). In andern Ländern kommt Arsenophagie nur ausnahmsweise vor, doch sind vereinzelte Fälle beschrieben, die nicht immer einen gleich günstigen Verlauf hatten und wo in Folge unausgesetzten Consums Magenschmerzen, Strangurie, Diarrhoe mit Tenesmus und selbst der Tod eintrat. Genuss von stark arsenhaltigem Wasser des aus den Blackcomb mountains entspringenden Flusses Whitbeck in Westcumberland soll anfangs Trockenheit im Munde und Schlunde veranlassen, doch tritt rasch Gewöhnung ein und erreichen die Einwohner des Fleckens Whitbeck, welche kein anderes Wasser geniessen, durchgängig ein hohes Alter. Die consumirte Arsenmenge scheint hier indessen weit geringer als in Steiermark zu sein. Dass auch bei Thieren Gewöhnung an Arsen stattfindet, ist nicht nur bei Pferden, sondern auch bei Kaninchen (Roussin, Cunze) nachgewiesen.

Die physiologischen Versuche über die Einwirkung der Arsenikalien auf den gesammten Stoffwechsel und auf die einzelnen Systeme und Organe haben keineswegs überall zu vollkommen gleichen Resultaten geführt. Die Ergebnisse sind z. Th. einander so widersprechend, dass es uns nicht befremden kann, dass in Bezug auf die Theorie der Arsenwirkung, sei es der toxischen, sei es der medicamentösen, die heterogensten Anschauungen sich Bahn gebrochen haben und dass die Einen z. B. den Arsenik für ein Fieber erzeugendes Mittel erklären, während ihn Andere als ein Antipyreticum bezeichnen. Von Manchen ist besonders auf eine den Arsenikalien zukommende Beschränkung des Stoffwechsels als Erklärungsgrund für eine Reihe Erscheinungen hingewiesen, während Einzelne einen Wechsel von Anziehung und Abgabe von Sauerstoff als eigentliches Wesen der Arsenwirkung betrachten. Von den meisten Autoren als auf verschiedene Theile des Nervensystems herabsetzend und lähmend wirkend angesehen, ist Arsenik von Anderen geradezu als Neurosthenicum hingestellt.

Es lässt sich nicht leugnen, dass manche dieser Gegensätze darauf beruhen, dass die Differenzen der Wirkung kleiner und grosser Dosen nicht geschieden sind. Gewiss aber ist es, dass nicht, wie man aus febril verlaufenen Fällen von Arsenicismus acutus hat schliessen wollen, die arsenige Säure ein pyretogener Stoff ist und dass, wo bei acuter Arsenvergiftung febrile Erscheinungen auftreten, diese als Folge der bestehenden Entzündung im Darm anzusehen sind. Worauf das Fieber bei der Arsenikur maligner Lymphome (Winiwarter) beruht, steht dahin. Bei acuten Vergiftungen mit Natriumarseniat bei Thieren findet sich stets beträchtliches Sinken der Temperatur bis zum Tode; dasselbe ist der Fall bei Einführung kleiner Mengen desselben Salzes längere Zeit hindurch fortgesetzt (Cunze). Es ist somit Sinken der Temperatur, wie auch Lolliot bestätigt, als Resorptionswirkung des Arsens zu betrachten. Wie diese Erscheinung für eine Herabsetzung des Stoffwechsels spricht, so wird dieselbe auch durch Thierversuche von Schmidt und Stürzwage durch eine Verminderung der Kohlensäureausscheidung nach toxischen Dosen arseniger Säure erwiesen. In Bezug auf die Ausscheidung des Harnstoffs divergiren die Resultate; den Beobachtungen von Schmidt und Bretschneider, Rabuteau und Lolliot, wonach Arsenikalien eine Verminderung des Harnstoffs bedingen sollen, nach Rabuteau selbst um 60%, stehen Untersuchungen von Fokker bei einem im Stickstoffgleichgewicht befindlichen Hunde mit kleinen Dosen Arsen gegenüber, wobei keine Abnahme der Harnstoffausscheidung erfolgte.



Auch Gätthgens und Kossel haben bei vorsichtig gesteigerter und später toxischer Gabe von Arsensäure (als Natriumsalz genommen) eine Steigerung der Stickstoffausscheidung constatirt, doch betont Boeck, dass es nicht gestattet sei, hiervon auf die Abhängigkeit des Arsenicismus acutus und chronicus vom Stoffwechsel zu schliessen, da einerseits eine analoge Steigerung durch nicht toxische Stoffe, z. B. Chlornatrium, hervorgebracht wird, andererseits die Höhe der Steigerung der Harnstoffausscheidung nicht derjenigen beim Phosphorismus acutus annähernd gleichkommt. Für eine Oxydationshemmung spricht ferner die eigenthümliche Beobachtung Canzes, dass bei Thieren, die nach Einspritzung von Natriumarseniat in die Jugularis rasch getödtet werden, die Contractionen des Herzens und besonders des rechten Vorhofes viel länger als unter gewöhnlichen Verhältnissen, selbst bis 19 Std. nach dem Tode fortdauern, was nur bei Säugethierherzen, nicht aber bei Froschherzen sich zeigt.

Die Hemmung der Oxydation steht ferner im Einklange mit dem Fettansatze der Arsenik essenden Steiermärkerinnen, deren Vermehrung der Körperfülle ein Pendant in E. Kopps Selbstbeobachtung findet, der in Folge von Arbeiten mit Arsen, wobei eine Einverleibung nicht zu vermeiden war, im Laufe von 2 Monaten 20 Pfd. schwerer wurde. Zunahme des Gewichtes hat auch Vaudrey bei mehreren Versuchspersonen nach längerer Darreichung von 0,001 bis 0,006 arseniger Säure, ebenso in rapider Weise nach grösseren Dosen auftreten gesehen, doch blieb es im ersteren Falle zweifelhaft, in wie weit die gleichzeitig bestehende Steigerung von Appetit und Durst dazu contribuirte. Ist der Arsen wirklich ein Hemmungsmittel der Oxydation und findet in der That auch bei kleineren Dosen der Arsenikalien verminderte Ausscheidung von Kohlensäure statt, so liesse sich der Fettansatz allerdings aus unvollständiger Verbrennung der eingeführten Kohlehydrate erklären. In gleicher Weise findet sich in letzterer auch eine Erklärung für die Leichtigkeit der Bewegungen und die ausserordentliche Arbeitsfähigkeit der Arsenikesser, indem bekanntlich die Oxydationsprocesse vorzugsweise in den Muskeln stattfinden und in Folge einer Herabsetzung derselben weniger Fleischmilchsäure gebildet wird, in deren Auftreten die Ursache der Ermüdung gesucht werden muss. Möglicherweise ist auch die durch kleine Gaben Arsen bedingte Leichtigkeit des Athmens, welche von Vaudrey u. A. auf eine besondere Wirkung des Arsens auf den Vagus bezogen wird, der Ausdruck einer solchen Hemmung der Oxydationsvorgänge in der Muskulatur der Brust, wozu vielleicht der das Athmungsbedürfniss herabsetzende Einfluss der Kohlensäureverminderung im Blute als zweites Moment hinzukommt (Rabateau).

Directe Herabsetzung der Fähigkeit des Blutes, Sauerstoff aufzunehmen, wollen Delpench und Fery nachgewiesen haben, und immerhin ist diese Beschränkung der Absorptionsfähigkeit des Bluts für Oxygen ein besserer Erklärungsgrund für die durch Arsen bedingte Oxydationshemmung als die von Munk und Leyden früher supponirte directe Sauerstoffentziehung, die bei den zur Erzielung der Wirkung ausreichenden minimalen Mengen wohl nicht in Betracht kommen kann. Man müsste dabei natürlicherweise auch eine Ueberführung der arsenigen Säure in Arsensäure annehmen, die, wenn sie die neueren Untersuchungen von Binz und Schulz auch für das Parenchym bestimmter Organe wahrscheinlich machen, dennoch für das Blut als zweifelhaft angesehen werden muss. Selbst Binz und Schulz bezeichnen das Blut als ein zur Entscheidung der Frage über die Umwandlung der arsenigen Säure in Arsensäure ungeeignetes Object. Dass die arsenige Säure im Blute nicht ohne Einfluss auf die rothen Blutkörperchen bleibt, ist unzweifelhaft. Schon die Beobachtung von Schmidt und Bretschneider, wonach die resorbirte arsenige Säure nur im Blutkuchen, nicht aber im Serum sich findet, spricht für eine Beziehung der Erythrocyten zu dem Arsen. Wie bei directem Zusatze grösserer Mengen arseniger Säure zu Blut die rothen Blutkörperchen aufgelöst werden, während bei kleinen Mengen Farbe und Form lange unverändert bleibt, während Arsensäure das Blut schneller dunkel macht und zur Veränderung der Form und Grösse der Blutkörperchen rascher führt (Dogiel), so tritt auch bei steigenden medicamentösen Dosen Abnahme der Zahl der rothen Blutkörperchen ein (Delpench), wobei jedoch der Hämoglobingehalt der einzelnen Körperchen entschieden steigt. Spectroskopisch kann beim Warmblüter nach arseniger Säure Veränderung des Häm-

globins im Blute nicht nachgewiesen werden (Filehne). Dagegen verändert Arsenwasserstoff das Hämoglobin (Koschlakow) und erzeugt damit im Zusammenhange Hämoglobinurie, welche in der Vergiftung mit anderen Arsenikalien, wenn sie auch vereinzelt vorkommt (Vrijens), nur eine unbedeutende Rolle spielt.

Dass die arsenige Säure auf die Eiweissbestandtheile des Organismus in besonderer Weise influirt, ist aus den mitgetheilten Daten ersichtlich. Es erhellt dies auch aus den Versuchen Selmis, wonach bei Fütterung mit Natriumarseniat das Arsen theilweise als organische Verbindung in Form einer oder mehrerer arsenhaltiger Basen im Harn erscheint. Einen weiteren Beweis einer solchen Alteration liefert die bei acuter und subcutaner Vergiftung in der Regel zu constatirende fettige Degeneration verschiedener Organe, welche allerdings gewöhnlich nicht den hohen Grad erreicht, welchen die Phosphorvergiftung meist darbietet.

Den Grund der Veränderungen überhaupt sucht man allgemein in einer Wirkung des in dem *Acidum arsenicosum* enthaltenen Elements Arsen. In neuester Zeit haben jedoch Binz und Schulz die Hypothese aufgestellt, dass das Arsen nicht an sich giftig wirke, sondern gewissermassen nur Träger der giftigen Eigenschaften sei und dass die giftige Action der Arsenikalien eigentlich als Wirkung nascirenden Sauerstoffs aufgefasst werden müssen. Indem die arsenige Säure sich zunächst zu Arsensäure oxydire, diese dann wieder Sauerstoff abgebe und dieser Process sich *ad libitum* reiterire, soll ein fortwährendes Hin- und Herschwingen des Sauerstoffs von Molecül zu Molecül stattfinden und durch die gesteigerte Oxydation in den Geweben nicht allein der Symptomencomplex der Vergiftung, sondern auch der therapeutische Effect der Arsenikalien bedingt werden. Diese Hypothese hat zunächst den Umstand gegen sich, dass analoge Beziehungen zum Sauerstoff auch die Ferro- und Ferrisalze zeigen, ohne dass dabei jedoch toxische Wirkung eintritt. Ferner ist es unerklärlich, wie eine solche Schwingung auch in Verbindungen statthaben soll, in denen die Arsenatome mit anderen Elementen als Ofest verbunden sind. Wir wissen, dass fast sämtliche arsenikhaltige Verbindungen, soweit sie resorbirbar sind, nach ihrer Aufnahme ins Blut den nämlichen Symptomencomplex bedingen, wie die arsenige Säure. Es ist dies z. B. bezüglich der Dimethyl- und Diphenylarsinsäure (H. Schulz), sowie der Benzarsinsäure der Fall (Schröter), doch wirken alle diese Verbindungen, welche nicht allein den Symptomencomplex der acuten, sondern auch den der chronischen Arsenikvergiftung zu erzeugen vermögen, weniger giftig als Arsensäure und arsenige Säure. Die Hypothese von Binz und Schulz würde aber voraussetzen, dass die Arsenikalien und in specie Arsensäure und arsenige Säure den nämlichen Grad der Giftigkeit besäßen. Man sollte sogar, wenn der mit den Geweben in Wechselwirkung tretende nascirende Sauerstoff die Ursache der Arsenwirkung wäre, meinen, dass die Arsensäure, insofern von dieser die Sauerstoffatome sich abspalten, giftiger sein müsste als die arsenige Säure, welche nur sauerstoffentziehend wirkt. Nichts destoweniger ist nach wiederholten genauen Untersuchungen die Arsensäure und deren Natriumverbindung sowohl für Vertebraten als für wirbellose Thiere, z. B. Fliegen, weit weniger giftig als die arsenige Säure, so dass eine dieselbe Menge As einschliessende Menge arsenige Säure weit rascher letale Intoxication als die entsprechende Quantität Arsensäure hervorbringt. Auch sind bei Einführung von Arsensäure in den Magen die örtlichen Erscheinungen relativ geringer als beim *Acidum arsenicosum*. Man könnte daher gerade in Bezug auf die kaustische Wirkung geneigt sein, damit, wie Cunze gethan, die Hemmung der Oxydationserscheinungen in Zusammenhang zu bringen.

Nicht minder differirend sind die Anschauungen in Bezug auf die Beeinflussung der verschiedenen Nervengebiete durch die arsenige Säure. Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass die verschiedenen Nervenstörungen als consecutive Erscheinungen des acuten Arsenicismus oder bei chronischer Arsenintoxication, wenn sie auch z. Th. mit nutritiven Störungen zusammenhängen, doch theilweise auch als directe Wirkung auf das Nervensystem und zwar auf die Nervencentren anzusehen sind. Paralytische Erscheinungen treten namentlich prägnant bei acuter Arsenvergiftung von Fröschen hervor; bei diesen cessirt nach den Versuchen von Sklarek zunächst die spontane Muskelaction in Folge

centraler Einwirkung, da weder die Muskeln noch die peripherischen Nerven functionsunfähig sind; dann wird die Sensibilität beeinträchtigt und bei intactem Muskelgefühl die Empfindung gegen kaustische und chemische Reize herabgesetzt, und zwar ebenfalls vom Centrum aus, wobei wahrscheinlich die graue Substanz des Rückenmarks betroffen ist. Dass die Erscheinungen nicht auf einer Prädilection des Arsens zum Gehirn oder Rückenmark und einer Aufspeicherung des Metalls in diesen Theilen (Skolosuboff) beruhen, haben E. Ludwig und Vrijens (1881) übereinstimmend dargethan. Vrijens hält für das Wesen der toxischen Wirkung des Arsens eine Herabsetzung der Function und Erregbarkeit des gesammten Nervensystems, ohne dass es möglich sei, ein specifisch afficirtes Nervengebiet als Ort der Wirkung dem Gifte zuzuweisen. Im Gegensatze zu dieser Anschauung, welche darauf basirt, dass bei Integrität der directen Muskeleerregbarkeit die indirecte Reizung während der Arsenvergiftung nur schwache Contractionen auslöst und dass beim Fortschreiten der Intoxication die verschiedensten Nervengebiete (Depressores, Vagi, vasomotorisches Centrum) weniger erregbar werden, vindicirte Böhm (1874) dem Gifte eine besondere lähmende Wirkung auf die Gefässe des Unterleibes, welche in der Stauungshyperämie der Abdominalorgane ihren Ausdruck finde und im Verein mit einer starken Herabsetzung der Herzenergie die Ursache der bedeutenden Herabsetzung des Blutdrucks sei, welche nach den verschiedensten Untersuchungen (Böhm und Unterberger, Lesser, Vrijens, Dogiel) die acute Arsenvergiftung charakterisirt. Dieselbe kann mit wechselnden Veränderungen der Herzschlagzahl, über deren Zustandekommen die einzelnen Autoren differente Anschauungen haben, auch nach kleineren Arsenmengen vorkommen und ist ohne Zweifel vom vasomotorischen Centrum unabhängig (Böhm, Lesser). Kleine Dosen beschleunigen, grosse verlangsamen den Blutstrom nach primärer Acceleration (Dogiel). Das Athemcentrum wird unabhängig von der Circulation durch arsenige Säure anfangs erregt, später herabgesetzt. Beim Warmblüter überdauert der Herzschlag stets die Athmung, während bei Fröschen das Gegentheil der Fall ist (Lesser).

Als besondere Nervenwirkung der Arsenikalien ist von Imbert Gourbeyre eine Herabsetzung des Geschlechtstriebes hervorgehoben, doch widersprechen dem die Verhältnisse der steirischen Arsenophagen vollständig.

Als eine eigenthümliche Wirkung der Arsenikalien wird die Zerstörung des Glykogens in der Leber bezeichnet. Die Angabe von Saikowski, dass bei mit Arsenikalien gefütterten Thieren durch die sog. Piquüre oder durch Curarisation kein Diabetes hervorgerufen werde, scheint nach Bimmermann und Lehmann irrig. Polyurie ist bei chronischer Arsenvergiftung von Thieren ein nicht seltenes Phänomen. Auch kommt Zucker im Harn bei acuter Arsenvergiftung vor (Vrijens).

Als Medicament haben die Arsenikalien die grösste Bedeutung bei Dermatosen, unter denen besonders die Psoriasis am häufigsten durch dieselben in günstiger Weise beeinflusst wird. Ueberhaupt scheinen schuppenförmige Exantheme vorzugsweise für den Arsengebrauch zu passen, während bei papulösen und pustulösen Exanthemen, sowie bei Ulcerationen, Arsenik eher verschlimmernd als bessernd wirkt.

Von der Heilwirkung des Liqueur Kali arsenicosi bei idiopathischer Psoriasis hat sich mancher Arzt, welcher sie nach dem Vorgange von Romberg und Veiel gegen dieses Leiden anwendete, überzeugt, und die Erfahrungen deutscher Aerzte werden durch auswärtige Dermatologen (Biétt, Cazenave, Hardy, Wilson, Thomson, Hunt u. A.) bestätigt. Obschon manche Fälle durch das Mittel nicht geheilt werden, sondern nur temporäres Verschwinden des Ausschlages zeigen, ist doch in den meisten eine Verminderung der Schuppen, ein Abblässen der Flecke und eine Abnahme des Juckens nach etwa 14tägiger Behandlung bemerkbar. Die gleichzeitige Anwendung äusserer Medicamente (Theer, Waschungen) ist dabei unnöthig. Die Anwendung bei andern Hautaffectionen, z. B. Elephantiasis, wogegen Arsenik seit Alters her in Indien Anwendung findet, Alopecie, Prurigo, ist in der Regel von minder günstigem Er-



folge. Auch bei Eczema chronicum universale lässt sie meist im Stich. — Dass Arsenik auf die äussere Haut einen besondern Einfluss ausübt, beweisen die alten Erfahrungen bei Pferden, deren Fell dadurch eine glänzendere Beschaffenheit annimmt. Ist der günstige Erfolg bei Dermatosen auf Eliminationswirkung und nicht etwa auf Beseitigung einer herpetischen Krase zu beziehen, wie man früher glaubte, so erklärt sich sehr leicht, dass bei bestehender stärkerer Hautentzündung dieselbe gesteigert wird und daher die Arsenikalien bei solchen geradezu contraindicirt sind.

In zweiter Linie erweisen sich die Arsenikalien wirksam gegen Intermittens, wo sie jedoch unbedingt dem Chinin nachstehen und nur dann Anwendung verdienen, wenn das Wechselfieber durch letzteres nicht geheilt wird.

Schon vor der Mitte des 17. Jahrhunderts als Quacksalbermittel in Gebrauch, wurde Arsenik um 1670 von Slevogt und Melchior Frick als Febri-fugum allgemeiner bekannt; seine Anwendung fand dann an Störk einen entschiedenen Gegner. Später lenkten Fowler, Pearson, Heim die Aufmerksamkeit auf das Mittel, welches jedoch in allen Ländern bis in die neueste Zeit hinein auf hartnäckige Opposition stiess, die z. B. in Frankreich, wo Boudin und verschiedene in Algier stationirte Militairärzte die antitypische Wirksamkeit des Arsens sicher stellten, theilweise noch jetzt fortdauert. So weit unsere eigene Erfahrung reicht, ist Arsenik in frischen Fällen von Intermittens überflüssig, dagegen kommen inveterirte Formen, besonders mit quartanem Typus vor, wo nach erprobter Unwirksamkeit des Chinins Arsenik curativ wirkt. Die Befürchtung, dass das Mittel hier Vergiftungserscheinungen bedinge, fällt weg, wenn man die Dosis zweckmässig einrichtet, da nicht etwa, wie beim Chinin, ein Coupinen der Anfälle durch grosse Dosen Zweck der Medication sein darf. Bei perniciossem Wechselfieber ist Arsenik entschieden unzulässig. Die Theorie der Wirkung des Arsens bei Intermittens ist bis jetzt unklar. Da er nach Isnard u. A. von günstigstem Einflusse auf Malaria cachexie ist, lässt sich eine directe Wirkung auf den Intermittensprocess annehmen.

Eine besondere Bedeutung haben die Arsenikalien in der Behandlung maligner Lymphome und Lymphosarkome (Winiwarter, Billroth, Czerny, Chiari), wo man die Fowlersche Solution theils curmässig intern verabreicht, theils parenchymatös injicirt. Auch liegen nicht wenige Fälle vor, wo sich Arsen in langsam steigenden Dosen bei Leukämie und perniciosser Anämie bewährte (Malthé).

Bei allen übrigen Dyskrasien und Diathesen, wo Arsenikalien versucht wurden, — und es ist dieses fast bei allen derartigen Zuständen der Fall gewesen — ist man von dem Gebrauche derselben fast vollständig zurückgekommen. Bei Syphilis, wogegen Arsenik schon im 17. Jahrhundert von David de Plan-tecampy benutzt wurde, ist er zwar nicht unwirksam und wirkt namentlich bisweilen auf Knochenschmerzen günstig, steht jedoch dem Iod und Quecksilber bei Weitem nach. Ganz verwerflich erscheint die Anwendung bei Gicht, Scrophulose, Tuberculose, Caries, Krebs und ähnlichen Affectionen; Typhus und asiatischer Cholera, deren Behandlung von einzelnen Aerzten als erfolgreich bezeichnet wurde. Der Gebrauch bei giftigem Schlangenbiss, wo die sog. Tan-jorepillen (Arsenik mit Quecksilber) früher in Ansehen standen, und gegen Wasserscheu hat sich nicht bewährt. Ueber die Wirkung bei Rotzkrankheit (Mackenzie) liegen Beobachtungen in genügender Zahl nicht vor. Bei Diabetes, gegen welchen früher Hoog eine Mischung von Kaliumarseniat und Schwefel-ammonium, später Leube Fowlersche Solution empfahl, kann man durch Arsen zwar die Zuckermenge im Harn herabdrücken, jedoch nicht ohne Störung des Allgemeinbefindens (Herz und Lehmann).

Sehr guten Erfolg hat Arsenik in manchen Fällen von Neuralgien, und zwar nicht nur bei frischen oder inveterirten perio-

dischen, sondern auch bei atypischen Formen, gleichviel in welchen Nerven dieselben ihren Sitz haben. Auch bei manchen andern Neurosen, zumal bei Chorea, hat Arsen Empfehlung gefunden, ohne jedoch allgemein in Anwendung gezogen zu werden. Besonders gerühmt werden Arsenikalien bei asthmatischen Beschwerden.

Dass selbst sehr hartnäckige Fälle von Neuralgien, welche allen andern Mitteln trotzten, durch Arsen geheilt werden können, beweisen verschiedene Beobachtungen. Genaue Indicationen für die Anwendung des Mittels lassen sich jedoch nicht feststellen. Nach Romberg soll Arsen am wirksamsten bei stark anämischen Kranken und bei Neuralgien sein, denen Leiden des Uterus und der Ovarien zu Grunde liegen. Nach Isnard, welcher Arsenik als allgemeines Tonicum des Nervensystems empfahl, ist es von dem geringsten Erfolge bei Ischias, was auch von Cahen bestätigt wird. Bei Chorea ist allerdings in sehr alten Fällen sehr oft ein Nutzen nicht verkennbar, doch widerstehen auch diese häufig der Arsenotherapie. Die Anwendung gegen Epilepsie, Keuchhusten, Apoplexie (Lamard-Picquot) scheint ohne besondere Bedeutung. Bei Tetanus erklärt es sogar Isnard für wirkungslos, welcher sonst das Medicament in einer Reihe von Affectionen empfiehlt, wo es bisher entweder gar nicht angewendet wurde oder Andern seinen Dienst versagte. So rühmt er den Arsenik in allen Fällen von Nervosismus (nach schweren Krankheiten, während der Gravidität und Lactation, in der Pubertätsperiode und während und nach der Menopause), ferner bei Chlorose, wo er bei Recidiven und Complicationen mit Neurosen dem Arsen den Vorzug vor dem Eisen giebt, ja selbst bei Adynamie, in der Reconvalescenz von acuten Krankheiten, bei Delirien und Collaps auf der Höhe oder gegen das Ende schwerer febriler Affectionen, endlich bei allen Kachexien. Inwieweit hier reelle Erfolge zu erzielen sind, müssen weitere nüchterne Beobachtungen lehren. Gewiss ist es, dass bei Tuberculose, bei welcher Isnard selbst das Mittel im dritten Stadium anwandte, manchmal eine Besserung der Diarrhoe, des Auswurfs und selbst des hektischen Fiebers erfolgt, dass aber von einer Heilung absolut nicht die Rede sein kann und in der Regel das Körpergewicht sinkt. Erfolge bei Asthma sind neuerdings von Trousseau und Sée gerühmt. Dujardin-Beaumetz rühmt Arsen als Tonicum statt Eisen bei compensirten Mitralisaffectionen. Die bei den Arsenophagen beobachtete grössere Leichtigkeit des Athmens wird mit diesen Effecten gewöhnlich in Zusammenhang gebracht. Bei eigentlichem Emphysem bleibt Arsenik ohne jeden Nutzen.

Die mannigfache Opposition, welche die Arsenotherapie jeder Zeit gefunden hat, nicht weil sie unwirksam ist, sondern weil sie Leben und Gesundheit der Kranken bedrohe, ist jetzt ziemlich verstummt und es giebt sogar jetzt mehr Arsenenthusiasten als Arsenophoben. Es lässt sich auch nicht leugnen, dass bei zweckmässiger Anwendungsweise das Mittel gar keine Gefahren bedingt. Beschränkung der Dosen und Darreichung bei gefülltem Magen verhütet acute Vergiftung; ebenso ist man im Stande, chronischer Intoxication vorzubeugen, wenn man das Mittel aussetzt, sobald sich Conjunctivitis zeigt, welche meist das erste Phänomen der Vergiftung ist, oder sobald gastrische Störungen sich einstellen. Von Wichtigkeit ist es auch, für Leibesöffnung zu sorgen, um das im Darm eliminirte Gift fortzuschaffen. Im Uebrigen giebt es, von bestehenden Magen- und Darmkatarrhen abgesehen, kaum eine Contraindication. Kinder ertragen Arsenikalien recht gut, auch anämische Personen; Plethorische sollen ihn sogar schlechter toleriren (Romberg). Gravidæ ertragen nach Isnard das Mittel vorzüglich und soll Abortus nicht zu befürchten sein.

Dagegen bietet die externe Anwendung als Reizmittel bei verschiedenen Hautaffectionen, wie wir bereits früher hervorhoben, Gefahren durch die Möglichkeit einer Resorption grösserer Mengen arseniger Säure. Man hat in dieser Richtung fast ausschliesslich das Acidum arsenicosum benutzt, und zwar als Causticum vorzugsweise bei Krebs, Lupus, aber auch bei Geschwüren, brandigen und phagedänischen Schankern (Ricord, Teissier), auch bei Onychia maligna. Trotzdem dass die Aetzwirkung eine beschränkte bleibt und in der Regel schöne glatte Narben hinterlässt, sind doch überall andere Aetzmittel vorzuziehen. Bei Krebs schützt natürlich weder Arsen noch ein anderes Aetzmittel vor Recidiven.

Besondere Empfehlung hat die arsenige Säure zum Aetzen der Zahnnerven und Heilung der Zahncaries vor dem Plombiren der Zähne gefunden.

Was die Verordnung der Arsenikalien anlangt, so wird bei uns gewöhnlich zum inneren Gebrauche der *Liquor Kali arsenicosi* der arsenigen Säure vorgezogen, da jener weniger leicht Druck im Magen und gastrische Reizungserscheinungen bedingt. Man giebt denselben, am zweckmässigsten mit 3—4 Th. eines aromatischen Wassers verdünnt, in Tropfenform, und je nach der Affection, gegen welche man ihn gebraucht, zu 0,01—0,5 pro dosi. Nach der Phkp. sind 0,5 als höchste Einzelgabe und 2,0 als höchste Tagesgabe erlaubt. Von der arsenigen Säure schwanken die Dosen von 0,001—0,005. Letzteres ist die Maximalgabe der Phkp., welche 0,02 als Tagesgabe concedirt.

In Berücksichtigung der Gewöhnung des Organismus an Arsenikalien ist man in praxi gewohnt, dieselben in steigender Dosis zu reichen. Boudin stellt dies geradezu als Hauptregel für die Arsenotherapie hin und es kann auch nicht zweifelhaft sein, dass bei Intermittens, wo im Allgemeinen die höchsten zulässigen Dosen der Arsenikalien ihre Berechtigung haben, man wohl thut, mit diesen nicht zu beginnen, sondern durch Darreichung kleinerer Dosen den Organismus für solche vorzubereiten. Man kann allerdings in manchen Fällen auf diese Weise es dahin bringen, dass der Patient 0,02—0,03 arsenige Säure auf einmal nimmt, aber in der Regel — von wirklicher Malaria-kachexie abgesehen — wird man die Dosis von 0,005, höchstens 0,007 (6—10 Tropfen *Liquor Kali arsenicosi*) zu überschreiten nicht nöthig haben. Viel geringer sind die Dosen, welche man bei Psoriasis zur Erzielung von Heileffecten nöthig hat, wenn man dieselben nur anhaltend gebraucht. Hier genügt die Anwendung von 3mal täglich 3—6 Tropfen Fowlerscher Solution, wie sie Romberg verordnete, in den meisten Fällen, ja es scheint fast, als ob grössere Mengen minder günstig wirkten. Hebra beginnt mit 6 Tropfen, steigt dann alle 2 Tage um 1 Tropfen bis auf 12 und, wenn danach keine Veränderung eintritt, alle 4 Tage um einen weiteren Tropfen (bis 20 und selbst 30 Tropfen) und geht schliesslich wieder allmählig auf die Dosis von 6 Tropfen zurück. Isnard wendet das *Acidum arsenicosum* bei rein chronischen Leiden zu 0,01, bei acut verlaufenden Affectionen zu 0,02 pro die auf 3—4mal vertheilt an. Bei starker Empfindlichkeit beginnt er mit 0,002 und steigt höchstens bis 0,008 pro die. Bei Periodicität lässt er die letzte Gabe 3—5 Stdn. vor dem Anfälle nehmen. Hebra giebt bei Psoriasis in der Regel 3 Pillen von 0,005 arseniger Säure, in hartnäckigen Fällen sogar 12 derartige Pillen. Natürlich muss bei solchen hohen Dosen eine stete genaue Beaufsichtigung des Patienten stattfinden, um nöthigenfalls die bei acuter Arsenikvergiftung nothwendigen Mittel ungesäumt anzuwenden. Bei malignen Lymphomen giebt man Fowlersche Solution mit  $\frac{1}{2}$  apfelsaurer Eisentinctur 2mal täglich nach dem Frühstück und Abendessen in steigender Dosis, wobei man mit 5 Tropfen der Mischung pro dosi beginnt und alle 2—3 Tage um einen Tropfen steigt, bis Vergiftungssymptome eintreten, was meist nach 25—30, bisweilen erst nach 40 Tropfen eintritt (Winivarter).

Ob Arsenik oder Kaliumarseniat besser helfen, ist streitig; wahrscheinlich ist die Wirksamkeit beider nicht eben verschieden. Bei Psoriasis hält Hebra die arsenige Säure für ebenso wirksam, bei Intermittens Mac Culloch dieselbe für wirksamer als *Solutio Fowleri*. Arsenige Säure kann in Pulverform, Pillen (häufig in der öfters variirenden alten Form der *Pilulae Asiaticae*, vgl. Verordnungen) oder in Lösungen administriert werden. Um örtliche Affection des Magens zu verhüten, setzt man häufig Opium hinzu. Zweckmässiger vermeidet man solche dadurch, dass man sie  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  Stunde nach dem Genusse von Speise nehmen lässt. Dasselbe gilt für den *Liquor Kali arsenicosi*. Die hypodermatische Application der *Solutio Fowleri* (mit 2 Th. Aq. dest. verdünnt, zu 1—2 Tropfen), welche bei diversen Neurosen, besonders mit Tremor



verbundenen (Eulenburg), Chorea, Psoriasis u. s. w. versucht wurde, ist wenig im Gebrauch. Fowlers Solution (namentlich die ältere Form mit Spiritus Melissae compositus) wirkt örtlich stark irritierend, ebenso 1% Lösung von arseniger Säure. Zur parenchymatösen Injection bei malignen Lymphomen injicirt man unverdünnte Solutio Fowleri zu einem Theilstrich der Pravazschen Spritze Boudin empfahl bei Asthma das Rauchen mit arseniger Säure imprägnirter Cigarren, sog. Arsencigarren.

Aeusserlich wird arsenige Säure in Pulver-, Pasten- oder Salbenform, ausnahmsweise in Lösungen (z. B. zu Waschungen bei inveterirten Condylomen, zu Injectionen bei Uteruscarcinom) gebraucht.

In früherer Zeit war als arsenhaltiges Aetzmittel namentlich das sog. Cosmische Pulver, Pulvis arsenicalis Cosmi, das auch schlechthin als Causticum arsenicale bezeichnet wurde, in Gebrauch, eine Mischung aus arseniger Säure, Zinnober, Thierkohle und Drachenblut, in keineswegs immer gleichbleibenden Verhältnissen in den einzelnen Pharmakopöen. Die ursprünglich von Baseilhac (Jean de St. Côme, Frère Cosme), Bruder im Orden der Feuillants (gestorben 1781), angegebene Formel enthielt statt Thierkohle Schwammkohle oder gebrannte Schuhsohlen. Das Pulver wurde mit etwas Gummilösung in Pastenform gebracht und  $\frac{1}{2}$ —1 Mm. dick auf die zu ätzenden Krebsgeschwüre gestrichen. Die bei uns übliche Vorschrift, in welcher 40 Th. arsenige Säure auf 120 Th. Zinnober, 8 Th. Thierkohle und 12 Th. Drachenblut kommen, ist stärker als diejenige anderer Pharmakopöen und aus diesem Grunde besser zum Aetzen geeignet, weil danach weniger ausgedehnte Entzündung in der Nachbarschaft eintritt; doch sind die Gefahren der Resorption auch hier vorhanden und ist das Chlorzink unbedingt zweckmässiger. Ob man durch Beschränkung des Aetzens auf kleine Stellen (von nicht mehr als 2—3 Cm. Durchmesser) und durch Aufschieben erneuter Cauterisationen auf mindestens 8 Tage, wo die Ausscheidung der etwa resorbirten Arsenmenge vollendet sein soll (?), das Auftreten von acutem Arsenicismus verhüten kann, wie Manec u. A. behaupten, ist problematisch. Das Verfahren ist ausserdem sehr schmerzhaft. Ähnliche Pulver sind in Frankreich als Poudre oder Pâte de Dubois, P. de Rousselot benutzt. Etwas abweichend ist Dupuytren's Pulver (1—6 Th. Arsenik auf 99 Th. Calomel), welches mehr als Reizmittel bei Geschwüren und Hautleiden in Anwendung kam. Eine Mischung von 1 Th. Pulvis Cosmi und 8 Th. einer als Unguentum narcotico-balsamicum Hellmundi bezeichneten complicirten Salbe (aus 10 Th. Bleiacetat, 5 Th. Tinctura Opii crocata, 30 Th. Perubalsam, 30 Th. Schierlingsextract und 240 Th. Wachssalbe) bildet das nach Art des Cosmischen Pulvers benutzte, nach einem Krebs curirenden Chausseegeldeinnehmer aus der Gegend von Minden benannte Unguentum arsenicale Hellmundi.

### Verordnungen:

- |  |  |
|--|--|
| <p>1) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Liquoris Kali arsenicosi</i> 5,0<br/> <span style="float: right;">(gm. 5)</span><br/> <i>Aquae Menthae piperitae</i> 15,0<br/> <i>M. D. S.</i> Dreimal täglich 8 Tropfen<br/> und allmählig auf 16 zu steigen. (Bei<br/> Psoriasis. Romberg.)</p>                                       | <p>3) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Acidi arsenicosi</i> 0,05 (cgm. 5)<br/> <i>Opii</i> 0,25 (cgm. 25)<br/> <i>Saponis med. q. s.</i><br/> <i>ut f. l. a. pil. No. 15. Consp. D. S.</i><br/> Täglich 1 Pille. (Bei Psoriasis.<br/> Hebra.)</p>  |
| <p>2) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Acidi arsenicosi</i> 0,25 (cgm. 25)<br/> <i>Piperis nigri</i> 2,5<br/> <i>Mucilaginis Gi. Arabici q. s.</i><br/> <i>ut f. pilul. No. 50. Consp. D. S.</i> 2 mal<br/> täglich 1 Pille. (Pilulae Asiaticae<br/> nach Hebra modificirt. Jede Pille<br/> enthält 0,005 arsenige Säure.)</p> | <p>4) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Acidi arsenicosi</i><br/> <i>Morphii acetici</i> <math>\overline{\text{aa}}</math> 0,3 (dgm. 3)<br/> <i>Kresoti q. s.</i><br/> <i>ut f. massa pultacea. D. S.</i> (Nach Rei-<br/> nigung der Zahnhöhle ein Minimum<br/> in dieselbe mit Zahnkitt zu bringen<br/> und nach Verschluss 24 Std. liegen<br/> zu lassen. Abbot.)</p> |

**Anhang.** Ausser den beiden besprochenen Arsenikpräparaten sind noch einzelne andere Arsenikverbindungen gebraucht, ohne jedoch besondere Vorzüge zu besitzen. Als Bromarseniklösung, *Solutio bromo-arsenicalis*, hat Th. Clemens eine Mischung von Kaliumarseniatlösung und Brom empfohlen, von welcher er 2–5 Tropfen 1–2mal täglich in einem Glase Wasser bei chronischen Dermatosen, hartnäckigen Wechselfiebern und inveterirter Syphilis mit Erfolg gereicht haben will. Das Präparat ist wahrscheinlich keine chemische Verbindung und geht allmählig durch Verdunsten von Brom in *Liquor Kalii arsenicosi* über. Dem letzteren in der Zusammensetzung ähnlich, jedoch statt des Kaliumarseniats arsenigsaures Natrium haltend, ist die *Solutio arsenicalis Pearsoni*, der man eine mildere locale Wirkung, auch bei Subcutaninjection (Delpeuch) zuschreibt. Trousseau empfahl damit getränktes, getrocknetes Papier zum Rauchen bei Schwindsüchtigen und Asthmatischen. Zu 0,003–0,01 empfiehlt Labbé neuerdings Natriumarseniat gegen *Urticaria chronica*; Piffard injicirte 0,2–1% Lösung bei Ekzem. Ein ähnliches Präparat ist auch die *Solutio arsenicalis Bietti*, welche jedoch arsenisaures Ammonium (nicht arsenigsaures) enthält. Beide Solutionen sind höchst entbehrlich, letztere bei Hautkranken sogar weniger wirksam als Fowlersche Lösung (Emery). Dasselbe gilt von der Donovanischen Lösung, welche Arsenik, Iod und Quecksilber enthält und mit der Hebra bei verschiedenen Hautkrankheiten ohne besondere Erfolge experimentirte. Dieselbe ist im Wesentlichen eine wässrige Lösung von Iodquecksilber und Iodarsen, *Arsenicum iodatum*, welches letztere auch für sich in der Dosis von 0,006–0,01 mehrmals täglich innerlich gegen Brustkrebs und Hautkrankheiten (Thompson) und äusserlich bei Lupus in Salbenform (Biett) benutzt wurde. Arsenchlorid, *Arsenicum chloratum*, ist von Clemens äusserlich und innerlich gegen Krebs und früher von Hunt bei Hautleiden gebraucht. Das Arsensulfür (Dreifach-Schwefelarsen) oder *Operment*, *Arsenicum sulfuratum s. citrinum s. flavum s. Auripigmentum*, diene sonst auch als Depilatorium, mit Aetzkalk oder Kalkschwefelleber (vgl. S. 233) als Teig oder Salbe, als sog. *Rusma* aufgelegt, oder als Aetzmittel bei unreinen Geschwüren und eitriger *Conjunctivitis* (Delhaie). Das käufliche Schwefelarsen enthält stets arsenige Säure beigemengt und unterliegt deshalb denselben Bedenken wie das *Acidum arsenicosum* selbst. Vielfach benutzt sind neuerlich das arsensaure Eisenoxydul, *Ferrum arsenicum oxydulatum*, welches Carmichael, Biett u. A. äusserlich (als Salbe, 1:10 bis 20 Th. Fett) und innerlich zu 0,003–0,006 bei Krebs und Lupus empfohlen und welches auch bei Chlorose Anwendung gefunden hat, sowie das arsenigsaure Antimon, *Stibium arsenicosum*, welches nach Papillaud zu 0,0005–0,002 2–3mal täglich gegen die verschiedensten Herzkrankheiten und von Isnard zu 0,001–0,01 bei asthmatischen Anfällen und Emphysem mit grossem Erfolge angewendet wurde. Das letzterwähnte Präparat, welches Papillaud in Form von Granules (*Granules d'Antimoine* von  $\frac{1}{2}$  Mgm. *Stib. ars.*) reicht, soll mehrere Jahre hindurch, ohne Intoxication zu bedingen, gebraucht werden können.

Zu den Arsenikalien gehört auch die Kakodylsäure, welche Joehheim als das am besten zu vertragende Arsenpräparat empfahl. Nach Renz bedingt sie jedoch, zu 0,06–0,3 in wässrig spirituöser Lösung genommen, Knoblauchgeruch des Athems und andere lästige Nebenerscheinungen (Insomnie, widriges Aufstossen, Trockenheit des Mundes und Appetitmangel, eigenthümliche Geiztheit), so dass von ihrem Gebrauche besser abstrahirt wird.

Auch einige Mineralwässer enthalten Arsen, theils als Natrium-, theils als Eisenverbindung, so z. B. einzelne Quellen von Vichy, vielleicht auch manche zu den indifferenten Thermen gezählte Quellen.

### Phosphorus; Phosphor.

Verhältnissmässig geringe therapeutische Bedeutung besitzt der für die Toxikologie so ausserordentlich wichtige Phosphor. Derselbe ist als sog. gewöhnlicher Phosphor, nicht in seiner ungiftigen Modification als rother oder amorpher Phosphor, officinell. Der officinelle Phosphor bildet weisse oder

gelbliche, wachsglänzende, durchscheinende, bei mittlerer Temperatur wachsweiße, in der Kälte spröde, cylindrische Stücke, welche bei längerer Aufbewahrung roth oder schwarz werden, im Dunkeln leuchten und an der Luft einen weissen, knoblauchartig riechenden Dampf verbreiten. Der Phosphor schmilzt unter Wasser bei 44° zu einer farblosen, amorph wieder erstarrenden Flüssigkeit, siedet bei 290° und entzündet sich bei Luftzutritt schon bei 60°. In Wasser ist er bei gewöhnlicher Temperatur fast unlöslich, obschon dasselbe Phosphordampf absorbiert. In Weingeist, Aether, fetten und ätherischen Oelen löst er sich schwierig, leicht und reichlich dagegen in Schwefelkohlenstoff.

In den Magen eingeführt wird der Phosphor theilweise als solcher in das Blut aufgenommen und zwar wahrscheinlich als Phosphordampf (Th. Husemann und Marmé, Bamberger, Vohl, Schultzen), theilweise auch vielleicht als nicht selbstentzündlicher Phosphorwasserstoff (Dybkowski); ein Theil wird noch im Magen unter dem Einflusse des Sauerstoffs oxydirt und in Form verschiedener Säuren des Phosphors (unterphosphorige Säure, phosphorige Säure, Phosphorsäure) resorbiert. Im Blute wird der Phosphor oxydirt, doch sind die gebildeten Säuren nicht als Grund der giftigen Wirkung anzusehen, da sämtliche Oxydationsstufen des Phosphors weniger giftig als Phosphor sind und ebenso wenig kann die durch die Oxydation des Phosphors bedingte Sauerstoffentziehung die toxische Wirkung erklären.

Schon in sehr geringen Mengen vermag der Phosphor die Erscheinungen der acuten Phosphorvergiftung hervorzurufen und selbst den Tod herbeizuführen. Der Phosphorismus acutus kann sich unter verschiedenen Formen darstellen, indem bald heftige Entzündungserscheinungen im Magen mit Erbrechen und den übrigen Folgen der Gastritis sich einstellen, bald ohne derartige örtliche Veränderungen die Symptome einer Allgemeinerkrankung sich geltend machen. Charakteristisch für die Vergiftung ist das Auftreten von Ikterus, vielleicht von einem Duodenalkatarrh abhängig, und eine Affection der Leber, welche sich als fettige Degeneration in ihren verschiedenen Stadien ausweist. Die Fettdegeneration betrifft indessen nicht allein die Leber, sondern auch verschiedene andere Organe, namentlich die Nieren, das Herzfleisch, verschiedene Muskeln des Stammes, die Drüsen des Magens, selbst den Uterus und die Gefässe. Sie ist offenbar der Ausdruck einer tieferen Störung des Stoffwechsels, bedingt durch eine eigenthümliche Action des Phosphors auf die Eiweissstoffe und die Zellenthätigkeit, nicht aber, wie von Einzelnen angenommen wird, einer entzündlichen Reizung, und steht sehr häufig in Verbindung mit einer tiefen Alteration des Blutes, welches dunkel und lackfarben erscheint und grosse Neigung zur Bildung von Sugillationen und Extravasaten zeigt. Selbst intensivere Blutungen, sogar Haemorrhagia uteri, kommen im Laufe der acuten Phosphorvergiftung häufig vor. Die hochgradige Alteration des Stoffwechsels ergiebt sich auch aus dem Verhalten der Stickstoffausscheidung im Harn, welche das Dreifache der normalen Ausfuhr betragen kann (Bauer). Die zersetzende Wirkung auf die Albuminate erweist besonders das Auftreten von Fleischmilchsäure (Schulten), Leucin, Tyrosin (Fränkel) und flüchtigen und festen phosphorhaltigen Basen (Selmi) im Harn. Die neben der Harnstoffvermehrung bei Hühnern sehr charakteristisch auftretende Steigerung der Harnsäureausscheidung (Fränkel u. Röhm) deutet auf gleichzeitig bestehende Herabsetzung der Oxydation, für welche auch die Abnahme der Kohlensäureausscheidung spricht. Nach Hans Meyer wirkt Phosphor bedeutend herabsetzend auf den gesammten Gehalt des Blutes an freier und gebundener Kohlensäure bei normalem Verhalten des Blutsauerstoffs; vermuthlich durch theilweise Alteration der Blutalkalien unter Bildung einer vom Körper selbst gelieferten Säure (Fleischmilchsäure?). Neben seiner Wirkung auf den gesammten Stoffwechsel, auf das Blut und die Ernährung kommt dem Phosphor auch eine direct schwächende Einwirkung auf die Herzthätigkeit zu, mit welcher stetiges Sinken des Blutdrucks im Zusammenhange steht und die von einer Lähmung des excitomotorischen Herznervensystems abzuhängen scheint (H. Meyer). Auf die quergestreiften Muskeln und die peripherischen Nerven wirkt Phosphor nicht paralyisirend.

Als Antidot bei acuter Phosphorvergiftung sind Kupfersulfat und nicht rectificirtes Terpenthinöl combinirt zu empfehlen. Zu vermeiden sind Alkalien und



Fette, da erstere die Bildung des höchst gefährlichen Phosphorwasserstoffs, letztere die Resorption des Phosphors als solchen befördern.

Neben der acuten Phosphorvergiftung kommt auch noch eine chronische, bei Arbeitern in Zündholzfabriken in Form von Nekrose der Kiefer mit auffallend starker Osteophytenbildung vor. Wahrscheinlich beruht dieselbe auf localer Einwirkung des in die Mundhöhle gerathenen Phosphors. Fälle, wo ein auf Phosphor zu beziehendes Allgemeinleiden bestimmt Ursache der Kieferkrankung war, liegen nicht vor.

Ueber die Wirkung länger fortgesetzter interner Einführung sehr kleiner nicht toxischer Gaben Phosphor bei Warmblütern hat Wegner ermittelt, dass danach — und zwar viel früher als die bei Steigerung der Gaben sich entwickelnde chronische Gastritis und interstitielle Hepatitis — eigenthümliche Veränderungen der Knochenbildung entstehen, so dass an Stelle spongioser Substanz überall compacter Knochen auftritt. Das ist am auffallendsten bei wachsenden Thieren, zeigt sich aber auch entschieden an fracturirten Knochen, bei superiostalen Resectionen und Periosttransplantationen. Die Wirkung gehört nur dem gewöhnlichen Phosphor an, nicht dem amorphen, noch auch dem Calciumphosphat, tritt dagegen in geringerer Weise auch nach Phosphorsäure u. a. Oxydationsstufen des Phosphors auf, welche dagegen keine eigentliche Magen- und Leberentzündung, sondern nur katarrhalische Magenschleimhautaffection erregen. Wegner betrachtet die Vorgänge in den Knochen als directen und formativen Reiz auf das osteogene Gewebe, nicht als Folge von Ueberladung des Blutes mit Phosphaten, da die Bildung fester Massen auch bei gleichzeitiger Verminderung der Zufuhr von Erdphosphaten erfolgt. Selbst am Fötus macht sich diese Wirkung bei trächtigen Thieren bemerklich, nicht bei saugenden Jungen.

Die frühere therapeutische Anwendung des Phosphors ist auf Annahmen gegründet, welche sich mit den der Beobachtung entnommenen Thatsachen über Phosphorwirkung nicht wohl vereinigen lassen. Man vindicirte nämlich dem Phosphor eine excitirende Wirkung, und insbesondere erregende Action auf Hirn und Rückenmark und auf die Genitalsphäre, und basirte auf solche den Gebrauch des gefährlichen Mittels bei Collaps und adynamischen Zuständen in Typhus u. a. febrilen Affectionen, bei Lähmungen (in specie bei Lähmungen der Augenmuskeln von Tavignot empfohlen), Amaurose, Hirnerweichung (Thompson), Abnahme der Geisteskraft durch Ueberanstrengung (Routh), Spermatorrhoe und Impotenz, Dysmenorrhoe und Amenorrhoe. Bei manchen dieser Leiden, sowie auch bei Hysterie und Epilepsie, wo Phosphor übrigens nichts leistet, haben chemische Theorien, insbesondere die Rücksicht auf den Phosphorgehalt der Nervencentren, die Anwendung bedingt. Auch die von Delpsch befürwortete Anwendung des Phosphors bei der durch cerebrale und spinale Lähmungserscheinungen charakterisirten Vergiftung durch Schwefelkohlenstoff fällt in diese Kategorie, indem sie der chemischen Theorie entstammt, dass Schwefelkohlenstoff durch Auflösung des Phosphors in den Nerven und Nervencentren toxisch wirke.

Besonders günstige Erfolge rühmt man dem Phosphor bei Neuralgien nach, namentlich auf anämischer Basis (Broadbent, Thompson, Mercier), desgleichen bei Mercurialzittern, Arsenlähmung und Alcoholismus chronicus (Gue-neau de Mussy). Als antidyskratisches Mittel ist Phosphor sowohl bei acuten als bei chronischen Dyskrasien versucht, z. Th. auch mit der Absicht, dabei gleichzeitig erregend zu wirken, z. B. bei Scrophulose und Tuberculose (Félix). Einzelne rühmten das Mittel besonders bei Intermittens, wo natürlich die Gefährlichkeit es ausschliesst. Die oben erwähnten Thierversuche von Wegner lassen die Anwendung des Phosphors bei schwächerer Entwicklung des Knochen-systems bei Kindern, bei Fracturen mit mangelhafter Callusbildung, bei Transplantationen von Periost und bei subcutanen Resectionen, vielleicht auch bei Rachitis und Osteomalacie, als rationell erscheinen. Broadbent sah entschiedenen Erfolg bei Leukämie und pernicioser Anämie, so wie in mehreren Fällen von Angina pectoris.

Bei der internen Anwendung des Phosphors muss selbstverständlich die grösste Vorsicht beobachtet und mit minutösester Sorgfalt auf die Höhe der Dosis geachtet werden. Einzelne Personen reagiren schon gegen ausserordentlich kleine Mengen Phosphor, sodass z. B. 2 Gaben von 0,002 oder eine Einzeldose von 0,004 (Day) Schmerzen im Epigastrium, Nausea, Erbrechen, Purgiren

und Depression veranlassen können. Die Phkp. gestattet 0,001 als höchste Einzelgabe und 0,005 als maximale Tagesgabe. Im Gegensatze hierzu geben Ashburton u. A. bei adynamischen Zuständen weit höhere Dosen, selbst 0,008 zweistündlich, bei chronischen Erschöpfungszuständen 0,0005.

Die Darreichung des Phosphors geschieht entweder in Pillen oder in Lösung, wobei man sich des Aethers, Alkohols, fetter und ätherischer Oele als Vehikel bedienen kann. Eine Lösung von 1 Th. Phosphor in 80 Th. Süßmandelöl, welche eine klare, rauchende, nach Phosphor riechende Flüssigkeit bildet, war früher unter dem Namen *Oleum phosphoratum officinell* und wurde innerlich in Emulsion oder äusserlich zu Einreibungen (mit Nelkenöl) benutzt. Einreibungen, bei Paralyse in Gebrauch, sind ohne reellen Nutzen und werden ausserdem durch den widrigen Geruch und das Leuchten im Dunkeln leicht den Kranken beschwerlich. Zusatz einiger Tropfen Citronenöl, Bergamottöl oder Rosmarinöl kann zwar Geruch und Leuchten beseitigen, aber die Medication nicht wirksamer machen. Als internes Mittel wird Phosphoröl auch in Emulsionen schlechter vertragen als andere Lösungen, so dass man nach Thompson höchstens 0,002 3mal täglich, dagegen von Phosphor in anderen Vehikeln (Alkohol, Aether oder Chloroform) 0,005 alle 4 Std. geben kann. Viel leichter wird Phosphor in Leberthran gelöst ertragen (Thompson, Routh). Als am wenigsten Nausea herbeiführende Darreichungsform des Phosphors bezeichnet Dobson eine Lösung von 0,06 in 45,0 Glycerin, 8,0 Spiritus vini und 8,0 Spiritus Menthae. Bei Neuralgien empfiehlt Routh Combination von Arsenik und Phosphor, sog. Chlorophosphide of arsenic, welche er durch Einwirkung von Salzsäure auf Phosphor und Arsen erhält. Weit gebräuchlicher als dieses ist das zunächst in Frankreich zum Ersatz des Phosphors in Anwendung gebrachte Phosphorzink, *Zincum phosphoratum*, welches sich im Magen unter Bildung von Phosphorwasserstoff zersetzt und in grösseren Dosen dem Phosphorismus acutus ähnliche Erscheinungen (Magenschmerzen, Icterus) herbeiführen kann. Man benutzt das Phosphorzink zu 0,004—0,008 in Granules, Pillen oder Pulver. Thompson will dasselbe sogar zu 0,02 alle 2 Stdn. gegeben haben.

Will man Phosphor längere Zeit verordnen, gleichviel, welches Präparat man wählt, so wird man stets wohlthun, mit einer sehr kleinen Dose ( $\frac{1}{2}$  Mgm.) zu beginnen und die einzelnen Gaben stets bei gefülltem Magen nehmen zu lassen.

Moxen aus Phosphor, von Paillard bei Neuralgien benutzt, haben vor anderen Exutorien keinen Vorzug.

**Kalium sulfuratum**, *Kalium sulfuratum ad balneum*, K. s. pro balneo;  
**Schwefelleber**, *Schwefelleber zum Bade*.

Dieses Präparat verdankt seine Wirksamkeit und Anwendung dem Schwefelwasserstoffgase, welches sich daraus unter dem Einflusse schwacher Säuren, selbst der Kohlensäure der Luft, mit grosser Leichtigkeit entwickelt.

Die officinelle Schwefelleber bildet leberbraune, später gelbgrüne Stücke, welche schwach nach Schwefelwasserstoff riechen, den sie auf Zusatz einer verdünnten Säure reichlich in Gasform entwickeln, wobei sich Schwefel abscheidet. Man erhält das *Kalium sulfuratum*, indem man 1 Th. Schwefel und 2 Th. Pottasche innig gemischt in einem geräumigen, bedeckten, eisernen oder irdenen Gefässe über gelindem Feuer erhitzt, bis die Masse zu schäumen aufhört und eine Probe ohne Abscheidung von Schwefel in Wasser sich löst, und die auf eine Eisenplatte oder in einem eisernen Mörser ausgegossene Masse nach dem Erkalten zerstösst. Die Schwefelleber zerfliesst an feuchter Luft und löst sich in der doppelten Menge Wasser bis auf einen geringen Rückstand zu einer alkalischen, gelbgrünen, opalisirenden Flüssigkeit. Auch in Weingeist ist dieselbe löslich. Neben der aus Pottasche bereiteten, vorwaltend zu Bädern dienenden Schwefelleber war früher als *Kalium sulfuratum s. Hepar sul-*

furis ad usum internum s. Hepar sulfuris kalinus s. Potassa sulfurata zum innerlichen Gebrauche ein aus Kaliumcarbonat bereitetes Präparat officinell. Beide Schwefellebern sind indess keine constante Schwefelverbindung des Kaliums, sondern Gemenge verschiedener Kaliumsulfurete, insbesondere  $K^2S^3$  (Schwefelkalium), und Kaliumthiosulfat. Die Annahme, dass die Schwefelleber Kaliumpentasulfuret sei, ist irthümlich, da zur Darstellung dieser höheren Schwefelungsstufe des Kaliums grössere Mengen Schwefel erforderlich sind.

Der Schwefelwasserstoff (Hydrothionsäure, Wasserstoffsulfid),  $H^2S$ , ist das bekannte; an allen Faulstätten organischer Stoffe sich bildende, durch seinen Geruch nach faulen Eiern ausgezeichnete und widerlich herbe schmeckende, farblose, durchsichtige, leicht entzündliche, mit blauer Flamme verbrennbare Gas, das bei  $10^\circ$  durch einen Druck von 15 Atmosphären zu einer farblosen, sehr dünnen Flüssigkeit, die bei  $-25^\circ$  krystallisirt, condensirbar ist. Es löst sich in Wasser, das bei  $0^\circ$  4,37, bei  $20^\circ$  2,90 Vol. absorhirt; die als Schwefelwasserstoffwasser bezeichnete Lösung hat Geruch und Geschmack des Gases und setzt an der Luft Schwefel ab. Alkohol löst weit mehr Schwefelwasserstoff als Wasser.

Das Schwefelwasserstoffgas wird von den verschiedensten Applicationsstellen, auch von der unverletzten Oberhaut aus, resorbirt und zum Theil durch die Lungen und Haut, mitunter auch durch den Urin, zum Theil oxydirt (als Sulfate) ausgeschieden.

Die Aufnahme des Schwefelwasserstoffs von der äusseren Haut aus ist durch Clemens experimentell sicher gestellt. Sowohl bei Application des Gases in das Unterhautbindegewebe als in das Cavum peritonei und in das Rectum (Demarquay) resultiren die nämlichen Erscheinungen wie nach Inhalation des Gases und nach Einführung von Schwefelwasserstofflösung in den Magen. Die Elimination durch die Lungen beginnt schon sehr rasch, bei Einleiten des Gases in das Unterhautzellgewebe schon nach 25 Secunden (Demarquay). Chausier wies bei Schwefelwasserstoffvergiftung das Gas im subcutanen Bindegewebe chemisch nach.

Das Schwefelwasserstoffgas ist, in grösseren Mengen eingeathmet oder auf andere Weise in den Körper eingeführt, ein heftig wirkendes Gift, welches unter Erscheinungen von Athemnoth und Paralyse, zuweilen auch von Convulsionen, zum Tode führt. Gleiche Vergiftungserscheinungen treten auch auf, wenn grössere Mengen Schwefelkalium in den Magen gelangen, indem unter dem Einflusse der Salzsäure reichliche Entwicklung von Schwefelwasserstoffgas stattfindet. Der Grund der schädlichen Wirkung des letzteren scheint vor Allem in Veränderungen des Hämoglobins zu suchen zu sein, woneben vielleicht auch directe Wirkung auf Herz und Nervencentren existirt.

Die Symptome der Schwefelwasserstoffvergiftung werden am häufigsten bei Arbeitern in Cloaken, Abtrittsgruben u. s. w. in Folge der Inhalation eines Gemenges von Gasen, unter denen der Schwefelwasserstoff als giftigstes prävalirt, beobachtet. In den leichtesten Fällen kommt es zu Kopfweh, Aufstossen nach faulen Eiern, Erbrechen, Mattigkeit; bei intensiverer Einwirkung treten vorübergehend Ohnmachten oder Delirien, bisweilen völliger Verlust des Bewusstseins, Trismus und Convulsionen auf; bei Einathmung sehr grosser und wenig mit atmosphärischer Luft verdünnter Gasmengen erfolgt entweder ohne Vorläufer (etwas Schwindel abgerechnet) plötzliches Hinstürzen, Verlust der Sensibilität, Motilität und des Bewusstseins bei Schwäche und Verlangsamung der Respiration und der Circulation, Cyanose, Mydriasis und Schäumen des Mundes, oder es treten, mitunter unter Ausstossen lauten Gebrülls, tonische und klonische Krämpfe wie bei Epilepsie mit anfänglicher Verengerung, späterer Erweiterung der Pupillen auf. Bei den durch Einathmen eines solchen Gasmenges zu Grunde Gegangenen ist in



den meisten Fällen die tintenartige Färbung des dünnflüssigen Blutes höchst auffallend, mit welcher eigenthümliche bläuliche Verfärbung einzelner Organe (Haut, Gehirn, Magen und Eingeweide) in Zusammenhang steht, während alle sonstigen Befunde (z. B. Fehlen der Todtenstarre, venöse Hyperämie der Hirnhäute) minder constant sind. Sorgfältige Versuche von Falck (und Amelung) erweisen auch für Fische, Frösche, Tauben, Kaninchen und Hunde ähnliche Wirkungen des Schwefelwasserstoffgases, das in kleineren Dosen Beschleunigung der Respiration, in grösseren sofortiges Sistiren derselben bedingt und bald vorwaltend Lähmung, bald auch — und zwar vorzugsweise bei Warmblütern, nicht bei Kaltblütern — Convulsionen hervorruft. Das Blut in Schwefelwasserstoff erstickter Thiere ist dunkelroth bis dunkelbraun und dunkelt noch an der Luft (in Folge der Einwirkung der sich durch den Sauerstoff der Luft bildenden Oxydationsstufen) nach; durch Aspiration lässt sich der Schwefelwasserstoff nur unvollständig daraus entfernen; auch in frischen Fällen können die Blutkörperchen zackig und zerrissen sein (Eulenberg). Ist letzteres aber auch nicht der Fall, so liegen doch für Annahme einer Einwirkung des Schwefelwasserstoffs auf die rothen Blutkörperchen zwingende Gründe genug vor. Nach den Untersuchungen von Kaufmann und Rosenthal einerseits und Hoppe-Seyler andererseits wirkt Schwefelwasserstoff auf sauerstoffreiches Hämoglobin nicht oder doch erst nach einigen Tagen verändernd ein, rasch dagegen auf Oxyhaemoglobin, aus welchem es zunächst den Sauerstoff austreibt, worauf spektroskopisch nachweisbare Veränderung des Hämoglobins resultirt, wobei (nach Hoppe-Seyler) nicht Hämatin, sondern eine eigenthümliche, in dünnen Schichten olivengrüne, in dicken braunrothe Substanz mit dem im Hämoglobin vorhandenen Eisengehalte, aber einem 4 mal so grossen Schwefelgehalte, unter Abscheidung von Eiweisskörpern und Schwefel sich bildet. Hoppe-Seyler ist der Ansicht, dass der Schwefelwasserstoff nur im arteriellen Systeme wirke und dass bei der toxischen Action die erwähnten Niederschläge von Schwefel und von Eiweissstoffen durch embolische Verstopfung der Lungencapillaren wirken, wofür freilich der anatomische Nachweis bisher fehlt. Kaufmann und Rosenthal erblicken den Grund der toxischen Wirkung in Sauerstoffentziehung, wogegen sich freilich auch manche Einwendungen machen lassen. Jedenfalls ist die alte Theorie, wonach der Schwefelwasserstoff im Blute durch Bildung von Schwefeleisen wirke, hinfällig. Im Blute erscheint ein von Lancaster als Sulfhämoglobinstreif bezeichneter Absorptionsstreif, jedoch nur bei directer Durchleitung oder bei Vergiftung mit Substanzen, aus denen im Blute sich Schwefelwasserstoff abspaltet. Eine directe Wirkung auf das Herz oder die in demselben belegenen Ganglien erweist die Herabsetzung des Herzschlages am excidirten Froschherzen (Falck); daneben besteht auch eine vorzugsweise bei kleinen Dosen hervortretende Wirkung auf die Vagi. Die respiratorischen Störungen erklären sich aus einer anfänglichen starken Erregung, welche später einer Lähmung Platz macht. Die Convulsionen fallen mit der Höhe der dyspnoëtischen Erscheinungen zusammen und sind wohl als Folge der Kohlensäureanhäufung zu erklären. Muskeln werden durch directe Einleitung von Schwefelwasserstoff bald todtenstarr und reagiren stark sauer; bei vergifteten Fröschen bleiben Muskeln und Nerven mechanisch und elektrisch reizbar (Kaufmann und Rosenthal).

Die Vergiftung mit Schwefelkalium entspricht im Wesentlichen der Schwefelwasserstoffvergiftung, doch kommen neben den Symptomen der letzteren noch Erscheinungen von Corrosion oder Irritation des Magens und der Eingeweide (Erbrechen, Durchfall) vor. Alle alkalischen Sulfurete wirken im Darne kaustisch und üben in starker Concentration einen kaustischen Einfluss sogar auf die äussere Haut aus. Bei den mit Schwefelkalium vergifteten Thieren wird dasselbe im Harn unverändert ausgeschieden (Wöhler). Als Antidote sind Natriumhypochlorit, Chlorkalk, auch Eisenhydroxyd oder Eisensaccharat zu empfehlen.

Die toxische Dosis des Schwefelwasserstoffgases ist eine äusserst geringe. Man sieht dies namentlich an Vergiftungen mit Natriumsulfantimoniat (Schlippersches Salz), welches im Blute und in den Geweben durch die Kohlensäure unter Freiwerden von Schwefelwasserstoff zersetzt wird und die dem letzteren angehörigen Blutveränderungen und Tod unter dyspnoëtischen Erscheinungen hervorruft. Von

dieser Verbindung sind 0,1—0,5, entsprechend 0,032 Schwefelwasserstoff, für Kaninchen und Hunde tödtlich (L. Lewin).

Die Einwirkung kleinerer Dosen Schwefelkalium bedürfen einer weiteren gründlichen Untersuchung, namentlich in Bezug auf die Alterationen des Stoffwechsels durch Schwefelwasserstoff.

Kleine Gaben von Schwefelalkalien bedingen Wärmegefühl im Magen, übelriechende Ructus und bei längerem Gebrauche Störung der Verdauung. Nach C. Ph. Falck erzeugen kleine Mengen Schwefelwasserstoffwasser oder Nenndorfer Wasser getrunken Ructus und Drang zum Uriniren, grössere (100 Ccm.) Uebelkeit, Erbrechen und Herzbeklemmung; bei Application im Klystier entsteht auch Drang und Kollern im Leibe. Bei Inhalationen der Gase an Schwefelquellen, welche übrigens meist ausser Schwefelwasserstoff noch Kohlensäure enthalten, werden Abnahme der Pulsfrequenz, Verlangsamung der Athemzüge, Eingenommenheit des Kopfes, Schwindel und Muskelschwäche beobachtet (Grandidier, Hergt, Collin, Despine). Nach Böcker und Eulenberg soll Schwefelwasserstoff die Ausscheidung der Kohlensäure durch die Lungen, sowie die des Harnstoffs und der Harnsäure vermehren. Dürr fand auch während des Badens in Schwefelbädern Harnsäure und Schwefelsäure im Urin vermehrt.

Die Wirkung des Schwefelwasserstoffs auf die Secretionen erheischt gründlichere Untersuchungen. Man schreibt demselben eine irritirende Wirkung auf die äussere Haut, die sich namentlich auch in Schwefelbädern durch lebhaftes Stechen, Brennen und Hitze kundgibt, und eine gelind reizende Action auf die Bronchialschleimhaut, welche auch bei Inhalation des Gases auftritt, zu. Ob die Vermehrung der Diurese und des Schweisses, die sowohl nach Inhalationen als nach Trinken von Schwefelwässern beobachtet wird, directe Wirkung des Gases ist, steht dahin.

Die therapeutische Anwendung des Schwefelkaliums als internes Medicament ist gegenwärtig sehr beschränkt und höchstens giebt man dasselbe noch bei chronischer Laryngitis und Heiserkeit (Oppolzer). Früher fand das Mittel überall, wo man gegenwärtig noch Schwefel zu gebrauchen pflegt, dessen entfernte Wirkung wesentlich auf der Bildung von Schwefelalkali im Darne beruht, Anwendung, so namentlich bei Gicht, chronischem Rheumatismus, Hautkrankheiten, selbst bei Tuberculose, Scrophulose, ferner bei Metallkachexien (Mercurialismus, Saturnismus). Auch galt es eine Zeit lang für ein Specificum bei Croup, wo es die Lösung der Pseudomembranen durch Verflüssigung der Absonderung fördern sollte (Barbier, Rilliet und Barthez), doch ist man von diesem Gebrauche und von der Benutzung bei Keuchhusten und Asthma ziemlich zurückgekommen. Bei Metallkachexien, wo es nach Astrié die Metallalbuminate lösen sollte, ist Kaliumiodid rationeller. Man gab das oben erwähnte Hepar sulfuris ad usum internum zu 0,05—0,3 2—3mal täglich in Lösungen (einfach in Wasser, ohne jeden Zusatz, wobei man zur Beseitigung des Geschmacks nach faulen Eiern einen Löffel voll eines aromatischen Wassers nachnehmen lässt).

Sehr ausgedehnt ist der äusserliche Gebrauch, und zwar im Wesentlichen bei den nämlichen Affectionen, wo man es früher innerlich gab, namentlich bei chronischem Rheumatismus, Hautaffectionen und chronischen Metallvergiftungen.

Ein Nutzen künstlicher Schwefelbäder, wie man die mit Kalium sulfuratum bereiteten Bäder gewöhnlich zu nennen pflegt, ist bei sämtlichen genannten Affectionen nicht zu bezweifeln. Bei chronischem Rheumatismus sowohl der Muskeln als der Gelenke sieht man die vorzüglichsten Erfolge, bei denen es übrigens zweifelhaft bleibt, welchen Componenten der Bäder, ob dem frei werdenden Schwefelwasserstoff oder dem in den Bädern sich bildenden kohlensauren Kalium oder der Temperatur des Bades, sie ihre Entstehung verdanken. Von Hautkrankheiten war es besonders Scabies, bei der man Schwefelbäder und Lotionen mit Schwefelleber gebrauchte, doch ist diese Behandlung durch wohlriechendere Methoden verdrängt. Auch bei Prurigo und Acne sind Schwefelbäder manchmal von Erfolg, während sie bei tiefern Leiden der Haut (Ekzem, Psoriasis)

meist im Stiche lassen. Für die Anwendung bei Saturnismus sprechen zahlreiche Erfahrungen; das dabei nicht selten vorkommende Schwarzwerden der Haut durch Bildung von Schwefelblei auf der Epidermis ist wohl nur bei Arbeitern, welche durch Bleistaub erkranken (Arbeiter in Bleiweissfabriken, Maler), beobachtet. Da das Mittel bei Bleikolik meist erfolglos bleibt und nur bei Bleiarthralgie, Tremor und Paralyse sich bewährt (bei erstgenannter nach Tanquerel in ganz vorzüglicher Weise), so werfen sich Zweifel auf, ob dem Schwefelwasserstoff ein Antheil an der Wirkung zukommt.

Zur Herstellung künstlicher Schwefelbäder rechnet man 50,0—150,0 Schwefelleber auf ein Vollbad. Um die Entwicklung des Schwefelwasserstoffs zu befördern, verordnet man gleichzeitig 15,0—20,0 rohe Schwefelsäure. Beliebte ist zur Milderung der Wirkung der Zusatz von 120,0—250,0 *Gelatina animalis* zum Bade, wodurch man die in manchen natürlichen Schwefelwässern vorkommenden schleimigschlüpfrigen Algen (*Barégine*) nachahmen und ersetzen kann. Von Bädern abgesehen wird Schwefelkalium bei Hautaffectionen auch noch in 1—5% Lösung zu Waschungen, ausserdem in Form von Salben (1 : 5—10) und als Schwefelleberseife, *Sapo Kalii sulfurati*, benutzt.

Dass Schwefelwasserstoffwasser, *Aqua hydrosulfurata* s. *hydrothionica* s. *hepatica*, kommt medicinisch wenig in Betracht. Man hat es in starker Verdünnung bei Vergiftung mit Metallsalzen, auch zur Inhalation benutzt.

**Anhang:** In ähnlicher Weise wie Kalischwefelleber ist auch die Natronschwefelleber oder das Schwefelnatrium, *Natrium sulfuratum*, äusserlich zu Bädern benutzt, in England besonders mit Schwefelmilch und Schwefelsäure als sog. *Balneum sulfuris compositum* gegen Scabies. Dasselbe kann auch als Depilatorium wie Kalkschwefelleber dienen. Ferner ist zu nennen die Ammoniakschwefelleber, *Hepar sulfuris volatile* s. *Oleum sulfuris Beguini* s. *Liquor fumans Boylii*, in England bei Gicht, chronischem Rheumatismus, auch bei Herzhypertrophie und Klappenfehlern (*Graves*) benutzt, und das Ammoniumbisulfuret (Zweifach-Schwefelammonium, flüssiges Schwefelwasserstoff-Schwefelammonium, *Liquor Ammonii sulfurati*) in derselben Richtung gebraucht; beide wirken dem Schwefelwasserstoff analog. Eine spirituöse Lösung des ersteren bildet der früher besonders bei chronischen schuppigen Hautleiden, *Prurigo*, Geschwüren und Prosopalgie benutzte *Liquor antipodagricus Hoffmanni* s. *Tinctura sulfuris volatililis*.

Von grösserer Bedeutung als die genannten obsoleten Schwefelalkalien sind die als Schwefelwässer (*Thiokrenen*) bezeichneten natürlichen Mineralwässer, deren hauptsächlichster wirksamer Bestandtheil der Schwefelwasserstoff ist. Sie stellen Lösungen entweder des Gases, mitunter auch von Kohlenoxysulfid (Kohlensäure, in welcher 1 At. O durch S vertreten ist), oder von Schwefelverbindungen der Alkali- oder Erdmetalle oder gleichzeitig von beiden dar. Dieselben sind theils kalt (sog. *Thiopegen*), theils warm oder heiss (sog. *Thiothermen*), von denen die ersteren selbstverständlich viel mehr Schwefelwasserstoff enthalten als die letzteren. Der Schwefelgehalt der fraglichen Wässer liegt in den Grenzen von 0,01 (Burtscheid) und 0,09 (Nenndorf) in 1000 Theilen. Neben Schwefelwasserstoff kommt meist auch Kohlensäure und reichlich Stickstoff in den meisten vor, daneben noch andere fixe Bestandtheile, bald Chlornatrium, bald Kaliumcarbonat, bald Erdsalze, und — zumeist in den warmen — eine als *Barégine* bezeichnete stickstoffhaltige, aus Algen gebildete organische Substanz. In den meisten dieser Wässer findet in Folge der zersetzenden Einwirkung des Sauerstoffs der Luft fortwährende Abscheidung von Schwefel statt. Die therapeutische Verwerthung dieser Quellen ist im Wesentlichen dieselbe wie die des Schwefelkaliums: bei chronischem Rheumatismus, chronischen Hautaffectionen und chronischen Metallvergiftungen (Saturnismus, Mercurialismus, auch Arsenik- und Kupfervergiftung) und chronischem Katarrh der Respirationswerkzeuge. Desgleichen ist die Anwendung von Schwefelbädern bei constitutioneller Syphilis, insbesondere bei Complicationen mit Hydrargyrose und als Vorbereitungscur für andere antisypilitische Heilmethoden (Reumont), in neuester Zeit vielfach in Anregung gekommen. Ein-



zelne hierhergehörige Quellen finden auch bei anderen Leiden, z. B. bei progressiver Muskelatrophie (Aachen), bei Sexualkrankheiten und verschiedenen Neurosen Anwendung (Landeck). Ausserdem vindicirt man denselben neuerdings einen heilsamen Einfluss auf *Plethora abdominalis*, und zwar gestützt auf die übrigens noch sehr beweisbedürftige cholagoge Wirkung des Schwefelwasserstoffs, durch welchen die durch die desoxydirende Wirkung des Gases rascher destruirten alternden Blutkörperchen schneller zerstört werden sollen (?), während man früher gerade für plethorische Individuen den Gebrauch der Schwefelbäder contraindicirt betrachtete.

Inwieweit die sonstigen fixen Bestandtheile bestimmend auf die Heilwirkung der einzelnen Schwefelwässer wirken oder dieselben modificiren, bleibt weiteren Untersuchungen zu entscheiden vorbehalten; nicht undenkbar wäre, dass ein reichlicherer Kochsalzgehalt die Heilung von solchen Hautaffectionen beförderte, zu deren Beseitigung ein intensiverer Reiz nöthig wäre, während reichlicherer Kalkgehalt die Heilung nässender Hautausschläge, sowie scrophulöser und rachitischer Leiden, die z. B. in Schinznach sehr günstig influirt werden, beschleunigen und Gehalt von Alkalicarbonaten — zumal bei Trinksuren — bei Respirationskatarrhen von günstigem Einflusse sein könnte. Für die in neuerer Zeit sehr in Aufnahme gekommenen Trinksuren lassen sich bei der Divergenz des Schwefelgehaltes in den einzelnen Quellen keine allgemeine Regeln hinsichtlich der Dosirung aufstellen. Bei Bädern beträgt die Temperatur in der Regel zwischen 33 und 36°, in manchen selbst 41°; als mittlere Dauer rechnet man  $\frac{1}{2}$  Stunde (in Schinznach 3 Stunden). In verschiedenen der hierhergehörigen Badeörter werden die Schwefelwässer auch zu Dampfbädern benutzt, wobei der Schwefelwasserstoff zum grössten Theil entweicht; ebenso wird, zumal bei respiratorischen Leiden, an vielen Orten entweder das Gas der Quellen oder das verstäubte Wasser inhalirt. Eine ganz vorzügliche Unterstützung der Curen bildet in manchen Orten (in Deutschland besonders in Nenndorf, Eilsen und Meinberg) die Anwendung der Schwefelschlammäder, die bei rheumatischen Affectionen (Gelenksudaten, Neuralgien, Contracturen, Paralysen), sowie bei torpiden chronischen Exanthemen und atonischen Fussgeschwüren ganz Vorzügliches leisten.

Wir unterscheiden mit Reumont in:

1) Schwefelkochsalzquellen, mit reichlicherem Gehalte von Kochsalz, wohin von deutschen Quellen die Thiothermen Aachen (mit verschiedenen Quellen, von denen die oberen die heissesten sind, darunter die 55° heisse Kaiserquelle, welche auch den Trinkbrunnen (Elisenbrunnen) mit Wasser versorgt, während die untern die Temp. von 45—47° haben) und Burtscheid (mit Thermen von 59—74°, deren heisseste nur Spuren von Schwefelwasserstoff enthält), sowie die Thiopege Weilbach (vorzugsweise zu Trinksuren verwendet); von schweizer Curorten Baden im Aargau, ferner Mehadia in Ungarn und Uriage in Frankreich. Aachen, Burtscheid und Weilbach enthalten auch beträchtliche Mengen Natriumcarbonat, weshalb dieselben als alkalische Schwefelwässer bezeichnet werden.

2) Schwefelkalkwässer, mit reichlicherem Gehalt an Kalksalzen. Hierher gehört die Mehrzahl unserer kalten deutschen Schwefelquellen, namentlich Nenndorf (mit Gyps und Kalkcarbonat), Eilsen, Meinberg (mit viel schwefelsaurem Natrium in dem Schwefelwasser, auch mit starkem Sauerling, Kohlensäure-Sprudelbädern und Salzquellen), Wipfeld (Unterfranken) und Langenbrücken (Baden); ferner die österreichische Therme Baden bei Wien, von schweizer Curorten die Therme Schinznach und die Pegen Gurinel und Alveneu.

3) Schwefelnatriumwässer. Als Lösungen von Schwefelnatrium stellen sich vor Allem die sehr zahlreichen Schwefelthermen der Pyrenäen (Barèges, Luchon, Amélie-les-Bains, St. Sauveur, Eaux-Bonnes, Eaux-Chaudes, Cauterets u. a. m.) und von sonstigen französischen Quellen St. Honoré und Aix-les-Bains dar. In ihrer Wirkung sehr nahestehend sind die Thermen von Landeck in der Grafschaft Glaz, welche den Uebergang zu den in-

differenten Thermen bilden. Auch Stachelberg im Canton Glarus gehört hierher.

### Aqua; Wasser.

Wir schliessen die Abtheilung der unorganischen Antidyscratica mit einer kurzen Betrachtung des Wassers, das als integrierender Bestandtheil des Organismus, indem es nicht weniger als  $\frac{3}{4}$  unseres Körpergewichts und über  $\frac{4}{5}$  der gesamten Blutmasse ausmacht, vielleicht mit demselben Rechte eine Stellung unter den Plastica beanspruchen dürfte. Lässt es sich auch nicht verkennen, dass wir berechtigt sind, das Wasser unter gewissen Umständen geradezu als Nutriens aufzufassen, so geschieht doch andererseits die therapeutische Anwendung vorzugsweise zur Beseitigung von Dyskrasien und Diathesen; ausserdem bildet es ein natürliches Bindeglied zwischen den anorganischen und organischen Antidyscratica, indem eine grosse Anzahl der letzteren vorzugsweise dadurch wirken, dass mit ihren activen Bestandtheilen gleichzeitig grosse Mengen Wasser in den Organismus eingeführt werden. Die Wirkungen des Wassers auf den Körper sind ausserordentlich abhängig von der Temperatur desselben und zwar sowohl bei Application auf die äussere Haut als bei interner Darreichung. Bringt man Wasser von 37–40° auf die äussere Haut, so wird eine Veränderung der Empfindung nicht wahrgenommen, wie solche in bekannter Weise sowohl bei höherer als bei niedriger Temperatur des Wassers hervortritt. Die erfrischende, kühlende Wirkung kalten und namentlich kohensäurereichen Quellwassers zeigt sich nicht bei Anwendung lauen oder warmen Wassers, durch welches im Gegentheil Uebelsein, Aufstossen und selbst Erbrechen hervorgerufen wird. Man benutzt ja deshalb lauwarmes Wasser geradezu als Emeticum. Wird die Einführung grösserer Mengen Wassers längere Zeit fortgesetzt, so resultirt allmählig Verdauungsstörung, Durchfall und bedeutende Vermehrung aller Ausscheidungen, besonders des Urins und des Schweisses. Mit der Zunahme der Wassermenge in den Secreten steigt auch die Quantität ihrer festen Bestandtheile, und zwar parallel mit derjenigen des ausgeschiedenen Wassers, so dass durch einmalige Einführung grösserer Mengen mehr fixe Bestandtheile ausgeschieden werden als auf kleinere Mengen. Das Maximum der Wasserausfuhr durch den Urin tritt nach Einfuhr grosser Wassermengen schon in 1–2 Stunden, nach kleineren erst in 3 Stunden auf (Falck, Westphal); von da ab findet allmähliges Sinken statt. Bei Injection in die Venen erfolgt ebenfalls Steigerung bis zu einem gewissen Maximum, jedoch nicht, ohne von Senkungen abwechselungsweise unterbrochen zu werden (Westphal). Die Vermehrung der festen Harnbestandtheile betrifft besonders den Harnstoff und die Salze (Kali, Chlor, Schwefel- und Phosphorsäure); dagegen sinkt die Harnsäuremenge des Urins (Genth, Mosler). Dieselbe Vermehrung der festen Bestandtheile findet auch in der Galle (Mosler) und in der Milch (Eckhard) statt. Warmes Wasser fördert die Harnstoffausscheidung mehr als kaltes (Mosler). Alle diese Veränderungen der Secretionen deuten auf eine Vermehrung der Oxydation und des Stoffumsatzes im Organismus, die sogar nach den Versuchen von Genth hochgradiger ist als durch irgend ein anderes Medicament. Unter dem Einflusse dieser Oxydationsvermehrung sinkt auch das Körpergewicht. Selbst bei Inanition vermehrt das gleichzeitige Trinken von Wasser die Ausscheidung (Böcker).

Therapeutisch können wir auf Grundlage der physiologischen Wirkung des Wassers von diesem in allen Krankheitsfällen Gebrauch machen, wo ein gesteigerter Stoffumsatz erwünscht erscheint oder wo die Anregung der Secretionen und die Verflüssigung der Secrete einen Nutzen verspricht. Es gehört dahin der Gebrauch bei Gicht (Cadet de Vaux), bei Lithiasis, wo die Verbrennung der Harnsäure zu Harnstoff gefördert werden soll, bei chronischen Metallvergiftungen, ferner bei Magenleiden und trägem Stuhlgang, bei Bronchitis und Bronchialkatarrhen u. a. m.

Hinsichtlich der äusserlichen Application von Wasser in Form von Bädern begnügen wir uns mit dem Hinweis darauf, dass dabei nicht sowohl die Aufsaugung von Wasser durch die Haut als vorzugsweise die Einwirkung der Temperatur des Bades auf die Körperoberfläche in Betracht kommt. Eine

detaillirte Darstellung dieser Wirkungen gehört nicht in das Gebiet der Arzneimittellehre, weshalb wir davon abstrahiren. Auch die jetzt so häufige Anwendung als Antiphlogisticum (Eisumschläge u. s. w.) und Antipyreticum (protrahirte lauwarme Bäder u. s. w.), sowie die verschiedenen Proceduren bei den sog. Kaltwassercuren (hydropathische Einwicklungen, Uebergiessungen, Abreibungen, Douchen, Regenbäder u. s. w.) müssen hier übergangen werden. Ebenso übergehen wir die Anwendung des kalten und des warmen Wassers zu Injectionen und Infusionen in Mastdarm und Vagina und viele andere Gebrauchsweisen, deren Wirkung nicht dem Wasser als solchem, sondern der jeweiligen Temperatur und seinen physikalischen Eigenschaften zukommen. Erwähnt werden mag noch, dass man, um eine Herabsetzung nervöser Erregung und krampfhafter Muskelaction zu erzielen, Wassereinspritzungen in die Venen bei Hydrophobie versucht hat, ohne jedoch curative Erfolge zu erzielen.

In den meisten Fällen, wo Wasser für sich als Medicament angewendet wird, wird Quellwasser, das sich zu Trinkcuren am besten eignet, bei äusserlicher Anwendung auch wohl Brunnenwasser, Flusswasser benutzt. Man giebt bei Trinkcuren dem weichen, d. h. nicht stark kalkhaltigen Wasser den Vorzug vor hartem, viele Kalksalze führendem. Selbstverständlich muss ein solches, bei Kranken anzuwendendes Trinkwasser von organischen Beimengungen oder deren Zersetzungsproducten möglichst frei sein.

Die Bedeutung des Wassers als Lösungsmittel und Auszugsmittel für die Herstellung der verschiedensten Arzneiformen ist bereits im allgemeinen Theile hervorgehoben. Man verwendet dabei das durch Destillation von fremden Verunreinigungen gereinigte Wasser, welches man als **Aqua destillata**, **destillirtes Wasser**, bezeichnet. Wie alle in der Pharmakopoe vorgeschriebenen Mischungen und Zubereitungen, bei denen Wasser in Frage kommt, mit destillirtem Wasser dargestellt werden, sollte auch der Arzt zu Mixturen, welche in der Apotheke angefertigt werden, nur destillirtes Wasser benutzen und die früher officinelle *Aqua communis*, d. h. möglichst reines Brunnen-, Fluss-, oder Regenwasser, welches gerade zur Hand ist, der häuslichen Arzneibereitung zu überlassen. In den meisten grösseren Städten ist in Folge der Durchtränkung des Bodens mit Abfall- und Zersetzungstoffen kein Brunnenwasser zu haben, welches nicht vor seiner Anwendung durch Filtration, am besten durch Kohlenschichten zu reinigen ist. Das durch Sand filtrirte Flusswasser der Wasserleitungen grösserer Städte entspricht nicht den Anforderungen, welche man an ein Vehikel für Medicamente stellen sollte. Das von Abfallstoffen unbeeinflusste Quellwasser, *Aqua fontana*, eignet sich wegen der darin enthaltenen Salze als Lösungsmittel für viele wirksame Substanzen, die durch letztere zersetzt werden, nicht.

**Anhang: Wildbäder.** — Dem destillirten Wasser pflegt man in der Regel die als Wildbäder oder Akratothermen oder indifferente Thermen benannten, meist in wilden bergigwaldigen Gegenden belegenen Quellen zu vergleichen, obschon dieselben nicht völlig ohne Gehalt an unorganischen Salzen sind und zum Theil auch wirksame Stoffe (Kochsalz und Natrou), allerdings in kleinen Mengen, enthalten. Manche Wildbäder schliessen verhältnissmässig grosse Mengen Sauerstoff und Stickstoff ein, während Kohlensäure nur in geringerer Quantität vorkommt. Man benutzt die Wildbäder vorzugsweise zum Baden, jedoch auch zu gleichzeitigen Trinkcuren. Im Wesentlichen haben sie die Wirkung warmer und heisser Bäder und können wie diese bei chronischen Leiden der verschiedensten Art benutzt werden. Man kann die über 37° warmen Akratothermen (wärmesteigernde Akratothermen von Kisch) mehr als umstimmend, die unter 37° warmen (indifferent warme Akratothermen von Kisch) als tonisirende Curmittel betrachten, wobei die Wirkungen der letzteren durch die Lage in hohen waldigen Gegenden kräftig unterstützt wird. Die für Wildbäder im Allgemeinen von Baumann angegebenen Indicationen, Nothwendigkeit eines möglichst milden, vor stürmischen Erscheinungen bewahrten Curverlaufes, Vorhandensein besonderer Vulnerabilität, reducirter Kräfte oder hohen Alters, excessive Reizbarkeit des Nerven- und Gefässsystems, starke Empfindlichkeit der Haut mit Tendenz zu Eruptionen, treffen im Wesentlichen das Richtige. Ihre hauptsächlichste Anwendung finden die Wildbäder bei erethischen Schwächezuständen, Altersschwäche, Zuständen schleppender oder



unvollkommener Reconvalescenz, bei Residuen von Entzündungen oder traumatischen Einflüssen, bei psychischen Hyperästhesien, bei Lähmungen, zumal auch tabetischen Lähmungen, bei Gicht, Rheumatismus, Acne, Pruritus, Prurigo und verschiedenen andern Hautaffectionen. Die über 37° warmen Wildbäder sind: Gastein (im Salzburgschen, zugleich die höchst belegene), Ragaz-Pfäfers im Canton St. Gallen, Teplitz-Schönau in Böhmen, Römerbad und Tüffer in Steiermark, Luxeuil und Plombières. Wildbäder unter 37° sind Badenweiler und Liebenzell im Schwarzwalde, Warmbrunn in Schlesien, Johannisbad im Böhmischem Riesengebirge, Wildbad im Enzthal (Württemberg), Schlangenbad im Taunus, Neuhaus und Tobelbad in Steiermark.

## 2. Ordnung. Antidyscratica organica, organische antidyskratische Mittel.

Diese Ordnung umfasst vorzugsweise verschiedene vegetabilische Antisyphilitica, welche meist in Form diluirter Abkochungen angewendet werden, und bei deren Wirkung offenbar die grosse Menge von Wasser, welche damit in den Körper eingeführt wird, in Verbindung mit der gleichzeitig eingehaltenen knappen Diät und der die Diaphorese des Kranken befördernden Lage im Bette die Hauptrolle spielt. Manche dieser Stoffe haben auch bei chronischen Exanthemen, ferner bei Gicht und Rheumatismus chronicus Gebrauch gefunden und leiten so zu solchen Vegetabilien über, welche ausschliesslich als Antirheumatica oder Hautmittel benutzt werden. Ueber die Art der Wirkung dieser und anderer Specifica gegen Dyskrasien befinden wir uns bis heute ganz im Unklaren, da die in denselben nachgewiesenen eigenthümlichen Pflanzenstoffe sich entweder dem Organismus gegenüber indifferent verhalten oder Wirkungen auf bestimmte Systeme zeigen, die mit ihrer Action auf die in Frage stehenden Krankheiten nicht in Zusammenhang zu bringen sind.

Die hier zu besprechenden Antisyphilitica werden meist nicht allein, sondern mit einander combinirt angewendet und bilden die Grundlagen der Curen mit sog. Holztränken, welche in der Behandlung der Syphilis sogar, wie bereits bemerkt, die Mercurbehandlung zeitweise fast völlig verdrängten und auch noch jetzt theils für sich, theils zur Unterstützung von Quecksilbercuren häufig Anwendung finden, besonders bei Recidiven nach vorgängigem Quecksilbergebräuche, gleichviel ob bei secundären oder tertiären Fällen. Gewöhnlich wendet man sie in durch die Empirie geheiligten Formen und Methoden an, unter denen bei uns besonders das Zittmannsche Decoct in Ansehen steht. Statt der Tisanen hat man, um das Einnehmen zu erleichtern, Syrupe aus den hierher gehörigen Pflanzentheilen anfertigen oder dieselben mit Zucker eindampfen lassen (sog. Sucre-tisane von Limousin), doch leistet diese Anwendungsweise entschieden für sich nicht dasjenige, was dünne Abkochungen bewirken.

**Radix Sarsaparillae**, Rad. Sarsaparillae vel Salsaparillae, Rad. Sarsae;  
Sassaparille, Sassaparillwurzel.

Die noch vielfach als Alterans benutzte, obschon allerdings im Credit gesunkene Sassaparille ist die durch ihren Bau leicht er-

kennbare Wurzel mehrerer mexikanischer Arten der zur Familie der Asparageen (*Smilaceen*) gehörigen Gattung *Smilax*.

Die zahlreichen (fast 300) Angehörigen dieser Gattung bilden strauchige Schlinggewächse mit kantigem, holzigem, häufig mit Stacheln besetztem Stengel, die sich namentlich an Flussufern und Sümpfen des tropischen Amerika (nördliche Länder von Südamerika, Centralamerika und Südamerika) finden. Der Name Sarsaparille stammt aus dem Spanischen, wo *zarza* (Portugiesisch *salsa*) einen stacheligen Strauch (Brombeerstrauch) bedeutet und *parilla* das Femininivum von *para*, Rebe, ist. Im Handel unterscheidet man nach der Herkunft mehrere Sorten, deren Differenzen zum grossen Theil durch die verschiedene Art des Trocknens bedingt zu sein scheinen, deren Abstammung von bestimmten Species aber nicht festgestellt ist; nur die mit der geringsten Sorgfalt getrocknete, Ost-mexicanische Sarsaparille, sog. Sarsaparilla de Veracruz s. della Conta, scheint sicher von *Smilax medica* Schlecht. abzustammen. Als Mutterpflanze anderer Sorten werden *Sm. syphilitica* (Sarsaparille von Caracas oder La Guayra, die als sog. Fioretta oder Fioretina in Italien beliebt ist), *Sm. papyracea* und *Sm. cordato-ovata* (Sarsaparille de Para oder de Maranhon, auch als Brasilianische oder Lissaboner bezeichnet) angegeben. Gerade für die am meisten benutzte officinelle Honduras-Sarsaparille ist die Abstammung nicht klar. Diese letztere wird aus ihrer Heimat in mehreren Fuss langen und 3–10 Cm. dicken Bündeln verschickt, welche neben den allein zu medicinischem Gebrauche zulässigen Wurzeln auch den Wurzelstock enthalten. Die Wurzeln sind bis ungefähr 7 Dm. lang und 4 Mm. dick, ziemlich gleichmässig cylindrisch, z. Th. mässig längstüchig, meist nicht verästelt, aussen bräunlichgrau, bisweilen fast gelbröthlich. Der dichtgeschlossene braune, schmale Kreis der Endodermis zeigt sich auf dem Querschnitte umgeben von einem weit breiteren, rein weissen, stärkemehlreichen Rindengewebe. Alle übrigen Sarsaparillsorten enthalten weit weniger Stärkemehl als die Honduras Sarsaparille. In England ist die sog. Jamaica Sarsaparille, richtiger als Sarsaparille von Chiriqui, welche von *Smilax officinalis* abstammt, officinell. Der Geschmack der Sarsaparillwurzel ist zugleich schleimig und kratzend.

Ausser Amylum und einer Spur ätherischen Oeles enthält die Sarsaparilla ein kratzend schmeckendes Glykosid, Smilacin oder Parillin, dessen Beziehung zu der Wirksamkeit der Sarsaparille nicht feststeht.

Das 1824 von Pallotta entdeckte und Parigin genannte Smilacin krystallisirt aus Weingeist in feinen Nadeln oder weissen Warzen, ist in trockenem Zustande fast geschmacklos, in Lösung scharf und bitter, giebt mit 20 Th. heissem Wasser eine schäumende Lösung und ist in Aether unlöslich. Am reichlichsten scheint dasselbe in den amyulumarmen Sarsaparillsorten enthalten zu sein, so dass, wenn es das wirksame Princip der Sarsaparilla wäre, die relativ smilacinreichste Ostmexicanische Sarsaparille, welche nach Flückiger 0,19% enthält, die beste wäre. Verdünnte Säuren spalten Smilacin in Pariginin und Zucker. Nach Pallotta bedingen 0,4 Smilacin Abnahme der Pulsfrequenz und Magenbeschwerden, 0,5–0,6 Ekel, Brechneigung und Erbrechen, 0,8 Husten und Ohnmacht; dagegen nahm Gross mehrere Tage 0,5 und später 0,8 ohne jede Beschwerde. Niesenerregend wirkt Smilacin nicht, ebensowenig diaphoretisch oder diuretisch (Boecker), weshalb es nicht als das active Princip der Sarsaparille in der Behandlung der Syphilis angesehen werden kann, bei der übrigens auch Cullerier dasselbe ohne Erfolg anwendete. Smilacin geht in den Harn über (Schroff). Neben dem Smilacin soll nach Schroff in der Sarsaparille noch eine zweite, viel schärfer und bitter schmeckende, Brechreiz und vermehrte Speichelabsonderung, Magenschmerz und stärkere Pulsabnahme bedingende Substanz vorkommen.

Die Sarsaparille ist der wichtigste Bestandtheil der meisten sog. Holztränke und wird besonders bei Syphilis, bei chronischen

Exanthemen (Psoriasis, Furunculosis und multiplen Abscessen), bei Gicht und chronischem Rheumatismus benutzt.

Man giebt die Sassaparille zu täglich 30,0—60,0 in Abkochung (1:12—25) wobei man meist die zerschnittene Wurzel vorher mit dem Wasser mehrere Stunden maceriren lässt. Zu vollständigerer Extraction ist der Zusatz von Alkalien empfohlen. Meist verbindet man andere vegetabilische Antidyscratica mit der Sassaparille und setzt den verordneten Species Süssholz und Gewürze (Coriander und Anis) als Corripientien hinzu. Auch kleine Mengen von Senna werden, um gleichzeitig die Darmsecretion zu mehren, hinzugefügt.

#### Präparat:

**Decoctum Sarsaparillae compositum fortius; Starke Sarsaparillabkochung,** starkes Zittmannsches Decoct, und **Decoctum Sarsaparillae compositum mitius; Schwache Sarsaparillabkochung,** milderes Zittmannsches Decoct. Beide Präparate sind integrierende Bestandtheile der besonders in Deutschland geschätzten sog. Zittmannschen Cur gegen Syphilis. Das stärkere Decoct wird in der Weise bereitet, dass man 100 Theile zerschnittene Sassaparillwurzel mit 2600 Th. Wasser 24 Std. lang digerirt und nach Zusatz von aa 15 Th. gep. Zucker und Alaun drei Stunden in bedecktem Gefässe im Dampfbade stehen lässt und gegen Ende des Kochens aa 5 Th. Anis und Fenchel, 25 Th. Sennesblätter und 10 Th. Süssholz hinzusetzt. Die Colatur beträgt 2500 Th. Diese Formel weicht von dem ursprünglichen Decocte von Zittmann (Leibarzt am Sächsischen Hofe im Anfange des vorigen Jahrhunderts) dadurch ab, dass während des Kochens mit dem Alaun und Zucker 4 Th. Calomel und 1 Th. Hydrargyrum sulfuratum rubrum in einem leinenen Beutel in der Flüssigkeit eingeschlossen werden, welche Vorschrift früher vom Apotheker angewendet werden musste, wenn der Arzt **Decoctum Zittmanni** verschrieb. Das letztere enthält Spuren von Quecksilber (in 4 Pfd. nach Wiggers 0,001, nach Zanten als Sublimat, wovon in der Flasche 0,012 vorhanden sein sollen) und wird von manchen Aerzten vorgezogen. Das mildere Decoct wird aus 50 Th. Sassaparille mit der gleichen Menge Wasser analog dem stärkeren bereitet, doch werden gegen Ende des Kochens aa 5 Th. Citronenschalen, Zimmt, Cardamomen und Süssholz hinzugesetzt. Die Zittmannsche Cur bei Secundärsyphilis besteht darin, dass man 2—4 Wochen lang bei reizloser Diät abwechselnd starkes und schwaches Decoct trinken lässt, und zwar entweder Morgens 300,0 bis 500,0 starkes Decoct (Morgens warm, Abends kalt) und im Laufe des Tages die doppelte Menge schwaches Decoct.

In früherer Zeit war auch ein zusammengesetzter Sarsaparillsyrup, **Syrupus Sarsaparillae compositus, officinell**, zu dessen Darstellung neben Sarsaparilla noch Chinawurzel, Sassafras, Guajakholz, Chinarinde und Anis diente und den man als Antisyphiliticum thee- oder esslöffelweise reichte und als Vehikel für Iodkalium verordnete. Auch curmässig wurde derselbe, wie der in seiner Zusammensetzung sehr variirende, marktschreierisch angepriesene Roob Laffecteur, in Verbindung mit schwachen Sarsaparilldecocten gebraucht. Aehnliche Zusammensetzung haben die in Frankreich benutzten Sirop de Cuisinier und Sirop sudorifique.

Hin und wieder wird auch noch die **Essentia Sarsaparillae**, eine von v. Arnim besonders empfohlene concentrirte Abkochung von Sarsaparilla (1:10) mit Zusatz von Spir. vini Gallici, täglich zu 2—4 Esslöffeln in Sennesblätteraufguss oder St. Germain Thee verordnet. Aehnlich, aber stärker, war das früher in der Preuss. Pharmacopoe officinelle **Decoctum Sarsaparillae concentratum**.

**Anhang.** — Der botanischen Abstammung nach reiht sich an die Sarsaparille die Chinawurzel, *Rhizoma Chinae* s. *Radix Chinae*. Diese richtiger den Knollen zuzuzählende Droge, welche eirunde und gekrümmte, bis 2 Dm. lange und 5 Cm. breite, schwere, compacte, aussen rothbraune, innen röthlich-weissliche Stücke darstellt, stammt vorzugsweise von *Smilax glabra* (Hance), vielleicht auch von anderen in China einheimischen *Smilax*arten, und enthält vorzugsweise Amylum, vielleicht auch geringe Mengen Smilacin oder einen dem-



selben nah verwandten Stoff (*Smilachin* von *Reinsch*). Die mehr schleimig als kratzend schmeckende Droge ist im östlichen Asien bei Lustseuche und Rheumatismus geschätzt und wurde 1525 durch den Portugiesen *Tristan* als Mittel gegen Syphilis nach Europa gebracht. Obschon sie zu jeder Zeit, besonders durch den Umstand, dass Kaiser Karl V. durch sie von einem hartnäckigen Rheumatismus befreit wurde, einen hohen Ruf genoss, ist sie jetzt fast ganz obsolet. Inwieweit die hellere und leichtere nordamerikanische Chinawurzel, von *Smilax Pseudochina* L. in der Wirkung Abweichungen zeigt, ist nicht ermittelt. Man kann die *Radix Chinae* in Tisanen (1:25—50) zu 15,0—30,0 pro die geben.

Nicht zu den *Smilaceen* gehört die sog. Ostindische Sarsaparille, *Radix Sarsaparillae Indicae* s. *Nanari*, die bei Syphilis und Hautkrankheiten nach Art der Chinawurzel benutzte Wurzel der Ostindischen *Asclepiadee* *Hemidesmus Indicus*.

### **Lignum Sassafras; Sassafras, Fenchelholz.**

Die Droge stammt von *Sassafras officinale* Nees (*Laurus Sassafras* L.), einem in den mittleren und südlichen atlantischen Staaten der nordamerikanischen Union einheimischen schönen Baume aus der Familie der Laurineen, und wurde aus Florida, wo sie als schweisstreibendes und antisypilitisches Mittel benutzt wurde, 1555 durch die Franzosen in Europa eingeführt.

Der *Sassafras* besitzt eine ästige, knorrige, bis zu 0,1 Meter dicke, gebogene Wurzel, welche aus dem blassbräunlichen oder fahlröthlichen, leichten, schwammigen Holze und der dicken, korkigen, aussen graulich braunen und rissigen, innen zimtbraunen Rinde besteht. Sowohl das Holz als die Rinde, welche auch als solche (*Cortex Sassafras*) im Handel sich findet, haben einen eigenthümlich angenehmen, aromatisch süßlichen Geruch und Geschmack, dessen Aehnlichkeit mit dem des Fenchels die Benennung Fenchelholz veranlasste. Aehnlicher Geruch kommt auch bei anderen Laurineen, z. B. der Brasilianischen *Sassafras*, *Nectandra cymbifera* Nees s. *Ocotea amara* Martius, vor. Der Name *Sassafras*nüsse wird den unter dem Namen *Pichurimbohnen* bekannteren *Cotyledonen* von *Nectandra* s. *Ocotea* *Puchury* (Brasilien) beigelegt.

Der wirksame Bestandtheil der *Sassafras*wurzel ist das besonders der Rinde angehörige ätherische *Sassafrasöl*, *Oleum Sassafras aethereum*.

Es ist frisch farblos, meist gelb, schmeckt brennend, löst sich in 5 Th. Weingeist und ist ein Gemenge von *Sassafrascampher*, der sich in der Kälte absetzt, dem diesem isomeren, bei 231—233° siedenden *Safrol* und dem rechtsdrehenden, bei 155—157° siedenden *Camphene* *Safren*. Neben dem Oele findet sich in der Rinde auch etwas Harz und das krystallinische, aber nicht genauer untersuchte *Sassafrid* von *Reinsch*. Wolf und Sachs versuchten das Oel bei *Blennorrhoe* der Bronchien und des Darmcanals ohne besonderen Erfolg. *Shelby* (1869) rühmt es bei Intoxicationen mit *Bilsenkraut* und *Tabak* und bei *Klapperschlangenbiss* und *Insectenstich* als *Excitans*.

*Sassafrasholz* findet seine Anwendung nur in der Form von Tisanen bei Syphilis, Hautkrankheiten und Rheumatismen. Man muss es wegen seines Gehaltes an ätherischem Oele im Aufguss (1:25—50) und bei Verordnung mit *Sassaparille* und ähnlichen Mitteln im *Decocto-Infusum* anwenden.

**Lignum Guajaci**, *Lignum sanctum s. vitae s. benedictum*; **Guajakholz**, Pockholz, Franzosenholz.

Die von den Spaniern als *palo santo* 1508 von Domingo nach Europa gebrachte Droge, welche ihren Ruf als *Antisyphiliticum* zum grossen Theile der 1519 erschienenen Schrift Ulrichs von Hutten *de Guajaci medicina et morbo gallico* verdankt, ist das von einem auf den Antillen wachsenden Baume aus der Familie der Zygophylleen, *Guajacum officinale* L., stammende, ausserordentlich schwere und dichte Holz, welches unter dem Namen Pockholz oder Bockholz (*corrumpirt* aus Pockenholz) vielfach zu Drechslerarbeiten benutzt wird.

Das Holz wird von Westindien aus in centnerschweren Stücken verschickt, kommt aber für den medicinischen Gebrauch im Handel gewöhnlich in der Form von Drehspänen (*Rasura ligni Guajaci*) vor. Das Holz hat ein spec. Gew. von 1,3 und besteht aus dem dunkel olivengrünen Kernholze, welches als der hauptsächlichste Träger der Wirksamkeit angesehen wird, und dem gelbweissen, an der Grenze des Kernholzes grün gestreiften Splinte. Das Pockholz ist ausgezeichnet durch den Verlauf der sich in verschiedener Richtung kreuzenden Holzfasern. Es schmeckt gewürzhaft, schwach kratzend und entwickelt beim Reiben einen angenehmen, an Benzoe erinnernden Geruch. — Die früher von Linné empfohlene Rinde, *Cortex Guajaci*, welche ein eigenthümliches Harz und einen Bitterstoff enthalten soll, ist obsolet; ebenso ist das gleichfalls als *palo santo* bezeichnete Holz des naheverwandten westindischen Baumes *Guajacum sanctum* L., welches viel leichter ist, nur in seiner Heimath gebräuchlich. Das Wort Guajak ist westindischen Ursprungs und würde richtiger als „Hujak“ gesprochen werden.

Als wirksames Princip der Droge ist das besonders im Kernholz vorhandene Harzgemenge zu betrachten.

Dieses früher officinelle Guajakharz, *Resina Guajaci*, welches aus Einschnitten des Baums ausgeflossen oder häufiger durch Auskochen des Holzes mit Salzwasser oder durch Erhitzen dünner Holzstückchen am Feuer in Westindien gewonnen wird, bildet dunkelgrüne bis braunschwarze Körner oder Klumpen mit glasartigem Bruche, eigenthümlichem angenehmem Geruche und scharf kratzendem Geschmacke. Es besteht aus drei Säuren, der Guajakonsäure, welche 70% des Guajakharzes ausmacht, Guajakharzsäure und Guajak-säure, welche der Benzoesäure sehr ähnlich ist, einem indifferenten Harze, Guajakbetaharz und einem krystallisirbaren bitterschmeckenden Farbstoffe (Guajakgelb). Bemerkenswerth ist die Eigenschaft des Guajakharzes, durch Ozon und andere oxydirende Einflüsse prächtig blau oder grün gefärbt zu werden, welche Färbung durch Reducienten wieder in die ursprüngliche gelbe zurückverwandelt wird. Beim Schmelzen mit Kalihydrat liefert es Protokatechusäure. Durch trockne Destillation entsteht aus dem Guajakharz ein dicker braunrother Theer, welcher von flüchtigen Bestandtheilen Guajacen oder Guajol, Guajacol und Pyroguajacin enthält (Hlasiwetz).

Weder von einem der Componenten des Guajakharzes noch von diesem selbst existirt eine befriedigende physiologische Prüfung. Die Angabe von Behr (1857), dass es zu 4,0 Purgiren ohne Kolikschmerzen bedinge und dass dieselbe Action in noch stärkerem Maasse nach einer Verbindung des Harzes mit Magnesia erfolge, lässt sich zu Schlussfolgerungen für die Wirkung nicht verwerthen. Auch die ärztliche Erfahrung berechtigt nicht zu bestimmten Schlussfolgerungen, da das Mittel fast niemals für sich zur Anwendung gekommen ist und meist mit grösseren Mengen Wasser eingeführt wird. Selbst die Erscheinungen, welche man auf grössere Dosen der Abkochungen des Holzes auftreten gesehen haben will, wie Temperatursteigerung mit nachfolgendem

Schweiss und morbillösem Exanthem (Krauss), können als Folge des Guajaks nicht mit Sicherheit angesehen werden. Secundärsyphilis, chronischer Rheumatismus, gichtische Leiden, chronische Hautkrankheiten und Menstrualstockungen sind diejenigen Affectionen, bei denen man Guajak in Anwendung bringt. Bell und Morris empfahlen es bei Angina tonsillaris nach vorausgeschicktem Brechmittel.

Man reicht Lignum Guajaci in schwacher Abkochung (Ptisane), die man entweder als solche (1:20) verordnet oder welche man im Hause des Kranken bereiten lässt. Meist giebt man es in Verbindung mit ähnlich wirkenden Mitteln, zweckmässig in der Form des officinellen Holzthees (s. Präparate).

Die Resina Guajaci wird zu 0,3—1,0 3—4mal täglich in Pulver, Pillen oder Emulsion gegeben. Die Emulsion nimmt eine blaue Farbe an, welche bei Zusatz oxydierender Mittel intensiver hervortritt.

#### Präparat:

**Species Lignorum, Species ad decoctum lignorum; Holzthee.** Guajakholz 5 Th., Hauhechelwurzel 3 Th., Sassafrasholz, Russisches Stussholz  $\bar{a}\bar{a}$  1 Th. Das Ppt. dient zu schweisstreibenden Curen bei Hautkrankheiten, Syphilis u. s. w. zu 50,0—60,0 pro die, indem man 2 Esslöffel davon mit 6 Tassen Wasser auf 4 Tassen einkochen lässt, die man Abends trinken oder im Laufe des Tages verbrauchen lässt. Mit Sennesblättern versetzt kann man den Holzthee auch zum Ersatz des Zittmannschen Decocts anwenden. Ähnliche Species, jedoch mit Sassaparille sind die *Espèces sudorifiques* der Franzosen; vielfach wird auch Rad. Bardanae, Lignum Juniperi oder Rhizoma Caricis arenariae hinzugesetzt. Fast alle auswärtigen Pharmacopöen haben verschiedene Vorschriften zum Holzthee.

Früher war unter dem Namen *Tinctura Guajaci*, Guajaktinctur, eine Lösung von 1 Th. Guajakharz in 5 Th. Spiritus officinell, die man zu 20—60 Tr. mehrmals täglich, meist in Verbindung mit Tinctura Colchici und anderen Rheumatica, verordnete. Von dieser braunen Tinctur unterscheidet sich eine in gleicher Richtung verwendete, mit Spiritus und Liquor Ammonici caustici bereitete Macerationstinctur, die Tinctura Guajaci ammoniata, durch ihre olivengrüne Farbe und scharfbrennenden Geschmack. Man giebt letztere zu 10—30 Tr. in schleimigen Vehikeln oder in einem aromatischen Syrup. Früher wurde das Harz auch mit Kalihydrat verseift, als Sapo guajacinus zu 0,1 bis 0,4 in Pillenform verwendet.

#### Verordnungen:

- |  |  |
|--|--|
| <p>1) <math>\bar{R}</math><br/> <i>Ligni Guajaci rasp.</i><br/> <i>Rhiz. Graminis</i> <math>\bar{a}\bar{a}</math> 40,0<br/> <i>Rad. Liquirit. mund.</i> 10,0<br/> <i>C. c. m. f. specc. D. S.</i> Zwei Esslöffel<br/> mit 6 Tassen Wasser auf 4 Tassen<br/> einzukochen und Abends zu trinken.<br/> <i>(Species lignorum Ph. milit.)</i></p> | <p><i>Stipitum Dulcamarae</i> 10,0<br/> <i>Fructum Foeniculi</i> 2,0<br/> <i>C. c. m. f. specc. D. S.</i> Nach Bericht.<br/> <i>(Species decocti lignorum. Ph. Norv.)</i></p>  |
| <p>2) <math>\bar{R}</math><br/> <i>Ligni Guajaci</i> 40,0<br/> — <i>Sassafras</i><br/> <i>Rad. Bardanae</i> <math>\bar{a}\bar{a}</math> 20,0<br/> — <i>Liquiritiae mund.</i> 5,0</p>   | <p>3) <math>\bar{R}</math><br/> <i>Ligni Guajaci</i> 50,0<br/> — <i>Juniperi</i> 35,0<br/> <i>Rad. Saponariae</i> 10,0<br/> — <i>Liquiritiae</i> 5,0<br/> <i>C. c. m. f. specc. D. S.</i> Holzthee.<br/> <i>(Species ad Decoct. lignorum. Ph. Suec.)</i></p> |

Tayuya. — Mit diesem Namen wird ein in Brasilien hochgeschätztes Antisyphiliticum, die Wurzel oder Knolle einer Cucurbitacee, vermuthlich *Trianosperma ficifolia*, belegt, welche bei Syphilis und Scrophulose neuerdings in Italien vielfach angewendet wird. Man benutzt eine starke Tinctur zu 10 bis 20 Tr. mehrmals täglich.



**Rhizoma s. Radix Caricis; Sandriedgraswurzel, rothe Quecke.** — Das Rhizom von *Carex arenaria* L., einer in Sandgegenden Europas häufigen Cyperacee, war in früheren Zeiten als blutreinigendes Mittel so geschätzt, dass man es sogar als Deutsche Sassaparillwurzel bezeichnete. Die frische Wurzel riecht balsamisch und schmeckt süsslich scharf, der Geruch verliert sich beim Trocknen. Die häufig damit verwechselten Stolonen von *Carex intermedia* L. und *C. hirta* L. sind braun von Farbe und ohne Schärfe, unterscheiden sich durch ihre feste, weisse Rinde, während die officinelle Wurzel Luftgänge in der Rinde zeigt. Die Sandriedgraswurzel wird nur innerlich in dünnen Abkochungen (1:25—50) zu 15,0—30,0 pro die bei Flechten und Secundärsyphilis gebraucht und meist mit andern antidyskratisch wirkenden Drogen zusammen verordnet.

### **Folia Juglandis; Walnussblätter.**

Die Blätter des Walnussbaums, *Juglans regia* L., eines ursprünglich in Vorderasien und Kaschmir einheimischen, jetzt überall bei uns cultivirten Baumes, sind unpaarig gefiedert und bestehen aus 6—9 grossen, länglich ovalen, ganzrandigen, zugespitzten Blättchen von eigenthümlichem balsamischem Geruche und bitterem, etwas herbem Geschmacke. Sie werden vor völliger Entwicklung gesammelt, wo sie langs der Nerven mit weichen Gliederhaaren besetzt und mit hellgelben Drüsen bestreut sind. Ausser eisengrünender Gerbsäure scheinen sie keinen besondern Bestandtheil zu enthalten, namentlich nicht das in den früher officinellen unreifen Fruchtschalen, *Cortex viridis* s. *Putamina nucum Juglandis*, aufgefundenen, in gelben Nadeln oder Blättchen krystallisirende, stickstofffreie Nucin. Die Walnussblätter werden hauptsächlich bei Scrophulose (Négrier, Nasse, Mauthner) innerlich und äusserlich verwendet und wirken hier wahrscheinlich durch ihren Gehalt an Gerbsäure. Wie früher die Walnusschalen einen Bestandtheil des Pollinischen Decoctes bildeten, giebt man in Italien auch jetzt noch hie und da die Blätter in Abkochung (zu 10,0—15,0 pro die) bei Syphilis, Hautkrankheiten und Gicht. Frische zerstossene Walnussblätter wurden von Nélaton und Raphanel als Verband bei *Pustula maligna* empfohlen. — Das nicht mehr officinelle *Extractum foliorum Juglandis* wurde früher zu 0,3—1,0 in Pillen oder Lösungen als Antidyscraticum benutzt, auch in adstringirenden Gurgelwässern, Collyrien und Verbandwässern gegeben.

**Radix Bardanae; Klettenwurzel.** — Die im Herbst des ersten oder im Frühling des zweiten Jahres gesammelte Wurzel der in Europa überall einheimischen drei Klettenarten, *Lappa minor* DC., *Lappa major* Gaertner (*Lappa officinalis* All.) und *Lappa tomentosa* Lam. (*Arctium Bardana* Willd.), aus der Familie der Synanthhereae, kommt im Handel gewöhnlich longitudinal in Stücken zerschnitten vor und hat einen schleimigen, süsslichen (nicht bitteren) Geschmack. Sie ist fingerdick, aussen graubraun und runzlig, innen blassbräunlich und enthält Inulin, etwas Gerbstoff und Zucker. Sie war früher ein Bestandtheil der *Species lignorum* und findet wie diese im Decoct (1:25—50) bei chronischen Hautkrankheiten, auch bei Syphilis secundaria hie und da Benutzung. Beim Volke steht ein concentrirtes Decoct in Ansehen gegen Ausfallen der Haare, wogegen besonders auch das sog. Klettenwurzelöl (ursprünglich Digest der Klettenwurzel mit Provenceröl) einen nach Kreutzburg u. A. unverdienten Ruf besitzt.

**Radix Carlinae s. Cardopatae; Eberwurzel, Rosswurzel.** — Die Wurzel der auf den Gebirgen und Voralpen des mittleren Europa heimischen schönen Eberdistel, *Carlina acaulis* L., aus der Familie der Synanthhereae, von eigenthümlichem, scharfem Geschmack und starkem, nicht angenehmem Geruche, enthält 1% ätherisches Oel, Harz und Inulin (letzteres nicht constant) und wurde früher gegen Hautkrankheiten (äusserlich und innerlich), Unterleibsstockungen und gastrische Fieber benutzt, wird aber jetzt mit Recht der Veterinärpraxis überwiesen.

**Radix Saponariae; Seifenwurzel.** — Unter diesem Namen war früher die Wurzel des bei uns an Ufern und Hecken wachsenden Seifenkrautes, *Saponaria officinalis* L., einer zu der Familie der Caryophylleae gehörenden Pflanze, welche in allen ihren Theilen, besonders aber in der Wurzel, ein durch seine Eigenschaft, mit Wasser eine schäumende Lösung zu geben, ausgezeichnetes Glykosid, das Saponin, einschliesst. Die Wurzel ist ohne Geruch, schmeckt anfangs süsslich bitter, später anhaltend scharf und kratzend und bewirkt Zusammenlaufen von Speichel im Munde, weshalb sie auch als Speichelwurzel bezeichnet wird. Man unterscheidet die Seifenwurzel als *Radix Saponariae rubrae* von den als *Radix Saponariae albae* bezeichneten Wurzeltheilen von *Melandrium sylvestre* Röhl. und *M. pratense* Röhl., sowie von der Spanischen oder Levantischen Seifenwurzel, *Rad. Sap. Levanticae*, den  $\frac{1}{2}$ —2 Zoll dicken, fusslangen Wurzeln von *Gypsophila Struthium* L.

Das Saponin, welches sich noch in einer grösseren Anzahl von Angehörigen der Familie der Caryophylleen, z. B. in der Kornrade, *Agrostemma Githago* L., ausserdem in der Senegawurzel, in der Monesia und in der sog. Panamarinde findet, bildet ein weisses, amorphes, neutrales Pulver von anfangs süsslichem, hinterher anhaltend scharfem und kratzendem Geschmacke, das, auf die Nasenschleimhaut gebracht, zu heftigem Niesen reizt. Verdünnte Säuren spalten Saponin in Sapogenin und Glykose.

Das Saponin ist ein örtlich scharf und ausserdem auf die verschiedensten Partien des Nervensystems und die Muskeln lähmend wirkender Stoff, welcher in der Intensität seiner giftigen Wirkung nach dem zu seiner Darstellung benutzten Material Verschiedenheiten darzubieten scheint. Bei Menschen bedingt Saponin zu 0,1—0,2 Hustenreiz und mehrstündige Absonderung von Schleim (Schroff), auf Wunden oder Schleimhäuten lebhaften Schmerz und nach einigen Stunden Absonderung plastischen Exsudats. Subcutane Injection bedingt sehr erhebliche örtliche und entfernte Erscheinungen, Oedem und Pseudoerysipelas, Schüttelfrost, Ohnmachten, somatische und psychische Depression, Schlummer-sucht, Photophobie, Speichelfluss und Nausea, Exophthalmos und Strabismus (Keppler, Eulenburg). Diese Phänomene können schon nach 0,02—0,1 hervortreten. Interessant ist die von Pelikan constatirte vernichtende Wirkung auf die Sensibilität an der Applicationsstelle, gleichzeitig mit Abnahme der elektrischen Reizbarkeit der Nerven und der Muskeln; Ligatur der Gefässe und Durchschneidung der Nerven wirken auf das Zustandekommen dieser lokalen Anästhesie verlangsamend ein. Das in das Blut aufgenommene Saponin wirkt lähmend auf Muskeln und Nerven und afficirt in eigenthümlicher Weise die Herznerven, indem es sowohl die Vagusendigungen und die Hemmungscentren als die aus dem Sympathicus stammenden Beschleunigungsnerven lähmt und schliesslich Herzstillstand bedingt. Digitalin bedingt bei Saponinvergiftung Beschleunigung der stark retardirten Herzaction und Verstärkung der Herzcontractionen, ebenso beseitigt es das bei Saponin hervortretende Sinken des Blutdrucks. Vor Eintritt der Herzlähmung wird auch die Darmmuskulatur gelähmt, ferner wirkt Saponin rasch auf das vasomotorische Centrum (zuerst erregend, dann rasch lähmend), sowie auf das respiratorische Centrum, das von grösseren Dosen plötzlich, von kleineren allmählig gelähmt wird. Athemfrequenz und Temperatur sinken bei Saponinvergiftung sehr bedeutend. Klonische und tonische Krämpfe, welche nach Saponin vorkommen, scheinen auf die Störungen des Herzens und der Athemfunctionen bezogen werden zu müssen; doch erzeugt Saponisirung des Rückenmarks bei Fröschen anfänglich Tetanus, später vom Centrum nach der Peripherie zu fortschreitende Lähmung. Nach grossen Dosen kommt es stets zu Trägheit und Unlust zu Bewegungen. Im Darm und Magen bewirkt Saponin entzündliche Röthung; Speichelfluss und Vermehrung anderer Secretionen ruft es nicht hervor (H. Köhler). St. Ange will Saponin zu 0,15 pro dosi mit Erfolg bei Mutterblutung gegeben haben.

Die empirisch ganz nach Art der Sarsaparille medicinisch benutzte *Radix Saponariae* findet meist in Verbindung mit andern vegetabilischen Antidyscratica innerlich im Decoct (1 : 10—20, zu 10,0—15,0 pro die) Anwendung und wird gewöhnlich in Speciesform verordnet. Früher kam sie auch häufig als Bestandtheil der Kämpferschen Visceralclystiere in Gebrauch.

**Stipites Dulcamarae; Bittersüsstengel.** — Mit diesem Namen werden die früher bei chronischen Krankheiten sehr geschätzten, anfangs bitter, später süß schmeckenden, 2- oder 3-jährigen, im Herbst nach dem Abfallen der Blätter gesammelten Stengel oder Aeste eines in ganz Europa an feuchten, schattigen Stellen wachsenden, auch in Algerien, Syrien, China und Nordamerika vorkommenden kleinen Strauches aus der Familie der Solaneen, *Solanum Dulcamara* L., bezeichnet. Die Pflanze enthält in allen ihren Theilen und vorzugsweise in der grünen Rindenschicht ein auch in anderen Solanumarten, z. B. in den grünen Theilen und den Keimen der Kartoffel, *Solanum tuberosum* L., in den Blättern und Früchten des schwarzen Nachtschatten, *Solanum nigrum* L., vorkommendes, auf das Nervensystem wirkendes Alkaloid, das Solanin, neben dem noch ein zweites, das Dulcamarin, von Wittstein aufgefunden ist, dessen Wirkung bis jetzt nicht festgestellt wurde. Das erstgenannte Alkaloid, dessen toxische Wirkungen mit denen eines aus Bittersüsstengeln dargestellten Heisswasserextracts völlig übereinstimmt, spaltet sich beim Erwärmen mit verdünnter Schwefel-, Salz- oder Oxalsäure in Glykose und Solanidin, einen ebenfalls basischen Pflanzenstoff, welcher durch weitere Einwirkung der Säuren in zwei andere Alkaloide, Solanicin und modificirtes Solanidin, zerfällt. Das Solanin ist eine auf das Nervensystem wirkende Substanz, welche nach den von Th. Husemann und Balmanya angestellten Versuchen bei Kaltblütern lähmend auf die Nervencentra wirkt, ohne die peripherischen Nerven und die quergestreiften Muskeln zu paralysiren, ausserdem die Schlagzahl des Herzens herabsetzt, das jedoch noch längere Zeit nach dem Erlöschen der Bewegungen und der Reflexaction weiter pulst und schliesslich in Diastole stillsteht. Bei Kaninchen bedingt Solanin Apathie ohne eigentliche Hypnose, Sinken der Zahl der Herzschläge und der Respiration (bisweilen nach vorausgehender Beschleunigung beider), Abnahme der Sensibilität und Tod unter Erstickungskrämpfen. Constant ist bei Warmblütern Sinken der Temperatur bis zum Tode und Abwesenheit von Veränderungen der Pupille. Das schwächer giftige Solanidin ruft bei Fröschen und Kaninchen dieselben Veränderungen im Nervensystem, in Respiration und Circulation hervor, bewirkt indess kein Sinken der Temperatur und veranlasst in toxischen Dosen Erweiterung der Pupille (Th. Husemann und Balmanya). Beim Menschen bedingen Dosen von 0,03—0,2 Kratzen im Halse, Ansteigen des Pulses mit nachfolgender Verminderung unter die Norm, Betäubung, Gähnen, Schlaftrigkeit, in den grösseren Dosen auch Athembeschwerden, Aufstossen, Uebelkeit, Brechreiz, Eingenommensein des Kopfes, Schwindel, Kälte der Extremitäten und Schwäche; wirklicher Schlaf erfolgt selbst durch grössere Dosen Solanin nicht. Veränderung der Pupille, des Stuhlganges, der Diurese und Diaphorese findet nicht statt (Desfosses, Clarus, Schroff, Fronmüller). Therapeutische Bedeutung hat das Solanin bis jetzt nicht erlangen können.

Der medicinische Gebrauch der *Stipites Dulcamarae* beschränkt sich nicht allein auf chronische Exantheme, wo sie vorzugsweise im Ansehen stehen, vielmehr hat das Mittel bei allen Dyskrasien, wo Holztränke in Gebrauch kamen, ferner bei Hydrops und Ikterus Benutzung gefunden. Für alle diese Verwendungen bietet sich in der Wirkung des Solanins keine rationelle Indication, eher für eine zweite Wirkungssphäre des Mittels, für den Gebrauch bei chronischem Bronchialkatarrh, Asthma und Keuchhusten, indem die bei toxischen Dosen Solanin beobachteten Erscheinungen eine herabsetzende Wirkung auf das respiratorische Centrum andeuten.

Man kann die *Stip. Dulc.* zu 0,5—2,0 pro dosi mehrmals täglich in Pulver oder Abkochung verordnen.

Das früher officinelle (wässrige) Bittersüsseextract, *Extractum Dulcamarae*, wurde zu 0,5—1,0 mehrmals täglich in Pillen oder Lösung gegeben.

### **Herba Violae tricoloris, Herba Jaceae; Stiefmütterchen, Freisamkraut.**

Die Droge ist das getrocknete blühende Kraut des in ganz Europa einheimischen und vielfach cultivirten Stiefmütterchen, *Viola tricolor* L., welches nur von wilden Exemplaren gesammelt werden darf. Man hielt früher



die als *Viola arvensis* bezeichnete einfarbige Varietät mit weissen oder gelben Blüten für besonders heilkräftig. Die getrocknete Droge besteht aus zahlreichen eckigen Stengeln mit zerstreuten, gestielten, herzförmig-eirunden Blättern und blattartigen leierförmigen Nebenblättern und langgestielten, gespornten ungleich-fünfblättrigen Blumen. Das Freisamkraut schmeckt schleimig, schwach bitter, kaum kratzend und enthält ausser etwas *Violin* (vgl. S. 589) nach den Untersuchungen von Mandelin *Salicylsäure*. Es ist im vorigen Jahrhundert von Strack gegen *Impetigo faciei* empfohlen und wird auch jetzt bei Ekzem u. a. Hautaffectionen im kindlichen Lebensalter besonders vom Volke angewendet. Man kann es zu 1,0–5,0 mehrmals täglich in Pulvern, oder zweckmässiger in Abkochung mit Milch oder Wasser (1:10) anwenden. Auch äusserlich hat ein daraus bereitetes Extract in Salbenform bei chronischen Hautleiden Empfehlung gefunden. Piffard (1882) empfiehlt ein Fluid Extract zu 5–10 Tropfen beim Erwachsenen und 1–5 Tropfen bei Kindern. Anhaltender Gebrauch von Stiefmütterchenthee soll dem Urin einen widrigen Geruch nach Katzenharn geben.

*Folia Toxicodendri, Herba Rhois toxicodendri, Giftsumachblätter.* — Weit mehr toxikologisches als therapeutisches Interesse besitzen die Blätter des Giftsumachs, *Rhus toxicodendron* Mich., eines in Nordamerika einheimischen Strauches aus der Familie der Terebinthaceen, von welchen verschiedene, von einzelnen Botanikern als besondere Species bezeichnete Varietäten (*Rhus radicans* L., *Rhus toxicodendron* L.) existiren. Bei Berührung der frischen Blätter und des in ihnen, wie in der ganzen Pflanze enthaltenen, an der Luft sich schwärzenden Milchsafte mit der blossen Haut entsteht ein eigenthümlicher Hautausschlag, welcher eine Combination von Ekzem und Erysipel darstellt und die Besonderheit zeigt, dass er durch Berührung mit den Händen auf andere Körperstellen übertragen werden kann, ja selbst auf andere gesunde Personen durch Berührung transmissibel ist. Nach einzelnen Angaben soll das mit starkem Jucken und Brennen verbundene Exanthem auch durch die Ausdünstung des Baumes hervorgerufen werden, was indessen nur unter bestimmten Bedingungen, nach van Mons u. A. bei trübem Himmel, im Schatten oder am Abend, nach Kalm bei transpirirenden Individuen zu geschehen scheint. Diese eigenthümliche Wirkung, welche auch andern Arten von *Rhus* zukommt und gegen welche Differenzen der Empfänglichkeit einzelner Individuen existiren, steht im scheinbaren Gegensatze zu der experimentell festgestellten Unwirksamkeit der trocknen Blätter und der aus solchen oder aus frischen Blättern dargestellten Auszüge (J. Clarus). Maisch will eine eigenthümliche flüchtige Säure, die Toxicodendronsäure, als wirksames Princip des Giftsumachs isolirt haben. Buchheim hält die Wirkung der frischen Blätter auf die Haut von Cardol oder einem ähnlichen Stoffe abhängig. Uebrigens mag bemerkt werden, dass ältere Experimentatoren nach Infusen von frischen Blättern Magenschmerzen und vermehrte Diurese, Jucken und Brennen der Haut, Schwindel und Krämpfe beobachtet haben wollen, wie auch Orfila bei endermatischer oder innerlicher Application von Sumachextract, sowie bei Injection in die Venen den Tod bei Hunden unter Lähmung der Nervencentren erfolgen sah. Bei diesen Widersprüchen erscheint es gewiss geboten, von der therapeutischen Anwendung der Giftsumachblätter vollständig zu abstrahiren. Man hat von denselben bei chronischen Hautausschlägen, Rheumatismus und Gicht einerseits, bei verschiedenen Nervenleiden, besonders Lähmungen (Alderson) andererseits, auch bei Amaurose (Bretonneau, Trousseau) und Enuresis nocturna (Descôtes) zu 0,03–0,12 in Pulverform, auch im Aufguss Gebrauch gemacht. Das von Rinde und Mark befreite Holz von *Rhus Toxicodendron* empfiehlt Gibson in Abkochung bei Phthisis. Eine aus frischen Giftsumachblättern dargestellte Tinctura *Toxicodendri* gab man früher zu 2–20 Tr mehrmals täglich bei Lähmungen.

*Herba Pulsatillae s. Pulsatillae nigricantis, Küchenschelle.* — Mit diesem Namen belegt man das mit der Blüthe im April und Mai gesammelte Kraut der bei uns einheimischen Ranunculaceen *Anemone pratensis* L. (*Herba Pulsatillae minoris*) und *Anemone Pulsatilla* L. (*Herba Pulsatillae majoris*). Dasselbe wird nur im frischen Zustande zur Darstellung von Präparaten benutzt, weil es beim Trocknen seine Schärfe theilweise

verliert, die sich frisch sowohl beim Zerreiben des Krautes als beim Kauen zeigt. In der Pulsatilla sind zwei eigenthümliche stickstofffreie Stoffe, das Anemonin (Anemonencampher, Pulsatillencampher) und die Anemonsäure aufgefunden, von welchen nur der erstgenannte auf den Organismus einwirkt. Derselbe ist nach Fehling nicht flüchtig, sondern erweicht bei 150°, wobei er Wasser und stechend riechende Dämpfe entwickelt. Er ist als das Anhydrid einer mit der Anemonsäure isomeren Säure zu betrachten, welche daraus beim Kochen mit wässrigen kautischen Alkalien entsteht (Anemoninsäure). Auf die Zunge in geschmolzenem Zustande gebracht, schmeckt Anemonin äusserst brennend scharf und hinterlässt auf der Zunge mehrere Tage anhaltendes Gefühl von Taubheit. Der Dampf des auf glühendes Eisenblech gestreuten Anemonins kann höchst intensive Reizung der Conjunctiva und der Nasenschleimhaut bedingen (Heyer). Die Untersuchungen von J. Clarus, Curci und Broniewski widerlegen die Annahme von Buchheim, wonach dem Anemonin nur örtlich scharfe Wirkung zukomme, während andererseits die Angabe von Clarus, wonach Anemonin keine örtlich irritirende Wirkung besitze, nicht völlig zutreffend erscheint. Die Symptome bei Thieren deuten auf eine Action auf Hirn und verlängertes Mark (Schlaf, Dyspnoe), vielleicht auch auf das Rückenmark und die Muskeln. Die Giftigkeit ist weit geringer als die anderer reiner Ranunculaceenstoffe, da es erst zu mehreren Dgm. Kaninchen tödtet. Nach Heyer bedingt Anemonin beim Menschen zu 0,03 2mal täglich heftiges Reissen im Kopfe und häufigen Urindrang.

Nach den vorliegenden Untersuchungen sind wir ausser Stande, die Stellung der Pulsatilla unter den Medicamenten mit Sicherheit zu bestimmen. Wir stellen sie zu den Antidyscratica, weil man sie in früherer Zeit bei Gicht, Rheumatismus, schuppigen Hautkrankheiten, sogar bei secundärer Syphilis benutzte, doch hat sie ihre hauptsächlichste Anwendung als Specificum bei den unter dem Namen Staar zusammengefassten Augenaffectionen gefunden, nicht nur bei Amblyopie und Amaurose, sondern auch bei Katarakt und Glaukom. Daneben aber stand sie auch in Credit bei Krämpfen, Hemikranie, Asthma und Hustenreiz.

Man gebrauchte früher das getrocknete Kraut zu 0,1—0,4 in Pulver, Pillen oder Aufgüssen (1 : 20—50), welche man auch zu Augenwässern benutzte; von Einzelnen wurde bei Katarakt und Amaurose ein weiniges Digest empfohlen.

Mehr als das Kraut selbst war ein aus der frischen blühenden Küchenschelle bereitetes Saftextract, *Extractum Pulsatillae*, in Dosen von 0,06 bis 0,2 gebräuchlich, das mitunter bei Hemikranie von vorzüglicher Wirksamkeit ist. Man kann es in Pulvern, Pillen oder Lösung verordnen. Auch alkoholisches Extract aus trockenem Kraute ist wegen seines Ammoningehaltes nicht ohne Wirksamkeit (Broniewski), wenn schon beim gesunden Menschen recht grosse Dosen keine Intoxicationsphänomene veranlassen.

*Herba Chelidonii*; Schöllkraut. — Die Droge stellt das im Mai in toto gesammelte Schöllkraut, *Chelidonium majus* L., eine bei uns auf Schutthaufen und an Hecken häufige Papaveracee, welche sich durch ihren besonders im Frühjahr stark hervortretenden, safrangelben, bitteren und scharfen Milchsafte auszeichnet, dar. Ueber die chemischen Bestandtheile des Schöllkrauts liegen Untersuchungen aus neuerer Zeit nicht vor. Aus älteren Wurzeln stellte Polex ein eigenthümliches Alkaloid, das Pyrrhopin, dar, welches später Probst als Chelerythrin bezeichnete und welches nach Schiel (1855) mit dem in der nordamerikanischen Blutwurzel vorhandenen Sanguinarin identisch ist. Neben dem Chelerythrin, das im Schöllkraut nur in geringen Mengen sich findet, existirt nach Probst besonders in der Wurzel ein zweites, als Chelidonin bezeichnetes Alkaloid von der Formel  $C^{19}H^{11}N^3O^3$ . Ausserdem enthält das Schöllkraut einen eigenthümlichen Farbstoff, das Chelidoxanthin, welches sich durch einen sehr bitteren Geschmack auszeichnet, und zwei eigenthümliche Säuren, die Chelidonsäure und Chelidoninsäure, welche neben Bernsteinsäure und Apfelsäure namentlich in der blühenden Pflanze sich finden. Das Chelerythrin reizt stark zum Niesen, bewirkt zu 0,06 beim Menschen Erbrechen (Andrews, van der Espt) und tödtet zu 0,001 subcutan Frösche und zu 0,02 Kaninchen; als Vergiftungserscheinungen resultiren Adynamie und klonische oder selbst tonische

Krämpfe. Der Tod erfolgt durch Lähmung des respiratorischen Centrums (Buchheim und Weyland, Schroff jun., R. M. Smith). Auf Pulsfrequenz und Blutdruck wirken kleine Dosen steigend, grosse herabsetzend durch lähmende Einwirkung auf das vasomotorische Centrum und das Herz (Smith).

Das Schöllkraut, welches schon seit dem Alterthume im medicinischen Gebrauche ist, gehört zu den als Lebermittel geschätzten Medicamenten, das namentlich bei Ikterus und bei Druck im rechten Hypochondrium Empfehlung gefunden hat. Mit Löwenzahn und ähnlichen Pflanzen dient der Saft besonders zu Frühlingscuren. Auch bei Wechselfieber, chronischen Katarrhen, Rheumatismus und secundärer Syphilis ist er gebraucht. Das frische zerschnittene Kraut empfahl Rey bei Amenorrhoe oder unterdrückten Fusschweissen in die Strümpfe zu streuen. Der frische Saft von *Chelidonium* ist so scharf, dass er zum Wegbeizen von Warzen benutzt werden kann.

Neben dem Schöllkraute war früher auch ein Saftextract aus dem blühenden Kraute, *Extractum Chelidonii*, officinell. Dasselbe fand zu 0,3–0,5 mehrmals täglich in Pillen oder Mixturen Anwendung. Tagesgaben von 4,0–8,0 können Schwindel, Uebelkeit und Abspannung bedingen (Krahmer). Man benutzte das Schöllkrautextract auch äusserlich zu Augentropfwässern bei Auflockerung der Bindehaut und Linsenstaar, sowie zum Verbands unreiner Geschwüre.

Eine aus dem Schöllkraut dargestellte *Tinctura Chelidonii* ist ein Hauptlebermittel der Rademacherschen Schule und wird zu 5–20 Tropfen 3–4 mal täglich verabreicht.

Die Wurzel der oben erwähnten amerikanischen *Papaveraceae Sanguinaria Canadensis* L., ihrer rothen Farbe wegen als Blutwurzel bezeichnet, scheint mit dem Schöllkraute in ihren Wirkungen ziemlich übereinzustimmen. Nach Eberle und Tully soll sie in kleinen Dosen cholagog und expectorirend wirken, auch Menstruation und Diurese fördern, in grösseren Gaben die Pulszahl herabsetzen, in sehr grossen Dosen Erbrechen, Schwindel, Brennen im Magen und die Erscheinungen des Collapsus, bisweilen auch convulsivische Steifigkeit der Gliedmaassen herbeiführen. In Amerika sind mehrere Todesfälle dadurch vorgekommen. Das Pulver wirkt niesenregend und reizt bei directer Application Wunden und Geschwürsflächen. Die *Radix Sanguinariae* wird zu 0,03–0,3 bei chronischer Dyspepsie und Bronchitis, Menostase und crophulösen Affectionen gegeben, zu 0,4–0,8 als Antipyreticum bei Rheumatismus acutus und Croup; äusserlich wird sie in Pulverform gegen Nasenpolypen, Impetigo und bei schlaffen Geschwüren gebraucht. Ursprünglich soll sie von den Indianern als Krebsmittel benutzt worden sein und auch jetzt noch machen amerikanische Aerzte von einer Aetzpaste mit Chlorzink Gebrauch. Ein als Sanguinarin bezeichnetes Pulver, welches man in Amerika als Sedativum verwendet hat, scheint ein Gemenge von Chelerythrin und Harz zu sein.

#### Cortex Condurango; Condurangorinde.

Aehnlich wie die *Radix Sanguinariae* hat die oben genannte Droge, die Rinde einer Asclepiadee des tropischen Amerikas, *Gonolobus Condurango Triana*, als Krebsmittel Anwendung gefunden. Obschon eine spezifische Wirkung bei carcinomatösen Processen dem Mittel offenbar nicht zukommt, lässt sich doch nicht verkennen, dass die Droge in einzelnen Fällen von Magenkrebs, vielleicht in Folge einer tonisirenden Action auf die Digestion, von günstigem Effecte gewesen ist.

Die Droge stellt ungefähr 1 Dm. lange und 1–7 Mm. dicke verbogene Röhren oder rinnenförmige Stücke dar, deren äussere Oberfläche bräunlich oder braungrau, längsrunzig und höckrig erscheint, während die Innenfläche hellgrau und derb längsstreifig ist. Der Querschnitt zeigt unter dem dünnen braunen Korke ein gleichmässiges, weisses, geschlängeltstrahliges Gewebe mit grossen



brauneu Harzzellen und reichlichen Mengen Stärkemehl. Die Rinde schmeckt bitterlich, schwach kratzend. Eine genauere chemische Untersuchung der Condurangorinde fehlt. Nach Antisell enthält sie Gerbstoff, Harz, Fett und Gummi, indessen ist die Gegenwart eines besonderen activen Principis zu vermuthen, da Extracte der Wurzel bei Thieren tetanische Convulsionen bedingen (Schroff jun., Gianuzzi, Bufalini). Auch die botanische Stellung spricht dafür, indem mehrere Asclepiadeen scharf und emetisch wirkenden Milchsaff führen, so z. B. die Mudarwurzel von *Asclepias* s. *Calotropis gigantea*, welche in Ostindien als Antisyphiliticum, sowie bei Aussatz, Dysenterie in Ansehen steht. Die Condurangorinde ist häufig der Gegenstand von Substitutionen geworden, ohne dass man indess sagen kann, dass darauf etwa die schlechten Erfolge zurückzuführen seien. Am häufigsten hat man die zerschnittenen Blätter und Blattstiele von *Mikania Guaco*, einer im tropischen Amerika einheimischen, widerlich riechenden, aromatisch bitteren Compositae, an Stelle von Condurango in den Handel gebracht, welche in ihrem Vaterlande unter dem Namen Guaco oder Huaco nicht allein gegen Schlangenbiss, sondern auch gegen Stich von Scorpionen und Biss wüthender Hunde in Ansehen steht und auch in Europa theils bei Cholera, theils bei syphilitischen Affectionen (Parola, Gomez) Empfehlung gefunden hat, ohne dass die dem Guaco zugeschriebenen Effecte, z. B. Vernichtung der Inoculabilität des Schankereiters, irgendwie erwiesen sind.

Obschon die mit Condurango von europäischen Chirurgen angestellten Versuche (Hulke, De Sanctis, Pierce) keine irgendwie befriedigenden Resultate von der innerlichen oder äusserlichen Anwendung des schwindelhaft angepriesenen Mittels ergaben, sind doch in den letzten Jahren verschiedene Fälle mitgetheilt, in denen der Gebrauch der Condurangorinde bei *Carcinoma ventriculi*, oesophagi und hepatis insofern günstigen Erfolg hatte, als dadurch Erbrechen und Schmerzen erheblich gemindert, dagegen Appetit, Verdauung und das Allgemeinbefinden bedeutend gehoben wurden. In einzelnen Fällen scheint sogar ein directer günstiger Einfluss auf den Tumor vorzukommen.

Man giebt die Condurangorinde gewöhnlich in Abkochung (1:10—20). Mehr empfehlenswerth scheint ein aus dem durch Erschöpfen der Rinde mit Wasser und später mit Spiritus gewonnenen Extract mit Malaga bereitetes Vinum Condurango zu sein, von welchem man täglich 3 Kaffeelöffel bis 3 Esslöffel voll geben kann. Immermann lässt dies Präparat, welches einen angenehm bitteren Geschmack besitzt und in der Regel längere Zeit hindurch gern genommen wird, in der Weise bereiten, dass 2,5 Kgm. grob gepulverte Rinde zunächst mit 10 Liter kaltem Wasser macerirt, dann der Rückstand mit derselben Menge Wasser eine Stunde lang gekocht, hierauf das Residuum mit 5 Liter Spir. vini rectificatissimus 2 Tage macerirt und nach Verjagen des Spiritus die Auszüge vereinigt, zur Extractconsistenz gebracht und schliesslich in  $2\frac{1}{2}$  Liter Malagawein gelöst werden.

**Anhang.** Mit der Canadischen Blutwurzel und der Condurango ist die Zahl der Krebsmittel keineswegs erschöpft. Da der Werth der hierher gehörigen Medicamente aber äusserst gering und meist sogar gleich Null ist, abstrahiren wir von einer Aufzählung und erwähnen nur die Flores Calendulae, die unangenehm riechenden Blüthen der bei uns einheimischen Synantheree *Calendula officinalis* L., Ringelblume, die in Form von Aufgüssen oder von frisch ausgepresstem Saft (zu 30,0—60,0 pro dosi) oder auch als Extract bei Krebs der Mamma und des Uterus den Ruf eines Specificum hatten. Ebenso problematisch ist der Werth der als Liqueur Calendulae bezeichneten, aus den Calendulablumen aussickernden Flüssigkeit bei Blutungen. Die oben erwähnte Rinde von Guaco ist der Hauptrepräsentant der Specifica gegen den Schlangenbiss, von welchen in tropischen Ländern Hunderte existiren, von denen jedoch bei exacter Prüfung stets die Werthlosigkeit sich erweist, wie z. B. Fayrer von keinem der in Ostindien gebräuchlichen Schlangengiftmittel irgend welchen Nutzen constatiren konnte. Die Stelle dieser Schlangengiftmittel vertreten bei uns Serien von sog. Antilyssa, wie man die gegen die Bissverletzungen wüthender Hunde in Anwendung gebrachten Vegetabilien, wie *Gentiana cruciata*, *Alisma Plantago*, *Anagallis arvensis*, *Scutellaria lateriflora*, nennt, deren Werth gleich Null ist und welche z. Th., wie der neuerdings aus Cochinchina zu uns importirte Hoang-nan, die strychninhaltige

Rinde von *Strychnos Gautheriana*, höchst giftige Drogen darstellen. Der Glaube an diese Mittel hat Manchen das Leben gekostet, der durch rationelle Behandlung der Wunde zu retten gewesen wäre.

Fast ebenso problematisch ist die Wirkung verschiedener gegen Lepra innerlich in Anwendung gezogener Vegetabilien, die man unter dem Namen *Antileprosa* vereinigt hat. Von diesen hat in allerneuester Zeit das Oel von *Gynocardia odorata*, *Chaulmugraöl*, innerlich in steigender Dose gegeben, die Aufmerksamkeit europäischer Aerzte auf sich gezogen. Aeusserlich ist es auch mit Erfolg bei Alopecie, Scabies und phytoparasitären Hautkrankheiten benutzt, innerlich, jedoch mit geringem Erfolge, bei Phthisis. Wir erwähnen hier noch wegen ihrer analogen Verwendung die eine Zeit lang als Mittel gegen Variola in Ansehen stehende, bald aber als völlig unwirksam erkannte nordamerikanische *Saracenia purpurea* L., welche neuerdings von französischen Aerzten (Hétet) gegen Gicht empfohlen wurde.

#### Semen Colchici; Zeitlosensamen, Herbstzeitlosensamen.

Die Droge stellt die Samen der im südlichen und mittleren Europa und in den Ländern des Kaukasus wildwachsenden, bei uns auf Wiesen nicht seltenen Colchicacee *Colchicum autumnale* L., Zeitlose, Herbstzeitlose, dar, welche in allen ihren Theilen ein stark giftiges und insbesondere drastisch wirkendes Alkaloid, Colchicin, enthält, das als das alleinige wirksame Princip der Droge zu betrachten ist.

Die Herbstzeitlosensamen werden im Frühsommer im fast reifen Zustande gesammelt, sind fast kuglig, durch den Nabelwulst etwas zugespitzt, bis 3 Mm. dick, punktiert, in nicht zu altem Zustande etwas klebrig, innen blassgrau, besitzen keinen Geruch und schmecken widrig bitter und scharf. Die harte braune Samenschale umschliesst ein graues, strahliges Eiweiss mit einem sehr kleinen Embryo. Von der im Herbst unblüthende Blüthen und im Frühjahr Früchte und Blätter tragenden, daher als „nackte Jungfer“ oder „filius ante patrem“ benannten Pflanze war früher auch die Zwiebel, *Bulbus Colchici*, officinell, welche jedoch minder reich an Colchicin ist, das in reifen und unreifen Samen zu 0,2 %, in jungen Knollen und Sommerknollen nur zu 0,08 % (noch weniger im October und im Mai) enthalten ist. Noch geringer ist der Alkaloidgehalt der Blätter und Blüthen. Das Colchicin,  $C^{11}H^{19}NO^5$ , welches ausser in der Herbstzeitlose, auch in den in alter Zeit in grossem Ansehen stehenden eigenthümlich gestalteten Zwiebeln von *Colchicum variegatum* L., den sog. *Hermodactyli*, vorzukommen scheint, ist eine gelblich-weiße, gummiartige Masse von schwach alkalischer Reaction, in Wasser langsam, aber in allen Verhältnissen, auch in Alkohol, nicht in Aether löslich. Mit Säuren giebt es leicht zersetzbare Salze. Durch verdünnte Mineralsäuren wird es in ein dunkelbraunes Harz und krystallisirbares Colchicein zerlegt, welches letztere mit dem Colchicin isomer ist, aber saure Eigenschaften besitzt, sich minder leicht in Wasser löst und viel weniger bitter schmeckt.

Das Colchicin ist ein heftiges Drasticum, welches in grösseren Gaben Gastroenteritis, meist erst nach einigen Stunden auftretend, und Tod bedingen kann und diese Wirkung auch von Wunden aus und selbst bei Einreibung in die Haut (Aschoff) zu Wege bringt. Bei Kaninchen, Hunden und Katzen können schon 0,003–0,01 tödtlich wirken, wobei Durchfälle und (bei Hunden und Katzen) auch Erbrechen mit nachfolgendem Collapsus und mitunter Erstickungskrämpfe auftreten. Nach längerem Bestehen von Enteritis kommt es zu einem Stadium completor Anaesthesie, in welchem selbst starke Reize keine spinalen oder vasomotorischen Reflexe bedingen. Die Zeit des Eintritts des Todes ist von der Dosis unabhängig; der Tod erfolgt durch respiratorische Lähmung (Rossbach). Hunde sind empfindlicher gegen das Gift als Kaninchen (Hübner). Bei Fröschen bedingt Colchicin Athembeschleunigung, Paralyse und Anaesthesie; das Herz pulsirt noch 9–16 Stdn. nach dem Erlöschen des Athems

fort (Albers). In Selbstversuchen von Heinrich bedingte 0,01 Colchicin stark bitteren, hintennach kratzenden Geschmack, dann mehrere Stunden anhaltend Brechreiz, Ekel, Aufstossen und vermehrte Speichelabsonderung, Verminderung der Pulsfrequenz um 11 Schläge in den ersten beiden Stunden; 0,02 rief die nämlichen Erscheinungen in den ersten 4 Stunden, später unruhigen, durch Durchfall und Erbrechen unterbrochenen Schlaf hervor, worauf noch am folgenden Tage Appetitlosigkeit, Uebelkeit, Fieber, Meteorismus, schleimige Stuhlentleerungen mit Tenesmus sich entwickelten, welche letzteren selbst bis zum vierten Tage persistirten. Ganz ähnliche Erscheinungen beobachtete auch Krahmer nach 0,01 Colchicin, doch trat kein Sinken der Pulsfrequenz und Respiration bei ihm ein. Das Colchicein scheint das Colchicin an Giftigkeit zu übertreffen, da es zu 0,01 Kaninchen in 10—12 Stunden und zu 0,05 in einigen Minuten unter paralytischen Erscheinungen tödtet (Oberlin). Im Organismus scheint Colchicin theilweise zersetzt zu werden (Dragendorff und Speyer).

Die drastische Wirkung des Colchicins scheint auch manchmal nach Einführung kleiner Dosen in cumulativer Weise sich geltend machen zu können. Wenigstens sieht man nach dem Gebrauche spirituöser Auszüge der Herbstzeitlosenwurzel und Samen oft erst nach einiger Zeit profuse Diarrhöen ohne eigentliche Darmentzündung eintreten. Nach Aldridge entsteht in dieser Weise auch Speichelfluss; nach Mann ist sogar in Folge längerer Darreichung von Tinctura Colchici tödtliche Intoxication vorgekommen (nach 14,0 im Ganzen). Im Uebrigen sind die Erscheinungen der Vergiftung durch Theile der Herbstzeitlose oder Auszüge derselben denen des Colchicins ähnlich. Die Intoxication hat das Eigenthümliche, dass sie in der Regel erst mehrere Stunden nach der Ingestion des Giftes sich geltend macht; Brennen im Munde und Schlunde, Durst, manchmal Speichelfluss, heftige Schmerzen im Leibe und Magen, stürmisches und anhaltendes Erbrechen und Durchfall mit nachfolgendem Collapsus (Cyanose der Lippen, kühle Haut) sind die Hauptsymptome, denen sich Dyspnoe, Eingenommenheit des Kopfes, Schwindel und Delirien, manchmal Harnverhaltung, selten Convulsionen hinzugesellen. Ausnahmsweise kommen Fälle vor, wo keine Magendarmreizung, sondern vorwaltend tonische Krämpfe das Krankheitsbild ausmachen. Die Section weist oft locale Entzündung im Magen, Hirnhyperämie und constant dunkel kirschrothes Blut nach. Als chemisches Antidot ist Tannin, das auch symptomatisch (gegen die Durchfälle) passt, indicirt; daneben Excitantien.

Ueber die Wirkung kleiner Dosen Colchicin auf die einzelnen Systeme und den Stoffwechsel fehlt es an neueren umfassenden Untersuchungen. Selbstversuche von MacLagan (mit 20 Tropfen Colchicumtinctur) stimmen mit den Beobachtungen von Heinrich über Colchicin und zeigen noch ausgesprocheneres Sinken der Pulsfrequenz (um 25 Schläge) vor Eintritt der Diarrhoe.

Nicht sowohl wegen ihrer Wirkung auf den Darm als wegen vermeintlicher Wirkung auf die Harnsäureabscheidung ist die Herbstzeitlose zu einem sehr beliebten Medicament geworden, das im Rufe eines Specificum gegen Gicht, Rheumatismus und Gries- und Blasensteinbildung steht.

Früher auch gegen Hydrops als Drasticum hydragogum und bei habitueller Obstipation, auch zum Abtreiben von Tänien benutzt, von Willis und Puchelt bei Diabetes, von Ritton u. A. bei Leukorrhoe und Amenorrhoe empfohlen, wird das Medicament noch heute in Folge der falschen Voraussetzung, dass es vermehrte Absonderung von Harnsäure bewirke, fast in allen Fällen von Gicht und Rheumatismus, sowie von schmerzhaften und entzündlichen Affectionen, als deren prädisponirende Ursache Rheumatismus erscheint, in Anwendung gezogen. Bei Gicht ist Colchicum namentlich in England ein seit Alters her beliebtes Mittel, das in verschiedenen Specialitäten und Quacksalbermitteln (Eau médicinale de Husson, Blairs gout pills) das Hauptingrediens bildet. Die Wirkungen bei Gicht sind indessen höchst problematisch; englische Aerzte betrachten es besonders indicirt bei jungen und kräftigen Individuen, nicht zu lange bestehender Arthritis und bei acuten Gichtanfällen oder Exacerbationen



im Verlaufe chronischer Gicht; überhaupt scheint es mehr gegen die Anfälle als gegen den Gichtprocess in Ansehen zu stehen. Die purgirende Wirkung ist für die Heileffecte bei Gicht unnöthig, nach Einzelnen sogar schädlich; die Art und Weise des Gebrauchs nicht bei allen Aerzten gleich, indem manche steigende Dosen, die meisten zuerst eine grosse und hierauf mehrere kleine Dosen verordnen. Einzelne legen Gewicht auf die bei Gichtanfällen danach auftretende Verlangsamung des Herzschlages. Bei Rheumatismus acutus und chronicus ist zuverlässige günstige Wirkung vom Colchicum nicht zu erwarten, ebenso wenig bei rheumatischen Neurosen oder einfachen katarrhalischen Anginen, Asthma, Bronchialkatarrhen, Hauterythemen, Urticaria, Prurigo oder gar bei Delirium und Coma im Verlaufe von Scarlatina, wo das Mittel ebenfalls Empfehlung gefunden hat.

Was die physiologische Begründung der Colchicumtherapie bei Rheumatismus anlangt, so hat Graves Vermehrung der Harnsäureausscheidung durch den Urin nach Colchicum nicht beobachtet, eher Verminderung. Ueberhaupt aber ist die beim gesunden Menschen von Chelius, Lewins und Krahmer gefundene Zunahme der Harnsäureausscheidung von andern Forschern (Böcker) nicht bestätigt. Ueber die diuretische Wirkung, welche man der Herbstzeitlose zugeschrieben hat, liegen neuere concludente Versuche gar nicht vor; die älteren Angaben von Störck, wonach Zumischung von Oxytel Colchici zum Weine bei ihm selbst frequentere Emissio urinae bewirkt habe, sind zu vage, um darauf therapeutische Anwendung des Mittels zu basiren. Jedenfalls ist Colchicum, wenn man dessen Gebrauch als Antarthriticum und Antirheumaticum nicht als überwundenen Standpunkt betrachtet, in allen Fällen zu meiden, wo Reizung oder Entzündung im Magen oder Darne entsteht, ebenso bei stark geschwächter Constitution, da hier leicht in Folge der Diarrhöen Collapsus sich einstellt. Das längere Zeit hindurch ununterbrochene Darreichen von Colchicumpräparaten bei chronischem Rheumatismus oder bei habitueller Obstipation ist jedenfalls zu widerrathen und beim Eintreten von Uebelsein, Erbrechen oder Brechdurchfällen das Aussetzen derselben geboten.

Die Semina Colchici können zu 0,06—0,2 in Pulverform gegeben werden, finden jedoch meist nur in Form der officinellen Präparate Verwendung.

#### Präparate:

1) **Tinctura Colchici**, Tinctura seminis Colchici; **Colchicumtinctur**, Herbstzeitlosentinctur. Mit 10 Th. Spiritus dilutus bereitet, gelb, bitter. Innerlich zu 10—20—40 Tr. mehrmals täglich für sich oder mit anderen anti-rheumatischen oder diuretischen Tincturen. Maximalgabe 2,0 pro dosi, 6,0 pro die.

2) **Vinum Colchici**, Vinum seminis Colchici; **Colchicumwein**, Herbstzeitlosensamenwein. Mit 10 Th. Vinum Xerense durch achttägige Maceration bereitet; klar, gelbbraunlich. Das wichtigste aller Herbstzeitlosenpräparate, welches wie die Tinctur benutzt und dosirt wird. Um die Nebenwirkung auf den Darm zu vermeiden, ist ein Zusatz von Opiumtinctur gebräuchlich.

Nicht mehr officinell sind der von Störck als das zuverlässigste diuretisch wirkende Präparat der Zeitlose gepriesene Acetum Colchici, Zeitlosenessig, den man zu 2,0—8,0 mehrmals täglich entweder als Zusatz zu Mixturen oder in Saturation verordnete. Derselbe diente auch zur Bereitung des Oxytel Colchici, Zeitlosensauerhonig, welchen man für sich zu 1 Theelöffel bis  $\frac{1}{2}$  Esslöffel administrierte, der meist aber als Zusatz zu diuretischen oder anti-rheumatischen Mixturen gebraucht wurde.

Complicirtere Tincturen, wie T. Colchici acida (mit Spir. dil. und Acid. acet. bereitet) und die von Williams zu 20 Tropfen und mehr gegen Rheumatismus alter, überreizter, an Flatulenz leidender Personen empfohlene Tr. Colchici ammoniacata (mit Spir. Ammon. aromaticum bereitet) und das aus einem Essigauszuge dargestellte, zu 0,05—0,1 zu verordnende Extractum Colchici acidum sind obsolet.

Auch das Colchicin hat man bei Gicht, wo es bei Anfällen, zu 0,001 dreimal täglich gegeben, oft jahrelanges Hinausschieben derselben bewirken soll (Guensburg), und bei acutem Rheumatismus, wo es nach Skoda die Schmerzen lindert und die Entzündung herabsetzt, welche Wirkung am 2. oder 3. Tage mit den Stuhlentleerungen eintritt, jedoch nicht von letzteren abhängig ist, benutzt. Man giebt Colchicin am besten in Pillen, auch in Lösung. Subcutaninjection soll sehr starke örtliche Irritation bedingen (Lorent).

## Verordnungen:

- |  |  |
|--|--|
| <p>1) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Vini Colchici</i> 12,0<br/> <i>Tincturae Opii crocatae</i> 2,0<br/> <i>M. D. S.</i> 3—4 stündl. 10—20 Tropfen.<br/>         Bei Rheumatismus chronicus.<br/>         (Eisenmann.)</p> | <p>2) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Colchicini</i> 0,06 (cgm. 6)<br/> <i>Aq. destill.</i> 10,0<br/> <i>Spiritus</i> 0,5<br/> <i>M. D. S.</i> 2—3 Mal täglich 5 Tropfen.<br/>         (Skoda.)</p> |
|--|--|

**Anhang.** An Colchicum schliesst sich noch eine grössere Zahl von Antirheumatica vegetabilia, wobin von häufiger benutzten Drogen die Folia Rhododendri chrysanthi, die Blätter der sibirischen Schneerose oder Gichtrose, Rhododendron chrysanthum L., gehören, welche man zu 0,5—1,0 als Pulver oder im Aufguss als Specificum gegen Gicht rühmte, ferner die Wurzeln verschiedener südeuropäischer Species von Aristolochia, Radix Aristolochiae longae et rotundae, welche auch als Emmenagoga benutzt wurden und einen Bestandtheil des als Duke of Portlands powder bezeichneten Gichtmittels bildeten. Mehrere verwandte Pflanzen, z. B. Aristolochia Cretica und semper-virens L., dienen in Südeuropa als Mittel gegen Vipernbiss und machen damit den Uebergang zu den bereits besprochenen Schlangenmitteln. Zu den Antirheumatica gehört auch das jetzt noch in Schweden und Finnland officinelle Kraut des Sumpfporsts oder wilden Rosmarins, Ledum palustre L. Ob die als Herba Ledi bezeichnete Droge ausser dem darin enthaltenen, in seiner Zusammensetzung sehr variirenden ätherischen Oele noch andere wirksame Bestandtheile enthält, denen sie stark excitirende und bei höheren Dosen sogar narkotische Wirkung verdankt, wegen deren sie früher von Bierbrauern benutzt worden sein soll, steht dahin. In Schweden dient sie bei Keuchhusten und als Diureticum und Diaphoreticum bei Rheumatismus, Dermatosen u. s. w., theils innerlich in Aufgüssen (2,0—3,0 zu 100,0 Col.), theils äusserlich zu Umschlägen und Bädern.

## **X. Classe. Antipyretica, Fiebermittel.**

Die Antipyretica, über welche das Allgemeine bereits S. 65 bis 67 angegeben wurde, zerfallen, je nachdem sie auch auf typische Fieber oder ausschliesslich auf continuirliches Fieber wirken, in die beiden Ordnungen der antitypischen Fiebermittel, Antipyretica antitypica, und reinen Fiebermittel, Antipyretica pura.

### **1. Ordnung. Antipyretica antitypica, antitypische Fiebermittel.**

**Cortex Chinae; Chinarinde. Chinini salia; Chininsalze. Chinaalkaloide.**

Unter den antipyretischen Stoffen nehmen die Chinarinde und Chininsalze in sofern die hervorragendste Stelle ein, als sie nicht nur bei den gewöhnlichen febrilen Affectionen, sondern auch bei typischen Fiebern Vorzügliches leisten und sogar bei den letztgenannten das vorzüglichste Heilmittel darstellen. Ihre Wichtigkeit für den Arzt wird noch dadurch erhöht, dass sie einerseits nach Art der Bitterstoffe stärkend wirken, andererseits auffallende antiseptische und antiphlogistische Actionen äussern.

Als Chinarinde sind gegenwärtig die Zweig- und Stammrinden cultivirter Cinchonon, namentlich *Cinchona succirubra* Pav., officinell, insoweit dieselben mindestens 3,5 % Alkaloide enthalten.

Die officinellen Culturrinden kommen in Röhren von etwa 6 Cm. Länge und 1—4 Cm. Durchmesser bei einer Dicke bis 4 Mm. und in Halbröhren von entsprechender Stärke vor. Diese mürrben und kurzfasrig brechenden Rinden sind aussen mit dünnem, graubräunlichem Kork mit groben Längsrnuzeln und kurzen Querrissen bekleidet und haben eine braunrothe und faserige Innenfläche. Die Culturrinde vertreten jetzt die früher in verschiedenen Sorten officinellen süd-amerikanischen Chinarinden, von denen man nach der Farbe hauptsächlich drei Sorten unterschied, die man als braune oder graue Chinarinde, *Cortex Chinae fuscus* s. *griseus*, rothe Chinarinde, *Cortex Chinae ruber*, und gelbe Chinarinde, *Cortex Chinae flavus*, bezeichnete, zu welcher letzteren auch die am meisten geschätzte Calisayarinde oder Königschinarinde, *Cortex Chinae Calisaya* s. *China regia*, gehört. Die ursprüngliche Heimat der Rubiaceengattung *Cinchona*, deren wahrscheinlich auf



mehrere Dutzend sich belaufende Species stattliche immergrüne Bäume von 20 bis 40 Meter Höhe und 1—2 Meter Dicke bilden, ist die sog. Chinazone von Südamerika, welche sich von Chuquisaca in Bolivia durch Peru und Columbien bis Caracas erstreckt, wo die Chinabäume in einer Seehöhe von 1200—3500 M. auf den Anden und besonders auf deren östlichen Abhängen wachsen. Die wichtigsten Species sind *Cinchona officinalis* (mit ihren beiden Varietäten  $\alpha$ . *Urifusinga* und  $\beta$ . *Condaminea* s. *Cinchona Chahuargera*) und *Cinchona micrantha* Ruiz et Pav., welche die hauptsächlichsten Sorten der grauen Chinarinde (*China Loxa* und *China Huanuco*) liefern, die *Cinchona Calisaya vera* Wedd, welche in der Nähe des Titicaca-Sees in Bolivia und in der peruanischen Provinz Carabaya wächst und die Königschinarinde liefert, endlich die bereits genannte *Cinchona succirubra*, welche ursprünglich in Ecuador und Nordperu einheimisch ist. Der ausserordentlich verbreitete Gebrauch der Chinarinde und der daraus dargestellten Alkaloide liess die Möglichkeit nicht verkennen, dass bei der Sorglosigkeit, mit welcher bei dem Einsammeln der Chinarinden in Südamerika durch die dazu verwendeten Halbindianer verfahren wird, die Cinchonabäume, welche nicht dichte Waldungen, sondern nur kleinere Gruppen in Wäldern von anderen Baumarten bilden, völliger Ausrottung entgegengehen, und in der That sind einzelne Sorten Chinarinde vermuthlich aus diesem Grunde aus dem Handel verschwunden. Allerdings hat man in neuester Zeit die Entdeckung gemacht, dass auch einzelne den Cinchonon nahestehende Species aus der Rubiaceengattung *Remijia* eine mit dem Namen *China cuprea* belegte Rinde liefern, in der die wirksamen Principien der Chinarinden in reichem Maasse vorhanden sind. Immerhin aber bleiben in der Gegenwart die jetzt officinellen Culturrinden die einzigen, deren reguläre Zufuhr einigermaassen zu garantiren ist, da die Länder der südamerikanischen Chinazone sehr häufig den Schauplatz heftiger Bürgerkriege bilden. Die ersten Versuche, Cinchonon in anderen tropischen Ländern zu cultiviren, wurden von den Holländern auf Java unternommen (1854), später sind solche in grossem Massstabe in verschiedenen Theilen Ostindiens, auf Ceylon, Jamaica mit Erfolg gemacht. Gegenwärtig wird besonders *Cinchona succirubra*, welche am besten gedeiht, und *Cinchona Calisaya* in verschiedenen Formen, namentlich auch die eine an wirksamem Princip alle anderen übertreffende Rinde liefernde *C. Ledgeriana*, cultivirt.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Chinarinde das wichtigste Medicament ist, welches die Entdeckung von Amerika dem Arzneischatze geliefert hat; denn erst durch ihre Einführung sind wir in den Besitz eines sicheren Mittels gegen Malariafieber gelangt. Das Hauptverdienst um das Bekanntwerden desselben kommt der Gemahlin des Grafen Chinchon, Vicekönigs von Peru, zu, welche selbst durch Chinarinde von einem hartnäckigen Wechselfieber befreit war und welche durch den Arzt des Vicekönigs, Juan del Vego, im Jahre 1638 eine Partie Rinde nach Spanien schickte. Ihr zu Ehren nannte Linné den erst 100 Jahre später durch De la Condamine und J. de Jussieu bei Loxa in Ecuador aufgefundenen Baum, welcher die Chinarinde lieferte, *Cinchona*, und ihr zu Ehren hiess das Pulver der Rinde, wie es gegen Wechselfieber gebraucht wurde, lange Zeit *Pulvis comitissae*, Gräfinnenpulver. Erst spät fand das Mittel allgemeinen Eingang und nach harten Kämpfen seitens der Anhänger der Galenischen Fiebertheorien und seitens der protestantischen Aerzte gelangte es zu der ihm jetzt allgemein eingeräumten hohen Stellung. Besondere Förderer des Mittels waren die Jesuiten (daher die Bezeichnung *Pulvis Jesuiticus* s. *patrum*, neben welcher auch der Name *Cardinalpulver* vorkommt, von dem Cardinal De Lugo, welcher das Chinapulver Mazarin für den wechselfieberkranken Ludwig XIV. empfahl) und der in seinem Auftreten stark an Charlatanerie streifende englische Arzt John Tabor (Talbot), denen erst später achtungsgebietendere Autoritäten, wie Morton, Sydenham, Ramazzini, sich anschlossen. Wahrscheinlich trug auch Verfälschung und unzweckmässige Anwendung und der Umstand, dass anfangs nur schlechtere Chinarinden in den europäischen Handel gelangten, zu der späten Anerkennung des Medicaments bei. Von weit grösserer Bedeutung wurde die Chinarinde für die Medicin, nachdem die Chemie sich mit derselben zu beschäftigen begann und Pelletier und Caventou (1820) aus derselben das für den Arzt der Gegenwart unentbehrliche Chinin isolirten.

Sämmtliche Chinarinden besitzen einen bitteren Geschmack und liefern, im Glasröhrchen gegläht, schön carminrothen Theer. Charakteristisch ist für dieselben das Vorhandensein eigenthümlicher länglicher, meist spindelförmiger, gerader oder schwach gekrümmter, niemals verästelter Baströhrchen oder Bastzellen, deren Länge nicht über 3 Mm. beträgt und deren Dicke  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  Mm. ausmacht; ihre Wandungen sind durch zahlreiche secundäre Ablagerungen stark verdickt, so dass ihre Höhlung einen schmalen Spalt bildet. In allen Chinarinden sind diese Bastzellen nur zu 3—5 oder 7 in Bündel vereinigt. In der Rinde von *Cinchona succirubra* findet man sie sehr zerstreut und von geringer Grösse. Dieselbe enthält zahlreiche Milchsaftschläuche in Form länglicher, nicht verzweigter Zellen von beträchtlicher Grösse zwischen der Mittelrinde (Mesophloeum) und der Bastschicht (Endophloeum).

Als active Principien der Chinarinde sind verschiedene darin enthaltene Pflanzenbasen anzusehen, unter denen das in vier seiner Salze officinelle Chinin das heilkräftigste ist, neben welchem aber in allen *Cortices Chinae* eine amorphe Modification, amorphes Chinin oder Chinoidin, und eine dem Chinin isomere Base, das Chinidin oder Conchinin, und zwei vom Chinin und Conchinin nur durch ein Sauerstoffatom weniger in ihrer Zusammensetzung verschiedene Alkaloide, das Cinchonin und Cinchonidin, sich finden. Die übrigen eigenthümlichen Stoffe der Chinarinde, ein als Chinovin oder Chinovasäure bezeichneter glykosidischer Körper, eine eigenthümliche Gerbsäure, die Chinagerbsäure, und ein daraus entstehendes Oxydationsproduct, das Chinarothe, endlich eine organische Säure, die Chinasäure, an welche die Alkaloide in der Droge gebunden zu sein scheinen, sind für die Wirkung von untergeordneter Bedeutung. Unter den Alkaloiden ist das Chinin bei Weitem das wirksamste.

Das als solches nicht mehr officinelle Chinin,  $C^{20}H^{24}N^2O^2$ , ist wasserfrei eine weisse, strahlig krystallinische Masse, welche sich in 1200 Th. kaltem und 250 Th. siedendem Wasser, in 21 Th. Aether und noch leichter in Alkohol und Chloroform löst. Es ist eine starke Base, welche Ammoniak aus heissen Lösungen von Ammoniaksalzen austreibt und mit Säuren neutrale und saure Salze bildet, deren wässrige Lösungen blau fluoresciren, die Ebene des polarisirten Lichts stark nach links drehen und intensiv bittern, noch in sehr diluirter Lösung (1:50000) deutlichen Geschmack besitzen. Mit Chlorwasser und kaustischem Ammoniak im Ueberschuss vermischt, färben diese Lösungen sich grün (Thalleiochin-Reaction). Das Chinin bildet mehrere, theils amorphe, theils krystallinische Hydrate.

Bei längerem Erhitzen von Chininsalzen auf 120—130° bildet sich eine als Chinicin bezeichnete, rechts polarisirende amorphe Modification. Das von Henri und Delondre 1833 entdeckte Chinidin, auch Chinotin, Cinchotin, Pitayin (wegen des reichlichen Vorkommens in einer der Königschinarinde ähnlichen, als *Cortex Chinae Pitayo* bezeichneten Rinde) genannt, giebt mit Säuren ebenfalls rechtsdrehende und in saurer Lösung fluorescirende und die Thalleiochinreaction liefernde Salze, unterscheidet sich aber vom Chinin und allen übrigen Chinaalkaloiden durch sein sehr schwer lösliches jodwasserstoffsaurer Salz. Das früher officinelle Cinchonin,  $C^{20}H^{24}N^2O$  oder  $C^{19}H^{22}N^2O$ , und dessen isomere Verbindung Cinchonidin bilden kein krystallinisches Hydrat, geben rechtsdrehende, nicht fluorescirende und keine Thalleiochinreaction liefernde Solutionen; Cinchonin ist in Aether fast unlöslich, Cinchonidin in demselben schwer löslich.

Die amorphe Chinabase oder das sog. amorphe Chinin, welche De Vrij in kleinen Mengen in allen echten Chinarinden auffand, ist ein Hauptbestandtheil des unter den Präparaten zu erwähnenden Chinoidins. In den rothen Rinden aus Ostindien und Java findet sich auch das 1872 von Hesse entdeckte Alkaloid Chinamin,  $C^{19}H^{24}N^2O^2$ , in alten ostindischen Rinden damit isomeres Conchinamin.

Verschiedene andere als Chinaalkaloide bezeichnete Basen, wie Paricin (auch in der Rinde von *C. succirubra* aufgefunden) und die in falschen Chinarinden vorkommenden Basen Aricin und Paytin sind als Medicamente bisher nicht in Frage gekommen.

Sowohl der Gesamtgehalt als der Gehalt an einzelnen Alkaloiden schwankt bei den Chinarinden ausserordentlich. Im Allgemeinen kann man sagen, dass von den früher officinellen amerikanischen Rinden die Königschinarinde an dem für die Wirkung am meisten in Betracht kommenden Chinin die reichste war, während in den braunen Chinarinden das Cinchonin die übrigen Alkaloide stets an Menge bedeutend übertraf. Es kommt übrigens auch vor, dass die Rinden derselben Cinchonaart mitunter kein Chinin enthalten, während sie an einer andern Localität Rinden von  $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ % Chiningehalt liefern (Karsten). Den höchsten Chiningehalt hat man in Rinden von *Cinchona Ledgeriana* von Java beobachtet; in guter Calisaya kommen mindestens 5—6% Chinin vor. Gute indische rothe Röhrenchinarinde kann 5—10% Alkaloide liefern, von denen nicht ganz  $\frac{1}{3}$  auf Chinin kommt,  $\frac{1}{4}$  ist Cinchonidin, der Rest Cinchonin, während sich Chinidin nur spurweise findet; in dicken, glatten, rothen Rinden sind nur 3—4% Alkaloide vorhanden. Wurzelrinden sind reicher an Chinabasen als Stammrinden (De Vrij). Ansehnliche Vermehrung des Chinins auf Kosten der minderwerthigen Nebenalkaloide scheint durch Düngung der Bäume zu resultiren.

Das Chinovin oder das Chinovabitter, früher auch vielfach als Chinovasäure bezeichnet,  $C^{20}H^{48}O^8$ , welches sich wahrscheinlich in allen echten Chinarinden findet, ist amorph, harzartig schmeckend, anfangs kaum, später scharf und angenehm bitter, wird wenig in Wasser, dagegen gut in Weingeist gelöst und durch Salzsäuregas, Natriumamalgam und verdünnte Säuren in Chinovasäure und Chinovinzucker gespalten. Es verbindet sich auch mit den Basen zu amorphen Verbindungen und scheint in den Chinarinden als in Wasser und Weingeist leicht löslicher, stark bitter schmeckender Chinovinkalk zu existiren. Die Chinovasäure,  $C^{22}H^{38}O^4$ , kommt nach De Vrij auch fertig gebildet in Chinarinden, namentlich den Javanischen, vor und findet sich ausserdem in grösseren Mengen in der Tormentillwurzel. Sie ist ein blendend weisses, lockeres, krystallinisches Pulver ohne Geschmack. Kerner glaubt, dass sowohl Chinovin wie Chinovasäure für die tonisirende Wirkung der Chinarinden von Bedeutung seien und dass namentlich deren Verbindungen mit Kalk, welche sich in den an Alkaloiden armen Abkochungen und Extracten aus der Chinarinde als Hauptbestandtheil finden, auch deren Wirksamkeit bedingen. Calciumchinovat erzeugt nach Kerner zu 15,0—30,0 beim Erwachsenen keine unangenehmen Nebenerscheinungen.

Die Chinagerbsäure bildet eine hellgelbe, zerreibliche, sehr hygroskopische, säuerlich und herbe, aber nicht bitter schmeckende, in Wasser, Weingeist und Aether leicht lösliche Substanz. Sie fällt Eisenoxydsalze grün, Brechweinsteinlösung graugelb und färbt sich auf 100° erhitzt dunkelroth unter Bildung eines rothbraunen, in Wasser unlöslichen Harzes. Dies entspricht dem Chinarothe, welches die Färbung der rothen Chinarinden bedingt und das in dicken rothen Rinden oft mehr als 10% beträgt.

Die Chinasäure, welche sich nicht nur in allen echten Chinarinden (zu 5—8%), sondern auch in den Blättern der Heidelbeere, im Kraute von *Galium Mollugo* und wahrscheinlich in vielen andern Pflanzen findet, bildet durchsichtige, tafelförmige Krystalle von reinsaurem Geschmacke, welche bei trockener Destillation Carbonsäure, Benzoesäure, Benzoyl und Hydrochinon liefern. Auf den Organismus wirkt sie nur nach Art anderer milder Pflanzensäuren. Im Thierkörper verwandelt sie sich in Hippursäure, welche im Urin auftritt; im Harn erscheint die letztere erst nach 2—3 Stunden, langsamer als nach Benzoesäure.

Bei Darstellung der physiologischen Wirkung und therapeutischen Anwendung der Chinarinden und Chinabasen glauben wir der Kürze halber uns auf diejenige des Chinins beschränken zu können, da hauptsächlich nur dieses Alkaloid in Anwendung kommt und da die sog. Nebenalkaloide meist nur quantitative und nur geringe qualitative Wirkungs differenzen zeigen. Das Chinin ist in auffallend



kleinen Mengen deleter für die niedrigsten thierischen Organismen (Protozoën und Infusorien), worin es nicht von den stärksten Pflanzengiften (Strychnin und Morphin) übertroffen wird (Binz), während es denselben in Bezug auf giftige Wirkung höheren Thieren gegenüber weit nachsteht, wie es z. B. auf Kaninchen erst zu 0,25—1,0 subcutan tödtlich wirkt (Schlockow). Es hemmt in kleinen Mengen verschiedene Gährungsprocesse und behindert das Auftreten und Fortschreiten der Fäulniss vegetabilischer und animalischer Substanzen (Eiweiss, Blut) in weit stärkerem Maasse als die meisten übrigen Antiseptica.

Hinsichtlich der Hemmung der alkoholischen Gährung (Buchheim und Engel) wird Chinin unter den Bitterstoffen nur von Strychnin, jedoch nicht im Verhältnisse der Bitterkeit, übertroffen. Es besitzt ähnliche Hemmungswirkung auf Buttersäuregährung und Einwirkung von Emulsin auf Amygdalin oder Salicin, desgleichen auf einzelne rein chemische Vorgänge, z. B. die Einwirkung von Säuren auf Rohrzucker, Stärkemehl und Salicin, dagegen nicht auf das saccharificirende Vermögen des Speichels und der Malzdiastase (Binz). Dass Chinin, und zwar sowohl Chininbisulfat als reines Chinin, auf Muskelfleisch besser conservirend wirkt als andere Amara, Chlor, Kochsalz, Arsen und Kreosot, wurde von Gieseler 1864 experimentell dargethan. Später fand Binz eine solche antiseptische Wirkung besonders am Chininhydrochlorat, welches die Vibrionen- und Schimmelbildung in Aufgüssen von Leguminosenmehl in weit kleineren Mengen verhindert als Strychnin, Morphin, Salicin und Sol. Fowleri, während es 15—16 mal schwächer conservirend als Sublimat wirkt. Auf grössere Infusorien (Vorticellen, Paramecien und Colpoden) wirkt Chinin weit rascher deleter als auf Bacterien (Bochefontaine). Vollständige Sistirung von Schimmelbildungen findet durch Chinin nicht statt, vielmehr tritt namentlich in Chininsulfatlösungen Bildung von *Penicillium glaucum* ein. Die antiseptische Wirkung der Chinarinde war schon in vorigem Jahrhundert (Pringle) aus Versuchen bekannt; vielleicht ist bei dieser auch die Chinagerbsäure mitwirkend. Cinchonin wirkt sowohl auf alkoholische Gährung als auf Fäulniss von Legumin und Albumin (Binz und Conzen) viel weniger stark hemmend als Chinin; in Bezug auf deletere Einwirkung auf Mikrozyten steht es dem Chinin, Chinidin und Cinchonidin nach (Buchanan Baxter). Am nächsten scheint dem Chinin in dieser Beziehung die amorphe Base zu stehen.

Von besonderem Interesse ist das Verhalten des Chinins zu gewissen pathologischen Fermenten. Schmidt-Rimplers Entdeckung, dass es dem Secret der diphtheritischen Conjunctivitis die Fähigkeit, bei Impfung auf der gesunden Hornhaut specifische Entzündung zu erregen, nehme, ist von Klebs und G. Brown bestätigt. Filehne constatirte ähnliche Hemmungswirkung auf die energische peptonisirende Wirkung fauliger Sputa des Lungenbrandes.

Ferner bildet das Chinin ein sehr intensives Protoplasmagift, welches nicht allein die Bewegungen von Amöben und anderen Protozoën, sondern auch die Bewegungen der weissen Blutkörperchen aufhebt. Desgleichen beschränkt Chinin sowohl bei directer Application als bei indirecter durch den Kreislauf vermittelter Zufuhr die Auswanderung farbloser Blutzellen an örtlich irritirten Geweben (Binz und Scharrenbroich).

Als Gift für Leukocyten ist Chininhydrochlorat vielen höchst energisch wirkenden Stoffen überlegen und wird nur vom Coniin und Campher übertroffen. Die übrigen Chinaalkaloide wirken schwächer, am schwächsten Cinchonin (Buchanan Baxter). Die Wanderbewegungen der Leukocyten werden schon durch Chininmengen gehindert, welche, wie 1:4000 des Körpergewichts, wesentliche Alteration der Circulation nicht bedingen (Appert).

Auch auf andere Blutbestandtheile scheint Chinin einen Ein-

fluss auszuüben, als dessen Wesen eine Hemmung der Oxydation anzusehen ist, die auch an anderem Materiale eintritt.

Die rothen Blutkörperchen werden durch Chinin bei toxischer Einwirkung verkleinert (Manassein); die im gelassenen Blute und post mortem auftretende Saurebildung erfährt durch Chinin Hemmung (Binz und Ransoné); die Uebertragung des activen Sauerstoffs durch Blut und krystallinisches Hämoglobin wird durch minimale Mengen Chinin gehemmt. Die Gerinnung des Blutes wird bei directem Zusatz von Chinin (Zunz) und bei Vergiftungen mit demselben (Melier) verringert. Auch in dieser Beziehung wirkt Cinchonin ungleich schwächer als Chinin. Hemmung der Ozonreaction tritt auch beim Zerreiben von Salat oder Löwenzahnblättern bei Zusatz von Chinin auf, wobei sich gleichzeitig Hemmung der moleculären Bewegung zeigt, wie solche auch an Kohlenpulver, Pigmentkörnchen und andern unbelebten Partikelchen hervortritt, und zwar stärker als unter dem Einflusse anderer neutraler Chlorverbindungen (Binz und Gützloe). Die Affinität des Eiweiss zum Ozon wird durch Zusatz von Chinin bei einer Temperatur von 30—40° aufgehoben (Rossbach). Beim Erwärmen mit Chinin versetzten Blutes verschwinden die Oxyhämoglobinstreifen erst in hoher Temperatur (Binz und Math. Müller). Aus den angeführten Daten ergibt sich, dass das Chinin die rothen Blutkörperchen zwar nicht ihrer Fähigkeit, Ozon zu bilden oder zu tragen, beraubt, wohl aber das letztere fester an das Hämoglobin bindet, möglicherweise in Folge einer Verbindung mit demselben (Rossbach). Eigenthümliche Hemmungswirkungen des Chinins machen sich auch an den Nieren in Bezug auf die Umwandlung von Benzoëssäure auf Hippursäure und auf die Phosphorescenz lebender Organismen geltend; dagegen beschleunigt es die Oxydation von Eisenoxydullösung (Binz).

Dem Chinin kommt eine allerdings nicht beträchtliche örtlich reizende Wirkung zu, welche namentlich bei endermatischer Application in Pulverform oder subcutaner Injection grösserer Mengen concentrirter Lösungen sich geltend macht.

In Bädern kann Chinin, zu 15,0 hinzugesetzt, bei empfindlichen Personen Beissen und Papelbildung veranlassen (Briquet); auch bei Arbeitern in Chininfabriken kommt Bildung von Knötchen an verschiedenen Körpertheilen, meist an Armen und Beinen, bisweilen Schwellung des Gesichts und der Augenlider mit Röthung der Augen vor (Chevallier, Kreuser). Bei endermatischer Anwendung grösserer Mengen kommt es regelmässig zu Brennen und starker Hyperämie; nach subcutaner Injection erfolgt meist Entzündung, Abscessbildung und selbst brandige Abstossung einer Hautpartie in der Nähe der Einstichstelle, und zwar nicht, wie man früher annahm, in Folge des nothwendigen Saurezusatzes, sondern, wie Bernatzik nachwies, durch Erstarren des injicirten Chinins zu einer harzartigen, als Fremdkörper irritirend wirkenden Masse, welche am leichtesten bei Anwendungen neutraler Lösungen resultirt. Aehnlich irritirend wirken auch die übrigen Chinaalkaloide bei subcutaner Application.

Auf Schleimhäuten tritt Irritation nach kleinen Mengen nur in sehr geringem Grade hervor. Längere interne Darreichung kann zu einem gelinden katarrhalischen Zustande des Magens mit Hitze und Druck im Epigastrium, Empfindlichkeit desselben gegen äusseren Druck, Uebelkeit, Brechreiz, manchmal sogar mit Fieber und Durst, bei einzelnen Personen auch zu Diarrhoe führen. Grosse Dosen bewirken leicht Erbrechen, mitunter auch starke Vermehrung der Speichelsecretion.

Möglicherweise sind diese letzteren reflectorische Phänomene, hervorgerufen durch den bitteren Geschmack des Mittels, welcher selbst noch an Verdünnungen von 1:10000 u. m. hervortritt. Das Chinin steht in dieser Beziehung dem Strychnin und Quassia nach, übertrifft dagegen die meisten andern Alkaloide und Bitterstoffe an Bitterkeit bedeutend. Gastrische Störungen werden nament-

lich dem gebräuchlichsten aller Chininsalze, dem Chininsulfat, zugeschrieben sollen dagegen beim Chininhydrochlorat (Binz) und bei Verbindungen des Alkaloids mit organischen Säuren weniger leicht vorkommen. Häufig macht sich eine derartige Störung bei Fieberkranken geltend, was vielleicht im Zusammenhang mit der verminderten Absonderung von Magensaft beim Fieber steht. Es giebt einzelne Individuen, welche auch kleine Dosen Chinin schlecht ertragen und stets danach leichten Magenkatarrh bekommen. Man hat auf das Auftreten eines solchen auch das wiederholt beobachtete Vorkommen von Hautausschlägen, besonders Urticaria, nach einer einzigen Chinindosis als Reflexerscheinung bezogen. Im Allgemeinen kann man das Chinin in kleiner Dosis als ein nach Art der Amara wirkendes Mittel betrachten, welches reflectorisch Vermehrung der Magensaftsecretion bedingt und dadurch auf den Verdauungsprocess fördernd wirkt. Die ältere Angabe von Buchheim und Engel, dass das Chinin bei Zusatz zu künstlichem Magensaft die Verdauung des Eiweiss verzögere, ist nach Wölberg nur für grosse Dosen gültig, während kleine Mengen geradezu verdauungsbefördernd wirken.

Die Resorption des Chinins erfolgt von den verschiedensten Schleimhäuten, unter Umständen auch von der äussern Haut aus. Die Elimination findet vorzugsweise durch die Nieren statt, theilweise in unverändertem Zustande, theils als amorphes Chinin, theilweise nach Oxydation zu Dihydroxylchinin (Kerner).

Chinin wird nicht aus Chininbädern (Briquet), wohl aber bei Einreibung von Lösung in die Handfläche (Dufay) resorbiert. Die Mastdarmschleimhaut ist nach Kerner für die Aufsaugung des Chinins weniger geeignet als die Magendarmschleimhaut. Die im Darne vorhandene Galle führt nach Malinin in Berührung mit Chininsalzen zur Bildung von in Wasser und verdünnten Säuren schwer löslichem glykocholsaurem Chinin, doch sind die gallensauren Alkaloide, selbst das am schwersten löslichste derselben, das gallensaure Chinin, diffusionsfähig (Dragendorff und De l'Arbre). Sehr rasch erfolgt die Resorption vom Unterhautbindegewebe aus. Die Elimination des Chinins geschieht nicht ausschliesslich durch die Nieren, vielmehr findet sich dasselbe auch im Schweiss, in den Thränen, im Speichel und in der Milch säugender Frauen in geringen Quantitäten (Landerer, Briquet). Nach Albertoni und Ciotto geht Chinin bei interner Einführung rasch in die Galle über und localisirt sich in Milz und Leber, welche weit stärker und länger als Herz und Gehirn chininhaltig bleiben. Die Oxydation des Chinins im Organismus ist bei grösseren Dosen offenbar nur eine sehr beschränkte, da Chinin als solches allein im Harn zu 75 % (Personne), in anderen Fällen sogar zu 95—96 % (Jürgensen und Thau) ausgeschieden wird. Das dabei resultirende Dihydroxylchinin wirkt in sehr hohen Dosen nicht toxisch auf Frösche und Kaninchen, passirt den Körper unverändert und hat in seiner Wirkung auf Infusorien, Gährungsprocesse, Fäulniss und Hämoglobin keine Analogie mit dem Chinin. Ein ähnliches Oxydationsproduct wird im Thierkörper aus Cinchonin, welches übrigens, namentlich im Anfange auch als solches in den Urin übergeht, gebildet (Dragendorff und Johannsen). Sowohl die Menge des als solches wieder ausgeschiedenen Chinins als die Schnelligkeit des Eintritts in den Harn sind bei schwerlöslichen Salzen (Tannat) geringer als bei leicht löslichen (Hydrochlorat, Citrat). Bei Subcutaninjection löslicher Salze ist Chinin schon in 10—15 Min., bei interner Einführung in  $\frac{1}{2}$  Std. (nach Kerner bei gleichzeitiger Einführung von Selterswasser schon früher) im Harn nachweisbar. Auch bei kleinen Dosen erscheint Chinin schon in 1 Std. im Harn, bei Kindern eher als bei Erwachsenen (Briquet). Bei kleinen Dosen scheint die Elimination schon in 9 Std. (Schwenger) vollendet, nach grösseren (1,0) bei den leicht löslichsten Salzen in 48, bei allen löslichen Salzen, mit Ausnahme des Tannats, in 72 Std.

Nach Dietl retardiren verschiedene Krankheiten (chronische Milzan-schwellung, Albuminurie, Emphysem) die Chininausscheidung; nach den Untersuchungen von Jürgensen und Thau scheiden Typhuskranke in den ersten 24 und 36 Stunden mehr Chinin aus als Gesunde und davon das meiste zwischen



6 und 12 Stunden (Gesunde in den ersten 6 Std.). Sehr rasch wird das salzsaure Salz der amorphen Chinabase resorbiert und eliminirt (Kerner).

Die entfernten Wirkungen des Chinins betreffen namentlich den Kreislauf und die Körperwärme. Die Wirkung auf den Kreislauf ist nicht so bedeutend wie bei verschiedenen anderen Alkaloiden. Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass nach kleinen Dosen geringe Vermehrung der Herzschläge und entsprechende Steigerung des Blutdrucks, nach grossen Verringerung der Herzschlagzahl und des arteriellen Blutdrucks eintritt.

Beim Menschen beträgt die durch kleine Dosen hervorgerufene Acceleration nicht mehr als 8 Schläge in der Minute und dauert 2—3 Std.; noch kleiner oder nur wenig bedeutender ist die Abnahme beim Gesunden nach 1,0—1,25, beträchtlicher bei Fieberkranken. Bei Fröschen wirken kleine und grosse Dosen in gleicher Weise verlangsamend (Eulenburg, Chirone). Die Pulsbeschleunigung kleiner Dosen beim Warmblüter beruht auf Erregung der motorischen Herzapparate, die Herzverlangsamung ist vom Vagus unabhängig und resultirt entweder aus Lähmung der automatischen Erregungsganglien im Herzen oder aus Schwächung des Herzmuskels oder aus beiden zugleich. Von der Schwächung des Herzschlages hängt theilweise auch die Blutdrucksenkung ab, doch ist nach Schroff jun. auch das vasomotorische Centrum in seiner Reflexerregbarkeit erheblich herabgesetzt. Chirone vindicirt dem Chinin primäre erweiternde Wirkung auf die Gefässmuskeln. Die Athmung wird durch kleinere und mittlere Gaben Chinin kaum beeinflusst, durch grössere verlangsamt und abgeschwächt, durch colossale gelähmt. Künstliche Respiration verzögert den Eintritt des Todes. Nur bei Einspritzung massiver Dosen in die Jugularis erlischt die Herzhthätigkeit früher als die Athmung.

Die Herabsetzung der Temperatur zeigt sich bei gesunden Menschen ebenfalls in geringerer Weise als bei Fieberkranken; nach nicht zu kleinen Dosen ist sie auch bei Hunden und Kaninchen deutlich ausgesprochen. Das Phänomen ist nicht abhängig von der Herzaction; bei Thieren kommt sie sowohl bei Steigerung als bei Herabsetzung des Blutdrucks vor (Block), bei Menschen geht die Wirkung auf die Circulation sowohl im normalen als im febrilen Zustande nicht immer gleichen Schritt mit dem Sinken der Eigenwärme (Gell und Ringer, Liebermeister). Auch die postmortale Steigerung der Temperatur wird durch Chinin aufgehoben, wie auch bei Durchschneidung des Halsmarks Chinin Ansteigen der Temperatur verhindert (Binz und Bouvier). Auf Abkühlung durch Verdunstung ist das Sinken nicht zu beziehen, da die Schweisssecretion unterdrückt ist (Kerner). Cinchonin scheint auf die Temperatur noch stärker herabsetzend als Chinin, dagegen weniger auf das Herz zu wirken (Dragendorff und Johannsen).

Neben dieser Wirkung macht sich insbesondere nach grossen Dosen eine solche auf das Gehirn geltend.

Dieselbe ist am ausgesprochensten beim Menschen, wo als Folge der Einwirkung grösserer Gaben Chinin sich am häufigsten Ohrensausen einstellt, das als eine charakteristische Wirkung des Chinins und der übrigen Chinaalkaloide zu betrachten ist. Dazu gesellen sich Schwere des Kopfes, Schwindel und Verwirrung der Ideen, welche das Bild des sog. Cinchonismus oder Chininrausches, *Ivresse à la Quinquina*, vervollständigen. Die Analogie mit einem rauschähnlichen Zustande wird noch ausgesprochener, wenn, wie in einzelnen Fällen, z. B. bei Thau in Selbstversuchen, gesteigertes Wohlbehagen und grosser Hang zur Fröhlichkeit vorausgehen. Während des Chininrausches findet sich Abnahme der Tastempfindlichkeit und Dumpfheit der Schallwahrnehmungen (Thau), häufig auch Erbrechen. Alle diese Symptome sind von einer Beeinträchtigung des Gehirns herzuleiten, wobei wohl der Acusticus in einer auffallenden Weise afficirt ist, doch wird von Kirchner (1881) starke Hyperämie der Paukenhöhle und der Labyrinthschleimhaut als Ursache der Schwerhörigkeit angesehen, während Hyperämie des äusseren Gehörganges und des Trommelfells nicht zu beobachten ist (Guder). Bei sehr hohen Dosen kann ein bisweilen auf bedeu-

tende Aufregung folgender Zustand von Sopor und Collapsus eintreten, in welchem sogar der Tod erfolgen kann. Auch kommen dauernde Störungen der Sinnesnerven, insbesondere Taubheit, aber auch Amblyopie, nach übertriebenen Chinindosen vor.

Auch bei Hunden rufen toxische Dosen (0.3—0.6 subcutan applicirt) Zittern, Unruhe, Brechversuche, Erbrechen und einen Zustand von Collapsus hervor. Bei Fröschen bedingen letale Gaben Aufhören der spontanen Bewegung, Abnahme der Empfindlichkeit der Extremitäten und Paralyse der Hinterbeine; die Reflex-erregbarkeit scheint vor den übrigen Functionen des Nervensystems herabgesetzt zu werden, nach Chaperon durch Erregung der reflexhemmenden Centren im Gehirn, nach Meihuizen nur indirect in Folge der durch Chinin bedingten Circulationsstörungen. Muskelreizbarkeit und Erregbarkeit der Nervenstämmen und der Ursprünge der motorischen Nervenfasern des Rückenmarks werden durch Chinin nicht afficirt (Eulenberg und Simon), dagegen wird die Stromgeschwindigkeit in den motorischen Nerven beeinträchtigt.

Aehnliche toxische Erscheinungen wie Chinin bringt auch Cinchonin beim Menschen hervor. Nach Bouchardat, Delondre und Girault bedingen 0.75—1.0 eigenthümlichen Druck und Schmerz im Vorderkopfe, dagegen tritt Ohrensausen später als nach Chinin auf. Bei Kaltblütern ist die Wirkung der des Chinins gleich, bei Warmblütern bewirken sowohl Cinchonin als Cinchonidin epileptiforme Krämpfe in Folge von Reizung cerebraler Centren (Laborde und Dupuis, Chirone). Bei grösseren Thieren kommen etwa 5 Th. Cinchonin 4 Th. Chinin hinsichtlich ihrer Giftigkeit gleich und die Vergiftungserscheinungen sind protrahirter, theils in Folge geringerer Wirkung des Cinchonins auf das Herz, theilweise vermöge langsamerer Ausscheidung des Cinchonins (Bernatzik), die nach Dragendorff und Johannsen bei grösseren Dosen beim Menschen erst in 96, bei Thieren sogar erst nach 142 Stunden sich vollendet. Die amorphe Base scheint das Chinin an Giftigkeit, allerdings nicht erheblich, zu übertreffen (Bernatzik, Diruf).

Von sonstigen Organen wird die Milz besonders durch Chinin afficirt, indem sie sowohl unter normalen Verhältnissen als namentlich bei pathologischer Vergrösserung starke Volumabnahme erfährt. In neuerer Zeit sind dem Chinin wiederholt wehentreibende Wirkungen vindicirt. Auf die secernirenden Organe hat Chinin anscheinend keine besondere Wirkung.

Die milzverkleinernde Wirkung kommt nur dem Chinin und der amorphen Base, nicht aber dem Cinchonin zu (Küchenmeister). Sie ist vom Nerven-einflusse völlig unabhängig (Mosler und Landois). Die von Monteverdi (1872) zuerst bei Puerperae constatirte ekbolische Wirkung des Chinins ist von Chirone, Dupuis und Laborde an trächtigen Thieren bestätigt. Chirone hält die Contraction des Uterus und der Milz durch Chinin für Folge einer Wirkung des Alkaloids auf die glatten Muskelfasern, welche auch an der Darm-musculatur und an den Gefässen sich manifestiren. Die Bewegung der Samen-fäden wird durch Chinin anfangs erheblich gesteigert, später aufgehoben (Chirone). — Nach Kerner vermehren grössere Mengen Chinin die Harn-absonderung bei Gesunden. Die von Stockmann dem Chinin zugeschriebene Vermehrung der Gallensecretion wird nach Versuchen von Buchheim und Engel durch das Medicament nicht hervorgerufen. Irritirende Wirkung auf die Nieren und Harnwege ist in einzelnen Fällen nach sehr grossen Dosen in Form von Albuminurie oder Blasenkatarrh, Ischurie und Strangurie beobachtet. Sicilianische und griechische Aerzte schreiben dem Chinin die Erzeugung von Hämoglobinurie zu, doch sind hier vermuthlich Malariaaffectionen auf Rechnung des Mittels geschrieben (Antoniades). Nach einigen Angaben soll Chinin bestehende Gonorrhöen verschlimmern.

Auf den Stoffwechsel wirkt Chinin retardirend (Ranke, Kerner, v. Boeck); diese Action tritt sowohl bei kleinen als bei grossen Dosen hervor (Kerner).

Bedeutend herabgesetzt erscheint nach Chiningebrauch die Harnsäureaus-

scheidung und zwar proportional der Höhe der Dosis, in zweiter Linie die Schwefelsäureausscheidung; bei grossen Gaben ist auch die Gesamtstickstoffmenge vermindert und nur Kreatin- und Ammoniakgehalt annähernd derselbe (Kerner). Nach v. Boeck beschränkt Chinin die Zersetzung der stickstoffhaltigen Substanzen stärker als Morphin und stellt sich in dieser Beziehung dem Iod gleich, indem es eine Ersparniss von nahezu 11 % der Gesamtstickstoff-einfuhr zu Wege bringt. Abnahme der ausgeschiedenen Kohlensäure scheint Chinin nicht zu bewirken (Binz und Strassburg). Buss erhielt beim Gesunden nur geringe Verminderung der Kohlensäureausscheidung (nach 1,5), unabhängig von der Temperatur. — Cinchonin besitzt die retardirende Wirkung auf den Stickstoffumsatz in noch höherem Grade wie Chinin (Dragendorff und Johannesen).

Von den verschiedenen therapeutischen Anwendungen der Chinarine und Chinaalkaloide heben wir zuerst diejenige als Tonicum hervor, da in dieser Richtung auch die Rinde und daraus dargestellte Präparate in gleicher Weise Verwendung finden, während sonst im Allgemeinen in der Therapie die Chinabasen bevorzugt werden.

Es ist nicht zu verkennen, dass dem Chinin vermöge seiner Wirkung auf den Stoffwechsel und den Blutdruck (in kleinen Dosen), sowie als bitterem Medicamente überhaupt die Eigenschaft eines Plasticums zukommt und dass auch die Nebenalkaloide, ja das Cinchonin vielleicht in Folge stärkerer Beschränkung des Stickstoffumsatzes in noch höherem Grade wie das Chinin, dasselbe Prädicat in Anspruch nehmen können. Schon oben wurde hervorgehoben, dass die Chinabasen nicht die gesammte tonisirende Wirkung der Chinarinden repräsentiren, indem Präparate aus letzteren, in denen Alkaloide nur spurweise sich finden, bei Schwächezuständen von notorisch günstiger Wirkung sind. Manche günstige Effecte der Chinapräparate als Tonica sind übrigens nicht als Folge einer directen plastischen Wirkung, sondern als indirecte Wirkung aufzufassen, indem die Besserung nicht selten, z. B. bei Tuberculose auf Herabsetzung des Fiebers oder auf Beschränkung der Diarrhoe, z. B. bei Verwendung von Chininum tannicum, bezogen werden muss. Man wendet die Chinapräparate nicht nur bei chronischen Kachexien (Tuberculose, Scrophulose, Krebs), sondern namentlich auch bei mehr acut auftretenden Erschöpfungszuständen, z. B. in Folge von langdauernden Eiterungen oder Blutungen und in der Reconvalescenz von acuten Krankheiten (Typhus, Pneumonie, Pleuritis u. s. w.) an.

Auch als reines Stomachicum stehen die Chininpräparate im hohen Ansehen und verdienen in der That in allen Fällen von sog. atonischer Verdauungsschwäche Anwendung, während sie bei dem Bestehen eines acut entzündlichen Magenkatarrhs oder eines mit starker Schleimsecretion und bedeutenden Zungenbelag verbundenen chronischen Magenkatarrhs contraindicirt erscheinen.

Die Gründe für die Wirkung der in Rede stehenden Präparate sind dieselben wie bei dem *Amara pura*, ebenso sind die Formen der Dyspepsie, wo sie Anwendung verdienen, die nämlichen (*Dyspepsia potatorum*, *chlorotica*, *phthistica* u. s. w.). Man giebt bei diesen Leiden gewöhnlich den aus der Chinarine dargestellten Tincturen, Weinen und Extracten den Vorzug.

Die vorzüglichste Anwendung finden die Chinapräparate und besonders das Chinin bei Wechselfiebern, sowohl einfachen als perniciosen, sowie bei Sumpffiebern mit leicht ausgesprochenem Typus (*Febris remittens*), ferner bei intermittirenden Krankheitsformen jeder Art, namentlich Neuralgien und Neurosen mit bestimmtem Typus.

Wie bereits oben angegeben wurde, fand die Chinarine ihre erste Verwendung gegen intermittirende Fieber; aber erst durch Entdeckung der Alkaloide



und durch die von Magendie bald nach der Auffindung des Chinins durch Pelletier und Caventou (1820) geschehene Einführung des letzteren in die Therapie sind wir zu einem wahrhaft souveränen Mittel gegen alle sog. Malaria-Affectionen gelangt. Aus dem ursprünglich gegen Intermittenten gebrauchten Chinapulver werden die Alkaloide nur sehr langsam und höchst unvollständig (nach Kerner nur 28% des in China regia enthaltenen Chinins) resorbirt, auch sind die zur Beseitigung des fraglichen Leidens nothwendigen Mengen so ausserordentlich grosse, dass sie mit Mühe beigebracht werden können und fast immer stark belästigend auf die Digestion wirken. Die aus den Rinden dargestellten Decocte, Tincturen und Extracte nehmen nur geringe Mengen der Alkaloide auf. Man gebraucht deshalb jetzt — von Nachkrankheiten der Malariaintoxication abgesehen — fast ausschliesslich die Chinaalkaloide resp. deren Salze. Unter den Chinabasen aber ist, wie wiederholte Prüfungen in Fiebergegenden darthun, das Chinin das wirksamste und zuverlässigste Antitypicum; ihm zunächst folgen das Chinidin und Cinchonidin und erst in vierter Linie kommt das Cinchonin, welches zur Erzielung derselben Heilwirkungen bei Intermittens die doppelte Menge bedarf. Anderen Antitypica gegenüber nimmt das Chinin unbestritten den ersten Rang ein. Ausgedehnte eigene Erfahrung über die Wirkung des Chinins bei Wechselfieber lassen uns alle — mit Ausnahme des theuren Preises — dem Chinin gemachten Vorwürfe als ungerecht und allein von einer unpassenden Anwendungsweise abhängig erscheinen. Sogar bei Complicationen mit Status gastricus wird das Mittel selbst ohne zuvorige Darreichung eines Brechmittels ertragen. Je frühzeitiger bei decidirtem Typus Chinin in Anwendung kommt, um so entschiedener sind die Erfolge. Die Kunst, reguläre Wechselfieber mit Chinin zu heilen, besteht in der richtigen Wahl der Dosis und der Zeit ihrer Darreichung. Zur Heilung einer gewöhnlichen Tertiana von nicht zu langer Dauer reicht die Gabe von 0,5–1,0 Chininsulfat oder Chininhydrochlorat (vgl. Präparate) aus, wenn man dieselbe 6 Std. vor dem zu erwartenden Anfall auf einmal (oder in zwei Hälften, die erste 6, die zweite 3 Std. vor dem Anfall) nehmen lässt. Dasselbe gilt von frischer Quotidiana, nur ist das Chininpulver zweckmässiger 9–12 Std. vor dem Anfall zu reichen. Giebt man das Medicament kürzere Zeit vor dem Anfall, so wird derselbe nicht vollständig unterdrückt oder oft postponirt. Zweckmässig ist es zur sicheren Verhütung der Wiederkehr der Anfälle dieselbe Chinindosis einige Stunden vor dem zweiten zu erwartenden Anfall zu wiederholen. Bei Quartana ist es in der Regel angezeigt, sofort nach dem Coupiren des Anfalls mittelst einer grossen Chiningabe (1,0–1,5) kleinere, jedoch nicht unter 0,2–0,3, während der Apyrexie fortnehmen zu lassen. Unter dem Einflusse grosser Dosen ist eine Volumverminderung der bei Intermittens bekanntlich oft hochgradig angeschwollenen Milz unverkennbar, und häufig gelingt es, durch Chinin sowohl die nach Ablauf der Fieberanfälle zurückgebliebenen Fieberkuchen als den von Milzvergrösserung abhängigen Hydrops mit einem Schlage zu beseitigen. Nach verschiedenen Erfahrungen an der Westküste von Afrika, in Südcarolina und auf dem Isthmus zu Panama besitzt Chinin auch eine prophylaktische Wirkung gegen Malaria-gift, wenn es regelmässig Morgens und Abends genommen wird. Bei nicht normalem Typus und bei remittirendem Fieber sind die Effecte des Chinins nicht so prägnant wie bei regelmässiger Intermittens.

Die antitypische Wirkung des Chinins bei nicht febrilen Intermittensformen, sog. Intermittens larvata, steht durch ausgedehnte Reihen von Beobachtungen fest. Neuralgien mit ausgesprochenem Typus, wie solche insbesondere an den verschiedenen Zweigen des Trigeminus vorkommen, werden durch stündliche Darreichung von 0,1–0,2 Chininsulfat oder durch 3 mal tägliche Application von 0,3–0,4 eines Chininsalzes rasch und sicher geheilt. Die medicinische Literatur enthält eine grosse Menge von Fällen der verschiedensten typischen Neurosen und intermittirenden Hyperämien, welche durch Chinin Heilung fanden.

Die Theorie der Chininwirkung bei Malariaerkrankungen muss als eine gegenwärtig noch auf äusserst schwachen Füßen stehende bezeichnet werden. Die milzverkleinernde Wirkung des Chinins ist dabei jedenfalls von untergeordneter Bedeutung; denn auch intermittirende Affectionen, bei denen keine Milzvergrösserung sich findet, weichen dem Chinin, und manche stärker milzverkleinernd als Chinin wirkende Medicamente, z. B. Gentianin, sind weit schlech-

tere Autitypica (Küchenmeister). In der gegenwärtigen Epoche der Vibrioniden und Bakterien hat man natürlich auch die Malariakachexie auf solche zurückgeführt, wie früher auf Pilzsporen, und die Erdtödtung dieser furchtbaren Gebilde als Ursache der Chininwirkung bei Intermittens hingestellt, doch enthält das Blut malariakranker Menschen oft nicht mehr stäbchen- und körnchenförmige bewegliche Körper als das Blut gesunder Menschen (Vulpian), und nach den neuesten Untersuchungen von Bochefontaine würden die zur Heilung von Intermittens genügenden Quantitäten Chinin durchaus nicht ausreichen, um die Vibrioniden im Blute zu ertödteten, wozu bei einer Blutmenge von 14 kg. 17,0 Chinin erforderlich erscheinen.

Nicht minder wirksam erweist sich das Chinin als ein die Temperatur und die Pulsfrequenz herabsetzendes Mittel bei continuirlich fieberhaften Affectionen, und zwar sowohl bei Infectionskrankheiten als bei dem mit acut entzündlichen Localprocessen zusammenhängenden Fieber. Besonders günstige Erfolge zeigt das Chinin beim Typhus und bei hektischem Fieber (Liebermeister).

Die antipyretische Verwendung des Chinins, zuerst von den Anhängern der Rasorischen Schule geübt, fand in Frankreich durch Briquet und Leroux, in Deutschland durch Wachsmuth und Liebermeister besondere Empfehlung. Es kommt bis jetzt meist nur das Chinin resp. seine Salze in Betracht, obschon auch gerade hier von dem wohlfeileren Cinchonin Gebrauch gemacht werden könnte, da dasselbe auf Temperatur und Stoffwechsel selbst noch mehr herabsetzend als Chinin wirkt. Das letztere wurde am häufigsten bei Rheumatismus acutus und Typhus gegeben und über diese Krankheiten liegen bis jetzt die meisten Erfahrungen vor, doch ist auch eine günstige Wirkung bei Entzündungen der Lunge und Pleura, bei Peritonitis puerperalis, Erysipelas, Variola und andern Leiden constatirt. Die Herabsetzung der Temperatur erfolgt constant nur nach grossen Gaben (1,2) und schwankt zwischen wenigen Zehntelgraden bis zu 3 Grad; am stärksten ist sie bei Darreichung des Mittels in den Abendstunden. Am ausgesprochensten ist sie bei Typhus, weniger bei Gesichtrose und acutem Gelenkrheumatismus. Die antipyretischen Effecte machen sich gewöhnlich 24—48 Std. geltend. Der Hauptabfall zeigt sich in derselben Zeit, wo die Chininausscheidung durch den Harn am grössten ist. Die Pulsfrequenz beginnt später zu sinken als die Temperatur und erreicht auch ihren tiefsten Stand später als diese. Beim Typhus bessern sich unter dem Einflusse des Chinins oft die cerebralen Symptome, auch das Allgemeinbefinden, letzteres nach Wachsmuth vorzugsweise bei Anwendung kleinerer Dosen. Gerade bei Typhus, wo schon ältere Aerzte die China in der Absicht anwendeten, um der Blutdissolution entgegen zu wirken, scheint Chinin als Antipyreticum vor andern ähnlich wirkenden Mitteln verschiedene Vorzüge zu besitzen, indem ihm z. B. die schädlichen Wirkungen des Veratrins auf den Darm abgehen, auch nicht so leicht Collapsus danach eintritt, und indem es schneller und anhaltender wirkt als die jetzt in der Therapie des Typhus so häufig angewendeten kalten Bäder. Wie alle Antipyretica findet das Chinin seine Indication beim Typhus in dem Vorhandensein sehr hoher Fiebertemperatur, welche direct Gefahren für das Leben des Kranken involvirt; die Wirkung ist natürlich nur eine symptomatische, der Verlauf der Krankheit wird durch das Mittel nicht abgekürzt. Im acuten Gelenkrheumatismus ist Chinin als Antipyreticum jetzt mehr und mehr durch Salicylsäure und Natriumsalicylat, welche in entschiedener Weise auf die Schmerzen und überhaupt auf den Verlauf coupirend wirken, verdrängt. Hinsichtlich der Verwendung bei Pneumonie, bei welcher die von Skoda angenommene Hemmung der eitrigen Exsudation durch Chinin nicht stattfindet (Schroetter), ist übrigens zu berücksichtigen, dass die depressirende Action grosser Dosen auf die Herzthätigkeit Steigerung der Athemnoth und Cyanose bedingen kann und daher Vorsicht geboten ist. Nach Liebermeister wirkt bei hektischem Fieber eine Verbindung von Chinin und Digitalis günstiger als Chinin allein.

Factisch ist, dass von fiebernden Kranken durchschnittlich grössere Dosen Chinin ertragen werden als von Gesunden, indessen treten bei Einzelnen auch nach der eben angegebenen Dosis von 1,2 Ohrensausen und leichte cerebrale

Störungen ein. Briquet will sogar beim Gelenkrheumatismus das Zustandekommen der Besserung nur durch Gaben eintreten gesehen haben, welche leichte Intoxicationsphänomene bedingten. Die von ihm durchschnittlich dargereichten Dosen von 2,0—3,0 pro die oder gar von 10,0 täglich, wie er sie im Anfange gab, verdienen keine Nachahmung.

Besonders günstige Wirkung schreibt man dem Chinin bei Fiebern zu, welche anfallsweise auftreten, ohne an einen bestimmten Typus gebunden zu sein, wie solche bei Eiterungen innerer Organe (Leberabscess, Empyem) oder bei Septicämie vorkommen. Die Erfolge sind hier manchmal vorübergehend günstig, manchmal aber auch selbst bei Anwendung sehr grosser Dosen gleich Null. Die hemmende Wirkung des Chinins auf die Emigration rother Blutkörperchen bildet eine rationelle Grundlage für die vielfach versuchte Anwendung desselben als Antiphlogisticum bei innerlicher Benutzung.

Im Allgemeinen ist die antipyretische Wirkung bei eigentlichem septischem Fieber geringer als bei Infectiouskrankheiten und entzündlichen Fiebern, doch werden mitunter gerade die intercurrenten Fieberexacerbationen durch Aufsaugung putriden Exsudate im Verlaufe zymotischer Krankheiten in ganz vorzüglicher Weise beeinflusst.

Von Pneumonie (Skoda) abgesehen, ist Chinin zur Beschränkung von eitrigen Exsudationen bei Cystitis und Pyelitis (Lebert), bei Croup (Macfarlan), endlich in England vielfach bei Ophthalmien mit Erfolg gebraucht.

Viel gebraucht werden die Chinapräparate, und zwar fast noch mehr die Chinarinden als das Chinin, in antiseptischer Richtung. Das Rationelle dieser Anwendungsweise kann nach den Ermittlungen über die physiologische Wirkung des Chinins nicht zweifelhaft sein.

Es gilt dies besonders von der örtlichen Anwendung der Chinarinde in Substanz oder in Abkochungen und Auszügen derselben bei gangränösen und scorbutischen Geschwüren. Beliebt ist besonders die Anwendung von Zahnpulvern aus Chinarinde bei leicht blutendem Zahnfleische, wo vielleicht der Gerbsäure ein ebenso grosser Antheil an der Wirkung als den Chinaalkaloiden zukommt. Weniger gut erwiesen ist dagegen die Heilwirkung des Chinins oder der Chinarindenabkochungen bei putriden Fiebern oder sog. Tendenz zur Blutdissolution als directe Folge einer auf das Blut oder den septischen Process direct gerichteten Action. Immerhin problematisch bleibt auch trotz jahrhundertlangem Gebrauch ein directer günstiger Einfluss der Chinarindendecocte bei Scorbut und Morbus maculosus, zumal da meist neben der China noch Säuren in Anwendung gezogen werden. Hierher gehört auch die Anwendung von Chininlösungen und Gurgelwässern bei Angina diphtheritica und Decubitus (Brakenridge), wo gleichzeitig die antiphlogistische Action des Alkaloids von Bedeutung ist, die das Mittel z. B. auch bei suppurirender Angina tonsillaris indicirt erscheinen lässt. Die antiphlogistische, antiseptische und antizymotische Wirkung rechtfertigt auch die Anwendung bei Cystitis putrida als Infusion in die Blase und bei septischer Keratitis als Collyrium.

Rationell erscheint noch wegen der deleteren Action des Chinins auf niedrigere Organismen die Verwendung des Chinins bei einzelnen parasitären Affectionen, wo dieselben einer localen Application zugänglich erscheinen, so beim Heuasthma (Helmholz) und beim Keuchhusten (Binz und Fickert).

Hierher gehört auch die Empfehlung des Chinins als Prophylacticum und Desinfectionsmittel bei Cholera, weil es die Cholerapilzbildung hemme (Jörg, Guyet, Hallier). Möglicherweise ist Chinin auch (in Klystierform) von Erfolg



bei Enteritis, welche mit massenhafter Bildung von Monaden oder Vibrionen in Verbindung stehen, so vielleicht in manchen Fällen von Sommerdiarrhoe; auch verdiente die Wirksamkeit bei *Balantidium coli* und verwandten Darminfusorien geprüft zu werden. Delvaux empfahl Chininklystiere gegen Oxyuris, doch lebt dieser Wurm lange Zeit in Chininlösungen (Küchenmeister).

Die unzweifelhafte Wirkung des Chinins auf die Nervencentra macht auch den Gebrauch des Chinins bei manchen Nervenkrankheiten indicirt, und in vielen Fällen von Motilitäts- und Sensibilitätsneurosen hat das Alkaloid ausserordentliche günstige Erfolge gegeben.

Wie das Chinin typische Neuralgien rasch und sicher beseitigt, so hilft es auch nicht selten bei atypischen, doch ist es nach unseren eigenen Erfahrungen hier viel weniger zuverlässig und stets sind zur Erzielung von Heileffecten grössere Dosen notwendig. Sehr günstig wirkt Chinin in einigen Fällen von Hemikranie, und zwar am besten in kurz vor dem Anfalle zu reichenden kleinen Dosen (Oppolzer), sowie bei Hyperästhesie der Ciliarnerven. Von Motilitätsneurosen will Gamberini Epilepsie mit Chinin geheilt haben; Skoda empfahl es besonders bei Chorea magna, wo schon kleine Gaben manchmal sehr grosse Wirkung haben, und bei Innervationsstörungen des Herzens mit oder ohne Klappenfehler. Die von verschiedenen amerikanischen Autoren angeführten Heilungen von idiopathischem und traumatischem Tetanus lassen sich durch die von Chinin bedingte Herabsetzung der Reflexaction erklären; auch liegen Beobachtungen über Heilung von Singultus durch Chinin vor.

In der neuesten Zeit ist die Aufmerksamkeit der Aerzte auf die Behandlung der Leukämie mit grossen Dosen Chinin (Hewson, Mosler) und auf die Benutzung des Alkaloids als Ecboicum (Monteverdi) gerichtet.

Die Effecte des Chinins bei Leukämie sind im hohen Grade sowohl in Bezug auf die Verringerung der Leucocyten als hinsichtlich der Verkleinerung des Milztumors überraschend. Als wehentreibendes Mittel bei Inertia uteri und zur Austreibung der Placenta ist Chinin als Ersatzmittel des Mutterkorns nach den bisherigen Erfahrungen besonders italienischer Aerzte gewiss anzuwenden gerechtfertigt. Ob dasselbe den Uterus im Beginne der Gravidität oder gegen den Schluss derselben bei stärkerer Entwicklung der glatten Muskelfasern (Chirone) kräftiger afficirt, steht dahin, jedenfalls kann nicht geleugnet werden, dass man das Mittel mit Erfolg einerseits zur Stillung von Metrorrhagien und andererseits auch zur Einleitung künstlicher Frühgeburt benutzt hat. Bei Metrorrhagien dürfte auch die Herabsetzung des Blutdrucks durch grosse Dosen von Einfluss sein, die das Mittel auch bei anderen Blutungen wie Epistaxis, Hämorrhoidalblutungen (Klokw), Hämoptysis, indicirt erscheinen liessen.

Die Chinarinde dient jetzt fast nie mehr als Antitypicum, sondern entweder zur Nachcur bei Intermittenten oder als Tonicum, Adstringens und Antisepticum. Als Form der Anwendung kommen vorzugsweise Pulver und Abkochung (1:10—20) in Betracht.

In Pulverform dient die Chinarinde, meist in Combination mit Kohle oder Myrrha, als Streupulver bei putriden Geschwüren und als Zahnpulver. Abkochungen müssen heiss colirt und beim Einnehmen umgeschüttelt werden, weil sie in der Kälte einen alkaloidhaltigen Niederschlag geben; Zusatz von etwas Salmiak gegen Ende des Kochens (1:25 Rinde) macht das Decoct etwas klarer. Zur vollständigeren Lösung der Alkaloide ist der Zusatz von etwas Säure (etwa 3 Th. Acidum sulf. dil. auf 25 Th. Rinde) sehr anzurathen, da ohne solchen Zusatz nur 42, mit demselben dagegen 74% der Alkaloide in das Decoct aufgenommen werden (Jensen). Einzelne ziehen zum inneren Gebrauche das Macerat dem Decocte vor, indessen wird der Vortheil, leichter vom Magen ertragen zu werden, durch den weit geringeren Gehalt an Alkaloiden aufgewogen. Chinaabkochungen können sowohl innerlich als zu verschiedenen äusseren Formen (In-

jectionen, Verbandwässern, Klystieren, Gurgelwässern, Mundwässern) verwendet werden. Andere Formen, z. B. zum innern Gebrauche Chinachokolade und Chinakaffee, zum äussern Gebrauche Chinasalben und Chinapomaden, welchen eine stärkende Wirkung auf den Haarwuchs vom Volke beigelegt wird, die jedoch zweckmässiger aus Chinaextract bereitet werden, haben nur untergeordnete Bedeutung.

Ueber die Wahl der einzelnen Chininsalze, von denen mehrere officinell sind, gilt im Allgemeinen, dass sehr grosse Differenzen in der Wirkung nicht existiren, dass aber durchschnittlich die löslicheren und am meisten Chinin einschliessenden Salze Bevorzugung verdienen, wenn rasche Resorptionswirkung gewünscht wird. Aus diesem Grunde ist Chininum hydrochloricum, das ausserdem vermöge seines niedrigen endosmotischen Aequivalents weniger leicht Irritation des Magens bedingt, nicht ohne Vorzüge vor dem Chininsulfat, welches am meisten bei den Aerzten im Gebrauch steht.

#### Präparate:

1) **Tinctura Chinae**, Tr. Chinae simplex; **Chinatinctur**. Mit 5 Th. Spiritus dilutus bereitet, rothbraun, stark bitter. Als Tonicum und zur Nachcur von Intermittens zu 20–60 Tropfen mehrmals täglich.

2) **Tinctura Chinae composita**, Elixir roborans Whyttii; **Zusammengesetzte Chinatinctur**, Whytts Magenelixir. Cort. Chinae 6 Th., Cort. fructus Aurantii, Rad. Gentianae aa 2 Th., Cort. Cinnamomi 1 Th. mit 50 Th. Spiritus dilutus digerirt; rothbraun, bitter aromatisch. Nach Robert Whytt, dem bekannten Gegner der Hallerschen Irritabilitätslehre, benanntes tonisirendes Medicament, das man für sich zu 10–60 Tropfen oder als Zusatz zu Mixturen benutzte. Aehnliche ältere, jedoch mit Wein u. a. aromatischen Zusätzen bereite Chinaauszüge sind die Tinctura Chinae composita vinosa und die Tinctura Chinae crocata s. Elixir alexipharmacum Huxhami.

3) **Vinum Chinae**; **Chinawein**. Chinatinctur, Glycerin aa 1 Th. mit 3 Th. Xeres 3 Wochen stehen gelassen und filtrirt. Braunroth, klar. Esslöffelweise oder weinglasweise mehrmals täglich als Tonicum.

4) **Extractum Chinae spirituosum**; **weingeistiges Chinaextract**. Trocknes Macerationsextract mit 10 Th. Spir. dil. bereitet; rothbraun, in Wasser trübe löslich, ersetzt das früher officinelle Extractum Chinae fuscae. Innerlich 0,5–1,0 mehrmals täglich, nur als Tonicum, in Pillen oder Lösung; äusserlich besonders als Zusatz zu angeblich den Haarwuchs befördernden Pomaden.

5) **Extractum Chinae aquosum**; **wässriges Chinaextract**. Mit Wasser bereitetes dünnes Macerationsextract; rothbraun, in Wasser trübe löslich. Ersetzt das früher officinelle Extractum Chinae frigide paratum (von gewöhnlicher Consistenz). Dieses Präparat wurde früher ungemein geschätzt, enthält aber nur  $\frac{1}{2}$  der ausziehbaren Alkaloide, dagegen Chinagerbsäure und chinovasaures Calcium. Nur als Tonicum, wie spirituöses Chinaextract zu verwenden.

Zu den Extracten müssen wir auch das sog. Quinium oder Extrait alcoolique de quinquina à la chaux stellen, welches Labarracque aus den Chinarinden durch Behandeln mit Kalkhydrat, kochendem Weingeist und Eindampfen bereitete und von welchem  $4\frac{1}{2}$  Gm. 1,0 Chininsulfat und 0,1 Cinchoninsulfat entsprechen sollen. Diese durch ihre geringe Bitterkeit ausgezeichnete Masse scheint schlecht resorbirt zu werden.

Verschieden hiervon ist das seit 1876 auf Anregung von De Vrij in Ostindien bereitete Quinetum, welches durch Erschöpfen ostindischer Chinarinden mit schwach angesäuertem Wasser und Ausfällen mit Natron gewonnen wird, den Gesamtbetrag der in der Rinde enthaltenen Alkaloide in relativ reinem Zustande darstellt. Das Präparat, in Indien als Cinchona febrifuga be-

zeichnet. wird, in etwas grösseren Dosen als Chininsulfat und etwas länger vor dem Anfalle gegeben, bei Wechselfiebern von indischen Aerzten sehr gerühmt und lässt sich auch als Tonicum verwenden (Vinkhuysen).

6) **Chininum sulfuricum; Chininsulfat**, schwefelsaures Chinin, neutrales schwefelsaures Chinin. Dieses von allen Chininsalzen am meisten medicinisch verwendete Salz,  $2\text{C}^{20}\text{H}^{24}\text{N}^2\text{O}^2, \text{SH}^2\text{O}^4 + 7\text{H}^2\text{O}$ , bildet zarte, seideglänzende, etwas biegsame, schneeweisse Krystallnadeln von äusserst bitterem Geschmacke, welche sich in ca. 800 Th. kaltem und in 35 Th. heissem Wasser, sowie in 60 Th. heissem Alkohol lösen. Auch in Kresot und Glycerin löst sich Chininsulfat, dagegen nur schwierig in Aether. Leicht erfolgt die Lösung in angesäuertem Wasser.

Ueber die Dosis des Chininsulfats wie über diejenige aller Chininsalze wurden bereits oben bei den einzelnen Krankheiten Notizen gegeben, da dieselbe eine ganz andere ist, wenn man tonisirend wirken, als wenn man Intermittens oder continuirliches Fieber beseitigen will. Als Tonicum oder Stomachicum giebt man Chininsulfat zu 0,05–0,15, als Mittel gegen Intermittens dagegen zu 0,6 bis 1,2 vor dem Anfalle, als Antipyreticum zu 1,2 auf 2 Mal in Zwischenräumen von mehreren Stunden oder bei empfindlichen Personen zu 0,6 auf einmal, worauf man weitere 0,6 in 2ständlichen Dosen von 0,2–0,3 folgen lässt (Liebermeister). Bei typischen Neuralgien und beim hektischen Fieber ist der continuirliche Gebrauch von 0,1–0,2 in stündigen oder mehrständigen Intervallen gebräuchlich und (bei Febris hectica wenigstens) vorzuziehen. Wenn es sich nicht verkennen lässt, dass besonders bei der Anwendung des Chinins als Antipyreticum und Antipyreticum Misserfolge durch zu kleine Dosen häufig veranlasst werden und dass man bei perniciosen Wechselfiebern die grossen Chiningaben selbst auf das Drei- und Vierfache gesteigert hat, ohne dadurch die Gesundheit zu schädigen, so muss man doch die Möglichkeit einer Vergiftung durch Chinin stets im Auge behalten und nicht ohne besondern Grund die angegebenen Grenzen überschreiten. Tödliche Effecte wird man freilich nach medicinalen Dosen oder solchen, welche sich denselben nähern, niemals auftreten sehen, wohl aber können ernstliche Erkrankungen bei einzelnen Personen durch dieselben herbeigeführt werden. So findet sich in der Literatur Auftreten von 24ständiger Maule bei einer jungen Dame schon nach 1,5 (Trousseau), Hemiplegie nach dreimal 0,5 (Stillé), Taubheit nach 14 Tage lang fortgesetzter Einführung von 0,12 (van Buren) u. a. m.

Meist wird Chininsulfat innerlich gegeben, und zwar trotz seiner Bitterkeit in Pulver. Als Corrigentien dienen Oelzucker oder aromatische Pflanzenpulver, z. B. Pulvis florum Chamom., am zweckmässigsten Chokolade, welche die Bitterkeit am besten verdeckt. Chinintrochischen aus Chokolademasse sind für die Verabreichung im kindlichen Lebensalter sehr geeignet; Pillen und Boli passen in gleicher Weise für Erwachsene. Zur Beförderung der Resorption kann man Chininpulver in Selterswasser nehmen lassen (sog. Aqua carbonica febrifuga). Wässrige Lösungen sind weniger beliebt; auch führen dieselben wegen der bei Einverleibung des Alkaloidsalzes in flüssiger Form nothwendig resultirenden rascheren Resorption leichter zu Ohrensausen und cerebralen Erscheinungen. Gewöhnlich werden derartige Solutionen unter Beihülfe von Säuren (Schwefelsäure, Salzsäure, Weinsäure, Citronensäure) gemacht. Nicht unzweckmässig ist Kaffee als Vehikel, stark mit Milch und Zucker und mit einigen Tropfen Citronensaft versetzt (Delioux). Alkoholische Lösungen, z. B. Vin de quinine nach Magendie, haben keine besondern Vorzüge. Häufig verbindet man Chinin bei interner Darreichung mit Medicamenten, denen man Steigerung der Wirkung zuschreibt, z. B. bei continuirlichem und hektischem Fieber mit Digitalis, bei Intermittens mit Belladonna, Strychnin, Goldschwefel, Brechweinstein und Opium, als Tonicum mit Eisen, als Stomachicum mit aromatischen und bitteraromatischen Mitteln. Bei Personen, deren Tractus vom Chinin unangenehm afficirt wird und welche leicht danach erbrechen, werden Opium und Kaliumacetat als Corrigentien empfohlen. Zu vermeiden sind bei interner Anwendung Metallsalze, Alkalien, Salzbildner und Tannin, weil dadurch Zersetzung oder Bildung von weniger löslichen Niederschlägen resultirt. Nach Calloud erhöhen Salmiak, Salpeter, Kochsalz und Seifenwasser die Löslichkeit des Chininsulfats dem gewöhnlichen Wasser gegenüber um die Hälfte. Glauber- und Bittersalzsolutionen wirken



schwächer lösend als Wasser. Natriumphosphat und Natriumbicarbonat stören die Lösungswirkung des Wassers bedeutend.

Von äusseren Applicationsweisen ist diejenige in Klystierform die beste. Dieselbe passt besonders bei Kindern und bei bestehender Brechneigung, sowie bei comitirenden Intermittenten. Die Wirkung der Chininklystiere ist fast sicherer als die der internen Einverleibung; die Dosis scheint bei Intermittens auf 0,4 bis 0,5 erniedrigt werden zu können, während die antipyretische Wirkung nach Liebermeister gleiche Mengen erfordert. Auch in Suppositorien ist Chininsulfat bei Intermittens benutzt. Epidermatisch wird Chininsulfat nur von Wenigen (Dassit, Nonat) als Antiperiodicum empfohlen, wohl aber bei Neuralgien (Dufay), wo auch die endermatische Anwendung, bei welcher das Salz in Salbenform oder Lösung zu appliciren ist, weil dasselbe in Substanz Brennen und Entzündung erregt, von Nutzen sein kann (Guersent). Die Inconvenienzen, welche die hypodermatische Anwendung von Chininsalzen darbietet, lassen diese Darreichungsmethode nur bei perniciöser Intermittens und Febris intermittens haemorrhagica als empfehlenswerth erscheinen. Will man das Chininsulfat in dieser Richtung benutzen, so setzt man zur Anfertigung der Lösung am zweckmässigsten Salzsäure zu. Wird auf 1 Aeq. Chininsulfat 1 Aeq. Salzsäure genommen (auf 100,0 Ch. 69,0 Acid. hydrochl. dil.), so lässt sich eine krystallisirende Lösung so concentrirt erhalten, dass je 1 Ccm. Lösung 3 Cgm. Chinin enthält, so dass 0,3 subcutan injicirt werden können (Bernatzik). Zweckmässiger wird jedoch statt Chininsulfat das Chininhydrochlorat benutzt. Völlig irrelevant erscheint die Einreibung von Chinin in die Wangenschleimhaut und Pharynxwand (Point und Ducros) und wenig gebraucht ist bisher die Inhalation zerstäubter Chininsulfatlösungen, welche Fieber bei intermittirenden Hustenparoxysmen und Ancelon bei Wechselfieber versuchte. Schnupfpulver aus Chininsulfat sind gegen Migraine und Neuralgia ciliaris und supraorbitalis (Hue, Bourjot, St. Hilaire), Augenwässer (1:500) bei typischen Ophthalmien (Belonsowich) erfolgreich versucht. Zur Einspritzung in die Blase bei Cystitis putrida dienen Lösungen von 1:200—1250 (Nunn, Thornton).

7) **Chininum bisulfuricum**, **Chininum sulfuricum acidum**; **Chininbisulfat**, saures schwefelsaures Chinin. Dieses beim Auflösen von Chininsulfat in schwefelsäurehaltigem Wasser entstehende Salz bildet wasserhelle, an der Luft verwitternde Prismen von saurer Reaction und bitterem Geschmacke, welche sich bei 13° in 11 Th., bei 22° in 8 Th. Wasser, sowie in 2 Th. Spiritus lösen. Es ist besonders zur Subcutaninjection, auch zur Darstellung einer Aqua carbonica febrifuga, bereitet durch Darreichung eines Theelöffels voll einer Lösung von 0,5 in 30,0 Aq. dest. in einem Glase Selterswasser, empfohlen. Für den innern Gebrauch wird es zweckmässig billiger durch Lösung von Chininsulfat in mit Schwefelsäure angesäuertem Wasser dargestellt.

8) **Chininum hydrochloricum**, **Ch. hydrochloratum s. muriaticum**; **Chininhydrochlorat**, neutrales chlorwasserstoffsäures Chinin, salzsaures Chinin. Dieses in weissen, glänzenden Prismen krystallisirende Chininsalz ist durch Leichtlöslichkeit in Wasser und Alkohol ausgezeichnet. Es giebt mit 3 Th. Weingeist und 34 Th. Wasser neutrale, nicht fluorescirende Lösungen. Wie früher Hufeland und Bartels haben neuerdings Binz und Colin das Präparat als ein als Antipyreticum und Antitypicum sicherer als Chininsulfat wirkendes Mittel, das ausserdem wegen seiner Leichtlöslichkeit vom Magen weit besser tolerirt wird, bezeichnet. Als Protoplasmagift und Antisepticum ist es selbst dem Chininbisulfat überlegen (Binz). Indicirt erscheint dasselbe besonders bei bestehendem hohem Fieber, wo in der Regel Chininsulfat vom Magen schlecht ertragen wird (Socin, Lindwurm); doch sind auch hier grosse Dosen zweckmässiger im Klystier zu appliciren. Binz fand es bei Keuchhusten intern in flüssiger Form applicirt, nicht in fester Form von vorzüglicher Wirksamkeit; Botkin empfahl es bei Cholera, curativ und prophylaktisch. Da das Präparat wegen des niedrigen Atomgewichts der Salzsäure mehr Chinin als Chininsulfat enthält, lässt es sich in etwas geringerer Dosis appliciren. Eine Lösung von 10 Th. in 4 Th. Salzsäure und 16 Th. Wasser ist von Bernatzik als zweckmässigste Form für die subcutane Injection des

Chinins empfohlen. Auch in Glycerin löst sich das Präparat leicht. Aeusserlich ist das Chininhydrochlorat bei septischer Conjunctivitis und Keratitis in Collyrien (1:100) benutzt (Samelsohn).

9) **Chininum ferro-citricum**, Citras Ferri et Chinini; Eisenchinincitrat. — Die Phkp. lässt dieses Präparat so bereiten, dass 6 Th. Citronensäure, in 500 Th. Wasser gelöst, und 3 Th. Eisenfeile unter öfterem Bewegen 48 Std. im Wasserbade digerirt werden und dem zur dünnen Syrupsdicke abgedampften Filtrat nach dem Erkalten 1 Th aus 1,3 Chininsulfat durch Natronlauge frisch gefälltes Chinin zugefügt wird, nach dessen vollständiger Lösung die Flüssigkeit auf Glas oder Porcellanplatten ausgebreitet und allmähig zur Trockne gebracht wird. Es entstehen so glänzende, durchscheinende, dunkelrothbraune Lamellen von gleichzeitig bitterem und eisartigem Geschmacke, welche sich langsam in Wasser, aber in jedem Verhältnisse, schwierig in Alkohol lösen. Dieses Präparat, welches in 1,0 mindestens 0,09 Chinin enthalten muss, wird nur als Tonicum benutzt, ist aber unstreitig eine vorzügliche Combination von Chinin und Eisen, welche zu 0,1—0,3 gegeben bei chlorotischen Zuständen und besonders bei Neurosen auf anämischer Basis sich ausserordentlich gut bewährt. Man verordnet es in Pillen, Pulver oder in Lösung.

Das früher officinelle Chinintannat, *Chinium tannicum*, kommt im Handel als amorphes Pulver von bald ausgesprochener Bitterkeit, bald fast ohne Bitterkeit vor. Nach Jobst sind die durch geringe Bitterkeit ausgezeichneten Sorten entweder von sehr schwachem Chiningehalte (7,4%) oder enthalten vorwaltend Cinchonidin und Chinidintannat. Das früher officinelle *Chinium tannicum* enthielt 1 At. Chinin auf 3 Th. Gerbsäure und hat einen Procentgehalt von 22,72% Chinin, während chemisch reines neutrales Chinintannat 31,37% Chinin einschliesst. Trotz seiner Schwerlöslichkeit wird das Präparat im Darm resorbiert und durch die Nieren eliminirt, doch beginnt die Elimination erst später als die des Chininhydrochlorats (Kerner). Das zuerst von Berzelius und Ronander (1830) empfohlene Salz passt minder gut bei Intermittenten, gegen welche es besonders im kindlichen Lebensalter wegen seiner minder intensiven Bitterkeit gerühmt wurde (Trousseau), dagegen vortrefflich als Tonicum, zumal wo es sich darum handelt, beschränkt auf die Darmsecretion zu wirken, z. B. bei Diarrhoe der Phthisiker. Delieux rühmt es auch bei hektischen Schweissen; von Bourgogne wurde es gegen Cholera und epidemische Grippe empfohlen. Binz und Becker (1880) benutzten Chinintannat mit Erfolg bei Keuchhusten. Als Tonicum giebt man 0,05—0,12 mehrmals täglich in Pulver oder Pillen, als Antiperiodicum 1,0—3,0. Bei Cholera ist es sogar bis zu 30,0 gegeben. Bei Keuchhusten, wo übrigens die geschmackfreien Tannate besondere Beachtung verdienen, giebt man soviel Dgm. wie das Kind Jahre zählt. Empfehlend für das Chinintannat ist übrigens der Umstand, dass es vermuthlich in Folge der langsamen Resorption selbst in Dosen von 3,0 (Rabuteau) kein Ohrensausen hervorruft.

Früher war auch das baldriansaure Chinin, *Chininum valerianicum*, welchem man wegen seines Baldriansäuregehalts besondere Wirkung auf das Nervensystem zuschrieb, officinell. Das zuerst von Prinz Louis Lucien Bonaparte dargestellte, schön krystallisirende Salz fand bei typischen Neuralgien, Cardialgie, Epilepsie und Hemicranie, sowie in bösartigen Formen von Intermittens mit typhösem Charakter (Devay, Castiglioni), Lobredner. Nach Barbarotta wirkt es dreimal stärker als Chinincitrat. Devay gab bei Malariafiebern 0,3—1,0 in Pulver oder Pillen.

Neben diesen Chininsalzen sind noch eine grössere Zahl anderer Verbindungen des Chinins mit anorganischen und organischen Säuren oder mit beiden zugleich von verschiedenen Aerzten als Antiperiodica benutzt. Von unorganischen Chininsalzen nennen wir das iodwasserstoffsäure Chinin, *Chininum hydroiodicum*, welches bei einfacher und mit Scrophulose complicirter Intermittens (Mampedonia, Dowler), sowie äusserlich gegen Milzanschwellung (Righini) Gebrauch fand. In Frankreich hat auf die Empfehlung von Gubler (1875) das bromwasserstoffsäure Chinin, *Chininum hydrobromicum*, in den letzten Jahren als Antitypicum, Antipyreticum und Antineuralgicum viel Anwendung gefunden, da es innerlich zu 0,4—0,8 ausserordentlich gut tolerirt

wird und auch mit Zusatz von etwas Alkohol zu 10% Lösungen gebracht werden kann, welche subcutan wenig irritiren. Gubler empfahl das Salz besonders bei hysterischem Erbrechen, periodischen Neuralgien und Congestionen, Dardeenne bei perniciöser Intermittens und hämorrhagischer Intermittens. Das von Bischoff gegen adynamische Affectionen des Harnsystems vorgeschlagene salpetersaure Chinin, das als Tonicum und als vorzüglich gut vom Magen tolerirtes Chininsalz von Harless warm befürwortete phosphorsaure Chinin und das von Lawrence Smith bei Lungenphthise empfohlene unterphosphorigsaure Chinin, welches gleichzeitig die Wirkung des Chinins und der Hypophosphite besitzen sollte, reihen sich daran. Um die antitypische Wirksamkeit des Chinins zu erhöhen, hat man es mit Arsensäure und arseniger Säure verbunden. Das arsensaure Chinin, *Chininum arsenicum*, wollen Bourrières und Manfré gegen hartnäckige Wechselfieber, Fäye in zymotischen Krankheiten, besonders bösartigem Puerperalfieber, Apostolides bei Geisteskrankheiten mit Depression erfolgreich angewendet haben. Von den arsenigsauren Chininsalzen sind sowohl das neutrale arsenigsaure Chinin *Chininum arsenicosum* (Bertolini, Bacelli), als das saure arsenigsaure Chinin, *Chininum biarsenicum* (Kingdom), bei Intermittens, letzteres auch bei Neuralgien und Hautkrankheiten angewendet. Bei den letztgenannten Verbindungen ist jedenfalls grosse Vorsicht geboten, da nach Pinto die Hälfte der von Bacelli mit *Chininum arsenicosum* behandelten Malaria-kranken an chronischem Arsenicismus erkrankten. La Camera und Palombo wollen antimonsaures Chinin, *Chininum antimoniatum* s. *stibicum*, zu 0,1—0,2 4mal täglich bei Intermittens, Rheumatismus und Arthritis vorzüglich wirksam gefunden haben.

Noch zahlreicher sind die organischsauren Chininsalze, unter denen selbst stearinsaures und harnsaures Chinin nicht fehlen. Im Allgemeinen wird denselben eine mildere Wirkung auf den Magen zugeschrieben und darauf ein Vorzug vor dem Chininsulfat gegründet. Viele dieser Präparate, z. B. *Chininum citricum*, *Chininum hydrocyanicum*, *Chininum ferrocyanatum*, *Chininum aceticum*, *Chininum lacticum* und *bilacticum* haben ihre hauptsächlichste und fast ausschliessliche Anwendung in Italien gefunden, wo auch das sehr empfehlenswerthe sog. Chininsulfotartrat, *Chininum sulfurotartricum* s. *Sulfotartras Chinii*, zuerst von Bartella und Consolini benutzt wurde. Man stellt das letztere zweckmässig ex tempore durch Mischen gleicher Theile von Chininsulfat und Weinsäure dar. Nach Aran und Righini soll zur Heilung von Intermittenten bei Benutzung dieses Präparates nur halb so viel Chininsulfat nöthig sein wie ohne den Weinsäurezusatz. *Chininum bilacticum* und *Ch. formicicum* lassen sich ihrer Leichtlöslichkeit wegen zur Subcutaninjection benutzen, doch bedingt letzteres leicht örtliche Entzündung (Bernatzik). Kerner hat als rationell anzuwendendes Chininsalz das kohlen-saure Chinin, *Chininum carbonicum*, bezeichnet, indem die Resorption des Chinins, für welche die alkalische Beschaffenheit des Blutes ein Hinderniss darbietet, durch den Einfluss der freien und halbgebundenen Kohlensäure des Blutes unter Mitwirkung des bei dem Verdauungsprocesse resultirenden Antheils dieses Gases wesentlich unterstützt wird. Doch lässt sich diese Beförderung der Resorption auch durch Einnehmen anderer Chininsalze in Selterswasser bewerkstelligen. Das chinas-aure Chinin, *Chininum chinicum*, dem man besonders günstige Effecte aus dem Grunde zuschrieb, weil das Chinin in Verbindung mit Chinasäure in den Chinarinden sich findet, besitzt in Wirklichkeit keine Vorzüge vor andern Chininsalzen und ist wegen seines theueren Preises kaum verwendbar. Zu erwähnen ist noch das *Chininum carboolicum*, welches auf die Empfehlung von Bernatzik, der in dem Präparate besondere antiseptische Wirksamkeit vermuthete, von G. Braun bei Puerperalfieber und von Duchek bei Typhus anscheinend mit günstigem Erfolg angewendet wurde. Es lässt sich in Pillen zu 0,05—0,06 mehrmals täglich verordnen. Neben dem Chinin-carbolat ist auch das *Chininsalicylat*, *Chininum salicylicum*, bei Intermittens, putriden Affectionen und namentlich als Antipyreticum bei Pneumonie und Meningitis zu 2,0 intern oder in Clysmata (Maury, Brown) empfohlen. Ein vielbesprochenes modernes Salz ist auch das *Chininum amidato-bichloratum* (*Chininum bimuriaticum carbamidatum*), Chinin-harnstoff, das



sich namentlich zur Subcutaninjection besonders gut eignet und selbst zu 1,0 keine Nebenerscheinungen macht (Drygin, Jaffé).

Von den **Nebenalkaloiden** war früher das Cinchonin unter der Form des Cinchoninsulfats, Cinchoninum sulfuricum, officinell, an Stelle dessen von einzelnen Aerzten auch das Cinchonintannat, Cinchoninum tannicum, als Tonicum im Typhus, bei adynamischen Durchfällen der Phthisiker und bei chronischen Blenorrhoen verschiedener Organe zu 0,2 mehrmals täglich (Wucherer) benutzt wurde. Als Mittel gegen Intermittens hat das Cinchoninsulfat niemals so ausgedehnte Verwendung gefunden wie das Chininsulfat, ja es fehlt sogar nicht an Aerzten, welche dem Cinchonin alle antitypische Wirksamkeit absprechen. Es steht indessen durch ältere und neuere Erfahrungen fest, dass Intermittenten durch Cinchoninsulfat geheilt werden können, wenn man dasselbe in doppelt so grosser Dosis wie das entsprechende Chininsalz darreicht. Mehrere Aerzte (Nieuwenhuis, Stratingh, Mangold) verordnen das Cinchoninsulfat zusammen mit Chininsulfat und behaupten, dass man dadurch eine erhebliche Ersparung an Chinin bewerkstelligen könne, indem die gleiche Gewichtsmenge einer Combination von Chinin- und Cinchoninsulfat ebenso kräftig wirke wie die entsprechende Quantität von Chininsulfat. Man giebt Cinchoninsulfat meist in Pulverform, seltener in angesäuelter Lösung (Briquet). Bei Intermittens ist auch das reine Alkaloid wegen seines minder intensiv bitteren Geschmacks, weshalb es auch betrügerischer Weise in Nordamerika als Sweet Quinine in den Handel gebracht wurde, verhältnissmässig häufig angewendet.

Von den übrigen Chinaalkaloiden ist hauptsächlich das Cinchonidin (früher meist unter der Bezeichnung Chinidin im Handel) therapeutisch benutzt und hat namentlich als Sulfat bei Intermittens viele Lobredner gefunden (Cullen, Spitzner und Wunderlich, Picoock, Clarus, De Bordes, Schroff und Eisenstein), doch steht es dem Chininsulfat nach neueren Erfahrungen in Ostindien nach, wodurch die Angabe von Reuling und Salzer, dass 6 Th. Cinchonidin 4 Th. Chinin gleichständen, sich bewahrheitet. Nach den Untersuchungen von Bernatzik ist Cinchonidinsulfat auf Thiere von gleicher, vielleicht noch etwas stärkerer Giftigkeit als das Chininsulfat. Als Antitypicum dürfte sich die Dosis von 1,0, in Pulverform kurz vor dem Anfälle gereicht, empfehlen. An Stelle des Sulfats sind eine Reihe von anderen Salzen (Bisulfat, Aethylsulfat, Hydrobromat) besonders zur Subcutaninjection empfohlen, doch bedingen alle diese Salze nach Gubler, mit Ausnahme des Cinchonidinium hydrobromicum, das in 20 % Lösung durchaus keine Irritation bedingen soll, leicht Abscedirung der Einstichstelle.

Das aus dem Cinchonidin sich bildende Cinchonicin hat sich bei Intermittens (Forget, Briquet) und acutem Rheumatismus (Taylor, O. Rees) als dem Chinin ausserordentlich nachstehend und sehr leicht die Verdauung störend erwiesen. Das Chinidin (Conchinin) hat sich als Antitypicum (Macchiavelli, Newton) und Antipyreticum (Strümpell, Ziemssen) dem Chinin ziemlich gleichwerthig erwiesen; doch ist dies Nebenalkaloid in den Chinarinden in zu geringen Mengen vorhanden, um dem Hauptalkaloide Concurrenz zu machen. Grosse antipyretische Gaben bewirken relativ selten Ohrensausen, dagegen häufig Erbrechen, das jedoch die therapeutische Wirkung nicht stört (Strümpell), bei Kindern Collaps und Oedeme (Steffen).

**10) Chinoidinum, Chinioidinum; Chinoidin.** Zu den bei Wechselfieber vielfach benutzten Präparaten der Chinarinden gehört auch das sog. Chinoidin, ein bei der Bereitung des Chins durch Ausfällen der dunklen Mutterlauge mit Ammoniak resultirendes Product, welches ein Gemenge von amorphen Umwandlungsproducten der Chinbasen, Cinchonin, etwas unverändertem Chinin und Harz (Winckler) oder nach van Heyningen und De Vrij ein solches von 50—60 % Chinidin, 6—8 % Cinchonin, 3—4 % gewöhnlichem Chinin, 29—41 % einer besonderen, nur unkrystallisirbare Salze bildenden, nicht mit Chinin identischen Base und einer gewissen Menge durch den Einfluss der Luft entstandener, schwarzbrauner Oxydationsproducte ist. Das Chinoidin des Handels stellt eine braune oder schwarzbraune, harzige Masse dar, welche einen glänzenden, muschligen Bruch und einen sehr bitteren Geschmack besitzt, sich wenig in

Wasser, leicht und fast vollständig in Weingeist, Chloroform und angesäuertem Wasser löst, und wenn es nicht absichtlich verfälscht wurde, auf dem Platinblech ohne Rückstand verbrennt. Der Umstand, dass je nach der Anwendung verschiedener Chinarinden zur Darstellung der Chinaalkaloide das aus der Mutterlauge in der oben angegebenen Weise erhaltene Präcipitat eine sehr variable Zusammensetzung zeigen muss, und dass ausserdem nicht selten Verfälschung mit Harzen, z. B. Kolophonium, stattfindet, so dass die käufliche Waare 50% Verunreinigungen (De Vrij) enthalten kann, lässt das Präparat als ein in seiner Wirksamkeit sehr verschiedenes erscheinen und erklärt die Widersprüche, welche bezüglich der Heilwirkung des Chinoidins in der Literatur sich finden. Derselbe rechtfertigt auch die Versuche, aus dem Chinoidin die oben erwähnte amorphe Base rein darzustellen und als solche oder in Verbindung mit Säuren in Form von Salzen als billiges Surrogat des Chinins zu versuchen. Dieses gereinigte Chinoidin kommt unter der Bezeichnung *Chinoidinum purissimum* oder *Chininum amorphum* in den Handel.

Das gewöhnliche Chinoidin ist schon vor seiner Entdeckung durch Serturner (1829) als sog. *Resina Chinae praeparata* und als *Chininum resinoso-sulfuricum* oder *Residuum resinosis Chinini* von verschiedenen Aerzten (Thiel, Gruner, Chapman, Thuessink) bei Intermittens gebraucht und hat später in vielen deutschen und italienischen Aerzten begeisterte Lobredner gefunden, welche es, wie namentlich Diruf, als Heilmittel bei typischen Affectionen dem Chinin gleichstellen und es wegen seines billigen Preises und wegen des seltenen Auftretens von Nebenerscheinungen ganz an Stelle dieses Alkaloids gesetzt wissen wollen. Freilich fehlt es auch nicht an Stimmen, welche die Unzuverlässigkeit des Mittels hervorheben (Leubuscher) und wir selbst haben bei der Behandlung frischer Wechselfieber mit unreinem Chinoidin keine besonderen Erfolge erzielt, haben dasselbe dagegen nicht selten nach vorheriger Beseitigung des Fieberanfalls durch Chinin verordnet und danach rasche Abnahme der Milzanschwellung eintreten gesehen, die nur bei bedeutendem Grade der Schwellung keine Beseitigung durch das Mittel erfuhr. Dass ein Theil der Misserfolge sich aus den erwähnten Verfälschungen des Präparates erklärt, scheint uns nicht zweifelhaft.

Die Darreichung des Chinoidins geschieht am zweckmässigsten in Gestalt der officinellen *Tinctura Chinoidini*, *Chinoidintinctur*, einer filtrirten Lösung von 10 Th. Chinoidin in 85 Th. Spiritus und 5 Th. Salzsäure. Man lässt von dieser rothbraunen Tinctur 2—4mal täglich einen Theelöffel voll in Rothwein oder Zucker nehmen. Diruf verordnete dieselbe gewöhnlich 3mal täglich zu 20 bis 60 Tropfen in der Apyrexie und liess kurz vor dem Anfälle die doppelte Dosis nehmen. Das Präparat ersetzt frühere Formeln von Natorp (mit *Elixir acidum Halleri*) und Dreyer (Lösung in *Spiritus aethereus*) vollkommen. Man kann nach dem Vorgange von Rademacher in der Tinctur noch eine dem Chinoidingehalte gleiche Menge von Chininsulfat oder Chininhydrochlorat auflösen, wodurch die Wirksamkeit natürlich erhöht wird. Nach Franke ist bei hartnäckigen Quartanen Verbindung mit *Belladonnaextract* von günstigem Erfolge; Andere empfehlen Combination mit *Opium* (Maratos und Vastas). Ausser in Lösung kann auch das Chinoidin als Substanz in Pulvern oder Pillen verordnet werden; Diruf gab dasselbe auch zu 1,5—2,5 im Clysma. Im Allgemeinen reichen 4,0 zur Heilung von Intermittens aus. Nach Diruf besitzt Chinoidin auch gleiche tonisirende Wirkung wie Chinin und kann zu 0,2—0,4 pro dosi bei Schwächezuständen aller Art verordnet werden.

Das *Chinoidinum purissimum* (*Chininum amorphum*) ist sowohl als solches, wie in Verbindungen mit Säuren vielfach in Anwendung gekommen und scheint namentlich in Form des *Chinoidinum hydrochloricum* (Bernatzik, Kerner) und des *Chinoidinum citricum* (Jobst, Machiavelli, Hagens) der verbreitetsten Benutzung bei Wechselfieber werth, zumal da die physiologischen Effecte vollständig mit dem des krystallisirten Chinins gleich sind und letzteres im Organismus sich theilweise in amorphes Chinin umwandelt (Binz, Kerner). Nach Löbl sind indessen nur 10 Th. Chinoidin als *Antipycicum* 6 Th. Chininsulfat gleichwerthig, aber selbst bei diesem Verhältnisse sind die billigen Chinoidinsalze sehr empfehlenswerth. Vom *Chinoidincitrat*, welches 95—113mal billiger als die gebräuchlichsten Chininsalze ist, genügt in leichten Fällen stets

1,0—2,0 pro die, in älteren 2,5—3,0 zum Coupiren der Anfälle (Hagens). Im Keuchhusten hat sich sowohl das Hydrochlorat (Hesse) als das Tannat (Binz) bewährt. Das Chinoidinum purissimum lässt sich in Pulverform (nach Bernatzik) mit Zusatz der Hälfte Weinsäure oder in Pillen geben. Von den durch starke Hygroskopicität ausgezeichneten Chinoidinsalzen eignet sich nur das chinovasäure Chinoidin zur Pulverform; während die übrigen in Pillen oder in Lösung gegeben werden müssen. Den kratzenden, an Theer erinnernden Geschmack des Chinoidincitrats verdeckt man am besten mit gleichen Theilen eines zum trocknen Extracte eingeengten Extractum Absinthii und Zusatz von  $\frac{1}{2}$  Weinsäure oder  $\frac{2}{5}$  Citronensäure (Hagens). Die C. Zimmerschen Chinaalkaloide in Pillenform bestehen aus einem extractförmigen Chinoidinum sulfuricum und Cinchonin; jede Pille entspricht nach Kerner dem Wirkungsverthe von 0,06 Chininsulfat. Zur Subcutaninjection eignen sich Chinoidinsalze trotz ihrer grossen Löslichkeit in Wasser nicht, da die Einstichsstellen sich leicht entzünden und selbst brandig werden.

Von nicht alkaloidischen reinen Chinastoffen empfahl Kerner den chinovasäuren Kalk, *Calcaria chinovica*, als Mittel gegen Dysenterie, innerlich zu 0,1—0,5 in Pulverform (mit Zucker oder Calciumphosphat fein zerrieben) oder im Klystier (zu 8,0—25,0 mit 150,0—180,0 Aq. dest. unter Zusatz von etwas Tragantenschleim fein verrieben, wozu allmählig so viele Tropfen Phosphorsäure zugetröpfelt werden, bis schwachsaure Reaction eintritt und Kalk und Chinovasäure in fein vertheilter Form ausgeschieden sind.)

## Verordnungen:

1)  $\mathcal{R}$   
*Corticis Chinae*  
*Carbonis pulverati*  $\overline{\text{aa}}$  100,0  
*M. f. pulv. D. S.* Streupulver. (Bei putriden und brandigen Geschwüren.)

2)  $\mathcal{R}$   
*Corticis Chinae* 20,0  
*Carbonis pulverati* 5,0  
*M. f. pulv. D. in scatula. S.* Zahnpulver.  
 (Pulvis dentifricius niger Ph. Hann.)

3)  $\mathcal{R}$   
*Corticis Chinae* 10,0  
*Ligni Santali rubri* 15,0  
*Olei Caryophyllorum*  
 — *Bergamottae*  $\overline{\text{aa}}$  gtt. 6  
*M. f. pulv. D. in scatula. S.* Zahnpulver. (Pulvis dentifricius Hufelandi.)

$\mathcal{R}$   
*Corticis Chinae* 25,0  
*Acidi hydrochlorici diluti* 5,0  
*Coque c. Aq. comm. q. s. ad colat.*  
 200,0, cui adde  
*Syrupi Cinnamomi* 25,0  
*M. D. S.* Dreistündlich 1—2 Esslöffel voll. (Zur Nachcur bei Intermittens, als Tonicum.)

4)  $\mathcal{R}$   
*Extracti Chinae spirituosii* 2,5  
*Medullae ossium bovis* 25,0  
*Mixturae odoriferae* 1,0

*M. f. ungt. pomadinum.* (Chinapomade zur Stärkung des Haarwuchses.)

5)  $\mathcal{R}$   
*Extracti Chinae spirituosii* 3,0  
*Aquae Aurantii florum*  
 — *Cinnamomi*  
*Syrupi Aurantii corticis*  $\overline{\text{aa}}$  30,0  
*M. D. S.* Esslöffelweise halbstündlich.  
 (Bei Wehenschwäche. Monteverdi.)

6)  $\mathcal{R}$   
*Chinini sulfurici*  
*Pastae Cacao saccharatae*  $\overline{\text{aa}}$  1,0  
*M. f. pulv. D. S.* Die Hälfte 6, die andere Hälfte 3 Stunden vor dem Anfälle zu nehmen. (Bei Intermittens.)

7)  $\mathcal{R}$   
*Chinini sulfurici*  
*Acidi tartarici*  $\overline{\text{aa}}$  0,5  
*Aq. Foeniculi* 120,0  
*Syrupi Cinnamomi* 30,0  
*M. D. S.* Stündlich 1 Esslöffel voll.  
 (Bei Quartana in der Apyrexie. Bartella.)

8)  $\mathcal{R}$   
*Chinini tannici* 2,0  
*Pulv. Cacao tost.*  
*Sacchari*  $\overline{\text{aa}}$  10,0  
*M. f. pulv. Divide in part. aeq. No. 20.*  
*S.* Dreimal täglich ein Pulver. (Als Tonicum bei Phthisis u. s. w.)



- |   |   |
|---|---|
| <p>9) R<br/> <i>Chinini ferro-citrici</i> 3,0<br/> <i>Extracti Valerianae</i> 5,0<br/> <i>Pulv. rhizom. Calami</i> q. s.<br/> <i>ut f. pilul. No. 60. Consp. pulv. Cin-</i><br/> <i>nomomi. D. S. Dreimal täglich 3</i><br/> <i>Stück zu nehmen. (Bei Neuralgien</i><br/> <i>auf anämischer Grundlage.)</i></p> | <p>10) R<br/> <i>Chinini hydrochlorici</i> 2,0<br/> <i>Tincturae Chinoidini</i> 20,0<br/> <i>M. D. S. Viermal täglich 50 Tropfen.</i><br/> <i>(Als Nachcur bei Quartanen und</i><br/> <i>bei zurückbleibender Milzhypertrophie</i><br/> <i>nach Intermissus überhaupt.)</i></p> |
|---|---|

**Anhang.** Surrogate der Chinaalkaloide. Der verhältnissmässig theuere Preis des Chinins erklärt die vielfachen Bestrebungen, ein sicheres Ersatzmittel desselben in der Behandlung intermittirender Krankheitsprocesse aufzufinden. Leider ist es bisher nicht geglückt, ein mit derselben Sicherheit antitypisch wirksames Medicament zu entdecken. Am nächsten steht dem Chinin unstreitig das Bebeerin (Bibirin), ein aus der als Färbemittel benutzten Bebeerurinde, der Rinde eines in Guyana vorkommenden Baumes aus der Familie der Laurineen, *Nectandra Rodiaei* Schomb., dargestelltes Alkaloid, welches als Sulfat (*Bebeerinum sulfuricum*) namentlich in England bei Intermissus Anwendung gefunden hat und zu 1,0—2,0 pro die Wechselfieber sicher heilen soll (Douglas, MacLagan, Bennett). Auch als Tonicum und bei scrophulösen Ophthalmien ist es nach Art des Chininsulfats in kleinen Dosen (zu 0,06—0,12) benutzt. Bei Intermissus fehlt es übrigens nicht an Misserfolgen (Blair, Becquerel, Clarus), welche vielleicht durch Anwendung eines unreinen Präparats sich erklären. Nach Binz und Conzen wirkt Bebeerinsulfat auf niedere Organismen, weisse Blutkörperchen und Fäulnisprocesse qualitativ und quantitativ in gleicher Weise wie Chinin und hat auch auf höhere Thiere toxische Action (zu 0,05—0,8 innerlich bei Hunden), indem es Erbrechen, Mattigkeit, Schwindel, Durchfall, Stuhl drang und Zittern bedingt. Golding Bird und Powell behaupten, dass nach Bebeerin der Harnstoffgehalt des Urins steige (?). Eine grössere Bedeutung für die Therapie des Intermissus würde das Bebeerin ohne Zweifel erringen, wenn sich die Annahme als richtig herausstellte, dass das in dem in Europa einheimischen *Buxus sempervirens* L. enthaltene und Buxin genannte Alkaloid identisch mit Bebeerin sei. Das Buxin wurde schon 1857 von Vitali für den bedeutendsten Rivalen des Chinins erklärt, das selbst bei protrahirten Fällen und bei Intermissus perniciosus Anwendung verdiene, und neuere Erfahrungen (Tibaldi, Buzzoni und Mazzolini) sprechen für dessen Anwendung. Man giebt das Mittel zu 1,2—1,5, im Nothfalle auch in der doppelten Menge, in getheilten Gaben von 0,12—0,15, doch bedingen selbst diese kleinen Einzeldosen bisweilen Magen- und Leibschmerzen, Durchfall und Erbrechen, auch Schwindel, Ohrensausen, Kopfschmerz, jedoch minder intensiv als Chinin.

Weniger Bedeutung als Antitypica besitzen einige neuerdings aus afrikanischen Fiebermitteln isolirte Bitterstoffe, so das Cailcedrin aus der Rinde von *Swietenia Senegalensis* Desr., das Adansonin aus der Rinde des Baobab, *Adansonia digitata* L. u. a. m.

Durch das Verdienst F. v. Müllers ist die Aufmerksamkeit der Aerzte auf die fieberwidrigen Wirkungen der Blätter einer australischen Myrtacee, *Eucalyptus globulus* Lab., hingewiesen worden. Schon die Ausdünstungen des durch riesenhaften Wuchs ausgezeichneten Baumes sollen in Fiebergegenden vor dem Auftreten von Intermittenten schützen, weshalb dieselben auch in Italien, Corsica und Südfrankreich auf sumpfigem Boden angepflanzt wurden. Man empfiehlt selbst den Anbau in Zimmern zur Reinigung der Luft. Der Hauptbestandtheil der *Folia Eucalypti* ist ein ätherisches Oel, in welchem ein als Eucalyptol bezeichneter, sauerstoffhaltiger, bei 170° siedender, in Wasser wenig, dagegen vollständig in Alkohol löslicher Stoff, und ein mit dem Namen Eucalypten belegter Kohlenwasserstoff enthalten sein sollen (Cloëz). Faust und Homeyer erklärten das Eucalyptol für eine Mischung von Terpen und Cymol, doch giebt dasselbe beim Durchgang durch den Körper keine Cuminsäure (H. Schulz). Neben dem Oel finden sich in der Droge noch Harz und

Gerbstoff, dagegen kein Alkaloid. Halbtrockne Blätter können 6% Eucalyptol liefern. Schon Binz und Gimbert wiesen die hohe antiseptische Wirkung des Eucalyptusöls nach, welche nach H. Schulz die der Carbolsäure und des Chinins übertrifft. Auch die weissen Blutkörperchen werden bei Zusatz von  $\frac{1}{10}\%$  Eucalyptusöl ihrer amöboiden Bewegungsfähigkeit beraubt und nehmen dasselbe Aussehen wie bei Chininzusatz an (Mees, H. Schulz). Auch die Entzündung des Frochmesenteriums wird vom Eucalyptusöl durch Behinderung der Auswanderung weisser Blutkörperchen beschränkt (Mees). Eucalyptusöl wirkt bei Einführung in den Organismus stark verkleinernd auf die Milz (Schläger). Die Elimination des Oels geschieht vorzugsweise durch die Lungen und den Darmcanal, weniger durch Haut und Nieren. Die Ausscheidung erfordert 2—3 Tage, während deren die Expiration den charakteristischen Geruch des Oels besitzt, während im Harn Veilchengeruch auftritt. Bei Kalt- und Warmblütern setzt es in starken Dosen Reflexthätigkeit, Athmung und Herzthätigkeit durch directe Beeinflussung des Rückenmarks, des Athmencentrums und der im Herzen belegenen Ganglien herab; der Blutdruck sinkt und bei Warmblütern erfolgt constant, vielleicht mit Ausnahme von subcutaner Injection (Schläger), Abnahme der Temperatur. Frisches Oel wirkt auf die äussere Haut stark irritirend, altes weniger. Auf die Magenschleimhaut ist es weit weniger hyperämisirend. Auf Wundflächen übt es eine geringe Reizung aus. Bei Menschen erzeugt Eucalyptusöl zu einigen Tropfen innerlich Kältegefühl im Munde, Oesophagus und Magen, zu 1,0—2,0 Brennen und Schmerz im Magen; nach 10—20 Tropfen resultirt anfangs Pulsbeschleunigung und Aufregung, auf welche niemals ein Zustand von Torpidität, sondern stets Heiterkeit des Gemüths und ruhiger Schlaf folgt, und bei öfterer Wiederholung solcher tritt an die Stelle der Aufregung Ruhe mit Abnahme der arteriellen Spannung und selbst mit geringem Sinken der Temperatur. Nach sehr grossen Dosen tritt bei Menschen Temperaturabfall von  $1-1\frac{1}{2}^{\circ}$ , häufigeres und tieferes Athmen, Pulsverlangsamung und ein asthenischer Zustand mit Abnahme der Reflexaction und Schlafneigung ein. Das Eucalyptol ist verhältnissmässig wenig giftig und bringt selbst zu 80 Tropfen nur vorübergehende Congestionen zum Kopfe bei erhaltener Besinnung hervor; doch giebt es Individuen, welche schon durch 10—20 Tropfen nicht unerheblich collabiren. Schulz nahm 18,0 frisch bereitetes Oel im Laufe von 2 Tagen ohne schädliche Wirkung. Im Wesentlichen haben somit Eucalyptusöl und Eucalyptol die Wirkung aller ätherischen Oele, unter denen sie jedoch durch ihren Einfluss auf die Leucocyten und die Milz und durch ihre intensive antiseptische Wirkung, welche auch bei Thieren nach Einspritzung putriden Stoffe constatirt wurde (Mees, Schulz), eine Sonderstellung einnimmt. Leider haben sich die Erwartungen, welche man nach den Empfehlungen von Ullersperger und Lorinser von der antitypischen Wirksamkeit hegte, keineswegs bewahrheitet, indem meist negative Resultate erhalten werden. Dagegen kann Eucalyptus einerseits als Excitans, andererseits als Diaphoreticum und als secretionsbeschränkendes Mittel mit Vortheil benutzt werden. Bell empfahl das Mittel bei Magenaffectionen, besonders bei Atonie und Cardialgie, Aguilar bei Tripper und Blasenkatarrhen, Rodolfi das Kauen trockner Blätter als Abortivmittel des Schnupfens. Aeusserlich hat man dasselbe bei atonischen Geschwüren (Demarquay, Aguilar) und zum Ersatze der Carbolsäure zur Wundbehandlung überhaupt empfohlen. Zum internen Gebrauche können die Folia Eucalypti zu 2,0—6,0 in Pulverform oder im Aufguss dienen. Man benutzt die Blätter auch als Cataplasma zum Bedecken von Geschwüren und Wunden (Aguilar) oder gekaut (bei Coryza oder chronischer Stomatitis) oder geraucht (bei Asthma und chronischer Bronchitis) oder im Infus (1:10) zu Injectionen, Klystieren, Mund- und Gurgelwässern. Am gebräuchlichsten ist sowohl zum externen und zum inneren Gebrauche die Tinctura Eucalypti, welche man äusserlich zum Verbands von Geschwüren (Demarquay) und zum Besprengen von Krankensälen zum Zwecke der Desinfection und innerlich gegen Wechselfieber (mehrmals täglich 1 Esslöffel voll) empfahl. Das Eucalyptusöl verordnete Gimbert innerlich zu 5—10—20 Tropfen in Kapseln während der Mahlzeit, auch im Klystier mit Gummi emulgirt, zu reizenden Einreibungen als Liniment (mit 5 Th. Olivenöl oder mit  $1\frac{1}{2}$  Th. Glycerin, 2 Th. Seife und  $6\frac{1}{2}$  Th. Spiritus). Zum Wundverbande lässt es sich direct auf Wunden appliciren oder in Form einer 0,2—0,3% Wasseremulsion

zum Tränken des Verbandmaterials oder zur Ausspülung von Wundhöhlen verwenden. Siegen empfahl Eucalyptusölgaze, welche jedoch nach den Erfahrungen von Busch zu irritierend wirkt, um zum Listerschen Verbandsgebrauch werden zu können.

Von einheimischen Mitteln, welche als Chininsurrogate gelten, ist eine grössere Anzahl schon unter den bitteren Mitteln abgehandelt. Besondere Erwähnung verdient noch das aus verschiedenen Rinden bei uns einheimischer Weidenarten dargestellte Glykosid Salicin, welches auch in einzelnen Species der Gattung *Populus* sich findet. Das Salicin ist durch starke Bitterkeit ausgezeichnet, steht aber sowohl in dieser Beziehung als in seinem deleteren Einflusse auf Infusorien, als ferner in Bezug auf Hemmung von Gährung und Fäulniss weit unter dem Chinin (Binz und Herbst). Vor dem Chinin hat es den Vortheil, dass es auch in sehr hohen Dosen keinerlei Intoxicationsphänomene bedingt und selbst zu 220,0 in 3 Wochen genommen werden kann, ohne andere Erscheinungen als Flimmern vor den Augen und etwas Ohrenklingen zu bedingen (Ranke). Indessen können mehrere stündliche Gaben von 2,0 bei Kindern ausser Ohrensausen und Schwerhörigkeit auch Muskelschwäche, Tremor, leichte spasmodische Zuckungen, grosse Irritabilität bei Berührung, Dyspnoe und Pulsbeschleunigung hervorrufen (Ringer und Bury). In physiologisch-chemischer Beziehung ist von Interesse, dass dasselbe im Organismus in mannigfacher Weise verändert wird, so dass, während bei kleinen Dosen im Harn gepaarte Schwefelsäure auftritt, nach grossen Gaben in demselben neben unzersetztem Salicin sich Saligenin, salicylige Säure, Salicylsäure und vielleicht auch Salicylsäure finden. Beim Menschen ist Salicylsäure nach 1,5–2,0 schon in 15–20 Min. im Harn nachweisbar (Senator). Die Erfahrungen über die Wirksamkeit des Salicins bei Intermittenten, wo dasselbe am zweckmässigsten zu 2,0–4,0 gereicht wird, sind sehr widersprechend, vielleicht eignet es sich besonders zur Nachcur, da es rasch Verkleinerung der Milz bedingt. Auch als Stomachicum bei Dyspepsie und bei chronischen Katarrhen verschiedener Schleimhäute ist Salicin in kleinen Dosen angewendet. MacLagan empfahl Salicin zu 0,9 dreistündlich bei Gelenkrheumatismus, Senator versuchte dasselbe als Antipyreticum im Typhus und anderen Krankheiten, doch ist der antipyretische Effect im Typhus nie so gross wie beim Natriumsalicylat, dagegen macht es weder Erbrechen noch Collaps und eignet sich daher besonders gut für fiebernde Phthisiker, bei denen es häufig auch bestehende Durchfälle günstig beeinflusst. Zur Erzielung antipyretischer Effecte sind meist 8,0–10,0 pro die erforderlich. Als Amarum giebt man 0,1 bis 0,3 pro dosi in Pulver oder Pillen; Connay wendet es zu 0,2–0,5 als Kehlkopfpuhlver eingeblasen bei Diphtheritis an. Auch die salicinhaltigen Rinden verschiedener einheimischer Weidenbäume, *Salix fragilis* L., *S. pentandra* L., waren früher als *Cortex Salicis officinell* und wurden wegen ihres Gehaltes an Gerbsäure und Salicin besonders äusserlich in Abkochung bei Geschwüren nach Art der Chinarinde verworther.

Von andern einheimischen Antitypica nennen wir die Rosskastanienrinde, *Cortex Hippocastani*, welche früher in Abkochung zu 15,0–30,0 pro die in besonderem Rufe als Chinasurrogat stand und ihre Wirksamkeit einem eigenthümlichen, als Aesculin bezeichneten Glykoside von bitterem Geschmacke, dessen wässrige Lösung sich durch ihre stark blaue Fluorescenz auszeichnet, verdankt. Nach Mouchon und Durand heilt letzteres zu 1,0 Sumpffieber, welche dem Chinin widerstehen, nach Monvenoux bewährt es sich gleich sicher bei typischen Neuralgien. Auch den Rinden der südeuropäischen Steinlinde, *Philyrea latifolia* L., desgleichen unserer einheimischen Esche, *Fraxinus excelsior* L., wird antitypische Wirksamkeit vindicirt.

Zu den antipyretischen und antitypischen Stoffen ist auch das Chinolin zu stellen, auf dessen antifermentative, antiseptische und fieberwidrige Wirkungen Donath (1881) hinwies. Sowohl das aus Chinoidin dargestellte als das durch Erhitzen eines Gemenges von Anilin, Nitrobenzol, Glycerin und Schwefelsäure gewonnene Chinolin (Biach und Loimann) bewirken bei Kaninchen in nicht toxischen Dosen starke Herabsetzung der Temperatur und Athemfrequenz, in toxischen Dosen Mattigkeit, Herabsetzung der Reflexerregbarkeit, Dyspnoe, Lähmung und Collaps. Chlorwasserstoffsäures Chinolin verhindert in 0,2% Lösung die Fäulniss des Harns und des Leims, sowie Milchsäuregährung, in



0,4 % auch die Fäulniß des Blutes, dessen Gerinnungsfähigkeit 1 % Solution vollständig vernichtet. Es ist ein sehr energisches Bacteriengift, beeinflusst dagegen die alkoholische Gährung nur unbedeutend. Von Menschen werden 1,0 bis 4,0 pro die ohne Nebenerscheinungen genommen. In den Harn scheint es nicht überzugehen. Ein antipyretischer Effect beim Typhus ist nach den bisherigen Erfahrungen von Sakowsky und Jaksch nicht ganz in Abrede zu stellen, obschon es in anderen ganz wirkungslos bleibt (Brieger, Nahmacher), ebenso wirkt es mitunter bei Wechselfiebern günstig, ohne auch in grösseren Dosen Ohrensausen zu bedingen, doch steht es dem Chinin in Wirksamkeit nach. Sehr günstige Erfolge wurden neuerdings bei Diphtheritis erhalten (Schreiber). Man wendet meist nicht das Chinolin selbst, welches ein wasserhelles, dünnflüssiges, scharf und bitter schmeckendes und penetrant riechendes Oel bildet, sondern das weinsaure Chinolin, *Chinolinum tartaricum*, eine in feinen, farblosen Nadeln von pfefferminzähnlichem Geschmacke und Bittermandelgeruche krystallisirende Verbindung, an, welches man Erwachsenen zu 0,5—2,0 2—3mal täglich in Oblaten darreicht. Bei Kindern giebt man eine Mixtur von *Chinolinum tartaricum* 1,0 und Aq. dest. und Syr. simpl.  $\overline{aa}$  50,0. Subcutan injicirt wirkt salzsaures Chinolin (1:10) intensiv reizend (Jaksch). Auch *Chinolinum tartaricum* ist nicht ganz ohne reizende Wirkung und führt selbst bei kleinen Dosen zu Nausea (Brieger).

## 2. Ordnung. Antipyretica pura, reine Fiebermittel.

Die Ordnung der reinen Fiebermittel umfasst zunächst eine Anzahl von Säuren, welche in Bezug auf ihre entfernte Wirkung mit den unter den Caustica abgehandelten Mineralsäuren im Wesentlichen übereinstimmen, ohne deren ätzende Wirkung zu besitzen. Ihre Lösungen fallen Hühnereiweiss nur bei Zusatz von Kochsalz oder andern Neutralsalzen. Allen diesen antipyretischen Säuren kommt herabsetzende Wirkung auf die Herzaction und die Körpertemperatur zu. Vor den übrigen Antipyretica zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie in vorzüglicher Weise gegen ein bei fieberhaften Zuständen unangenehmes Symptom, den Fieberdurst, einwirken, doch beschränkt sich ihr Effect nicht hierauf allein, wie man eine Zeit lang anzunehmen geneigt war.

Die hier abzuhandelnden organischen Säuren (Weinsäure, Citronensäure) und einzelne andere ihnen in ihrer Wirkung gleichkommende (Apfelsäure) bilden den wesentlichsten Bestandtheil einer Anzahl säuerlich süsser Früchte, welche gewöhnlich unter der Bezeichnung Obst zusammengefasst werden und von denen einzelne zur Darstellung angenehm schmeckender, süss-säuerlicher Syrupe und kühlender Getränke ausgedehnte Verwendung finden.

Die drei hauptsächlich in den verschiedenen Obstarten vertretenen Säuren, Weinsäure, Citronensäure und Apfelsäure, finden sich theils an Basen gebunden, theils frei. Neben denselben enthält das Obst Pectinkörper, auf deren Vorhandensein die Verwendung verschiedener Früchte zur Darstellung von Gelées beruht, Traubenzucker und Fruchtzucker, Proteinverbindungen und flüchtige Bestandtheile, welche das Aroma der einzelnen Fruchtsorten bedingen, übrigens in ihrem chemischen Verhalten wenig gekannt sind. Der Proteingehalt des Obstes ist so gering, dass, wenn wir danach seinen Nahrungswerth bemessen, etwa 1 Pfd. Kirschen, 2 Pfd. Erdbeeren und  $2\frac{1}{4}$  Pfd. Aepfel den Nährwerth eines Hühnereies repräsentiren. Auch der Gehalt an löslichen Kohlehydraten ist ge-

ring, so dass 1 Pfd. Stärkemehl, das etwa in  $5\frac{1}{2}$  Pfd. Kartoffeln enthalten ist, seinen Ersatz in 5,4 Pfd. Trauben, 6,7 Pfd. Kirschen oder Aepfel, 7,8 Pfd. Zwetschen, 10,8 Pfd. Johannisbeeren, 12,3 Pfd. Erdbeeren und 12,0 Pfd. Himbeeren findet (Fresenius). Dieser geringe Nährwerth des Obstes macht es erklärlich, dass der curmässige Gebrauch desselben mitunter Günstiges bei Plethora abdominalis leistet, wobei die organischsauren Salze durch gelinde Bethätigung des Stuhlgangs die Wirkung unterstützen. Der reichliche Genuss von Früchten mit derberem Fleische kann Magenbeschwerden und Koliken hervorbringen, weshalb bei reizbarem Magen der Gebrauch rohen Obstes zu widerrathen und nur der Genuss weichgekochter Früchte oder von Abkochungen derselben, wie sie in den Obstsuppen und Obstgelees gegeben sind, erlaubt ist. Bei manchen Personen geben Erdbeeren, Himbeeren und schwarze Johannisbeeren in auffallender Weise zum Entstehen von Urticaria Veranlassung. Der Gehalt der einzelnen Obstsorten an freier Säure variirt in einzelnen Sorten und in einzelnen Jahrgängen sehr; unter dem Einflusse günstiger Witterung tritt Verminderung der Säure und Zunahme des Zuckers ein. Nach Fresenius beträgt der Durchschnittsgehalt an freier Säure bei Johannisbeeren 2,04 %, bei Maulbeeren 1,86 %, bei Himbeeren 1,48 %, bei Erdbeeren 1,31 %, bei Sauerkirschen 1,28 %, bei Brombeeren 1,19 %, bei Zwetschen 0,89 %, bei Aepfeln 0,75 %, bei Süsskirschen 0,62 % und bei Birnen 0,07 %. Der Wohlgeschmack des Obstes wird hauptsächlich bedingt durch das relative Verhältniss von Säure und Zucker zu einander, wobei indess zu bemerken ist, dass die Anwesenheit von Gummi und Pektinstoffen auch ein ungünstiges Verhältniss zwischen Säure und Zucker verdecken kann. So schmecken z. B. Himbeeren süsser als Johannisbeeren, ob schon bei ersteren diese Säure zum Zucker wie 1:2,7, bei letzteren wie 1:3 sich verhält, weil die Pektinstoffe in den Himbeeren in weit reichlicherem Maasse sich finden. Das mittlere Verhältniss zwischen Säure und Zucker ist nach Fresenius bei Brombeeren 1:3,73, Heidelbeeren 1:4,31, Walderdbeeren 1:4,37, Maulbeeren 1:4,94, Sauerkirschen 1:6,85, Zwetschen 1:7,03, Aepfeln 1:11,16, Süsskirschen 1:17,29, Birnen 1:94,60. Auch das Verhältniss zwischen löslichen Stoffen, unlöslichen Stoffen und Wasser ist von Einfluss auf Geschmack und Verdaulichkeit, indem davon die Weichheit und Saftigkeit des Obstes abhängt.

Die medicinisch in reinem Zustande nicht verwendete Apfelsäure oder Aepfelsäure, *Acidum malicum*,  $C^4H^6O^5$ , ist die verbreitetste der hierhergehörigen Säuren und findet sich fast in allen unseren Früchten theils frei, theils als saures Kalium- oder Calciumsalz. Sie kann auch künstlich dargestellt werden, theils durch Einleiten von Stickoxydgas in eine Lösung von Asparagin oder Asparagsäure in kalter mässig concentrirter Salpetersäure (Piria), theils durch Reduction von Weinsäure durch Erhitzen mit Zweifach-Iodphosphor und Wasser (Dessaigues). Im Organismus wird Apfelsäure ebenso wie ihre Kalium- und Calciumsalze in gleicher Weise oxydirt; durch Elimination von kohlen sauren Alkalien tritt vorübergehend Alkalescentz des Urins ein. In den Tractus eingeführt, verwandelt sich apfelsaures Calcium in Folge eines Gährungsprocesses in Calciumcarbonat (Magawly); ob dabei, wie beim Vergähren mit Bierhefe oder faulem Käse auch bernsteinsaures, buttersaures und essigsaures Calcium auftritt, steht dahin.

**Acidum tartaricum, Acidum Tartari, Sal essentielle Tartari; Weinsäure, Weinsteinsäure, Rechtsweinsäure.**

Die Weinsäure,  $C^4H^6O^9$ , welche in chemischen Fabriken aus dem gereinigten Weinstein dargestellt wird, bildet grosse, wasserhelle, schief rhombische Säulen und Pyramiden, die häufig zu Krusten vereinigt werden, ohne Geruch und von starkem, aber angenehmem saurem Geschmacke. Die Krystalle sind pyroelektrisch und leuchten beim Reiben im Dunkeln. Die Säure ist luftbeständig, verbrennt an der Luft mit helleuchtender Flamme unter Caramelgeruch, löst sich in 0,8 kaltem und noch weniger kochendem Wasser, ist in 2,5 Weingeist, aber nicht in Aether löslich. Nicht concentrirte wässrige Weinsäurelösungen zersetzen sich an der Luft unter Schimmelbildung. Die Weinsäure ist eine im Pflanzenreiche

als Kaliumbitartrat viel verbreitete und ausser in den Weintrauben u. a. auch in Maulbeeren, Löwenzahnwurzel, Queckenwurzel, Färberröthe, Kamillenblüthen, Isländischem Moos, Meerzwiebel, Tamarindenmus, Ananas und Sauerampfer aufgefunden. Sie lässt sich künstlich durch Oxydation von Stärke, Milchzucker und anderen Substanzen, durch Stehenlassen von Citronensaft u. s. w. erhalten. Beim Schmelzen der Weinsäure entsteht die Metaweinsäure, deren Alkalisalze in neuester Zeit wegen ihrer grossen Löslichkeit statt der weinsäuren Alkalien als Abführmittel empfohlen werden. — Bei trockener Destillation liefert Weinsäure unter anderen Producten die von Krüger-Hansen bei Cholera in Anwendung gebrachte Brenzweinsäure, *Acidum pyrotartaricum*. Durch Kaliumpermanganat, Braunstein, Bleihyperoxyd und Kalumbichromat wird Weinsäurelösung theils schon in der Kälte, theils bei gelindem Erwärmen zu Ameisensäure und Kohlensäure oxydirt.

Auf der äussern Haut erzeugt concentrirte Weinsäurelösung in  $\frac{1}{4}$  Stunde leichtes, nicht lange dauerndes Brennen. Bei interner Application rufen kleine Gaben kühlendes Gefühl im Munde hervor und wirken durstlöschend; grössere Gaben können Purgiren bedingen, auch wird sie bei fortgesetzten kleinen Gaben vom Magen schlecht tolerirt. Sehr grosse Gaben wirken toxisch nach Art anderer organischer Säuren, doch steht die Giftigkeit hinter derjenigen der Citronen- und Oxalsäure zurück.

Weinsäure tödtet Kaninchen intern erst zu 12,0—16,0 (in 30,0 Wasser gelöst), nach Erscheinungen zunehmender Adynamie, Schwäche des Herzschlages und beschwerlicher und langsamer Respiration (Mitscherlich). Bei Menschen sollen 30,0, auf einmal in Wasser gelöst genommen, den Tod bedingen können (Taylor), doch sind bisweilen selbst 24,0 ohne Erscheinungen von Vergiftung genommen (Sibbald). Jedenfalls kommt es dabei sehr auf die Concentration der Lösung an. Kalk und Magnesia sind die rationellsten Gegengifte.

Als entfernte Wirkung nichttoxischer grösserer Gaben Weinsäure resultirt bei Fröschen, Kaninchen und Menschen Schwäche und Verlangsamung der Herzaction, wobei der Vagus unbetheiligt ist (Bobrik). Der Harn wird nach Weinsäuregenuss stärker sauer und enthält Calciumtartrat (Wöhler), doch treten immer nur wenige Procente der eingeführten Weinsäure im Urin wieder auf (Buchheim und Piotrowski), während der Rest im Blute oxydirt wird.

Als kühlendes und erfrischendes Mittel wird Weinsäure meist in Pulverform (mit 20—40 Th. Zucker oder Citronenölzucker), auch in der Form der Trochisci Acidi tartarici (1 Th. Weinsäure,  $\frac{1}{10}$  Th. Citronenöl, 30 Th. Zucker), welche die sog. Drops der Zuckerwaarenfabrikanten ersetzen, gegeben. Auch dient sie zur Darstellung der Brausepulver, sowie zu Saturationen. Ausserdem hat man innerlich Weinsäure zu 0,2—1,0 gegen Scorbut, Ruhr, Magenkatarrh benutzt. Aeusserlich empfahl Schottin bei fötiden Fusschweissen Weinsäure in die Strümpfe zu streuen oder mit Weinsäurelösung getränkte Strümpfe tragen zu lassen.

*Acidum citricum*, *Acidum citricum crystallisatum*, *Acidum Citri*;  
Citronensäure.

Die häufigste Verwendung zu kühlenden Getränken und Mischungen findet wegen ihres besondern Wohlgeschmackes die Citronensäure, welche am reichlichsten in den Citronen sich findet, deren Saft deshalb auch ein billiges Surrogat der Säure darstellt,



übrigens auch wegen seines Gehaltes an Alkalicitraten als Diureticum gebraucht wird.

Die Citronensäure,  $C^6H^8O^7$ , findet sich ausser in den Früchten von Citrus Limonum und andern Citrusarten noch in den verschiedensten süßsauerlichen Früchten (Kirschen, Heidelbeeren, Preiselbeeren, Moosbeeren, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Vogelbeeren, Erdbeeren, Rosenäpfeln), in Runkelrüben, und Georginenknollen, in den Zwiebeln von Allium Cepa L., in vielen Blättern und Kräutern (Waldmeister, Kiefernadeln u. s. w.), auch in einzelnen Pilzen. Das officinelle Acidum citricum bildet grosse, farb- und geruchlose, wasserhelle orthorhombische Säulen von stark angenehm-saurem Geschmacke, welche in sehr feuchter Luft zerfliessen und sich unter beträchtlicher Kälteerzeugung in 0,54 Th. Wasser zu einer syrupdicken Flüssigkeit auflösen; auch in 1 Th. Weingeist und 50 Th. Aether sind sie löslich. Die Citronensäure ist eine dreibasische Säure, deren Alkalisalze in Wasser sich leicht lösen. Bei 100° verliert sie ihr Krystallwasser, schmilzt bei etwa 165° und verwandelt sich bei 175° unter Verlust von Wasser, etwas Aceton und Kohlenoxyd in Aconitsäure, Itaconsäure und Citraconsäure. An der Luft erhitzt, entzündet sie sich leicht und verbrennt zu Kohlensäure und Wasser; dieselben Producte bildet aus derselben Ozon bei Gegenwart eines Alkalis, wobei vorübergehend Oxalsäure entsteht (Gorup-Besanez). Concentrirte Lösung hält sich unverändert, verdünnte Lösungen zersetzen sich unter Schimmelbildung selbst in verschlossenen Gefässen.

Die Citronensäure wird im Magen und Darm leicht resorbirt und im Blute zu Kohlensäure und Wasser verbrannt.

Selbst nach 30,0—60,0 findet sich keine Citronensäure im Harn wieder (Buchheim und Piotrowski); die Säure des Harns erscheint danach vermehrt (Eylandt).

Auf die Haut wirkt concentrirte Citronensäurelösung weder ätzend noch reizend (Mitscherlich). Erst sehr hohe Dosen scheinen toxische Wirkung zu besitzen, doch übertrifft sie die Weinsäure an Giftigkeit. Auf die Herzaction wirkt sie wie Weinsäure verlangsamen und schwächend.

Auf grosse Kaninchen wirken 8,0—15,0 conc. Citronensäurelösung in 65 resp. 20 Minuten tödtlich (Mitscherlich), 4,0 bei Hunden und Katzen nicht toxisch (Christison). Piotrowski nahm in 6 Stdn. 30,0, eine Stunde darauf 15,0 und eine Stunde später wiederum 30,0, ohne dass sich etwas anderes wie 2 Stunden nach der letzten Dosis Erbrechen einstellte. Bobrik constatirte bei Kaninchen nach Einführung von 10 Cc. einer 40% Citronensäurelösung Schüttelkrämpfe, Athembeschwerden, Abnahme der Pulsfrequenz und Sinken der Temperatur um 2°.

Die Citronensäure dient als kühlendes Mittel zu 0,5—1,0 pro dosi in Pulver, Pastillen (0,05 mit 1,25 Zucker) oder versüßter Lösung; auch kann sie zu Brausepulver und Sationen wie Weinsäure benutzt werden. Aeusserlich ist Citronensäurelösung zu schmerzlindernden Umschlägen bei Krebsgeschwüren empfohlen (Brandini).

Als Pulvis ad Limonadam, Limonadepulver, war früher eine wegen ihrer Hygroskopicität nicht vorrätig zu haltende Mischung von 10,0 Citronensäure, 120,0 Zucker und 1 Tr. Citronenöl officinell, das man theelöffelweise in einem Glase Wasser gelöst verwendet.

**Anhang.** Zur Bereitung des als Surrogat der Citronensäure nicht selten verwendeten Citronensaftes, Succus Citri, dienen die länglich ovalen, hochgelben, dünnchaligen, als Citronen oder Limonen, Fructus s. Poma Citri s. Citrea, bezeichneten sauren Früchte von Citrus Limonum Risso. Der Saft enthält ausser citronensauren Salzen eine Menge freier Citronensäure. Gute Citronen liefern 24,0—30,0 gewöhnliche etwa 16,0 Citronensaft. Letzterer ist am besten aus geschälten und von den Samen befreiten Früchten herzustellen; beim längeren Aufbewahren schimmelt er leicht und zersetzt sich unter Bil-

dung von Essigsäure. Der Gehalt an Citronensäure beträgt in guten Citronen etwa 5,5 %.

Der Citronensaft ist ein zur Stillung des Durstes und als kühlendes Mittel beliebtes und häufig verwendetes Medicament, indem man entweder mit Zucker bestreute Citronenschalen in den Mund nehmen lässt oder Succus Citri in Zuckerwasser oder Kohlensäurewasser verordnet. Ausserdem hat man ihn bei Rheumatismus acutus und bei Hydrops (Cohen, Siebert) curmässig verwendet, anscheinend nicht ohne Erfolg, manchmal aber auch in enormen Quantitäten, so bei Hydrops, wo man mit einer Citrone pro die beginnt und allmählig auf 15 bis 20 steigt, oft bis zu 1000—2000 Stück bei einem Kranken. Bei Rheumatismus acutus (Owen Rees u. A.) wendet man in der Regel 30,0 pro dosi täglich an; ob er hier mehr als durstflöschend und in gelindem Grade antipyretisch wirkt, steht dahin und nach zu grossen Dosen und zu langem Gebrauche soll sogar bedenklicher Collapsus, Haemoptysis und Darmblutung vorkommen können (O'Connor, Klusemann). Einen besonderen Ruf hat der Citronensaft sowohl prophylaktisch wie als Heilmittel beim Scorbut, weshalb man bis in die neueste Zeit hinein in England und in Amerika fast jedes Schiff damit verproviantirt; inwieweit dieser Ruf gerechtfertigt ist, lässt sich auf Grundlage concludenter Versuche bis jetzt nicht sagen. Wenn sich bei Hydrops eine günstige Wirkung aus der Bildung von Alkalicarbonaten, in welche die citronensauren Salze sich verwandeln, und aus der diuretischen Action der letzteren erklären lässt, so fehlt dagegen jede rationelle Indication für die Anwendung bei Ikterus, Ruhr, Cardialgie, Croup und anderen Affectionen, gegen welche ihn Einzelne als Specificum gepriesen haben. Günstige Wirkung sieht man sehr häufig vom Citronensaft beim Erbrechen; ob er aber bei Seekrankheit mehr als andere Mittel leistet, bleibt problematisch. Selbstverständlich lässt sich Citronensaft in analoger Weise wie andere organische Säuren bei Vergiftung mit ätzenden Alkalien als Antidot verwenden, doch hat er keine Vorzüge vor dem Essig. Auch äusserlich kann Citronensaft als Adstringens, z. B. bei lockerem, leicht blutendem Zahnfleische, sowie bei Pernionen gute Dienste leisten. Bei Epheliden bleibt er meist ohne Nutzen, und noch weniger ist von ihm bei Behandlung von Hospitalbrand und Diphtheritis zu erwarten. Man empfiehlt ihn auch zur Verhütung des Decubitus und gegen Ausfallen der Haare nach Typhus. Sehr zweckmässig lässt sich Citronensaft als Geschmackscorrigens bei manchen schlecht schmeckenden Mixturen (Glaubersalz-, Senna-, Rheummixturen, Oelemulsionen) und zur Bereitung von Saturationen (vgl. S. 170) verwenden. Officinell war früher eine Lösung von 18 Th. Zucker in 10 Th. frisch ausgepresstem und filtrirtem Citronensaft als Syrupus succi Citri, Syrupus acetositatis Citri, Citronensaftsyrup, ein angenehmes, aber theures Corrigens, das sich auch zum Getränk mit Wasser (1:100—150) verwenden lässt.

#### **Syrupus Cerasorum, Syrupus Cerasi; Kirschensyrup, Kirschsyrop.**

Die sauren Kirschen oder Morellen, *Cerasa acida*, *Fructus Cerasi*, sind die durch ihren dunkelpurpurrothen Saft ausgezeichneten Früchte der als *Prunus Cerasus* var. *austera* L. und var. *acida* Koch (*Cerasus acida* Gaertn.) bezeichneten Varietäten des von Lucullus aus Kleinasien nach Europa eingeführten Kirschbaums. Sie unterscheiden sich von den süssen schwarzen Kirschen, den Früchten der Vogelkirsche, *Prunus avium* L., durch einen viel grösseren Gehalt an Apfelsäure und einen geringeren Gehalt an Zucker, neben welchen sich in beiden Pektinstoffe, Citronensäure und andere minder wichtige Bestandtheile, nach Zoller auch ein flüchtiges Oel finden. Zur Bereitung des als geschmacksverbessernden Zusatz zu kühlenden Mixturen sehr beliebten, dunkelpurpurrothen Syrupus Cerasorum werden die sauren Kirschen mit den Kernen zerstampft und in einem bedeckten Gefässe bei etwa 20° stehen gelassen, bis sich eine abfiltrirte Probe mit dem halben Volum Weingeist ohne Trübung mischen lässt, dann 35 Th. des ausgepressten und filtrirten Saftes mit 65 Th. Zucker versetzt. Da die Kirschkerne kleine Mengen von Amygdalin einschliessen, enthält der Syrup geringe Mengen Blau-

säure und Bittermandelöl, welche auf die Wirkung ohne Einfluss sind, dagegen ihm ein angenehmes Aroma verleihen.

### Syrupus Rubi Idaei; Himbeersyrup.

Die unter dem Namen Himbeeren, *Fructus Rubi Idaei*, wohlbekannten Früchte des in ganz Europa und im nördlichen Asien einheimischen Himbeerstrauches, *Rubus Idaeus* L. (Fam. Rosaceae), dienen frisch im reifen Zustande, wo sie Apfelsäure, Citronensäure, Zucker, Pektinstoffe, ein eigenthümliches ätherisches Oel und ein Stearopten (Himbeercampher) enthalten, zur Darstellung des als Zusatz zu kühlenden flüssigen Mixturen sehr gebräuchlichen Himbeersyrups. Man lässt die frischen zerdrückten Himbeeren bei 20° so lange stehen, bis eine abfiltrirte Probe mit der Hälfte ihres Volum Weingeist sich ohne Trübung mischen lässt, und löst in 35 Th. des filtrirten Presssaftes 65 Th. Zucker auf. Der Himbeersyrup ist von rother Farbe, die durch Zusatz von  $\frac{1}{2}$  Vol. Salpetersäure nicht in Gelb übergeht. Alkalien färben denselben blau. Mit 2 Th. Acetum purum ex tempore gemischt, bildet er den als kühlenden Getränk (mit Wasser vermischt) beliebten Himbeeressig, Acetum Rubi Idaei.

Der bei Darstellung des Himbeersaftes resultirende Presskuchen diene früher auch zur Bereitung aromatischer Wässer, Aqua Rubi Idaei und Aqua Rubi Idaei concentrata, die ein angenehmes Vehikel für Mixturen bilden.

**Anhang.** An die erwähnten Syrupe schliesst sich das früher officinelle, aus den frischen, reifen Beeren von *Sambucus nigra* L. (Familie Caprifoliaceae), welche im Fruchtfleische Apfel-, Wein-, Citronen- und Baldriansäure, Zucker, Pektinstoffe und eine Spur von ätherischem Oel und in den Kernen fettes Oel enthalten, durch Auspressen, Coliren, Abdampfen und Zusatz von  $\frac{1}{12}$  Th. Zucker bereitete rothbraune Extract von süßsaurem Geschmacke, das Fliedermus, *Succus Sambuci inspissatus* s. *Extractum Sambuci*. Das käufliche und viel billigere Fliedermus ist von schwarzer Farbe. Man benutzt es entweder rein, theelöffelweise, oder als Zusatz zu Mixturen, besonders diaphoretischen und antikatarrhalischen (1:4—5).

Ein ähnlicher eingedickter Saft ist der aus den sog. Attichbeeren, den Früchten von *Sambucus Ebulus* L., bereitete Roob Ebuli, welcher von purpurrother Farbe und etwas bitterlich-süßem Geschmacke ist und in gleicher Weise gebraucht wird. Die Samen von *Sambucus Ebulus* sollen purgirend wirken. Der Name Attichbeeren kommt ursprünglich den Früchten von *Sambucus nigra* zu, welche früher als *Grana Actes* bezeichnet wurden.

Ausser den oben abgehandelten säuerlichen Früchten sind noch verschiedene andere in Anwendung gebracht, welche theils Apfelsäure, theils Citronensäure, meist der Hauptsache nach an Basen gebunden, zum kleineren Theile frei, enthalten. Am reichlichsten findet sich freie Säure in den Johannisbeeren, den Früchten von *Ribes rubrum* L. (zu 1,84—2,31 %), die Säure ist hier vorwiegend Citronensäure und kann der aus den rothen Johannisbeeren bereitete Syrup, *Syrupus Ribis* s. *ribium*, wie Citronensaftsyrup benutzt werden. Auch aus den Früchten von *Ribes nigrum* L., den sog. Aal- oder Gichtbeeren, hat man einen ähnlichen, jedoch nicht sehr angenehm schmeckenden Syrup bereitet. An Stelle des Himbeersyrups sind auch in ähnlicher Weise bereitete Syrupe aus Maulbeeren, *Mori* s. *Baccae Mori* (von dem ursprünglich in Persien einheimischen, bei uns in Gärten gezogenen Maulbeerbaume, *Morus nigra* L.), Brombeeren, *Baccae Rubi fruticosi* s. *Fructus Mori humilis* (von *Rubus fruticosus* L. und verwandten Arten), Erdbeeren, *Fragae* (auch zur Bereitung eines destillirten Wassers benutzt, von *Fragaria vesca* L.), Berberitzen, *Baccae Berberidum* s. *Berberum* s. *Fructus Oxyacanthi* (von *Berberis vulgaris* L.), Moosbeeren, *Baccae Oxycoccos* (von der namentlich in nördlichen Ländern häufigen *Vacciniae Schollera Oxycoccos*, mit reichlichem Gehalte an Citronensäure), Vogelbeeren, *Baccae Sorbi* (von *Sorbus aucuparia* L.) verwendet. Auch aus Aepfeln, *Poma acidula*, den Früchten von *Pyrus Malus* L., bereitete man früher einen *Syrupus pomorum acidulorum*. Hufeland empfahl



dieselben zu sog. Aepfelcuren bei Abdominalplethora, wo 10—20—30 Stück pro die verspeist werden sollten. Die Volksmedizin empfiehlt in ihrem eigenen Wasser geschmorte Aepfel (Bratäpfel) rein oder mit Wachs oder Hammeltalg imprägnirt gegen Brust- und Darmkatarrhe. Auch der Quittensaft, *Succus Cydoniorum expressus*, fand früher Verwendung. Ferner gehören hierher die Hainbutten oder Hagebutten, *Fructus Cynosbati*, die fleischig-gewordenen Blüthenschalen von *Rosa canina* L., welche als falsche beerenartige Fruchthüllen die eiförmigen, steinharten, behaarten Carpellen, sog. Hainbuttensamen, *Semen Cynosbati*, einschliessen. Die Hainbutten oder die ihnen ähnlichen, aber grösseren und fleischigen *Fructus Rosae Gallicae* dienten früher zur Darstellung der *Confectio Rosae caninae* s. *Conserva Rosae fructus*, welche wie die früher besprochene *Conserva Rosarum* als lange feuchtleibendes Pillenconstituens Benutzung fand. Die getrockneten Hainbutten können zu säuerlich schmeckenden Suppen verwendet werden. Die Hainbuttensamen sind Volksmittel gegen Helminthen und Sodbrennen und wurden zerstoßen zu 1—2 Theelöffel pro die oder in Abkochung von Spitta gegen Gries- und Harnbeschwerden empfohlen.

**Pulpa Tamarindorum cruda, Fructus Tamarindorum, Tamarindi, Siliquae Indicae; rohes Tamarindenmus, Pulpa Tamarindorum depurata; gereinigtes Tamarindenmus.**

Den säuerlich süßen Früchten reiht sich das Tamarindenmus an, welches als rohes Tamarindenmus das mit Samen, Gefässbündeln und Häuten zu einer teigigen Masse zerstampfte Fruchtmass der Schoten von *Tamarindus Indica* L., einem in Indien, Centralafrika und Ostafrika ursprünglich einheimischen, in Westindien und Brasilien cultivirten Baume aus der Familie der Leguminosen, darstellt. Es bildet eine dunkelrothbraune Masse von säuerlichem Weingeruch und saurem Geschmacke. Im Handel kommen mehrere Sorten vor, von denen indessen nur die Ostindischen Tamarinden, *Tamarindi orientales*, medicinisch verwendbar sind. Die Westindischen Tamarinden, *Tamarindi occidentales*, sind von hellerer, gelbrother Farbe, weicher und von süßerm Geschmacke, oft schon in Gährung begriffen. Die aus Sennaar und Nubien stammenden *Tamarindi levanticae* s. *Aegyptiacae* bilden 12—18 Cm. breite und 4—5 Cm. dicke, rundliche, schwarze Kuchen von stark saurem Geschmacke und sind mit Sand, Maissamen u. s. w. verunreinigt; letztere sollen in den Hafenplätzen des Mittelmeeres mit Wasser erweicht und in die Form der Ostindischen Tamarinden gebracht werden. Mit heissem Wasser aufgeweicht, durch ein Haarsieb geseiht und in einem Porcellangefasse im Dampfbade zur Extractconsistenz gebracht, geben die Ostindischen Tamarinden die ausschliesslich zu medicinischen Zwecken verwendbare *Pulpa Tamarindorum depurata*.

Die ostindischen Tamarinden enthalten Zucker, Weinsäure, Citronensäure, Essigsäure und andere flüchtige Fettsäuren, letztere oft in grosser Menge, die Weinsäure theils als Kaliumbitartrat, theils frei. In ihrer Heimath, namentlich in afrikanischen Ländern, bilden die Tamarinden mit Butter und Zwiebeln eine erfrischende Speise; mit Zucker eingemacht, kommen sie aus Westindien als Delicatesse in den Handel. Medicinisch benutzt man die *Pulpa Tamarindorum depurata* als kühlendes und gelind abführendes Mittel bei fieberhaften Zuständen und Congestionen, am meisten in Abkochung (1:5—10) oder als Zusatz von Mixturen zu 30,0—60,0 pro die; auch benutzt man das Tamarindenmus als Constituens für Latwergen.

Durch Zusatz von 4 Th. *Pulpa Tamarindorum cruda* zu 100 Th. kochender Milch, Coliren und Filtriren wurden die früher officinellen Tamarindenmolken, *Serum lactis tamarindinum*, erhalten, die man innerlich als kühlendes und gelind öffnendes Getränk benutzte.

**Anhang:** *Acidum oxalicum*, Oxalsäure oder Kleesäure. — Der Wein- und Citronensäure in ihrer Wirkung nahestehend, jedoch viel stärker giftig ist die in der Medicin kaum benutzte, wegen ihres Vorkommens im Sauerklee,

*Oxalis Acetosella* L., als Oxal- oder Kleesäure bezeichnete Säure, welche in Verbindung mit Calcium fast im ganzen Pflanzenreiche verbreitet ist und durch Einwirkung von Salpetersäure auf Zucker oder Stärkemehl oder von Kalihydrat auf diverse organische Substanzen erhalten werden kann. Sie krystallisiert in wasserhellen vierseitigen Prismen, die sich in Wasser und Alkohol leicht lösen und intensiv sauren Geschmack besitzen. Die Säure und ihr saures Kaliumsalz, welches unter dem Namen Sauerkleesalz oder Kleesalz, *Oxalium*, *Sal Acetosellae*, bekannt ist und häufig zur Entfernung von Dintenflecken benutzt wird, haben nicht selten zu Verwechslung mit Abführmitteln, namentlich mit *Magnesium sulfuricum*, und daraus resultirenden Vergiftungen, bei denen oft der Tod äusserst rasch erfolgt und neben Erbrechen Prostration und bisweilen Convulsionen auftreten, Veranlassung gegeben, besonders in England. Selbst 4,0 können auf einmal genommen tödtlich wirken, während in vertheilten Gaben allerdings weit grössere Mengen genommen werden können (Piotrowsky). Man hat die Vergiftungserscheinungen und namentlich den raschen Eintritt des Todes dadurch erklärt, dass die Säure im Blute sich mit Kalk verbinde und das unlösliche Calciumoxalat in den Lungenarterien Pfropfbildung bedinge, doch scheint diese Theorie nicht richtig zu sein und die entfernten Erscheinungen auch durch exquisite Wirkung auf das Herz und die Nervencentren erklärt werden zu können, wie solche 1879 gleichzeitig von Böhm und Koch und von Kobert und Küssner nachgewiesen wurden. Im Harn treten Eiweiss, eine eigenthümliche, stark reducirende Substanz und zahlreiche Magnesiumoxalat-Krystalle, welche letzteren auch als Infarcte in den Harncanälchen constant vorkommen, auf (Kobert und Küssner). Als Antidot finden Kalkpräparate (Calciumcarbonat, Zuckerkalk, Kreide) Anwendung. Kleine Mengen, z. B. 0,2–0,4, wirken nur kühlend und können wie Weinsäure oder Citronensäure in Lösung oder Pulverform gegeben werden. Ob Oxalsäure bei acuten Entzündungsprocessen von Schleimhäuten, zumal des Magens und der Respirationsorgane, sowie bei fieberhaften Zuständen mehr als andere Säuren wirkt, und ob sie bei Phthisis (Hastings) wirklich etwas leistet, ist völlig unentschieden. Man fertigt auch Drops und Pastillen gegen den Durst aus der Säure an.

#### Acidum phosphoricum, Phosphorsäure.

Mit dem Namen Phosphorsäure bezeichnet die Pharmakopoe eine Lösung der Orthophosphorsäure oder der gewöhnlichen Phosphorsäure in Wasser, welche eine klare, farb- und geruchlose Flüssigkeit von 1,120 spec. Gew. darstellt und in 100 Th. 20 Th. Phosphorsäure enthält.

Die Orthophosphorsäure (dreibasische oder c-Phosphorsäure,  $\text{PO}^4\text{H}^3$ , stellt eine farblose, syrupdicke, stark saure, in allen Verhältnissen in Wasser lösliche Flüssigkeit dar, die beim ruhigen Stehen in vier- und sechsseitigen Säulen krystallisiert. Neben derselben war früher als *Acidum phosphoricum siccum* s. glaciale ein Gemenge von Metaphosphorsäure und Pyrophosphorsäure officinell, welches besonders da benutzt wurde, wo Phosphorsäure in Pillen zur Verordnung kam. Weder die Metaphosphorsäure (einbasische oder a-Phosphorsäure, Phosphorsäuremonohydrat),  $\text{PO}^3\text{H}$ , welche beim Lösen des durch Verbrennen von Phosphor in trockener Luft entstehenden Phosphorsäureanhydrids (Phosphorpentoxyd),  $\text{P}^2\text{O}^5$ , in der Kälte sich bildet, noch die beim Abdampfen der Orthophosphorsäure bei einer Temperatur von unter  $213^\circ$  resultirende Pyrophosphorsäure, zweibasische oder b-Phosphorsäure, Diphosphorsäure,  $\text{P}^2\text{O}^7\text{H}^4$ , welche beide farblose, durchsichtige, glasartige Massen bilden, haben als solche therapeutische Bedeutung. In wässrigen Lösungen verwandeln sich beide Säuren allmählig in der Kälte und rascher beim Erhitzen in Orthophosphorsäure.

Die Phosphorsäure schliesst sich in ihrer Wirkung und Anwendung den bereits früher abgehandelten unorganischen Säuren an, nur gehen ihr die kaustischen Wirkungen derselben ab, indem

wässrige Lösungen von Orthophosphorsäure Eiweiss nicht fällen. Sie verhält sich Hühnereiweiss gegenüber wie Oxalsäure und Weinsäure, indem sie dasselbe erst nach Zusatz von Kochsalz oder andern Neutralsalzen präcipitirt. In Folge davon wirkt sie auch verhältnissmässig wenig irritirend auf die Magenschleimhaut und stört die Verdauung minder stark als Schwefelsäure und Salpetersäure, ein Umstand, der sie ganz besonders in allen Fällen indicirt, wo es sich um Erzielung entfernter Wirkungen der Säure durch längere Darreichung handelt. Hieraus erklärt sich der Vorzug, welcher der Phosphorsäure namentlich bei Behandlung fieberhafter Affectionen, z. B. im Typhus (Stromeyer, Hasse u. A.) in der Praxis gegeben wird.

Im Allgemeinen findet die Phosphorsäure dieselbe therapeutische Verwendung wie die Schwefelsäure. Als Antipyreticum wird sie von Kranken ihres angenehmen Geschmacks wegen viel lieber als andere unorganische Säuren genommen. Nach einem Selbstversuche von Bobrick bedingen 15,0 Phosphorsäure zunächst ein Frostschauder und Steigen der Pulsfrequenz, später behagliches Wärmegefühl und Sinken der Herzschlagzahl unter die Norm. Kobert (1880) fand beim gesunden Menschen relativ geringe Mengen Phosphorsäure (schon 2,0 in Zuckerwasser) Pulsverlangsamung und geringen Temperaturabfall unter Zunahme der Acidität des Harns und ohne sonstige Nebenwirkungen bedingen, eine Action, welche auch am Kranken hervortritt. Bei innerlicher Verabreichung von 2 Ccm. 4—20procentiger Säure steigt bei Fröschen die Pulsfrequenz, ohne dass es später zu Sinken unter die Normalschlagzahl kommt (Bobrick). Subcutane Application von  $\frac{1}{2}$ —2 Ccm. verdünnter Phosphorsäure ruft Schwäche und schliesslich completes Coma unter Verlangsamung des Herzschlages hervor; directe Application auf das ausgeschnittene Froschherz steigert zunächst die Schlagzahl, bedingt aber später stetiges Sinken, wobei gleichzeitig die Contractionen unvollständiger werden und schliesslich in blosse Vibrationen übergehen (Munk und Leyden). Der Herzmuskel ist gleich nach dem Tode nicht mehr erregbar. Bei Warmblüthern tritt nach subcutaner Application (zu etwa 8,0) Verlangsamung, Schwäche und Irregularität des Herzschlages, Abnahme der Respirationsfrequenz, Sinken der Körpertemperatur, Mattigkeit und Tod ein. Nach Injection von Phosphorsäure in die Jugularis sinkt der Blutdruck regelmässig, ebenso die Pulsfrequenz, welche bei kleineren Dosen später wieder zunimmt, nach grösseren Dosen nur abnimmt. Injection in die Carotis macht sofort starken inspiratorischen Krampf, von Convulsionen und Coma gefolgt, starkes Sinken der Pulsfrequenz mit enormer Beschleunigung kurz vor dem Tode. Nach Kobert sind bei relativ rascher Einführung 5—10 % Phosphorsäurelösungen in die Venen 0,62 Ccm. per Kilo zur Tödtung erforderlich, wobei heftige Dyspnoe auftritt, welche sich nicht durch Embolien in den Lungen erklärt und die durch Vagusdurchschneidung eher gesteigert als verringert wird. Bei Einführung diluirter Lösungen in das Gefässsystem bewirkt Phosphorsäure zuerst durch Reizung des Vaguscentrums, des vasomotorischen Centrums und der grossen motorischen Ganglien Pulsverlangsamung, Steigen des Blutdrucks und klonische und tonische Krämpfe; später erfolgt Lähmung dieser Centren und Tod durch Athemstillstand, während die automatischen Herzganglien zuletzt gelähmt werden; im Harn treten Eiweiss und Epithelialcylinder, mitunter auch Hämoglobin auf (Kobert). Die Section mit Phosphorsäure vergifteter Thiere ergiebt fast constant Echylosen in den Lungen und fettige Degeneration in Leber, Nieren und Muskeln, vielleicht im Zusammenhange mit einer directen Veränderung des Blutes, das durch kleine Mengen Phosphorsäure dunkel, dünnflüssig, lackfarben und schwer coagulabel, durch grössere durchsichtig und gelatinös wird. War die Vergiftung durch interne Einführung geschehen, so können sich Erosionen, Röthung und Schleimhautablösung durch starke blutige Ergüsse im Magen und Duodenum finden (Munk und Leyden).

Die Orthophosphorsäure deckt sich in ihrer physiologischen Wirkung keines-



wegs vollständig mit der Metaphosphorsäure und Pyrophosphorsäure. Metaphosphorsäure fällt Eiweiss, was Pyrophosphorsäure und Orthophosphorsäure nicht thun. Das Natriumsalz der Metaphosphorsäure und besonders der Pyrophosphorsäure wirken bei Subcutaninjection oder in die Venen applicirt stark giftig, indem sie Zahl und Energie des Herzschlages und gleichzeitig den Blutdruck herabsetzen und systolischen Herzstillstand bedingen; bisweilen zeigen sich auch nach Natriumpyrophosphat die für den Phosphor charakteristischen Verfärbungserscheinungen (Priestley, Gamgee und Larmuth).

Abgesehen von der Anwendung als Antipyreticum hat die Phosphorsäure noch bei einer Reihe von Affectionen der verschiedensten Art Benutzung gefunden, ohne dass jedoch ein reeller Werth des Mittels bis jetzt irgendwie nachgewiesen wäre.

Besonders häufig gebrauchte man die Säure bei Schwachezuständen, ferner bei Knochenleiden, wo jetzt die Verbindungen der Phosphorsäure mit Calcium- oder Natrium bevorzugt werden. Während man hier ansetzend wirken will, glaubt man andererseits bei Oxalsäuresteinen lösend durch dieselbe wirken zu können, da Calciumoxalat in reichlicher Menge in Phosphorsäure zu einem gewissen Grade sich auflöst. Als blutstillendes Mittel, zumal bei Metrorrhagien, sowie als secretionsverminderndes Medicament zur Minderung des Auswurfes bei chronischen Bronchialkatarrhen und bei Tuberculose, sowie zur Beseitigung der colliquativen Schweisse, ferner zur Heilung von Spermatorrhoe verhält sich Phosphorsäure wohl nicht anders wie andere mineralischen Säuren. Einzelne haben sie auch bei Diabetes empfohlen, doch beschränkt sie die Zuckerbildung nicht (Griesinger). Ueberhaupt ist ihr Einfluss auf die Beschaffenheit des Harns noch nicht sicher festgestellt. Nach Böcker steigert sie die Ausfuhr der Phosphate, und zwar nicht sowohl des Calciumphosphats und des Magnesiumphosphats als vielmehr die des entsprechenden Kaliumsalzes.

Man giebt die Phosphorsäure innerlich zu 0,5—1,5 mehrmals täglich, am zweckmässigsten in starker Verdünnung mit wässrigen Flüssigkeiten (in Mixturen 1 : 25—50, im Getränk 1 : 100—250), zweckmässig unter Zusatz schleimiger Substanzen, selten in Tropfen oder (die officinelle Säure eingedampft als Acidum phosphoricum siccum) in Pillen.

Aeusserlich kommt Phosphorsäure wenig in Betracht. Eine Mischung von Acid. phosph. sicc. mit Aetzkalk diente früher als sog. Dental succedaneum zum Ausfüllen hohler Zähne.

#### Verordnungen:

1)	R	2)	R
	<i>Acidi phosphorici</i> 5,0		<i>Acidi phosphorici sicci</i>
	<i>Aq. comm.</i> 1000,0		<i>Asae foetidae</i> 10,0
	<i>Syrupi Rubi Idaei</i> 100,0		<i>Pulv. rhizom. Calami q. s.</i>
<i>M. D. S.</i>	Zum Getränk (Phosphorsäurelimonade).	<i>ut f. pilul.</i> 150.	<i>D. in vitro.</i> S. Dreimal täglich 6—8 Stück. (Bei Caries. Rust.)

**Kalium nitricum**, Kali nitricum, Nitram depuratum, Nitras kalicus depuratus; **Kaliumnitrat**, Salpeter, Kalisalpeter.

Das Kaliumnitrat bildet durchsichtige, farblose, luftbeständige, prismatische Krystalle, welche meist hohl und gestreift erscheinen, oder ein weisses Krystallpulver von kühlendem, scharfsalzigem Geschmacke. Es löst sich in 4 Th. kaltem Wasser und in weniger als der Hälfte kochendem Wasser, ist dagegen in Weingeist unlöslich. Bei 350° schmilzt es zu einer dünnen Flüssigkeit, in stärkerer

Hitze entwickelt es Sauerstoff und wird zu salpetrigsaurem Kalium (Kaliumnitrit), welches bei sehr hoher Temperatur in Kali, Sauerstoff und Stickstoff zerfällt. Es ist bei höheren Hitzegraden ein äusserst kräftiges Oxydationsmittel und verpufft beim Erhitzen mit Schwefel, Kohle und andern brennbaren Körpern auf das heftigste (Anwendung zu Schiesspulver). Der Salpeter findet sich in Bengalen, Aegypten und andern warmen Ländern nach der Regenzeit an manchen Stellen des Erdbodens als Auswitterungsproduct, wird aber meist künstlich entweder durch Zersetzung von Natriumnitrat oder in den sog. Salpeterplantagen gewonnen. Der dabei resultierende rohe Salpeter, *Kali nitricum crudum*, wird zum medicinischen Gebrauche durch Umkrystallisiren gereinigt.

Die Wirkung des Salpeters setzt sich zusammen aus einer örtlichen Action, in welcher das Salz den Alkalisulfaten sich analog verhält, indem es in kleinen Gaben nicht oder wenig irritirend, in mittleren purgirend, in grossen (besonders bei Anwendung in Substanz oder sehr concentrirter Lösung) irritirend wirkt, und aus einer entfernten, besonders auf das Herz und die Muskeln, aber auch auf die Nervencentra gerichteten Action, in Folge deren es in nicht zu kleiner Dosis Verlangsamung des Pulsschlages und der Temperatur, in sehr grossen, selbst tödtlichen Collapsus bedingt. Die letztere Wirkung ist von dem Kaliumgehalte des Salpeters abhängig. Die Elimination erfolgt sehr rasch durch Nieren und Speicheldrüsen.

Kleine Mengen scheinen vollständig zur Resorption zu gelangen; schon nach wenigen Minuten erscheint der Salpeter im Urin und Speichel. Die Elimination ist in 2 Tagen vollendet (L. Hermann). Bei grösseren Dosen geht die grösste Menge des Salzes in Folge beschleunigter Peristaltik mit dem Stuhle wieder ab. Bei Vergiftungen findet sich Kaliumnitrat auch im Blut, in der Milz und Leber. Eine partielle Umwandlung in das weit giftigere Kaliumnitrit (Binz und Barth) ist durchaus nicht sicher gestellt.

Bei Menschen bewirkt Kalisalpeter in kleinen Dosen (0,3—0,6) ausser kühlendem, salzigem Geschmacke selbst bei mehrmaligem Einführen derselben keine besonders hervortretenden Erscheinungen; bei öfterer Wiederholung scheint die Verdauung wenig oder gar nicht zu leiden, dagegen soll bisweilen Vermehrung der Diurese auftreten. Nach Rabuteau ist bei kleinen Dosen Salpeter Obstipation Regel. Die Wirkung höherer Dosen ist nach der Form der Einführung verschieden. Nach Gaben von 1,0—4,0, wie sie Einzelne selbst bei Kranken zulassen, macht sich bei Ingestion in Substanz oder conc. Lösung Trockenheit im Halse, Durst, Brennen im Epigastrium und Aufstossen geltend, während bei Anwendung diluirter Lösungen keinerlei örtliche Reizung, sondern nur Vermehrung der Diurese mit Zunahme des spec. Gewichts stattfindet (Basham). Nach Rabuteau und Jovitzu D  m  tre bewirken derartige gr  ssere Dosen von Kalisalpeter in starker Verd  nnung (2mal t  glich 5,0 in 200,0 Wasser) Abnahme des Harnstoffes um 5—6 % und deutliche Verlangsamung des Pulses. Der Einfluss auf die Def  cation ist bei diesen Gaben variabel; bei Einzelnen tritt Diarrhoe ein, welche selbst die Anwendung von Opium nothwendig machen kann, bei Andern Verstopfung (Martin-Solon). Selbst bei Tagesgaben von 30,0 bis 60,0 soll nach Martin-Solon die Verdauung wenig leiden. Ausserdem kann es zu Erscheinungen kommen, wie solche neuerdings viel nach dem Gebrauche von Bromkalium beobachtet sind (Apathie, Bl  sse, Schl  frigkeit, Unlust zu Anstrengungen). Noch gr  ssere Gaben k  nnen Veranlassung zur Vergiftung werden, welche in einzelnen F  llen unter den Symptomen intensiver Gastroenteritis mit Blutbrechen, blutiger Diarrhoe und heftigen Leibschmerzen verl  uft, w  hrend in andern Erscheinungen entfernter Wirkung, wie Frostschauder, Mattigkeit, Verlangsamung des Pulses und der Athemz  ge, allgemeine Apathie, bisweilen Zittern, Hallucinationen, Verlust des Sehverm  gens und der Sprache, selbst Convulsionen in den Vordergrund treten. In einzelnen F  llen findet sich eine Mischung entfernter und   rtlicher Symptome, so dass anfangs starker Collapsus,

später ein mit der Gastroenteritis in Zusammenhang zu bringender febriler Zustand eintritt. Selten gehen dem Eintritt des Collaps furibunde Delirien voraus (Mouton); selten sind auch Symptome seitens der Harnwege (vermehrte Diurese, Brennen in der Urethra). In den meisten Fällen erfolgt bei angemessener symptomatischer Behandlung Genesung. Bisweilen bleiben aber Magenkrampf, Dysurie, Kältegefühl in den Händen und Füßen und längs des Rückens, Zittern und Lähmung der Extremitäten längere Zeit zurück. Bei der Section an Salpetervergiftung gestorbener Personen findet man Entzündung in den ersten Wegen und hellrothe Färbung des Blutes.

Die Erscheinungen nach Einführung grösserer Mengen Salpeter sind bei Thieren wesentlich die nämlichen wie beim Menschen. Die Versuche von Blake (1839), Grandeau (1864), Traube (1865) und Guttman (1865), welche die bereits beim Kaliumcarbonat erwähnte Wirkung sämmtlicher Kalisalze auf Muskel und Herz dargethan haben, sind vorzugsweise mit Kaliumnitrat ausgeführt. Schon 0,3—0,4 Salpeter tödtet bei Injection in die Venen Kaninchen augenblicklich, 1,0—1,5 bei Subcutanapplication in 20 Min., bei interner Einführung sind grössere Dosen erst in mehreren Stunden letal. Der Tod erfolgt unter rapidem Sinken der Herzthätigkeit und dadurch bedingtem vermindertem Gaswechsel im Blute unter epileptiformen Krämpfen. Traube verglich die Wirkung des Kalisalpers auf das Herz mit der der Digitalis, doch ist dieselbe vom Vagus völlig unabhängig (Bunge) und auch der Herzstillstand keineswegs immer ein systolischer, noch die Reizbarkeit des Herzmuskels bei demselben völlig erloschen. Böhm fand, dass nach Infusion von Kaliumsalzen das Herz des scheinotodten Thieres noch unvollkommen rhythmische Contractionen zeige, und durch fortgesetzte künstliche Respiration und mechanische Reizung des Herzens ist der definitive Tod selbst bei solchen Thieren abzuwenden, die schon 36 Std. im Scheintod sich befinden (Böhm und Mickwitz), wobei dann die vitalen Functionen in umgekehrter Reihenfolge, wie sie verschwinden, sich wieder herstellen, indem zuerst die Herzenergie zunimmt, dann der Blutdruck steigt, hierauf spontane Athmung eintritt und schliesslich die Reflexe sich wieder herstellen, wobei die Erregbarkeit sich derartig steigert, dass auf geringfügige Reize Krämpfe eintreten (Böhm, H. Köhler). Herzmusculatur und Blutkörperchen sind nach Salpetervergiftung nicht verändert. Es bliebe somit nur die Ansicht Buchheims, wonach Kalisalper und andere Kalisalze dadurch giftig wirken, dass die contractile Substanz, die er als eine moleculäre Verbindung von Kaliumsalzen und Eiweisskörpern betrachtet, in ihrer chemischen Constitution geändert werden. übrig, wenn man den Herzmuskel und die quergestreiften Muskeln überhaupt als den Angriffspunkt der Kaliumsalze statuiren will. Für eine solche Wirkung spricht nun allerdings der Umstand, dass auch das völlig isolirte Herz durch grosse Mengen Kaliumnitrat zum Stillstande gebracht wird und dass bei Infusion von Salpeter das Herz stets früher als die Muskeln afficirt wird, während bei Injection in eine Arterie die von dieser versorgten Muskeln ebenso früh betroffen werden. Für eine Wirkung auf die Muskeln scheint auch das Verhalten der Temperatur zu sprechen, welche auch bei kleinen Dosen, bei denen die Pulsfrequenz geradezu vermehrt erscheinen kann, herabgesetzt wird und nach kleinen oder nicht letalen grösseren Mengen länger als das Herz beeinflusst wird. — Aubert und Dehn (1874) führen die lähmende Herzwirkung der Kaliumsalze auf die Störung eines besonderen Coordinationscentrums des Herzens zurück, während Böhm den Kaliumherzstillstand als einen aus heftigem Herzkrampf hervorgehenden lähmungsartigen Schwächezustand der automatischen nervösen Herzapparate ansieht, durch welchen nur für die Fortbewegung des Blutes unzureichende Herzcontractionen zu Stande kommen. Nach den Versuchen von H. Köhler (1877) ertragen Warmblüter erheblich grössere Dosen Kaliumsalze nach Durchschneidung des Halsmarks als intacte Thiere, bis totales Absinken des Blutdruckes und Aufhören der Herzcontractionen zu Stande kommt, und ist daher der Tod als Folge einer Lähmung des vasomotorischen Centrums zu betrachten, neben welchem auch das Athemcentrum durch Kalisalze beeinflusst und nach anfänglicher Erregung rasch in seiner Function herabgesetzt und schliesslich gelähmt wird. Die Reizbarkeit der peripherischen Nerven wird durch Kalisalper nicht herabgesetzt. Eine schwächende Wirkung auf die Nervencentra ergiebt sich besonders bei Kaltblütern (Guttman, Block). Nach Injection von Kalisalper in die Venen



kann Eiweiss im Urin auftreten (Rabuteau). Fütterung von Hunden mit kleinen, nicht toxischen Dosen soll zu scorbutischen Zuständen bei denselben führen (Pilger).

Die Anwendung des Kalisalpers geschieht vorzugsweise bei acuten entzündlichen fieberhaften Affectionen, wo das durch das Natriumnitrat zeitweise verdrängte Medicament in der neueren Zeit nach dem Bekanntwerden der physiologischen Wirkungen der Kalisalze wieder viel in Anwendung gezogen wird.

Die Bedeutung des Salpers als Antipyreticum darf nicht unterschätzt werden, denn wenn er auch der Digitalis in seiner pulsverlangsamenden Action an Sicherheit nachsteht, so wirkt er doch weit entschiedener auf die Temperatur herabsetzend ein. Bei den in der Therapie gebräuchlichen Dosen von 0,3—0,6 sieht man fast nie ein erhebliches Sinken der Pulsfrequenz, während das Allgemeinbefinden und die Fiebertemperatur wesentliche Besserung danach erfahren. Höhere Dosen setzen auch die Herzschlagzahl herab. Die Krankheiten, bei denen man Salpeter als Antipyreticum benutzt, sind vor Allem Pneumonie, Pleuritis, Pericarditis, Endocarditis, acute Exantheme und acuter Gelenkrheumatismus. Bei letzterem, wo Martin-Solon, Forget und Socquet Behandlung mit grossen Dosen Nitrum einführten, scheint er den Verlauf manchmal nicht unerheblich abzukürzen. Contraindicirt ist der Salpeter bei acutentzündlichen Affectionen des Magens und Darmcanals, so wie bei entzündlichen Zuständen der Nieren.

Man vindicirte dem Salpeter früher eine besondere antiphlogistische Wirksamkeit in Folge Veränderung des Blutfaserstoffs. Unter Einwirkung medicinaler Dosen Salpers sollte bei Fiebernden das Aderlassblut einen kleineren und weniger dichten Blutkuchen geben (Martin-Solon). Bei Vergiftungen mit Salpeter ist das Blut dünnflüssig und schwer coagulabel. Blutfibrin wird in Salpeterlösung (1:10) in einigen Stunden gelöst, nachdem es zuvor in eine schleimige Substanz übergeführt ist; dasselbe Lösungsvermögen besitzen aber verschiedene andere Kalium-, Natrium-, Ammonium- und Bariumverbindungen. Die hellrothe Farbe, welche Blut bei Zusatz von Kaliumnitrat zeigt, tritt ebenfalls bei Anwendung verschiedener Neutralsalze (Chlornatrium, Chlormagnesium) ein.

Eine weitere Anwendung findet der Salpeter als Diureticum, wo er besonders bei Hydrops in Folge hydrämischer Blutbeschaffenheit indicirt erscheint.

Die Theorie der diuretischen Wirkung des Salpers ist noch nicht vollständig aufgeklärt. Letzere zeigt sich bei kleineren Dosen eben so gut wie bei grösseren und kann somit nicht allein von Steigerung des Blutdruckes abhängig sein. In der That leistet Salpeter in Hydrops mit vermindertem arteriellem Blutdruck weniger als Digitalis. Von Bedeutung ist gewiss die zuerst von Weikart für die Kalisalze nachgewiesene bedeutende Diffusionsgeschwindigkeit, in welcher Beziehung sich der Salpeter den kohlensauren und organischen Kaliumsalzen anreihet. Traube vermuthet, dass Salpeter und die salinischen Diuretica überhaupt die Widerstände vermindern, welche den Harnbestandtheilen durch die von ihnen zu passirenden Membranen entgegengesetzt werden. Selbst bei entzündlichen Leiden der Harnorgane hat man Kalisalper gegeben; doch ist dies nicht anzurathen, da (nach Ausweis der Vergiftungen) Reizung der Nieren durch grosse Dosen zu befürchten ist. Sehr häufige Anwendung findet Salpeter bei pleuritischen und pericarditischen Exsudaten, wo es sich um Anregung der Diurese handelt. Von geringerer Bedeutung ist er bei sonstigen Affectionen, wo er innerlich Anwendung gefunden hat. Paterson und Cameron empfahlen Salpeter (als Kaliumsalz) gegen Scorbut, Devilliers, Cavalier u. A. gegen Hämorrhagien (Hämoptysis, Metrorrhagie, hier meist mit Digitalis verbunden); Briquet behandelte Intermittens mit Kalisalper. Fernere Empfehlungen sind bei Incontinentia urinae im kindlichen Lebensalter (Delcours), bei Polydipsie, bei chronischem Rheumatismus, Cholera u. s. w. Ob das

Mittel bei Gonorrhoe, wo es als Antiphlogisticum in Ruf steht, mehr schadet oder nützt, bleibt dahin gestellt; grosse Gaben wirken entschieden reizend auf die Harnorgane.

Man reicht den Salpeter innerlich gewöhnlich zu 0,2—1,2 1—2-stündlich (2,0—8,0—10,0 im Tage), selten als Pulver oder sog. Sal Prunellae, meist in Solution stark verdünnt in Wasser, schleimigen Decocten und nöthigenfalls Emulsionen. Als Antiphlogisticum ist das Mittel in weit höheren Dosen angewendet; doch sind die Tagesgaben von Martin-Solon (30,0) bedenklich.

Das sog. Sal Prunellae, Nitrum tabulatum, Sore-throat-salt, Crystal minéral, ist geschmolzener und auf eine kalte Platte getropfelter Salpeter, welcher früher bei Polydipsie und Anginen zu 1—2 Stück Anwendung fand.

Aeusserlich wird Salpeter wegen der Eigenschaft, bei Auflösung in Wasser Wärme zu binden, als kühlendes Mittel benutzt.

Viel gebraucht wurden früher, besonders bei Kopfwunden, die Schmucker-schen Fomentationen, Fomentationes Schmuckeri s. frigidae, ursprünglich durch Mischen von 1 Th. Salpeter und 8 Th. Weinessig mit 80 Th. Wasser, später meist aus aa 1 Th. Salpeter und Salmiak, 12 Th. Essig und 40 Th. Wasser bereitet, welche man jetzt durch Eisblasen ersetzt. Sollen dieselben wirken, muss natürlicherweise die Auflösung der Salze bei der Application und nicht vorher in der Apotheke geschehen. Aehnlich wirkt Markwies Epithem (Badeschwamm mit Salpeter bestreut und von Zeit zu Zeit mit Wasser benetzt). Einstreuen von Salpeterpulver bei Hornhautflecken (Gastaldi) und Einreiben von solchem in Muttermäler (Mangenot), wobei Blasenbildung und Verschrumpfung resultiren soll, Application in Pulverform oder conc. Lösung bei Geschwüren und Brand, oder in Gurgelwässern (1:20—100) oder im Klystier (bei Pruritus ani) oder in Sitzbädern (mit 125,0 Salpeter bei Pruritus vulvae), haben gegenwärtig keine Bedeutung mehr.

#### Präparat:

**Charta nitrata** s. nitrosa; **Salpeterpapier**, Papier nitré. Dieses als Anti-asthmaticum in grossem Rufe stehende und auch nicht ohne Nutzen verwendete Präparat wird durch Tränken von Fliesspapier mit wässriger Salpeterlösung (1:5) und Trocknen erhalten. Man benutzt es in der Weise, dass man die aus dem verglimmenden Salpeterpapier aufsteigenden Dämpfe im Beginne eines asthmatischen Anfalls oder Abends vor dem Schlafengehen einathmen lässt. Es genügt zu diesem Zwecke  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  Quartblatt Charta nitrata, das man am besten auf einen Teller verbrennen lässt. Welchem der aus der Verbrennung des Salpeterpapiers entstehenden Gase die Wirksamkeit gegen die asthmatischen Beschwerden zukommt, steht dahin, vielleicht ist der dabei freiwerdende Sauerstoff nicht ohne Bedeutung. Nach Anderen soll dabei auch Cyanwasserstoffsäure in geringen Mengen auftreten. Man hat die Wirksamkeit des Salpeterpapiers noch dadurch zu erhöhen geglaubt, dass man den zur Tränkung des Fliesspapiers bestimmten Salpeter in einem Stechapfelblätter-Auguss löste (Salter) oder statt Papier Folia Belladonnae, Nicotianae oder Digitalis benutzte. Complicirter ist die Charta antiasthmatica densata von Hager (mit verschiedenen narkotischen Mitteln, Myrrha, Olibanum und Salpeter versetzter und zu Tafeln von 1 Mm. Dicke comprimierter Filtrirpapierbrei). Mit Benzoë-tinctur getränkte Charta nitrata bildet die sog. Charta balsamica nitrata, aus der man in Frankreich Cigaretten gegen Heiserkeit, sog. Cigarettes balsamiques contre l'aphonie, bereitet.

Der Salpeter war früher in verschiedenen Mischungen als Pulvis temperans gebräuchlich. An Stelle des unter diesem Namen bereits beim Weinstein besprochenen Gemisches (S. 605) dienen in älterer Zeit Mischungen von Salpeter und Kaliumsulfat mit oder ohne Zinnober (Pulvis antispasmodicus ruber und albus) oder mit Antimonoxyd (Pulvis resolvens stibiatus).

**Natrium nitricum**, Nitrum cubicum, Natrum nitricum depuratum; **Natriumnitrat**, gereinigter Chilisalpeter, Natronsalpeter.

Das Salz stellt farblose, durchscheinende, rautenförmige (nicht cubische!) Krystalle (ohne Krystallwasser) von salzig kühlend bitterem Geschmacke dar, welche sich in trockner Luft nicht verändern und in 1,5 Th. Wasser oder 50 Th. Weingeist löslich sind. Es wird durch Reinigen und Umkrystallisiren des als Düngmaterial und zu technischen Zwecken (Gewinnung von Kalisalpeter und Salpetersäure) in grossen Quantitäten verwendeten sog. Chilesalpeters gewonnen, welcher 4—10% Verunreinigungen (Nitrate, Chlorüre und Sulfate anderer Alkalien und Erden) enthält und sich in mächtigen Lagern an der Grenze von Chile und Peru findet.

Das Natriumnitrat schliesst sich hinsichtlich seiner Anwendung dem Kaliumnitrat im Wesentlichen an, an Stelle dessen es in Folge der Empfehlung von Rademacher eine Zeit lang vollständig getreten ist, besonders in fieberhaften Krankheiten, weil es weniger belästigend auf den Magen wirken sollte.

Die Differenzen der physiologischen Wirkung bei Kalium- und Natriumsalzen machen es a priori unwahrscheinlich, dass der Natronsalpeter ausgeprägte antipyretische Wirkung besitzt. Directe Versuche von Guttman zeigen, dass Natriumnitrat auch in grossen Dosen Frequenz und Energie der Herzcontractionen nicht afficirt, auch die Temperatur nicht herabsetzt. Bei Selbstversuchen von Jovitzu Démetre blieb sowohl Verminderung der Pulszahl als Verringerung der Harnstoffausscheidung aus. Einen lösenden Einfluss auf Fibrin besitzt das Salz allerdings, doch hängt ja davon, wie oben bemerkt, der günstige Effect des Salpeters bei fieberhaften Affectionen nicht ab. Ueber das Verhalten des Chilisalpeters zum Kalisalpeter als Diureticum fehlt jede genauere Untersuchung. Das endosmotische Aequivalent des Natriumnitrats ist dem des Magnesiumsulfats gleich und auch in purgirender Beziehung stehen sich beide Salze gleich. Aus dieser abführenden Wirkung erklären sich die Erfolge, welche man von Natrium nitricum bei Dysenterie beobachtet haben will (Rademacher, Meyer). Auf Croup- und Diphtheritismembranen wirkt wässrige Solution fast eben so lösend wie Kalkwasser (Küchenmeister).

In physiologischer Hinsicht erwähnen wir noch Löfflers Versuche mit grossen Dosen Chilisalpeter bei gesunden Personen (bis 150,0 in 8—12 Tagen), wonach sich vom 2. bis 4. Tage an Verlangsamung des Pulses, der zugleich weicher und schwächer wurde, Zunahme des spec. Gew. und bei Einzelnen auch der Menge des Harns, allgemeine Mattigkeit, psychische Verstimmung, Blässe des Gesichts eingestellt haben sollen und wobei das Blut reicher an Wasser und weissen Blutkörperchen geworden sein soll. Ob es bei diesen Versuchen sich um chemisch reines Natrium nitricum handelte, steht dahin. Der im Handel vorkommende Chilesalpeter hat mitunter Vergiftungen bei Thieren hervorgerufen, insbesondere bei Kühen, welche denselben in Substanz oder in Lösung verschlungen hatten. Die Vergiftung rührt hier offenbar vorzugsweise von der Entzündung der ersten Wege her, welche Chilesalpeter ebenso gut wie Kalisalpeter in conc. Form hervorbringt. Nach Barth (1879) kann in den tödtlich verlaufenen Vergiftungsfällen salpetrigsaures Natrium im Harn nachgewiesen werden, welches sich, ähnlich wie ausserhalb des Körpers im Contact mit Muskelsubstanz und anderen organischen Stoffen (Gscheidlen), auch im Organismus und theilweise schon im Darm bildet. Bei der grossen Giftigkeit des Natriumnitrats, welches mindestens 10mal so stark wirkt wie indifferente Natriumsalze (Chlornatrium), könnte das gebildete Natriumnitrit, welches vorzugsweise auf die rothen Blutkörperchen wirkt und Depression des centralen Nervensystems herbeiführt, bei der Intoxication eine gewisse Rolle spielen, indessen kommt bei Intoxication mit Chilesalpeter Natriumnitrit nur ganz ausnahmsweise im Blute vor und findet sich niemals im frischen Harne, selbst nicht bei Menschen, welche wochenlang 0,5—1,0 mit Natriumnitrit verunreinigten Natronsalpeter genommen hatten, wohl aber beim Stehen des Harns in Folge Einwirkung organischer Keime (Kobert).

Die Verordnung stimmt mit der des Kalisalpeters überein. Bei Ruhr



empfahl Rademacher 25,0 in 200,0 Wasser gelöst pro die. Auch äusserlich kann es wie Kalisalpeter als kühlendes Mittel gebraucht werden; eine Lösung in 2 Th. Wasser bildet den als örtliches Antiphlogisticum benutzten Liqueur *Natri nitrici Rademacheri*.

In ähnlicher Weise wie Kalium und Natrium nitricum ist auch Ammonium nitricum, *Nitras Ammoniae* s. *Nitrum flammans*, benutzt. Statt des krystallinischen Ammoniumnitrats, den man zu 0,5–1,5 reicht, lässt sich zweckmässiger eine Saturation von Ammoniumcarbonat mit Salpetersäure geben. Besonders gut dient dieses Salz zu Kältemischungen, indem bei Application von 150,0 in einem Eisbeutel mit dem gleichen Volumen Wasser die Temperatur von 16° auf 1,5° sinkt und noch nach einer Stunde sich unter 8° erhält (Rochelt).

Das Sulfoeyankalium oder Rhodankalium, dasjenige Kalisalz, an welchem zuerst die Wirkung der Kaliverbindungen auf die Muskulatur durch Claude Bernard dargethan wurde, hat bisher als Antipyreticum keine Anwendung gefunden. Als vermeintliches Antidot des Strychnins hat es sich in Versuchen von Legros und Dubreuil nicht bewährt.

**Veratrinum, Veratrin.** *Rhizoma Veratri, Radix Veratri albi, Radix Hellebori albi; weisse Nieswurzel.*

Das 1818 von Meissner in den *Fructus Sabadillae* (vgl. S. 216) entdeckte Alkaloid Veratrin ist nicht allein als Antipyreticum, sondern auch wegen seiner irritirenden Wirkung auf die Haut als Derivatium ein sehr geschätztes Medicament, welches das analog wirkende *Rhizoma Veratri albi* völlig aus der medicinischen Praxis verdrängt hat.

Das Veratrin bildet ein weisses oder graulichweisses, lockeres Pulver, ist geruchlos, erregt in den kleinsten Mengen in die Nase gelangend äusserst heftiges Niesen, schmeckt scharf brennend, löst sich in kaltem Wasser fast gar nicht, in kochendem Wasser schwierig, in 4 Th. Weingeist und 2 Th. Chloroform, weniger in Spiritus dil. und Aether, auch, unter Bildung von meistens gummiartigen Salzen, in verdünnten Säuren. Mit kochender Salzsäure giebt Veratrin rothe Lösung. Mit 100 Th. Schwefelsäure zerrieben, ertheilt es derselben grünlichgelbe Fluorescenz und später rothe Färbung; beim Bestreuen der in dünner Schicht ausgebreiteten schwefelsauren Lösung mit gepulvertem Zucker nimmt dieselbe gelbe, grüne und zuletzt blaue Farbe an, welche in einer Stunde zu erblassen beginnt. Von dem amorphen Veratrin scheint das von Merck in mehr als 1 Cm. langen, farblosen Prismen erhaltene sog. krystallinische Veratrin, kaum Cevadin genannt, chemisch, aber nicht physiologisch verschieden zu sein.

Das *Rhizoma Veratri* stammt von einer auf den Alpen und Pyrenäen, in Finnland und Südsibirien wachsenden Melanthacee, *Veratrum album* L. Die Droge stellt das dunkelbraune, aufrechte, bis 8 Cm. lange und 2–5 Cm. breite bis 25 Mm. dicke Rhizom mit den gelblichen, höchstens 3 Dm. langen und etwa 3 Mm. dicken Wurzeln dar. Der Querschnitt des Rhizoms zeigt in geringem Abstände von der Oberfläche eine feine, bräunliche, gezackte Endodermis, welche ein derbes, weissliches, amylnhaltiges Gewebe einschliesst, das von zahlreichen kurzen, unregelmässig verlaufenden Gefässbündeln durchzogen ist. Beim Kauen erregen Rhizom und Nebenwurzeln starkes Brennen und beim Einathmen in Pulverform heftiges Niesen. Das Rhizom von *Veratrum album* enthält nach den neuesten Untersuchungen kein Veratrin (Tobien), sondern vorwiegend Jervin, ein schon von Simon (1838) in der weissen Nieswurz aufgefundenes Alkaloid, welches weisse Krystalle bildet und sich gut in Alkohol, kaum in Wasser löst. Neben demselben enthält die Nieswurz nach Wright und Luff noch drei verschiedene Alkaloide, Veratralbin, Pseudojervin und Rubijervin. Die physiologischen Verhältnisse der letztgenannten Basen sind bisher experimentell nicht untersucht. Das Jervin scheint nicht der Träger der scharfen Wirkung der Nieswurzen zu sein, wohl aber für die Wirkungen derselben auf Puls und

Kreislauf in Anspruch genommen werden zu müssen. Nach Schroff wirken vorzugsweise die Wurzeln und von diesen ausschliesslich die Rindensubstanz. Letztere sind entschieden giftiger als das eigentliche Rhizom, welches selbst qualitativ verschiedene toxische Action zu haben scheint, da es nach Schroffs Versuchen keine tonischen Muskelcontractionen, sondern Reflexlähmung hervorruft. Es ist daher die Einführung des Rhizoma cum radicibus in die Pharmacopoe entschieden zweckmässig.

Das Veratrin, dessen Wirkungsverhältnisse bei der Bedeutungslosigkeit des Rhizoma Veratri hier ausschliesslich betrachtet werden, besitzt gleichzeitig ausgesprochene örtliche, sowohl auf der Haut als auf Schleimhäuten sich äussernde, irritirende Wirkung und eine entfernte Action auf Muskeln, Nerven, Herz- und Eigenwärme. Die Resorption erfolgt von fast sämtlichen Applicationsstellen, die Elimination nachweislich durch die Nieren (Prévost, Dragendorff und Masing).

In Salbenform oder spirituöser Lösung auf die äussere Haut gebracht, erregt Veratrin eigenthümliches Gefühl von Wärme und Prickeln, das sich manchmal bis zu Schmerzempfindung steigert und meist mit Gefühl von Kälte und Pelzigsein endigt; Veränderung der Hautfarbe resultirt dabei nicht, nur bei längere Zeit hindurch fortgesetztem Einreiben kann ein juckender frieselähnlicher Ausschlag (Turnbull, Forcke) entstehen. Minimale Mengen auf die Zunge gebracht, bedingen Kratzen im Halse und reflectorische Vermehrung der Speichelsecretion. Das schon oben erwähnte, mit anhaltendem Kitzeln verbundene, heftige Niesen nach Einführung von Pulvis Veratri oder äusserst geringen Mengen von Veratrin, welches dem Veratrum album den Namen Nieswurz verschaffte, kann selbst mehrere Stunden persistiren, und schon das unvorsichtige Oeffnen von mit Veratrin gefüllten Gläsern ist im Stande, 4 Stunden dauernden Nieskrampf hervorzubringen (L. van Praag). Nasenbluten und intensive Coryza, Ptyalismus, trockener Husten, Brennen im Schlunde können als Residuen der Irritation dem Niesen folgen (Delondre).

In den Magen gebracht ruft Veratrin in etwas grösseren Mengen leicht Brechneigung und Erbrechen, sogar Blutbrechen, sowie Durchfälle hervor. Intensivere Entzündungserscheinungen, wie sie nach Magendie Veratrin namentlich in den untern Darmpartien hervorbringen sollte, sind von späteren Beobachtern weder bei Menschen (Ritter) noch bei Thieren (Esche, van Praag) constatiert. Die brechenerregende und kathartische Wirkung tritt auch bei subcutaner und endermatischer Application von Veratrin ein.

Die Resorption des Veratrin scheint von der äusseren Haut aus im geringeren Grade stattfinden zu können, da nach fortgesetztem Einreiben von Veratrin salbe Wärmegefühl und Prickeln an entfernten Körperstellen und selbst unwillkürliches Zucken der Muskeln, des Mundes und der Augenlider (Turnbull, Forcke) bei Menschen entstehen, doch ist auch Uebertragung durch die Hände der eingeriebenen Patienten nicht undenkbar. Sicher nachgewiesen ist die Resorption von der Magenschleimhaut, von der Pleura und Tunica vaginalis (Magendie) und bei angesäuarter Lösung auch vom Unterhautzellgewebe aus.

Die entfernte Wirkung, welche bei höheren Gaben eine toxische ist, äussert sich bei Menschen und Thieren aus allen Classen der Vertebraten in der nämlichen Weise. Bei Menschen sind insonderheit die Wirkungen kleiner fortgesetzter medicinaler Dosen (0,004 bis 0,006) durch klinische Untersuchungen bekannt, bei denen sich ausser gastrischen Symptomen vorwaltend ein Sinken der Temperatur und des Pulses zu erkennen giebt.

Bei Vergiftungen von Menschen mit Veratrum album können auch Zuckungen, wie solche bei Vergiftungsversuchen an Thieren nach Veratrin constant vorkommen, eintreten.

Seit der Beobachtung von Bardsley, dass unreines Veratrin sofortige Verlangsamung des Pulses mit Schwächerwerden desselben und in grösseren Mengen Erbrechen, Ekel und reichliche Stuhlentleerungen bedingt, sind die Anfänge der Veratrinvergiftung von einer Reihe von Aerzten nach Erfahrungen am Krankenbette beschrieben. Nach Selbstversuchen von Esche (1836) bedingt Veratrin zu 0,006 in Pillenform Kältegefühl im Magen, zu 0,012 leichte Nausea, Appetitmangel, gelinden Schwindel, dumpfen Kopfschmerz, weichen Stuhlgang bei nicht vermehrter Diurese, und zu 0,024 ausserdem häufiges bitteres Aufstossen, Speichelfluss, Gefühl von Zusammenschnüren der Kehle, schliesslich Erbrechen und schleimigen Durchfall nebst grosser Schwäche. Nach 3 Mgm. essigsaurom Veratrin bekam Esche starken Collaps, Schwindel, Verdunklung des Sehvermögens, Blässe des Gesichts, kühle Haut, Beschleunigung, Schwäche und Irregularität des Pulses, später starke Vomituritionen, dann Zittern am ganzen Körper, Schweiss und Depression, welche etwa 1 Stunde anhielt. Zuckungen der Gesichtsmuskeln sind auch von L. van Praag nach 6 Dosen von 0,006, Zuckungen und Ziehen längs der Wirbelsäule von Ebers nach endermatischer Application von 0,006 Veratrin constatirt. Eine sehr genaue Schilderung der Erscheinungen nach Veratringebrauch verdanken wir Ritter nach den von Hasse im Göttinger Hospitale angestellten Versuchen bei Pneumonie. Hiernach kommt Würgen und Erbrechen reichlicher, bald grünlicher, bald galliger Massen, denen selbst Blut beigemischt sein kann, schon nach zweimaliger Darreichung von 0,006 vor, während die weit minder erhebliche Action auf den Darm erst später resultirt. Sinken der Körpertemperatur zeigt sich oft schon nach 3 Gaben, meist aber erst nach 7—10 Dosen von 0,003; der Puls steigt nach den ersten Gaben, nimmt dann aber rasch an Frequenz ab. Als Nebenerscheinung kommen Kratzen im Halse, Elendgefühl, bisweilen Salivation, vereinzelt krampfhaftes Schlucken vor. Eine constante Wirkung auf die Pupille findet nicht statt. Das Sensorium bleibt immer ungetrüb, nur wenn starker Collapsus eintritt, kann es zu Somnolenz kommen; auch zeigt sich vereinzelt ungewöhnliche Abnahme des Gehörs (Kocher). Die dem Veratrin von Ebers zugeschriebene diuretische Wirkung ist von spätern Beobachtern nicht constatirt. Bei dem Auftreten toxischer Erscheinungen nach Veratringebrauch sind Excitantien indicirt; Kocher fand besonders den Liqueur Ammonii anisatus zu 10—15 Tr. wirksam, wodurch auch rasche Stillung des Erbrechens erfolgt, Reiche empfahl schwarzen Kaffee mit Citronensaft.

Das wichtigste Vergiftungssymptom bei Thieren ist eine anfallsweise auftretende tetaniforme Steifigkeit der Muskeln, welche sich zunächst an den Extremitäten, später am ganzen Körper äussert, die sich langsam in fibrilläre Zuckungen auflöst und schliesslich completer Lähmung der Muskeln Platz macht. Diese Muskelcontractur ist nicht mit einer Steigerung der Reflexerregbarkeit verbunden und macht sich besonders bei Bewegungsversuchen und localen Reizen geltend. Daneben sind auch die Erscheinungen örtlicher Reizung, Speichelfluss, Brechanstrengungen und Erbrechen, wo dieses möglich ist, und vermehrte Kothentleerung (bei grösseren Dosen) vorhanden. Der Herzschlag ist anfangs beschleunigt, später, und zwar oft schon vor Eintritt des Erbrechens, verlangsamt, unregelmässig und schwach; die Temperatur sinkt oft um mehrere Grade, die Diurese wird auch bei Thieren nicht vermehrt. Bei stärkerer Intoxication wird auch die Respiration beengt und gehemmt. Der Tod, welcher auch nach sehr grossen Dosen bei Säugethieren selten vor 5 Min. erfolgt, scheint mehr asphyktisch als synkoptisch zu sein. Der Herzstillstand ist diastolisch (Magendie, Esche, Forcke, van Praag, Köl liker, Leblanc und Faivre, Schroff, Guttman).

Als die auffallendste physiologische Wirkung des Veratrins er giebt sich danach Vernichtung der Erregbarkeit der quergestreiften Muskeln nach vorausgegangener Steigerung der Erregbarkeit in der Weise, dass auf einen einfachen Reiz des Muskelnerven oder des Muskels selbst nicht eine kurze Zuckung, sondern eine sich nur langsam wieder lösende tetanische Contraction erfolgt (Köl liker, Guttman, Bezold und Hirt).



Der Muskel entwickelt bei dieser Contraction mehr Wärme als unter normalen Verhältnissen (Böhm und Fick). Die Hubhöhe wird an Frosch- und Warmblütermuskeln um das Doppelte bei Anwendung kleiner Dosen gesteigert. Rückenmarksdurchschneidung modificirt die Muskelwirkung nicht. Dieselbe tritt auch nach vorheriger Lähmung der Nervenendigungen ein (Prévost); die Erregbarkeit der letzteren wird zuerst erhöht, später vernichtet, und zwar zuerst die der Endapparate (Böhm und Fick). — Auch auf den Herzmuskel wirkt Veratrin in ähnlicher Weise wie auf die quergestreiften willkürlichen Muskeln (Sidney Ringer). — Nach Bezold und Hirt wirken kleine Dosen zuerst beschleunigend, dann verlangsamen, grosse sofort verlangsamen und schliesslich lähmend. Diese Wirkung ist z. Th. Folge erhöhter Action des Vagus, dessen Enden im Herzen gelähmt werden (Böhm). Auch das vasomotorische Centrum wird durch Veratrin zuerst gereizt, später gelähmt; der Blutdruck sinkt bei unversehrten Vagi, bei durchschnittenen nach voraufgehender Steigung. In kleinen Gaben reizt Veratrin die sensibeln Vagusendigungen der Lunge und wirkt auf das Athmungscentrum in der Medulla oblongata hemmend; in grossen lähmt es auch die Vagusendigungen in der Lunge (Bezold und Hirt).

Therapeutisch kommt Veratrin in erster Linie wegen seiner irritirenden Wirkung auf die Haut als Ableitungsmittel bei schmerzhaften, namentlich neuralgischen Leiden, wo es sich als vortreffliches Palliativum, nicht selten auch als wirkliches Heilmittel bewährt, in Betracht.

Das zuerst von Bardsley bei Ischias und von Turnbull bei Gesichtsschmerz und verschiedenen andern Neuralgien verordnete Mittel ist keinesweges ein blosses Palliativum, sondern kann da, wo nur functionelle Störungen der Nerven vorliegen, radicale Heilung bedingen (Cunier, Forcke). Selbst invertirte Fälle können dadurch geheilt werden, doch ist der Erfolg bei frischen sicherer. Zur Erzielung des Heileffects muss das Mittel örtlich epidermatisch applicirt werden. Innerliche Darreichung nützt nichts. Auch bei andern Schmerzen, z. B. rheumatischen, sind Einreibungen von Veratrinsalbe manchmal von Erfolg. Turnbull empfahl solche auch bei scrophulösen und rheumatischen Anschwellungen von Drüsen und Gelenken. — Nicht irrational würde auch der Gebrauch des Veratrins bei chronischen Hautkrankheiten sein, doch scheint es hier weniger als andere Medicamente zu leisten, welche lebhafte Hyperämie bedingen (z. B. Theerpräparate). M. Langenbeck empfahl Inoculation von Veratrin bei schuppigen Hautkrankheiten. Früher stand dabei die weisse Nieswurz in Form von Salben (1:5—10), Abkochungen (1:50) oder Macerationen mit Weingeist oder Brantwein in Ansehen. Namentlich geschätzt war das Rhizoma Veratri bei manchen parasitären Hautaffectionen, z. B. Scabies (Bestandtheil der Wilkinsonschen Salbe), Epheliden, Pityriasis versicolor (wo die von Lilienfeld und Spengler empfohlene Tinct. Veratri albi sich in der That trefflich bewährt), selbst bei Favus, wo das ebenfalls von Küchenmeister angerathene Veratrin jedoch nicht sicher wirkt, da es nach Hebra die tiefer sitzenden Favuspilze nicht zerstört. Jedenfalls sind Veratrinpräparate hier entbehrlich.

Das Nämliche gilt auch in Hinsicht der Anwendung des Veratrins und des Rhizoma Veratri als örtliche Reizmittel auf verschiedenen Schleimhäuten. Die Empfehlung des Veratrins als Drasticum bei Obstipation alter Leute und bei apoplektischen Anfällen (Magendie) ist bei der grossen Zahl sicher wirkender Drastica ohne Bedeutung. Im Alterthume, wo die Nieswurz im hohen Ansehen stand, lag allerdings, wie Schroff richtig hervorhob, in der Unbekanntheit der Griechen und Römer mit minder gefährlichen Brech- und Abführmitteln ein Grund für ihre Anwendung. Als Brechmittel dient sie jetzt nur noch in der Veterinärpraxis. Ebenso ist der Gebrauch als Niesmittel fast ganz ausser Cours. Die äusserst heftigen Effecte sehr geringer Mengen Nieswurzpulver machen die Benutzung als Sternutatorium unzweckmässig und selbst gefährlich, jedenfalls ist Nieswurzpulver niemals allein, sondern stets mit 5—20 Th. Amylum oder Pflanzenpulver versetzt zu geben. Ein nieswurzhaltiges Sternutatorium ist der sog. Schneeberger Schnupftabak.

Die entfernten Wirkungen des Veratrins auf Puls und Körpertemperatur machen dasselbe zu einem trefflichen Antipyreticum, welches namentlich bei acutem Gelenkrheumatismus (Piédagnel, Trousseau, Bouchut, Aran, Hasse) und bei Lungenentzündung (Aran, W. Vogt, Hasse, Biermer und Kocher) treffliche Dienste leistet, dagegen im Typhus und überhaupt in Fällen, wo der Eintritt von Collapsus zu befürchten steht, durch andere Antipyretica (Chinin, Spiritus) zu ersetzen ist.

Die antipyretischen Effecte des Veratrins zeigen sich am intensivsten bei hochgradigem Fieber. Sie zeichnen sich vor denen der Digitalis durch die Raschheit ihres Eintrittes aus. Neuerdings ist indessen Veratrin durch die Salicylsäure und die Salicylate verdrängt, die bei Polyarthritis rheumatica mehr leisten. Die Veratrinbehandlung der Pneumonie führt in etwa  $\frac{1}{3}$  der Fälle zu dauernder Remission oder totalem Abschlag des Fiebers und bei fast der Hälfte der Kranken zu vorübergehender Remission, welche erst beim Fortgebrauche des Mittels zu einer definitiven wird; der locale Process scheint in einzelnen Fällen beschränkt werden zu können, doch ist dies im Allgemeinen nicht der Fall. Inwieweit die Dauer der Pneumonie abgekürzt und die Reconvalescenz durch das Mittel beeinflusst wird, ist aus den Beobachtungen nicht völlig ersichtlich. Für die Wahl des Veratrins als antifebriles Mittel bei Lungenentzündung ist vor Allem günstiger Kräftezustand des Kranken und hohe Fiebertemperatur entscheidend. Bei subacut verlaufenden Pneumonien ist es ohne Nutzen, bei schwächlichen Personen schädlich. Bei Rheumatismus acutus bedingt Veratrin ausser rascher Defervescenz auch Linderung der localen Schmerzen, manchmal Beseitigung derselben, in einzelnen Fällen von Complication mit frischer Herzaffection schwindet letztere auffallend rasch (Hasse). Unter allen Umständen ist bei der Verwendung des Veratrins als Antipyreticum sorgfältige Ueberwachung des Patienten notwendig, um bei Eintritt von Collaps die nöthigen Massnahmen sofort treffen zu können, ein Umstand, der in der Privatpraxis manchmal von dem Mittel absehen lässt. Die sonstigen Nebenerscheinungen haben keine Bedeutung und sind bei Pneumonie zum Theil sogar nützlich.

Minder motivirt erscheint der Gebrauch des Veratrins als eigentliches Antirheumaticum (innerlich gegen Rheumatismus chronicus gebraucht) und bei Herzkrankheiten auf rheumatischer oder gichtischer Basis, ferner bei Palpitationen (Turnbull), ebenso bei den verschiedenen Nervenleiden, wo dasselbe Empfehlung fand. Die eigenthümliche Steigerung des Muskeltonus durch Veratrin liesse vielleicht von der innern Application sehr kleiner Dosen bei manchen Lähmungen Günstiges erwarten, doch ist bisher das Mittel bei Peralysen nur äusserlich benutzt. Der Erfolg ist hier weit weniger prägnant und rasch als bei Algien; die meisten Chancen scheinen rheumatische Lähmungen zu bieten (Turnbull, Gebhard), doch wird auch mehrwöchentliche Einreibung in das Rückgrat bei Parese der Extremitäten in Folge excessiver Samenentleerungen oder von Rheuma, ebenso bei Paralyse der Sphinkteren empfohlen (Reiche). Inwieweit das Veratrin bei Rückenmarkslähmung wirksam sein kann, ist aus den bisherigen Beobachtungen nicht ersichtlich; die von Einzelnen behauptete Steigerung der Reflexerregbarkeit durch kleine Dosen Veratrin scheint nach den Erfahrungen am Krankenbette völlig problematisch. Noch weniger ergeben die physiologischen Beobachtungen Anhaltspunkte für die Benutzung bei Lähmungen sensorieller Nerven (Amblyopie, Gehörsschwäche). Verschiedene Aerzte haben Veratrin innerlich und äusserlich bei Keuchhusten versucht, andere bei Hypochondrie und Hysterie, Schreibekrampf (Reil), Chorea und Paralysis agitans. Die Erfolge sind hier sehr variirend. Die Nieswurz wurde in früherer Zeit als vorzügliches Sedativum bei Geisteskrankheiten betrachtet und kann hier durch Herbeiführung des mit Nausea verbundenen Zustandes allgemeiner Schwäche allerdings beruhigend wirken; directe sedirende Wirkung auf das Gehirn fehlt dem Mittel dagegen ganz.

Das Veratrin wird als Antipyreticum am besten in Pillen mit einem bittern Extracte gegeben.

In Pulvern oder in spirituöser Lösung, z. B. als Magendies Tinct. Veratrini (1:150 Th. Spiritus), lässt es sich schlecht nehmen. Aran gab Veratrin in Pillen mit Opiumextract zur Verhinderung des Erbrechens. Die beste Administrationsweise ist die Darreichung von 5–8 Dosen von 0,005–0,008 in stündlichen Intervallen (Aran, Hasse). Kocher empfiehlt, Veratrin zu 0,003–0,005 so lange zu verabreichen, bis starker Ekel und Erbrechen oder erheblicher Temperaturabfall eintritt. Die Phkp. setzt als höchste Einzelgabe 0,005, als höchste Tagesgabe 0,02. Beim Rheum. acut. der Kinder giebt Bouchut 0,001–0,003 pro die. Zu subcutaner Injection lässt sich eine Lösung von 1 Th. Veratriu in aa 100 Th. Spiritus und Wasser administrieren; conc. Lösungen erregen lebhaften Schmerz und Entzündung; die Dosis ist zu 0,0015–0,002 zu nehmen, da 0,003 hypodermatisch applicirt leicht zu stark wirken (Eulenburg).

Zur Hervorrufung örtlicher Wirkungen dient meist die Salbenform, seltener alkoholische Lösung (1:20–100).

Spirituöse Lösung wird besonders im Gesicht bei Zahnschmerz oder Augenaffectionen, z. B. Keratitis rheum. (Aliès), Iridochoioiditis (Martin), Photophobie (Cunier), benutzt, wobei Contact der Bindehaut und Nasenschleimhaut sorgfältig zu meiden ist. Zur Salbe nimmt man 0,2–0,5 auf 25,0 Fett, wobei man, wie im Unguentum Veratrini Ph. Br., das Alkaloid vorher mit 2,0 Olivenöl verreiben lassen kann. Die stärkeren Salben sind namentlich bei Lähmungen in Gebrauch, in allen Fällen aber muss man so lange einreiben, bis Wärmegefühl und Prickeln in ziemlich hohem Grade (nach Forcke sogar in einem der Intensität des neuralgischen Schmerzes gleichkommenden Grade) sich manifestiren. Zur Inoculation bei Rheumatismus benutzte Lafargue 0,001 bis 0,002.

Das Rhizoma Veratri wird am zweckmässigsten zum innerlichen Gebrauche gar nicht verwendet. Schon 0,2 können heftiges Erbrechen und Purgiren herbeiführen. Auch die äusserliche Anwendung ist entbehrlich. In Oesterreich ist eine Tinct. Veratri albi (1:5) officinell, welche zu 5–10 Tropfen als Antipyreticum gebraucht werden kann.

#### Verordnungen:

1)	R	2)	R
	<i>Veratrini</i> 0,03–0,05 (cg. 3–5)		<i>Veratrini</i> 0,1–0,2
	<i>Extracti Gentianae</i> 0,8		<i>tritum cum</i>
	<i>Pulveris rad. Alth. q.-s.</i>		<i>Oleo Olivarum</i> 1,0
			<i>Axingiae porci</i> 15,0
<i>ut f. pilul. No. 10. Consp. D. S.</i>			
Stündlich 1 Pille, bis Erbrechen oder deutliche Wirkung eintritt. (Bei Pneumonie, Rheumatismus acutus.)		<i>M. D. S.</i>	Zum Einreiben. (Bei Neuralgie.)

**Anhang.** Auch andere Species der Gattung *Veratrum* haben medicinische Verwendung gefunden. Der Wurzelstock der auf dem Riesengebirge wachsenden, als *Veratrum Lobelianum* Bernhards bezeichneten Spielart der weissen Nieswurz, welcher in seiner Giftigkeit demjenigen von *Ver. album* nachsteht (Schroff jun.), dient zur Bereitung einer Tinctur, welche von Hubeny zu 3–5 Tropfen als Specificum gegen Cholera, so lange nicht paralytische Erscheinungen eingetreten sind, dringend empfohlen ist. Wichtiger ist das besonders in Amerika ganz nach Art des Veratrins benutzte Rhizom von *Veratrum viride* L. Dasselbe enthält kein Veratrin, vorzugsweise Jervin (Viridin) und einen zweiten als Veratroidin bezeichneten alkaloidischen Körper und ein irritirend auf den Tractus wirkendes Harz. Das Jervin ist nach H. C. Wood das die Herabsetzung der Circulation bedingende active Princip von *Veratrum viride*, welches vor dem Veratrin den für die therapeutische Anwendung sehr wichtigen Vorzug besitzt, dass es nicht örtlich irritirend wirkt und weder Erbrechen noch Durchfall hervorruft. In toxischen Dosen bedingt es bei Warmblütern zuerst Unlust zu Bewegungen, dann bei Schwächezunahme Zittern und fibrilläre Zuckungen aller Muskeln, setzt Energie und Frequenz des Herzschlages stark



herab, erniedrigt den Blutdruck und tödtet durch Lähmung der Athemmuskeln bei intactem Bewusstsein, jedoch bei herabgesetzter Sensibilität und Reflexaction. Das Veratroidin wirkt emetokathartisch, verringert den arteriellen Blutdruck und die Pulsfrequenz anfangs, steigert diese aber später wieder und ruft in viel geringerem Grade als Jervin Krämpfe und fibrilläre Muskelzuckungen hervor (Wood). Das Rhizoma Veratri viridis dient vorzugsweise in der Form einer Tinctur, Tinctura Veratri viridis, welche nach dem Vorgange von Norwood bei Pneumonie und fieberhaften Krankheiten überhaupt zu 5—10—25 Tropfen stündlich oder mehrstündlich, bis Herabsetzung des Fiebers eintritt, gereicht wird. Dieses Präparat, das nach Squarey beim Gesunden starke Herabsetzung der Pulsfrequenz und minder ausgesprochenes Sinken der Temperatur, sowie zu mehr als 20 Tropfen stets Nausea und Erbrechen bedingt, wird von Oulmont und Linon (1868) wegen seiner die Digestion weit weniger beeinträchtigenden Wirkung dem Veratrin und der aus Veratrum album bereiteten stärker wirkenden Tinctur vorgezogen. Dieselben empfehlen auch ein Extrait résineux aus Veratrum viride zu 0,01 in Granules, bei Männern stündlich, bei Frauen 2—4stündlich.

Zu den Antipyretica gehört die als Radix Christophorae Americanae bezeichnete Wurzel von Cimicifuga racemosa Bart. (Fam. Ranunculaceae), indem sie die Herzaction in bedeutendem Maasse beschränkt, Schwindel, undeutliches Sehen, Uebelkeit und Erbrechen, jedoch keine Beeinträchtigung des Sensoriums erregt (Wood, Garden). Sie wird zu 1,0—4,0 in Substanz oder in Form einer Tinctur (zu 30—60 Tropfen) bei acutem und chronischem Rheumatismus (Bartlett), nervösem Kopfschmerz, Hysterie, Epilepsie (Wood), Chorea (Young), Phthisis (Garden) empfohlen.

#### **Folia Digitalis, Folia Digitalis purpureae; Fingerhutblätter.**

Einen Uebergang zu der folgenden Classe der Neurotica bilden die Folia Digitalis, insofern sie von den übrigen Antipyretica sich dadurch unterscheiden, dass sie vorwaltend durch eine auf die Herznerven gerichtete Action eine Herabsetzung der Pulsfrequenz herbeiführen, während dadurch die Temperatur selbst bei Kranken nur um einige Zehntelgrade herabgesetzt wird. Die Droge, der Hauptrepräsentant der sog. Herzgifte, stellt die zur Zeit der Blüthe von wildwachsenden Exemplaren gesammelten Blätter von Digitalis purpurea L., einer bei uns und im grössten Theile Europas einheimischen, namentlich in Bergwaldungen wachsenden, krautigen Scrophularinee, dar.

Der rothe Fingerhut, durch seine grossen fingerhutförmigen Blüthen eine beliebte Zierpflanze unserer Gärten, hat zahlreiche bodenständige, stumpfeiförmige, höchstens 3 Dm. lange und 5 Cm. breite Blätter und mehr oder minder zugespitzte Stengelblätter, welche sich beide in den Blattstiel verschmälern und am Rande gesägt, sowie in Folge starker, spitzwinkliger, namentlich unterseits stark hervortretender Nerven etwas uneben und starr erscheinen; auf der Unterfläche finden sich dicht gedrängte, weiche, grauliche Haare, welche aus einer Anzahl bandartig zusammenfallender, kurzgegliederter Zellen bestehen, wodurch sie sich leicht von den in der Form ähnlichen Blättern von verschiedenen Verbasumarten (durch ästige Sternhaare dicht filzig), Symphytum officinale L. (sehr rauh; borstig, ganzrandig) und Inula Conyza DC. (unterseits lebhafte grün, durch abstehende Haare rauh, gar nicht oder wenig gesägt) unterscheiden. Der bittere, widrige Geschmack, welcher den Fingerhutblättern eigenthümlich ist, schützt ebenfalls vor diesen Verwechslungen. Die Fingerhutblätter geben mit dem zehnfachen Gewichte kochenden Wassers einen bräunlichen, lakmusröthenden, widerlich bitteren, nicht aromatischen, aber eigenartig riechenden Auszug, in welchem durch Eisenchlorid zunächst dunklere Färbung, später ein brauner Absatz entsteht und in welchem Gerbsäurelösung reichlichen, von

überschüssigem Tannin nur schwer aufgelösten Niederschlag erzeugt. Bei längerer Aufbewahrung verringert sich die Wirksamkeit der Fingerhutblätter.

Als das wirksame Princip der Digitalisblätter sind verschiedene, meist glykosidische, stickstofffreie Stoffe anzusehen, welche zum grössten Theile in derselben Richtung als Herzgifte wirken, jedoch in Bezug auf die Stärke ihrer Action wesentlich abweichen.

Die im Handel unter dem Namen Digitalin vorkommende Substanz ist nach den Untersuchungen Schmiedebergs ein Gemenge von verschiedenen (mindestens fünf) reinen Stoffen, denen sich nicht selten noch Spaltungsproducte eines oder des anderen, die übrigens vielleicht ebenfalls schon in der Pflanze entstehen, zugesellen. Von den reinen Glykosiden ist eines, das Digitin, ohne Wirkung auf den Organismus. Ein zweites, das Digitonin, steht in Eigenschaften und Wirkungen dem Saponin nahe. Die übrigen Stoffe, welche als Digitoxin, Digitalin und Digitalein bezeichnet werden, sind starke Herzgifte, unter denen das bei der Spaltung keinen Zucker liefernde Digitoxin als Gift die höchste Stelle einnimmt. Verschiedene Spaltungsproducte der letztgenannten Glykoside (Toxiresin, Digitaliresin) wirken nicht auf das Herz, sondern erregen Krämpfe nach Art des Pikrotoxins. Das Digitoxin kann schon zu 0,0001 systolischen Ventrikelstillstand beim Frosche bedingen und tödtet Katzen zu 0,001. Bei Menschen kann 0,001 zu ziemlich heftiger Vergiftung führen (Koppe). Digitalin und Digitalein tödten Frösche zu  $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$  Mgm.

Das Digitoxin ist der Hauptbestandtheil des krystallisirten Digitalins, für welches Nativelle 1872 den Orfilaschen Preis erhielt und das in seiner Wirkungsintensität dem Digitoxin nicht viel nachgiebt. Das mit dem Digitoxin in seiner Unlöslichkeit in Wasser übereinstimmende Digitalin bildet den Hauptbestandtheil der Digitaline chloroformique von Homolle u. Quevenne. Das Digitalein unterscheidet sich von dem Digitoxin und Digitalin durch seine Löslichkeit in Wasser und bildet mit dem Digitonin vorzugsweise den activen Bestandtheil des in Deutschland producirt Digitalins. Es ist daher durchaus nicht gleichgültig, welche der im Handel unter dem Namen Digitalin befindlichen Präparate man in praxi anwendet. Das französische Digitalin bildet feine, weisse, seidenglänzende Nadeln oder Krystallschüppchen von intensiv bitterem und lange anhaltendem, jedoch sich langsam entwickelndem Geschmacke, die sich auch in kochendem Wasser äusserst wenig, in Aether und Benzol gar nicht, wohl aber in Chloroform und kaltem oder warmem Alkohol lösen. Das deutsche Digitalin ist amorph, bitter und in Wasser zum grössten Theile löslich. Nach den Untersuchungen von Nativelle ist der Gehalt der wilden Pflanzen an activen Principien viel grösser als der der cultivirten und beträgt im Maximum vor Entwicklung der Blüthe vom Digitalin  $\frac{1}{10}$  und vom Digitalein etwa 1% in den Blättern, von letzterem 2% in den Samen, welche kein Digitoxin enthalten. Uebrigens scheinen die Mengen der activen Principien in käuflichen deutschen Digitalisblättern weit geringer zu sein (Böhm und Görz).

Von sonstigen Digitalinstoffen will Homolle eine eigenthümliche Säure, die Digitaleinsäure, zu 0,45 unter Erscheinungen toxisch wirken gesehen haben, welche denen des Digitalins entsprechen; vielleicht war letzteres in kleinen Mengen beigemischt. Die Blätter enthalten auch Inosit.

Die Folia Digitalis und ihre activen Principien äussern vorwiegend entfernte Wirkung; doch kann ihnen örtliche erethistische Action nicht abgesprochen werden.

Die im Handel vorkommenden Gemenge activer Digitalisstoffe bedingen endermatisch und hypodermatisch Symptome örtlicher Reizung in Form von Infiltraten und Erysipelen (Homolle und Quevenne, Lorent, Erlenmeyer); wässrige Digitalinlösung erregt bei Application auf die Oberhaut nur Abnahme der Gefühlsperception (Hoppe). Auf die örtliche Entzündung ist das von einzelnen Beobachtern (Otto) constatirte sog. Digitalinfieber nach Subcutaninjection, das übrigens keineswegs constant ist, zu beziehen. Auf der Conjunctiva ruft Digitalin Schmerz hervor und bedingt 12—15 Stdn. lang anhaltende Trü-

lung des Gesichts, Funkensehen und leichte Pupillendilatation, auf die Nasenschleimhaut gebracht erregt es heftiges Niesen (Homolle und Quevenne). Auch bei interner Application von Digitalispräparaten erfolgen häufig nicht allein Störungen der Digestion (besonders bei längerem Gebrauche), sondern auch Erbrechen und selbst Durchfall; doch treten diese Erscheinungen auch nach subcutaner Einführung bei Thieren als entfernte Erscheinungen hervor und ist ihre Deutung als locale Symptome somit problematisch. Eigentliche entzündliche Erscheinungen kann man auf der Darmschleimhaut nach intern eingeführtem Digitalin nicht vorfinden. Die Resorption der wirksamen Digitalisstoffe erfolgt auch von der äusseren Haut, z. B. bei Application von Digitalistinctur. Die Schicksale der Digitalisstoffe bedürfen noch weiterer Untersuchungen. Dragendorff und Brandt wiesen Spuren von Digitalein im Urin damit vergifteter Thiere nach.

Die entfernten Wirkungen der Fingerhutblätter bieten beim gesunden Menschen allerdings nach der Verschiedenheit der Dosis und nach der Individualität einige Differenzen, doch giebt sich ihre Wirkung insbesondere bei mittleren Gaben in einer Steigerung der Energie der Herzcontractionen und einer nicht unbedeutenden Abnahme der Pulsfrequenz zu erkennen.

Bei kleineren Gaben wird der Herzschlag mitunter anfänglich beschleunigt, geht aber namentlich bei Wiederholung derselben bald in verlangsames Tempo über. Mit dem Eintritte der Herzverlangsamung nach Verabreichung etwas grösserer medicinaler Gaben zeigen sich nicht selten gleichzeitig, fast immer aber nach Wiederholung derartiger Dosen, Nebenerscheinungen seitens des Tractus (weniger nach Digitalin als nach Digitalis selbst) und seitens der Nerven, erstere vorzugsweise in Verminderung des Appetits, Nausea, mitunter selbst Erbrechen, ausnahmsweise auch in Diarrhoe, letztere in Kopfschmerzen, Eingenommenheit des Kopfes und Schwindel, mitunter auch in Flimmern vor den Augen und in peripherischen rheumatismüsähnlichen Schmerzen sich äussernd. Die Verlangsamung der Herzaction kann beim Gesunden nach nicht zu kleinen Dosen 10–20–30 und mehr Schläge in der Minute betragen; sie tritt dann meist nach 2–3 Stdn. ein, erreicht aber ihr Maximum erst nach 12–24 Stdn. und überdauert die Darreichung der Digitalispräparate längere Zeit. Werden grössere Dosen wiederholt hintereinander verabreicht, so kann es zu schweren und selbst tödtlichen Vergiftungserscheinungen kommen, die sich theils als Steigerung der gastrischen und nervösen Erscheinungen, insbesondere wiederholtes unstillbares Erbrechen, darstellen, theils unter starker Muskelschwäche und Collaps verlaufen.

Von den verschiedenen Beobachtern, welche seit der Einführung der Digitalis in den Arzneischatz durch Withering die Wirkung medicinaler Gaben an Kranken prüften oder welche mit Fingerhutpräparaten, wie Saunders, Hutchinson, John Moore, Bidault u. A., an Gesunden experimentirten oder mit den reinen Principien, wie Stadion mit Digitalin, Görz mit Digitalein und Koppe mit Digitoxin, an sich selbst Versuche anstellten, wird wiederholt auf die eigenthümliche Reizbarkeit und Erregbarkeit des Herzens hingewiesen, in der Art, dass die geringste Körperbewegung, z. B. das Trinken von warmen Flüssigkeiten, bedeutendes Steigen des Pulses hervorruft. Dieser Umstand macht ein exactes Studium der Herzwirkung der Digitalis bei Gesunden äusserst schwierig. Beträchtliche und dauernde Herabsetzung des Pulses lässt sich nur bei ruhigem Verhalten im Bette constatiren. Schon Baillou machte darauf aufmerksam, wie sein eigener Puls, der durch Digitalis beim Liegen im Bette von 110 auf 40 sank, beim Aufsitzen auf 70 und beim Aufstehen auf 100 Schläge stieg. Ausserdem scheint die Empfindlichkeit der einzelnen Individuen gegen Digitalis eine äusserst verschiedene zu sein. Bei schwachen Constitutionen zeigt sich die Verminderung des Pulses eclatanter als bei robusten und plethorischen Individuen. Einzelne Personen bekommen schon nach ausserordentlich kleinen Mengen Nausea und Erbrechen.

Die cumulative Wirkung kleiner Dosen kennen wir mehr aus Erfah-



rungen am Krankenbett als aus Beobachtungen an Gesunden, doch zeigen die Selbstversuche Stadios die Anfänge dieser Wirkung in charakteristischer Weise, besonders die Steigerung der nervösen Nebenerscheinungen. Auch Homolle hat dieselben in Selbstversuchen beobachtet. Die leichten Formen solcher durch cumulative Wirkung entstandenen Vergiftungen beschränken sich auf Brechreiz, Kopfweh und Delirien, welche innerhalb 24 Stunden verschwinden und denen ein Gefühl von Schwäche im Epigastrium, etwas Uebelsein, Spannung über den Orbitae, dumpfes Gefühl im Kopfe und Gesichtsverdunklung vorhergehen (Homolle und Quevenne). In andern Fällen kommt es zu Schlaflosigkeit und wirklicher Verwirrung der Sinne, Hallucinationen, Funkenschen, Ohrensausen und Pupillenerweiterung. Der Puls ist dabei meist verlangsamt, klein und intermittierend, die Herzaction irregular und tumultuarisch. In schweren Vergiftungen, wie sie z. B. Leroux, Chereau, Trèves u. A. nach Digitalin beobachteten, tritt zu diesen Erscheinungen Präcordialangst, Kühle der Haut, kalter Schweiß und grosse Schwäche hinzu. Hier können die Symptome in 7–8 Tagen schwinden, aber auch den Tod durch Synkope im Gefolge haben.

Die intensivsten Effecte zeigt Digitalis und Digitalin nach den Versuchen an Thieren bei Infusion in die Venen. Die Subcutaninjection erfordert geringere Dosen als die interne Darreichung. Bei innerer Application bedingt die drei- und selbst die fünffache Dosis bei Kaninchen nicht so markirte Wirkung wie die endermatische (Homolle).

In Bezug auf die Wirkung bei Thieren ergiebt sich eine Modification durch die Thierspecies. Wie schon Stannius fand, wirkt Digitalin auf Carnivoren (Katzen, Hunde, Eulen, Raben) weit stärker giftig als auf Herbivoren (Kaninchen, Tauben) und gilt dies sowohl für Homollesches als für Mercksches Digitalin. Auch für Kaltblüter (Tritonen, Frösche) ist Digitalis Gift; der von Stannius als sehr resistent gegen Digitalinwirkung bezeichnete Frosch zeigt zufolge seiner Organisation allerdings erst spät Intoxicationssymptome, erleidet jedoch schon durch  $\frac{1}{3}$  Mgm. systolischen Herzstillstand; Kröten ertragen die zehnfache Menge (Vulpian). Hühner und Tauben toleriren weit mehr Digitalin als Säugethiere. Als Symptome der Digitalinwirkung in toxischen Dosen ergeben sich wiederholtes Erbrechen bei solchen Thierspecies, welche brechen können, manchmal Abgang von Koth und Urin, Verlangsamung des Herzschlages, Erweiterung der Pupille, Zustand von Collapsus oder Coma bei rascher Wirkung grosser Dosen und manchmal auch bei kleineren Gaben Convulsionen kurz vor dem Tode. Charakteristisch für den Tod durch Digitalis ist, dass der Stillstand des Herzens vor dem Erlöschen der Respirationsbewegungen eintritt und dass der Herzmuskel nach dem in Systole erfolgten Stillstande des Herzens sehr rasch seine Fähigkeit, sich auf mechanischen oder elektrischen Reiz zu contrahiren, einbüsst. Die Wirkung auf das Herz verhält sich bei Säugethiern und Fröschen nach den Dosen verschieden, bei kleinen Dosen erfolgt vorübergehende Verlangsamung, bei grösseren anfangs Verlangsamung, dann Beschleunigung und bisweilen vor dem Tode abermalige Retardation, bei sehr grossen Gaben nach subcutaner Injection Verlangsamung bis zum Tode oder bei Einspritzung in die Venen enorme Beschleunigung, mit dem Eintritte des Todes wieder abnehmend. Bei Fröschen steht zuerst der Ventrikel still, später die Vorhöfe.

Beim Eintreten von Vergiftungserscheinungen bei medicinaler Darreichung zu grosser Gaben und zu lange fortgesetzter kleiner Dosen genügt in der Regel das Aussetzen der Medication. Bei Vergiftungen hat man Tannin oder (zur Spaltung der Glykoside im Magen) verdünnte Säuren empfohlen. Das Hauptgewicht ist hier jedoch auf die Beseitigung des Collaps durch innere und äussere Stimulantien zu legen. Man vermeide bei Digitalisvergiftung häufiges Trinkenlassen, da dadurch Vermehrung des Brechreizes eintritt, und starke Bewegungen, welche mitunter zu plötzlichem, syncoptischem Tode führen können.

Diuretische Wirkung ist nach Digitalis und Digitalin bei gesunden Menschen und Thieren in erheblichem Maasse nicht constatirt.

Hinsichtlich der Einwirkung der Digitalis und des Digitalins auf die Diurese bei gesunden Menschen und Thieren divergiren die Angaben. Stadion fand bei seinen Selbstversuchen in den ersten 11 Tagen weder die Harnmenge noch die Quantität der einzelnen Harnbestandtheile verändert, in den folgenden 7 Tagen, wo toxische Erscheinungen bestanden, sowohl die Harnmenge als Harnstoff, Chlornatrium, Phosphor- und Schwefelsäure etwas verringert bei Zunahme der Harnsäure. Siegmund fand bei Kaninchen die Harnmenge gesteigert, den Harnstoff vermindert, Winogradoff beide wie auch die Chloride verringert, dagegen Sulfate und Phosphate vermehrt. Neuerdings hat Megevand vergleichende Versuche mit Digitalin von Homolle und Quevenne, Pulvis Digitalis und Nativelleschem Digitalin gemacht und bei sich nach sehr schwachen Dosen beider Digitalinsorten Vermehrung der Diurese, am meisten nach Nativelleschem Digitalin, dagegen nach grösseren Gaben von Fingerhutpulver Verminderung der Harnmenge erhalten, während der Harnstoff constant, und zwar wiederum am meisten nach Nativelles Digitalin, abnahm. Auffällig ist die wiederholt bei schweren Intoxicationen mit Digitalis und Digitalin beobachtete Seltenheit der Harnentleerung, die in einzelnen Fällen sich sogar zu completer, drei bis vier Tage anhaltender Anurie (Heer) steigert; mitunter geht derselben vermehrte Diurese voran.

Sowohl die Beobachtungen am Menschen als die Versuche an Thieren setzen es ausser Zweifel, dass die Digitalis in erster Linie auf das Herz wirkt und in toxischen Dosen durch Stillstand desselben den Tod herbeiführt. Sie gehört zu den sog. Herzgiften, da der fast ausnahmslos systolische Herzstillstand nicht mit einer allgemeinen Lähmung der Muskeln coincidirt, die vielmehr sowohl direct als von den Nerven aus nach dem Tode in Contraction versetzt werden können.

Ein directer Einfluss des Fingerhuts auf das Centralnervensystem ist nicht erkennbar; am wenigsten wird jedenfalls das Grosshirn afficirt, wie der Umstand beweist, dass selbst bei sehr schweren Vergiftungen das Bewusstsein in der Regel bis zum Tode persistirt. Die mitunter beobachteten Hallucinationen und Delirien sind wohl ebenso wie die terminalen Krämpfe bei Thieren auf Anämie des Hirns resp. der Medulla oblongata zu beziehen. In gleicher Weise ist die bei Vergiftungen oft sehr hochgradige Dyspnoe grösstentheils Folge der circulatorischen Veränderungen. Die Erregung des Rückenmarks und der peripheren Nerven erlischt früher als die der quergestreiften Muskeln (Courvat). Als centrale Wirkung erscheint das Erbrechen, für welches die örtliche Reizung der Magenschleimhaut keine genügende Erklärung bietet. Auf die Darmperistaltik wirkt Digitalin erregend (Nasse).

Bei der Wirkung der Digitalis auf das Herz ist theils das regulatorische Herznervensystem, theils der Herzmuskel selbst betroffen. Der Vagus wird sowohl central als peripherisch primär erregt und bei fortschreitender Intoxication gegen das Ende der Vergiftung gelähmt (Traube); der Herzmuskel scheint durch das Digitalin eine Verminderung seiner Elasticität zu erfahren. Ob neben dem Herzen auch noch die Capillargefässe durch Fingerhut beeinflusst werden und einen Antheil an dem durch Digitalis constant erzeugten Steigen des Blutdrucks hat, ist streitig.

Die Details der über Digitalis und Digitalin vorliegenden physiologischen Versuche zeigen in ihren Resultaten höchst bedeutende Differenzen, z. Th. wohl, weil die Experimentatoren mit ganz verschiedenen Dosen und mit ganz differenten Präparaten, da die Digitalinsorten des Handels wesentliche Unterschiede darbieten, gearbeitet haben. Feststehend ist zunächst die erregende Wirkung auf den Vagus, die nicht, wie A. B. Mayer annahm, Folge des erhöhten Blut-

drucks im Gehirn ist, da Atropin die Pulsverminderung nicht zu Stande kommen lässt. Dass der Herzmuskel als solcher von Digitalin afficirt wird, beweist das Zustandekommen der Wirkung an der nervenlosen Herzspitze (Franck). Nach den Untersuchungen von Williams ist die erste Wirkung des Digitalins auf das Froschherz Volumzunahme der Herzpulsationen ohne Zunahme der absoluten Leistungsfähigkeit des Herzens und erhebliches Steigen des mittleren Blutdrucks bei nicht erhöhtem Maximaldrucke; diese Effecte erfolgen bei Ausschaltung des capillären Kreislaufes. Auch beim Säugethiere zeigt sich, wie schon früher Böhm darthat, die Wirkung zunächst durch Verstärkung der Herzcontractionen, der Werth der Druckschwankung des einzelnen Herzschlages wächst, der Puls wird grösser und dikrotisch, indem die Reizbarkeit des Herzmuskels so gesteigert ist, dass schon die halbe Füllung des Ventrikels ausreicht, um eine neue Contraction hervorzurufen. Zweifelsohne genügt diese Steigerung der Arbeitsleistung des Herzens, um die Erhöhung des Blutdrucks zu erklären, doch wird von Ackermann, Fothergill und Brunton als ein in gleicher Richtung wirkender Factor noch eine durch Digitalin bedingte Verengung der peripheren Gefässe hervorgehoben, die, wenn sie wirklich existirt, vom vasomotorischen Centrum unabhängig ist, da auch bei völliger Lähmung des letzteren durch Chloralhydrat Blutdruckssteigerung eintritt. Die bei tödtlichen Fingerhutvergiftungen mitunter, jedoch keineswegs constant zu beobachtende Pulsbeschleunigung ist dadurch zu erklären, dass in solchen Fällen der Vagus vor dem Herzmuskel gelähmt wird.

Der durch Digitalin bedingte systolische Herzstillstand wird durch Saponin beseitigt, vermuthlich in Folge von Herabsetzung der erregten Hemmungsmechanismen, andererseits hebt Digitalin Saponinstillstände auf, wahrscheinlich durch hochgradige Erregung des Muskels (H. Köhler).

Auf der Steigerung des Blutdruckes durch Digitalis beruht offenbar die in manchen Fällen von Erkrankung wahrzunehmende diuretische Wirkung bei Hydrops und wahrscheinlich auch der Einfluss des Mittels auf die Temperatur.

Wir haben bereits oben angegeben, dass beim gesunden Menschen ebenso wie beim Thiere Digitalis und Digitalin nicht diuretisch wirken, wohl aber ist dieses der Fall bei Kranken, welche an Klappenfehlern des Herzens leiden und sich im Stadium der gestörten Compensation befinden, wobei nach medicinischen Dosen von Digitalis mit dem Steigen der arteriellen Spannung auch Zunahme der verringerten Urinausscheidung eintritt. Die Beziehungen der Digitalis zur Körpertemperatur, welche namentlich bei Fieberkranken in ausgeprägter Weise hervortreten, zur Veränderung des Herzens sind neuerdings von Ackermann bei Thierversuchen genauer studirt. Nach seinen Versuchen tritt mit der durch Digitalin veranlassten Drucksteigerung im Aortensystem Abnahme der Temperatur in der Vena cava bei Zunahme an der Körperoberfläche (zwischen den Zehen) ein, was Ackermann durch die in Folge der arteriellen Blutdruckssteigerung hervorgerufene Beschleunigung der Blutbewegung durch die äussere Haut erklärt, insofern dadurch Erwärmung der Peripherie des Körpers und Abkühlung des Innern erfolgt.

Von den krankhaften Zuständen, gegen welche der Fingerhut in Anwendung gezogen wird, nehmen die fieberhaften Affectionen unstreitig den ersten Platz ein. Besonders gebräuchlich ist die Benutzung bei croupöser Pneumonie und bei hektischen Fieber (hier zweckmässig mit Chinin), während sie im Typhus verhältnissmässig weniger gebraucht wird.

Bei Pneumonie sind die Ansichten über den Werth der Digitalisbehandlung sehr auseinandergehend, und während vor einigen Decennien kaum ein Fall von Lungenentzündung ohne Digitalis mit oder ohne Nitrum und Brechweinstein zur Genesung oder zum tödtlichen Ende geführt wurde, ist der Gebrauch der Digitalispräparate jetzt weit seltener geworden. Statistische Zusammenstellungen



(Thomas, Schrötter) scheinen darzuthun, dass bei expectativ symptomatischer Behandlung der Pneumonie die Defervescenz im Durchschnitt eben so rasch und das Mortalitätsverhältniss eben so günstig wie bei Digitalisbehandlung ist. Dem Veratrin steht Digitalis dadurch nach, dass es viel geringer die Temperatur als den Puls beeinflusst und dass zur Herabsetzung der Temperatur manchmal Dosen nothwendig werden, mit denen unangenehme Nebenerscheinungen (Erbrechen, Schwindel, Kopfweh) sich verbinden. Grosse Dosen führen oft zu Collaps; aber auch bei längerer Darreichung kleiner Dosen können sich Toxicationserscheinungen manifestiren, ein Umstand, der Digitalis als Antipyreticum nur mit grosser Vorsicht anzuwenden gebietet. Es gilt dies besonders bei anämischen, heruntergekommenen Individuen, wo man das Mittel eben so sehr wie das Veratrin zu vermeiden hat. Ein Einfluss auf den localen Process bei Pneumonie ist in keiner Weise ersichtlich. Sowohl bei Pneumonie als bei Pleuritis, Pericarditis, Endocarditis, auch bei Erysipelas können nur Fälle mit wirklich hochgradigem und in Folge davon an sich lebensgefährlichem Fieber die Digitalis indiciren, während beim Bestehen mässiger Fiebergrade das Medicament überflüssig ist und Darreichung säuerlicher Getränke genügt. Die nicht selten ungünstige Wirkung der Digitalis auf die Verdauung verbietet ihre Anwendung bei bestehender gastrischer Störung. Im Typhus werden Chinin und kühle Bäder allgemein der Digitalis vorgezogen. Bei Rheumatismus acutus hebt Traube das in mehreren Fällen constatirte erhebliche Nachlassen der Localaffection beim Eintritt der Digitaliswirkung hervor, doch ist dies wohl eben so ausgesprochen und vielleicht noch ausgesprochener beim Veratrin. Bei Febris hectica, wo jedoch im Allgemeinen die Dosen niedriger zu greifen sind als bei acutentzündlichen Krankheiten, auf deren Höhe häufig Dosen nothwendig werden, welche den toxischen nahe stehen, wird nicht selten auch das Allgemeinbefinden (Husten, Kopfweh, Dyspnoe) erheblich gebessert.

Ueber die Veränderungen von Puls und Temperatur bei Fieberkranken unter dem Einflusse von Digitalis und Digitalin sind eine grosse Anzahl exacter Beobachtungen seit der Einführung des Medicaments durch Rasori als Antipyreticum gemacht, in Deutschland besonders von Traube, Wunderlich, Thomas und Ferber. Die antipyretischen Effecte scheinen bei Krankheiten mit kürzerem fieberhaftem Verlaufe erst nach grösseren Dosen und später einzutreten als bei Typhus und andern länger dauernden Affectionen. Das Sinken der Temperatur kann beim Typhus früher als die Abnahme der Pulsfrequenz eintreten; bei allen übrigen Fiebern und meist auch beim Typhus erfolgt die erstere später. Die Wirkung auf den Puls hält länger an als die auf die Eigenwärme gerichtete. Nach Ackermanns Versuchen müsste die Digitalis besonders bei sog. asthenischen Fiebern, wo hohe Innentemperaturen und verhältnissmässig niedere Hauttemperaturen bestehen, Anwendung finden. Sicher ist, dass bei acuter Herzschwäche im Verlaufe von Fiebern Fingerhutpräparate von äusserst günstiger Wirkung sind (Fothergill, Leyden), wo dann freilich der antipyretische Werth des Mittels nicht in Frage kommt.

In zweiter Linie steht der Gebrauch der Digitalis bei Herzkrankheiten, wo unter bestimmten Verhältnissen kaum ein Stoff so Günstiges leistet, wie der Fingerhut.

In diesen Krankheiten ist indessen Digitalis keineswegs überall indicirt und auch nicht zur Bekämpfung jeder Asystolie und Arrhythmie von Nutzen, vielmehr sind bei der Verwendung bestimmte Indicationen und Contraindicationen maassgebend, wie solche zuerst von Traube, später von Potain (1880) und Leyden (1881) aufgestellt wurden. Nach Traube ist Digitalis überflüssig und selbst schädlich bei frisch entsandenen Klappenfehlern, wo die compensatorische Hypertrophie erst in der Ausbildung begriffen ist, ebenso nach vollständiger Ausbildung der Compensation und relativem Wohlbefinden der Patienten, weil in letzterem Falle Eintreten von Compensationsstörung geradezu befördert wird. Indicirt ist Digitalis dagegen in Fällen, wo bei ziemlich genügend ausgebildeter Compensation die Herzaction sehr aufgeregt, der Puls sehr frequent oder intermittirend ist, starkes Herzklopfen mit mächtigem Spitzenstoss und

erhebliche Dyspnoe besteht. Bei Compensationsstörungen leistet *Digitalis* auffallend günstige Dienste bei abnorm niederer Spannung der Arterien, wo es den aus beginnender Leistungsunfähigkeit des Herzmuskels und der herabgesetzten Triebkraft desselben hervorgehenden Hydrops durch Erhöhung des Blutdrucks beseitigt und gleichzeitig durch Herabsetzung der Pulsfrequenz die Ernährung des Herzmuskels, dem sein Ernährungsmaterial vorzugsweise bei der Diastole zugeführt wird, bessert. Zu vermeiden ist nach Traube dagegen *Digitalis* bei bestehender abnormer Erhöhung der Spannung im Aortensystem, weil hier durch eine weitere Steigerung des arteriellen Drucks geradezu Zerreißung von Gefäßen und sogar Hämorrhagie im Gehirn herbeigeführt werden kann. Selbst in Fällen, wo die Compensationsstörung Folge einer plötzlichen Vermehrung der Widerstände, zumal eines Bronchialkatarrhs, ist, kann *Digitalis* neben andern zur Bekämpfung des localen Leidens dienenden Mitteln von Nutzen sein. Am meisten wird *Digitalis* bei Mitralisinsufficienz mit Erfolg gegeben, demnächst bei Insufficienz der Tricuspidalis, wo die Effecte jedoch wegen der meist bestehenden fortgeschrittenen Alteration des Herzmuskels minder ausgeprägt sind und bei zu starker Steigerung des Blutdrucks selbst Hämoptoë auf *Digitalis*-gebrauch folgen kann (Potain). Insufficienz der Aortenklappen bildet nach Traube und Leyden keine Contraindication der *Digitalis*. Die Wirkung des Mittels setzt natürlich weder einen hochgradig hypertrophischen noch einen in fortgeschrittener Degeneration befindlichen Herzmuskel voraus; bei sog. paralytischer Asystolie von Gubler (Potain) leistet Fingerhut nichts. Absolute Contraindication bildet fettige Entartung des Herzens keineswegs, doch wirkt das Mittel bei dem sog. *weakened heart* von Stokes nur anfangs, dann aber auch im hohen Grade erleichternd, mitunter ohne dass die Pulsfrequenz wesentlich abnimmt oder die Schlagfolge regelmässig wird (Traube, Fraenkel). Schwächezustände des linken Herzens ohne Klappenfehler indiciren *Digitalis* ganz besonders (Leyden); bei Lähmung des l. Herzens kann das Mittel beginnendes Lungenödem beseitigen. Fothergill bezeichnet atheromatöse Entartung der grossen Gefässe als Contraindication des Fingerhutgebrauches, weshalb derselbe in den meisten Fällen von Aortenstenose nicht zulässig erscheine, doch ist zu berücksichtigen, dass die Gefahren des erhöhten Drucks durch die gleichzeitig bewirkte Gleichmässigkeit desselben übercompensirt wird (Potain). Fothergill sah günstige Erfolge in mehreren Fällen von Angina pectoris und Asthma cardiacum. Während beim Bestehen von Herzklappenfehlern und Compensationsstörung Irregularität des Herzschlages und Palpitationen durch *Digitalis* häufig genug beseitigt werden, ist diese kein Heilmittel gegen Palpitationen ohne Herzfehler, obschon sie in manchen Fällen bei bestehender Herzschwäche palliativen Nutzen hat; bei chlorotischen und hysterischen Palpitationen ist der Effect unwesentlich, ebenso bei Palpitationen in Folge chronischer Tabaksvergiftung oder in der Basedowschen Krankheit (Leyden).

In dritter Reihe steht die Anwendung der *Digitalis* als Diureticum bei Hydrops.

Da es als nachgewiesen betrachtet werden kann, dass die diuretischen Effecte des Fingerhuts von der durch denselben hervorgerufenen Erhöhung des Drucks im Aortensystem herrühren, so passt *Digitalis* auch hier nur in denjenigen Fällen, wo die Wassersucht mit einer Schwächung der Herz- und Gefäßthätigkeit einhergeht, während bei normaler Spannung oder bei Erhöhung derselben das Mittel contraindicirt erscheint. Bei Hydrops in Folge chronischer Nephritis oder von Hydrämie steht sie andern Diuretica entschieden nach; in ersterem Falle ist das Mittel sogar gefährlich, indem die Ausscheidung des *Digitalis* verhindert und das Eintreten cumulativer Wirkung dadurch gefördert wird. Das Vorhandensein von Herzklappenfehlern oder von secundärer Hypertrophie des rechten Ventrikels kann im Allgemeinen als das die Anwendung der *Digitalis* indicirende Moment angesehen werden.

Von geringerer Bedeutung sind die übrigen Anwendungen der *Digitalis*. Man betrachtete sie früher als Heilmittel bei Phthisis, wo sie indessen nur als antifebrile Mittel palliativen Nutzen gewährt, sei es, dass hektisches Fieber oder febrile käsige Pneumonie besteht. Traube vindicirte der *Digitalis* beson-

ders günstige Action bei Hämoptoe, wo sie jedoch durch Steigerung des Blutdrucks geradezu ungünstig wirken kann. Von dem Gebrauche bei Leber- und Milzinfarcten oder Scrophulose (Withering), bei eingeklemmten Brüchen (Simmons) u. s. w. ist man fast ganz zurückgekommen. In früherer Zeit rühmte man sie sehr bei Manie mit oder ohne chronische Hirnentzündung (Jones, Mason Cox), wo sie dem Opium als minder aufregendes Mittel vorzuziehen sein sollte. Derselbe Grund gilt auch für die Anwendung von Digitalis bei Delirium tremens (Huss, Günsburg); hier kann sie allerdings von Nutzen sein, doch wohl vorwiegend nur in solchen Fällen, wo der Säuferwahnsinn mit Fieber complicirt oder die Folge einer mit Fieber einhergehenden Entzündung ist. Bei stark gespanntem Arterienrohr ist Digitalis auch hier sicher contraindicirt. Die Empfehlung bei Wechselfieber (Bouillaud), Spermatorrhoe und Nymphomanie (Corvisart, Laroche, Brugmans) haben kein Interesse.

Die Folia Digitalis werden innerlich zu 0,06—0,3, am besten in Pulvern, Pillen oder im Aufguss gegeben.

Die Phkp. gestattet 0,2 als höchste Einzelgabe und 1,0 pro die. Zum Infus rechnet man 0,5—1,5 auf 200,0 Colatur. Decocte sind unpassend, weil darin theilweise Zersetzung der Digitalisglykoside resultirt und so die Wirkung abgeschwächt wird. Im Allgemeinen scheinen bei der internen Anwendung als Antipyreticum einzelne grössere und seltene Dosen passender als häufigere kleine; immer aber ist bei der Anwendung auf die cumulative Wirkung des Medicaments Acht zu haben und allzulange Fortsetzung der Darreichung zu vermeiden. Bei Herzklappenfehlern sind im Allgemeinen kleinere Dosen (durchschnittlich ein Aufguss von 0,6 auf 180,0 Colatur) als bei fieberhaften Affectionen zu geben. Auch ist bei Compensationsstörungen das Mittel nur so lange zu verabreichen, bis die Spannung der Arterien sich gehoben hat, weil die günstige Wirkung auf das Herz bei längerem Gebrauche entschieden abstumpft. Bei der Verordnung sind Gerbsäure, Bleizucker, Alkalicarbonat, auch Cyankalium als zersetzend nicht gleichzeitig zu geben.

Die äusserliche Anwendung hat im Ganzen wenig Bedeutung. Die endermatische Application des Pulvers zur Erzielung enterner Wirkungen ist fast völlig aufgegeben. Frische zerquetschte Blätter, welche mit Bier macerirt in Irland Volksmittel bei Epilepsie sind, hat man äusserlich als Kataplasma bei Wassersuchten benutzt. Auch Aufgüsse der getrockneten Blätter haben als Bähungen und Waschungen, sowie der Presssaft aus frischen Pflanzen zu Einreibung Empfehlung gefunden. Aus beiden bereitete Salben dienten auch früher bei scrophulösen Drüsengeschwülsten. Gerhard empfahl Inhalationen verstäubter Digitalisaufgüsse (0,5—2,5 auf 500,0 Col.).

### Präparate:

1) **Acetum Digitalis; Fingerhutessig.** Durch achttägige Maceration von 5 Th. Digitalisblättern mit 5 Th. Weingeist, 9 Th. verd. Essigsäure und 36 Th. Wasser in einer verschlossenen Flasche erhalten; klar, bräunlichgelb, von saurem und stark bitterem Geschmacke. Innerlich zu 10—20 Tr. mehrmals täglich. Die Phkp. giebt als maximale Einzelgabe 2,0, als maximale Tagesgabe 10,0. Am besten pure oder als Diureticum oder in Verbindung mit Acetum Scillae. Nach Fraenkel (1881) ist der Fingerhutessig zuverlässiger als alkoholische Tincturen und lässt namentlich die pulsverlangsamende und drucksteigernde Wirkung der Digitalis hervortreten. Verabreichung des starkwirkenden Präparats in Mixturen ist wegen der ungenauen Dosirung unzweckmässig; zu Saturationen eignet es sich nicht, da Zersetzung der wirksamen Principien durch überschüssige Alkalien zu befürchten steht.

2) **Tinctura Digitalis; Digitalistinctur.** Aus 1 Th. getrockneter Digitalisblätter mit 10 Th. Spir. dil. bereitet. Dunkelgrün, bitter, vom Geruche der Fingerhutblätter. Zu 5—20 Tr. für sich oder in Verbindung mit diuretischen, in Tropfenmixturen anzuwendenden Medicamenten; auch äusserlich zu Einreibung bei Hydrops benutzt. Die Pharmakopoe gestattet als höchste Einzelgabe 1,5, als maximale Tagesgabe 5,0. Die Tinctur ist erheblich stärker als die früher



officinelle aus frischen, zerstampften Digitalisblättern bereitete Tinctur, von der 2,0 pro dosi und 6,0 pro die in maximo erlaubt waren, und als die jetzt nicht mehr officinelle ätherische Fingerhut-tinctur, *Tinctura Digitalis aetherea*, aus getrockneten Blättern durch Maceration mit *Spiritus aethereus* dargestellt, welche früher irrig als doppelt so stark wie die aus frischen Digitalisblättern dargestellte alkoholische Tinctur angesehen wurde, aber nicht stärker als diese ist (Bennefeld). Mit Wasser verdünnt, diente die ätherische Tinctur früher äusserlich zu Fomenten und selbst zu Injectionen bei Hydrocele (Kress), was jedenfalls ein gefährliches Verfahren darstellt. Leyden hat Digitalis-tinctur bei Lungenödem in Folge von Herzschwäche subcutan injicirt.

3) **Extractum Digitalis ; Digitalisextract, Fingerhutextract.** Aus dem Presssaft des blühenden frischen Krantes dargestelltes dickes Extract, braun, in Wasser trübe löslich, zu 0,03—0,2 3—4mal täglich in Pillen oder Lösung. Maximale Einzelgabe 0,2, maximale Tagesgabe 1,0. In Pulvern wendet man dasselbe mit aa Süssholzpulver verrieben als sog. *Extractum Digitalis siccum* in doppelt so grosser Dosis an. Eine aus Digitalisextract mit 9 Th. Wachssalbe bereitete Salbe diente früher nach Rademachers Empfehlung zu Einreibungen bei Drüsenentzündungen (Mastitis, Parotitis) und war als *Unguentum Digitalis* officinell.

Die reinen Digitalisstoffe finden bei uns verhältnissmässig wenig, in Frankreich etwas mehr Anwendung. Es lässt sich nicht verkennen, dass die als Digitalin im Handel vorkommenden Gemenge von Digitoxin, Digitalin und Digitalin eine völlig sichere Dosirung nicht zulassen, indessen ist dies noch mehr bei den Fingerhutblättern der Fall, wo freilich nicht Mengen von 0,001 als gefährlich in Betracht kommen. Die im französischen Handel vorzugsweise gebräuchlichen sog. Granules de Digitaline sind in ihrer Wirkung so inconstant, dass sie bisweilen in minimalen Mengen zu Vergiftung führen, während in andern Fällen selbst der Inhalt ganzer Flacons von Kindern ohne Schaden geleert wurde (Marrotte). Unangemessen ist es, wie es häufig geschieht, von einem Digitalinum Gallicum zu reden, da die aus Frankreich kommenden Digitaline keineswegs immer gleich wirkend sind. Man bezeichnet das Nativellische krystallisirte Digitalin in der Tagesgabe von 0,001—0,002 als pulsverlangsamend, in derjenigen von 0,004 als temperaturherabsetzend bei Fieberkranken und stellt die Tagesgabe für das krystallisirte Digitalin von Homolle (Digitaline globulaire cristallisée) zur Pulsverlangsamung auf 0,003—0,01 (Vidal). Man wird wohlthuen, als Einzelgabe bei Herzkranken für Nativellisches Digitalin  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  Mgm., bei anderen französischen Sorten nicht über 0,001 zu setzen. Das deutsche Digitalin kann in Dosen von 0,001—0,002 2—3mal täglich gereicht werden. Stärker ist das in Oesterreich officinelle, durch Ausziehen mit Chloroform gereinigte Digitalinum depuratum, welches dem Homolleschen Digitalin an Wirksamkeit gleich steht. Die beste Form zur Anwendung von Digitalin ist die der Pillen. In Lösung von Alkohol oder Aceton (Strohl) verändert sich bei der leichten Verdunstung des Vehikels der Digitalingehalt. Bei Personen, welche zu Nausea und Erbrechen geneigt sind, kann Digitalin (namentlich stark digitaleinhaltige deutsche Sorten) auch subcutan verwendet werden, da diluirte Lösungen keine örtlichen Reizungserscheinungen bedingen, während Digitoxin subcutan heftige Irritation bedingen kann. Man benutzt deutsches Digitalin in 1% Lösung (0,1:10,0 gleicher Theile Wasser und Glycerin) zu 0,001—0,003. G. Bulgari hat bei Orthopnoe bis zu 0,005 injicirt. Digitalinsalben, gegen Anasarca und Ekzem von Dumont empfohlen, sind ohne Bedeutung.

#### Verordnungen:

1)	R	<i>cui adde</i>
	<i>Fol. Digit. 1,0</i>	<i>Syr. simpl. 25,0</i>
	<i>Affunde Ag. ferv. q. s.</i>	
	<i>ad. colat. 150,0</i>	<i>M. D. S. 2stündlich 2 Esslöffel voll.</i>

- |  |   |
|--|---|
| <p>2)           ℞<br/> <i>Inf. fol. Digit.</i> (e 2,0) 175,0<br/> <i>Kali nitr.</i> 5,0<br/> <i>Syr. Rubi Idaei</i> 25,0<br/> <i>M. D. S.</i> 1—2stündlich 1 Esslöffel voll.</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p>3)           ℞<br/> <i>Tincturae Digit.</i> 2,0<br/> <i>Aq. Amygd. amar.</i> 8,0</p> | <p><i>M. D. S.</i> 3mal täglich 15 Tr. (Bei Herzpalpitationen. Oppolzer.)</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p>4)           ℞<br/> <i>Extr. Digit.</i> 1,0<br/> <i>Aq. Petrosel.</i> 175,0<br/> <i>Oxymell. scillit.</i> 25,0<br/> <i>M. D. S.</i> 2stündlich 1 Esslöffel voll. (Als Diureticum.)</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> |
|--|---|

**Anhang.** Die Digitalis ist der Hauptrepräsentant einer grösseren Anzahl von in gleicher Weise auf das Herz wirkenden Stoffen, von denen jedoch keiner als Antipyreticum therapeutische Anwendung findet, von welchen dagegen eine grössere Reihe als Diuretica in Anwendung gezogen wird, weshalb dieselben in der Classe der Nierenmittel ausführliche Besprechung finden.

---

## **Vierte Abtheilung. Auf entfernte Organe wirkende Arzneimittel, Medicamenta teledynamica.**

---

### **XI. Classe. Neurotica, Nervenmittel.**

Diese Classe umfasst alle auf das Nervensystem wirkenden Mittel, welche vorzugsweise bei krankhaften Störungen der nervösen Apparate in Anwendung gezogen werden. Indem wir bezüglich der Nervenwirkungen selbst auf die allgemeine Pharmakodynamik (S. 74) verweisen, ordnen wir dieselben nach den Abtheilungen des Nervensystems, die sie vorzugsweise beeinflussen.

---

#### **1. Ordnung. Neurotica peripherica, vorzugsweise auf das peripherische Nervensystem wirkende Mittel.**

Von diesen Mitteln haben nur die vorwaltend lähmenden Substanzen und auch von diesen nur zwei alkaloidhaltige Drogen, das Schierlingskraut und das Curare, therapeutische Bedeutung.

Die Frage, ob der lähmenden Action der Neurotica peripherica eine erregende Wirkung auf die peripheren Nerven vorangeht oder ob die Paralyse auf convulsivische Erscheinungen folgt, wird von verschiedenen Experimentatoren different beantwortet. Bei grösseren Dosen der hauptsächlichsten hierhergehörigen Substanzen resultirt in der Regel ausschliesslich Lähmung, die man, nach dem zuerst als in dieser Richtung wirkend erkannten Curare, gewöhnlich als Curarelähmung oder Curarewirkung bezeichnet und welche man daran erkennt, dass bei Ausschluss der Blutzufuhr zu einer Extremität durch Arterienligatur das betreffende Glied von der Lähmung nicht betroffen wird.

Den Gegensatz zur Curarewirkung bildet die Action des Guanidin und Methylguanidin, welche durch Reizung der peripherischen Nervenendigungen nicht allein fibrilläre Muskelzuckungen, sondern geradezu klonische Krämpfe der gesammten Musculatur erzeugen, welche durch Abschliessung der Blutzufuhr, nicht aber nach Durchschneidung des Rückenmarks oder des Hüftgeflechts oder Zerstörung des Gehirns beseitigt werden, in abgetrennten Extremitäten persistiren und auch in solchen bei directer Einführung hervortreten (Gergens und Baumann, Putzeys und Swaen). In tödtlichen Dosen bewirkt Guanidin nicht allein Lähmung der peripheren Nervenendigungen, sondern auch des Gehirns und Rückenmarks.



Auch dem Curare u. den curareartig wirkenden Stoffen wird von verschiedenen Experimentatoren (Steiner, Holmgren, Bochefontaine) eine herabsetzende Wirkung auf das Grosshirn (narkotische Action) vindicirt. Manche der zur Gruppe des Curarin gerechneten Stoffe gehören entschieden zur Abtheilung der eigentlichen Cerebralia, so z. B. das Kraut von *Cynoglossum officinale* und vermuthlich mehrere der von Buchheim als curareartig wirkend bezeichneten Borragineen, wahrscheinlich auch das neuerdings (1882) von Schiffer als *Neuroticum periphericum* betrachtete *Guachamacacextract*, ein Extract aus der Rinde eines zu den Apocyneen gehörenden Giftbaumes von Venezuela, welches zwar mit dem Curare die Eigenthümlichkeit theilt, dass vom Magen aus erst unverhältnissmässig grössere Mengen als bei Subcutaninjection toxisch wirken, welches aber beim Menschen zu 0,1 hypodermatisch mehrstündigen Schlaf bedingt, ohne lähmend zu wirken. Alle diese Stoffe und ebenso die hierher gehörigen Alkylbasen (vgl. S. 24) besitzen therapeutische Bedeutung nicht.

**Herba Conii, Herba Conii maculati, Herba Cicutae; Schierlingskraut.**

Durch den Gehalt an einem sehr giftigen, flüchtigen, sauerstofffreien Alkaloide, dem Coniin, neben welchem noch einige ziemlich gleichartig wirkende basische Pflanzenstoffe sich finden, sind die verschiedenen Pflanzentheile des bei uns an Wegen, Schutthaufen und bebauten Stellen häufigen Fleckschierlings, *Conium maculatum* L. (Fam. Umbelliferae), wirksam.

Der Fleckschierling, dessen Saft im alten Griechenland zur Hinrichtung von Verbrechern angewandt wurde, wie dies aus der Geschichte des Sokrates hinreichend bekannt ist, darf nicht mit zwei andern zur Familie der Doldengewächse gehörigen, ebenfalls als Schierling bezeichneten Gewächsen verwechselt werden. Es sind dies die Hundspetersilie oder der Gartenschierling, *Aethusa cynapium* L., deren früher viel gefürchtete Giftigkeit sich als Illusion erwiesen hat (Harley), und der Wasserschierling oder Wütherich, *Cicuta virosa* L., dessen giftiges Princip, ein indifferentes, harzartiger Körper, das Cicutoxin, nach Art des Pikrotoxins klonische und tonische Krämpfe und Trismus bedingt. *Conium maculatum*, vielleicht ursprünglich nur im Orient und Südeuropa einheimisch, jetzt aber durch ganz Europa, Nord- und Westasien verbreitet und sporadisch auch in Nord- und Südamerika vorkommend, ist ein zweijähriges, seltener einjähriges Kraut mit etwas bereiftem, am untern Theile rothgeflecktem und gestreiftem, nach oben zu gefurchem Stengel und mehrfach getiederten, überall glatten Blättern, von denen die untern lange, den Stengel scheidig umfassende Stiele besitzen, die obern sitzend sind, mit weissen, kleinen, in Dolden gestellten Blüthen und mit glatten, im reifen Zustande grünlichbräunlichen, eirunden Theilfrüchtchen. Die Blätter des Fleckschierlings sind dreifach fiederspaltig, die Fiederblätter der ersten und zweiten Ordnung eirund, gestielt, die der dritten Ordnung länglich eirund, ungestielt, tief eingeschnitten mit gesägten Lappen, deren Sägezähne in eine weisse trockenhäutige Spitze endigen. Die ganze Pflanze ist mattgrün und vollständig kahl, die Frucht glatt, etwa 3 Mm. lang und ebenso dick und auf jeder Fruchthälfte mit fünf starken blassen Längsrippen besetzt, welche eine wellig gekerbte Bogenlinie beschreiben; charakteristisch ist das Fehlen der Oelstriemen in den vier zwischen den Rippen belegenen Thälchen oder Furchen und an den Berührungsfächen der beiden Theilfrüchte. Die *Herba Conii* stellt die Blätter und blühenden Spitzen der im Sommer gesammelten Pflanze dar, welche von andern ähnlichen Umbelliferen am besten durch die leicht erkennbaren Längsrippen der unreifen Frucht, an Farbe und Form, sowie an dem eigenthümlichen Geruche der Blätter, welcher namentlich auch beim Befeuchten der trockenen Blätter mit Kalilauge sich entwickelt, unterschieden wird.

Das Coniin,  $C^8H^{15}N$ , ist eine wasserhelle öltartige Flüssigkeit von 0,87 bis 0,89 spec. Gew., höchst durchdringendem, widrigem, an Mäuseharn erinnerndem,

zu Thränen reizendem Geruche und scharfem und unangenehmem, tabaksähnlichem Geschmacke. Es siedet bei  $163^{\circ}$ , destillirt bei Luftabschluss unverändert über, zersetzt sich dagegen theilweise bei Zutritt von Luft und verbrennt bei stärkerer Erhitzung an freier Luft mit heller, russender Flamme. In Wasser löst es sich wenig, in kaltem reichlicher als in warmem, so dass sich die wässrige Lösung beim Erwärmen trübt; Weingeist löst Coniin in allen Verhältnissen, ebenso Aether, Amylalkohol, Chloroform, Aceton, Benzol und ätherische Oele. Es ist eine starke Base, welche die Oxyde der Schwermetalle und der Thonerde aus ihren Lösungen fällt und auf Eiweiss coagulirend wirkt. Mit Säuren bildet es schwierig krystallisirbare, leicht zerfließliche, meist sich rasch zersetzende Salze; auch das Coniin verändert sich bei Luftzutritt rasch, wird gelb, später braun und dickflüssig, und geht schliesslich unter Entwicklung von Ammoniak in eine harzartige, bitter schmeckende Masse über, welche Stickstoff enthält und an feuchter Luft, sowie beim Verbrennen nach Buttersäure riecht, welche letztere auch beim Erwärmen von Coniin mit Salpetersäure oder andern Oxydationsmitteln entsteht. In der Schierlingspflanze findet sich Coniin am reichlichsten in den nicht völlig reifen Früchten der zweijährigen Pflanze, minder reichlich in den Blättern, welche nach Schoonbrodt in der Blüthezeit das meiste Coniin liefern, das in frischen Blättern  $0,14\%$  beträgt (in den Früchten nach Barth fast  $1\%$ ). Die Blätter büssen sehr viel Coniin beim Trocknen ein, so dass im getrockneten Schierlingskraut nur  $0,04\%$  sich findet; weniger scheinen die Früchte zu verlieren, in denen dagegen beim Reifen theilweise Veränderung des Alkaloids erfolgt. Nach Manlius Smith sind die noch nicht ausgewachsenen und die vollkommen ausgewachsenen unreifen Früchte 3—7mal stärker als die zur Blüthezeit gesammelten Blätter, welche ihrerseits doppelt so stark wirken wie Blätter aus späteren Vegetationsperioden. Nach Schroff sind die unreifen Früchte der einjährigen Pflanze weit schwächer als die der zweijährigen. Die Zerstörung des Coniins beim Trocknen der Blätter erklärt, weshalb aus nicht frischem Kraute dargestellte Schierlingspräparate nahezu unwirksam sind (Harley).

Das käufliche Coniin enthält nach Planta und Kekulé stets Methylconiin,  $C^8H^{14}(CH^3)N$ , welches wahrscheinlich schon in der Pflanze aus dem Coniin durch Substitution des Radicals Methyl für H entsteht. In Folge dieser Beimengung bestehen nach Crum Brown u. Fraser auch Wirkungsunterschiede bei den einzelnen Coniinsorten, indem Methylconiin die Reflexaction mehr beeinträchtigt als Coniin. Weitere Wirkungsunterschiede können dadurch entstehen, dass dem Coniin Ammoniak beigemengt ist. Ein weiteres Substitutionsproduct des Coniins, das Dimethylconiin, ist schwächer giftig als Coniin und Methylconiin, indem es erst zu  $0,2$ — $0,4$  den Tod von Kaninchen herbeiführt, und wirkt ganz nach Art des Curare lähmend auf die peripherischen Nerven. Analog wirken auch die durch Substitution des Radicals Aethyl entstehenden Basen Aethylconiin und Diaethylconiin (Pélissard, Jolyet und Cahours). Nach Boche-fontaine und Tiryakim wirkt das reine Coniin vorwiegend herabsetzend auf das Gehirn und bedingt zunächst allgemeine Schwäche, dann convulsivische Erschütterungen, Steigerung der Reflexerregbarkeit bei gleichzeitiger Vernichtung der Willkürbewegung, beschleunigte Athmung und Sehstörungen, später allmähliches Schwinden der Reflexerregbarkeit, Schwächerwerden der Athmung und des Pulses, Collaps und Tod, während die curareähnliche Wirkung auf die peripherischen Nerven einer harzähnlichen Substanz zukommt. Jedenfalls überwiegt in den Handelssorten des Coniins und der daraus dargestellten Salze das curareähnlich wirkende Princip.

Neben Coniin und Methylconiin findet sich im Schierling, und zwar besonders in den Blüten, aber auch in den Früchten und in ganz geringer Menge im Kraute während der Blüthezeit, eine krystallinische Base, das Conydrin, das durch Entziehen von Wasser mittelst Erhitzen mit Phosphorsäureanhydrid in Coniin übergeht und in analoger Weise, jedoch weit schwächer giftig als Coniin wirkt (Wertheim). Das Coniin ist mit Bestimmtheit bis jetzt nur im Fleckschierling aufgefunden. Die von Sievers in den Lupinen aufgefundenen und mit dem Methylconiin und andern aus Coniin darstellbaren Basen identificirten Alkaloide sind in ihrer Wirkung bisher nicht genau untersucht; dagegen soll das von Hugo Schiff aus dem Butyraldin durch trockene Destillation erhaltene

künstliche Coniin, welches jedoch keinen substituierbaren Wasserstoff besitzt, physiologisch mit dem aus Schierling dargestellten Coniin übereinstimmen.

Das Coniin, welches als wirksamer Bestandtheil der *Herba Conii* zu betrachten ist, hat sowohl örtliche als entfernte Wirkung, von denen erstere jedoch nur an Schleimhäuten mit dünner Epithelschicht bei Anwendung unverdünnten Coniins sich zeigt. Das resorbirte Coniin wird theilweise durch den Urin eliminirt.

Auf die *Conjunctiva* applicirt wirkt unverdünntes Coniin geradezu kaustisch, bedingt Blennorrhagie, Cornealtrübung und Hornhautgeschwüre; diese Wirkung ist offenbar die Folge der Affinität zum Eiweiss. Bei der in der Regel rasch tödtlichen Wirkung des Coniins findet sich bei Vergiftungen an Thieren selten Entzündung im Tractus. Schön Orfila constatirte die Resorption des Alkaloids durch den Nachweis in Milz, Nieren und Lungen; Dragendorff und Zaleski fanden es auch im Blute und bei nicht letal vergifteten Kaninchen im Urin, in letzterem spurweise noch 27½ Tage nach der Einführung; ein Theil scheint auch durch die Lungen eliminirt zu werden (van Praag), ein anderer wird unstreitig destruiert.

Die entfernten Wirkungen des Coniins, welche in höheren Dosen eines der gefährlichsten und sehr rasch zum Tode führenden Gifte ist, sind sowohl bei Menschen durch verschiedene Selbstversuche (Pöhlmann, Dworzak, Heinrich und Dillnberger, Harley) und Beobachtungen am Krankenbette als bei den verschiedensten Thieren durch eine grosse Zahl von Experimentatoren sehr genau festgestellt. Als hauptsächlichste Wirkungserscheinung ergiebt sich überall Lähmung, welche, wie dies zuerst Kölliker darthat, durch directe Beeinträchtigung der motorischen Nerven entsteht, wobei zuerst die Nervenendigungen und erst später die Stämme selbst gelähmt werden. Diese Lähmung, welche auch die Respirationsmuskeln ergreift, führt bei letalen Dosen mitunter zu Dyspnoe und Erstickung unter terminalen klonischen Krämpfen. Die Herzthätigkeit bleibt lange Zeit völlig unverändert, wenn die Störung der Blutlüftung durch künstliche Respiration ausgeglichen wird. Einwirkung auf das Gehirn scheint nicht stattzufinden, da bei Menschen das Bewusstsein auch bei toxischen Dosen intact bleibt. Möglicherweise ist dem Coniin eine besondere Wirkung auf das Rückenmark eigen, da bei Kaltblütern mitunter die Reflexaction vor der Reizbarkeit der peripherischen Nerven erlischt (Crum Brown und Fraser).

Die Giftigkeit des Coniins für Thiere ist für alle Wirbelthierclassen und auch für Regenwürmer und Insecten constatirt; die manchen Vögeln zugeschriebene Immunität gegen Schierling ist wohl nur darin begründet, dass Schierlingssamen häufig unverdaut wieder abgeht, da Coniin Vögel rasch tödtet. Junge Thiere werden weit stärker durch Coniin afficirt als alte (Rossi). Möglicherweise kann auch Gewöhnung bis zu einem gewissen Grade eintreten (Guttman). Die tödtliche Dosis des Coniins lässt sich schwer feststellen, da das Coniin des Handels stets Methylconiin und Ammoniak beigemengt enthält und da, möglicherweise schon durch blossen Contact mit der äussern Luft bei sonst sorgfältiger Aufbewahrung, die Wirkung des Coniins so abgeschwächt werden kann, dass das im frischen Zustande bei Application auf das Auge Kaninchen in 7 Minuten tödtende Alkaloid später in derselben Menge nur örtlich entzündungserregend wirkt (Schroff). Im Allgemeinen aber ist die letale Dosis bei Thieren sehr klein, bei Tauben 0,1, bei Kaninchen etwas mehr als 0,01.



Die Erscheinungen der Coniivergiftung bei Kaltblütern entsprechen ziemlich genau dem Bilde der Vergiftung mit Curare, Frösche verfallen in 1—2 Min. danach in allgemeine Paralyse, die manchmal die Vorder-, manchmal die Hinterbeine zuerst ergreift; die Respiration wird unregelmässig und steht bald still, ebenso das Lymphherz, dagegen schlägt das Herz auch nach dem Aufhören aller übrigen Functionen stundenlang fort, ohne dass im Rhythmus und in der Stärke der Contractionen anfangs Veränderungen bemerkbar wären. Bei nicht zu grosser Dosis erholen sich die Frösche, wenn man dieselben gehörig vor Verdunstung schützt, im Verlaufe von 24 Stunden wieder. Bei grösseren Dosen ist die Stärke der Herzcontractionen etwas beeinträchtigt. Unterbindung der Arteria iliaca verhindert das Auftreten von Lähmung in der von dieser versorgten Extremität (Kölliker u. A.) Convulsionen fehlen nach Coniivergiftung bei Fröschen vollständig und treten bei Warmblütern nach vorausgehender Lähmung der Hinterbeine und allgemeiner Paralyse in Folge respiratorischer Störungen als secundäre Erscheinungen auf; dieselben sind vorwaltend klonischer Art. Die bei Warmblütern mitunter frühzeitig vorkommenden fibrillären Muskelzuckungen sind möglicherweise von einer primären Reizung der intermuskulären Nervenendigungen abzuleiten. Während des apathischen und paralytischen Zustandes der mit Coniin vergifteten Säugethiere sind Sensibilität und Sensorium anfangs völlig intact; die Respiration erlischt stets früher als die Herzthätigkeit, auch bleibt das Herz lange elektrisch reizbar. Ein Einfluss auf die Nervencentren ist kaum in Abrede zu stellen, da auch Ligatur sämmtlicher Gefässe der Extremitäten die Abnahme der Reflexerregbarkeit nicht hindert, dagegen scheint Beeinträchtigung der psychomotorischen Centren nur secundär in Folge der mangelhaften Blutlufung oder des veränderten Blutdrucks stattzufinden (Lautenbach). Ebenso wenig wirkt Coniin direct auf die sensiblen Nerven oder die secretorischen Nerven (Prévost); dagegen werden die Vagusendigungen früher und selbst durch geringere Mengen als die Endorgane in den willkürlichen Muskeln gelähmt (Jolyet und Pélistard). Blutdruck und Körpertemperatur steigen (letztere auch beim Menschen nach medicinalen Gaben). Einfluss auf die Diurese scheint nicht stattzufinden. Die Athmung ist meist zuerst beeengt, keuchend und beschleunigt, später verlangsamt, bei leichten Intoxicationen, wo die Symptome ausschliesslich in wankendem Gange in Folge von Parese bestehen, normal. Die Pupille ist in der Regel erweitert, bisweilen verengt, die peristaltische Bewegung auch nach dem Tode erhalten. Die von Ihmsen als charakteristisch bezeichnete Beschaffenheit des Blutes ist indess keine andere als bei dem Tode durch Asphyxie überhaupt (dunkelkirschrothe Färbung, Fluidität und verminderte Coagulationsfähigkeit), welchem auch die venösen Hyperämien im Abdomen und in der Schädelhöhle entsprechen.

Beim Menschen kann schon  $\frac{1}{4}$  Tropfen Coniin Brennen im Munde, Kratzen im Halse, Speichelfluss, Brechneigung und Erbrechen, sowie Eingenommenheit und Hitze im Kopfe bedingen. Nach 1 Tropfen kommt es rasch zu bedenklieheren Erscheinungen, Schwindel, Unvermögen zu denken und die Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand zu fixiren, Schlaftrunkenheit, grosser Verstimmung des Gemeingefühls, Undeutlichsehen, Pupillenerweiterung, Abnahme der Gehörspception und des Tastgefühls, Ameisenkriechen in der Haut, Schwäche und Hinfälligkeit, Unsicherheit und Wanken des Ganges, Cyanose und kaltem Schweiss, endlich zu Krämpfen in verschiedenen Muskelgruppen bei forcirten Bewegungen (Schroft). In den Selbstversuchen von Schroffs Schülern Heinrich und Dillnberger war die Diurese nicht verändert, der Puls anfangs bei den grösseren Dosen um einige Schläge frequenter, später verlangsamt, jedoch nicht im Verhältniss zur Steigerung der Gabe, stets aber klein und schwach. Ganz ähnlich sind die Erscheinungen nach Genuss von Schierlingextracten. So beobachtete Harley nach 12,0 des Succus Conii Ph. Br. Schwäche und Schwere in den Beinen und Schwindel, letzteren in Folge von Störung im Augenmuskelapparate, nach 20,0 in  $\frac{3}{4}$  Stunden Mydriasis, Paralyse des M. levator palpebrae (Ptosis), Muskelschwäche, welche Erscheinungen in 2—3 Stunden nachliessen und ohne Beeinträchtigung der psychischen Functionen verliefen. Bei subcutaner Application von Coniin kann schon nach 0,001 Schwäche und Schwindelgefühl entstehen (Eulenburg).

Bei tödtlicher Vergiftung durch Schierling bei Menschen ist das Verhalten

ein analoges wie bei Säugethieren; in dem Stadium der Parese, welche zuletzt auf die Respirationsmuskeln übergreift, bleibt das Bewusstsein lange ungetrübt; schliesslich erfolgen Convulsionen. Ein Beispiel für die in dieser Weise verlaufende Intoxication bietet der bekannte Fall des Sokrates. Bei der einzigen bisher bekannten tödtlichen Intoxication mit Coniin war stürmische Herzaction das am meisten hervorstechende Symptom.

Zur Behandlung der Coniinvergiftung ist schleunige Einleitung der künstlichen Respiration das einzig rationelle Mittel, da bei der grossen Schnelligkeit der Wirkung (bei der einzigen tödtlichen Vergiftung erfolgte der Tod nach 10 bis 15 Tropfen Coniin in wenigen Minuten) von Brechmitteln oder chemischen Antidotem nicht viel zu erwarten ist. Bei Vergiftungen mit Schierling, wo die Resorption langsamer erfolgt, sind Magenpumpe und Emetica indicirt.

Das Schierlingskraut findet nur geringe therapeutische Verwendung, meist auch nur in Zuständen, welche in der physiologischen Wirkung des Schierlingsalkaloids keine Stütze finden.

In praxi wird man immer wohlthun, statt des Schierlingskrautes, welches meist in empirischer, keineswegs durch Thatsachen als zulässig erkannter Weise bei Scrophulose und Geschwülsten in Anwendung gezogen wird, das wegen seiner leichten Zersetzlichkeit aus der Pharmakopoe entfernte Coniin in solchen Fällen zu verwenden, wo die physiologischen Wirkungen in Frage kommen, wie dies namentlich bei manchen motorischen Störungen, zumal Muskelkrämpfen, welche aus peripherischen Ursachen entstehen, der Fall ist. Als Antispasmodicum hat Coniin sich besonders bei Krämpfen der Respirationsorgane, namentlich Keuchhusten (Spengler, W. Reil), Asthma (Pletzer), Angina pectoris (Erlenmeyer), bei Hustenreiz im letzten Stadium der Tuberculose (Nega) Eingang verschafft und ist in Folge davon auch bei verschiedenen entzündlichen Leiden der Respirationsorgane, z. B. bei Pneumonie, versucht, wo das Mittel nach Lorent Abnahme der Dyspnoe und Athemfrequenz bewirken, jedoch nicht so günstige Effecte wie Morphin zu Stande bringen soll. Pereira machte auf die Möglichkeit, Coniin bei Tetanus wegen der dadurch hervorgerufenen Muskelrelaxation zu verwenden, aufmerksam, doch haben die in England angestellten Versuche bei Tetanus traumaticus und Hydrophobie negative Resultate ergeben. Dasselbe gilt von meinen eigenen Versuchen über den Gebrauch des Coniins als Antidot beim Strychnintetanus und bei den durch Pikrotoxin und Carbonsäure hervorgerufenen Krämpfen. Harley rühmte die Schierlingspräparate bei Chorea vielfach. Vielfach ist Coniin auch als schmerzstillendes Mittel empfohlen worden, doch fehlt ihm nach Maassgabe der physiologischen Versuche eine eigentliche anästhetische Wirkung und sowohl bei interner Application (Reuling und Salzer) als subcutan injicirt (Lorent, Gubler) steht es dem Morphin nach. Bei Cardialgie bleibt Coniin meistens ohne jeden Erfolg; nach Reil soll es bei Magenschmerzen, welche mit gestörter Leberfunction einhergehen, günstig wirken. Nega und Murawjew empfahlen Coniin bei Neuralgien, syphilitischen Knochenschmerzen und bei cariösem Zahnschmerz; bei letzterem leistet es verhältnissmässig bei directer Application noch das Meiste. Erlenmeyer empfahl Coniin bei Angstzufällen Seelengestörter, Landouze bei Dentitionsstörungen.

Was die empirische Anwendung des Schierlings anlangt, so ist derselbe durch Störck, Bayle u. A. sogar in den Ruf eines Krebsmittels gekommen, obsonen wahrscheinlich niemals ein Carcinom durch Schierling geheilt wurde. Selbst Murawjew, der verschiedenste Coniinenthusiast, sah bei Krebs höchstens palliativen Erfolg von dem Mittel, während noch in neuerer Zeit von Devay und Guillermond die coniinreichen Früchte von *Conium maculatum* als Krebsmittel in die Therapie eingeführt wurden und Reil das Coniin für eins der schätzbarsten Mittel beim Magenkrebs erklärte. Auch für die Behandlung der Scrophulose mit Schierlingspräparaten finden wir in den Wirkungen des Coniins keinerlei Indication. Die Alten betrachteten Schierling als vorzügliches auflösendes und zertheilendes Mittel und wandten ihn deshalb vorzugsweise in kleinen Dosen bei Drüsengeschwülsten an. Man behauptete sogar, dass unter dem Einflusse desselben Brustdrüsen atrophiren könnten. Wirklich eclatanten

Nutzen gewähren Schierlingspräparate indessen nur bei *Ophthalmia scrophulosa*, wo das Coniin der dabei bestehenden Lichtscheu in ausgezeichneter Weise entgegenwirkt und insbesondere bei erethisch scrophulösen Individuen in verhältnissmässig kurzer Zeit den Blepharospasmus beseitigt (Fronmüller, Hasner, Mauthner u. A. m.). In älterer Zeit kam Schierling vielfach gegen chronische Hautausschläge in Anwendung, auch galt er als Anaphrodisiacum, welchem Wahne in früheren Jahrhunderten manche Menschenleben zum Opfer gefallen sein sollen. Werthheim empfahl Coniin als die Pulsfrequenz herabsetzendes Mittel bei Typhus und Wechselfieber, doch leistet es, wie aus der physiologischen Wirkung sich leicht ergibt, in dieser Beziehung Nichts. Murawjew rühmte Coniin bei Oedemen nach Verwundungen, bei Vomitus gravidarum, Ikterus, Intumescenz der Leber (auch den Alten galt Schierling als ein Lebermittel), Hydrops, Peritonitis und vielen andern Krankheiten. Dammourette will davon Erfolge bei Hypertrophia uteri gesehen haben. Bei entzündlichen Affectionen könnte Coniin durch seinen von Binz constatirten deleteren Einfluss auf weisse Blutkörperchen günstig wirken.

Als Contraindicationen des Coningebrauches sind von Murawjew und L. van Praag eine Reihe von Momenten hervorgehoben, von denen indess nur das Bestehen hochgradiger Kachexie und Neigung zu Lähmungen als einigermaassen ins Gewicht fallend bezeichnet werden können. Nach Reil werden blühende, vollsaftige oder erethische Personen am leichtesten nach Coniin von Schwindel befallen. Gewisse pathologische Zustände des Nervensystems (Tetanus, Hydrophobie) scheinen die Empfänglichkeit für Coniin sehr herabzusetzen.

Man giebt die Herba Conii innerlich zu 0,05–0,3 mehrmals täglich in Pulvern und Pillen (die Phkp. lässt vom Schierlingskraut als höchste Einzelgabe 0,3, als höchste Tagesgabe 2,0 zu); meist dient dieselbe aber äusserlich in Verbindung mit narkotischen Pflanzentheilen, namentlich Bilsenkraut, oder mit Leinkuchen zu schmerzstillenden und zertheilenden Umschlägen, auch im Infus oder Decoct zu schmerzstillenden Injectionen, Mund- und Gurgelwässern, Klystieren u. s. w., ohne dass der Antheil des Schierlingskrautes an den Heilwirkungen ein wesentlicher wäre.

Unter dem Namen Schierlingsextract, *Extractum Conii s. Cicutae*, war früher ein Spiritusauszug des eiweissfreien Presssaftes frischen Schierlingkrautes als braunes, in Wasser trübe lösliches Extract von gewöhnlicher Consistenz officinell, von welchem als maximale Einzelgabe 0,18 und als maximale Tagesgabe 0,6 vorgeschrieben waren. Bei dem relativ unbedeutenden Coningehalte des Präparats sind jedoch, um wirkliche physiologische Effecte zu erzielen, selbst die Maximaldosen nicht ausreichend. Zur Verhütung von Mastitis bei Wöchnerinnen giebt Altstädter 4–6mal täglich 0,01–0,06. Mit Ipecacuanha und Syr. comm. bildet Schierlingsextract die als Alterans in England gebräuchlichen Compound pills of hemlock. Aeusserlich kann es zu Augenwässern (2–4:100), Augentropfwässern (4:100), Augensalben (1:5–10), Pinselsäften, Verbandsalben und Pflastern magistral verordnet werden.

Eine Mischung von 1 Th. Schierlingsextract mit 9 Th. Wachssalbe bildet die früher officinelle Schierlingssalbe, *Unguentum Conii s. Cicutae*, die zum Vertheilen von Drüsengeschwülsten und zur Einreibung bei neuralgischen Affectionen, auch wie das beim Arsen erwähnte *Unguentum narcotico-balsamicum Hellmundi* zum Verbands von schmerzenden Krebsgeschwüren benutzt wurde. Aus dem Schierlingskraute stellte man früher verschiedene, bei Drüsengeschwülsten, Knoten in der Mamma u. s. w. benutzte Pflaster her, die als Schierlingspflaster, *Emplastrum Conii s. Cicutae* und als *Emplastrum Conii ammoniacatum s. Cicutae cum Ammoniac* (mit Ammoniakgummi) bezeichnet wurden.

Statt des von Murawjew u. A. innerlich benutzten Coniins wird in Frankreich meist das von Mourrut (1876) empfohlene bromwasserstoffsäure Coniin, *Coninum hydrobromicum*, benutzt, welches vor dem Alkaloide den Vorzug grösserer Stabilität besitzt, den übrigens auch das schon von L. van Praag empfohlene chlorwasserstoffsäure Salz zeigt. Man gab das Coniin bei uns früher zu 0,001–0,003 in Wasser oder einem destillirten Wasser oder in verdünntem Alkohol gelöst, am zweckmässigsten der genauen Dosirung



wegen in Tropfenform und wegen der leichten Zersetzlichkeit in kleinen Quantitäten und im schwarzen Glase. In Frankreich sind weit grössere Dosen des Coniinum hydrobromicum üblich, nach Dujardin-Beaumetz 0,01 mehrmals täglich, bis 0,1 und selbst 0,2 pro die intern in Syrup (1 : 1000) oder in wässriger Solution oder in den Mourrutschen Granules de bromhydrate de cicutine, die 0,002 enthalten. Das kindliche Lebensalter contraindicirt den Gebrauch des Coniins und seiner Salze in keiner Weise und selbst Säuglinge ertragen Dosen von 0,002 ohne Nebenerscheinungen (Landouze) oder bei vorsichtiger Steigerung der Dose selbst 0,012—0,015 (Aoudhouy). Bei Erwachsenen können 0,015 Schwindel und unsicheren Gang bewirken (Dujardin-Beaumetz). Bei Darreichung in Pillenform resultiren erst nach 0,14—0,25 Nebenerscheinungen (Aoudhouy). Zum externen Gebrauche ist mit Ausnahme der Subcutanapplication, wo das bromwasserstoffsäure Salz in 2% Lösung gar nicht irritirend wirkt, das Coniin selbst vorzuziehen. So zu Einreibungen (1 Tr. in 5,0—15,0 Weingeist gelöst), in Collyrien (1—3 Tr. mit 25,0 Aqua dest. und 5,0 Mucilago), Augensalben, Salben und Linimenten (1 : 100 Mandelöl), nach Mauthner besonders günstig bei Blepharospasmus und scrophulösen Drüsengeschwülsten, Zahnehtropfen (1 Tr. mit 5 Tr. Zimmtöl und 5,0 Weingeist). Die mit Fett bereiteten Coniinformen sind übrigens sehr zu Zersetzung geneigt und können, wie auch spirituöse Einreibungen, bei wiederholter Anwendung stark juckenden Papelausschlag hervorrufen (Fronmüller).

**Curare, Venenum Americanum.** — Dieser Name wird gewöhnlich allen aus Südamerika zu uns gelangenden Arten von Pfeilgift beigelegt, welche sich dadurch auszeichnen, dass sie in exquisiter Weise lähmend, und zwar zuerst auf die peripherischen Nervenendigungen, wirken und in tödtlichen Dosen Paralyse der Respirationsmuskeln und Erstickungstod veranlassen. Das Curare ist von den Pfeilgiften anderer wilder Völkerschaften durch seine Wirkungsweise verschieden, so von den Asiatischen, welche entweder (durch Strychningehalt), wie das Upas oder Tienté, die Reflexerregbarkeit steigern oder, wie das Antjar, nach Art des Digitalins als Herzgift wirken, auch von dem afrikanischen Iné, welches ebenfalls ein Herzgift darstellt. Das Curare, welches auch mit verschiedenen ähnlich klingenden Bezeichnungen, wie Urari, Woorara, Woorali belegt ist, wird von den am Orinoko, Rio Negro und Amazonenströme wohnenden wilden Völkerschaften in eigenthümlicher, mit allerlei Ceremonien verbundener Weise bereitet und stellt einen wässrigen Auszug verschiedener Pflanzen, besonders Lianen, dar, deren Natur erst in der neuesten Zeit sicher gestellt wurde. Nachdem man früher eine zur Familie der Loganiaceen gehörige Liane, *Strychnos toxifera* Schomb., allgemein als Mutterpflanze des Curare ansah, glaubten Cl. Bernard und Preyer, nachdem sie in amerikanischem Pfeilgift die Früchte einer Paullinia, die auf Frösche wie Curare wirkten, aufgefunden hatten, die schon von Kosteletzky als Stammpflanze angesehene Paullinia Cururu aus der Familie der Sapindaceen als solche bezeichnen zu müssen. Nach den höchst interessanten Untersuchungen von Planchon kann es jedoch keinem Zweifel unterliegen, dass das Hauptingrediens sämtlicher amerikanischer Pfeilgifte der Saft von verschiedenen Species *Strychnos* ist, welche jedoch bezüglich ihrer Giftigkeit sehr differiren und in Folge davon Pfeilgifte von sehr verschiedener Intensität der Wirkung liefern. Auch dieselbe *Strychnos*art kann Curare von verschiedener Wirkungsintensität liefern, je nachdem Stammrinde oder die weit stärkere Wurzelrinde von jungen Bäumen oder diejenige älterer Exemplare angewendet werden. Auch die Bereitungsweise ist möglicherweise von Einfluss, da Extracte von *Strychnos triplinervia* namentlich von jungen Lianenstämmen, bei längerer Einwirkung von Siedhitze ihre Curarewirkung verlieren und ein den arteriellen Blutdruck enorm herabsetzendes und auf diese Weise tödtendes Gift werden (Couty und De Lacerda). Auch kräftige Curaresorten können durch langes Kochen wirkungslos gemacht werden. Die hauptsächlichsten als wesentlichen Ingrediens des Curare benutzten *Strychnos*species scheinen *Strychnos toxifera*, *St. Castelnoeana* und *Strychnos Crevauxii* zu sein. Ueberall aber ist nicht eine Liane als Material zur Curaredarstellung gebräuchlich, sondern es wird dasselbe von mehreren Pflanzen bereitet, deren Effecte jedoch die eigentliche Curarewirkung nicht modificiren. Die Frage, ob auch giftige

Thiere, namentlich Schlangen und giftige Ameisen, in die Bereitung eingehen, ist dahin zu beantworten, dass das im Allgemeinen nicht der Fall ist, jedoch bei einzelnen Völkerschaften in der That geschieht. Wir selbst haben einen Schlangenzahn in einem Topfcurare gefunden. Man ist in Europa meist nicht im Stande, die Abstammung der einzelnen Sorten des amerikanischen Pfeilgiftes, welche wir durch den Handel erhalten, genau festzustellen. Wir können nur nach der Verpackung Calebassen- und Topfcurare, je nachdem sich das Curare in Calebassen (aus Kürbisschalen) oder irdenen Töpfen befindet, unterscheiden, ohne dass es gerechtfertigt ist, aus der Verpackung auf die Qualität zu schliessen. Cl. Bernards Angabe, dass das Calebassen-Curare schwächer als Topfcurare sei, lässt die entschiedensten Ausnahmen zu; selbst die Pfeilgifte derselben Völkerschaften differiren so, dass von einzelnen 0,015, von andern erst 0,005 Hunde tödten (Moroni und Dell'Acqua). Als wirksames Princip der Curarearten erscheint das zuerst von Preyer krystallinisch dargestellte Curarin, eine sauerstofffreie, stark hygroskopische Base von höchst bitterem Geschmacke, welche sich in Wasser und Alkohol in allen Verhältnissen, sehr schwierig in Chloroform, gar nicht in Aether löst. Nach Preyer soll es 20mal stärker als bestes Curare wirken, dagegen übertrifft es nach Dragendorff und Koch die Wirksamkeit des Curare, das zur Darstellung diente, kaum.

Das Curare bietet die merkwürdige Erscheinung, dass es von der Magenschleimhaut aus nur äusserst langsam resorbiert wird, so dass es collossaler Quantitäten (bei manchen Thierspecies der 50—80fachen Menge der bei Application in das Unterhautbindegewebe nöthigen Giftdosis) bedarf, um den Tod herbeizuführen, während es von der Mastdarm- und Scheidenschleimhaut schnell resorbiert wird (Moroni und Dell'Acqua). Das Curarin wird durch Harn (Voisin und Liouville, Bidder, Dragendorff und Koch) und Galle (Lussana) theilweise unverändert ausgeschieden. Partielle Destruction ist wahrscheinlich. Starke Ozenströme heben die Wirksamkeit von Curare auf (R. Richter), dagegen hält es sich trocken an der Luft unverändert und kann in Töpfen sogar 100 Jahre lang wirksam erhalten bleiben (Schroff). Lösungen schimmeln leicht und verlieren an Wirksamkeit.

Ueber die Wirkung toxischer Dosen von Curare beim Menschen liegen wenige Beobachtungen vor. Preyer sah nach dem Pulvern einer besonders harzreichen Curareart aus Venezuela starken Blutandrang nach dem Kopfe, eigenthümlich beengende, aber nicht lange anhaltende Kopfschmerzen, mehrstündige Mattigkeit und Unlust zu Bewegung, sowie ungewöhnliche Speichel- und Nasenschleimabsonderung; auch nach dem Hineingerathen einiger Tropfen Curarinlösung in eine Schnittwunde trat bei Preyer nach 5 Std. Vermehrung der genannten Secretionen, sowie des Schweisses, der Thränen und des Harns ein. Ausgedehnte Beobachtungen machten Voisin und Liouville über die Wirkung kleiner Dosen von Curare an sonst gesunden Epileptikern. Nach Subcutanapplication von  $\frac{1}{10}$  bis 1,8 Mgm. einer Curaresorte, die zu 0,0025 Kaninchen tödtete, ergab sich starke entzündliche Reizung an der Applicationsstelle, manchmal mit Anschwellung der benachbarten Lymphdrüsen verbunden, nach unfiltrirter Curarelösung sogar Abscedirung. Auch bei endermatischer Application von Curarepulver resultirte lebhafter, stehender Schmerz, Erhöhung der Temperatur und manchmal Erythem in der Umgebung. Bei kleineren Dosen wurde der Puls etwas kräftiger und frequenter, einige Stunden doppelschlägig, ebenso nahm die Temperatur in der Achselhöhle um 1—2°, die Zahl der Respirationen um 4—8 zu, mitunter kam vermehrte Schweisssecretion, constant Zunahme der Diurese vor, wobei der Harn hell und zuckerhaltig war. Bei grösseren Dosen bekamen die Patienten 20—90 Min. nach der Injection heftigen Schüttelfrost (mit Gänsehaut, Zähneklappern und Zittern des ganzen Körpers), womit sich Angstgefühl, mühsames Athmen, Kleinheit des sehr beschleunigten Pulses und erhöhte Temperatur verbanden. Sehr rasch verminderte sich die Motilität der untern Extremitäten, wozu noch starker Durst, heftiges Kopfweh und Schlafneigung hinzukamen. Auf den Schüttelfrost folgte nach einigen Stunden Steigen der Hautwärme, Beschleunigung und Dikrotismus des Pulses, Hautröthe, namentlich im Gesicht und an den Ohren, Injection der Conjunctiva und schliesslich profuser Schweiss. Die Lähmung der Extremitäten dauerte  $\frac{1}{4}$  bis 1 Std., das Fieber bis zu 6 Tagen. In einigen Fällen kam Diplopie, Mydriasis, Strabismus divergens und Ptosis vor.

In seiner Wirkung auf Thiere gleicht Curare im Wesentlichen dem Coniin. Bei Fröschen bedingen höchst minimale Mengen ( $\frac{1}{30}$  Mgm.) Lähmung aller willkürlichen Bewegungen, die an den Hinterbeinen beginnt und rasch zum Stillstande der Athmung führt. Die Reflexerregbarkeit, welche nach einzelnen Forschern (Wundt, Schelske, von Bezold) anfangs gesteigert ist, erlischt später als die willkürliche Bewegung. Convulsionen treten nicht ein. Von der allgemeinen Lähmung ist nur das Herz ausgenommen, welches unverändert tagelang fortpulst, während die Lymphherzen stillstehen. Mit nicht zu hohen Dosen vergiftete Frösche erholen sich bei passender Behandlung auch aus vollständiger Paralyse nach 3–4, ja selbst nach 11 Tagen; der von ihnen ausgeschiedene Urin wirkt auf andere Frösche paralyisierend (Bidder). Bei Säugethieren sind ebenfalls Lähmungserscheinungen die Hauptsache; doch scheinen kleine Mengen auch Erregungszustände herbeiführen zu können (De Lacerda). Hier werden die Athemmuskeln rasch ergriffen, in Folge wovon Kohlensäureanhäufung im Blute und in manchen Fällen klonische Convulsionen vor dem Tode eintreten. Der Tod ist ein asphyktischer und kann durch Einleiten der künstlichen Respiration verhütet werden, wenn man gleichzeitig oberhalb der Applicationsstelle mittelst einer Ligatur den Eintritt des Giftes in die Circulation verhindert. In der Ligatur und der artificiellen Athmung sind die Hauptmittel zur Behandlung einer Vergiftung mit Curare gegeben.

Die physiologischen Versuche über die Wirkungsweise des Curares lassen kaum einen Zweifel darüber, dass bei Warmblütern und den meisten Kaltblütern die lähmende Wirkung primär auf die peripherischen Nervenendigungen und später auf die Nervenstämmen gerichtet ist und dass erst später eine Lähmung anderer Nerven und der Nervencentren durch Curare erfolgt. Bei Fischen wird die Willkürbewegung eher gelähmt als die Endorgane in den Muskeln (Steiner). Cl. Bernard u. A. nehmen auch eine Lähmung der vasomotorischen Nerven an, namentlich unter Hinweis auf die bei Menschen und Säugethieren beobachtete, jedoch keineswegs constante Vermehrung der Secretionen und den Curarediabetes. Die Einwirkung des Halsstammes des Sympathicus auf Gefässe und Temperatur der betreffenden Seite wird durch Curarevergiftung nicht aufgehoben. Die bei curarisirten Thieren constant vorhandene Mydriasis, welche bei Fröschen oft 24 Std. deutlich ist und sich mit Prominenz der Bulbi verbindet, ist auf Lähmung des Oculomotorius zu beziehen. Grosse Dosen (0,0015 bis 0,0020 beim Frosche) bewirken Lähmung der Herzvagusendigungen. Die Darmbewegungen werden durch Curare sehr vermehrt und die Erregbarkeit des Darmes für directe Reize gesteigert. Bei Einspritzung grosser Dosen Curarelösung in die Drosselader erfolgt bei künstlich respirirenden Thieren anfangs rapides Sinken des Drucks im Aortensystem bei ausserordentlicher Beschleunigung der Pulsfrequenz, später Wiederanstiegen des Drucks mit Abnahme der Herzschlagzahl (Traube). Ausserhalb des Körpers zerstört Curare die weissen Blutkörperchen, im Organismus ist dies nicht der Fall (Tarchanoff), doch häufen sich dieselben bei Fröschen in den Lymphsäcken an und verschwinden aus dem Blute.

Therapeutisch ist Curare zuerst von italienischen Aerzten (Vella u. A.), später auch von deutschen (Demme, Busch) gegen Tetanus traumaticus angewendet; die Statistik der bis dahin mit dem Mittel behandelten Fälle spricht nicht gerade zu Gunsten des Medicaments. Burow will einen Fall von Tetanus toxicus (Strychninvergiftung) damit geheilt haben. Dass Curarin kein reeller Antagonist des Strychnins ist, zeigt die Vergleichung der Wirksamkeit beider. Die Reflexerregbarkeit wird durch Curare jedenfalls nur in zweiter Linie herabgesetzt, die motorische Lähmung ist entschieden die Hauptsache. Das Uebergreifen derselben auf die Athemmuskeln vergrössert aber bei grossen Dosen, durch welche man allerdings Strychninkrämpfe unterdrücken kann, was bei kleineren nicht der Fall ist, die Gefahr, dass Asphyxie und Tod eintritt. Das von R. Richter bei Thieren erprobte Verfahren, die Strychninkrämpfe durch grosse Dosen Curare aufzuheben und die künstliche Athmung so lange zu unterhalten, bis das Strychnin eliminirt ist, beseitigt zwar die Erstickungsgefahr; doch ist es viel unbequemer als die wohl ebenso erfolgreiche Behandlung mit Chloral, und enthebt, da sie das Bewusstsein nicht alterirt, den Kranken nicht wie Chloral der psychischen Aufregung. Hunter u. A. benutzten Curare bei



*Lyssa humana.* Gualla will Curare bei Spasmus faciei mit Erfolg angewendet haben; Benedikt, Thiercelin, Kunze u. A. versuchten dasselbe bei Epilepsie, wo indessen ein entschiedener Nutzen nach Voisin und Liouville nicht hervortritt, höchstens da, wo die Convulsionen aus directer Reizung der motorischen Nerven hervorgehen.

Curare kann endermatisch und subcutan angewendet werden; letzteres ist am gebräuchlichsten. Bei den quantitativen Wirkungsdifferenzen der verschiedenen Curare-Arten ist eine allgemein passende Dosis nicht aufzustellen. Zur subcutanen Injection sind filtrirte wässrige Lösungen (1:100) die besten und beginnt man mit 0,005—0,006 und steigt vorsichtig, bis man die Dosis erreicht, welche Muskeler schlaffung bedingt. Eine cumulative Action ist nicht zu befürchten und schwerere Erscheinungen treten erst nach einigen Dgm. ein, während 4mal täglich 0,1 ohne Schaden injicirt werden kann (Voisin und Liouville). Endermatisch kann viel mehr gebraucht werden; Vella stieg dabei von 0,1—1,0 bei Tetanischen (auf die Wunde applicirt), Voisin und Liouville bis 0,38. Letztere applicirten Curare auch im Rectum (bis 0,4). Man darf wässrige Curarelösungen nicht lange aufbewahren, da sehr rasch unter Bildung von Pilzen Zersetzung und Sedimentirung eintritt.

Das im Handel als Curarinsulfat vorhandene Product ist häufig nur Calciumphosphat mit anhaftenden Curareresten (Sachs) und übertrifft das Curare keineswegs an Activität (Beigel), weshalb man von der Anwendung des sehr theueren Präparats am besten ganz abstrahirt.

## 2. Ordnung. Neurotica spinalia, besonders auf das Rückenmark wirkende Mittel.

**Semen Strychni, Nux vomica; Strychnossamen, Krähenaugen, Brechnuss. Strychninum nitricum; Strychninnitrat, salpetersaures Strychnin.**

Als der hauptsächlichste Repräsentant der die Reflexerregbarkeit steigernden Medicamente erscheint das in den Brechnüssen, den Samen eines ostindischen Baumes aus der Familie der Loganiaceen, *Strychnos nux vomica* L., enthaltene und als salpetersaures Salz officinelle Alkaloid Strychnin.

Die Brechnüsse sind scheibenförmige, 2,5 Cm. Durchmesser und höchstens 5 Mm. Dicke erreichende, in der Mitte etwas dünnere, auf der einen Seite etwas vertiefte, auf der andern Seite erhabene, häufig verbogene Samen, deren graugelbe Oberfläche mit weichen, glänzenden, bisweilen grünlich schillernden einfachen Haaren dicht besetzt ist und welche nach dem Einweichen in Wasser sich längs der oft etwas zugeschärften Randlinie in die beiden Hälften des hornartigen, stärkemehlfreien Sameneiweisses zerlegen lassen, welche die zwei zarten, fünf Mm. langen Keimblättchen und das keulenförmige Würzelchen einschliessen. Sie waren schon den Arabern bekannt.

Das 1818 von Pelletier und Caventou entdeckte Strychnin findet sich ausser in den Brechnüssen auch in den Ignazbohnen, *Fabae Sti. Ignatii*, den Samen von *Ignatia amara* L. fil., einem dem Brechnussbaum verwandten strauchartigen Baume auf den Philippinen, ferner in der als falsche Angusturarinde bezeichneten Rinde von *Strychnos nux vomica* L. (vgl. S. 659), sowie in der holzigen Wurzel von *Strychnos colubrina* L., dem sog. Schlangenhölze, einer als Hoang-nan bezeichneten Cochinchinesischen *Strychnos*rinde (*Str. Gauthieriana*), welche als Specificum gegen Biss toller Hunde und giftiger Schlangen gilt, endlich in dem auf den Molukken und Sundainseln von den Eingeborenen aus der Wurzelrinde von *Strychnos Tienté* Lesch. bereiteten Pfeilgifte Upas Radja oder Tienté. Auch auf Krähenaugenbäumen schma-

rotzende Lorantheen sollen Strychnin enthalten. Das Alkaloid ist fast überall von einer zweiten Base, dem Brucin, in den Brechnüssen noch von einer dritten, dem Igasurin, begleitet. Das Brucin überwiegt in den Brechnüssen wie in der Angusturarinde das Strychnin, fehlt dagegen im Upas. Der Strychningehalt der Brechnüsse kann zwischen 0,28 und 0,63 % variiren. Das Alkaloid soll darin an eine eigenthümliche Säure, Igasursäure, gebunden sein, welche jedoch vielfach für Milchsäure erklärt wird.

Das Strychnin,  $C^{21}H^{22}N^2O^2$ , bildet kleine, weisse, orthorhombische Prismen von ausserordentlich bitterem, hintennach etwas metallischem Geschmacke und alkalischer Reaction. Es löst sich in 6667 Th. kaltem und 2500 Th. siedendem Wasser; die kalt gesättigte Lösung schmeckt bei Verdünnung mit ihrem hundertfachen Gewichte Wasser noch deutlich bitter; in Aether oder absolutem Alkohol ist Strychnin fast nicht löslich. Das Strychnin ist eine starke Base, welche viele Metalloxyde aus ihren Salzlösungen fällt; die Strychninsalze sind meist krystallisirbar und schmecken ausserordentlich bitter. Von denselben bildet das allein officinelle Strychninnitrat farblose Krystallnadeln, die sich in 90 Th. kaltem und 3 Th. siedendem Wasser, so wie in 70 Th. kaltem und 5 Th. siedendem Weingeist auflösen und damit neutrale Solutionen von intensiv bitterem Geschmacke geben. Ein Stückchen Strychninnitrat, welches in kochende Salzsäure fällt, ruft darin dauernd rothe Farbe hervor. Mit Salpetersäure zerrieben, färbt sich Strychninnitrat gelblich; aus der gesättigten wässrigen Auflösung des Salzes fällt Kaliumchromat rothgelbe Kryställchen, die in Berührung mit Schwefelsäure blaue bis violette Farbe annehmen.

Das Brucin, bildet wasserhelle vierseitige Prismen oder perlgänzende Blättchen oder blumenkohlartige Aggregate, welche anhaltend bitter schmecken. Es ist schwer in Wasser, leicht in absolutem und wässrigem Alkohol, sowie in Chloroform löslich. Das Brucin ist, wie es im Handel vorkommt, in der Regel mit Strychnin verunreinigt und zeigt wesentlich die demselben zukommende tetanisirende Action. Reines Brucin wirkt allerdings ebenfalls steigernd auf die Reflexerregbarkeit, zugleich aber entschieden herabsetzend und lähmend auf die peripherischen Nervenendigungen, welche Wirkung bei Kaltblütern prävalirt oder geradezu ausschliesslich vorkommt (Liedtke, Robins). Die Giftigkeit des salpetersauren Brucins ist  $38\frac{1}{2}$  mal so schwach wie die des entsprechenden Strychninsalzes (F. A. Falck). Das Igasurin soll nach Desnoix und Soubeiran ebenfalls wie Strychnin wirken und in seiner Giftigkeit die Mitte zwischen Strychnin und Brucin halten.

Die Wirkung des Strychnins ist hauptsächlich eine entfernte, obschon ihm gelinde örtliche Reizung nicht abgeht, welche zusammen mit der grossen Bitterkeit Ursache der durch Einführung sehr kleiner Mengen Strychnin bedingten Beförderung des Appetits zu sein scheint. Die Resorption des Strychnins erfolgt von der Cutis und dem Unterhautzellgewebe und wohl von sämtlichen Schleimhäuten aus. Es wird bei toxischen Gaben durch die Nieren und vielleicht auch durch die Speicheldrüsen eliminirt.

Die irritirende Wirkung des Strychnins macht sich im Magen und Darmcanal kaum geltend; das bei Einführung von Strychnin in Pulver oder Lösung häufig eintretende Erbrechen ist offenbar ein durch die intensive Bitterkeit des Mittels veranlassetes Reflexphänomen. Dagegen giebt sich Irritation bei endermatischer Anwendung durch heftiges Brennen und Jucken, sowie durch mässige Entzündung der Applicationsstelle und ein Gefühl in deren nächster Umgebung, als wenn man die Haut mit Nadeln stäche, zu erkennen (G. B. Richter). Längere innerliche Darreichung führt wie diejenige anderer Amara bisweilen zu Verdauungsstörungen. Die Resorption des Strychnins erfolgt am raschesten bei subcutaner, langsamer bei interner und endermatischer Application. Nach Savory ist der Mastdarm für Strychnin eine gefährlichere Applicationsstelle als der Magen; selbst vom Thränencanal aus (Schüler) hat man Resorption und intensive Vergiftungserscheinungen nach Dosen, welche vom Magen aus dieselben nicht bedingen würden (0,03), beobachtet. — Am schwierigsten wird Strychnin von der Blasenschleimhaut aus resorbirt, so dass von hier aus beim

Hunde 0,006–0,01 nicht giftig wirken (F. A. Falck); doch sind beim Menschen Strychninvergiftungen durch Injection in die Blase bei hohen Dosen (0,1) vorgekommen (Robert). — Die Elimination von Strychnin durch die Nieren wurde zuerst von M'Adam nachgewiesen, welcher nach Darreichung von 0,03 bei einem Hunde dasselbe schon nach 9 Min. im Urin fand, ehe Intoxicationserscheinungen sich eingestellt hatten. Kratter (1882) fand das Alkaloid nach 0,075 Strychninnitrat subcutan schon in  $\frac{1}{2}$  Std. im Harn; die Elimination war nach einmaliger Injection in 24 Std., nach längerem Gebrauche in 3 Tagen vollendet. Dragendorff und Masing constatirten bei Thierversuchen, dass Strychnin bei längerer Darreichung kleiner Dosen erst mehrere Tage nachher im Harn erscheint und dann die Elimination auch mehrere Tage fortdauert. Das Alkaloid scheint bei Thieren kurze Zeit in den Organen und namentlich in der Leber zu verweilen. So constatirten es Dragendorff und Masing beim Hunde noch 3 Tage nach dem Verabreichen einer grossen, nicht letalen Dosis in der Leber; ausser in der Leber ist Strychnin auch in den Muskeln (M'Adam), Nieren, Milz und Pankreas (Dragendorff und Masing), in verschiedenen Theilen des Centralnervensystems und im Speichel (Gay) constatirt.

Die hauptsächlichste Wirkung des Strychnins ist, abgesehen von seinem hemmenden Einfluss auf Gährungsprocesse, worin es in mancher Beziehung, z. B. in Bezug auf alkoholische Gährung (Buchheim und Engel), jedoch nicht im Verhältnisse zur Intensität seiner Bitterkeit, selbst das Chinin übertrifft, auf das Rückenmark gerichtet, indem es eine ausserordentliche Steigerung der Reflexaction herbeiführt, die bei grossen Dosen zum Auftreten tetanischer Anfälle führt, welche durch die leisesten äusseren Reize (Berührung, Geräusch) hervorgerufen werden. Ueber das Zustandekommen dieser Krämpfe divergiren die Ansichten sehr; doch ist es wahrscheinlich, dass eine directe Erregung durch das Gift stattfindet und nicht sonstige physiologische Effecte des Alkaloids als primär und als Ursache der Krämpfe anzusehen sind. Unter diesen steht die von Harley constatirte Verringerung der Absorptionsfähigkeit des Blutes für Sauerstoff obenan, indem dieselbe die durch die vom Tetanus mit ergriffenen Brustmuskeln gesetzten Hindernisse der Respiration und die daraus hervorgehende mangelhafte Oxydation im Blute in ihrer Einwirkung auf den Organismus unterstützt und das Eintreten von Erstickungstod, wie solcher im Verlaufe eines tetanischen Anfalles bei Warmblüthern in der Regel dem Leben ein Ende setzt, befördert. S. Mayer wies neuerdings eine besondere Wirkung auf das vasomotorische Centrum nach, indem, wie auch schon R. Richter sah, Strychnin bei morphinisirten oder curarisirten Thieren enorme Steigerung des Blutdruckes bedingt, welche manchmal mit Beschleunigung, in der Regel mit Retardation (in Folge centraler Reizung des Vagus), häufig mit keiner wesentlichen Veränderung des Herzschlages einhergeht. Ausserdem besitzt Strychnin eine enorm reizende Wirkung auf das respiratorische Centrum, das es in sehr grossen Dosen rasch zu lähmen vermag (R. Richter, S. Mayer).

Dass das Gehirn nicht primär afficirt wird, beweisen die Vergiftungsfälle beim Menschen, bei denen das Sensorium fast ausnahmslos bis zum Tode ungetrückt bleibt. Auf die motorischen Nerven ist Strychnin ohne Einfluss; allerdings resultirt bei Vergiftung von Fröschen schliesslich Lähmung derselben,



jedoch nur durch sehr hohe Dosen oder durch Ueberreizung (Kölliker), auch geht die elektromotorische Wirksamkeit der Nerven nicht verloren. Festgestellt durch Versuche ist nur, dass es auf sensorielle Nerven in der Weise wirkt, dass es deren Perception verschärft, insbesondere auf den Olfactorius (Lichtenfels und Fröhlich). Ein gleiches Verhalten scheint ihm dem Opticus gegenüber bei pathologischen Zuständen desselben zuzukommen, während bei normalem Verhalten dasselbe bisher nicht nachgewiesen ist; die bei längerer Darreichung von Strychnin beobachtete Empfindlichkeit der Augen gegen Licht ist wohl nicht auf die Sehnerven zurückzuführen. Die Tastempfindlichkeit scheint nach den Versuchen von Lichtenfels und Fröhlich ebenfalls erhöht zu sein. Ein Einfluss auf die Pupille kommt dem Strychnin als solchem nicht zu; die Veränderungen fehlen, wenn künstliche Athmung unterhalten wird, sind somit Folge der Alteration des Blutes (Schiff). In den tetanischen Anfällen ist die Pupille meist erweitert, in den Pausen normal, seltener verengt (Civinini). Ebenso inconstant ist die Wirkung auf das Herz bei Säugethieren (S. Mayer) und beim Frosche (Heinemann). Bei Batrachiern wirken kleine toxische Gaben fast gar nicht auf die Pulsfrequenz; bei etwas grösseren erfolgt Herabgehen der Herzschlagzahl vor Eintritt der Krämpfe, das nach dem Anfälle noch zunimmt und sich mit Irregularität des Herzschlages und diastolischen Herzstillständen selbst von  $\frac{1}{2}$  Minute Dauer verbindet, aber manchmal auch wieder der Norm Platz macht (Heinemann). Brunton und Cash vindiciren dem Strychnin eine besondere stimulirende Wirkung auf das Herz, da die Ligatur der venösen Sinus beim Froschherzen und ebenso nach vorher bewirktem Herzstillstand Injection von Strychnin in das rhythmische Pulsation hervorruft. Die Reflexerregbarkeit des vasomotorischen Centrums wird gesteigert; die Gefässe sind während der Anfälle an der Froschschwimmhaut und den Fledermausflügeln stark contrahirt (R. Richter). Die peristaltische Bewegung wird durch kleine Dosen Strychnin nicht gesteigert (Nasse), wohl aber durch letale (Freusberg).

Die zuerst von S. Meyer aufgestellte Theorie, wonach Strychnin nur indirect auf das Rückenmark wirke und die primäre Action auf das vasomotorische Centrum und das Athmungscentrum gerichtet sei, und zwar auf letzteres in so heftiger Weise, dass die Erregung von dieser auf die gesammte Körpermuskulatur irradiire und durch die hierdurch eingeführten sensiblen Erregungen vom Rückenmark ausgehende neue Reflexinnervationen zu den cerebralen Erregungen hinzutreten, und dass diese Effecte des Strychnins schliesslich durch die in gleicher Richtung wirkende Sauerstoffverarmung des Blutes unterstützt würden, kann durch die Versuche von Freusberg (1875), wonach auch nach Rückenmarksdurchtrennung Krämpfe in den von dem abgetrennten Rückenmark innervirten Theilen durch Strychnin hervorgerufen werden, als widerlegt erscheinen. Gegen eine derartige directe Reizung des Athmungscentrums als Hauptursache der Strychninkrämpfe spricht auch die grosse Empfänglichkeit der Frösche gegen das Gift, obschon bei diesen Thieren die Athmung durch die Haut ungestört fortgeht. Für eine directe Erregung des Rückenmarks sprechen auch Versuche von Spence, wonach Tetanus bei Fröschen durch Strychnin nach Ligatur des Herzens auch bei directer Application auf die Centren eintritt und wonach bei letzterer Applicationsweise in Folge von allmähigem Vordringen des Giftes in das Rückenmark zuerst die vordern, später die hintern Extremitäten tetanisch werden, wie auch die Hyperästhesie allmähig von vorn nach hinten vorschreitet. Hyperämien des Rückenmarkes sind nach Spence nicht Ursache des Tetanus, weil die Krämpfe auch nach totaler Wegschneidung des Herzens auftreten. Die Möglichkeit einer directen Wirkung von Strychnin auf die Nervencentren wird durch den Nachweis des Giftes in denselben (Gay) dargethan. Dass dabei auch eine Reizung der Medulla oblongata stattfinden kann, ist um so weniger auszuschliessen, als nach Gay das Gift gerade im verlängerten Marke in der grössten Quantität sich findet. Die Steigerung der Reflexerregbarkeit bezieht sich gleichmässig auf mechanische, thermische und chemische Reize (Freusberg). Die Nothnagelsche Theorie, dass Strychnin reflexhemmende Centren im Rückenmark lähme, ist von Freusberg als unzureichend zur Erklärung der Symptome des Strychnismus bezeichnet, indem sie für das Endstadium der Lähmung, wo die Reflexerregung entschieden herabgesetzt ist, die nicht zulässige Annahme

einer Steigerung dieser Apparate voraussetzt. Dass die Strychninkrämpfe von der verringerten Fähigkeit des Blutes zur Sauerstoffaufnahme und der damit im Zusammenhang stehenden Alteration der Ernährung der Nervencentren abhängen, lag umso näher anzunehmen, als die Strychninconvulsionen mit den Erstickungskrämpfen die grösste Aehnlichkeit besitzen. Spence suchte diese Theorie durch Experimente zu widerlegen, wonach Frösche nach längerem Aufenthalte in Sauerstoff genau so wie unter gewöhnlichen Verhältnissen tetanisirt werden. Dass die Asphyxie bei toxischen Dosen mitwirkt, wird man nicht in Abrede stellen wollen, wenn man die schwarze Färbung des arteriellen Bluts bei strychninisirten Thieren ins Auge fasst, bei denen die Herstellung normaler Blutfarbe nur durch äusserst energische künstliche Respiration gelingt. Diese Färbung ist aber offenbar nur z. Th. aus der verringerten Absorptionsfähigkeit des Blutes zu erklären, z. Th. ist es gewiss die Folge des enormen Sauerstoffverbrauchs und der gesteigerten Kohlensäureausscheidung in den tetanisirten Muskeln, als deren Ausdruck auch die Steigerung der Temperatur (bei Thieren oftmals 44° und darüber) erscheint.

Die tetanischen Erscheinungen nach Strychnin in toxischer Dosis, an welchen Extremitäten und Rumpf so wie die Kaumuskeln participiren und welche in der Regel unter der Form des Opisthotonos sich darstellen, zeigen sich sowohl bei Menschen als bei den verschiedensten Thierklassen. Unter letzteren ist die Receptivität gegen das Gift eine äusserst verschiedene.

Die auffallendste Immunität für das Gift zeigen verschiedene Schnecken und von Wirbelthieren Hühner und Nashornvögel. Kaninchen sind empfänglicher als Katzen. Nach F. A. Falck ist bei subcutaner Application die niedrigste letale Dosis, auf Kgm. berechnet, für Kaninchen 0,0006, für Katzen und Hunde 0,00075, für Hühner 0,002, für Frösche 0,0021, für Ringelnattern 0,00231 und für Weissfische 0,00125. Wenn hiernach Frösche nicht als besonders wenig resistent gegen das Gift gelten können, so ist doch auffallende Empfänglichkeit für kleine Gaben denselben nicht abzustreiten. Wenn, wie Rosenthal und Leube angeben, bei den meisten Thieren eine Dosis schon tödtlich wirkt, welche die kleinste tödtliche Gabe um  $\frac{1}{3}$  übersteigt, so ist dies beim Frosche gewiss nicht der Fall, indem zur Hervorrufung von Tetanus bei Fröschen oft  $\frac{1}{100}$ , stets aber  $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$  Mgm. genügt, während nicht selten Intoxicationen mit 0,002 überstanden werden.

Bei Menschen variirt die vergiftende und tödtliche Dosis des Strychnins nach Alter, Constitution und andern Verhältnissen. Es giebt Fälle, wo 0,005 beim Erwachsenen leichte Intoxicationerscheinungen bedingen können (Lüdicke, Andral, Coote), während solche nach der Maximaldosis von 0,01 und selbst nach höheren Gaben ausbleiben können. Bei subcutaner Injection sah Eulenburg schon nach 0,01 die ersten Intoxicationsphänomene, Bois nach 0,004 (bei einem 4 jährigen Knaben), Upshur nach 0,003 (bei einem 3 monatlichen Kinde) Intoxicationerscheinungen, welche bei endermatischer Application nach 0,01 in intensiver Weise hervortreten können (Wuttke, G. B. Richter). Im Allgemeinen lässt sich die niedrigste letale Gabe für Erwachsene als zwischen 0,03 und 0,12 liegend betrachten, doch giebt es Fälle genug, wo viel mehr Strychnin den Tod nicht herbeiführt.

Nach Leube und Rosenthal tritt bei Thieren nach längerer Darreichung kleiner Mengen Strychnin Toleranz gegen das Mittel ein. Auch bei Menschen scheint eine solche erworben werden zu können, doch hat dieselbe entschieden ihre Grenzen, und nicht selten führt Steigerung der Dosen zu heftigen Vergiftungen, selbst mit Exitus letalis (Taylor, Pereira, Borchard, W. Hunter).

Wenn in einzelnen Fällen in nichts weniger als nachahmungswerther Weise Paralytische in 2 Monaten 4,0 Strychnin consumirten, anfangs in Einzeldosen von 0,005, später von 0,01 und 0,02, endlich bei allmäliger Erhöhung mehrere

Tage hindurch von 0,2 pro die, ohne dass dadurch Vergiftungserscheinungen folgten, so lag dieser vermeintlichen erworbenen Toleranz vielleicht ein pathologischer Zustand der Medulla spinalis zu Grunde. Andererseits ist die niedrigste letale Dosis sowohl bei allmählicher Strychnindarreichung (0,01) als bei einmaliger Einführung (0,015–0,03) bei Herzkranken beobachtet, wo die Gefahren der Erhöhung des Drucks im Aortensystem in manchen Fällen auf der Hand liegen.

Manche äussere Verhältnisse können modificirend auf die Strychninaction wirken. Nach Ranke können die tetanischen Krämpfe durch Anwendung des constanten Stroms auf die Medulla spinalis, gleichviel ob in aufsteigender oder in absteigender Richtung, aufgehoben werden. Nach Vierordt und Kaupp sollen Aderlässe bei Kaninchen den Eintritt der Strychninvergiftung verzögern. Nach Rosenthal, Leube und Uspensky kann der Strychnintetanus durch künstliche Respiration bis zu vollständiger Apnoe unterdrückt werden. Nach Kunde ist auch die äussere Temperatur von Bedeutung, indem Frösche in einer gewissen Temperatur (+ 15°) nicht tetanisirt werden und vergiftete Thiere in erhöhter Temperatur im Allgemeinen leichter genesen. Eine grosse Reihe neurotischer Mittel können Strychnintetanus vorübergehend oder dauernd unterdrücken.

Das Bild der Einwirkung des Strychnins gestaltet sich bei Menschen und Thieren in derselben Weise, weshalb wir uns auf die Darstellung der bei Menschen beobachteten Erscheinungen nach grösseren Dosen beschränken, indem wir bezüglich der besonders bei Paralytikern beobachteten Wirkungen fortgesetzter kleiner und bis zu einer gewissen Grenze gesteigerter Dosen auf die Darstellung der Anwendung der Strychnacea bei Lähmungen verweisen. Die leichteren, meist von selbst vorübergehenden Erscheinungen nach sog. physiologischen Dosen bestehen in Vibrationen in den Extremitäten wie beim Fieberfrost, Ziehen in den Kau-muskeln, Nacken- und Brustmuskeln, Ameisenkriechen und analogen Sensationen verschiedener Art in der Haut und erhöhter Empfindlichkeit gegen äussere Reize. In den leichtesten Fällen der Intoxication kommt es zu Steifigkeit einzelner Muskeln, die sich nach kurzer Zeit zurückbildet; in schwereren Fällen zu meist mehreren, durch deutliche Intervalle von einander geschiedenen Anfällen von tonischen Krämpfen, welche den Tod durch Erstickung im Anfälle oder durch Erschöpfung herbeiführen. In den Intervallen befinden sich die Muskeln meist nicht in rigidem Zustande und ist das Bewusstsein völlig intact.

Auch in den Anfällen ist das Sensorium meist ungetrückt und nur bei langer Dauer des Anfalls scheint es bisweilen zu schwinden. Die Zeit des Eintritts der Anfälle schwankt in den bisher beim Menschen beobachteten Intoxicationen durch innere Einführung von Strychnin nach der genommenen Quantität und der Form der Darreichung zwischen 5 Min. und mehreren Stunden; der Tod kann schon nach 5–10 Min. und bisweilen selbst früher erfolgen, tritt aber in der Regel erst nach mehreren Stunden ein, in Ausnahmefällen auch nach Beseitigung des Tetanus am folgenden oder selbst am dritten Tage nach der Intoxication. Die Zahl der Anfälle kann in tödtlich endenden Vergiftungen eine sehr beschränkte sein, die Dauer derselben beträgt meist nicht über 2 Minuten. In Fällen, wo Genesung erfolgt, werden die Intervalle zwischen den Anfällen immer länger. Charakteristisch für die Strychninvergiftung ist die in den Intervallen bestehende enorm gesteigerte Reflexerregbarkeit, so dass der geringste äussere Reiz (Berührung, Luftzug, Geräusch) aufs Neue Tetanus erzeugen kann. Die Anfälle, als deren nächste Veranlassung fast immer ein äusserer Reiz erscheint, der nur ausnahmsweise nicht nachgewiesen werden kann, können sich unter den verschiedenen Formen des Tetanus (Opisthotonos, Orthotonos, Pleurotonos und



Emprosthotonos) darstellen. Nicht immer participiren alle Muskeln in gleichem Maasse an dem Krampfe, selten nehmen z. B. Gesicht- und Bauchmuskeln daran Theil; der tonische Krampf der Kiefermuskeln (Trismus) kann in einzelnen Fällen fehlen und geht nicht immer, wie beim Wandstarrkrampf, dem Tetanus der Extremitätenmuskeln voraus. In den Anfällen besteht in Folge der Steifigkeit der Brustmuskeln hochgradige Dyspnoe und Erstickungsgefühl oder vollständiges Sistiren der Athmung, wo dann Cyanose des Gesichts und der ganzen Haut, Anschwellung der Venen, Protrusion der Augäpfel und Mydriasis eintritt und bei längerer Dauer des Anfalls Erstickungstod nachfolgt.

Bei der Section finden sich die Zeichen des Erstickungstodes, dunkle Blutfärbung und Hyperämie in verschiedenen Körperhöhlen, die bald dieses, bald jenes Organ mehr betrifft. Eigenthümlich ist in der Regel das Verhalten der Todtenstarre, welche meist, nachdem im Moment des Todes Erschlaffung eingetreten, äusserst rasch auftritt und lange Zeit anhält, so dass sie oft noch bei schon vorgeschrittener Fäulniss, ja selbst monatelang bestehen kann; die Finger sind dabei eingekniffen, der Fuss gewölbt oder einwärts gedreht; nur äusserst selten ist der Rigor mortis normal.

Die Behandlung der Strychninvergiftung erfordert, so lange die Möglichkeit dazu vorhanden ist, schnelligste Entfernung des Giftes durch die Magenpumpe oder durch Brechmittel. Als chemisches Antidot ist Tannin in der 20 bis 25-fachen Menge des ingerirten Strychnins oder ein Galläpfeldecocet (zu 20,0 auf 0,1 Strychnin) darzureichen, doch muss man das keineswegs völlig unlösliche Strychnintannat durch Brechmittel oder die Magenpumpe entfernen. Brechmittel und chemische Antidote haben übrigens bei Strychninvergiftung, da in der Regel Einführen von Medicamenten in den Magen durch bestehenden Trismus unmöglich gemacht wird, geringere Bedeutung als organische und dynamische Antidote. Von Substanzen, welche die directe Herabsetzung der Reflexerregbarkeit bedingen (Chinin, Bromkalium, Campher und ätherische Oele), sind Campher und das von mir zuerst vorgeschlagene Bromkalium mit Erfolg benutzt, doch stehen beide verschiedenen indirecten Antagonisten nach. Die letzteren zerfallen in solche, welche die Sensibilität vermindern oder durch Herabsetzung der Hirnthätigkeit die Perception äusserer Eindrücke beschränken oder aufheben und in dieser Weise der Wiederholung der für das Leben besonders gefährlichen Krampfanfälle vorbeugen, und in solche Substanzen, welche einen lähmungsartigen Zustand hervorrufen, der das Hervortreten tetanischer Muskelcontractionen verhindert. Gelingt es, die Vergifteten im Zustande herabgesetzter Sensibilität oder Motilität so lange zu erhalten, bis die Elimination des Giftes vollzogen ist, so ist die Genesung der Patienten der Ausgang. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die cerebralen Neurotica bedeutend mehr als die motorisch lähmenden (Coniin, Curare) leisten und dass man dieselben schon deshalb bevorzugen muss, weil sie den Vergifteten in einen Zustand versetzen, in welchem er von seiner traurigen Situation nichts ahnt. Auf Grundlage einer grösseren Versuchsreihe an Thieren müssen wir das Chloralhydrat in hohen Gaben als das zuverlässigste Antidot des Strychnin bezeichnen, welches den tödtlichen Effect einer 5–6fachen letalen Dose mit Sicherheit abwendet. Man kann mittelst Chloral und noch leichter durch Chloroform einen Zustand von Narkose herbeiführen, in welchem die Anwendung der Magenpumpe oder der chemischen Antidote ohne Gefahr möglich ist. Künstliche Respiration genügt für sich zur Lebensrettung bei Vergiftung mit mehr als letalen Strychnindosen nicht. Nach Richet muss dieselbe mit grosser Energie gehandhabt werden, wenn die Herstellung normaler Blutfarbe erreicht werden soll, oder ist, wie schon früher R. Richet vorschlug, mit Curarebehandlung zu combiniren. Letztere Methode, welche bisher beim Menschen nicht versucht wurde, während die Chloralbehandlung auch beim Menschen mit Erfolg in Anwendung gezogen wurde, lässt, da sie das Bewusstsein nicht aufhebt, den Vergifteten immer Qualen ausstehen, welche ihm erspart werden können.

Das exquisite Bild des Strychnintetanus tritt bei Thieren nicht ein, wenn sehr grosse Mengen auf einmal in die Circulation gelangen, z. B. bei Einspritzung erheblicher Strychninmengen in die Venen. Es kommt dann kein oder doch nur ein rudimentärer Anfall von Tetanus zu Stande, dagegen an dessen Stelle die heftigsten klonischen Krämpfe der gesamten Musculatur, selbst der Augenlider

und des Bulbus bei plötzlich cessirendem Athem (R. Richter). Noch grössere Dosen erzeugen eine Periode der Resolution mit Aufhebung der Athmung und der Reflexerregbarkeit, enormem Sinken des Blutdrucks und der Körpertemperatur bei Fortdauer des Herzschlages (Richet).

Therapeutische Anwendung finden die Krähenaugen und das Strychnin gegen motorische Lähmungen verschiedener Art, wo sie sich namentlich bei Paralyseu peripherischen Ursprungs und bei Lähmungen in Folge von Vergiftungen (Saturnismus, Alkoholismus, Mercurialismus), ferner bei Lähmung der Sphinkteren, sowie bei Prolapsus ani und Enuresis nocturna bewähren.

Die von Fouquier 1811 zuerst eingeführte methodische Behandlung von Lähmungen mit Brechnusspräparaten, an deren Stelle später Magendie, Andral u. A. das Strychnin und seine Salze setzten, ist in neuerer Zeit hauptsächlich durch die Fortentwicklung der Elektrotherapie mehr und mehr ausser Gebrauch gekommen. Die Unbequemlichkeit, welche die Strychninbehandlung in sich schliesst, ist gleichfalls ein Moment, welches derselben nicht günstig ist. Bei längerem Gebrauche, namentlich steigender Dosen, entwickelt sich in den gelähmten Gliedern das Gefühl von Ameisenkriechen im Verlaufe der Nerven, manchmal mit schmerzhaften Sensationen, welche von den Kranken mit dem Durchzucken elektrischer Schläge verglichen werden, und mit Zuckungen der gelähmten Muskeln verbunden. Letztere können so heftig werden, dass die Kranken aus dem Bett geworfen zu werden befürchten; Finger und Zehen gerathen dabei in rasch abwechselnde Extension und Flexion, während Kiefer und Schlundmuskeln frei bleiben und die Circulation nicht alterirt wird. Die Symptome steigern sich meistens Abends und verbinden sich mit Schlaflosigkeit, Ohrentönen und Nebelsehen. Bei der stärksten Einwirkung der Brechnusspräparate verspüren die Kranken lebhaft Schmerzen in den Gliedern, sind keiner Bewegung fähig, da bei jedem Versuche die Muskeln steif werden, leiden an Empfindlichkeit des Gehörs und Gesichts, sowie an Kopfweh und bisweilen an fieberähnlichen Symptomen.

Zu diesen Uebelständen kommt hinzu, dass bei der Mehrzahl der Lähmungen die Medication ohne reellen Nutzen bleibt. Es gilt dies besonders von cerebralen Paralyseu, aber auch von Rückenmarkslähmungen, wenn dieselben wie gewöhnlich mit Structurveränderung der Medulla spinalis verbunden sind. Geradezu contraindicirt ist Strychnin bei frischen cerebralen Lähmungen in Folge von materiellen Läsionen, namentlich Apoplexie, weil es hier leicht Reizungserscheinungen hervorruft. Wo neben motorischer Lähmung erhöhte Reizempfindlichkeit der sensibeln Nerven (erethische Schwäche) besteht, z. B. bei Tabes dorsalis und hysterischen Lähmungen, schadet Strychnin mehr als es nützt. Auch bei peripherischen Lähmungen ist Strychnin nur dann von Nutzen, wenn die Ursachen, auf welchen die Unerregbarkeit motorischer Nerven beruht, beseitigt sind. Vor Allem können somit alte periphere Lähmungen als Indication für das Strychnin betrachtet werden; ausserdem empfehlen es Romberg und Brown-Séquard bei Reflexparalyseu, Ersterer auch bei rheumatischen Lähmungen, Tanquerel des Planches bei Paralysis saturnina. Die Wirksamkeit des Mittels beschränkt sich nicht auf Lähmungen von Rückenmarksnerven, sondern zeigt sich mitunter sehr exquisit an gelähmten Hirnnerven, z. B. bei Facialislähmung und Aphonie in Folge von Stimmbandlähmung. Die vortreffliche Wirkung bei Prolapsus ani (Hutchinson, Manz) hat mancher Praktiker constatirt, und zwar ebensowohl bei interner Darreichung von Brechnusspräparaten als bei epidermatischer Application in der Nähe des Anus; ebenso kommen Heilungen von Incontinentia urinae im kindlichen Lebensalter nicht selten vor, während in späteren Lebensperioden, z. B. bei Harnincontinenz Geisteskranker, der Erfolg meist ungenügend ausfällt. Von Einzelnen wird es auch bei Ischurie in Folge von Lähmung des Detrusor urinae empfohlen. Duclos rühmte Strychnin bei Impotenz.

In zweiter Linie steht die Anwendung des Strychnins bei

Lähmung sensibler (Pétrequin) und sensorieller Nerven, insbesondere gegen Amaurose aus verschiedenen Ursachen.

Die schon früher von Middlemore, Griffin, Fremineau, Saemann, Hoegh u. A. constatirte günstige Wirkung des Strychnins bei Amblyopie und Amaurose ist in neuerer Zeit (1871) von Nagel durch eine reichhaltige Casuistik sichergestellt. Die günstigsten Erfolge liefern nach Nagel Amblyopie und Amaurose ohne ophthalmoskopischen Befund, doch wirkt das Mittel auch bei hyperämischen Zuständen, bei Torpor der Netzhaut, bei plötzlichen Erblindungen ohne Befund mit wahrscheinlich zu Grunde liegender retrobulbärer Neuritis, bei traumatischer Amblyopie und bei Amblyopie aus Nichtgebrauch. Bei bedeutenden materiellen Veränderungen des Opticus und der Retina sind die Erfolge minder günstig, doch scheint selbst ausnahmsweise temporärer Stillstand der progressiven grauen Degeneration der Sehnerven vorkommen zu können (Horner, Cohn). Günstige Effecte durch Strychnin sah Nagel auch in leichteren Fällen von Hyperästhesie der Netzhaut, bei paretischen Zuständen der Accomodation und der Augenmuskeln, weniger bei Lähmungen, gar nicht bei Mydriasis und Accomodationslähmung. Amaurosis saturnina, alcoholica und Tabaksamaurose werden nach Hoegh, Higgins und Woinow in besonders günstiger Weise dadurch beeinflusst, ebenso ist bei Hemeralopie (De Ricci, Chisholm, Woinow) der Erfolg auffallend günstig. Auch bei Retinitis pigmentosa (Haltenhoff), Amblyopie in Folge von Diphtheritis (Savary) und bei Schwachsichtigkeit in Folge von Gehirndepression (Mannhard) sind Erfolge zu verzeichnen. Die Besserung tritt bei Amblyopie oft schon im Verlaufe von einer Stunde ein. — Gegen Ohrentönen und nervöse Schwerhörigkeit empfahl Kramer das Strychnin. Auch bei einer Reihe anderer Nervenleiden haben Brechnusspräparate und Strychnin Empfehlung gefunden, so bei Chorea (Trousseau), wo nach Sée und Sandras die Effecte keineswegs befriedigend ausfallen, bei Epilepsie (Chrestien), besonders von Uterinleiden abhängender (Tyrrel), Oesophagealkrampf (Mathieu), Gesichtskrampf (Sander), Zuckungen nach Schussfractur der Wirbelsäure (Ruppaner), Asthma und Lungenemphysem (Bouchardat und Homolle), Heufieber (Green), Prosopalgie (Adelmann), Gastralgie und Bleikolik, ischiadische Schmerzen von Tabetikern (Pletzer), ja sogar unerhörter Weise Wundstarrkrampf (Fell und Kellock). Bei Wechselfieber soll gleichzeitiger Gebrauch von Strychnin Ersparniss an Chinin ermöglichen (Hassingier, Schroff), so dass 0,2 Chinin den Fieberanfall zu coupiren vermögen.

Ziemlich ausgedehnte Verwendung finden die Brechnusspräparate (weniger das Strychnin, das wegen seiner intensiven Giftigkeit bei geringfügigen Leiden minder gebräuchlich ist) nach Art der Amara bei atonischer Dyspepsie und chronischen Magenkatarrhen, ferner bei Diarrhöen, wo die Brechnuss in der That manchmal mit Vortheil gereicht werden kann.

Ob die Nux vomica bei Appetitmangel mehr als andere nicht giftige Amara leistet, ist höchst zweifelhaft. Die Indicationen sind wohl die nämlichen, doch hat man ausser bei Dyspepsia atonica auch bei Anorexie mit cardialgischen Schmerzen und Ructus Brechnusspräparate besonders empfohlen. Dass sowohl acute als auch chronische Darmkatarrhe unter dem Einflusse der Brechnusspräparate schwinden, ist ein schon von Bardsley hervorgehobenes Factum. Wenzel empfahl das Mittel gegen Dysenterie. Dreifuss, Jenkins, Abeille u. A. glaubten dem Strychnin sogar eine Rolle als Prophylacticum oder Heilmittel bei Cholera asiatica vindiciren zu dürfen, wo es sich freilich in keiner Weise bewährte und die etwaigen Erfolge meist auf die gleichzeitige Administration von Morphin, Eis, Bism. nitr. kommen. Man gab es sogar im Stadium algidum und behauptete, dass hier selbst toxische Dosen ohne Schaden gegeben werden könnten, doch hat man wiederholt beobachtet, dass meist anfangs keine Resorption stattfand, dagegen später bei Wiederherstellung der Circulation plötzlich Strychninvergiftungssymptome eintraten und in einzelnen Fällen sogar der Tod erfolgte. Wir halten diese Medication, namentlich aber auch die In-



jection von Strychnin in das Blut, für eine gefährliche Spielerei. Im Typhus können die Krähenaugenpräparate bei profusen Diarrhöen statt des Opiums gegeben werden, wenn man von letzteren unangenehme Wirkungen auf das Gehirn fürchtet. Ebenso können sie bei Kindern statt Opium benutzt werden. Gewissermaassen im Gegensatze zu dieser hemmenden Wirkung auf die Peristaltik steht die manchmal eclatante Wirkung bei Obstipation, zumal nach vorangegangenen Durchfällen, weshalb auch Aloë und andere Purgirmittel von vielen Praktikern mit Extractum Strychni verbunden werden, wodurch noch dazu die Purgirwirkung erheblich gefördert werden soll.

Alle übrigen der Nux vomica und dem Strychnin zugeschriebenen Heil-effecte sind problematisch oder irrelevant. So bei Chloralvergiftung (Liebreich), Amenorrhoe (Bardsley), Hernia incarcerata (Bardsley), Hydrops (Teissier), Diabetes mellitus (Frick), chronischem Tripper (Johnson), Scrophulose, Rotz, Lungenphthise, hektischen Schweissen (Brunton), Alkoholismus (Luton), fötider Bronchitis (Laycock u. A. m.). Brunton (1878) bezeichnet das Strychnin als allgemeines Tonicum, welches auf die Verdauung als Amarum wirkt, die Reflexerregbarkeit des vasomotorischen Centrums bedeutend hebt und gleichzeitig als Tonicum nervinum, sowie erregend auf das respiratorische Centrum wirkt und durch Vertiefung und Beschleunigung der Respiration einerseits und durch Steigerung des Blutdrucks andererseits die Oxydation und Elimination der chemischen Auswurfstoffe fördert.

Die Strychnossamen finden selten als solche Anwendung; die maximale Einzelgabe beträgt 0.1, die maximale Tagesgabe 0.2. Von Strychninnitrat lässt die Pharmakopoe 0.01 als höchste Einzeldosis und 0.02 für den Tag zu. Zweckmässig ist, diese Maximalgabe nicht zu überschreiten, sondern unter derselben zu bleiben, da wiederholt schon bei geringeren Mengen Vergiftungserscheinungen vorgekommen sind. Man beginne deshalb vorsichtig mit 0.002—0.003 und steigere allmählig um  $\frac{1}{2}$ —1 Mgm. Man reicht Strychninnitrat am zweckmässigsten in Pillenform oder giebt dasselbe gelöst hypodermatisch in etwas geringeren Mengen. Die Pillenform empfiehlt sich für das Strychninsalz wegen des bitteren Geschmacks, wobei man dasselbe zweckmässig mit Aqua dest. oder Spir. dil. verrieben der Pillenmasse zusetzen lässt. Lösungen lassen sich mit Wasser (mit oder ohne Zusatz von Säure), verdünntem Alkohol oder Glycerin bewerkstelligen, sind aber ihrer Bitterkeit wegen nicht empfehlenswerth. Man hüte sich namentlich vor der Anwendung zu geringer Mengen des zu wählenden Vehikels, weil dadurch Abscheidung des Strychninsalzes erfolgen kann, welche, wenn zuletzt der Bodensatz auf einmal genommen wird, selbst tödtliche Intoxicationen zu bedingen vermag. Ebenso hüte man sich, der Lösung des Strychninnitrats Substanzen zuzusetzen, welche die Bildung eines schwerer löslichen Salzes und damit ebenfalls Präcipitation einer giftigen Verbindung veranlassen, so z. B. Iodmetalle, gerbstoffhaltige Syrupe. Alkalien und Alkalicarbonate können zur Abscheidung des ebenfalls viel schwieriger löslichen Strychnin führen und bedingen dieselben Gefahren. Diese Regeln gelten auch für die äusserliche Verwendung des Strychninnitrats in Lösung, obschon ein Zuwiderhandeln hier nur zur Verminderung der Wirkung, nicht aber zu Intoxication führt. Die früher gebräuchliche epidermatische und endermatische Methode sind jetzt fast vollständig durch die subcutane Injection verdrängt, welche gegen Lähmungen der verschiedensten Art und in der neueren Zeit besonders auch bei Amaurose ausgedehnte Anwendung findet. Bei der letzten Applicationsweise wird man nach den Erfahrungen von Eulenburg und Bois die Dosis von 0.005—0.01 nicht überschreiten dürfen. Bei der endermatischen Methode genügen auf eine Vesicatorstelle von der Grösse eines Quadratzolls 0.005. Epidermatisch benutzt man Salben oder Lösungen in Glycerin oder fetten Oelen (1:50—100) bei Paralyse. Bei Amaurose hat man auch Strychninnitrat am untern Augenlide eingepflegt oder in Form von Augenzwässern administriert. Kramer empfahl Einblasen verdünnter Strychninlösungen in die Trommelhöhle durch die Tuba Eustachii bei nervösem Ohrentönen; auch sind Einspritzungen in die Blase bei Lähmung des Sphincter vesicae versucht. Selbst bei diesen Gebrauchsweisen darf der Arzt niemals die zum inneren Gebrauche zulässige Dosis übersteigen.

Von den an Stelle des Strychninnitrats empfohlenen sonstigen Strychninsalzen sind nur das in Frankreich officinelle Strychninsulfat, Strych-

ninum sulfuricum, und das Strychninum aceticum, welches Lüders und Neumann bei Lähmung, Fricke bei syphilitischen Schmerzen und Holscher bei Amblyopie benutzte, von einiger Bedeutung. Leichter löslich als Strychninnitrat, sind sie, wie das von Wimmer bei Amaurose und in England in wässriger Lösung als Liquor Strychniae officinelle benutzte Strychninhydrochlorat, besonders zur Subcutaninjection geeignet. Magendie und Cottureau empfehlen das Iodwasserstoffsäure Salz, Bouchardat das sehr schwer lösliche Iodwasserstoffsäure Strychniniodür, Grimelli ein arsensaures und arsenigsäures Salz (bei Scrophulose und Krebs), Pavesi das in fetten Oelen äusserst leicht lösliche Camphersäure Strychnin (zu epidermatischer Anwendung). Alle diese Salze sind entbehrlich, ebenso die von Einzelnen benutzten Doppelsalze, wie das von Grimelli bei Lähmungen, Neuralgien, Scrophulose und Krebs empfohlene Strychninmorphinsulfat, das bei inveterirter Intermission von Chiappero versuchte arsensaure Chinistrychnin und das von O'Connor bei Indigestion und Chlorose gebrauchte Strychninferricitrat.

Das S. 913 besprochene Brucin ist theils als reines Alkaloid, theils in verschiedenen Salzen (Sulfat, Hydrochlorat, Nitrat) bei Lähmungen nach Art des Strychnins benutzt (Pelletier und Andral, Bardsley, Bricheteau und Lepelletier). Man gab dasselbe in steigenden Dosen, mit 0,02 2—3mal täglich beginnend und bis 0,18 3mal täglich (Bardsley) steigend. Die Heileffekte sind z. Th. auf die dem kändlichen Brucin stets beigemengten, oft nicht unerheblichen Strychninmengen zu beziehen, da reines Brucin weit weniger auf das Rückenmark wirkt.

### Präparate der Strychnossamen:

1) **Extractum Strychni; Strychnossamenextract.** Trocknes Digestionsextract, durch Ausziehen von 10 Th. Strychnossamen mit 20 Th. verdünntem Weingeist und Extraction des Pressrückstandes mit 15 Th. Spir. dil. dargestellt; braun, in Wasser trübe löslich, äusserst bitter. Man giebt das Präparat, welches mit dem früher officinellen weingeistigen Krähenaugenextract, *Extractum Strychni spirituosum* s. *Extr. Nucum vomicarum spirituosum*, übereinstimmt, namentlich bei Lähmungen zu 0,01—0,05, meist in Pillen, seltener in Pulver oder Lösung, auch epidermatisch in Spir. dil. gelöst oder in Salbenform und endermatisch. Maximale Einzelgabe 0,05, höchste zulässige Tagesdosis 0,15.

Früher war noch ein zweites, ebenfalls trocknes und in gleichem Verhältnisse mit heissem Wasser bereitetes, gelbbraunes, in Wasser mit grüner Farbe trübe lösliches Extract unter der Bezeichnung *Extractum Strychni aquosum* s. *Extractum Nucum vomicarum aquosum*, wässriges Krähenaugenextract, officinell. Man bevorzugte dies hauptsächlich nur Brucin enthaltende und daher viel weniger leicht toxische Extract in allen Fällen, wo Strychnin im kindlichen Lebensalter als Tonicum und Stomachicum gegeben werden sollte, und reichte dasselbe innerlich zu 0,03—0,2 mehrmals täglich in Pulver, Pillen oder Solutionen. Die frühere Maximalgabe war für dieses Extract pro dosi 0,2, pro die 0,6.

2) **Tinctura Strychni, Tinctura Nucis vomicae; Strychnossamentinctur,** Krähenaugentinctur, Strychnostinctur. Mit 10 Th. Spir. dil. bereitet, gelb und sehr bitter, innerlich zu 2—6 Tropfen mehrmals täglich, auch äusserlich zu Einreibungen, z. B. mit Seifenspiritus bei Rheumatismus (Rademacher). Maximaldosis 1,0 pro dosi, 2,0 pro die. Andere Pharmacopöen haben 2—3mal stärkere, gleichnamige Tincturen. Nicht mehr officinell ist die mit 10 Th. Spir. aethereus bereitete *Tinctura Strychni aetherea*, welche wie die spirituöse Tinctur dosirt wurde.

### Verordnungen:

1)  $\mathcal{R}$   
*Extracti Strychni* 0,01  
 — *Ratanhae* 0,5  
*Aq. dest.* 100,0  
*M. D. S.* Wohl umgeschüttelt dreimal

täglich 2—3 Tropfen (bei Säuglingen, bei älteren Kindern 10—12 Tropfen). (Bei Prolapsus ani. Manz. Sehr wirksam.)

2)

R

*Extracti Strychni* 5,0  
*Pulv. Liquiritiae* q. s.  
*ut f. pilul. No. 100. Consp. D. S.*  
 Zweimal täglich 1—2 Stück, allmählig  
 bis auf 9 zu steigern. (Bei Paralyse.  
**Fouquier.**)

3)

R

*Strychnini sulfurici* 0,1  
*Aq. destill.* 10,0  
*M. D. S.* Zur subcutanen Injection.  
 (Die pro dosi zu injicirende Flüssig-  
 keit beträgt 0,2—0,5, entspr. 0,002  
 bis 0,005 Strychnin.)

### Physostigminum salicylicum; Physostigminsalicylat.

Das Physostigminsalicylat ist ein haltbares Salz des hauptsächlichsten Alkaloids aus den früher officinellen reifen Samen der in Oberguinea an der Mündung des Niger und des Flusses Old Calabar wachsenden Leguminose *Physostigma venenosum* Balfour.

Die Gattung *Physostigma* ist unsern Vitsbohnen nahe verwandt und bildet einen kletternden Halbstrauch mit fleischfarbenen, ins Purpurrothe spielenden Blumen. Nur die als Calabarbohne, *Faba Calabarica*, Samen *Physostigmatis*, Samen Calabar, bezeichneten Samen scheinen die Giftigkeit zu besitzen, welche den Eingebornen Oberguineas seit langer Zeit Veranlassung gab, dieselben als Mittel zur Entdeckung der Schuld oder Unschuld der Zauberei angeklagter Personen zu benutzen, wodurch jährlich viele Tausende, die sich durch das Essen der Bohnen von dem Verdachte der Zauberei reinigen sollen, aus der Welt geschafft werden. Freilich ist man human genug, im Falle ein Angeklagter die Probe übersteht, seinen Ankläger dieselbe Menge Bohnen versuchsweise verspeisen zu lassen. Diese Anssitte führte 1846 den Missionär Daniel dahin, die als Ordeal bean (Gottesgerichtsbohne) bekannte Bohne nach Schottland zu senden, wo die Untersuchungen von Fraser (1863) sie als eine mit ganz eigenthümlichen Wirkungen ausgestattete Droge erkennen liessen. Die Calabarbohnen, auch Esérenuss oder Spaltnuss genannt, sind elliptische, eifrunde oder oblonge, mehr oder weniger nierenförmige, etwas zusammengedrückte, etwa 4 Cm. lange, 2 Cm. breite und 11 Mm. dicke Samen mit gewölbter, fein höckerig unebener, schwachglänzender, dunkelbrauner Oberfläche; der eine Rand ist convex, grade oder etwas eingebogen, dunkelbraun, der andere concav und von einem schwarzgrauen Nabel über die ganze Länge des Samens tief gefurcht. Sie bestehen aus einer harten, rothbraunen, am Nabel verdickten Samenschale und zwei weissen, dicken, etwas spröden, convex-concaven Cotyledonen, welche eine leere centrale Höhlung umgeben. Das giftige Princip hat seinen Sitz fast ausschliesslich in den Cotyledonen; die Samenschale ist minder giftig (Fraser).

Ueber die wirksamen Principien der Calabarbohne sind wir noch nicht gänzlich im Klaren, insofern möglicherweise mehrere gleichwirkende Alkaloide darin vorhanden sind. Neben dem von Jobst und Hesse 1863 aufgefundenen Physostigmin von der Formel  $C^{30}H^{21}N^3O^4$ , welches eine farblose und geschmackfreie amorphe Masse bildet, die bei 40° erweicht und bei 45° schmilzt, haben Vée und Leven 1865 ein krystallinisches, bitter schmeckendes und bei 90° schmelzendes Alkaloid isolirt und als Eserin bezeichnet. Es fragt sich nun, ob beide gleichwirkenden Substanzen verschieden oder, wie Tison annimmt, identisch sind. Beide Alkaloide haben die Eigenthümlichkeit, dass sie in Lösung an der Luft sehr rasch unter Bildung eines als Rubreserin bezeichneten Körpers rothe Färbung annehmen. Dasselbe gilt von sämmtlichen Salzen des Physostigmins und Eserins, welche zum grössten Theil sogar im trocknen Zustande rasch roth gefärbt werden. Letzteres ist nicht der Fall bei dem officinellen Physostigminsalicylat, welches farblose oder schwach gelbliche Krystalle bildet, die in 150 Th. Wasser und in 12 Th. Weingeist sich lösen. Mit dem Physostigmin findet sich in verschiedenen Extracten der Calabarbohne, welche zu therapeutischen Zwecken im Handel sind, bisweilen prävalent ein in Aether unlösliches Alkaloid, das Calabarin von Harnack und Witkowski, welches



bei Fröschen nach Art des Strychnins Tetanus erzeugt. Das von diesem befreite Physostigmin von Harnack und Witkowski zeigt die grösste Aehnlichkeit mit dem Eserin des Pariser Handels, welches sich jedoch noch etwas leichter zersetzt als völlig reines Physostigmin. Die sonstigen Bestandtheile der Calabarbohne, wie das von Hesse 1846 gefundene cholesterinähnliche Fett, sind ohne Bedeutung für die Wirkung derselben, welche übrigens fast genau mit der des Physostigmins übereinstimmt, während allerdings Extracte der Calabarbohne häufig in ihrer Action divergiren. Nach Harnack (1880) kann übrigen: Calabarin aus Physostigmin sich bilden und bei längerer Aufbewahrung von Physostigminsulfat oder durch langdauernde Einwirkung von Iodwasserstoffsäure auf letzteres entstehen.

Das Physostigmin ist ausgezeichnet durch verschiedene eigenenthümliche Applicationswirkungen, nämlich einerseits dadurch, dass es bei Application auf das Auge hochgradige Pupillenverengung hervorruft, und andererseits dadurch, dass es die Magen- und Darmperistaltik krampfhaft erregt und bis zum Darmtetanus steigert. Beide Wirkungen können auch in Folge von Resorption des Physostigmins resultiren, sind jedoch bei anderweitiger Application weit weniger constant.

Schon 1 Tr. einer  $\frac{1}{2}$  % Lösung Physostigminsalicylat erzeugt bei Application auf das Katzenauge den höchsten Grad von Myose. Die nach Application von Calabarextract auf das Auge entstehende Myosis tritt bei Menschen durchschnittlich in 8—14 Min. ein, erreicht schnell das Maximum der Verkleinerung und bleibt auf diesem 6—8 Stdn. stehen, um in 2—3 Tagen zur Norm wieder zurückzukehren. Zu gleicher Zeit tritt krampfhafte Zusammenziehung des Accommodationsmuskels, Vergrößerung der Hornhautwölbung und vorübergehende Myopie ein, welche meist in 20—30 Min. ihren Höhepunkt erreicht und in  $1\frac{1}{2}$ —2 Stdn. verschwindet (A. v. Graefe, Regnoli und v. Reuss); bisweilen scheint minder deutliche Perception der Farben von Roth und Grün stattzufinden (Dor). Bei Thieren bestehen Verschiedenheiten in der Einwirkung auf die Pupille; so werden Vögel in Bezug auf dieselbe wenig afficirt, während sie im Allgemeinen den toxischen Wirkungen der Calabarbohne weit leichter erliegen als Säugethiere. Die myotische Wirkung ist bei Kaninchen viel intensiver als bei Hunden und fehlt bei Fischen und Amphibien; nach Rossbach wirkt Physostigmin bei Fröschen mydriatisch.

Ueber die Erklärung der Calabarmyose gehen die Anschauungen der Experimentatoren auseinander. Harnack und Witkowski beziehen, wie Martin Damourette, die Physostigminmyose auf eine Erregung des Sphincter iridis, Filehne und Schömann auf eine Erregung des peripheren Endes des Oculomotorius. Der Sympathicus ist bei der Physostigminwirkung unbetheiligt. Während allgemein ein beiderseitiger Antagonismus des Physostigmins und Atropins in Bezug auf die Pupille zugelassen wird, so dass bei nicht allzu starken Dosen Atropin die erweiterte Pupille wieder durch Physostigmin verengt wird, während Atropin jede Pupillencontraction nach Physostigmin beseitigt, bestreitet Rossbach den Antagonismus und legt dem Physostigmin in kleinen Dosen eine reizende, in grossen eine lähmende Action auf den Sphincter iridis resp. den Oculomotorius bei.

Die Wirkung des Physostigmins auf die Peristaltik erklärt die bei Intoxicationen mit Calabarpräparaten regelmässige Vermehrung der Defäcation; dieselbe scheint auf directer Reizung der Darmganglien zu beruhen (Bauer). Atropin hebt die Physostigminwirkung auf; Physostigmin wirkt auch bis zu einem gewissen Grade nach zuvoriger Atropinisirung erregend auf die Peristaltik. Die Action des Physostigmins erstreckt sich auch auf Milz, Harnblase und Uterus, die es in Contractionen versetzt.

Die entfernten Wirkungen des Physostigmins können sich von den verschiedensten Applicationsstellen aus geltend machen.

Die Resorption von Calabarextract erfolgt am raschesten von dem Unter-

hautbindegewebe und den serösen Häuten aus, am langsamsten von der Nasenschleimhaut und der Conjunctiva; bei Application in das Unterhautbindegewebe und auf seröse Häute resultirt locale Irritation, nicht aber auf Schleimhäuten (Fraser). Dragendorff und Pander constatirten bei Thieren den Uebergang des Physostigmins in Galle und Speichel, während der Nachweis im Urin zweifelhaft blieb.

Nach Harnack und Witkowski verursacht reines Physostigmin directe Lähmung aller sensiblen und motorischen Nervencentren bei gleichzeitiger Erregung der quergestreiften Muskeln.

Nach früheren Versuchen von Fraser und Roeber mit Calabarpräparaten vindicirte man diesen als Erstwirkung Herabsetzung und Vernichtung der Erregbarkeit der gangliösen Elemente des Rückenmarks, welche zunächst die in den Vorderhörnern der grauen Substanz belegenen Gangliengruppen, welche die Bewegungsimpulse vom Gehirn zur Peripherie leiten, betreffe, dann aber auch auf die die Schmerzempfindung zum Gehirn vermittelnden, in den Hinterhörnern gelegenen Elemente der grauen Substanz übergreife, woraus dann vollständiger Verlust der Motilität und Reflexerregbarkeit, sowie vollständiger Verlust der Schmerzempfindungen resultirten, während Tastempfindung und Muskelgefühl bis zum Tode erhalten blieben. Nach den Versuchen von Harnack und Witkowski wird bei Fröschen zuerst das Gehirn gelähmt, die Willkürbewegung aufgehoben und die Sensibilität stark herabgesetzt, später die Athmung sistirt und erst zum Schluss die Reflexerregbarkeit vernichtet, so dass hier die Wirkung auf das Gehirn weit früher als die Rückenmarkparalyse eintritt. Bei Warmblütern werden in den meisten Fällen alle motorischen und sensiblen Nervencentren direct gelähmt, doch kommt bei manchen Thieren, namentlich Katzen, vor der Paralyse ein Stadium hochgradiger Erregung vor, welches von Harnack und Witkowski nicht auf directe Wirkung bezogen, sondern als Folge der Circulations- und Respirationsveränderung betrachtet wird. Die motorischen Nerven werden durch reines Physostigmin nicht gelähmt. Auffallend ist bei Vergiftungen mit Calabarextract und auch mit reinem Physostigmin das Auftreten ausserordentlich heftiger, oft vollständig rhythmischer fibrillärer Muskelzuckungen, welche mitunter das Gepräge klonischer Krämpfe tragen und auf eine Reizung der intramusculären Nerveneindigungen hindeuten. Auf eine Reizung motorischer Centren deutet das Auftreten wirklicher epileptiformer Anfälle bei Thieren, welche nach der Methode von Brown-Sequard zu derartigen Krämpfen prädisponirt sind.

Neben der Wirkung auf die Nervencentren ist eine Action des Physostigmins und der Calabarbohne auf die Herzthätigkeit unverkennbar, welche sich bei kleinen toxischen Dosen durch Herabsetzung der Herzschlagzahl und bedeutende Verstärkung der Herzstolonen zu erkennen giebt.

Schon v. Bezold und Götz fanden den Blutdruck nach Calabarextract gesteigert. Roeber bezog die Pulsverlangsamung nach Calabarpräparaten auf Herabsetzung u. schliessliche Lähmung des excitomotorischen Herznervencentrums, während Lenz und H. Köhler Reizung der Vagusendigungen annahmen, da die musculomotorischen Herzganglien erst kurz vor dem Tode herabgesetzt werden. Harnack und Witkowski vindiciren dem Physostigmin eine directe erregende Wirkung auf den Herzmuskel oder das excitomotorische Herzcentrum und verneinen eine Reizung der Hemmungsnerven.

Viele Experimentatoren (Fraser, Keuchel, Schiff) vindiciren der Calabarbohne und dem Atropin einen directen Antagonismus in Bezug auf ihre Herzwirkung, welcher bei Kaltblütern entschieden nicht stattfindet und bei Warmblütern höchstens in indirecter Weise. Rossbach erklärt das Physostigmin in kleineren Gaben für erregend, in grösseren für lähmend auf die Hemmungsapparate des Herzens und in dieser Beziehung für gleichwirkend mit dem Atropin, von dem es sich nur durch starke Erregung der musculomotorischen Apparate unterscheidet.

In eigenthümlicher Weise wirkt Physostigmin nach Art des Muscarins und Pilocarpins vermehrend auf die Speichelabsonderung.

Diese Wirkung, welche Harnack und Witkowski von einer Reizung des Drüsenparenchyms ableiten, wird durch grosse Dosen Atropin aufgehoben, und bis zu einem gewissen Grade kann auch Physostigmin die entgegengesetzte Wirkung des Atropins beseitigen.

Letale Dosen von Physostigmin scheinen durch Respirationslähmung tödtlich zu wirken.

Sehr grosse Dosen Calabarextract haben mitunter raschen diastolischen Herzstillstand zur Folge, ohne dass jedoch die elektrische Reizbarkeit des Herzens verloren geht. Die Athmung wird bei Säugethieren zuerst beschleunigt, später aussetzend. Künstliche Respiration wirkt bei Warmblüthern lebensverlängernd und sogar lebensrettend (Harnack und Witkowski). Auf die Beinträchtigung der Respiration bezieht sich auch wohl die im Verlaufe der Intoxication stets zu beobachtende Abnahme der Temperatur.

Die Erscheinungen der Physostigminwirkung bei Menschen sind für kleinere Dosen sowohl durch Beobachtungen an Kranken als durch Selbstversuche festgestellt. Nach subcutaner Injection von 0,001 Eserinsulfat kann sich Erbrechen und Unwohlsein einstellen (Vée); ähnliche Phänomene können nach 0,004 bei interner Einführung vorkommen (Léven); 0,1 bedingte bei Leteinturier Schwere im Kopfe, Undeutlichsehen gedruckter Schrift bei starker Myosis, Schwindel, Nausea und Erbrechen (letzteres erst in  $\frac{3}{4}$  Std. eintretend) und grosse Muskelschwäche, welche  $2\frac{1}{2}$  Std. anhielt. Physostigmin von Merck bewirkt zu 0,012 in einer Stunde Uebelkeit, beiderseitige Myosis, Undeutlichsehen, jedoch keine Veränderung des Pulses (Fronmüller). Nach Selbstversuchen von Fraser mit 0,3–0,6 Pulver des Embryo der Calabarbohne und therapeutischen Experimenten mit daraus bereiteter Tinctur tritt in etwa 5 Minuten eigenthümliches, später schmerzhaftes Gefühl unter dem Sternum, bald darauf Ructus, hie und da Gefühl von Dyspnoe, später Schwindel und Schwäche in den Extremitäten ein; noch etwas grössere Dosen erzeugen Krampf der Brustmuskeln, Zusammenlaufen von Speichel im Munde, Trübung des Sehvermögens, gelinden Sch weiss und irreguläre, herabgesetzte Herzaction. Ausgedehnte Erfahrungen über die Wirkung toxischer Dosen der Calabarbohne sammelten Cameron und Evans in Liverpool bei 60 Kindern, welche im Hafen verstreute, als Ballast von der afrikanischen Westküste mitgebrachte Calabarbohnen gegessen hatten und bei denen ein lähmungsartiger Zustand, oft von mehr als 36 Stdn. Dauer, Erbrechen und Prostration die HAUPTerscheinungen bildeten, während in weniger als  $\frac{1}{3}$  der Fälle Myosis vorhanden war. Convulsionen und Anästhesie waren in keinem Falle zugegen; ebenso war das Sensorium frei.

Was die Anwendung des Physostigmins und der Calabarbohne in krankhaften Zuständen des Nervensystems anlangt, so lässt sich nicht verkennen, dass ihre physiologische Wirksamkeit sie vor Allem beim Tetanus indicirt erscheinen lässt, indem sie durch directe Herabsetzung der Motilität und Sensibilität einerseits und der Reflexaction andererseits von Nutzen sein können. Seit der Anwendung der Calabarbohne durch Lemaire liegen zahlreiche Beobachtungen über Heilung vom Wundstarrkrampf unter dem Gebrauche vor.

Schon 1868 wies Fraser darauf hin, dass von 12 mit Calabarbohne behandelten Fällen von Tetanus, welche die Literatur aufzuweisen hatte, 9 mit Genesung endeten, und dass unter den 3 Todesfällen sich einer befand, wo das Mittel in der Agone gereicht sei. Zu den mit dem Mittel geheilten Fällen kommen weitere günstig verlaufene theils von Tetanus traumaticus, theils von Tetanus rheumaticus in grosser Fülle hinzu (G. de la Chartrie, Mac Arthur, Duffy, Schmitt, Monti und Widerhofer, Watson, Esenbeck u. A. m.), während verhältnissmässig wenige ungünstige Fälle vorliegen. Selbst



bei Tetanus neonatorum sind gute Erfolge beobachtet (Monti u. Wiederhofer). Bei Tetanus toxicus (Strychninvergiftung) ist Physostigmin nicht zu empfehlen. Bei Fröschen kann man allerdings die durch Strychnin stark gesteigerte Reflexerregbarkeit durch grosse Dosen Calabarextract aufheben und bei einem mit Calabar gelähmten Frosche treten nach Application von Strychnin keine Reflexkrämpfe auf. Versuche an Säugethieren ergeben indess, dass Kaninchen und Hunde, welche Strychnin und Calabarextract in toxischen Mengen erhalten, noch rascher als bei Vergiftung mit jedem der einzelnen Gifte erkranken und asphyktisch zu Grunde gehen (Vée u. Léven, Th. Husemann und Hessling). Diese Facta würden durch die Annahme von Rossbach, dass die durch Calabar bedingte Herabsetzung der Reflexerregbarkeit eine secundäre Erscheinung sei, sich in leichter Weise erklären lassen.

Die übrigen Nervenaffectionen, bei denen Calabar in Anwendung gekommen ist, bieten weniger Chancen. Es gehören dahin Prosopalgie (Munro), Chorea (Harley, Gubler, Ogle, M'Laurie) und spasmodische Contracturen (Vée und Leven); auch schliesst sich hieran die Behandlung der Atropinvergiftung mit Calabarbohne, für welche anscheinend eine Beobachtung am Menschen (Kleinwächter) spricht. Der günstige Verlauf von Atropinvergiftungen ohne jede Behandlung oder selbst bei verkehrter Therapie macht indess den Werth einer einzigen Beobachtung über die Effecte des Antidots zweifelhaft. Man hat in der neueren Zeit geradezu einen Antagonismus des Atropins und Physostigmins construirt, indem man ihnen eine entgegengesetzte Wirkung auf den Blutdruck, Vagus, die Secretionen und die Pupille vindicirte (Fraser, Bartholow u. A.). Obschon Rossbach die Existenz eines derartigen Antagonismus entschieden bestritten hat, indem nach seinen Versuchen die Endeffecte (Lähmung) dieselben sind, während nur die Dauer der primären Erregung eine verschiedenen lange sei, sind doch die zuerst von Fraser erhaltenen und später auch von H. Köhler u. A. bestätigten Resultate der an Hunden angestellten toxikologischen Versuche beachtenswerth, wonach die gleichzeitige Einführung colossaler tödtlicher Gaben von beiden Giften, 0,5 Atropinsulfat und 0,4 Calabarextract, nicht tödtlich wirkt, während schon 0,2 des letzteren für sich den Tod von Hunden herbeizuführen vermögen. Jedenfalls aber erscheint die Anwendung von Atropin neben künstlicher Respiration bei Calabarvergiftung gerechtfertigt. Williams empfahl Calabarbohne bei Epilepsie, doch ist nach den Erfahrungen von Harnack u. Witkowski das Mittel gerade hier contraindicirt, da es die Anfälle in entschiedener Weise vermehrt.

Oertlich ist die Calabarbohne bei verschiedenen Affectionen des Auges angewendet, unter denen diphtheritische und traumatische Accomodationslähmung (Scheby-Buch, Harlon, Manz) die günstigsten Resultate zu geben scheint.

Von ophthalmologischer Seite wurde die Calabarbohne zunächst als Mittel zur Beseitigung übermässiger Erweiterung der Pupille durch Atropin (A. v. Graefe) ins Auge gefasst; doch ist die Wirkung hier keineswegs eclatant, indem hochgradige Mydriasis nach Atropingebrauch oft nicht durch Calabarextract aufgehoben wird. Geringe Grade lassen sich allerdings durch Physostigmin beseitigen, besonders wenn die Mydriasis schon einige Zeit bestanden hat, während andererseits Atropin stets Calabar-Myose aufhebt. Bei Pupillenerweiterung in Folge von Lähmung des Oculomotorius kann während der Dauer der Physostigminwirkung Besserung des Sehens erzielt werden (Gubler, Regnoli). Gubler benutzte Calabar auch zur Zerreissung von hintern Synechien.

Wiederholt wurde auch Physostigmin nach der Empfehlung von Laqueur und Weber (1876) als den Druck herabsetzendes Mittel bei Glaucom angewandt, wo bei 8--10tägiger Instillation ansehnliche Verbesserung der Sehscharfe resultiren kann, doch ist das Mittel mit Vorsicht anzuwenden, da die dadurch bemerkte Turgescenz der Gefässconvolute der Ciliarfortsätze Blutungen in dem Glaskörper zu Stande bringen kann. Weber empfiehlt dasselbe zur Verminderung des Drucks in der vorderen Kammer bei Keratocele, Cornea conica und tiefgreifenden Hornhautulcerationen, ferner bei staphyloamatösen Processen und Prolapsus iridis.

Die Empfehlung subcutaner Application bei Cholera (Munro) gehört wohl zu den am Schreibtisch ausgedachten therapeutischen Bizzarrerien. Dagegen ist die Anwendung bei Atonie des Darmes mit Flatulenz und Verstopfung (Sabbotin, Schäfer) keineswegs irrationell.

Im Ganzen ist bisher das Physostigminum salicylicum wenig in Anwendung gekommen, indem man meistens das sog. Eserinsulfat des Handels oder noch häufiger die Calabarbohne und ein aus derselben bereitetes, früher unter dem Namen *Extractum Fabae Calabaricae* s. *Extractum Physostigmatis* s. *Extractum Calabar*, Calabarbohlenextract, officinelles wässrig-spirituöses Extract in Anwendung zog. Man gab die Calabarbohne in Pulverform innerlich zu 0,05 (Williams) oder in noch kleineren Dosen, das Calabar-extract zu 0,005–0,02, bei Tetanus auch in weit höheren Gaben. So reichte Watson innerlich 0,12 in nicht bestimmten Zeiträumen, so dass z. B. ein Patient 1,5 in den ersten 3 Tagen, dann 1,0 in den folgenden 7 Tagen und hierauf selbst in zweimal 24 Stunden 3,0 und 3,5, im Ganzen im Verlaufe von 43 Tagen 64,0 consumierte. Man darf jedenfalls hier grössere Dosen nicht scheuen. Zum internen Gebrauche des Extracts sind Pulver- und Pillenform, auch Lösungen in Glycerin, Spiritus dil. oder Spiritus aethereus anwendbar. Schäfer gab bei Atonie des Darmes dreistündlich 3–6 Tropfen einer Lösung von 0,05 in 10,0 Glycerin. Glycerinlösungen, jedoch stärker (1:5–15), welche man mit einem Pinsel in kleinen Mengen ins Auge bringt, dienen auch vorzugsweise zum äusseren Gebrauche. Noch häufiger benutzt man die *Charta calabarina* (Calabarpapier, Papier calabarisé), welches mit einer Auflösung von Calabarextract (1:65) getränktes und in kleine Quadrate abgetheiltes Filtrirpapier, von welchem jeder Quadratcentimeter 0,002 Calabarextract enthält, darstellt. Der letzteren Applicationsweise klebt der Uebelstand an, dass das auf die Bindehaut applicirte Papier Irritation bedingt und reflectorisch Thränen des Auges hervorruft, wodurch der grösste Theil des wirksamen Stoffes wieder aus dem Auge entfernt wird. Minder diesem Vorwurfe ausgesetzt erscheinen die von Hart angegebenen, mit Extr. Fab. Calab. bestrichenen Leimtabletten, die sich in der Thränenflüssigkeit leicht lösen.

Für das Physostigminsalicylat hat die Pharmakopoe 0,001 als maximale Einzelgabe und 0,003 als maximale Tagesgabe festgestellt. Zweckmässig beginnt man bei Darmatonie mit 0,005 pro dosi und wählt für die interne Darreichung Pillen- oder Tropfenform. Zu ophthalmiatrischen Zwecken benutzt man  $\frac{1}{3}$ – $\frac{1}{2}$  % Lösungen, bei Glaucom zu 3–4 Tropfen täglich. Ganz in derselben Weise ist auch das Eserinum sulfuricum zu verwenden, welches nach Königstein u. C. Hender in der Augenheilkunde das nämliche wie das Salicylat leistet.

**Ditain.** — Als eine gleichzeitig das Rückenmark und die peripheren Nervenendigungen, auch wie Atropin die Vagusendigungen im Herzen lähmende Substanz hat Harnack ein auf den Philippinen und in Niederländisch Indien als *Antitypicum* benutztes Alkaloid aus der als Ditarinde bezeichneten Rinde von *Echites scholaris* (Fam. Apocynae) bezeichnet. Die Lähmung auf die motorischen Nervenendigungen scheint indessen bei Säugethieren stärker ausgesprochen als die ohne voraufgehende Erregung eintretende spinale Paralyse. Der Blutdruck wird durch Ditain stark herabgesetzt. Therapeutisch ist unreines Ditain als Surrogat des Chinins bei Intermittens vereinzelt verwendet.

### 3. Ordnung. Neurotica encephalica, vorzugsweise auf das Gehirn wirkende Nervennittel.

#### a. Encephalica analeptica, belebende Hirnmittel.

Diese Unterabtheilung umfasst die meisten der früher als Excitantien (vgl. S. 76) zusammengefassten Arzneimitteln, welche besonders zur Bekämpfung von plötzlich eintretendem Schwäche-

zustande und Collapsus in Gebrauch gezogen werden. Dieselben wirken vielleicht alle nicht allein auf das Gehirn, sondern auch auf andere Theile des Nervensystems, namentlich die Vasomotoren, und auf das Herz. Der Zusammenhang dieser Wirkungen bedarf noch in vielen Punkten der Aufklärung durch physiologische Versuche.

Die meisten der hierher gehörigen Stoffe gehören zu den ätherisch-öligen oder sind diesen nahe verwandt und durch Flüchtigkeit ausgezeichnet. Viele derselben sind gleichzeitig als Antispasmodica gebräuchlich, was möglicherweise mit der neuerdings von Binz u. Grisar für verschiedene ätherische Oele physiologisch nachgewiesenen reflexhemmenden Wirkung in Zusammenhang steht.

#### **Moschus, Moschus Tunquinensis; Moschus, Bisam.**

Der Moschus ist ein durch höchst intensiven Geruch ausgezeichnetes Secret von in der Nähe der Genitalien des männlichen Moschusthieres, *Moschus moschiferus* L., eines zu den Wiederkäuern gehörenden, auf den mittelasiatischen Hochgebirgen lebenden Thieres, belegenen Drüsen.

Bei verschiedenen Arten der Gattung *Moschus* findet sich unterhalb des Nabels zwischen der dichtbehaarten Haut und den Bauchmuskeln ein plattrundlicher, einige Zoll breiter, 1,5–3 Cm. dicker, mit einem ziemlich weiten Canale nach aussen mündender Sack, der bei jungen Thieren ein überreichendes, talgartig-schmieriges oder milchiges, wenig gefärbtes Secret enthält, das erst beim alten Thiere den eigenthümlichen Moschusgeruch annimmt, dessen Intensität mit dem Alter wächst. Der bei uns officinelle Moschus, auch als *Moschus Tunquinensis* oder als chinesischer oder tibetanischer Moschus bezeichnet, stammt nur von den in Tibet und China lebenden Varietäten von *Moschus moschiferus* und kommt über Canton und London in den Handel, während über Russland eingeführter sog. *Moschus Cabardinus* (richtiger *Cabarginus*, nach der tatarischen Bezeichnung des Moschusthiers *Cabarga*) vielleicht von einer andern Art abstammt. In China und Tibet wird der Moschus so bereitet, dass die erwähnten Beutel nebst der sie bekleidenden Bauchhaut ausgeschnitten und entweder an der Luft oder auf heissen Platten getrocknet werden. Das in dem Beutel eingeschlossene Secret, der eigentliche Moschus, bildet eine krümlige oder etwas weiche dunkelrothbraune Masse von bitterem Geschmack und penetrantem, äusserst lange haftendem Geruche, der von dem weit schwächeren und ammoniakalischen Geruche des heller gefärbten russischen Moschus völlig verschieden ist. Mit Hülfe von Terpenthinöl unter dem Mikroskope in dünner Schicht ausgebreitet, zerfällt der Moschus ziemlich gleichmässig schollenartig in durchscheinende braune, amorphe Splitter und Körnchen. Im Handel kommt der Moschus theils als *Moschus in vesicis*, in den 15,0–30,0 schweren kugelförmigen, an der einen Seite ebenen und glatten, an der anderen convexen und behaarten Beuteln eingeschlossen, oder aus diesen herausgenommen, als *Moschus ex vesicis*, vor. Wegen seines überaus hohen Preises unterliegt das Medicament mannigfachen Verfälschungen, welche den Moschus in *vesicis* eben so gut betreffen wie den *Moschus ex vesicis*. Selbst völlig gefälschte Moschusbeutel aus einem Stück Fell zusammengeheftet, sog. *Wampomoschus*, haben sich im Handel gefunden. Der Moschus muss über Schwefelsäure getrocknet werden, bis er keinen Gewichtsverlust mehr erleidet und darf beim Verbrennen nicht mehr als 8% Asche hinterlassen.

Der eigenthümliche Riechstoff des Moschus, welcher als Träger der Wirkung desselben betrachtet werden muss, ist bisher nicht isolirt.

Der Moschusgeruch, welcher mit dem von *Mimulus moschatus* u. a. Pflanzen übereinstimmt, hält sich unter günstigen Umständen in Aufbewahrungs-



räumen viele Jahre lang. Einzelne Stoffe, z. B. Campher, Mandelsyrup, Goldschwefel, sind im Stande, denselben bedeutend abzuschwächen oder ganz zu zerstören. Ganz trockner Moschus ist fast geruchlos und entwickelt erst beim Befechten den eigenthümlichen Riechstoff. Die übrigen Bestandtheile des Moschus (Fette, Harz, Salze) sind für die Wirkung ohne Bedeutung.

Die bisherigen Versuche über die Wirkung des Moschus lassen eine gewisse Verwandtschaft mit der Wirkung mancher ätherischer Oele und eine excitirende Wirkung auf das Nervensystem nicht verkennen.

So beobachtete Jörg nach 0,2—1,0 Druck und Völle im Epigastrium, Kopfschmerz, Schwindel, Schläfrigkeit mit darauf folgender allgemeiner Abspannung, bei Einzelnen Muskelzittern, Zunahme der Pulsfrequenz, Hauttemperatur und Ausdünstung, welche Erscheinungen 6—8, bei empfindlichen Personen selbst 16 Std. anhielten. Sundelin empfand nach 1,2 Moschus 3 Std. lang die Gefühle eines leichten Weibrausches bei vollem Pulse und duftender Haut; Trousseau und Pidoux Wärme im Epigastrium, gesteigerten Appetit, nach einigen Stunden Kopfschmerzen und Steigerung des Geschlechtstriebes; dagegen fehlte Veränderung des Pulses. Bei einzelnen Individuen soll Moschus Erbrechen und Durchfall veranlassen. 0,3 mit Wasser in die Schenkelfene eines Hundes injicirt bewirken Betäubung, Convulsionen, blutige Diarrhoe und Tod (Tiedemann). Nach Filehne ist von verschiedenen Auszügen nur der wässrige des eingedampften Alkoholextracts und ein mit schwach angesäuertem Wasser gemachter Moschusauszug wirksam; nach Einspritzung von 0,05—0,1 Moschus treten bei Fröschen Zuckungen sämmtlicher Muskeln ein, welche nach Durchschneidung der motorischen Nerven nicht cessiren und nur durch starken Nervenreiz aufgehoben werden, welche Wirkung den Moschus an die Seite des Guanidins stellt.

Als Medicament hat der Moschus einen nicht zu unterschätzenden Werth in der Behandlung des Collapsus, mag derselbe plötzlich nach schweren Verletzungen oder im Verlaufe intensiver acuter Krankheiten (Typhus u. a.) entstanden sein.

Der völlig unverdiente Misset, in welchen das Medicament in neuerer Zeit bei vielen Aerzten gekommen ist, erklärt sich theilweise aus den ungenügenden Dosen, in welchen man den Moschus wegen seines theueren Preises zu verordnen pflegte, theilweise dadurch, dass man ihn zur Unzeit gab, d. h. in Agone, wo günstiger Ausgang unmöglich mehr erwartet werden kann. Man ist seit lange gewohnt, den Moschus als ultimum refugium anzuwenden und denselben in extremis zu verabreichen, wo die ärztliche Kunst am Ende ist. Das Volk betrachtet ihn daher als schlimmstes Prognosticum für den Patienten, welchem er gereicht wird. Im Allgemeinen ist Moschus in allen Fällen indicirt und andern Excitantien vorzuziehen, wenn der Collaps im Verlaufe acuter Affectionen sich sehr rasch entwickelt und steigert, wo es also darauf ankommt, auch ein möglichst rasch wirkendes Mittel in Anwendung zu bringen. Die oben angeführten physiologischen Versuche zeigen auf das Evidenteste, dass Moschus nicht allein erregend auf die Nervencentra und in specie auf das respiratorische Centrum, sondern auch auf das Herz wirkt. Denselben daher auf solche Fälle zu beschränken, wo es sich um eine Belebung der gesunkenen Erregbarkeit der Centralnervenapparate handelt, heisst dem Moschus einen ansehnlichen Theil seines Wirkungsbezirkes rauben, wo er vorzügliche Dienste zu leisten im Stande ist. Wir kennen Fälle von Shock in Folge von schweren Verletzungen, Ueberfahren u. s. w., welche ihren günstigen Ausgang ausschliesslich dem Gebrauche kräftiger Dosen Moschus verdanken. Besonders günstige Erfolge rühmt man dem Moschus mit Recht in Bezug auf Erkrankungen des kindlichen Lebensalters nach. In der That sind die Veränderungen, welche eine einzige Dosis Moschus im Aussehen und im Verhalten collabirter Kinder herbeizuführen vermag, oft höchst überraschend. Dass man beim Erwachsenen diese Erfolge nicht so prägnant hervortreten sieht, hat seinen Grund vor Allem darin, dass meist wegen des hohen Preises des Medicaments ungenügende Dosen verordnet werden. Ein Erwachsener, zumal wenn er an den Genuss excitirender Getränke gewöhnt

ist, reagirt nicht auf 0,05 Moschus, wohl aber ein Kind, bei dem eine Abstumpfung gegen Excitantien nicht stattgefunden hat, und selbst bei letzterem ist die angeführte Dosis häufig zu klein gegriffen. Dass die durch den Moschus gesetzte Erregung in vielen Fällen nicht ausreicht, das Leben so lange zu erhalten, bis die Störung, welche zum Collapsus führte, ausgeglichen ist und die Bedingungen zur Reconvalescenz gegeben sind, weiss jeder Praktiker aus eigener Erfahrung, und dieser Umstand drängt zu verhältnissmässig frühzeitiger Anwendung. Auch am Moschus documentirt sich die an allen excitirenden Mitteln zu beobachtende Abnahme der Wirkung bei Darreichung in derselben Dosis; man erreicht selten bei Wiederkehr des Collaps durch die nämliche Gabe gleiche Veränderung des Krankheitsbildes ad melius, während manchmal noch Erhöhung der Gabe lebensrettend wirken kann. Die Krankheiten, wo Moschus im Collaps vorzugsweise in Anwendung kommt, sind Typhus (Febris nervosa versatilis) und Pneumonie, ferner acute Exantheme im kindlichen Lebensalter, Herzkrankheiten (Fettherz, Klappenfehler im Stadium der Compensationsstörung), acute Hämorrhagien u. a. m. Im Typhus hat man ihn beim Vorwalten von krampfhaften Erscheinungen (Schnenhüpfen, Zuckungen der Gesichtsmuskeln) besonders gegeben.

Erst in zweiter Linie steht die Bedeutung des Moschus als Antispasmodicum, wo sein Nutzen nicht unbestritten ist und wo jedenfalls billigere Mittel (Asa foetida, Valeriana) ihn vollkommen zu ersetzen vermögen.

Mendel und Chapp empfahlen Moschus sogar beim Tetanus (zu 4,0 pro dosi mit Opium). Am meisten hat man ihn bei Krämpfen im kindlichen Lebensalter (Spasmus glottidis, Keuchhusten, bei letzterem auch prophylaktisch) angewendet. Ebenso wie er hier nicht mehr als billigere Mittel leistet, hat er auch bei andern nervösen Störungen, wo man ihn empfahl, z. B. bei Lähmungen, Amblyopie, Taubheit, Gedächtnisschwäche, Impotenz einerseits, bei schmerzhaften Affectionen andererseits, wo namentlich, z. B. beim schmerzhaften Brand, eine Verbindung mit Opium als vorzüglich wirksam gerühmt wurde (P. Frank, Lentin), keine besondere Bedeutung.

Man giebt Moschus in der Regel zu 0,05—0,1 pro dosi 2—4 stündlich, doch ist bei Erwachsenen die doppelte bis dreifache Dosis angemessener, wenn es sich um Beseitigung von Collapsus handelt. Bei Säuglingen verordnet man 0,01—0,02. Als Darreichungsform empfehlen sich Pulver und Emulsion.

In Pulvern giebt man Moschus am zweckmässigsten einfach mit Zucker in Charta cerata. Zur Verdeckung des Geruches kommen Elaeosaccharum Cinnamomi oder Amygd. amar., auch Pulvis aromaticus in Gebrauch, doch wird vielleicht dadurch die Moschuswirkung abgeschwächt. Dasselbe gilt von der Verordnung mit Goldschwefel. Inwieweit die Verbindung des Medicaments mit Opium, Campher, Ammonium carbonicum, Zinkoxyd mehr als Moschus allein wirkt, steht dahin. Statt Moschusemulsion kann man auch das Mittel mit Zimmtsyrup oder Syrupus emulsivus verrieben anwenden. In Emulsionsform kann Moschus auch im Klystier applicirt werden. Auf die Verwendung als Parfum zu Zahnpulvern (bei Foetor oris zu 0,01—0,05 auf 25,0) und Waschpulvern braucht hier nicht weiter eingegangen zu werden. Das Tragen von Moschus mit Kamillen oder Zimmtölzucker in kleinen Säckchen zur Prophylaxe bei Keuchhusten oder Blattern ist natürlich ohne reellen Werth.

#### Präparat:

**Tinctura Moschi;** Moschustinctur, Bisamtinctur. Moschus 1 Th. mit Spiritus dil. und Aq. aa 25 Th. macerirt und filtrirt; rothbraun, von intensivem Moschusgeruch. Die vorzugsweise als Parfum benutzte Tinctur kann zu 20—50 Tr. für sich oder in Verbindung mit ähnlichen Tincturen, auch als Zusatz zu Mixturen Verwendung finden. Vanoye empfahl sie mit Tinctura Ambrae bei Trismus neonatorum.

Als *Julapium moschatum* wird eine durch Verreiben von 1 Th. Moschus und 5 Th. Zucker mit 250 Th. Rosenwasser erhaltene Mixtur, wovon ein Esslöffel 0,05 Moschus enthält, bezeichnet.

### Castoreum; Bibergeil.

Die mit dem Namen Castoreum oder Bibergeil belegte Droge stammt von dem zu den Nagethieren gehörenden Biber, *Castor Fiber L.*

Man unterschied früher Canadisches Bibergeil, *Castoreum Canadense* s. *Anglicum* s. *Americanum*, und Sibirisches oder Russisches Bibergeil, *Castoreum Sibiricum* s. *Moscoviticum* s. *Rossicum*; doch scheint gegenwärtig in Sibirien nur ganz ausnahmsweise Castoreum gewonnen zu werden und die weit theurer bezahlte sog. sibirische Waare gerade so gut aus Canada zu stammen wie das *Castoreum Canadense*.

Der durch seine künstlichen, backofenförmigen Baue wohlbekannte und seines Pelzwerks wegen sehr geschätzte Biber, welcher in früher Zeit im ganzen nördlichen und mittleren Europa verbreitet war, findet sich jetzt nur ausnahmsweise in europäischen Flüssen (Elbe), etwas mehr noch am Ob und dessen Nebenflüssen in Sibirien. Der amerikanische Biber, eine als *Castor Americanus* Cuv. bezeichnete Spielart, lebt vorzugsweise am Mississippi, Ohio, Huronensee und an der Hudsonsbay. Sowohl das Männchen als das Weibchen haben an den Geschlechtstheilen zwei mehrere Zoll lange birnförmige Säcke, die mit ihrem schmalen Ende mit einander zusammenhängen und mit einer gemeinsamen Oeffnung in den Präputialkanal münden. Diese als Bibergeilen oder Castoreumbbeutel bezeichneten Säcke — nicht zu verwechseln mit den am After des Bibers vorhandenen Drüsen oder Oelsäcken, deren Inhalt die früher ebenfalls therapeutisch verwendete *Axungia Castorei*, Bibergeilfett, bildet — sind keine besonderen Drüsen, sondern taschenförmige Einstülpungen der Präputialschleimhaut, die sich darin zu zahllosen einspringenden Leisten zusammengefaltet hat, und scheinen als Reservoir von *Smegma praeputii* zu dienen, das vielleicht während der Begattung seine Verwendung findet. Der Inhalt dieser Säcke ist bei Elbbibern nach der Brunstzeit von dicklicher Consistenz, stark riechend, schwefelgelb und arm an Calciumcarbonat, während der Brunstzeit (Februar bis Juni) dünnflüssiger, heller, schwächer riechend und enthält reichlich kohlenstoffsaures Calcium (Jannasch).

Die Castoreumsäcke werden zu medicinischem Gebrauch unversehrt und in ihrer Totalität aus den getödteten Bibern herausgenommen und getrocknet, was meistens im Rauche geschieht. Sie bestehen aus zwei äusseren, nicht leicht zu trennenden, und zwei inneren Häuten, welche den Inhalt durchsetzen, der aus einer harten, ausnahmsweise etwas weichen, braunrothen oder schwarzbraunen, selten gelbbraunen, eigenthümlich riechenden, harzigen Masse besteht. Die innerste Membran stellt die vielfach gefaltete, aussen silberweiss glänzende und glatte, innen mit ziegeldachförmigen, unregelmässigen Schuppen besetzte und mit einem Epithel überzogene Schleimhaut dar, in welcher auch drüsige Elemente sich finden. Wie der Moschus unterliegt auch das Castoreum zahlreichen Verfälschungen durch künstliche Entleerung des Inhalts, welcher das eigentliche Heilmittel darstellt, und theilweisen Ersatz desselben durch Harz.

Ueber das wirksame Princip des Castoreums befinden wir uns bis jetzt im Unklaren; wahrscheinlich ist dasselbe in einem den ätherischen Oelen verwandten Körper zu suchen, dessen genauere Kenntniss indess noch fehlt.

Das Castoreum enthält ausser Fettarten (Castorin, Cholesterin) Salicin (wahrscheinlich aus der zur Nahrung dienenden Weidenrinde abstammend) u. a. Stoffen ein Castoreumharz von brauner Farbe, scharf bitterem Geschmacke, gut in Spiritus, nicht in Aether löslich, das im Sibirischen Castoreum 58 %, im



Canadischen kaum halb so viel ausmacht, und ein stark riechendes und bitter schmeckendes, blassgelbes flüchtiges Oel. Wöhler fand im Castoreum Canadense Carbonsäure, vielleicht vom Räuchern der Castoreumbutel herrührend. Schaer will eine den Ptomäin ähnliche Substanz im Castoreum aufgefunden haben.

Physiologische Versuche mit Castoreum sind bisher in ausreichender Weise nicht angestellt. Nach grösseren Dosen (8,0 nach Alexander, 1,5 nach Jörg) scheint ausser Aufstossen keine constante Erscheinung aufzutreten, bisweilen kommt Hitze des Gesichts und etwas Schwindel danach vor.

Die Anwendung des Medicaments beschränkt sich vorzugsweise auf hysterische Krämpfe, die es oft in wunderbarer Weise mildert, doch kann es auch in einer Reihe anderer nervöser Zustände mit Nutzen verwendet werden. Inwieweit es dabei vor ähnlich wirkenden billigeren Mitteln (*Asa foetida*, *Baldrian*) Vorzüge besitzt, steht dahin.

Die wegen des Fehlens auffallender physiologischer Effecte vielfach geleugnete therapeutische Wirkung des Castoreums ist eine dem Praktiker zwar oft unbegreifliche, aber nichtsdestoweniger vollkommen feststehende Thatsache. Es ist nicht allein „ein speciöser Riechstoff für das outrirte Geruchsorgan Hysterischer“ (L. W. Sachs), sondern ein wirksames Agens bei Zuständen erhöhter Erregbarkeit im Laufe der Hysterie, und zwar vorzugsweise im Bereiche der Motilität (hysterische Convulsionen), aber auch im Bereiche der Sensibilität (Neuralgien). Ein Heilmittel der Hysterie ist es nicht, wohl aber ein Palliativum bei hysterischen Paroxysmen. Ob es auch bei hysterischen Psychosen günstig wirkt, steht dahin, und ob es bei krampfhaftem Leiden auf nicht hysterischer Basis (Epilepsie, Chorea) reellen Nutzen hat, ist nichts weniger als festgestellt. Besondere Empfehlung hat das Medicament noch bei Asthma, und namentlich bei Asthma laryngeum der Kinder, bei Krampfwehen, Dysmenorrhoe, Cardialgie, Kolik und Erbrechen gefunden, im russischen Amerika sogar bei Rheumatismus und Blutspeien. Posner empfahl es im Verlaufe des Typhus als Ersatzmittel des Opiums.

Man verordnet Castoreum selten in Substanz und zwar zu 0,2—1,0 in Pulvern oder Pillen, Boli oder Latwerge, meist in Verbindung mit billigeren Antispasmodica; noch seltener im Klystier (1,0—4,0) oder in Suppositorien. Auch als Bestandtheil von Pflastern wurde früher Castoreum verwendet.

#### Präparat:

**Tinctura Castorei**, *Tinctura Castorei Canadensis*; **Bibergeiltinctur**. Mit 10 Th. Weingeist bereitete, dunkelrothbraune, kräftig nach Bibergeil riechende Macerationstinctur, welche mit dem 4—5fachen Volumen Wasser eine milchartige, lehmfarbige Flüssigkeit giebt, aus der sich beim Durchschütteln reichlich Harz abscheidet, während die Flüssigkeit selbst fast farblos und klar wird. Man giebt die Tinctur zu 15—60 Tr. bei hysterischen Anfällen, gewöhnlich in Verbindung mit andern krampfstillenden Tincturen. Auch als Riechmittel, in Klystieren, Collyrien (bei Blepharospasmus mit 30 Th. Kamillenthee) wurde Bibergeiltinctur benutzt.

Die spirituöse Tinctur macht die früher gebräuchliche, mit Aether bereitete ätherische Tinctur überflüssig; ebenso die *Aqua Castorei*, ein destillirtes Wasser, welches nur anfangs nach Castoreum, später nach salicyliger Säure riecht, und die aus Zucker und Traganthschleim bereiteten *Trochisci Castorei*.

**Anhang:** Animalische Excitantien. — Wie Moschus und Castoreum wurden auch andere starkriechende animalische Stoffe, z. B. Ambra und Zibeth (vgl. S. 418) benutzt. Minder wohlriechend ist das in Amerika als Antihysterikum verwendete Secret von Afterdrüsen des Stinkthiers, *Mephitis Chinga* Tiedem. s. *Viverra Mephitis* L. Endlich gehört hierher noch das *Hyraceum* s. *Dasjepis* (Dachshorn), ein vom Cap importirtes schwarzbraunes, harzglänzendes, festes, thierisches Product, welches erwärmt dem Bibergeil ähnlich

riecht, als dessen billiger Ersatz es in Form einer *Tinctura Hyracii* s. *Dasjespis* (zu 20—60 Tr. u. m. pro dosi) Gebrauch fand (Th. Martius, Canstatt, J. Vogel). Es bildet wahrscheinlich die Excremente des Klipppdachs, *Hyrax Capensis* L. s. *Cavia Capensis* Pallas, nach Andern ist es der eingedickte Urin des zur Ordnung der Vielhufer gehörenden Thieres.

**Oleum Terebinthinae, Spiritus Terebinthinae; Terpenthinöl. Oleum Terebinthinae rectificatum; gereinigtes Terpenthinöl.**

Das Terpenthinöl ist das in verschiedenen Ländern aus dem gemeinen und Venetianischen Terpenthin (vgl. S. 542) durch Destillation mit Wasser gewonnene ätherische Oel, welches sowohl als rohes als auch als durch Destillation mit Wasser rectificirtes Terpenthinöl officinell ist. Beide sind dünnflüssig, farblos, von starkem eigenthümlich unangenehmem Geruche und brennendem Geschmacke. Das rohe Terpenthinöl, welches bisweilen eine geringe gelbliche Färbung zeigt, enthält Ameisensäure, Essigsäure und Fichtenharzsäuren beigemengt, von denen es durch die Rectification befreit wird. Das rectificirte Terpenthinöl hat ein spec. Gew. von 0,86—0,87 und einen Siedepunkt zwischen 152 und 160°. Es löst sich in 12 Th. Weingeist von 0,86 spec. Gew., ebenso mischt es sich mit Holzgeist, Aether, Chloroform, Benzol und Schwefelkohlenstoff. Das Terpenthinöl ist ein Gemenge von Camphenen, denen in geringer Quantität auch Kohlenwasserstoffe beigemengt sind, die einem Multiplum der Formel  $C^{10}H^{16}$  entsprechen. Diese verschiedenen Kohlenwasserstoffe erleiden durch sehr verschiedene Einflüsse sehr leicht molekulare Umänderungen, die von Veränderung des spec. Gew., des Siedepunkts und namentlich des Rotationsvermögens begleitet sind. An der Luft nimmt das Terpenthinöl leicht Sauerstoff auf, den es dabei theilweise in Ozon verwandelt, wobei sich gleichzeitig rasch Ameisensäure und Kohlensäure bilden; ist dabei Wasser vorhanden, so entsteht ein campherartig riechender, in Nadeln krystallisirender Körper, das Terpenthinöloxydhydrat von Sobrero; bei Contact mit Wasser und etwas Salpetersäure entstehen wasserhelle, rhombische, geruch- und geschmackfreie Krystalle von Terpin oder Terpenthinölhydrat. Einleiten von Salzsäuregas in kaltgehaltenes Terpenthinöl erzeugt beim Stehen krystallinische, campherartig riechende und schmeckende, neutral reagirende Massen von einfach salzsaurem Terpenthinöl oder Terpenthincampher,  $C^{10}H^{16}$ , HCl. Mit Iod verpufft das Terpenthinöl, namentlich im frischen Zustande, weniger energisch nach stattgefundener Verharzung. Mit conc. Salpetersäure oder einem Gemisch von Salpeter und Schwefelsäure entzündet sich das Terpenthinöl. Auch säurefreies Terpenthinöl macht Enteneiweiss gerinnen (Chevreul) und fällt Hühnereiweiss aus wässriger Lösung (Lienau).

Das Terpenthinöl zeigt in ausgesprochenem Maasse die den ätherischen Ölen im Allgemeinen zukommenden Wirkungen. Auf der äusseren Haut und auf Schleimhäuten wirkt es stark irritirend. Nach der Aufnahme in das Blut, welche auch von der unversehrten Oberhaut aus geschehen kann, resultirt bei kleineren Dosen (6—30 Tr.) Zunahme der Pulsfrequenz und der arteriellen Spannung, meist auch vermehrte Diurese, wobei der Urin einen eigenthümlichen, an Veilchen erinnernden Geruch annimmt, während gleichzeitig der Athem einen Geruch nach Terpenthinöl zeigt. Bei etwas grösseren Gaben (3,0—8,0) kommt es zu ausgesprochenen gastrischen Störungen mit lebhafter Zunahme der peristaltischen Bewegung, auch zu Erscheinungen von Seiten des Nervensystems, die bei grösseren toxischen Mengen bis zu Sopor und Coma sich steigern können; hier tritt meist auch Entzündung im Urogenitalsystem ein.

Terpenthinöl wirkt in grösseren Dosen auf Menschen und Thiere entschieden

giftig; die Dämpfe desselben tödten Insecten und Milben, auch *Sarcoptes scabiei* rasch und wirken selbst auf viele Pflanzen deleter; Kaninchen sterben nach 15,0–30,0 in 44–60 Std. unter den Erscheinungen von Magen-Darmentzündung, allgemeiner Paralyse und Verlust der Reflexerregbarkeit, mitunter nach vorausgehenden Convulsionen

Nach Köhler und Kobert erregen kleine Dosen Terpenthinöl bei Thieren das Reflexhemmungscentrum im Gehirn, steigern durch Erregung des Gefässnervencentrums den Blutdruck, beschleunigen die peripherische Circulation, vermehren sämtliche Secretionen und bedingen im Zusammenhange damit Sinken der Temperatur, ausserdem acceleriren sie die Athmung und verstärken die Inspiration. Grosse Dosen lähmen das vasomotorische Centrum und bewirken Sinken des Blutdrucks mit nachfolgender Störung der Blutläftung, beschleunigen die Athmung und verlangsamen durch Lähmung der motorischen Herzganglien die Herzschlagzahl. Die Körpertemperatur wird durch kleinere oder grössere Gaben bei jeder Applicationsweise herabgesetzt, nur bei Subcutanapplication folgt auf das Sinken intensives entzündliches Fieber im Zusammenhange mit localer Phlegmone. Fortgesetzte Zufuhr kleiner Mengen bedingt Abmagerung, Parese und Auftreten fettsaurer Salze in dem anfangs vermehrten, später spärlichen Harn, bei innerer Application auch chronische Diarrhoe (Köhler und Kobert).

Bei Menschen erregt Application von Terpenthinöl auf die äussere Haut schon in wenigen Minuten Gefühl von Brennen und intensive Röthung und bei längerer Einwirkung Bildung von Bläschen. Sehr heftige Entzündung und Schwellung erfolgt beim Contact mit der Conjunctiva. In grösseren Mengen inhalirt, verursacht es Druck, Beklemmung und schmerzhaftes Empfindung in der Brust, während die Einathmung kleiner Mengen keine erheblichen Erscheinungen hervorruft. Fortgesetzte Einathmung von Terpenthinöldämpfen, z. B. bei frischem Zimmeranstrich, soll Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Schmerzen in der Lenden- und Nierengegend, Blutharnen und selbst asphyktische Erscheinungen herbeiführen können (Marchal de Calvi). Die Wirkungen, welche grössere Dosen bei innerlicher Einverleibung bedingen, sind nicht immer constant. Druck und Wärme im Epigastrium, Aufstossen, Kneifen im Bauche, Kollern und Stuhldrang beweisen die vorhandene Irritation der Intestina und der Peristaltik; unruhiger Schlaf, Spannung und schmerzhaftes Gefühl im Kopfe weisen auf Ergriffensein des Gehirns hin; ausserdem kommen leichter Schwindel, Ohrensausen, mitunter rheumatische Schmerzen in den Extremitäten, manchmal auch starke Abgeschlagenheit vor. Das bisweilen beobachtete Hautjucken (noch seltener ist Hautausschlag) steht wahrscheinlich mit der Ausscheidung des Oels durch die Haut im Zusammenhange. Von Duncan und Copland sind auch psychische Exaltationen nach grösseren Mengen Ol. Tereb. beobachtet, von Stedman Strangurie, Hämaturie und Anurie, von Höring Bronchitis und Stickanfalle (letztere offenbar Eliminationswirkung). Im Ganzen ist die Giftigkeit nicht gross, da selbst bei Kindern nach 60,0–120,0 meist Genesung eintritt, doch ist auch tödtlicher Ausgang nach 15,0 bei einem 14 Monate alten Knaben beobachtet (Miall). Percival nahm 8,0 ohne nachtheilige Folgen. Im Organismus verhält sich Terpenthinöl wahrscheinlich dem Campher analog, indem danach mehrere gepaarte Glykuronsäuren, darunter eine stickstoffhaltige, im Urin auftreten (Schmiedeberg). Der Veilchengeruch des Urins erscheint schon nach der Einathmung höchst geringer Mengen Terpenthinöls, auch bei Kranken, welche an parenchymatöser Nephritis leiden (Rühl). Der Geruch kann nach dem Einnehmen kleinerer Mengen 24 Std. und länger dauern. Bei tödtlicher Terpenthinolvergiftung fehlt er im Thierharn (Köhler und Kobert).

Das Terpenthinöl wirkt retardirend auf Harn- und Milchgährung (Köhler und Kobert).

Therapeutische Anwendung findet das Terpenthinöl sowohl äusserlich als innerlich bei einer grossen Anzahl verschiedener Affectionen, wie dies die mannigfachen physiologischen Wirkungen des Mittels a priori wahrscheinlich machen. Als erregendes Mittel steht es namentlich in England in Ruf, wo es besonders im Typhus und im Puerperalfieber in Anwendung kommt.



Für die Benutzung des Mittels im Puerperalfieber, gegen welches dasselbe selbst in enormen Dosen (nach *Brenan* 3–4stündlich 1–2 Esslöffel voll, daneben auch äusserlich mit Terpenthinöl getränkter Flanell auf das Abdomen applicirt) diene, scheinen sich kaum noch Stimmen zu erheben. Als Excitans ist Terpenthinöl bei narkotischen Vergiftungen (Opium und Blausäure) empfohlen, hier jedoch ebenfalls von andern Mitteln (Wein, Campher u. s. w.) verdrängt.

Ferner kann Terpenthinöl bei verschiedenen Nervenkrankheiten in Anwendung gezogen werden. Am meisten Nutzen hat es bei Neuralgien und in specie bei Ischias.

In welcher Weise die wohlconstatirten günstigen Effecte bei Ischias (*Home*, *Recamier*, *Pitcairn*, *Romberg*) sich erklären lassen, ist zweifelhaft. Das Oel kann sogar bei sehr inveterirten Neuralgien dauernd heilen, bisweilen wirkt es nur temporär lindernd, manchmal versagt es ganz seinen Dienst. Ob rheumatische Ischias besonders günstig durch Terpenthinöl influirt wird, steht dahin. Auch in Fällen von Hemikranie haben wir günstige Wirkung von Terpenthinöl gesehen. Von andern Neurosen ist es die Epilepsie, wo man (vorzugsweise in England) das Mittel benutzt hat; auch Chorea, Hysterie und Tetanus sind zu nennen. Die Wirkung ist jedoch hier überall problematisch.

An die Neuralgien schliesst sich einerseits die Anwendung des Mittels bei Gallensteinkolik, andererseits dessen Gebrauch bei rheumatischen Schmerzen.

Bei Gallensteinkolik ist es besonders in Form des sog. *Durandschen* Mittels (Ol. Tereb. 1 Th., Aether 3 Th.) viel gebraucht und gerühmt. Man schrieb demselben eine auflösende Wirkung auf die Steine zu, doch ist es unwahrscheinlich, dass das Mittel in dieser Weise wirkt. Wahrscheinlich ist die Anregung der Peristaltik durch das Oleum Tereb. und die darauf beruhende raschere Herausbeförderung der Steine einerseits und die anästhesirende Wirkung des Aethers andererseits die Hauptsache. Bei chronischen Rheumatismen scheint die Heilwirkung in der diaphoretischen Action begründet; der Erfolg zeigt sich nach *Pereira* am besten nach Gaben von 4,0–8,0, nicht nach kleineren. Bei localen Schmerzen wirkt die örtliche äussere Application in entschiedener Weise unterstützend. Besonders gerühmt wird Ol. Tereb. bei Iritis rheumatica (*Carmichael*). Minder günstig wirkt es bei Iritis syphilitica, während es bei längerer Darreichung andre syphilitische Erscheinungen (Condylome) günstig beeinflussen soll (*Nicholsen*).

Die anregende Wirkung auf die Peristaltik macht Terpenthinöl zu einem guten Mittel bei Auftreibung des Magens und der Gedärme durch Blähungen und bei acutem Meteorismus im Typhus oder Puerperalfieber (*Ramsbotham*, *Marshall Hall*, *Cantet*).

In letzteren Affectionen soll es in purgirender Dosis gegeben werden, lässt sich aber zweifelsohne durch weniger irritirend wirkende Cathartica ersetzen. Als eigentliches Purgans empfiehlt es sich wegen der den abführenden Dosen zukommenden Nebenerscheinungen nicht. Ebenso ist es trotz seiner deleteren Wirkung auf Band-, Spul- und Madenwürmer kein empfehlenswerthes Anthelminicum.

Sehr günstig wirkt Terpenthinöl bei verschiedenen krankhaften Zuständen der Lungen und der Bronchien. Es beschränkt bei Bronchialkatarrhen mit excessiver Secretion die letztere in analoger Weise wie die sog. balsamischen Mittel und hat bei gleichzeitiger Fötidität des Athems die Wirkung, letztere in ausgezeichneter Weise

zu verdecken. Besondere Empfehlung fand das Mittel bei Lungengangrän.

Skoda constatirte unter Einwirkung von Terpenthinöldämpfen entschiedene Abnahme des Uebelgeruchs der Sputa bei Lungengangrän, sowie Reinigung und Heilung der Brandhöhlen. Der Grund der günstigen Effecte ist nicht völlig sicher gestellt; Einwirkung auf die bei Lungengangrän vorkommenden Pilze und Infusorien scheint nicht im Spiele zu sein, vielleicht ist die durch die Dämpfe verursachte Irritation der Wandungen der Gangränhöhlen die Hauptsache. Warburton Begbie sah Heilung eines in der Lunge durch Hineingerathen eines Dornes gebildeten Eiterherdes bei innerem Terpenthinölgebrauche.

Wie bei chronischen Bronchoblennorrhöen wird Terpenthinöl auch bei analogen Affectionen der Urethra und Vagina benutzt und namentlich hat es einigen Ruf bei Blasenkatarrh, obschon meist Balsamum Copaivae u. a. in praxi bevorzugt werden. Vielleicht in ähnlicher Weise, d. h. durch einen contrahirenden Einfluss auf die Gefässe, sind die günstigen Effecte, welche bei Blutungen in manchen Fällen beobachtet werden, zu erklären.

Bei allen blennorrhagischen Affectionen nützt das Medicament nur dann, wenn dieselben chronischen Charakter zeigen; ist acute Reizung vorhanden, so wirkt es oft geradezu verschlimmernd. Namentlich bei Blasenkatarrh ist dies wohl zu berücksichtigen, weshalb hier Pereira auch kleineren Dosen den Vorzug giebt. Bezüglich des Gebrauches bei Blutungen sei bemerkt, dass man im Allgemeinen Terpenthinöl mehr bei atonischen Blutflüssen als bei activen Hämorrhagien indicirt erachtet. In England fand es Empfehlung als Purgans bei *Purpura hæmorrhagica*; ob mit Recht, steht dahin. Auch bei Darmblutungen und chronischen Darmkatarrhen wird Ol. Tereb. von Einzelnen gerühmt.

Ferner dient Terpenthinöl als Diureticum bei Wassersuchten, wo es indess bei bestehender Tendenz zu Entzündung des Darmcanals oder der Harnwege contraindicirt ist.

Pereira empfiehlt es besonders bei atonischem Hydrops, namentlich bei scrophulösen Subjecten, ausserdem wurde das Mittel auch bei Nierenvereiterung und Nierenhydatiden empfohlen. Bei Diabetes besitzt es keine besondere Bedeutung.

In neuerer Zeit hat sich vielfach die Aufmerksamkeit der Aerzte auf die antidotarische Anwendung des Terpenthinöls bei Phosphorismus acutus gelenkt, wofür einzelne Beobachtungen an Menschen und ausgedehntere Versuchsreihen an Thieren (H. Köhler, Vetter) günstiges Zeugniß ablegen.

Nachdem zuerst Letheby die Dämpfe des Terpenthinöls, weil dasselbe das Leuchten des Phosphors verhindert, zum Schutze der Arbeiter in Phosphorzündholzfabriken in der Weise verwendet hatte, dass er jeden Arbeiter eine Büchse mit Terpenthinöl vor der Brust tragen liess, erprobte zuerst Andant das Terpenthinöl als Antidot bei acuter Phosphorvergiftung. Seine günstigen Erfolge fanden Bestätigung durch Lichtenstein, H. Köhler, Géry u. A., welche das Mittel bei Menschen nach Ingestion zum Theil selbst grosser Phosphormengen benutzten. Personne, welcher zuerst an Thieren die Bedeutung des Terpenthinöls als Antidot bei Phosphorvergiftung studirte, glaubte, dass die Wirkung darauf beruhe, dass das resorbirte Oel den Phosphor im Blute verhindere, den rothen Blutkörperchen Sauerstoff zu entziehen. Köhler führte den Nachweis, dass Terpenthin mit Phosphor im Magen eine Verbindung eingeht, bei deren Bildung der Sauerstoff mitwirkt, und welche, ohne erheblich giftige Wirkungen zu äussern, den Organismus passirt und durch die Nieren eliminirt wird. Nach neueren Untersuchungen von Fort sollen sich zwei verschiedene Verbindungen

bilden, denen beiden nur geringe Toxicität zukommt. Diese von Köhler als terpenthinphosphorige Säure bezeichnete, übrigens leicht veränderliche und sich höher oxydierende Verbindung ist zu 1,0 für Hunde nicht toxisch und bildet sich nur bei Anwendung nicht rectificirten Terpenthinöls, weshalb bei Phosphorvergiftung stets gewöhnliches Oleum Terebinthinae verordnet werden muss. Zweckmässig erscheint bei Anwendung des Ol. Tereb. gegen Phosphorvergiftung, demselben ein Emeticum aus Kupfersulfit vorzuschicken.

Aeusserlich kann Terpenthinöl in allen Fällen verwendet werden, wo Erethistica in Anwendung kommen, sei es als Derivatium oder zur Beseitigung von Hautaffectionen durch Hervorrufung einer localen Entzündung oder zur Reizung von Geschwüren bei torpider Beschaffenheit derselben.

Die deletere Wirkung des Terpenthinöls auf Insecten und Milben lässt dasselbe auch bei Scabies (Volz, Wucherer, Upmann), Morpionen u. s. w. verwundbar erscheinen, doch ist es hier durch Perubalsam und Storax verdrängt. Als Rubefaciens bei chronischem Rheumatismus, Neuralgien, Lähmungen und Anästhesien steht es dem Senfspiritus am nächsten. Als Verbandmittel von torpiden Geschwüren ist es in tropischen Ländern zur Fernhaltung von Fliegenlarven geschätzt. Auch bei uns galt es früher bei Gangraena senilis (Dussausoy, Brüninghausen), freilich in Verbindung mit Chinarinde, für das vorzüglichste Heilmittel. Bei Frostbeulen ist es ein beliebtes Volksmittel. Kentisch und Pereira rühmen es als kräftiges Reizmittel bei Verbrennungen, Lücke, Borigen, Kaczorowski bei Erysipelas traumaticum. Dass man es zur Unterstützung der innern Anwendung bei Peritonitis puerperalis und andern entzündlichen Affectionen verwendete, wurde schon oben angegeben. Burdach, Bellecontre u. A. glaubten sogar, durch Einreiben von Terpenthinöl Intermittens heilen zu können.

Einen besonderen Ruf geniesst Terpenthinöl namentlich in England als blutstillendes Mittel, doch sind seine hämostatischen Wirkungen bei äusserer Application keineswegs sicher gestellt. Foulis empfiehlt Waschungen mit Terpenthinöl vor Sectionen als Prophylacticum des Leichengifts.

Innerlich wird Terpenthinöl zu 5—20 Tr. u. m., als Excitans und Neuroticum selbst zu 2,0—5,0 gereicht. Bei Phosphorvergiftung ist etwa die hundertfache Dosis des genommenen Phosphors nothwendig; hier ist nicht Ol. Tereb. rectificatum zu verwenden, welches sonst den Vorzug verdient. Man giebt das Mittel in Gallertkapseln oder, wo kleinere Dosen genügen, in Tropfen, wobei man Haferschleim, Bouillon oder etwas Citronensaft mit- oder nachnehmen lässt. Auch die Form der Emulsion kann benutzt werden, doch darf bei Phosphorismus acutus als Emulgens nicht Eidotter dienen, weil durch das in demselben enthaltene Fett die Resorption des Phosphors befördert wird.

Weniger gebräuchlich sind Pillen (mit Wachs). Auf Mischungen mit Aether wurde bereits oben hingewiesen; ebenso kann man es mit Spiritus aethereus und aromatischen Tincturen geben. Nicht schlecht ist die Form der Latwerge oder des Linctus (1 : 5—10 Honig), besonders wenn man als Geschmacks corrigens  $\frac{1}{12}$  Ol. Citri zusetzt.

Aeusserlich kommt nur das gewöhnliche, nicht das rectificirte Terpenthinöl in Anwendung und zwar entweder pure, z. B. zum Bepinseln der Haut bei Erysipelas oder zu Einreibungen bei Krätze, Cholera (Bellecontre), Pneumonie, Puerperalfieber, wo man, wenn die Wirkung eine sehr rasche sein soll, erwärmtes Terpenthinöl benutzt, oder in Mischungen mit andern Substanzen zu Linimenten, Inhalationen, Verbandmitteln, Salben und Klystieren. Im Clyisma verwendet man Ol. Tereb. gewöhnlich in Form einer Emulsion mit Eigelb zu 3,0—15,0 auf 150,0 Col. Derartige Klystiere können nicht nur als Reizmittel bei Collapsus,



Erschöpfung u. s. w. dienen, sondern sollen auch bei profuser Menstruation (Garraway) von vorzüglicher Wirkung sein. Zur Inhalation giesst man entweder einen oder mehrere Theelöffel voll Ol. Tereb. auf kochendes Wasser und lässt die aufsteigenden Dämpfe direct oder mittelst eines Apparats einathmen (Skoda), oder man zerstäubt ein Gemenge von Terpenthin und Wasser oder einer dem jedesmaligen Zwecke entsprechenden Lösung von Stoffen, welche auf die Respirationsschleimhaut wirken (Waldenburg).

Pharmaceutische Anwendung findet Terpenthinöl zur Tränkung von Oblaten, welche als Moxen benutzt werden; man gebraucht dazu am zweckmässigsten eine Mischung von 3 Th. Ol. Tereb. und 1 Th. Aether. Endlich ist noch zu erwähnen, dass in der Choleraepidemie von 1854 Terpenthinöl auf Pfeufers Anregung als Desinfectionsmittel in Krankensälen, Gefängnissen und andern Anstalten gebraucht wurde, angeblich mit Erfolg. Man ist von diesem Verfahren, welches eine Steigerung des Ozongehalts der Luft beabsichtigt, ziemlich allgemein zurückgekommen, zumal da die Terpenthinöldämpfe nicht zu den angenehmsten Reizmitteln des Olfactorius gehören.

Als Präparat des Terpenthinöls ist das Unguentum Terebinthinae bereits früher besprochen.

Das Terpenthinöl bildet einen Bestandtheil vieler sowohl zum inneren als zum äusseren Gebrauche bestimmter, mit besonderen Namen belegter Mischungen, die theils als Quacksalbermittel, namentlich bei Blutungen und Frostbeulen, einen ziemlichen Ruf gewonnen haben. Dabin gehört z. B. Warrens blutstillender Balsam, eine Maceration von Terpenthinöl mit Spiritus und Schwefelsäure, in Amerika innerlich bei Hämorrhagien zu 20–40 Tropfen gebraucht, und andere ähnliche, als Balsamum adstringens, Eau hémostatique de Broccieri, Eau de Tisserand bezeichnete Mischungen, Sauborns Krebstropfen u. s. f. Hierher gehört auch die aus aa 6 Th. Terpenthinöl und Oleinseife und einen Theil Kaliumcarbonat bereitete früher officinelle Terpenthinölseife, Sapo terebinthinatus s. Balsamum vitae externum s. Sapo Starkeyanus, eine äusserlich und innerlich benutzte salbenartige Masse, keine eigentliche Seife, zu deren Herstellung 16 Th. Seife auf 1 Th. Terpenthinöl erforderlich sind.

Das ozonisirte Terpenthinöl, Oleum Terebinthinae ozonisatum, welches äusserlich viel intensiver reizend als gewöhnliches Terpenthinöl wirkt, ist von Seitz zu 5–20 Tr. mehrmals täglich bei chronischem Blasenkatarrh, Incontinentia urinae, Metrorrhagie und Neuralgien empfohlen.

Ähnlich wie Terpenthinöl wirken auch verschiedene andere durch Destillation von Theilen derjenigen Abietineen, aus denen Terpenthin und Terpenthinöl erhalten werden, gewonnene Oele, die theilweise durch angenehmeren Geruch sich auszeichnen. Dabin gehören namentlich das aus den Zapfen von Abies pectinata DC. und Abies excelsa DC., Schweizer Tannenzapfenöl, Oleum abietinum Helveticum, und verschiedene als Oleum templinum bezeichnete, aus den Zapfen der Krummholz- oder Latschenkiefer, Pinus Pumilio Hänke, gewonnene Gemenge von Camphenen. Nach Versuchen von Ray (1868) wirken Schweizer Tannenzapfenöl und Ungarisches und Reichenhaller Krummholzöl nicht wesentlich verschieden vom Terpenthinöl und können auch therapeutisch wie dieses äusserlich als Derivans und bei torpiden Geschwüren und Rhagaden, innerlich bei Ischias und Bronchorrhoe, bei letzterer auch in Inhalationen Verwendung finden.

#### Verordnungen:

1)  $\mathcal{R}$   
*Olei Terebinthinae*  
*Spiritus aetherei* aa 10,0  
 M. D. S.  $\frac{1}{2}$  stdl. 12 Tropfen in Hafer-schleim. (Bei Phosphorismus acutus. H. Köhler.)

2)  $\mathcal{R}$   
*Olei Terebinthinae* 15,0  
*Vitelli ovi unius*  
*Aq. Ment. pip.* 150,0  
 M. D. S. Äusserlich. (Linimentum diureticum Ph. Hann.)

- |  |  |
|--|--|
| <p>3) R<br/> <i>Olei Terebinthinae</i> 100,0<br/> <i>Camphorae</i> 6,0<br/> <i>Saponis viridis</i> 12,0<br/> <i>M. f. linim. D. S.</i> Aeusserlich (Linimentum Terebinthinae. Ph. Br.)<br/> Bei chronischen Brustleiden u. s. w.)</p> <hr/> <p>4) R<br/> <i>Olei Terebinthinae rectificati</i><br/> <i>Rad. Liquiritiae pulv. aa</i> 10,0<br/> <i>Mellis depurati</i> 20,0</p> | <p><i>M. D. S.</i> Mehrmals täglich <math>\frac{1}{2}</math> bis 1 Theelöffel. (Confectio s. Electuarium Terebinthinae. Ph. Br.)</p> <hr/> <p>5) R<br/> <i>Olei Terebinthinae</i> 2,0<br/> <i>Aetheris</i> 3,0<br/> <i>M. D. S.</i> Mehrmals täglich 15—30 Tropfen. (Bei Gallensteinkolik. Durande.)</p> <hr/> |
|--|--|

**Camphora; Campher, Camphor, Camphol, Laurineencampher, Japanischer oder Chinesischer Campher, Gemeiner Campher.**

Das unter dem Namen des Camphers bekannte Stearopten stammt von *Cinnamomum Camphora* Nees (*Laurus Camphora* L., *Camphora officinarum* Bauh.), einem Baume aus der Familie der Laurineen, welcher auf dem asiatischen Continent von Cochinchina und den südöstlichen Provinzen Chinas an bis nördlich vom Amur, ferner auf den benachbarten Inseln und besonders auf Japan ausserordentlich verbreitet und cultivirt ist.

Dieser Baum enthält in allen seinen Theilen ätherisches Oel, ursprünglich wohl ein Tereben, das aber leicht Sauerstoff aufnimmt und sich dabei in den Campher,  $C^{10}H^{16}O$ , verwandelt, der oft im Holze in grösseren Mengen krystallinisch abgeschieden vorkommt. Der Campher wird an Ort und Stelle als sog. Rohcampher durch Auskochen der zerkleinerten Pflanzentheile mit viel Wasser in eisernen Kesseln und Sammeln des dabei mit den Wasserdämpfen sich verflüchtigenden Stearoptens in einem sehr primitiven Helme gewonnen und in Europa durch nochmalige Sublimation mit Kohle oder Sand und Aetzkalk gereinigt oder raffinirt (raffinirter Campher). Der japanische Campher ist wohl zu unterscheiden von dem Borneo-Campher oder Baros-Campher, auch Sumatra-Campher genannt, welcher von einem Baume aus der Familie der Dipterocarpeen, *Dryobalanops Camphora* Colebr., stammt, welcher auf der Nordküste Sumatras und im nördlichen Borneo wächst. Aus demselben sickert bei dem Anbohren ein röthlicher klebriger Balsam, der aus Harz, Campher und hauptsächlich einem nach rechts rotirenden Terebene, dem Borneen, besteht, das in ähnlicher Weise wie das Campheröl zu Camphol sich zu Borneo-campher oder Borneol oxydirt. Dieser Campher gelangt nicht in den europäischen Handel, sondern geht nach China und Japan; er ist etwas härter, weniger flüchtig, bei 198° flüssig, riecht feiner und soll milder schmecken und wirken. Er hat die Formel  $C^{10}H^{18}O$  und verhält sich zum Campher wie Alkohol zum Aldehyd. Beim Erwärmen mit mässig concentrirter Salpetersäure wird er in gewöhnlichen Campher übergeführt. Beim längeren Digeriren von Japan-campher mit wässrigem Kali entsteht Borneol (Berthelot), das sich auch in ähnlicher Weise aus dem erwähnten Borneen, welches auch im Baldrianöl vorkommt, künstlich darstellen lässt. Sowohl dem Camphol als dem Borneol entsprechend zusammengesetzt sind verschiedene Stearoptene und Elaeoptene andrer Abstammung.

Der gereinigte Campher bildet weisse, körnig krystallinische, mürbe Massen von glänzendem Bruche, eigenthümlich starkem Geruche und brennendem bitterem, nachher kühlendem Geschmacke. Kleine Stückchen schwimmen auf dem Wasser mit rascher rotirender Bewegung. Die Ebene des polarisirten Lichtes dreht er nach rechts. An der Luft verflüchtigt er sich nach und nach. Er lässt sich leicht entzünden und brennt mit russender Flamme. In Wasser

löst er sich äusserst wenig (in 1000 Th. kaltem Wasser), leicht löslich ist er in Weingeist, noch leichter in Aether, Chloroform, Holzgeist, Eisessig, auch in Benzin, Schwefelkohlenstoff, Aceton, ätherischen und fetten Oelen.

Mit Brom bildet er Substitutionsproducte, von denen der von Swarts entdeckte Monobromcampher,  $C^{10}H^{15}BrO$ , medicinisch benutzt wird. Die aus dem Campher durch Oxydationsmittel erhaltene Camphersäure,  $C^{10}H^{16}O^4$ , scheint keine besondere Action zu besitzen und geht als solche in den Harn über; das bei der gleichen Behandlung entstehende Camphersäureanhydrid,  $C^{10}H^{14}O^3$ , erscheint im Urin als Camphersäure (Bertagnini).

Der Campher, welcher als Medicament seit der Zeit der arabischen Aerzte eine bedeutende Rolle gespielt hat und auch jetzt noch allgemeine Anwendung findet, besitzt örtliche und entfernte Wirkung, von denen erstere als ziemlich stark reizende an Haut und Schleimhäuten hervortritt.

Bei Einreibung auf die äussere Haut resultirt Stechen und Brennen, bei zarter Haut auch Erythem, bei subcutaner Injection Röthung und Schmerzhaftigkeit der Injectionsstelle, bei Application auf die blossgelegte Cutis heftiger Schmerz. Im Munde und auf der Zunge erregt Campher bei kürzerer Anwesenheit anfangs brennenden Geschmack, dann nicht lange anhaltendes Gefühl von Kälte und reichliche Absonderung von Speichel und Schleim; dauert der Contact etwa  $\frac{1}{2}$  Std., so kommt es zu intensiver Hitze und Entzündung. Schmerz und Kältegefühl können auch bei Ingestion grösserer Dosen im Magen auftreten. Bei Thieren, welche mit Campher vergiftet wurden, kommen sogar Ulcerationen im Magen vor.

Der Campher wird von den Schleimhäuten als solche resorbirt und theilweise unverändert durch die Athmung, theilweise in Gestalt gepaarter Glykuronsäure durch den Harn ausgeschieden.

Nachdem bereits Buchheim und Malewski den von Hertwig behaupteten Uebergang des Camphers in Harn und Milch in Abrede gestellt hatten, ist durch Schmiedeberg und H. Meyer (1880) der Nachweis geliefert, dass beim Hunde nach Fütterung mit Campher drei verschiedene gepaarte Säuren auftreten, zwei nicht stickstoffhaltige Camphoglykuronsäuren, welche durch Säuren in Campherol,  $C^{16}H^{16}O^2$ , und Glykuronsäure,  $C^6H^{10}O^7$ , gespalten werden; die dritte Säure ist stickstoffhaltig und wahrscheinlich als Uramido-Camphoglykuronsäure zu betrachten. Eine Ausscheidung von Campher als solchem durch die Respirationswege macht der Camphergeruch des Athems bei Vergiftung wahrscheinlich. Tiedemann und Gmelin constatirten Camphergeruch im Pfortaderblute, nicht aber im Chylus und Urin, Reynolds bei einem Vergifteten im Harn und Schweiss, Pluskal im Schweisse noch am 22. Tage nach einer Campherintoxication.

Die entfernte Wirkung des Camphers scheint von der Gaben- grösse ausserordentlich abhängig zu sein. In grösseren Dosen ist der Campher ein Gift für Thiere und Menschen.

Auffallend stark werden von demselben in Dampfform niedere Thiere von dem Typus der Articulaten afficirt, Entozoën nur sehr wenig; Hunde sind weniger empfindlich als Katzen. Auch auf Pflanzen wirkt Campher deleter.

Das Bild der Vergiftung bei Säugethieren zeigt insofern grössere Differenzen, als sich manchmal ein rauschähnlicher Zustand, der bisweilen an Hydrophobie erinnert, bald Zittern und epileptiforme Convulsionen, bald mehr Betäubung und Sopor einstellen; bei einzelnen prävalirt Angst, Wimmern, neben Röcheln und dyspnoëtischen Erscheinungen, endlich kann es zu Entleerungen nach oben und unten, zu vermehrter Diurese und Speichelfluss kommen. In manchen Fällen sind diese Erscheinungen zum Theil combinirt und es kann vorkommen, dass, wenn das Thier unter Abnahme der Reflexerregbarkeit in Sopor und einem paralytischen Stadium sich befindet, sich plötzlich wiederum paroxystische klonische und tonische Krämpfe einstellen. Die Convulsionen tragen nicht selten



den Charakter der Drehbewegungen. Puls- und Athemfrequenz variiren, dagegen ist die Temperatur bei Hunden und Katzen im ganzen Verlaufe der Vergiftung und selbst um mehrere Grade gesunken (W. Hoffmann). Bei Vögeln sind die Vergiftungserscheinungen die nämlichen; bei Fröschen fehlen Convulsionen vollständig (Carminati).

Auch das Bild, welches toxische Dosen Campher beim Menschen hervorrufen, zeigt viele Variationen. In einer Reihe von Fällen kommt es zu ausserordentlich stark ausgeprägten Excitationsphänomenen, die nicht selten den Ausdruck des Wahnsinns tragen, wie z. B. Reynolds das Aufführen wilder Tänze in nacktem Zustande, Lemaistre Florian groteske Hallucinationen des Gesichts und heiteres Delirium beobachtete. In anderen Fällen walten heftige Krämpfe, die häufig den Charakter der epileptischen zeigen und mit Schäumen des Mundes u. s. w. verbunden sind, seltener wirklichen Opisthotonos mit gleichzeitigem Trismus darstellen, vor. In anderen kommt es sofort zu depressiven Erscheinungen, Schwindel, Ohnmachten, völligem Aufgehobensein des Bewusstseins, so dass die Patienten sich des Vorgefallenen nicht mehr erinnern, Coma und Prostration, welche bisweilen nach vorübergehender starker Excitation erst später sich geltend machen. Manchmal wechselt auch Excitation und Depression, lautes Lachen mit Todesangst (Hofmann) u. s. f. Genaue Temperaturmessungen bei Camphervergiftungen liegen für den Menschen nicht vor; auch hier scheint Kühle der äusseren Haut mit gleichzeitiger Blässe Regel, worauf in einzelnen Fällen, vielleicht in Folge von örtlichen Entzündungen (Gastroenteritis), Hitze und Turgescenz der Haut folgen kann. Einzelne Kranke zeigen auch ein subjectives Kältegefühl. Seltene Erscheinungen sind Micturition und Schmerzen im Verlaufe der Samenstränge (Reynolds); häufig ist Angst, Erstickungsgefühl und erschwerte Respiration vorhanden. Der Zustand der Pupille ist inconstant, auch das Verhalten des Pulses nicht überall gleich, doch scheint vorwaltend Abnahme der Pulszahl, während manchmal Irregularität desselben sich findet, vorzukommen.

Die Wirkung kleiner Dosen Campher auf den gesunden Menschen ist in neuerer Zeit wenig studirt. Die Versuche von Jörg und Heisterberg, von Scudery, Mazzotti u. A. lassen es als ausgemacht erscheinen, dass Dosen von weniger als 0,05 gar keine Befindensänderung herbeiführen, während grössere Gaben (0,06 bis 0,5 bis 1,0) Phänomene der Excitation seitens des Kreislaufes und der Gehirnfunktionen bedingen können, so dass der Puls nicht nur frequenter, sondern auch voller wird und die Ideen lebendiger und klarer als gewöhnlich erscheinen. Bei Dosen über 1,0 kann es zu depressiven Vergiftungserscheinungen kommen.

Bei kleinen, aber activen Mengen giebt sich auch Erregung der Peristaltik durch Aufstossen und Abgehen von Blähungen kund, selten erfolgt Stuhlentleerung. Die Wangen röthen sich, häufig erfolgt Schweiss, doch kommt auch trockne Haut nicht selten vor. Die Harnentleerung wird mitunter gesteigert. Vielfach wird grössere Wärme der Haut angegeben, doch hat bisher Messung der Temperatur bei diesen Versuchen nicht stattgefunden. Ueber die Wirkung etwas grösserer Dosen, 1,0—2,5, liegen verschiedene interessante Selbstversuche von Alexander, Trousseau, Parkyne und Malewski vor, welche den Einfluss individueller Verschiedenheiten auf die Dosis toxica des Camphers nachweisen. So nahm Trousseau bis zu 2,3, ohne darnach etwas anderes wie Schwere im Kopfe, Kältegefühl über den ganzen Körper und Abnahme der Pulsfrequenz auf die Dauer von 2 Stunden zu bekommen, während bei Malewski schon nach 2,0 und bei Alexander und Purkyne nach 2,5 Bewusstlosigkeit, welche bei Alexander sich mit intercurrirenden epileptischen Convulsionen verband, eintrat. Bei Purkyne hatte früher 0,7 Campher angenehmes Wärmegefühl über den ganzen Körper, Erregung des Nervensystems und des Gehirns und Tendenz zu religiösem Fühlen zur Folge gehabt.

Die Beobachtungen an Menschen und Thieren lassen die ent-

fernte Wirkung des Camphers als vorzugsweise auf das Gehirn gerichtet erscheinen und zwar primär auf das Grosshirn, später auf Kleinhirn und verlängertes Mark. Inwieweit die Hirnerscheinungen durch directe chemische Einwirkung oder indirect vermöge Einwirkung auf die Circulation resultirt, ist noch nicht völlig festgestellt. Vermuthlich wirken beide Momente gleichzeitig ein. Nicht ohne Bedeutung ist auch eine herabsetzende Wirkung auf die Temperatur und eine fäulnisswidrige Action des Camphers.

Die bei Säugethieren durch Campher bedingten Krämpfe sind nicht vom Rückenmark abhängig, sondern entstehen durch Reizung der im verlängerten Mark belegenen Krampfcentren (Wiedemann). In der bei Fröschen durch Campher bedingten Lähmung bleibt die Reflexaction lange Zeit intact. Nach Heubner steigert Campher in kleinen Dosen die Energie der Herzaction und die Schnelligkeit der Blutbewegung beim Frosche, doch macht sich allmählig eine Abstumpfung der Wirkung geltend, während grosse Dosen geradezu herabsetzend und lähmend auf die Herzaction wirken. Die Erregung geschieht direct, da weder Muscarin noch Vagus- oder Sinusreizung Herzstillstand bewirken (Harnack und Witkowski). Heubner fand bei Warmblütern nach Infusion wässriger Campherlösungen keine besondere Blutdrucksveränderung; starke Dosen bedingen periodische Steigerungen durch Reizung des vasomotorischen Centrums (Wiedemann). Es ist nicht unmöglich, dass derartige periodische Blutdrucksveränderungen einen Theil der bei Vergiftungen an Menschen sich in erster Linie zeigenden psychischen Excitationserscheinungen hervorbringen. Auch die Krämpfe hat man von unregelmässiger Blutvertheilung abhängig angesehen und mit den von Hertwig bei Thierversuchen constatirten Hyperämien in der Gegend der Varolsbrücke und Medulla oblongata in Zusammenhang gebracht.

Die lange ventilirte Streitfrage, ob Campher ein Excitans oder ein Sedativum sei, lässt sich mit ziemlicher Sicherheit dahin schlichten, dass sedative Wirkungen auf das Nervensystem nur durch grosse Dosen hervortreten, während kleinere, aber wirksame Gaben Herz- und Hirnthätigkeit anregen. So erklären sich auch manche Widersprüche in Bezug auf besondere dem Campher zugeschriebene Specialactionen, z. B. auf die Geschlechtsfunctionen.

Unabhängig von der Dosis ist die Temperaturherabsetzung, die sowohl durch grosse als durch kleine nicht krampferregende Mengen bedingt wird (Jos. Baum); der Abfall erfolgt leichter bei fiebernden als bei gesunden Thieren. Dass Campher die Fäulniss organischer Materien hemmt, war bereits im vorigen Jahrhundert Pringle bekannt. Schimmelbildung wird dadurch nicht beeinträchtigt. Nach Binz und Scharrenbroich hemmt Campher die amöboide Bewegung der weissen Blutkörperchen.

Die hauptsächlichste Anwendung des Camphers geschieht gegen die im Verlaufe acuter fieberhafter Krankheiten eintretende allgemeine Schwäche (Collapsus), wo er entweder für sich oder abwechselnd mit anderen Excitantien, z. B. Wein, gereicht wird.

Es ist nicht möglich, bestimmte Indicationen für die Anwendung des Camphers im Collapsus im Gegensatz zu anderen ähnlichen Arzneimitteln festzustellen, da weder die dem Auftreten der allgemeinen Schwäche zu Grunde liegende Ursache, noch die verschiedenen Krankheitsprocesse, im Verlaufe deren sie eintritt, dafür bestimmend sein können. Man hat ihn bei Pneumonien, wenn Stocken des Auswurfes eintritt, mit Vorliebe gegeben, nach Einigen, weil er die Respirationsfrequenz nicht erhöhen soll. Aber ebensogut kann er auch bei anderen acuten entzündlichen Affectionen, ferner im Typhus, bei Puerperal-

fieber, Pyämie, acuten Exanthemen, ja auch bei Delirium tremens, sobald sich die Erscheinungen des Collapsus einstellen, mit Vortheil gereicht werden. Eben-  
sowenig giebt es eine bestimmte Contraindication, als welche active Congestion  
und sthenische Inflammation, daneben auch Neigung zu Blutungen oder ein  
erethischer, reizbarer Habitus bezeichnet werden; selbst das Vorhandensein von  
Magenentzündung schliesst die Anwendung des Camphers (in subcutaner Injec-  
tion) nicht aus.

In der Mehrzahl der genannten Krankheiten wurde Campher früher auch  
als directes, nicht als symptomatisches Heilmittel in Anwendung gezogen, ins-  
besondere bei Typhus und acuten Exanthemen. Die Erfolge, welche ältere Be-  
obachter (Ettmüller, Haller u. A.) bei Variola, Typhus u. s. w. vom Cam-  
pher sahen, beruhen offenbar auf der günstigen Wirkung bei Adynamie im Ver-  
laufe derselben. Ob der Campher als directes Antipyreticum anzusehen ist, wie  
es nach Jos. Baum u. Binz selbst bei kleinen Dosen zu sein scheint, müssen  
weitere Versuche lehren. Ob er bei solchen Affectionen, besonders bei den  
putriden Formen, vermöge seiner fäulnisswidrigen Eigenschaften, wie man in  
alten Zeiten glaubte, Günstiges wirkt, steht dahin. Man muss aber erwägen,  
dass derartige putride Affectionen höchstens Analoga der Fäulniss sind, nicht  
dieser selbst entsprechen. Der Nutzen im Collapsus bei Typhus in Folge abnorm  
hoher Temperaturen beruht offenbar zum grössten Theile auf seiner Action auf  
das Herz.

Als die Gehirnthatigkeit erregendes und allgemein belebendes  
Mittel kommt Campher bei Intoxicationen durch narkotische  
Gifte (Opium, Belladonna, Alkohol) in Anwendung und leistet hier  
sowohl als namentlich auch bei Vergiftungen mit Stoffen, die, wie  
Chloralhydrat, gleichzeitig narkotisch und herabsetzend auf die  
Herzthatigkeit wirken, entschieden Günstiges. Wirkung gegen  
Strychninvergiftung (Pidduck u. A.) dürften nur grosse Gaben  
besitzen.

Als sedirendes Mittel wurde Campher früher bei diversen  
Nervenaffectionen, vorzugsweise spasmodischer und schmerz-  
hafter Art benutzt, so bei Keuchhusten, Chorea, Epilepsie, Pal-  
pitationen (Foissac), selbst bei Tetanus. Hier jedoch, wie auch  
bei Manie, z. B. Puerperalmanie (in grossen Dosen), ist der  
Nutzen ein sehr problematischer. Dasselbe gilt auch von der An-  
wendung als Mittel gegen krankhafte und schmerzhaftes  
Leiden der Urogenitalorgane, einerseits bei Strangurie, Erec-  
tionen Tripperkranker, Spermatorrhoe, andererseits bei Satyriasis  
und Nymphomanie. Die angeblichen Wirkungen gegen solche  
Affectionen, welche zum Theil Symptome der Cantharidinvergiftung  
bilden, haben dem Campher auch einen unverdienten Ruf gegen  
diese Intoxication verschafft.

Den Alten galt der Campher als ein Anaphrodisiacum: „camphora per  
nares castrat odore mares“. Mönche suchten sich deshalb das Keuschheits-  
gelübde durch Tragen in Säckchen eingenähten Camphers zu erleichtern. Auch  
Trousseau will an sich Anaphrodisie als Folge grösserer Campherdosen be-  
obachtet haben. Kleine Dosen nützen nichts, sollen sogar nach Einigen Auf-  
regung des Geschlechtstriebes zur Folge haben. Auch bei Chorea venerea darf  
man, wenn man Erfolg haben will, nur grössere Dosen geben. Die Anwendung  
grosser Gaben gegen Manie ist schon deshalb unzulässig, weil wir wissen, dass  
auch in manchen Fällen von Camphorismus vorwaltend Excitationserscheinungen  
vorkommen.

Auf der vermeintlichen specifischen Action des Camphers auf die Urin-  
werkzeuge beruht auch die von einzelnen Aerzten noch jetzt geübte Praxis,  
Cantharidenpflaster mit Campher zu bestreuen, um der entzündlichen Wirkung



des Cantharidins auf die Nieren entgegenzuwirken. Das Verfahren hat keinen Nutzen. Ebenso ist es überflüssig, zur Vermeidung der Nierenreizung Scilla oder Mezereum mit Campher zu verbinden.

Die durch den Campher hervorgebrachte Diaphoresis hat ihm auch als Mittel gegen Erkältungen und Rheuma Anwendung verschafft, doch steht er hier andern Medicamenten nach.

Die antiputride Wirkung des Camphers ist besonders auch für die äusserliche Verwendung desselben von Bedeutung. Vorzüglich nützlich erscheint er bei brandigen Affectionen, wie bei Decubitus und Gangraena senilis, wo man den externen Gebrauch oft mit dem innerlichen verbindet. Die örtlich reizende Wirkung kommt in Betracht bei der Verwerthung des Mittels gegen schlechte Geschwüre, welche keine Tendenz zur Heilung haben, schlaffe Granulationen zeigen und dünnen Eiter absondern, bei Ozaena, scorbutischem Zahnfleisch und analogen Affectionen, ferner bei den äusserst gebräuchlichen Einreibungen von Campherpräparaten in Fällen, wo Blutaustritt in Folge von Verletzungen (Luxationen, Contusionen, Verstauchungen u. s. w.) stattgefunden hat, oder bei schmerzhaften Affectionen in Folge von Gicht oder chronischem Rheumatismus.

Netter rühmt neuerdings Campher gegen Hospitalbrand, wo 3–4tägiges wiederholtes Aufstreuen gründlich reinigend wirkt. Zu antiseptischen Watteverbänden hat Soulez eine Lösung von  $2\frac{1}{2}$  Th. Campher in 1 Th. 90% Carbolsäure mit 5 Th. Olivenöl oder mit Saponinlösung empfohlen. Als ableitendes Mittel hat man Campher selbst bei Meningitis (zwischen zwei Compressen stets mit Wasser befeuchtet) angewandt. Beliebt ist das Tragen mit Watte umhüllter Campherstückchen im äusseren Gehörgange bei rheumatischem und anderem Zahnschmerz. Auch bei Lähmungen, Amblyopie, Anaesthesie, Frostbeulen, Oedem, Drüsengeschwülsten findet Campher Verwendung.

Endlich kommt noch die Wirkung als Antiparasiticum in Betracht, die jedoch insofern von untergeordneter Bedeutung ist, als die Anwendung gegen Krätze, weil Campher den *Sarcoptes* nicht tödtet, nicht angeht und diejenige gegen Helminthen einer längst verschwundenen Periode angehört. Man hat ihn neuerdings, nicht ohne Erfolg, bei einigen phytoparasitären Affectionen angewendet, so bei *Trichophyton tonsurans* (Sundevall), bei Favus und Soor. Viel ausgedehnter als die Benutzung gegen wirkliche parasitäre Affectionen ist eine solche gegen vermeintliche Schmarotzerkrankheiten geworden, indem, namentlich in Frankreich, die Theorie von Raspail, dass alle ansteckenden Krankheiten durch Schmarotzerthiere oder Pflanzen entstanden und man im Campher ein Mittel besitze, das davor zu behüten im Stande sei, eine grosse Anzahl von Anhängern gefunden hat, welche sich des Camphers in der Form der von Raspail empfohlenen Cigarettes camphrées oder in einer anderen bedienten, um gesund zu bleiben, freilich manchmal mit dem entgegengesetzten Effecte, indem dadurch chronische Intoxication in Form von Zittern der Hände, paralytischer Schwäche u. s. w. hervorgerufen werden kann (Leroy d'Etiolles).

Die weiteren Anwendungen, wie zur Beförderung des Auswurfs bei Emphysem und Tuberculose, als Mittel zur Verhütung von Quecksilberspeichelfluss, bei chronischen Metallvergiftungen, zur Verstärkung der brechenrerregenden Wirkung des Stibio-Kali tartaricum bei narkotischer Vergiftung, haben keinen Werth oder sind, wie die Anwendung gegen Apoplexie (Chomel), Menstruationsstockung u. s. w. geradezu irrationell.

Pharmaceutisch ist Campher als Zusatz zu Pflastern, welche Gummiharze enthalten, von Wichtigkeit, da er dieselben weich und geschmeidig macht. Zusatz zum Cantharidenpflaster, um deren Wirkung auf die Harnwege zu hemmen, ist illusorisch.

Die Dosis des Camphers beträgt, wo man excitirend wirken will, 0,05—0,2. Um sedative Effecte zu erreichen, hat man 0,5 bis 0,8 und mehr gegeben.

Zu den contrastimulistischen Gaben von 1,0—4,0 wird man sich wohl kaum gern entschliessen und lieber ein Narkoticum wählen, da Vergiftungserscheinungen erster Art zu besorgen sind. Bei der durch das physiologische Experiment festgestellten allmählig eintretenden Unempfindlichkeit des Herzens für excitirende Dosen Campher bei längerer Darreichung ist bei Collapsus der Wechsel mit anderen Excitantien (Wein, Ammoniakalien) gerathen.

Man giebt Campher in Substanz in Pulver- oder in Pillenform oder in Emulsion.

Campher lässt sich nur unter Verreibung mit etwas Alkohol pulverisiren und wird dann als *Camphora trita* mit Zucker oder Gummi Arabicum verordnet. Pillen oder Bissen lässt man am zweckmässigsten mit Süssholzextract und Gummi Arabicum machen. Die Anwendung in Pulverform ist bei grösseren Dosen unzweckmässig, weil dadurch leicht Irritation des Magens und Gastralgie hervorgerufen wird. Man zieht deshalb meist die Form der Emulsion vor, für welche sich Gummischleim oder noch besser Eigelb verwerthen lässt; am zweckmässigsten wird dieselbe aus *Oleum camphoratum* angefertigt. Gebräuchlich sind Lösungen in Aether oder Spiritus aethereus. Auch *Vinum camphoratum* und *Campherspiritus* lassen sich als Excitans darreichen, wobei deren Dosirung dem Camphergehalte entspricht.

Auch äusserlich kommt der Campher in Substanz nicht selten, jedoch vorwaltend zu örtlichen Zwecken, in Anwendung.

Man hat bei Angina gangraenosa Stücke davon kauen lassen und applicirt ihn ebenfalls in Stücken in hohle Zähne oder den Gehörgang (in Watte für sich oder in Pillenform mit Oel und Wachs, sog. Pintersche Ohrenpillen), desgleichen als Derivans in Kräuterkissen (mit 50 Th. Species aromaticae) oder als Anaphrodisiacum für sich in Säckchen. Zu localer Einwirkung dienen auch die Dämpfe, z. B. bei Anginen mit heissem Wasser verflüchtigt oder bei Rheumatismus von heissen Metallplatten entwickelt und entweder direct zu den leidenden Theilen geleitet oder mit Wolle (*Lana camphorata*) oder Watte aufgefangen, wofür man einfacher mit spirituöser Campherlösung besprenzte Zeuge anwendet. Mit Kohle, Myrrha u. s. w. dient gepulverter Campher als Adsperso, Schnupfpulver u. s. w. Vielfach dient er zu Einreibungen (hier jedoch mehr in Form der Ppt.). Auch Seifen lässt er sich im Verhältniss von 1:8 beimengen.

Zur Erzielung entfernter Wirkungen lässt sich Campher im Klystier (Bouchardat) oder in Subcutaninjection zu 0,05—0,2 in verdünntem Weingeist, Aether oder fetten Oelen gelöst, bei Collaps mit grossem Erfolg geben.

#### Präparate:

1) **Spiritus camphoratus**, Spiritus s. Tinctura camphorae, **Campherspiritus**. 1 Th. Campher in 7 Th. Spiritus gelöst, dazu 2 Th. Aq. dest. und filtrirt. Klar, farblos, nach Campher riechend. Das Präparat wird vorzugsweise äusserlich benutzt, kann aber auch innerlich zu 10—30 Tropfen pure oder in Mixturen (mit Syrupen oder Gummischleim) gegeben werden. Wasserzusatz ist zu vermeiden, weil dadurch Campher ausgeschieden wird. Aeusserlich dient Spir. camph. besonders zu reizenden Einreibungen und Waschungen, seltener und minder zweckmässig als Zusatz zu Mund- und Gurgelwässern, Injectionen und Collyrien. Mit  $\frac{1}{50}$  Tinct. Croci bildet er den bei Kolik und Frostbeulen benutzten *Spiritus camphorato-crocatus*. In England sind concentrirtere spirituöse Campherlösungen, z. B. Epps concentrated

solution of camphora, als homöopathische Universaltropfen im Gebrauch, deren unvorsichtiger Gebrauch wiederholt Vergiftungen veranlasste.

2) **Vinum camphoratum; Campherwein.** 1 Th. Campher in 1 Th. Weingeist gelöst, 3 Th. Gummischleim, 45 Th. Weisswein. Diese weisslich trübe Flüssigkeit dient äusserlich zu Umschlägen auf brandige und torpide Geschwüre, auch bei Verletzungen der Genitalien bei der Geburt, Dammrissen u. s. w., kann aber auch innerlich bei Collapsus zu 1—2 Theelöffel 1—2stündlich gegeben werden.

3) **Oleum camphoratum, Linimentum camphorae; Campheröl.** Lösung von 1 Th. Campher in 9 Th. Provenceröl. Das Oleum camphoratum kann in Form von Emulsionen als innerliches Camphermittel angewendet werden, dient aber meist äusserlich zu Einreibungen, Salben, Pinselsäften (nach Hensch bei mercuriellen Mundgeschwüren), Ohrtropfen auf Baumwolle bei Otalgia rheumatica und zum Töden in den äusseren Gehörgang eingedrungener Insecten, auch zur Subcutaninjection, wo es weniger als ätherische und spirituöse Lösung irritirt.

4) **Linimentum saponato-camphoratum, und**

5) **Linimentum saponato-camphoratum liquidum** vgl. unter Ammoniak.

In früherer Zeit hatte man noch zahlreiche andere Campherpräparate zum inneren oder äusseren Gebrauche. Vorzugsweise innerlich dienten Acetum camphoratum und Aether sulfuricus camphoratus, Mixtura camphorata s. Aqua camphorata, Julapium camphorae acetosum u. a. m., welche besonders in England in Ansehen standen, vorzugsweise äusserlich dagegen das Acidum aceticum camphoratum und Acidum aceticum aromatico-camphoratum, beide Riechmittel bei Ohnmachten, der Spiritus antiparalyticus, das Balsamum universale u. s. f.

Der Monobromcampher, Camphora monobromata, wurde 1871 von Deneffe zu 3,0—4,0 pro die in Pillenform bei Delirium tremens benutzt und später meist in kleineren Dosen bei einer Reihe von Affectionen, in denen Campher häufig Anwendung findet, so namentlich bei Chorda venerea (Hamilton), bei Spermatorrhoe und Nymphomanie (Goss), bei Chorea (Gallard), hysterischen Krämpfen, Palpitationen und Dyspnoe (Vulpian, Potain), bei Epilepsie (Charcot und Bourneville), bei Prosopalgie (Desnos) und bei schmerzhaften Affectionen der Blase (Lannelongue) gegeben. Man gebraucht das Mittel meistens zu 0,2—0,4 Abends oder 3—4mal täglich, häufig in Pariser Hospitälern in Form von Dragées oder Gallertkapseln. M. Rosenthal rühmt es bei nervösem Herzklopfen und Blasenreizung. Bei längerer Darreichung bewirkt es leicht Irritation des Magens und Magenkatarrh (Lawson). Bei Thieren bewirkt Monobromcampher Schlaf und Herabsetzung der Puls- und Athemzahl, sowie der Temperatur. Zu 1,0 und darüber erzeugt er beim Menschen Vergiftungserscheinungen (psychische Verstimmung, convulsivische Zuckungen, Pulsverlangsamung, Bewusstlosigkeit), welche ganz das Gepräge der acuten Camphervergiftung zeigen (Rosenthal).

#### Verordnungen:

1)  $\mathcal{R}$   
*Camphorae tritae* 0,5  
*Gummi Arabici* 5,0  
*M. f. pulv. Divide in part. aeq. No. 10.*  
*D. in charta cerata. S. Stündlich 1*  
*Pulver.*

2)  $\mathcal{R}$   
*Olei camphorati* 10,0  
*Gi. Arabici* 5,0

*F. c. Aq. dest. q. s.*  
*Emulsio* 150,0  
*in qua solve*  
*Kalii bromati* 5,0  
*Syrupi Althaeae* 25,0

*M. D. S. Stündlich 1 Esslöffel. (Bei*  
*Tripper.)*



3)  $\mathcal{R}$   
*Camphorae* 1,5  
*Aetheris acetici* 10,0  
*Tincturae Opii simpl.* 2,5  
*M. D. S.*  $\frac{1}{4}$  —  $\frac{1}{2}$  stündlich 10 — 15  
 Tropfen. (Bei Cholera asphyctica. Oppolzer.)

4)  $\mathcal{R}$   
*Camphorae* 1,0  
*Aetheris* 5,0  
*M. D. S.* Zur subcutanen Einspritzung.  
 ( $\frac{1}{2}$ —1 Spritze voll.)

5)  $\mathcal{R}$   
*Camphorae* 0,5  
*Vitelli ovi unius*  
*Extracti Opii* 0,05  
*Aq. destill.* 125,0  
*M. D. S.* Zum Klystier. (Gegen  
 schmerzhaftre Erectionen bei Tripper.  
 Ricord.)

6)  $\mathcal{R}$   
*Camphorae tritae* 0,5  
*Olei Terebinthinae* 20,0  
*M. D. S.* Zur Einreibung. (Bei Per-  
 nionen.)

**Radix Serpentariae**; Virginische Schlangenzurzel, *Serpentaria*. — Ein nach Art des Camphers benutztes Excitans ist die früher officinelle Schlangenzurzel, der mit zahlreichen dünnen Wurzelsfasern besetzte, federkielartige Wurzelstock einer in den Vereinigten Staaten von Pennsylvania bis Carolina wachsenden *Aristolochie*, *Aristolochia Serpentaria* L., und einiger verwandter Species, z. B. *A. reticulata* Nutt. Die Droge ist häufig mit andern ähnlichen Wurzeln vermischt, z. B. mit den Wurzeln des amerikanischen Ginseng, *Panax quinquefolius* L., und dem Rhizom von *Asarum Virginicum* L. Sie besitzt einen an Baldrian erinnernden Geruch und scharf gewürzhaften, campherartigen, bitteren Geschmack. Ersterer rührt von einem gelben ätherischen Oele, von dem die Wurzel nur  $\frac{1}{2}$  % zu enthalten scheint, her. Die *Serpentaria*, welche zuerst in ihrem Vaterlande von den Indianern gegen Schlangenbiss gebraucht wurde, ist bei uns seit ihrer Einführung durch Jac. Cornutus in den Ruf eines Reizmittels bei Typhus (Sydenham, Cullen) gelangt, das man namentlich bei stockendem Auswurf für indicirt hielt. Gegenwärtig ist sie fast ganz ausser Gebrauch. Nach Joerg erregt sie beim Gesunden in etwas grösseren Dosen Uebelkeit und Brechneigung, Wärme im Magen, bisweilen Erbrechen, Pulsbeschleunigung, Hitze im Kopfe und Eingenommenheit, später Flatulenz und Kolikschmerzen mit Stuhl drang, auch Verringerung des Appetits. Man gab das Mittel früher auch im Froststadium des Wechselfiebers. Die Darreichung geschah meist im Infus (1:10—20) oder im Macerat mit Wein, selten in Pulver (zu 0,5—1,5 pro dosi).

**Radix Valerianae**, **Rhizoma Valerianae**, **Radix Valerianae minoris**  
 vel **montanae**; Baldrianwurzel, Katzenwurzel.

Die Droge stellt das Wurzelsystem von *Valeriana officinalis* L., einer durch das ganze mittlere und nördliche Europa verbreiteten, in Amerika (Vermont) cultivirten *Valerianee*, dar.

*Valeriana officinalis* zeigt nach dem Standorte in ihren Formen bedeutende Abweichungen, welche die Botaniker zur Aufstellung verschiedener Species veranlasst haben. Die als *Valeriana officinalis*  $\beta$  minor s. *Valeriana angustifolia* Tausch bezeichnete Varietät liefert hauptsächlich die officinelle Wurzel. Die von Varietäten, welche an trocknen Stellen wachsen, gesammelte Wurzel wird als kräftiger vorgezogen. Sie besteht aus dem etwas knolligen, 2 Cm. dicken und fast doppelt so langen, nach unten abgestorbenen Rhizom, das nach unten ganz von fingerlangen, höchstens 2 Mm. dicken, biegsamen, längsstreifigen, grauen oder graugelblichen Wurzelsfasern umhüllt ist. Der Querschnitt erscheint gewöhnlich hornartig glänzend, heller oder dunkler, und zeigt den dünneren Holzcylinder von der bis 4mal breiteren weissen Rinde umschlossen. Die starke Mittlerinde besteht aus zahlreichen rundlichen Zellen, welche Stärkemehl und

Oel enthalten. Die Baldrianwurzel besitzt eigenthümlichen, campherartigen, nicht besonders angenehmen Geruch, welcher sich erst beim Trocknen stärker entwickelt, und einen süsslich-bitteren, scharf gewürzhaften Geschmack.

Statt der bei uns officinellen Baldrianwurzel war im Alterthume die als *Nardus Gallica* sehr geschätzte Wurzel von *Valeriana Phu L.* oder *Val. Dioscoridis Sibth.* gebräuchlich, welche als *Radix Valerianae majoris* noch jetzt hie und da in Südeuropa Anwendung findet. Die Wurzel der bei uns einheimischen *Valeriana dioica L.* war früher als *Radix Valerianae palustris s. Phu minoris officinell*, die von *Val. Tripteris L.* als *Rad. Val. alpinæ*. Auch verschiedene aussereuropäische *Valerianasppecies*, z. B. *V. Sitchensis*, *V. Wallichii*, riechen wie Baldrian und werden wie dieser benutzt, während andere Arten derselben Gattung, z. B. *V. Celtica L.*, wohlriechendere, mit dem Namen Narde bezeichnete Producte liefern. Die sog. *Rad. Valerianae Graecae* (in Russland bei Lyssa und Syphilis benutzt), gehört nicht zum Baldrian, sondern stammt von *Polemonium coeruleum L.*

Der Träger des Geruches und der medicinischen Eigenschaften der Baldrianwurzel ist das früher officinelle Baldrianöl, *Oleum Valerianae*, und die Baldriansäure, *Acidum valerianicum*.

Nach Bruylants besteht Baldrianöl aus einem Camphen (Valeren), einem sauerstoffhaltigen Oele von der Formel  $C^{10}H^{18}O$ , mit welchem Chromsäure gewöhnlichen Campher und Ameisen-, Essig- und Baldriansäure liefert, und einer krystallinischen Verbindung mit gleicher Zusammensetzung, wahrscheinlich Borneol. Die eben genannten Säuren kommen constant in alten Baldrianwurzeln vor. Die Baldriansäure der *Radix Valerianae* ist Isovaleriansäure (Isopropylessigsäure) und findet sich ausser in *Valeriana* noch in einer Reihe anderer Pflanzen, z. B. in den reifen Beeren und der Rinde des Schneeballs, in der Engelwurzel und den Römischen Kamillen, auch im Delphinöl und in geringerer Menge im gewöhnlichen Fischthran.

Das Baldrianöl, welches am reichlichsten (bis zu 2 %) in den Nebenwurzeln auf steinigem, trockenem und sonnigem Boden gewachsener Baldrianpflanzen im Herbst (Zeller) vorhanden ist, ist gelbbraun, frisch zuweilen grünlich, dünnflüssig (im älteren Zustande dicklich und dunkelbraun), riecht stark nach Baldrian, schmeckt gewürzhaft brennend, reagirt stark sauer und löst sich in Spiritus in jedem Verhältniss.

Genaue physiologische Versuche über die einzelnen Bestandtheile des Baldrianöls liegen bis jetzt nicht vor. Nach Binz und Grisar setzt Baldrianöl in toxischen Dosen die Reflexerregbarkeit nach kurzer Steigerung bei Fröschen und Warmblütern unabhängig von den reflexhemmenden Centren im Gehirn und auch bei künstlicher Steigerung derselben durch Strychnin, Brucin und Ammoniak herab; die Wirkung ist stärker als beim Kamillenöl, schwächer als beim Campher. Grosse Dosen Baldrianöl setzen den Blutdruck rasch herab und vermindern bei Fröschen die Herzschlagzahl (E. Bock). Baldriansäure, welche Eiweiss, Blutserum und Milch, nicht aber Leim und Chondrin coagulirt, erzeugt auf der äusseren Haut nach einer Stunde einen weissen Fleck und Hautjucken, worauf in  $\frac{3}{4}$  Stunden vorübergehende Röthung folgt, auf der Zunge einen weissen Fleck mit nachfolgender Epithelabstossung; sie wirkt zu 8,0 intern auf Kaninchen in 3–4 Stdn. letal, wobei als Intoxicationssymptome vermehrter, aber an Energie verringerter Herzschlag, anfangs beschleunigtes, später verlangsamtes und mühsames Athmen, stetig zunehmende Schwäche und Parese der Extremitäten, mitunter Krämpfe vor dem Tode auftreten und wonach bei längerer Dauer der Vergiftung im Tractus Echylosen und Exsudate unter der Schleimhaut bei rother oder rothbrauner Färbung derselben, bisweilen auch Nierenhyperämie und blutiger Harn vorkommen (Reissner). Die excitirende und krampfwidrige Wirkung des Baldrians kann somit nicht wohl auf die Baldriansäure zurückgeführt werden, welche als solche in ihrer Wirkung der Essigsäure und andern fetten Säuren der Alkoholreihe nahe steht und wahrscheinlich auch nach Art dieser Säuren im Blute zu Kohlensäure verbrennt, da sich ihr Geruch bei Vergiftungsversuchen nicht im Urin und im Blute (wohl aber in der Bauchhöhle) nachweisen lässt (Reissner). Als Natriumsalz setzt die Säure zwar in geringer

Weise bei Fröschen, aber selbst nicht in sehr grossen Dosen bei Warmblütern die Reflexerregbarkeit herab; bei letzteren verändert sich auch der Blutdruck nicht (E. Bock).

Valeriana gehört zu den mildern Excitantia und kann in erheblichen Mengen monatelang ohne Beeinträchtigung des Befindens genommen werden.

Dies verbürgen vor Allem die Beobachtungen von Herpin, welcher bei Epileptikern täglich 250,0—300,0, zusammen oft über  $\frac{1}{2}$  Ctr. Baldrianwurzel verabreichte. Indessen sieht man nach grösseren Gaben (5,0—10,0) manchmal Kopfschmerzen, Uebelkeit, Schwindel, Ohrenklingen, bisweilen Kriebeln in Händen und Füssen und Ziehen längs der Wirbelsäule auftreten, welche Erscheinungen sich in der Regel rasch verlieren (Jörg, Trousseau und Pidoux). Auch die gewöhnlichen medicinalen Dosen wirken bisweilen bei plethorischen Individuen und namentlich bei bestehender Tendenz zu Kopfcongestionem leicht erhitzend (weniger jedoch bei Anwendung in Substanz oder in Maceration, als beim Gebrauche von Baldriantinctur oder heissen Aufgüssen). Die eigenthümlichen grotesken Tänze, zu welchen der Geruch des Baldrians Katzen veranlasst, sind bekannt; dieselben werden aber auch durch andere stark riechende Pflanzen, z. B. *Nepeta cataria* L., hervorgerufen.

Der Baldrian ist eins unserer vorzüglichsten Mittel bei Hysterie und scheint auch in manchen Fällen von Epilepsie und andern Neurosen (Chorea, Spasmus glottidis, Hemikranie) von günstigem Erfolge zu sein.

Dass Hysterie durch Baldrianpräparate selbst bei prolongirtem Gebrauche völlig geheilt werde, ist bis jetzt nicht erwiesen; dagegen ist das Mittel von vorzüglicher Wirkung bei hysterischen Krampfanfällen, welche Muskeln dabei auch betroffen sein mögen, indem man bei Anwendung von Valerianapräparaten beim Auftreten prämonitorischer Symptome den Anfall manchmal geradezu coupiren, in andern Fällen der Dauer und der Intensität nach abschwächen kann. Viel weniger günstig wirkt Valeriana bei hysterischen Störungen in der sensibeln Sphäre (Neuralgien, Hemikranie); die geringsten Erfolge bietet es bei Paralyse. Manchmal soll unter consequentem Gebrauche von Baldrian ein bestimmter Symptomencomplex der Hysterie dauernd schwinden, freilich um einem andern Platz zu machen. Besonders günstig zeigt sich Baldrian bei Anfällen, welche durch vorausgehende Anstrengung und Erschöpfung hervorgerufen sind, wie überhaupt bei schwächlichen und heruntergekommenen Hysterischen, während bei plethorischen und robusten Patientinnen das Mittel oft fehlschlägt. Bei Epilepsie, wo Valeriana auf die Empfehlung des neapolitanischen Botanikers Fabius Columna, der sich selbst und verschiedene seiner Freunde damit von der Krankheit befreit haben will, gegen Ende des 16. Jahrhunderts Eingang fand, kennen wir jetzt im Atropin und Bromkalium weit wirksamere Mittel, wie überhaupt der dem Baldrian in dieser Beziehung geschenkte Credit durch Herpins Versuche sehr problematisch geworden ist.

Auch als Excitans sowohl im Collapsus bei acuten fieberhaften Zuständen (Typhus, Pneumonie, Pleuritis) oder in der Reconvalescenz nach denselben, als bei Erschöpfungszuständen überhaupt lässt sich Baldrian mit Nutzen anwenden.

Bei plötzlichem Collapsus in fieberhaften Affectionen steht Baldrian dem Moschus und Campher nach, dagegen passt das Mittel vorzüglich, und hier besonders in Verbindung mit Chinapräparaten, bei prothahirten Fiebern. Hochgradiges Fieber und Tendenz zu Hirnhyperämie contraindiciren den Baldrian. — Andere krankhafte Affectionen, gegen welche Valeriana Anwendung fand, sind Polydipsie und Diabetes insipidus (Rayer, Trousseau), Dysmenorrhoe (hier besonders im Aufguss als Klystier), Helminthen (nach Baldriangebrauch gehen nicht selten Spulwürmer ab). Auch ist das Pulver als Niesmittel benutzt.



Man giebt die Baldrianwurzel zu 0,5—5,0 innerlich mehrmals täglich, bei Epilepsie in allmählig steigenden Gaben von 4,0—12,0, in Pulvern oder Latwerge, Pillen und Bissen, meist jedoch im Aufguss (zu 5,0—10,0 pro die) oder im Macerat. Meist verordnet man Theespecies mit andern Nervina, namentlich mit *Folia Aurantii*, wobei man  $\frac{1}{2}$ —1 Esslöffel auf 1—2 Tassen Thee rechnet.

Das ätherische Baldrianöl, welches bei hysterischen Leiden (Heyfelder), Chorea (Schneider) und Helminthiasis (Wendt) Empfehlung fand, kann zu 1—4 Tr., bei Epilepsie selbst bis zu 20 Tr., in Oelzucker, Pillen und spirituösen Lösungen verordnet werden.

Die Baldriansäure, von Bellini bei Strychninvergiftung empfohlen, kommt kaum je für sich in Anwendung und dient nur zur Bereitung baldriansaurer Metallsalze, deren Wirkung schwerlich durch die Säure bedingt oder verstärkt wird.

### Präparate:

1) **Tinctura Valerianae**, *Tinctura Valerianae simplex*; **Baldrian-tinctur**. Mit 5 Th. Spir. dil. bereitet, röthlichbraun; innerlich zu 20—60 Tr. mehrmals täglich für sich oder in Verbindung mit anderen krampfstillenden Tincturen.

2) **Tinctura Valerianae aetherea**, *Tinct. Val. anodyna*, *Tinctura antispasmodica* Lentini; **ätherische Baldriantinctur**. Mit 5 Th. Spiritus aethereus be-reitet, gelb, später bräunlich. Wie die vorige benutzt.

Früher benutzte man auch ein wässrigspirituöses Extract der Baldrian-wurzel, *Extractum Valerianae*, zu 1,0—2,0 mehrmals täglich in Lösung oder Pillen als Antihystericum, wobei manche ein kalt bereitetes Präparat, *Extractum Valerianae frigide paratum*, als weniger eritzend dem Digestionsextrakte vorziehen. Ein stark riechendes und sauer reagirendes Wasser, *Aqua Valerianae*, diente als Zusatz oder Vehikel krampfstillender Mixturen. Flüssige spirituöse Auszüge von Baldrian oder von *Serpentaria*, Campher und Baldrian mit *Liquor Ammonii vinosus aromaticus* bildeten die früher namentlich als schweisstreibendes Analepticum bei Rheumatismus, Darmkatarrhen und Cholera benutzten, als *Tinct. Valer. ammoniata s. volatilis* und *Tinct. Val. composita* bezeichnete Tincturen.

Baldrian ist Hauptbestandtheil verschiedener Geheimmittel gegen Epilepsie, z. B. des Ragoloschen Mittels, das ursprünglich aus Rad. Valer. 240 Th., Fol. Aurantii 20 Th., Ammon. chlor. 2 Th., Magn. carb. 1 Th. und Ol. Cajeputi 4 Th. bestand. Auch in den Kaempfschen Visceralklystieren ist Valeriana nicht ohne Bedeutung.

### Verordnungen:

1)  $\mathcal{R}$   
*Rad. Valerianae*  
*Fol. Aurantii*  
*Fol. Ment. pip.*  $\overline{\text{aa}}$  25,0  
*C. c. f. spec.* D. S. Einen Esslöffel zu  
 3 Tassen Thee. (Kalt zu trinken.)

2)  $\mathcal{R}$   
*Cort. Chinae* 20,0  
*Rad. Valerianae* 10,0  
*Affunde*  
*Aq. fervidae q. s. ad col.* 125,0  
*Residuum coque c.*  
*Aq. q. s. ad colat.* 75,0  
*Colaturis mixtis adde*  
*Spir. Aether. acetici* 5,0  
*Syrupi Cinnamomi* 25,0

*M. D. S.* Zweistündlich 1 Esslöffel voll. (In protrahirten fieberhaften Affectionen.)

3)  $\mathcal{R}$   
*Cort. Chinae*  
*Rad. Valerianae*  $\overline{\text{aa}}$  10,0  
*Cort. Cinnamomi* 2,5  
 — *Citri* 1,0

*C. c. m. f. spec.* D. S. Mit 1 Flasche Rothwein 24 Stdn. stehen zu lassen. Morgens und Abends ein halbes Weinglas voll. (In der Recon-  
 valescenz u. s. w.)

4) R  
*Tincturae Valerianae*  
 — *Castorei* aa 5,0  
*Spiritus aetherei* 1,0

M. D. S. 3mal täglich 15—20 Tropfen  
 auf Zucker oder in Kamillenthee.  
 (Bei Hysterie).

*Herba Chenopodii ambrosioidis*, Mexikanisches Traubenkraut. — Wie Baldrian wurde auch früher vielfach das gewöhnlich als Jesuitentheee oder *Herba Botrys Mexicanae* bezeichnete blühende Kraut von *Ambrina ambrosioides* Spach s. *Chenopodium ambrosioides* L., einer ursprünglich im tropischen Amerika einheimischen, von dort im Anfange des 17. Jahrhunderts (angeblich durch die Jesuiten) in Europa eingeführten *Chenopodiacee*, welche jetzt im südlichen Europa, stellenweise auch in Süddeutschland, verwildert ist, benutzt. Die Pflanze schmeckt scharf und bitter und hat einen eigenthümlichen campherähnlichen Geruch, der auch beim Trocknen nicht verschwindet. Es ist darin ein ätherisches Oel, dessen Geruch an Pfefferminze erinnert, zu  $\frac{1}{8}$ —1% gefunden; ausserdem scheint das Kraut viel Salze zu enthalten. Aehnlichen Geruch besitzen verwandte südeuropäische und nordafrikanische Arten, z. B. *Chenopodium Botrys* L., deren Aroma sich beim Trocknen leichter verliert, und *Chenopodium Schraderianum* Röm. und Schulte, deren Geruch noch intensiver ist. Sehr widrigen Geruch zeigt dagegen in Folge von Ausscheidung von Trimethylamin das ebenfalls früher officinelle *Chenopodium Vulvaria* L.

Der sog. Jesuitentheee wurde als Nervinum besonders bei Chorea, Hysterie und Brustkrämpfen gebraucht und im Anfange dieses Jahrhunderts besonders durch Plenck empfohlen. Kissel rath ihn gegen Zungenlähmung an. Auch kann die Droge ausserlich zu aromatischen Umschlägen dienen. Die einzig gebräuchliche Form ist die der Species ad infusum. Zum Aufguss rechnet man 1 Th. auf 10—15 Th. Colatur.

*Radix Artemisiae*, Beifusswurzel. — Die früher als Antiepilepticum von Burdach, Hufeland, Caspari, Nothnagel u. A. empfohlene Droge besteht aus den Nebenwurzeln der fast durch ganz Europa verbreiteten *Composite Artemisia vulgaris* L., von welchen zu medicinischem Gebrauche nur die mit Harzgängen durchsetzte Rinde dient. Man giebt die Wurzelrinde in Pulver zu 2,0—4,0 oder in Abkochung.

#### Flores Arnicae; Arnicablüthen, Wohlverleiblüthen.

Der auf den Gebirgen Süd- und Mitteleuropas, im nördlichen Europa in der Ebene wachsende, auch in Labrador einheimische Bergwolverlei (nicht Wohlverleih, da die mittelalterliche Bezeichnung wolfsgele, Wolfsgelb, ist), *Arnica montana* L. (Fam. *Synanthereae*), liefert uns in seinen Blüthen und in seiner nicht mehr officinellen Wurzel zwei aus der deutschen Volksmedizin stammende, im vorigen Jahrhundert von vielen Aerzten (Fehr, Collin, Stoerck) hochgepriesene, jetzt aber fast völlig in Vergessenheit gerathene Medicamente.

Die schön gelben, im Spätsommer sich entwickelnden Blüthenköpfchen von *Arnica montana* sind von einem Hüllkelch (*Peranthodium*) aus 20—24 lanzettlichen, in zwei Reihen gestellten Blättchen umgeben, von denen die äussersten braunroth, mit kurzen, drüsentragenden, und längeren, drüsenfreien Haaren versehen sind. Auf dem etwas gewölbten, grubigen, spreuhaarigen Blüthenboden sitzen etwa 20, über die Hülle hinausragende, etwa 4 Mm. breite, zungenförmige, an der Spitze 3 zahnige, weibliche Strahlenblüthen und zahlreiche röhrenförmige, 5 zahnige, hermaphroditische Scheibenblüthen. Trocken erregen die Blüthen beim Reiben Niesen. Man sammelt sie bei vollständiger Entwicklung mit der Hülle, welche jedoch nicht mit dispensirt wird. Vor Verwechslung mit anderen gelben *Synanthereen*blüthen schützt die Beachtung der botanischen Charaktere, des Geruchs und die Haltbarkeit der Farbe beim Trocknen. Die Blüthen sind häufig von Fliegenlarven (*Trypeta arnicivora* s. *Atherix maculata* Meigen) angefressen, denen man früher sogar drastische Eigenschaften zuschrieb.

Die *Radix Arnicae*, neben welcher auch früher noch die Arnicablätter officinell gebräuchlich waren, besteht aus dem Rhizom und den nach einer Seite

gerichteten Nebenwurzeln, welche beide in der Mittelrinde viele Balsamgänge enthalten und sich durch schwach aromatischen Geruch und scharf gewürzhaften und etwas bitterlichen, anhaltenden Geschmack charakterisiren.

Ueber die wirksamen Bestandtheile der Arnica sind wir noch nicht vollständig aufgeklärt. Die Blumen liefern im trockenen Zustande 0,1—0,9 % ätherisches Oel, welches von dem in der Wurzel enthaltenen ätherischen Oele, das sich darin zu 1 % finden soll, verschieden zu sein scheint. Nach Sigel besteht dasselbe hauptsächlich aus Thymohydrochinon-Dimethyläther. Ausserdem ist ein scharfes Harz, krystallisirendes Fett und Wachs, sowie Gerbsäure vorhanden. Ein als Arnicin bezeichneter Bitterstoff, welchen Walz in Form einer goldgelben, amorphen, wenig in Wasser, gut in Spiritus und Aether löslichen Masse erhielt, ist in physiologischer Beziehung ebenso wenig geprüft wie das Arnicaöl und Harz. Nach Chevallier und Lassaigue soll der in den Blüthen enthaltene Bitterstoff Erbrechen erregen. Die Angaben über ein in der Arnica enthaltenes Alkaloid, Basticks Arnicin (nach Thompson sollte sogar Strychnin darin sich finden), sind als beseitigt anzusehen.

Wirklich exacte Beobachtungen über Arnicawirkung fehlen. Auf die äussere Haut applicirt können Arnicablüthen oder die daraus bereitete Tinctur, wenn dieselbe unverdünnt angewendet wird, Brennen, Röthung und ein acutes Ekzem bedingen (White). Im Klysma eingeführt, bewirkt Arnicatinctur bei Hunden Tenesmus, abwechselnde Contraction und Erschlaffung der Muskeln und des Hintertheils (Guillemot). Einspritzung von Aufgüssen in die Vene bei Pferden und Hunden führt zu erheblicher und mitunter tödtlicher Narkose (Viborg, Hertwig). Bei Menschen beschleunigen kleine Dosen die Pulsfrequenz, bedingen Brennen im Munde, Aufstossen, Wärmegefühl im Magen, Leibschmerzen und vermehrte Stuhlentleerungen, bisweilen auch Eingenommensein des Kopfes, Schwindel und unruhigen Schlaf (Jörg). In grösseren Dosen im Aufguss angewendet, ist Arnica im Stande, Vergiftungserscheinungen zu bedingen, welche auf ein Ergriffensein des Tractus und des Gehirns hindeuten. Auch nach Arnicatinctur sind ähnliche Erscheinungen beobachtet, die nicht, wie Winkler will, auf die feinen Härchen der Blumenkrone, welche zufällig auf ein Infus gerathen könnten, zu beziehen sind. Barbier will nach Aufgüssen von 30,0, Jörg schon nach 2,0 Flores Arnicae Magen- und Darmreizung, Schwindel, Angst, Kopfschmerz, Zittern, Ohnmacht, Betäubung und selbst Krämpfe beobachtet haben, und in einem von Bertin berichteten Fall von Intoxication durch 30,0 Arnicatinctur, wo die Symptome erst nach 8 Stunden sich einstellten, wurde auch Mydriasis und Irregularität des Herzschlags bei schwachem und frequentem Pulse wahrgenommen.

Diese verhältnissmässig wenig zahlreichen Beobachtungen lassen Arnica als nach Art scharfer Mittel aus der Classe der Aethereo-oleosa wirkend erscheinen, ergeben aber in keiner Weise Anhaltspunkte für eine Verwendung in denjenigen Krankheiten, wo der blinde Glaube des Volkes oder Voreingenommenheit der Aerzte Erfolg davon erwartete. Sie wird bei nervösen Affectionen, bei Epilepsie, Gehirnerschütterung, Amaurose, Tremor, Geisteskrankheiten, bei Collapsus im Typhus, ausserdem auch bei Malariakrankheiten und Ruhr (hier besonders die Wurzel, welche man für stopfend erklärte) gegeben. Besonders rühmte man sie als ein Medicament, welches die Aufsaugung von Blutergüssen befördere, und wandte sie deshalb bei Apoplexie einerseits und andererseits äusserlich bei allen durch Fall entstandenen und mit Blutaustritt verbundenen Leiden (daher die alte Benennung Fallkraut) an. Die letztere Gebrauchsweise ist auch jetzt noch in verschiedenen deutschen und französischen Heilanstalten gebräuchlich, wobei man sich der unten zu erwähnenden Arnicatinctur bedient; inwieweit die Erfolge dabei von einem Arnicabestandtheile abhängen, steht dahin. Krahmer empfiehlt sie bei idiopathischem Schwindel. Auch als Antihydricum und Emmenagogum sind die Flores Arnicae benutzt, vorzüglich vom Volke und älteren Aerzten, welche in verba magistri schworen. Planat (1878) bezeichnet Arnica (örtlich in Form einer aus 1 Th. aus frischen Blüthen bereiteten Extracts und 2 Th. Honig dargestellten Salbe oder von Umschlägen aus aa Arnicatinctur und Wasser, bei gleichzeitigem internen Gebrauche von 35—50 Tr. Arnicatinctur pro die) als vorzügliches Abortivmittel für Furunkel.



Man giebt die Flores Arnicae innerlich meist im Aufguss (1:10—20) und verordnet sie in Form von Species, wobei man 10,0—15,0 tagsüber nehmen lässt. Minder gewöhnlich ist zum inneren Gebrauch die Pulverform (0,1—0,2 pro dosi). Aeusserlich benutzt man ebenfalls Aufgüsse (in doppelter Stärke) oder Species zu Fomenten oder Kräuterkissen, Die Blumen dienten früher auch als Niespulver.

Officinell ist ein aus den Arnicaablüthen mit 10 Th. Spir. dil. bereiteter Auszug, *Tinctura Arnicae*, *Arnica-tinctur*, ein sehr beliebtes Mittel bei äusseren Verletzungen (Wunden, Contusionen), welches man rein zu Einträufelungen in Wunden und zu Einreibungen (auch bei traumatischen Lähmungen, Neuralgien), häufiger noch zu Umschlägen (mit Wasser, Bleiwasser oder Kornbranntwein) verwendet. Viele ziehen eine aus dem frischen Saft der ganzen Pflanze bereitete Tinctur, *Tinctura Arnicae e succo recente s. plantae totius*, vor.

**Flores Chamomillae**, *Flores Chamomillae vulgaris*; **Kamille**, Gemeine Kamille, Chamille, Deutsche Kamille.

Die zu den ältesten und besonders in der Volksmedizin gebräuchlichen Arzneimitteln gehörigen Kamillen stammen von *Matricaria Chamomilla* L., einer in ganz Europa verbreiteten und auch in Australien eingebürgerten Synantheree aus der Abtheilung der Senecioideae.

Die Kamillen bilden die getrockneten Blütenkörbe, welche sich im Juni entwickeln und einzeln auf hohlen, langen Blütenstielen am Ende der Stengel oder ihrer Aestchen stehen und von einem ziegeldachartigen, schüsselförmigen, aus ziemlich zahlreichen, glatten, grünen, am Rande weisslichen, länglichen Blättern bestehenden Hüllkelche umgeben sind. Sie enthalten unten röhrenförmige, sonst zungenförmige, weisse, anfangs flach ausgebreitete, später senkrecht zurückgeschlagene, drüsentragende Strahlenblüthen (12—18) ohne Staubgefässe und mit einem zweischenkligen Griffel, sowie zahlreiche, hermaphroditische Scheibenblüthen mit gelben, trichterförmigen, fünfspaltigen Blumenkronen, welche aussen mit gestielten Oeldrüsen versehen sind. Charakteristisch für die Kamillen ist der sich zu einem 5 Mm. hohen, vom Grunde 1,5 Mm. im Durchmesser erreichenden Kegel entwickelnde glatte, grubige Blütenboden und der eigenthümlich starke Geruch, welche beide aber auch andern *Matricaria*-Arten, z. B. den in Russland statt der Kamillen benutzten Species *M. suaveolens* L., *M. coronata* und *M. Lithuanica* B. zukommen. Der Geschmack der Kamillen ist bei uns bitterlich, während er in Griechenland äusserst angenehm aromatisch sein soll (Heldreich). Wegen der Flüchtigkeit des Oeles sind alte Kamillen, ebenso von Insekten zerfressene und in ihre einzelnen Blüthen zerfallene unzulässig. Die Einsammlung muss bei trockenem Wetter gleich nach Entwicklung der Blüthen geschehen. Verwechslung mit den Anthonien verschiedener Species, *Pyrethrum*, *Tripleurospermum* und *Anthemis* (*A. Cotula* und *arvensis*), von denen die letzteren sich durch höchst fötiden Geruch auszeichnen, lassen sich durch die Beschaffenheit des Fruchtbodens, welcher bei diesen Pflanzen mit Mark ausgefüllt und bei *Anthemis* gleichzeitig mit Spreublättchen besetzt ist, unterscheiden.

In Frankreich und England werden unsere Kamillen durch die früher auch in Deutschland officinellen Römischen Kamillen, *Flores Chamomillae Romanae* s. *Flores Anthemidis*, die ganz oder doch zum grössten Theile gefüllten Blüthen von *Anthemis nobilis* L., ersetzt. Diese nur von cultivirten Pflanzen stammende Droge schmeckt stark aromatisch bitter und hat einen gewürzhaften, von dem der Deutschen Kamillen verschiedenen Geruch; der Blütenboden ist ohne Spreuschuppen, flach, nicht kegelförmig.

Geruch und Wirkung der Kamillen müssen auf das in ihnen enthaltene ätherische Oel zurückgeführt werden, welches sich durch seine tiefblaue Farbe auszeichnet.

Dasselbe findet sich in frisch getrockneten Kamillen zu 0,416 % (Steer), in 4jährigen nur zu 0,04%, nach Zeller in frischer Waare höchstens zu 0,36%, und ist fast undurchsichtig, dickflüssig, bei kalter Witterung von butterähnlicher Consistenz, hat ein spec. Gew. von 0,92—0,94, riecht stark nach Kamillen, schmeckt gewürzhaft erwärmend und löst sich in 8—10 Th. Spiritus. Es ist ein Gemenge von zwei sauerstoffhaltigen Oelen, von denen das unter 200° den Kamillengeruch zeigt, und dem als Coerulein oder Azulen bezeichneten blauen Bestandtheile, welcher nach Piesse die Formel  $C^{16}H^{21}.H^2O$  hat und durch Behandlung mit Alkalien grün gefärbt wird. Auch enthält das Kamillenöl Spuren von Baldriansäure. Physiologisch sind weder das Kamillenöl noch dessen einzelne Bestandtheile geprüft. Nach Hahnemann sollen 5 Tr. bei einer gesunden Gravida Unbesinnlichkeit, vorübergehende Zuckungen, wehenartige Schmerzen und Druck in der Nabelgegend hervorgerufen haben. — Das ätherische Oel von Anthemis nobilis, welches in den Blumen zu 0,6—0,8% enthalten ist, unterscheidet sich vom Kamillenöl wesentlich. Es bildet ein Gemenge von Kohlenwasserstoffen, zusammengesetzten Aethern, insbesondere Angelicasäure-Isobutyläther, Tiglinsäure-Isamyläther und Angelicasäure-Isamyläther, ferner Hexylalkohol und einem Alkohol von der Formel  $C^{10}H^{16}O$ . Auch dieses Oel ist physiologisch nicht untersucht. Der in den Kamillen enthaltene Bitterstoff ist bisher nicht isolirt. In den Römischen Kamillen soll er eine Säure sein (Camboulizes).

Die Kamillen bilden eins der beliebtesten Hausmittel bei einer grossen Anzahl krampfhafter Beschwerden, namentlich Cardialgie und Kolik, und stehen auch als Diaphoreticum bei Rheumatismus, Erkältungskrankheiten, Bronchialkatarrh, acuten Diarrhöen u. s. w. in Ansehen. Ihre hauptsächlichste Verwendung finden sie indessen äusserlich als gelind reizendes Mittel in den verschiedensten Formen zur Application auf Haut, Schleimhäute und Wunden.

Ein Nutzen bei Cardialgie und Kolik, vielleicht theilweise von Beschleunigung der Peristaltik abhängig, lässt sich in vielen Fällen nicht verkennen. Bei Kindern, besonders Säuglingen, ist Kamillenthee ein fast unentbehrliches Medicament gegen Leibschmerzen. Die demselben zugeschriebenen übeln Folgen auf die Darmschleimhaut (nach Winter soll übertriebener Gebrauch Ursache von Magenerweichung sein) beruhen auf Irrthum, ebensowenig wie die Angabe von Schönlain, dass längerer Gebrauch von Kamillenthee Rheumatalgien und namentlich Cephalalgie bedinge, als richtig gelten kann. Manche empfindliche Kranke bekommen nach grösseren Dosen des Thees Uebelkeit und selbst Erbrechen. Bei der diaphoretischen Wirkung ist wohl die Einfuhr grösserer Mengen heisser Flüssigkeit die Hauptsache. Ebenso sind bei der sehr gewöhnlichen Verwendung desselben zur Unterstützung der Action von Brechweinstein und Ipecacuanha-Oel und Bitterstoff unbetheiligt und nur die mechanische Ausdehnung des Magens durch die eingeführte Flüssigkeitsmenge Ursache der Emese. Bei schwereren Nervenleiden (Epilepsie, Asthma, Chorea) steht die Kamille andern Neurotica analeptica entschieden nach. In älteren Zeiten wollte man durch Kamillenthee sogar Wechselfieber heilen, welche dem Chinin widerstanden, und wenn dies auch dubiös ist, wird doch die antitypische Wirksamkeit noch durch Schultze-Bipontinus bestätigt. Lecoq empfahl Kamillen zu 4,0 pro die bei Gesichtsschmerz. — Als externes Mittel kommen die Kamillen oder ein daraus bereiteter Aufguss in allen Fällen zur Anwendung, wo die S. 538—542 besprochenen Erethistica aus der Familie der Labiata in Gebrauch gezogen werden. Ueberall, wo Erschlaffungs Zustände der kranken Theile (bei torpiden Geschwüren, Anginen, Bindehautentzündung u. s. w.) vorliegen, sind Fomentationen, Gurgelwässer oder andere Formen aus Kamillenblüthen am Platze. Selbst bei brandigen Affectionen und bei den schwersten Eiterungen, z. B. nach Rothlauf (Ozanam), sind sie von entschiedener Wirksamkeit. Bei rheumatischen Affectionen und Entzündungen können Kräuterkissen aus Kamillen gleichzeitig protectiv und derivativ wirken. Sehr beliebt ist Kamillenthee als Vehikel bei Klystieren. Als längere Zeit zu applicirender Verband wirkt Kamillenthee weniger

stark macerirend als reines warmes Wasser und ist deshalb diesem bei Neigung zu Excoriationen entschieden vorzuziehen.

Innerlich verordnet man Kamillen zu 1,0—5,0 mehrmals täglich meist in Speciesform. Zur Bereitung von Kamillentheee rechnet man dabei einen Esslöffel voll auf 3 Tassen.

Von den früher gebräuchlichen zahlreichen Präparaten der Kamillen, von denen jetzt keines mehr officinell ist, wurde das Kamillenwasser, *Aqua Chamomillae*, besonders als Vehikel krampfstillender Medicamente benutzt. Ein wässrig spirituöses Digestionsextract, das Kamillenextract, *Extractum Chamomillae*, wurde innerlich zu 0,5—2,0 in Pillen oder Mixturen, äusserlich als Zusatz zu Verbandwässern oder Pinselsäften gebraucht. Es soll leicht brechen-erregend wirken. Als Zusatz zu krampfstillenden Mixturen diene der nicht eben wohlschmeckende Kamillensyrup, *Syrupus Chamomillae*. Mit Fliederblüthen und Mehl bildeten die Kamillen früher die sog. *Species discutientes s. resolventes*. Officinell war früher auch ein *Oleum Chamomillae infusum s. coctum*, das fette Kamillenöl, ein gelbgrünes klares Digest mit Olivenöl, welches man äusserlich zu gelind hautreizenden Einreibungen und zu Klystieren (10,0—20,0 mit Eigelb emulgirt) verwendete.

Das ätherische Kamillenöl, *Oleum Chamomillae*, ist medicinisch in der Form des Oelzuckers gegen Asthma und Koliken, Magenkrampf (Schneider), Keuchhusten, Internittens (Voigtel) zu 1—2 Tr. gegeben. Als billigeres Surrogat dienten früher das *Ol. Chamomillae citratum* und *Ol. Cham. terebinthinatum*, erhalten durch Zusatz von 1 Th. *Ol. corticis Citri* resp. 2 Th. *Terpenthinöl* auf 480 Th. Kamillen und Dampfdestillation, in der Farbe dem reinen Kamillenöl gleich.

Die Römischen Kamillen können ganz wie die Deutschen innerlich im Aufguss (1:5—20) und äusserlich in der gleichen Form zu Bähungen oder als *Species pro fomento* gebraucht werden. Früher waren sie ein Hauptbestandtheil mancher besonders bei Kolik gebräuchlicher destillirter Wässer und Geister (*Aqua carminativa*, *Aq. carm. regia* u. a.).

**Folia Menthae piperitae**, *Herba Menthae piperitae*; **Pfefferminze**, Pfefferminze. **Oleum Menthae piperitae**; **Pfefferminzöl**, Pfefferminzöl.

Die Mutterpflanze der Pfefferminze, *Mentha piperita* Huds., kommt wahrscheinlich wild nur in England vor und wird in verschiedenen Ländern im Grossen zur Gewinnung des darin enthaltenen ätherischen Oeles, des Pfefferminzöles, als Arzneipflanze auch bei uns vielfach gebaut.

Die wilde Pflanze hat einen viel schwächeren Geruch und Geschmack als die cultivirte; ebenso hat keine andere Menthaart den anfangs brennenden, später kühlenden Geschmack der Pfefferminze, die ausserdem durch ihre deutlich gestielten Blätter sich von solchen unterscheidet, welche damit verwechselt werden können. Nach Schimmel giebt bestes getrocknetes Pfefferminzkräut 1—1,25% Oel. Das Pfefferminzöl ist frisch farblos, schwach grünlich, dünnflüssig, bräunt und verdickt sich beim Altwerden, siedet etwas unter 190°, hat ein spec. Gew. von 0,90—0,91, einen gewürzhalt brennenden, hinterdrein kühlenden Geschmack, löst sich in absolutem Weingeist in allen Verhältnissen und in 1 bis 3 Theilen 85% Weingeist. Beim Abkühlen auf  $-4^{\circ}$  setzt Pfefferminzöl farblose, sechsseitige Krystalle von Pfefferminzcampher oder Menthol,  $C^{10}H^{19}OH$ , ab. Diese letztere Substanz findet sich namentlich in dem neuerdings im Handel aufgetretenen Chinesischen oder Japanischen Pfefferminzöl, welches bisweilen fast ganz daraus besteht. Die zur Gewinnung desselben in Japan cultivirte Minze ist indess eine besondre Varietät von *Mentha arvensis* (Holmes). Das Menthol, welches bei 208—213° siedet und sich wenig in Wasser, leicht in Alkohol, Aether und ätherischen Oelen löst, wird durch Phosphorsäureanhydrid durch Entziehung von  $OH^2$  in einen angenehm riechenden Kohlenwasserstoff, das Menthen, verwandelt.



Das Pfefferminzöl des Handels ist nicht allein vielfach verfälscht, sondern auch von sehr differenten Güte, je mehr oder weniger Sorgfalt auf dessen Darstellung verwendet ist. Das amerikanische, bei dessen Destillation diverse Unkräuter, namentlich *Erigeron Canadensis*, mit in die Blase kommen sollen, ist von geringerem Werthe als das englische, das besonders bei Mitcham in Surrey gewonnen wird. In Deutschland wird die Pfefferminze bei Kölleda im Grossen cultivirt. Die Stengel scheinen weniger feines Oel als die Blüthen zu liefern; auch ist Arom und Gehalt an Oel bei verschiedenen Varietäten different.

Das Menthol besitzt kräftige antiseptische Wirkungen und hemmt die Entwicklung von Bakterien im Verhältnisse von 1 : 1000 ebenso stark wie Carbonsäure im Verhältnisse von 1 : 500 (Macdonald). Nach Köhler und Marcuson (1878) steigert Pfefferminzöl bei Infusion in Emulsion (1 : 200) anfangs den Blutdruck und erniedrigt ihn später, wirkt in gleicher Weise anfangs beschleunigend und später retardirend auf Herzschlag und Athemfrequenz und tödtet durch gleichzeitige Lähmung des respiratorischen und vasomotorischen Centrums. Auch in grossen Dosen infundirt, beeinträchtigt das Oel bei Warmblüthern die Reflexthätigkeit und das Sensorium nicht, doch tritt nach Inhalation und nach Subcutaninjection entschiedene Herabsetzung der Reflexe ein, selbst bei strychninisirten Thieren. Auf die Körpertemperatur wirkt Pfefferminzöl nur bei Inhalation nach eingetretener Reactionslosigkeit rapide herabsetzend. Das Blut nimmt bei Pfefferminzölvergiftung kirschrothe Farbe an und zeigt starke Verminderung der rothen Blutkörperchen (H. Köhler und Marcuson).

Die Pfefferminze wird im Ganzen wie die Kamillen benutzt, vor denen sie den Vorzug eines angenehmeren Geruches besitzt, doch scheint dem Pfefferminzöl noch eine besondere local anaesthetisirende Wirkung zuzukommen, welche die vorzüglichen Effecte des Mittels bei Cardialgien und Koliken erklären kann. Zwar beseitigt Pfefferminzöl als Carminativum am besten solche Cardialgie und Kolik, welche mit Gasansammlung im Darm verbunden ist, doch wirkt sie auch bei hysterischem Magenkrampf und nicht minder bei Koliken anderer Art, z. B. im Gefolge von einfacher Diarrhoe. Auch zur Stillung von Erbrechen kann Pfefferminze benutzt werden, doch giebt man hier meist dem Pfefferminzöl, welches Récamier sogar als Reizmittel bei Cholera verwendete, den Vorzug. Auch Schmerzen in entfernteren Organen werden dadurch mitunter gelindert (Delioux de Savignac). Am deutlichsten tritt der schmerzlindeffect bei Neuralgien, zumal am Kopfe und Gesichte hervor, wenn man die betreffenden Stellen direct mit Pfefferminzöl in Berührung bringt. Schon die Chinesen benutzten den Pfefferminzcampher äusserlich bei Zahnschmerzen, wogegen auch neuerdings Wright das Pfefferminzöl und Macdonald das Menthol besonders empfahl. Bei tiefer sitzenden Neuralgien nützt Einreibung von Pfefferminzöl nicht, wohl aber bei gichtischen und rheumatischen Schmerzen, gegen welche häufig auch trockene Pfefferminzfomente mit Erfolg angewendet werden. Delioux empfiehlt Pfefferminze zur Herabsetzung der Sensibilität bei Hyperästhesie der Bronchial- und Laryngealschleimhaut, so wie bei Pruritus vaginalis und hält Einreibungen von Pfefferminzöl auch bei Amblyopie für indicirt, da danach constant Schärfung des Gesichts eintrete. Zu erregenden Bädern dient meist nur die Pfefferminze selbst, nicht das Pfefferminzöl, welches nach Topinard zu stark irritiren soll (?). Die älteren Empfehlungen von Pfefferminzpräparaten bei Magenschwäche, Diarrhöen, bei Affectionen der Nieren und Blase (Dale, Ray) haben untergeordnete Bedeutung.

Als schmerzlindeffectives Mittel empfiehlt Delioux innerlich 1 Th. Pfefferminzöl in 9 Th. Aether gelöst anzuwenden und äusserlich bei Neuralgien die betreffenden Stellen mit einem Stücke Watte, das mit Pfefferminzöl getränkt ist, reiben und hierauf mit Watte bedecken zu lassen, bis der Schmerz vorüber ist. Macdonald applicirt Menthol als Antineuralgicum in Form geschmolzener Krystalle oder in 10 Th. Spiritus gelöst.

Zu Pfefferminzthee, den man wie Kamillenthee stets der häuslichen Bereitung überlässt, rechnet man  $\frac{1}{2}$ —1 Esslöffel voll auf die Tasse.

#### Präparate:

1) *Aqua Menthae piperitae*, Aqua Menth. pip. simplex; Pfefferminzwasser. 10 Th. Destillat aus 1 Th. Pfefferminzblättern, etwas trübe. Selten für sich,

esslöffelweise; meist Vehikel oder Zusatz für interne Mixturen und Collutorien und als solches sehr beliebt, da es den Geschmack schlechtschmeckender Stoffe in ausgezeichnete Weise verdeckt, besonders empfehlenswerth als Lösungsmittel für Alkalicarbonate, Alkalien und zu Saturationen. Delieux de Savignac empfiehlt es zu schmerzstillenden Subcutaninjectionen.

Neben dem Pfefferminzwasser war früher auch weingeistiges Pfefferminzwasser, *Aqua Menthae spirituosae s. vinosae*, bei dessen Bereitung Pfefferminz und Weingeist  $\overline{aa}$  1 Th. und 10 Th. Wasser zu 5 Th. abdestillirt wurden. Dasselbe ist von etwas schärferem Geschmacke und bei nicht in Wasser völlig löslichen Medicamenten (Extracten, Alkaloiden) als Vehikel empfehlenswerth.

2) **Syrupus Menthae, Syrupus Menthae piperitae; Pfefferminzsyrop.** 10 Th. Pfefferminzblätter mit 5 Th. Weingeist befeuchtet und mit 50 Th. Wasser einen Tag macerirt, in 40 Th. Colatur 60 Th. Zucker gelöst, filtrirt. Der grünlich braune Syrup dient als Zusatz zu excitirenden und antispasmodischen Mixturen.

3) **Rotulae Menthae piperitae; Pfefferminzkuchen; Pfefferminzplätzchen.** 1 Th. Pfefferminzöl, mit 2 Th. Spiritus verdünnt, auf 200 Th. Rotulae Sacchari vertheilt. Längerer Gebrauch soll zu Magenkatarrh führen können.

4) **Spiritus Menthae piperitae Anglicus; Englische Pfefferminzessenz.** Klare, farblose Lösung von 1 Th. Pfefferminzöl in 9 Th. Spiritus, von starkem Pfefferminzgeschmacke und 0,836—0,840 spec. Gew. Ersetzt die früher gebräuchliche, aus dem Kraute mit Spiritus bereitete *Tinctura Menthae piperitae*, welche für sich als *Analepticum* zu 20—30 Tropfen oder als Zusatz zu Mixturen (1:10—20) gegeben wurde. Mit 100 Th. Aq. dest. geschüttelt, kann das Ppt. zur extemporanen Darstellung von Aq. Menth. pip. dienen.

### **Folia Menthae crispae, Herba Menthae crispae; Krauseminze.**

Verschiedene *Mentha*-Arten nehmen bei der Cultur eine eigenthümliche Beschaffenheit der Blätter an, welche blasig runzlig und am Rande wellenförmig kraus erscheinen und damit eine Veränderung des Geruches darbieten. Die officinelle Krauseminze stellt eine solche Varietät der in Europa und Mittelasien wildwachsenden *Mentha aquatica* L. (die *Mentha aquatica*  $\gamma$ . *crispa* Benth.) dar, neben welcher aber auch eine analoge Spielart von *Mentha sylvestris* L. (*Mentha undulata* Willd., *M. crispa* Geiger) mit ungestielten, dichter und weicher behaarten Blättern, obschon sie einen weniger angenehmen Geruch besitzt, in einzelnen Gegenden cultivirt wird. Auch *Mentha viridis* L., *Mentha sativa* L. und *Mentha rotundifolia* L. scheinen in einzelnen Gegenden noch Krauseminze, zum Theil von feinerem Geruche, zu liefern. Nach Bischoff soll *Mentha sativa*  $\gamma$ . *crispa* (entsprechend *Mentha hortensis* Tausch) die ursprünglich in Deutschland cultivirte Krauseminze sein, während Flückiger die von Valerius Cordus beschriebene, zuerst officinelle Krauseminze der *M. aquatica* zurechnet. Uebrigens bilden die verschiedenen Minzenarten so viel Varietäten und Bastarde, dass eine Uebereinstimmung der Botaniker und Pharmacognosten nicht existirt.

Die Krauseminze dankt ihren Geruch und Geschmack (beide sind von dem der Pfefferminze verschieden, letzterer nicht kühlend) dem Krauseminzöl, *Oleum Menthae crispae*, von dem das getrocknete Kraut 1—2% liefert, während frisches Kraut verhältnissmässig mehr giebt. Dasselbe ist frisch dünnflüssig, hellgelb oder grünlich, im Alter bräunlich, dickflüssig und sauer; in Alkohol löst es sich in jedem Verhältnisse. Es enthält ebenfalls ein Stearopten.

Die Krauseminze wird ganz wie Pfefferminze angewendet, ihre Aufgüsse sind indessen nicht so schmackhaft wie die der letzteren.

### **Präparat:**

**Aqua Menthae crispae; Krauseminzwasser.** 10 Th. Destillat aus 1 Th. Krauseminzblätter. Wie Pfefferminzwasser, jedoch seltener benutzt.

Früher waren auch Krauseminzsyrop, Syrupus Menthae crispae und englische Krauseminzessenz, welche, wie die analogen Pfefferminzpräparate bereitet und benutzt werden, officinell.

Wie Pfeffer- und Krauseminze können noch eine Reihe von Labiaten gebraucht werden, die wir, da sie meist der Volksmedizin angehören, hier übergehen müssen. Aus der Gattung Mentha gehören dahin *M. viridis* (Herba Menthae Romanae), *M. Pulegium* (Polei, pennyroyal, Herba Pulegii) u. a. m.

**Fructus Carvi**, Semen Carvi, Semen Cumini pratensis; Kümmel, Kümmelsamen, Wiesenkümmel, Kümmich. **Oleum Carvi**; Kümmelöl.

Die Frucht der im mittleren und nördlichen Europa, auch in Südsibirien heimischen, vorzugsweise auf Wiesen wachsenden, in Holland und England, auch in einigen Theilen Deutschlands cultivirten Umbellifere *Carum Carvi* L. bildet ein von der Seite her stark zusammengedrücktes Doppelachänium, welches im trocknen Zustande jedoch leicht in seine beiden, am Rücken stark gekrümmten, bis 5 Mm. langen und 1 Mm. dicken Theilfrüchtchen zerfällt, wie dies in der Handelswaare durchgängig der Fall ist. Letztere sind braun, mit 5 sehr hervortretenden strohgelben Rippen, die fast halb so breit wie die dunkelrothbraunen, glänzenden Thälchen sind, welche letztere von je einem erhabenen, geschlängelten Oelgange eingenommen werden. Zwei solche zeigt auch die Fugenfläche. Der Kümmel riecht schwach aromatisch und ist von beissend gewürzhaftem Geschmacke. Die letzteren Eigenschaften verdankt derselbe dem Gehalte an ätherischem Oele, welches durchschnittlich 5, ausnahmsweise selbst 7% der Früchte der in Deutschland wilden Kümmelpflanzen ausmacht und unter dem Einflusse höherer Lage und nördlichen Klimas sich am reichlichsten zu entwickeln scheint (Zeller). Der als *Oleum Carvi* officinelle höher siedende Antheil desselben ist farblos oder blassgelb, dünnflüssig, rechtspolarisirend, von 0,91 spec. Gew., löst sich in einem gleichen Gewichte Weingeist und siedet bei 224°. Das Kümmelöl ist nach Völkel und Schweizer ein Gemenge von Carven,  $C^{10}H^{16}$ , welches bei 173° siedet, und von Carvol,  $C^{10}H^{14}O$ , einem dem Thymol isomeren, dünnflüssigen, wie Kümmelöl riechenden Oele, welches in feuchtem Zustande dampfförmig über erhitzten Zinkstaub geleitet und dann mit Natrium behandelt in Carven und Cymol zu zerfallen scheint. Das Kümmelöl tödtet Kaninchen zu 30,0 in 5 Min., zu 4,0 in 5 Stunden unter Convulsionen (Mitscherlich), wobei das Oel in der Bauchhöhle und im Athem, nicht aber im Urin durch seinen Geruch erkennbar ist. Auch beim Menschen können grössere Mengen Kümmelöl Frösteln, Hitze, Kopfcongestion und Delirien bedingen (Lilienfeld).

*Fructus* und *Oleum Carvi* sind ohne sonderliche medicinische Bedeutung. Sie stehen beide beim Volke in Ruf als Carminativum und Mittel gegen Magenkrampf. Auch wird Kümmel mit Biersuppe als Galactagogum vom Volke benutzt. Der Kümmel wird zu 0,5–2,0 in Form von Pulver oder Species (mit Baldrian, Kamillen u. a. krampfstillenden Dingen), selten im Aufguss (1:5–20) gegeben, das *Oleum Carvi* zu 1–3 Tropfen mehrmals täglich als Oelzucker. Die früher officinellen *Aqua Carvi* und *Spiritus Carvi* entbehren jetzt ganz der medicinischen Bedeutung.

Von unserem Wiesenkümmel zu unterscheiden ist der Römische Kümmel oder Mutterkümmel, *Fructus s. Semen Cumini*, von einer oberägyptischen, in Südeuropa cultivirten Umbellifere, *Cuminum Cyminum* L., deren getrocknete Früchte weniger angenehm aromatisch sind. Sie enthalten ein ätherisches Oel, welches vom Kümmelöl völlig verschieden ist, indem es aus Cymol,  $C^{10}H^{14}$ , und Cuminol (Cuminaldehyd),  $C^{10}H^{12}O$ , besteht. Das Cymol, welches auch künstlich aus Campher dargestellt werden kann, verursacht zu 2,0–3,0 beim Menschen Unruhe, Schlaflosigkeit und leichte Kopfschmerzen, in grösseren Dosen auch Erbrechen und geht in den Harn als Cuminsäure über (Ziegler). Das Volk vindicirt dem Cumin besondere Beziehungen zum Uterus.



**Radix Angelicae, Radix Archangelicae; Angelicawurzel, Engelnurzel.**

Die Engelnurzel, welche von einer in Nord- und Mitteldeutschland, sowie in England zerstreut vorkommenden, in Thüringen und im Erzgebirge cultivirten, mannshohen, zweijährigen Umbellifere, *Archangelica sativa* Fries (*Angelica Archangelica* α. L.), stammt, stellt das kurze, Blattreste tragende, bis 5 Cm. dicke Rhizom mit den bis 3 Dm. langen, 4—10 Mm. dicken, längsfurchigen, querröckrigen, weichen, wachartigen Wurzelästen dar. Die Rinde ist aussen graubraun, innen weiss und mit zahlreichen gelben, glänzenden Balsamgängen durchsetzt, der Holzkern ist strahlig, gelblich. Die Oberfläche trägt bisweilen graubraune Harzkörner. Die Wurzel wird im Anfange des zweiten Jahres gesammelt, riecht stark gewürzhaft und ruft auf der Zunge anfangs süsslichen, später bitterlichen Geschmack und ein brennendes Gefühl hervor. Die Wurzel der bei uns häufigen *Angelica sylvestris* L., welche damit verwechselt wird, ist viel kleiner, dünner, aussen grau und wegen der geringeren Zahl und Weite ihrer Balsamgänge viel weniger aromatisch. Die Wurzel von *Archangelica Norvegica* Fr. (*Angelica Archangelica* β. L.), deren oberirdische Theile im Norden als Salat und Gemüse dienen, liefert bei uns keine Engelnurzel. In Amerika benutzt man *Angelica atropurpurea* wie unsere Engelnurzel.

Als hauptsächlichste Bestandtheile der Engelnurzel sind das ätherische Oel und das Harz anzusehen, deren Gemenge die in den Balsamgängen enthaltene Masse constituirt. Dass auch die 1843 von Buchner aufgefundene Angelicasäure in der Engelnurzel präformirt ist, darf wohl als erwiesen angenommen werden. Neben derselben findet sich auch in geringerer Menge Baldriansäure. Das ätherische Oel beträgt nur  $\frac{1}{4}$ — $\frac{3}{4}$ % der Wurzel, das Harz gegen 6%. Das durch Verseifen des Angelicabalsams durch A. Buchner erhaltene harzartige Angelicin, das den gewürzhaften Geschmack der Engelnurzel bedingen soll, und ein von demselben gefundener Bitterstoff bedürfen neuerer Untersuchung. Angelicasäure ist zu  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ % in der Engelnurzel gefunden. Diese Säure,  $C^5H^8O^2$ , zur Gruppe der Acrylsäuren gehörend, krystallisirt in farblosen, glänzenden Prismen oder Nadeln, schmilzt bei 44—45° zu einem klaren Oel, siedet bei 190°, löst sich in kaltem Wasser wenig, leicht in kochendem Wasser, Spiritus, Aether, Terpenthinöl und fetten Oelen. Durch Behandeln mit Iodwasserstoffsäure und rothem Phosphor wird sie vollständig in Baldriansäure umgewandelt.

Die Engelnurzel hat ihren Ruf als erregendes Mittel, derentwegen man das in älterer Zeit als Bezoardicum, Diaphoreticum und Nervinum hochgepriesene Medicament im Typhus nach Art von Valeriana und ähnlichen Pflanzenstoffen zu Anfange dieses Jahrhunderts (v. Hildenbrand) vielfach verordnete, ziemlich eingebüsst und steht beim Volke noch als antikatarrhalisches Mittel in Gebrauch.

Die Zusammensetzung der Droge weist auf ähnliche Wirkungen wie bei Baldrian und Kamille hin und es ist zu verwundern, dass die viel angenehmer schmeckende *Angelica* nicht mehr an deren Stelle benutzt wird, als es geschieht.

Die Darreichung geschieht im Aufgusse (1 : 10—15 Colatur), welchen man esslöffelweise, meist mit anderen Excitantien, z. B. Aether, giebt. Dosis 0,5—2,0. Auch äusserlich kam *Angelica* zu Kräuterkissen oder Bädern ( $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  Pfund auf das Vollbad) in Anwendung.

**Präparat:**

**Spiritus Angelicae compositus; zusammengesetzter Angelicaspiritus, Engelnurzelspiritus.** In der Pharmakopöe an Stelle des *Spiritus theriacalis officinell.* *Angelica* 16, Baldrian, Wacholderbeeren aa 4, mit Spiritus 75, Aq. 125 Th. 24 St. macerirt und zu 100 Th. abdestillirt, darin Campher 2 Th. gelöst, filtrirt. Der farblose und klare Spiritus von gewürzhaftem, an die Ingredientien erinnernden Geruche und Geschmacke findet meist äusserlich zu nervenstärkenden Bädern (200,0—400,0 auf das Bad) oder Waschungen Anwendung. Innerlich kann er verdünnt zu 20—60 Tr. gegeben werden. In früherer Zeit war er ein Bestandtheil der Fowlerschen Arseniksolution, in der er durch Melissengestir ersetzt ist; er fand darin seinen Platz nicht etwa zur Vermehrung der Haltbar-

keit, sondern weil man der Angelica giftwidrige Eigenschaften zutraute, die das Mittel zu einem Alexipharmacon machten.

### **Rhizoma s. Radix Imperatoriae; Meisterwurzel.**

Die Droge bildet das im Frühling oder Herbst gesammelte, ästige, graubraune, etwas knollige Rhizom einer auf den mitteleuropäischen Gebirgen wachsenden Umbellifere, *Imperatoria Ostruthium* L., welche bei uns in Garten cultivirt wird. Der bis 1 Dm. lange und 1,5 Cm. breite, dichtgeringelte Hauptstamm treibt kleinere Wurzeln und holzige, bis 5 Mm. dicke Ausläufer. Die Rinde und besonders das Mark tragen grosse Balsambehälter. Die Droge besitzt einen starken aromatischen Geruch und einen brennend scharfen Geschmack. Im Handel kommt sie bisweilen mit *Rhizoma Veratri* untermengt vor, wodurch sie neuerdings zu Vergiftungen Veranlassung gegeben hat. Sie enthält ausser  $\frac{3}{4}\%$  ätherischem Oel, welches ein Gemenge eines Camphens mit sauerstoffhaltigen Oelen darstellt, einen in Prismen krystallisirenden und in weingeistiger Lösung brennend schmeckenden, nicht sublimirbaren Körper; welcher sich auch in der Wurzel von *Peucedanum officinale* L. findet und als *Peucedanin* oder *Imperatorin* bezeichnet wird. Derselbe verwandelt sich beim Kochen mit weingeistigem Kali in Angelicasäure und Oreoselin (Wagner). Die im Mittelalter als *Excitans* viel gebrauchte Wurzel, welche auch bei *Delirium tremens* (Spitta) und selbst gegen Krebs (Mylius) Empfehlung fand, ist jetzt ganz in Vergessenheit gerathen und wird fast nur noch in der Veterinärpraxis benutzt. Man gab sie zu 1,0—2,0 mehrmals täglich in Pulver, Latwerge oder Aufguss (1:10—25).

**Asa foetida, Gummi resina Asa foetida, Assa foetida; Asant, Stinkasant, Teufelsdreck.**

Die Droge ist der ausgeschwitzte Milchsaft einer oder mehrerer in den Steppen zwischen dem Persischen Meerbusen und dem Aralsee wachsenden und namentlich in Chorasán, Herat und Chiwa ausserordentlich massenhaft vorkommenden, mannshohen, gelbblüthigen Umbelliferen aus der Gattung *Ferula*.

Das durch seinen starken knoblauchähnlichen Geruch ausgezeichnete Gummiharz stellt freie oder mit einander verklebte Körner oder unregelmässige Massen dar, welche aussen gelb oder gelbbraun, innen auf frischer Bruchfläche milchweiss und fettglänzend erscheinen; die Färbung des Bruches geht rasch in Roth, später in Dunkelrothbraun über. Das Auftreten der rothen Färbung wird durch Chlor beschleunigt, während Salzsäure und Salpetersäure prächtig malachitgrüne Färbung erzeugen. Die *Asa foetida* ist ein Gummiharz von scharf bitterem Geschmack, welches nur theilweise in Spiritus sich auflöst und mit Wasser verrieben eine graue Emulsion giebt, die auf Zusatz von Natronlauge gelb wird. In neuerer Zeit findet sich im Handel eine *Asa foetida* in freien Körnern mit permanent gelber oder hellgelbbrauner Oberfläche und einer anfangs weissen, aber mit der Zeit gelb werdenden Bruchfläche. Sie stimmt im Geruche mit der persischen Droge überein, wie überhaupt mehrere persische Umbelliferen ähnliche knoblauchartig riechende Milchsäfte produciren. Eine dritte, innen blass schmutzigweisse oder blass schmutziggelbe, nicht nachdunkelnde, bei gewöhnlicher Temperatur salbenweiche Sorte wird in Indien als *Hingra* bezeichnet. Die Mutterpflanze der *Asa foetida* ist noch nicht mit Sicherheit festgestellt; doch kann man mit grosser Wahrscheinlichkeit *Ferula Scorodisma* Benth. und Hooker (*Scorodisma foetidum* Bunge, *Ferula Asa foetida* L.) als solche bezeichnen. Neben derselben nennt die Phkp. auch *Ferula Narthex* (*Narthex Asa foetida* Falconer).

Als der wirksame Bestandtheil der *Asa foetida* scheint vor-

zugsweise das darin zu 6—9% enthaltene flüchtige schwefelhaltige Oel betrachtet werden zu müssen.

Dasselbe ist hellgelb, von höchst widrigem Geruche, schmeckt erst milde, später kratzend und bringt auf der Haut keine Entzündung hervor. An der Luft wird es sauer und exhalirt Schwefelwasserstoff; es löst sich wenig in Wasser, leicht in Spiritus und Aether und scheint ein Gemenge von Schwefelverbindungen der Radicale Laseryl und Allyl, ( $C^6H^{11}$ ) $^2S$  und  $C^6H^{10}S$ , zu sein. Nach Semmer bewirkt es zu 60 Tr. ausser knoblauchduftendem Aufstossen keine Aenderung des Befindens, während der Geruch des Oels sich in Expiration und Perspiration, im Urin und in den Fäces geltend macht. Auch auf eiternden Flächen lässt sich bei Darreichung von Asa foetida der Geruch des Oels constatiren, welcher in der Perspiration nach dem Einnehmen grösserer Mengen erst in 48 Std. schwindet. Zersetzung des Oels im Organismus scheint nicht vor sich zu gehen, da die Sulfate im Urin nicht zunehmen (Semmer). Neben dem Oel finden sich 24—64% Harz und 12—50% Gummi. Aus dem Harze isolirten Hlasiwetz und Barth eine fast gar nicht in kaltem, ziemlich gut in kochendem Wasser und Aether, leicht in Spiritus lösliche, in Nadeln krystallisirende, geschmackfreie Säure, die Ferulasäure. Das Harz, welches beim Schmelzen mit Kalihydrat Resorcin, Protocatechusäure und flüchtige Fettsäuren liefert und sich in dieser Beziehung ähnlich wie Galbanum u. a. Umbelliferenharze verhält, besteht nach Semmer aus einem indifferenten und sauren Antheil, welche beide schwefelhaltig sein sollen, zu 15,0 nicht abführen und fast ganz mit den Fäces entfernt werden, dagegen nur spurenweise im Urin erscheinen.

Ueber die physiologischen Wirkungen der Asa foetida sind die Angaben getheilt. Nach Selbstversuchen von Trousseau und Pidoux haben selbst 15,0 keine auffallende Wirkung. Nach Jörg wirkt das Mittel schon in kleinen Gaben (bis 1,2) stark erhitzend, bewirkt Schwere des Kopfes und steigert den Geschlechtstrieb oder vermehrt und beschleunigt die Respiration. Sehr problematisch sind die älteren Angaben, dass bei Dosen von 0,05—0,1 bei nervösen Personen convulsivische Erscheinungen sich einstellen: dagegen kommt Aufstossen und Uebelkeit bei empfindlichen Personen vor, welche vielleicht auf den widrigen Geruch des Mittels zu beziehen sind. Andererseits giebt es Individuen, welche den widrigen Geruch, den die unanständige Bezeichnung *stercus diaboli* andeutet, nicht so übel empfinden, ja das Medicament sogar gern riechen. Uebrigens benutzen die Orientalen die Asa foetida vielfach als Gewürz in nicht unerheblichen Mengen.

Die Asa foetida ist eine sehr häufig bei krampfhaften Affectionen und namentlich bei Hysterie angewendete Substanz, deren Wirksamkeit nach zahlreichen Erfahrungen sich zwar nicht bezweifeln lässt, jedoch keineswegs als diejenige anderer Antispasmodica und Antihysterica übertreffend betrachtet werden kann.

Unter den Affectionen, in denen A. f. Anwendung findet, steht der Häufigkeit des Gebrauches nach die Hysterie obenan. Dass A. f. Hysterie radical heilt, wird von verschiedenen Aerzten behauptet, ist aber sehr dubiös, höchstens kürzt es die hysterischen Paroxysmen ab und auch bei diesen nicht besser als Castoreum und Baldrian. Bei der von Jörg behaupteten, aber sehr zweifelhaften Wirkung des Mittels auf den Uterus hat man es besonders Hysterischen gegeben, welche an Amenorrhoe oder Chlorose leiden, doch bewährt sich A. f. als Emmenagogum nicht. Die Beschränkung auf hysterische Erscheinungen im Bereiche des Abdomen (Kolik, Tympanitis) ist ungerechtfertigt, obschon dem Mittel carminative Wirkung nicht abgesprochen werden kann. Von andern convulsivischen Leiden sind namentlich solche im kindlichen Lebensalter hervorzuhoben, wie Laryngismus stridulus (Millar), Keuchhusten (Millar und Kopp), Flatulenz (Pereira) u. a. Da man der A. f. wie andern Aethereo-oleosa und Gummiharzen besonders günstige expectorirende Wirkung zuschrieb, erklärt sich ihre Benützung bei krampfhaften Leiden der Respirationsorgane, zumal beim Asthma (Trousseau und Pidoux) und bei alten chronischen Katarrhen mit zeitweise auftretender Schwerathmigkeit und chronischem Husten. Früher gab



man das Mittel auch bei Eingeweidewürmern, doch ist es ein sehr unsicheres Anthelminticum, obschon Proglottiden von Tänien oft danach abgehen. Noch weniger leistet es bei Caries, Scrophulose, Rachitis und ähnlichen Affectionen.

Man verordnet A. f. innerlich zu 0,2—1,0 und darüber mehrmals täglich in Pillen und Bissen, äusserlich im Klystier oder als Riechmittel.

Zur Darstellung von Pillen erfordert A. f. geringen Zusatz von Mucilago oder Spiritus; soll der Geruch vollständig beseitigt werden, müssen die Pillen gelatinisirt oder dragirt werden. Ueberziehen mit Silber ist unzweckmässig, da der Ueberzug schwarz und unansehnlich wird. Manche Patienten verbitten sich übrigens das Gelatinisiren, da sie auch etwas riechen wollen. Für solche und für Kinder ist die Form der Emulsion (mit der Hälfte Gi. arab.) zweckmässig. Für Pulverform eignet sich A. f. nicht, da das Mittel nur in der Winterkälte gestossen werden kann; die betreffende Masse backt aber sehr leicht wieder zusammen. — Die Form des Klystiers ist äusserst beliebt. Man verwendet zu demselben entweder Emulsion (3,0—8,0 mit einem Eigelb auf 50,0—150,0 Flüssigkeit) oder, wenn man reizend auf den Darm wirken will, Lösung in Essig (1:20). Sowohl innerlich wie äusserlich wird Asa foetida oft mit Baldrian, Ammonium carbonicum und ähnlich wirkenden Mitteln combinirt.

#### Präparat:

**Tinctura Asae foetidae; Stinkasantinctur.** Mit 5 Th. Spiritus bereitet, gelblich bis rothbraun. Innerlich zu 20—60 Tr. mehrmals täglich, rein oder in Verbindung mit Aether oder krampfstillenden Tincturen, seltener Mixturen hinzugesetzt oder mit aa Petroleum gegen Bandwurm; äusserlich als Riechmittel oder in Klystieren (zu 2,0—8,0), sonst auch zum Verband bei Caries benutzt. Eine früher officinelle Tinctura Asae foetidae ammoniata s. volatilis fand zu 20—30 Tr. innerlich, sowie als Riechmittel Verwendung. Sehr beliebt war früher die sog. Aqua foetida antihysterica, auch als Aqua Asae foetidae composita, Aqua foetida Pragensis, Aqua antihysterica Pragensis, Prager Wasser, Prager Tropfen, Stinktropfen bezeichnet, ein trübes Destillat von Baldrian, Zedoaria, Asant, Pfefferminz, Galbanum, Quendel, Römischen Kamillen, Myrrha, Angelica und Castoreum, mit Weingeist und Wasser. Das penetrant nach A. f. riechende Präparat wurde theelöffelweise rein oder in Mixturen, am besten mit Syrup, bei Hysterie oder krampfhaften Respirationskrankheiten angewendet, auch in Verbindung mit mehreren Th. Wasser in Klystierform. Aeltere Präparate waren auch Aqua Asae foetidae und das Lac Asae foetidae s. Solutio Asae foetidae aquosa. Pillen aus A. f., Galbanum und Myrrha, auch mit Castoreum bereitet, bilden die in England beliebten, schon von Sydenham benutzten Pilulae Asae foetidae compositae.

#### Verordnungen:

- 1)  $\mathcal{R}$   
*Asae foetidae* 4,0  
*Saponis medicati* 2,0  
*Olei Foeniculi* gtt. 2

ut f. pilul. No. 50. D. S. 3 mal täglich  
 2 Stück. (Pilulae Asae foetidae.  
 Ph. mil.)

- 2)  $\mathcal{R}$   
*Olei animalis foetidi*  
*Acidi succinici* aa 0,5  
*Asae foetidae*  
*Castorei* 15,0

*Tincturae Myrrhae* q. s.  
 ut f. pilul. No. 100. Obd. gelatina.  
 D. S. Dreimal täglich 2 Pillen.  
 (Pilulae foetidae succinatae.  
 Ph. Sn.)

**Anhang:** Aus der Familie der Umbelliferen stammt noch eine grössere Anzahl als belebende oder krampfstillende Mittel gebrachter Drogen, von denen das Sagapenum, früher auch Serapinum genannt, ein der Asa foetida im Geruch und in der Wirkung nahe verwandtes Gummiharz bildet, welches als der

eingetrocknete Milchsaft der persischen *Ferula Scovitsiana* DC. angesehen wird. Während *Sagapenum* zu den aus der Therapie verschwundenen Medicamenten gehört, hat man die Wurzel einer andern *Ferulacee*, *Euryangium Sumbul* Kauffmann, welche östlich von Samarkand auf den Bergen von Magian wächst, unter dem Namen *Radix Sumbul*, *Sumbulwurzel*, *Moschuswurzel*, in die Therapie eingeführt. Zuerst als Surrogat des Moschus, dessen Geruch sie nahe kommt, bei Cholera benutzt, hat sie später bei verschiedenen Schwächezuständen und Nervenkrankheiten, z. B. bei *Delirium tremens*, besonders durch russische Aerzte (*Murawieff*) Anwendung gefunden und ist theilweise sogar als eine Art *Panacee* bei den verschiedensten Affectionen (*Leukorrhoe*, chronischen Lungenkatarrhen, Verdauungsbeschwerden u. a. m.) benutzt. Sie enthält wenig ätherisches Oel und 9 % eines in Aether löslichen Weichharzes, welches den Geruch des Moschus besitzt, in seiner Constitution jedoch noch nicht völlig aufgeklärt erscheint; vielleicht enthält sie auch Angelikasäure. Wir erwähnen hier noch die Ginsengwurzel, *Radix Ginseng*, welche in China und Japan als das vorzüglichste Excitans gilt und von einer als *Panax Ginseng* Nees bezeichneten *Araliacee* abgeleitet wird. Diese zu ausserordentlich theurem Preise in ihrer Heimath bezahlte Droge wird im Handel durch den amerikanischen Ginseng, welcher von *Panax quinquefolius* L. abstammt, ersetzt. Sicher haben alle diese excitirenden Drogen keinerlei Vorzüge vor den bei uns officinellen, was auch bezüglich der in Nordamerika bei Hysterie, Krampfwehen, chronischem Rheumatismus, Asthma und Bronchialkatarrhen empfohlenen *Radix Dracontii* (von einer als *Dracontium foetidum* L. bezeichneten, jetzt meist als *Symplocarpus foetida* Nut. aufgeführten Aroidee) und analogen vegetabilischen Excitantien gilt, welche jetzt nur noch vereinzelte Anwendung finden. Hier dürfte auch kurz der wie Ginseng in China als *Aphrodisiacum* in Mexico in Ansehen stehenden *Damiana*, des Krautes von *Turnera aphrodisiaca*, gedacht werden, welche neuerdings (1877) von amerikanischen Aerzten gegen Impotenz und Dysmenorrhoe in Form eines Fluidextracts kaffee- oder theelöffelweise 3—4 mal täglich gereicht wird, ohne dass ihr therapeutischer Werth vor einer gesunden Kritik bestehen kann.

#### Coffeinum, Theinum; Kaffein, Caffein, Thein.

Verhältnissmässig wenig medicinischen Gebrauch findet das in verschiedenen Genussmitteln, namentlich den Kaffeebohnen und Theeblättern, enthaltene Alkaloid, das in seiner Wirkung sich den ätherischhöligen Stoffen anreihet und seltener als eigentliches Analepticum, mehr als Beschwichtigungsmittel bei nervösen Irritationszuständen, besonders Hemikranie, und als Diureticum benutzt wird.

Das im Jahre 1820 von Runge in den Kaffeebohnen constatirte Caffein, dessen Identität mit dem von Oudry in den Theeblättern entdeckten Alkaloide (Thein) Mulder und Jobst nachwiesen, bildet mit einem Atom Krystallwasser lange, schneeweisse, seidenglänzende Nadeln von bitterlichem Geschmacke. Es giebt mit 2 Th. heissem Wasser eine neutrale Lösung, in der es beim Erkalten krystallinisch erstarrt; in der Kälte sind 80 Th. Wasser zur Lösung erforderlich. Das Caffein löst sich in 9 Th. Chloroform oder in 50 Th. Weingeist, wenig in Aether. Wasserfreies Caffein sublimirt bei vorsichtigem Erhitzen über 180° ohne Rückstand. Es verbindet sich nur mit den stärksten Säuren. Verdampft man Caffeinlösung mit etwas Chlorwasser oder Salpetersäure, so erhält man einen rothbraunen Rückstand, welcher, mit kaustischer Ammoniakflüssigkeit befeuchtet, eine prachtvoll purpurviolette Farbe annimmt (*Schwarzenbach*). In den Kaffeebohnen, den bekannten Samen des Kaffeebaumes, *Coffea Arabica* L., eines Baumes aus der Familie der Rubiaceen, welcher, ursprünglich in Abyssinien und im innern Afrika einheimisch, von den Arabern nach Arabien und später von dort in fast alle tropische Länder verbreitet wurde, wo er jetzt im ausgedehntesten Maasse cultivirt wird, findet sich das Caffein theilweise im freien Zustande, theilweise an Gerbsäure gebunden (als sog. chlorogen-

saures Coffein). Stenhouse fand in den Kaffeebohnen 0,5—1% Coffein und in den Blättern des Kaffeebaumes von Sumatra 1,15—1,25 %; nach den neueren Untersuchungen von Weyrich schwankt der Gehalt verschiedener Kaffeesorten zwischen 0,67 (Feldkaffee von Jamaica) und 2,21 % (grauer Javakaffee). Im Thee, den getrockneten Blättern des in China und Japan einheimischen Theestrauches, *Thea Chinensis* L., fand Stenhouse 2,1%, Würthner beim schwarzen Thee zwischen 1,36 und 2,14 und beim sog. Blumenthee zwischen 1,79 und 3,09%. Ausser in den genannten Genussmitteln findet sich das Coffein noch in dem sog. Paraguay-Thee oder Maté, den Blättern und Stengeln von *Ilex Paraguayensis* Lamb. (Fam. Aquifoliaceae), hier jedoch nur zu 0,45—1,1%, sowie in den im westlichen Central-Afrika im frischen Zustande als Nahrungs- und Arzneimittel verwendeten Kola- oder Gurunüssen, den Samen von *Kola acuminata* (Fam. Sterculiaceae). Am reichlichsten findet sich das Coffein in der weiter unten zu erwähnenden Guarana.

Das Coffein ist seiner chemischen Zusammensetzung nach als Methyltheobromin oder, da das in den Cacao enthaltene Alkaloid Dimethylxanthin ist, Trimethylxanthin,  $C^5H(CH^3)_3N^4O_2$ , aufzufassen.

Man hielt in der früheren Zeit das Coffein für einen nährenden Stoff, welchem zugleich die volle Wirkung der als Nutriment betrachteten Genussmittel, die dasselbe enthalten, zugeschrieben wurde. Beides ist offenbar unrichtig, da wiederholte Versuche an Thieren und Menschen das Coffein offenbar in vorwaltender Weise zu den auf das Nervensystem wirkenden Stoffen stellen, und da sowohl im Kaffee als im Thee neben Coffein noch andere, zum Theil auf die Nutrition, zum Theil auf das Nervensystem wirkende Stoffe vorhanden sind. Ueber das Verhalten des Coffeins im Organismus sind unsere Kenntnisse noch ziemlich dürftig. Bei kleineren Dosen ist der Nachweis im Urin häufig nicht möglich, während nach Versuchen von Strauch es bei mit Coffein vergifteten Säugethieren im Blute, im Urin und in der Galle nachweisbar ist. Ueber die Wirkung kleiner Dosen (0,15—0,3 im Tage) giebt Rabuteau nach Selbstversuchen von Eustratiades an, dass das Alkaloid die ausgeschiedene Harnstoffmenge um 11—28% und gleichzeitig auch die Harnsäureausscheidung verringere, welche beide nach Aussetzen der Coffeinzufuhr sehr rasch zur Norm zurückkehren. Die beim Menschen nach kleinen Gaben Coffein beobachteten Erscheinungen zeigen vorzugsweise eine Betheiligung des Gehirns und der Herzthätigkeit an. Nach Mengen von 0,1—0,2 und weniger zeigt sich meist geringe Verlangsamung der Herzschläge, welche bisweilen auch bei grösseren Gaben, z. B. bei Versuchen von Caron nach 0,8 eintritt, während gewöhnlich nach solchen ein ausserordentlich frequenter, manchmal unregelmässiger und aussetzender Puls sich findet. Bei den bei uns gebräuchlichen medicinalen Dosen treten cerebrale Erscheinungen kaum zu Tage und selbst beim Einnehmen des Mittels kurz vor dem Schlafengehen erfolgt nicht constant Störung des Schlafes wie nach einer starken Tasse Kaffee; häufig tritt sogar sehr fester Schlaf nach Coffein ein. Bei grösseren Mengen (0,5 und darüber) zeigt sich oft starke Erregung der Phantasie mit Verwirrung der Gedanken und Visionen, Ohrensausen und Pulsiren an den Schläfen, Funkensehen, Drang zum Harnlassen, Zittern der Hände. Nach Aubert kann Coffein auch zum Auftreten schmerzhafter Hämorrhoidalknoten Veranlassung geben.

Die toxikologischen Versuche, welche an den verschiedensten Thierclassen zuerst von Falck (und Stuhlmann), später von A. Mitscherlich, Voit, Leven, Amory u. A. angestellt sind, beweisen, dass dasselbe zu den giftigen Substanzen gehört, obschon im Verhältniss zu anderen Alkaloiden die Dosis letalis ziemlich hoch ist und bei Kaninchen mehrere Dgm. zur Tödtung erforderlich sind. Als Haupterscheinungen ergeben sich tonische Contractionen der Muskeln, später paralytische Erscheinungen und Störungen der Respiration, daneben auch Veränderungen des Herzschlages. Die Muskelrigidität ist bei einzelnen Thierspecies von einer Wirkung auf die Muskeln selbst abhängig, bei anderen steht sie mit Steigerung der Reflexerregbarkeit und spinalem Tetanus offenbar im Zusammenhange (C. Ph. Falck, Albers, Aubert). Die Erregbarkeit der Nerven wird bei Coffeinvergiftung bisweilen etwas herabgesetzt, meist, wie die Muskelirritabilität, nicht vermindert. Die Herzschläge nehmen bei Fröschen allmähig ab, das Herz leert sich nach und nach vom Blut unter



gleichzeitiger Erweiterung der Gefäße; bei Säugethieren wird die Herzaction stark beschleunigt bei gleichzeitiger Zunahme der Athemfrequenz, Abnahme der Höhe der Pulswellen, Arrhythmie und Sinken des Blutdrucks (Aubert). Aubert betrachtet die Zunahme der Pulsfrequenz als Erregung der Beschleunigungsnerven des Herzens, da sie nach Vagusdurchschneidung noch stärker hervortritt, und leitet die übrigen Phänomene von Lähmung der von den Herzganglien zum Herzmuskel tretenden Nerven ab. Sinken des Drucks erfolgt auch nach vorheriger Atropinisirung; Vagusreizung bedingt Sinken des Drucks ohne Aufhören der Pulsationen. Nach Binz und Peretti (1875) wirkt Coffein in eigenthümlicher Weise auf die Körpertemperatur, indem dasselbe in kleinen Gaben dieselbe nicht beeinflusst, während es in mittleren und toxischen, aber nicht rasch letalen Dosen sehr erhebliche Erhöhung der Körperwärme bedingt, welche bei künstlicher Respiration nicht eintritt. Bei Alkoholnarkose wirkt Coffein in überraschender Weise belebend, indem es auffällige Hebung der Respiration, Steigerung des Blutdrucks und der Pulsfrequenz und Zunahme der Temperatur bedingt. Nach Eulenburg setzt Coffein bei subcutaner Injection die Sensibilität an der Injectionsstelle herab.

Das Coffein findet seine hauptsächlichste Verwendung in der Hemicranie, wo es in der That oft von günstigstem Erfolge ist und selbst lange bestehende Migräne manchmal mit auffallender Schnelligkeit beseitigt (Hannon, Van den Corput, Riedel, W. Reil u. A.). Mir selbst hat sich das Mittel nicht nur bei idiopathischer, sondern auch bei hysterischer Hemicranie (hier palliativ) bewährt. Hannon empfahl Coffein auch gegen hysterische und hypochondrische Verstimmung des Nervensystems, Eulenburg in subcutaner Injection bei Neuralgien.

Vielfache Verwendung hat das Coffein seit seiner ersten Empfehlung durch Botkin und Koschlakoff gegen Hydrops gefunden, wo es in der That häufig glänzende Resultate giebt, besonders bei Hydrops in Folge von Herzkrankheiten (Leech). Nach Brakenridge ist die gesteigerte Diurese keineswegs von einer Steigerung des allgemeinen arteriellen Blutdrucks abhängig wie die der Digitalis, deren Effecte durch gleichzeitigen oder abwechselnden Gebrauch von Coffein oft im hohen Grade gesteigert werden. In der That ist auch in einzelnen Fällen von uncomplicirtem Morbus Brighti Besserung unverkennbar, obschon in den meisten Fällen dieser Art das Mittel nicht wirkt. In frühen Stadien desquamativer Nephritis steigert Coffein häufig die Diurese nicht, wenn Digitalis, Scilla oder salinische Diuretica Diuresis bedingen; andererseits bessert Coffein bei verschiedenen Herzkranken mit Oedem, Dyspnoe und Insomnie nicht selten die Cerebralerscheinungen (Shapter). Campbell versuchte Coffein bei Morphinumvergiftung mit negativem Erfolge, ebenso Falck bei Intermittens; Shapter will das Coffein als allgemeines Analepticum zum Ersatz der Spirituosa verwendet wissen.

Man giebt das Coffein zu 0,06—0,2 mehrmals täglich, meist in Pulverform, auch in Pillen oder Pastillen. Die Pharmacopoe gestattet als maximale Einzelgabe 0,2, als maximale Tagesgabe 0,6.

Diese Maximaldosen sind um so mehr gerechtfertigt, als selbst bei gesunden Personen die oben erwähnten Effecte grösserer Coffeinmengen hervortreten können. Bei Kranken kann schon nach 3 Gaben von 0,2 Uebelkeit, Kopfweg und Herzklopfen auftreten (Leech). Bei Herzkranken und Hydrophoren sind länger dauernde Versuche mit Coffein nicht zulässig, weil bei gehöriger Dosis die Wirkung schon in 24 Std. sich einstellt. Im Allgemeinen sind auch hier Tagesgaben von über 0,6 zu vermeiden, doch tritt mitunter die Wirkung erst bei doppelt so hohen Gaben ein. Bei Migräne empfahl zuerst Van den Corput als *Poudre contre la migraine* eine Mischung von 0,15—0,2 mit 0,5 *Elaeosacch. Vanilla*, wovon 4 Pulver zur Beseitigung eines Migräneanfalles genügen. Hannon, welcher übrigens statt des reinen Alkaloids ein Gemenge von Coffein und Citronensäure als *Coffeinum citricum* in Anwendung bringt, gab Pillen aus 0,05 Coffein citr. und 0,1 Extr. Gram. (2stdl. 1 Stück) oder einen Coffeinsyrup (1 : 25 Syr. simpl.) oder verordnete es im Klystier (zu

0,25 auf 2 Klystiere, wovon Morgens und Abends eines zu nehmen ist) oder in Salben. Mehr als letztere Form verdient die zuerst von Eulenburg angeregte Subcutaninjection Benützung. Man nimmt dazu die von Eulenburg angegebene Lösung (Coffein 0,4, Aq. dest., Spiritus aa 5,0) oder nach Empfehlung von Bernatzik eine Lösung von 0,6 in einer gelind erwärmten Mischung von 7,5 Spiritus und 2,0 Aq. dest., der nach dem Erkalten 7,5 Chloroform zugesetzt werden. Von letzterer Mischung können 20 Tropfen (etwa 0,015 Coffein entsprechend) in kurzen Zwischenräumen bei Migräneanfällen injicirt werden. Neben dem Coffein und dem Coffeincitrat ist auch baldriansaures Coffein, Coffeinum valerianicum, therapeutisch benutzt. Man rühmt dasselbe zu 0,1 mehrmals täglich bei hysterischem Erbrechen (Paret), in kleineren Dosen, in Form eines Syrups gegeben, auch bei Keuchhusten (Labadie-Lagrange). Shapter empfiehlt als analeptisches Getränk (sog. Aquatheine) Lösung von Coffein in Selterswasser. — Ob allmähig Steigerung der Gaben nothwendig ist, wie dies die rasche Gewöhnung an starken Kaffee beim Menschen und die das Gleiche für Coffein herausstellenden Versuche von Binz und Peretti wahrscheinlich machen, steht dahin.

**Pasta Guarana.** — Von den coffeinhaltigen Drogen ist am alkaloidreichsten die Guarana oder Guaranapaste, eine aus meist wurstförmigen, selten kuchen- oder kugelförmigen, braunschwarzen, wenig riechenden und adstringirend bitterlich schmeckenden, auf dem Bruche ebenen und mattglänzenden, im Innern nicht selten einzelne Samen einschliessenden Stücken bestehende Masse, welche sich theilweise in Wasser löst. Die Droge ist ein aus den getrockneten und gepulverten Samen von *Paullinia sorbilis* Martius, einer zur Familie der Sapindaceen gehörigen Liane Brasiliens, mit Wasser und angeblich auch unter Zusatz von Cacao und Mandiocamehl bereiteter und wieder an der Sonne oder am Rauch getrockneter Teig, welcher in seinem Vaterlande als diätetisches Genussmittel dienen soll und als Mittel gegen Dysenterie, Diarrhoe und Harnverhaltung gilt und in der That wegen seines grossen Gehaltes an Gerbstoff bei Darmkatarrhen wohl Nutzen schaffen kann. Der Coffeingehalt beträgt in den Samen 5,08%, in der Guarana 4,2–5% und rechtfertigt wohl die Verwendung der Guarana bei Hemikranie, wo das Mittel in Pulverform zu 0,5–2,0 pro dosi gegeben werden kann. Die in Brasilien gebräuchlichen Dosen von 5,0–8,0 können leicht zu Intoxication führen und sind deshalb zu vermeiden.

**Kaffee und Thee.** — Fast noch mehr als Coffein und Guarana werden die unter der Form von Getränken ökonomisch so überaus häufig benutzten coffeinhaltigen Genussmittel Kaffee und Thee als Medicament angewendet. Die Samen des Kaffeebaumes werden bekanntlich bei uns in geröstetem Zustande zur Darstellung eines Aufgusses benutzt und enthalten daher nur zum Theil die in den rohen Kaffeebohnen vorhandenen Principien. Ein Theil des Coffeins geht beim Rösten verloren, und zwar bei starkem Brennen mehr als bei schwachem; doch ist der geringe Mehrverlust bei stark geröstetem Kaffee für den Coffeingehalt des Infuses ohne Bedeutung, weil aus demselben mit heissem Wasser das Coffein viel leichter ausgezogen wird, so dass das daraus bereitete Infus sogar coffeinreicher ausfällt als aus schwach gerösteten Bohnen (Aubert). Von sonstigen Bestandtheilen der rohen Kaffeebohnen, welche in den Aufguss übergehen, hat man besonderes Gewicht auf die Aschenbestandtheile gelegt, und zwar namentlich auf Kali und Phosphorsäure, von denen ersteres 1,87–2,83% des Kaffees (50–65% der Asche), letztere 0,31–0,72% der Kaffeebohnen (0,64 bis 12,17% der Asche) ausmacht (Weyrich). Wichtiger sind offenbar die im Kaffeeaufgusse vorhandenen empyreumatischen Producte, welche aus den organischen Bestandtheilen des Kaffees bei Vorhandensein von Wasser durch trockne Destillation entstehen und deren Complex man mit dem Namen *Caffeon* oder *empyreumatisches Kaffeeöl* belegt hat. Namentlich das *Caffeon*, welches letztere das Aroma des Kaffeeaufgusses bedingt, ist als Ursache davon anzusehen, dass starker Kaffee weit stärker excitirend wirkt als eine entsprechende Menge Coffein. Nach Rabuteau ist das *Caffeon* toxisch, verhindert die Entwicklung von Infusorien und ist dasjenige Princip, welches besonders die Schlaf-

losigkeit hervorbringt, die als Folge starken Kaffees eintritt. Zulinski fand es bei Fröschen krampferregend. Interessant sind in Bezug auf das Verhältniss der Wirkung des Caffeins und Caffoons zum Kaffee Versuche von J. Lehmann, wonach 0,5 Caffein Pulsbeschleunigung, Zittern, fortwährenden Urindrang, eigenthümlich rauschartigen Zustand und endlich sehr festen Schlaf hervorbrachten, während ein Absud aus 3 Loth Kaffeebohnen sehr vermehrte Herzaction, Aufgeregtheit, Schwindel, Hinfälligkeit, Sch weiss, unruhigen Schlaf mit Träumen und ein Kaffeedestillat mit dem empyreumatischen Kaffeeöl zu 4 Gläsern täglich Aufregung mit gelindem Sch weiss und merkliche Steigerung des Verstandes, in doppelter Dosis aber Congestionen, starken Sch weiss und Schlaflosigkeit (bei andern Personen auch Stuhlentleerung) bedingte.

Die Einwirkung des Kaffees, in gewöhnlichen Mengen als Getränk genommen, ist von den verschiedensten Forschern untersucht, ohne dass jedoch über die Einzelheiten vollständige Uebereinstimmung herrschte. Neben den bekannten Erscheinungen einer Anregung der geistigen Thätigkeit und einer Erleichterung der Perception und der Arbeit bei gleichzeitigem allgemeinem Wohlbehagen tritt in der Regel Pulsbeschleunigung (beim Genuisse kalter Aufgüsse Pulsverlangsamung) und vermehrte Urinexcretion ein. Ob die Harnmenge in Wirklichkeit vermehrt ist, steht dahin, da die neueren Versuche von Eustratiades und Rabuteau den älteren Angaben in dieser Beziehung widersprechen. Ebenso differiren die Angaben über die Verhältnisse der Harnstoff- und Kohlensäureausscheidung, doch geben die meisten Forscher (Böcker, Voit und Eustratiades) eine Verminderung der ersteren an, während für die Kohlensäure von Böcker relative und absolute Abnahme, von Voit dagegen Zunahme der Kohlensäureausscheidung angegeben wird. Grössere Dosen von Kaffee können zu acuter Vergiftung führen, welche unter den Erscheinungen der Präcordialangst, Athemnoth und Herzklopfen, Micturition und heftigen Durchfällen verläuft (Curschmann). Ueber die Einwirkung des habituellen Genusses starken Kaffees, welcher ausser einer geringen Störung der Verdauung und häufiger Tendenz zu Obstipation auch nervöse Störungen, Congestionen zum Kopfe, Gliederzittern, nach Höring sogar eine Art von Delirium tremens veranlassen kann, wollen wir kurz hinweggehen, wie wir auch die Bedeutung des Kaffees als Nahrungsmittel oder als sog. Sparmittel den Physiologen und Diätetikern zur gründlichen Erörterung überweisen müssen. Die schädlichen Folgen des mässigen Kaffeegenusses, welche von einzelnen Schriftstellern behauptet werden, sind durch die tägliche Beobachtung genugsam widerlegt, da Tausende demselben Tag für Tag mit entschiedenem Behagen, selbst mit positivem Nutzen, niemals aber mit irgend welchem Nachtheile für ihre Gesundheit huldigen.

Die Wohlthaten des Kaffeegenusses als Diäteticum ergeben sich besonders bei der ärmeren Bevölkerung. Schon 1850 machte Gasparin darauf aufmerksam, wie die Arbeiter in den Bergwerken von Charleroy unter der Anwendung von täglich 2 Liter eines aus 30,0 Kaffee bereiteten Aufgusses bei sonst ungenügender Zufuhr von stickstoffhaltigen Nahrungsmitteln ihre schweren Arbeiten mit Leichtigkeit zu verrichten im Stande seien. Jemand konnte von 120,0 Kaffee in Pulverform und von 3 Liter eines Aufgusses von 200,0 Kaffee 7 Tage ohne jede andere Nahrung leben und dabei stärkere Arbeitsleistungen als unter gewöhnlichen Verhältnissen verrichten. Auch in den letzten grossen Feldzügen der preussischen Armee hat sich die Wirkung des Kaffees in ausgezeichneter Weise bewährt, besonders auf dem Marsche, was vielleicht mit der von Jemand beobachteten Thatsache zusammenhängt, dass Kaffee die Secretionen und namentlich die Schweisssecretion herabsetzt.

Was die therapeutische Anwendung des Kaffees anlangt, so kann man denselben sowohl bei chronischen als bei acuten Schwächezuständen in Gebrauch ziehen und findet er in letzterer Beziehung vorwaltend da seine Indication, wo die Thätigkeit des Gehirns darniederliegt, also bei plötzlich aufgetretenem Coma und Sopor. Der Kaffee ist daher eines unserer vorzüglichsten Hilfsmittel bei der Behandlung der Opium- und Morphinvergiftung, kann aber auch bei Intoxication mit andern narkotischen Substanzen, z. B. Kohlenoxydgas, in Anwendung gebracht werden. Bei der Vergiftung mit Opium ist vielleicht auch die im Kaffeeaufguss enthaltene Gerbsäure von Bedeutung. Für die Wirksamkeit des Kaffees bürgen sowohl Thiersversuche (Orfila, Binz) als Beobachtungen



an Menschen (Bouchardat). Auch als Mittel gegen Migraine und Kopfschmerzen verschiedener Art kann starker Kaffee in ähnlicher Weise wie Coffein mit Nutzen in Anwendung gebracht werden. Besonders günstig wirkt er bei Cephalaea anämischer und hysterischer Personen. Schwarzer Kaffee gilt ferner als ein vorzügliches Medicament bei übermässigem Erbrechen, gleichviel ob dasselbe rein nervös oder durch Emetica oder durch übermässiges Essen und Trinken hervorgerufen ist. Beim Volke ist derselbe beliebt bei Durchfällen, doch beschränkt sich der Nutzen auf solche acute Darmkatarrhe, welche durch Erkältung hervorgerufen sind, wo übrigens warme Aufgüsse von Kamillen oder Pfefferminze genau dasselbe leisten. Bei chronischen Durchfällen ist er geradezu schädlich durch die von dem darin enthaltenen Caffeon herbeigeführte Beschleunigung der Peristaltik. Von geringerer Bedeutung ist die Benutzung bei Intermittens, wogegen Kaffee mit Citronensaft in Morea und am Mississipi Volksmittel ist (Pouqueville) und von Grindel ausserordentliche Lobpreisung fand, bei Phthisis (Dufour), bei Gicht und harnsaurer Diathese (Roques, Rabuteau), bei Asthma, Typhus (Martin Solon), Hydrops, endlich auch bei eingeklemmten Brüchen (Carrere, Durand, Drake) und bei Keuchhusten.

Man giebt den Kaffee im Aufgusse der gerösteten Bohnen zu 10,0—30,0 per Tasse oder als Pulver zu 1,0—2,0. Bei Kopfweh hat man die ungerösteten Kaffeebohnen theelöffelweise mit heissem Wasser übergossen in Schütteltrank verordnet. Die beim Rösten des Kaffees entstehenden Dämpfe sind früher bei chronischer Ophthalmie und zu Inhalationen bei Brustkranken, sowie zur Desinfection von Krankenzimmern (Weitenweber) und bei Cholera (Jörg) benutzt.

Minder gebräuchlich als Medicament sind die ebenfalls als Genussmittel äusserst verbreiteten Theeblätter, welche im Handel unter der doppelten Form des schwarzen und grünen Thees vorkommen. Die Angaben über eine quantitative Wirkungsdifferenz des Alkaloids aus Kaffee (Coffein) und Thee (Thein) sind sehr widersprechend. Leven erklärt Coffein für doppelt so schwach wie Thein, Zulinski umgekehrt Thein für schwächer wirkend, während Schroff jun. beide für gleichwirkend erklärt. Neben dem Coffein findet sich in den Theeblättern 0,6—1 % ätherisches Oel, welches stark betäubend nach Thee riecht und das Aroma des als Getränk benutzten Theeaufgusses bedingt, ausserdem eine Quantität Gerbsäure, von der nur geringe Spuren in letzteren übergehen. Nach Aubert ist der Coffeingehalt von einer Tasse Theeinfus aus 5,0—6,0 Theeblättern identisch mit dem einer Tasse Kaffeefiltrat von 16,0—17,0 geröstetem Kaffee. Rabuteau fand bei Selbstversuchen mit Thee (im Aufguss oder in Substanz genommen) Abnahme des Harnstoffes, des Pulses und der Temperatur; vermehrte Diurese fand nicht statt. Der in früheren Zeiten von Bontekoe als Panacee gewissermassen gepriesene Thee wird jetzt fast nur noch als Diaphoreticum nach Art von Lindenblüthen- und Fliederthee bei Erkältungskrankheiten verordnet, wobei die eingeführte grosse Menge von warmem Wasser offenbar die Hauptsache thut. Die Empfehlung von Theeaufgüssen als gerbsäurehaltiges Antidot bei Intoxication mit narkotischen Alkaloiden und Brechweinstein ist wegen des geringen Tanningehaltes derartiger Infuse völlig unge rechtfertigt. Einzelne rühmen Thee bei Indigestion, während Andere ihn als verdauungsschwächend widerrathen. Prout und Royle rühmten ihn (mit Natr. carb.) bei Lithiasis; auch benutzt man ihn in England zur Injection bei Gonorrhoe.

**Folia Cocae.** Coca, Cocablätter. — Dem Kaffee und Thee in seiner Wirkung nahestehend ist ein von den Indianern Perus benutztes Genussmittel, welches dieselben mit Kalk gemischt kauen, um sich dadurch in einen Zustand zu versetzen, welcher sie zur Leistung anstrengender Arbeiten bei sonst knapper Nahrung befähigt. Es sind dies die Blätter von *Erythroxylon Coca*, meist schlechtweg als Coca bezeichnet, in welchen Wöhler und Niemann eine Cocain benannte Pflanzenbase entdeckten, neben welcher sich noch ein zweites Alkaloid, Hygrin, findet. Nach Schroffs Untersuchungen über die Wirkung des Cocains reiht sich dasselbe den narkotischen Alkaloiden und besonders dem Indischen Hanf an und verursacht bei Thieren Convulsionen und Mydriasis, bei

Menschen Eingenommenheit des Kopfes, Müdigkeit, Verminderung der Gehör-perception und des Gedächtnisses, Unmöglichkeit den Ideengang zu reguliren, anfangs Beschleunigung und später Abnahme der Athemfrequenz. Auch concentrirtes Cocainus bewirkt nach Schroffs Selbstversuchen ungewöhnliche Aufregung des Gefässsystems und der gesammten Hirnfunction mit Steigerung der Muskelkraft und des körperlichen und geistigen Gemeingefühls. Diese Angaben fanden ihre volle Bestätigung in späteren Untersuchungen von Moreno y Maiz, Ott (1874) und von Anrep. Nach Ott bedingt Cocain in kleinen und grossen Gaben Verlust der Coordination und Abnahme der Motilität, ohne jedoch die Vorderstränge des Rückenmarks vollständig zu lähmen, erhöht in kleinen Dosen die Sensibilität, so dass die geringsten Reize allgemeine Convulsionen hervorrufen, vernichtet in grossen Dosen die Hinterstränge und die sensibeln Nerven, ruft constant Mydriasis hervor und tödtet durch Lähmung der Respiration, die es anfangs beschleunigt. Cocain steigert die Hauttemperatur, während die Innentemperatur anfangs sinkt, später im Stadium der Krämpfe ebenfalls erhöht wird; es vermindert die Secretion der Schleimhäute, beschleunigt die Darmbewegung und setzt in grossen Dosen die Erregbarkeit der motorischen Nerven herab, ohne die Muskeleerregbarkeit zu afficiren (von Anrep). Auf die Herzaction und den Blutdruck wirkt es in mittleren Gaben steigend, in sehr grossen herabsetzend (Ott, von Anrep); die Wirkung ist theils vom vasomotorischen Centrum, theils vom Herzen, die Pulsbeschleunigung nach von Anrep von frühzeitiger Lähmung der Hemmungsnerven abhängig. Mittlere Gaben können bei Kaninchen, welche nach 0,1 per Kilo in einigen Stunden zu Grunde gehen, selbst 30 Tage eingekürrt werden, ohne die Functionen und das Körpergewicht zu beeinflussen; hungernde Thiere gehen bei Einführung derartiger Cocainmengen ebenso rasch zu Grunde wie ohne dieselben (von Anrep). Wenn hiernach die der Coca nachgerühmten eigenthümlichen Wirkungen auf die peruanischen Indianer kaum auf das Cocain bezogen werden dürfen, wenn man nicht voraussetzen will, dass ein durch das Cocain hervorgebrachter rauschähnlicher Zustand das Bewusstwerden des Hungers und der Strapazen nicht zulasse, müsste die fragliche Wirkung auf einer anderen in den Cocablättern enthaltenen Substanz beruhen. Man ist geneigt, an das ätherische Oel zu denken, da die Versuche, welche in Europa mit trocknen Cocablättern und daraus dargestellten Präparaten gemacht wurden, nur ausnahmsweise Anklänge an jene Wirkungen bei den südamerikanischen Indianern zeigen, deren Authenticität von Pöppig, Tschudi u. A. vollständig verbürgt ist. Hallucinationen und phantastische Träume, wie sie bei den an habituellen Genuss der Coca gewöhnten Indianern, den sog. Coqueros, vorhanden sein sollen, hat von Europäern nur Mante-gazza bei sich selbst beobachtet. Nach Selbstversuchen von Gazeau mit täglich 10,0—20,0 Folia Cocae vermindert das Kauen die Speichelsecretion, bedingt Herabsetzung der Sensibilität an Zunge und Mundhöhle, beschleunigt die Verdauung, ohne den Magen zu reizen, setzt die Empfindlichkeit der Magenwandungen herab, woraus sich vielleicht die Möglichkeit, längere Zeit beim Cocagebrauch Fasten zu ertragen, erklären lässt, wirkt vermehrend auf die Harnsecretion und die Harnstoffausscheidung, steigert die Temperatur und führt zur Abnahme des Körpergewichts. Ott constatirte bei ähnlichen Selbstversuchen mit Cocablättern an sich zuerst vermehrte Speichelabsonderung und Wärmegefühl im Munde, bis zum Magen sich ausdehnend, ebenso in der Haut, nach dem Kauen von 10,0 geringe Beeinträchtigung der Coordination und eine Art Parese mit Neigung zu Träumereien, Kopfschmerz, Ohrentönen und geringer Pupillenerweiterung, mit Steigerung der Pulsfrequenz und der Temperatur und nachbleibender Tendenz zu Insomnie. Ganz im Gegensatz zu Gazeau fand Ott bei mehrtägigem Cocagebrauche Verminderung der Harnmenge und der Ausscheidung von Harnstoff und Kochsalz. Aehnliche Resultate hatte Mason (1882), der auch bei starken Märschen Harn und Harnstoffmenge stark vermindert fand. Dass die Qualität der Cocablätter deren Wirkung sehr influirt, beweisen zahlreiche Versuche Christisons und verschiedener seiner Schüler, welche nach einer durch angenehmen Geruch und schön grüne Farbe sich auszeichnenden Coca constatirten, dass dieselbe gekaut oder als Thee getrunken die Ausführung grösserer Märsche ohne Ermüdung ermöglichte und während derselben oder nach denselben das Hungergefühl stillte, was bei anderen

Präparaten nicht der Fall war. Im Ganzen hat Coca bisher wenig therapeutische Verwendung gefunden. Demarle und Gazeau empfahlen sie zuerst als topisches Reizmittel bei Stomatitis mercurialis, Entzündung des Zahnfleisches mit Geschwürsbildung, Dyspepsie der Phthisiker, Verdauungsschwäche im Allgemeinen und Gastralgie. Bei den genannten Mundaffectionen lässt man die Cocablätter kauen, während man bei Magenleiden sich entweder der Blätter in Pulverform oder daraus dargestellter Infuse und Decocte (2,0—8,0 : 100) oder eines flüssigen alkoholischen oder weinigen Auszuges (Tinctura Cocae) bedient. Mantegazza rith die Anwendung der Coca auch bei Schwächezuständen nach Blutverlusten und Typhus, bei Anämie, Scorbut, Hysterie und Hypochondrie, selbst bei Geisteskrankheiten mit depressivem Charakter an, Th. Clemens gegen das abnorm gesteigerte Hungergefühl epileptischer und blödsinniger Personen, Verardini bei Paralysen (in Verbindung mit Ergotin), Tanner bei physischer und psychischer Ermattung in Folge von Ueberanstrengung, Stockwell bei Cholera, congestiven Fiebern und hypochondrischen Beschwerden, Mac Bean zur Hemmung des Gewebszerfalls auf der Höhe des Typhus oder in der Reconvalescentz, so wie bei acuter und chronischer Lungenphthise, Fauvel bei Pharyngitis granulosa. Christison, Leeboddy und Edmonston empfahlen Coca diätetisch bei angestrengten Märschen, letzterer besonders zur Verhütung des Durstes, den Coca mehr als den Hunger beschränkt, jedoch nur beim Kauen, auch zur Verhütung von Erschöpfung bei langdauernden Fiebern, wo sich Cocaaufguss (1 : 20) oder Cocawein mit Erfolg anwenden lässt. Auf einen angestrengten Marsch rechnet man eine Dosis von 4,0—6,0.

*Acidum succinicum*, Bernsteinsäure, und *Oleum Succini rectificatum*, gereinigtes Bernsteinöl. — Zu den erregenden und antispasmodischen Mitteln rechnet man auch zwei aus dem Bernstein (S. 550) gewonnene Producte, die übrigens jetzt meist künstlich aus apfelsaurem Kalk dargestellte Bernsteinsäure oder Succinylsäure, *Acidum succinicum* s. *Sal Succini volatile*, und das durch trockene Destillation des Bernsteins neben der genannten Säure und Colophonium Succini resultirende theerartige, braune, unangenehm brenzlich riechende Bernsteinöl, welches bei erneuerter Destillation unter Wasserzusatz ein dünnes, farbloses oder gelbliches Oel, das früher officinelle *Oleum Succini rectificatum* oder gereinigte Bernsteinöl, liefert.

Die Bernsteinsäure des Handels bildet gelbliche, schwach säuerliche Krystallkrusten, welche beim Erhitzen in Dämpfen sublimiren, die Kratzen im Halse hervorrufen. Sie löst sich in 28 Th. kaltem und 2,2 Th. kochendem Wasser, leicht in Spiritus, wenig in Aether, nicht in Terpenthinöl. Ausser im Bernstein findet sie sich auch in einigen Braunkohlen, im Terpenthin, im Gifflattich, Wermuth, wahrscheinlich auch im Schöllkraut und verschiedenen anderen Pflaunen, kommt auch im thierischen Organismus unter physiologischen (Milz, Thymus, Schilddrüse, Urin) und pathologischen (Hydrocele) Verhältnissen vor und lässt sich künstlich auf verschiedene Weise, z. B. durch Fäulniss von Asparagin oder Apfelsäure, durch Oxydation der Fette, des Wachses und der Fettsäuren mit Salpetersäure erzeugen. Auch bei der alkoholischen Gährung tritt sie als Nebenproduct auf (Pasteur). Die Säure afficirt nach den über die Schicksale der bernsteinsauren Alkalien angestellten physiologischen Versuchen den gesunden Körper nicht erheblich. Hallwachs nahm 4,0—8,0 Säure auf einmal, ohne Beschwerde, während Schottin allerdings schon nach 0,7 unerträgliche Hitze und Kopfschmerz bekam (Verunreinigung mit Bernsteinöl?). In Form von Salzen eingeführt wird Bernsteinsäure theilweise, bei kleineren Dosen vielleicht ganz, zu Kohlensäure verbrannt, theilweise erscheint sie, wenn sie in etwas grösseren Dosen ingerirt wird, als solche im Urin (Wöhler, Meissner und Shepard, Rabuteau). Die von Kühne behauptete Umwandlung in Hippursäure ist von keinem späteren Untersucher bestätigt. Schottin constatirte Uebergang der Bernsteinsäure in den Schweiss.

Nach der Ansicht älterer Therapeutiker soll Bernsteinsäure nach Art der Benzoësäure excitirend, expectorirend und diaphoretisch wirken, doch abstrahirte man diese Effecte theils aus Versuchen mit Ammoniumsuccinat oder mit einer Säure, welche stark mit Bernsteinöl verunreinigt war. Man gab in älterer Zeit



die Säure als Erregungsmittel im Typhus, bei Krämpfen und Convulsionen, Hysterie und Epilepsie, spastischer Harnverhaltung, selbst bei Lähmung und Amaurose, in Pulver, Pillen oder alkoholischer Lösung, meist mit anderen erregenden Mitteln (Moschus, Campher) zu 0,3–1,0.

Das rohe Bernsteinöl giebt mit Salpetersäure ein dunkles, eigenthümlich, jedoch keineswegs moschusartig riechendes Product, den sog. Moschus artificialis. Das Oleum Succini crudum diene früher besonders als Zahnwehmittel, indem man einen damit befeuchteten Wattepfropf in den hohlen Zahn oder in den äusseren Gehörgang applicirte. Das gereinigte Bernsteinöl wirkt bei Application auf die äussere Haut reizend und innerlich genommen in grösseren Dosen giftig. Hirschberg (1869) beschrieb einen Fall von Vergiftung einer Erwachsenen durch 4,0, wo ausser örtlichen Erscheinungen (heftigem Magenschmerz, Brechneigung) auch entfernte (intensiver Kopfschmerz, Angst, Pulsbeschleunigung) hervortraten, welche sich erst nach einigen Stunden verloren. Das Präparat ist vorzugsweise Volksmittel und gilt als krampfstillend bei Hysterie und Epilepsie, Keuchhusten u. s. w., ferner als Sudorificum bei Rheumatismus, wo man übrigens auch äusserlich dasselbe zu Einreibungen verwendete. Die Dosis beträgt 5–10 Tropfen. Das Mittel gehört zu den widrigst schmeckenden und erfordert Administration in Gallertkapseln.

**Spiritus**, Spiritus vini rectificatissimus, Alcohol vini; **Weingeist**. Spiritus dilutus, Spiritus vini rectificatus; **Verdünnter Weingeist**. Vinum; **Wein**.  
**Spiritus vini Cognac**; Cognac, Franzbranntwein.

Zu den für die Arzneimittellehre wichtigsten Stoffen gehört der in zwei Formen officinelle Alkohol oder Aethylalkohol, welcher zwar selten für sich als Medicament benutzt wird, dagegen als Solvens und Extractionsmittel völlig unentbehrlich ist.

Der wasserfreie Alkohol oder Aethylalkohol,  $C^2H^6O$ , das zweitniedrigste Glied der einsäurigen oder fetten Alkohole (vgl. S. 20), entsteht bei der Gährung des Traubenzuckers unter dem Einflusse des Hefepilzes und wird vorzugsweise aus stärkeemehlhaltigem Material (Getreide, Kartoffeln), das zunächst durch den Process des sog. Einmaischens in Dextrin und Traubenzucker verwandelt, dann der Hefegährung unterworfen wird, dargestellt. Es resultirt dabei zunächst ein sehr wässriger Weingeist (sog. Lutter), welcher durch wiederholte Rectification für sich und schliesslich über wasserentziehenden Substanzen (Chlorcalcium, Aetzkalk) entwässert und von beigemengten übelriechenden Stoffen (Fuselöl) befreit wird. Der wasserfreie Weingeist bildet ein farbloses, dünnflüssiges, sehr bewegliches Liquidum von 0,7978 spec. Gew. (bei 20°), angenehm geistigem Geruch und brennendem Geschmack, welches bei 78° siedet, leicht entzündlich ist und mit blauer, wenig leuchtender Flamme zu Kohlensäure und Wasser verbrennt. Er erstarrt selbst bei  $-90^\circ$  nicht. An der Luft zieht er Wasser an und vermischt sich mit Wasser unter Erwärmung und Contraction. Ausser mit Wasser mischt er sich auch mit Aether, vielen zusammengesetzten Aethern, Sauren, Alkoholen und ätherischen Oelen und löst Fette, Harze, viele Pflanzenstoffe, Iod, Brom und viele andere Körper. Durch oxydirende Agentien wird er in Aldehyd und Essigsäure übergeführt. Chlor erzeugt aus Alkohol Aldehyd und Chloral, und durch Mitbetheiligung der gebildeten Salzsäure auch Aethylchlorür; ausserdem bei Anwesenheit von Wasser verschiedene andere Producte (vgl. Spiritus Aetheris chlorati). Salpetersäure wirkt in der Wärme nicht bloss oxydirend, sondern erzeugt verschiedene Verbindungen (vgl. Spiritus nitrico-aethereus). Kalium wird von Weingeist unter Wasserstoffentwicklung und Bildung grosser, wasserklarer Krystalle von Kaliumäthylat gelöst. Mit verschiedenen Chlormetallen, Nitraten u. s. w. verbindet sich Weingeist zu krySTALLISIRBAREN Alkoholaten.

Der Weingeist der Pharmakopoe ist kein völlig wasserfreier Weingeist

(Spiritus vini alcoholisatus s. absolutus), sondern enthält nur 90—91,2 Volumprocente oder 85,6—87,2 Gewichtsprocente wasserfreien Weingeists. Er hat ein spec. Gew. von 0,830—0,834 und theilt im Uebrigen die Eigenschaften des Spiritus absolutus. Der Spiritus dilutus ist eine Mischung von 7 Th. Weingeist und 3 Th. Wasser, wodurch das Präparat ein spec. Gew. von 0,892 bekommt und einem Gehalte von 67,5—69,1 Volumprocenten oder 59,8—61,5 Gewichtsproc. entspricht.

Therapeutisch wichtiger als die beiden officinellen Spiritusarten sind verschiedene als Genussmittel benutzte gegohrene, weingeisthaltige Getränke, namentlich der **Wein**, **Vinum**, neben welchem die Pharmakopoe auch ein Destillationsproduct des Weins, den **Cognac**, Spiritus Vini Cognac s. Spiritus Vini Gallici, aufgenommen hat.

Der Wein ist das durch Gähren des Saftes der Weintrauben erhaltene Getränk, dessen gewöhnliche Bestandtheile Traubenzucker, Glycerin, Schleim, Eiweiss, Farbstoff, Gerbstoff (die letzteren beiden hauptsächlich in den rothen Weinen), Weinsäure, Alkohol, Oenanthäther und andere Riechstoffe, sowie Kalium-, Natrium- und Calciumsalze sind. Man bringt die Weine nach ihrem Gehalte an Zucker und Alkohol in drei Abtheilungen, nämlich in gemeine oder Tischweine mit einem Alkoholgehalte von selten über 3—5% und verhältnissmässig viel freier Säure (selbst bis 12% bei jungen Landweinen), in edle Weine mit grösserem Alkoholgehalte (8—12%), verhältnissmässig weniger freier Säure und angenehmem, durch das reichlichere Vorhandensein von Oenanthäther und ähnlichen Stoffen bedingten Geschmack und Geruch (Blume oder Bouquet des Weines), und in Süssweine (Muscateweine oder Secte), welche sich durch einen grossen Zuckergehalt und Reichthum an Weingeist, der in der Handelswaare bis zu 20% betragen kann, auszeichnen. Zu diesen drei Abtheilungen kommt noch als vierte die der Schaumweine oder moussirenden Weine hinzu, welche in Folge künstlicher Unterbrechung der Gährung mit Kohlensäuregas imprägnirt sind. Früher schrieb die Pharmakopoe als für pharmaceutische Zwecke dienend Vinum generosum album, Vinum generosum rubrum und Vinum Xerense (Sherry, Xereswein) vor, von denen der letztere zu den Süssweinen gehört, während jetzt bestimmte Weinsorten, so weit solche nicht etwa zur Darstellung der Vina medicata dienen, nicht vorrätig gehalten zu werden brauchen. Von edlen Weiss- und Rothweinen finden bei uns vorzugsweise deutsche und französische Weine Anwendung, doch lassen sich selbstverständlich auch Oesterreicher, Schweizer und Ungarweine von analogen Eigenschaften verwenden. Im Allgemeinen sind die französischen etwas alkoholhaltiger als die deutschen, indem erstere meist 10—12, die letzteren 8—10% Weingeist einschliessen. Von deutschen Weinen pflegt man Rheinwein, Pfälzer-, Franken-, Mosel-, Neckar-, Badener Weine, Bergsträsser u. s. w., unter letzteren Roussillonweine, Bordeauxweine und Burgunderweine zu unterscheiden. Die Süssweine werden vorzugsweise in Südfrankreich (Muscate-Lunel), Spanien (Tinto, Malaga, Alicante, Xeres u. a.), Portugal (Porto oder Portwein, Cascavella) und auf den afrikanischen Inseln (Madeira, Teneriffa) bereitet. Zu bedauern ist, dass die Mehrzahl dieser alkoholreicheren Weine südlicher Länder der Verfälschung unterliegen oder gar durch Kunstproducte ersetzt werden, so dass z. B. im Handel kaum Portwein vorkommt, dem nicht absichtlich ein Zusatz von Sprit gemacht wurde. Noch mehr gilt solches von Madeira, Vinum Madeirense, der seit dem Auftreten der Traubenkrankheit nur noch in sehr geringen Mengen producirt wird, und von dem Malaga-weine (Vinum Malacense). Für den diätetisch-medicinischen Gebrauch dürften die ebenfalls zu den Secten gehörigen Hegyallaweine, im Handel gewöhnlich als Tokayer (Vinum Tocaiense) bezeichnet, unter welchen die mit dem Namen Ausbruch belegten die besten sind, den Vorzug vor den spanischen und portugiesischen Weinen haben, weil dieselben leichter unverfälscht zu beziehen sind. Ob sie ausserdem, wie Einzelne behaupten, durch einen Gehalt an Phosphaten besonders als Diäteticum im kindlichen Lebensalter Verwendung verdienen, mag dahin gestellt bleiben. Andere derartige Secte, z. B.

Capwein, Samos, Chios, haben für uns keine Bedeutung, ebenso sind die Schaumweine, welche bekanntlich vorzugsweise in der Champagne bereitet werden, für die Medicin von untergeordnetem Interesse.

Den sog. Landweinen, die früher als *Vinum bonum nostras* in manchen deutschen Staaten officinell waren, reihen sich die aus verschiedenen säuerlich-süssen Früchten (Johannisbeeren, Stachelbeeren u. s. w.) bereiteten Fruchtweine an, unter denen der aus Aepfeln bereitete Aepfelwein oder Cider (Cidera) der bekannteste ist. Die Phkp. schliesst diese Weine aus den Apotheken ebenso wie die in neuester Zeit viel vertriebenen Kunstweine völlig aus. Der Spiritus Vini Cognac gehört den sog. Branntweinen, Spiritus ardens, an, welche sich durch einen höheren Alkoholgehalt auszeichnen. Der durch Destillation schlechterer Weinsorten oder aus Weintrestern gewonnene, namentlich in der Gegend der französischen Stadt Cognac dargestellte Branntwein bildet eine klare gelbe Flüssigkeit von angenehmem geistigem Geruche und Geschmacke, einem spec. Gew. von 0,920—0,924 und dem Gehalte von 46—50 Gewichtsprocenten Alkohol. Der daraus durch Destillation gewonnene Weingeist muss frei von Fuselöl und nicht sauer sein. Ausser dem Cognac giebt es noch verschiedene, unter die Kategorie des Spiritus ardens fallende Spirituosa, welche nach dem Material, aus welchem sie bereitet werden, verschiedene Beschaffenheit besitzen und verschiedene Namen führen. So erhalten wir aus Zuckerrohrsaft den Rum, Spiritus Sacchari, und den ihm sehr ähnlichen Tafia oder Ratafia, aus gemalztem Reis und Arecanüssen den Arrac, Spiritus Oryzae, aus den Blütenkolben der Cocos- und Dattelpalme den Palmwein, aus Getreide den Kornbranntwein, Spiritus frumenti, aus Kartoffeln den Kartoffelbranntwein oder Fusel, Spiritus Solani tuberosi, aus Kirschen, Weichselkirchen, Pflaumen den Kirschgeist, Maraschino, Slivovitz u. a. m. Durch Destillation von Kornbranntwein über ätherisch-ölige Stoffe, wie Kümmel, Anis, Kalmus, Cardamomen, Pomeranzenschalen, Wachholderbeeren, imprägnirt sich derselbe mit den ätherischen Oelen und giebt feinere Sorten von Branntwein, die nach den benutzten aromatischen Materialien ihre Benennung erhalten. Dahin gehören auch die ursprünglich durch Vergährenlassen von Getreide mit Wachholderbeeren erhaltenen Gin (Genever) und Whisky. Durch Lösung von Zucker in derartigen Branntweinen oder durch Mischen von Weingeist, Wasser, Zucker und aromatischen Flüssigkeiten (ätherischen Oelen, den als Fruchtessenzen bezeichneten zusammengesetzten Aethern, selbst mit giftigen Stoffen, wie Nitrobenzin) erhält man die sog. Liqueure. Auch Arrac, Cognac und Rum werden jetzt häufig künstlich unter Anwendung der sog. Fruchtessenzen dargestellt. Der Gehalt der Branntweine an Alkohol schwankt zwischen 25 bis 50 %. Nur Rum und Arrac nähern sich der Stärke des Spiritus dilutus. Alle Branntweine enthalten neben dem Aethylalkohol noch geringe Mengen flüchtiger Riechstoffe, welche ihr Aroma bedingen. Bei Kornbranntwein und Kartoffelschnaps werden dieselben als Fuselöl bezeichnet, das im Wesentlichen ein Gemenge von Homologen des Aethylalkohols mit höherem Siedepunkte und höherem Kohlenstoffgehalte (Amylalkohol, Propylalkohol) bildet.

Dem Weingeist kommt sowohl eine örtliche als eine entfernte Wirkung zu, von denen die erste auffällig bei dem sehr concentrirten Spiritus, nicht oder kaum bei den meisten der als Genussmittel gebrauchten Dilutionen hervortritt.

Lösliches Eiweiss wird durch Alkohol coagulirt und löst sich dann kaum in kaltem und wenig in warmem Ammoniakwasser (Payen u. Henry). Diese Coagulation steht in directem Verhältnisse zur Concentration; je verdünnter der Alkohol ist, um so weniger Eiweiss coagulirt er und um so längere Zeit hat er nöthig, um Coagulation zu bewirken (Falck und Jacobi). Hierauf und auf der wasserentziehenden Wirkung beruht die kaustische und irritirende Action starker Alcoholici bei Einführung in den Magen, welche schon C. G. Mitscherlich bei Thierversuchen constatirte. Absoluter Alkohol erzeugt bei Thieren diffuse Schorfe an der hinteren Wand des Pharynx in der Speiseröhre und im Magen nebst Entzündung der Wandungen derselben. Auch bei Dilution mit gleichen Mengen Wasser kommt es bei Hunden zu Schmerzen, Schorfbildung



und Extravasation in dem Magen, Abnahme der Fresslust, Abmagerung und Tod in Folge von Inanition. Erst bei Dilutionen von 1:4 fehlen entzündliche Erscheinungen bei Thieren (Albertoni und Lussana). Die irritirende Wirkung starker Spirituosa beim Menschen giebt sich in ausgesprochenster Weise in dem chronischen Magenkatarrh zu erkennen, welcher bei habituellen Brantweinrinkern fast nie fehlt und meist mit Vomitus matutinus und sog. Wasserkolk, bisweilen mit tieferen Läsionen der Schleimhaut verbunden ist. Noch auffallender tritt Verätzung in manchen Fällen acuter Alkoholintoxication hervor, bei denen fetzige Massen abgestossener Schleimhaut per anum entleert werden können. Auch die chronische Enteritis der Säuer hat ihren Grund zum Theil in der örtlich irritirenden Wirkung des Alkohols. Das Gefühl von Brennen und Wärme im Munde und Schlunde, das ein tüchtiger Schluck Cognac oder überhaupt Alcoholic von 30–70 % unter gleichzeitig vermehrter Speichelsecretion hervorrufen und welches zusammen mit einem Gefühle von Constriction sich durch die Speiseröhre hindurch bis in den Magen fortsetzt, kennt die Mehrzahl der Leser aus eigener Erfahrung. Der einmalige Genuss solcher kleinen Mengen von Spirituosen stört übrigens die Verdauung keineswegs, ist vielmehr sogar geeignet, dieselbe zu fördern, indem, wie durch andere hyperämisirende Stoffe, reflectorisch Vermehrung des Magensaftes bewirkt wird (Cl. Bernard), andererseits der Alkohol selbst die Lösung der Fette fördern und dadurch zu deren Emulsionirung beitragen kann. Grössere Dosen, nach Parker und Wollowicz über 60,0 Brantwein, wirken entschieden ungünstig auf die Verdauung. Absoluter Alkohol hebt bei Thieren die Digestion völlig auf, berauschende Dosen stark verdünnten Weingeists stören dieselbe, während kleinere Mengen sogar fördernd zu wirken scheinen (Albertoni u. Lussana). Nach W. Buchners (1881) Versuchen mit künstlichen Verdauungsgemischen beeinflusst Weingeist als solcher bis zu 10 % die künstliche Digestion nicht, verlangsamt dieselbe bei Zusatz von 20 % und hebt sie bei noch höherem Procentsatze gänzlich auf. Reiner Alkohol wirkt nicht so störend wie manche Alcoholic, z. B. Marsala, Rothwein und Bier, während andere (Weisswein, mousisirende Weine) weit weniger oder überhaupt nicht verdauungsstörend wirken (W. Buchner). Das Verhalten der Alcoholic zur Peristaltik ist nicht immer constant; meist wird dieselbe durch grössere Mengen gesteigert.

Auf der äusseren Haut erzeugt Alkohol bei ungehinderter Verdunstung ein Gefühl von Kälte, bei gehinderter Verdunstung ein Gefühl von Brennen und selbst Schmerz mit nachfolgender Dermatitis und Exfoliation. In diluirtter Lösung scheint ihm ein beschränkender Einfluss auf die Schweisssecretion zuzukommen. Interessant ist die Beobachtung von Horvath, wonach auf – 5° abgekühlter Alkohol keine Schmerzen auf der äussern Haut bedingt, vielmehr den Schmerz aufhebt, während die tactile Sensibilität erhalten bleibt. Die Mastdarmschleimhaut wird noch durch 12,5 % Weingeistverdünnungen stark irritirt, das Unterhautzellgewebe durch 50 % (Albertoni und Lussana).

Die Resorption erfolgt von den verschiedensten Applicationsstellen aus, jedoch nicht mit gleicher Geschwindigkeit. Im Blute findet bei Einführung geringer Quantitäten fast vollständige Verbrennung statt, während nach grösseren Mengen Elimination eines Theils durch Harn (Perrin, Duroy und Lallemand), Lungenexhalation (Bouchardat, Pommer, Frerichs, Buchheim), Galle (Percy) und selbst durch die Milch stattfindet.

Schon Magendie wies die Resorption vom Rectum, von der Vagina und vom Peritoneum aus nach. Albertoni und Lussana (1874) zeigten, dass die Erscheinungen nach Einführung in Darmschlingen später als bei interner Application eintreten, dass bei Einbringung in das Rectum und bei subcutaner Injection die berauschende Dosis sich höher stellt als vom Magen aus und dass vom Peritoneum und von der Bronchopulmonarschleimhaut aus bei Injection von Weingeistverdünnungen die Berausung rascher erfolgt. Dass der Aethylalkohol als solcher in das Blut übergeht, was noch 1851 Morin bezweifelte, der eine Bildung von Aether im Magen annahm, ist zweifellos, obschon der Nachweis des Alkohols im Blute manchmal misslingt. Im Chylus ist derselbe bisher nicht

nachgewiesen. Viel schwankender sind die Anschauungen über die weiteren Schicksale des Alkohols nach seiner Resorption. Viele Autoren nahmen eine vollständige Oxydation des Alkohols im Blute an, als deren Endproducte Kohlensäure und Wasser erscheinen, wonach der Alkohol den Fetten und Kohlehydraten analog wirke und zu den sog. Respirationsmitteln gerechnet werden müsse (Liebig). Hierbei sollen nach Einzelnen diverse Zwischenproducte sich bilden, so Essigsäure, welche Bouchardat und Sandras nach dem Genusse von Spirituosen im Blute gefunden haben wollen, und anfangs Aldehyd, von welchem Duclak die entfernten Wirkungen des Alkohols auf das Gehirn ableitete. Die Gegenwart solcher Oxydationsproducte im Blut ist indess sehr zweifelhaft, da sie nicht sicher nachgewiesen sind und da bei Einführung anderer Alkohole derselben Reihe, welche noch schwieriger total verbrennbar sind (z. B. Caprylalkohol, Amylalkohol), zwar wohl die Alkohole, nicht aber deren Aldehyd und Essigsäure (bei Amylalkohol Valeraldehyd und Valeriansäure) nachweisbar sind. Albertoni und Lussana beziehen den Umstand, dass der Alkohol vom Magen aus stärker toxisch wirke als bei Einführung in eine Vene und dass bei Infusion in eine Vena mesaraica die toxische Dose eine geringere sei, auf die Bildung von Aldehyd in der Leber, von welchem schon 1,0 Trunkenheit und Anaesthetie bedingen, der aber seinerseits vom Magen aus 5mal schwächer als bei Infusion wirkt; indessen ist auch in der Leber nach Alkoholzufuhr Aldehyd bisher chemisch nicht nachgewiesen. Auch ist die Wirkung des Aldehyds nicht vollkommen der des Alkohols gleich, obschon beide in mancher Beziehung, z. B. in Hinsicht auf die Beschränkung der Fäulnis, übereinstimmen, indem nach Albertonis und Lussanas Versuchen Aldehyd weit mehr herabsetzend auf die Sensibilität als Alkohol wirkt und selbst bei stärkerer Intoxication die Zahl und Energie des Herzschlages und den Blutdruck nicht herabsetzt, wie dies Alkohol in grösseren Dosen thut. Im Gegensatze hierzu lieferten Perrin, Duroy und Ludger Lallemand den Nachweis, dass der Alkohol unverändert in den Urin und die Transpiration übergeht und bei toxischen Dosen im Blute und den verschiedensten Organen (Leber, Hirn, Rückenmark, Zellgewebe, Muskeln), wo er sogar in der doppelten und dreifachen Menge wie im Blute existirt, nachgewiesen werden kann. Dieselben fanden den Alkohol im Urin bei Menschen schon  $\frac{1}{4}$  Stunde nach dem Genuss von etwa 40,0 Branntwein und noch 15 Std. nach dem eines Liter Weins wieder. Die Elimination des Alkohols fand weitere Bestätigung durch Hugo Schulinus, welcher jedoch bezüglich der Vertheilung im Thierkörper zu dem Resultate gelangte, dass Leber und Gehirn nicht mehr Alkohol aufnehmen als Lungen, Herz und Muskeln, und ausserdem den Nachweis lieferte, dass in den Organen und Secreten alkoholisirter Thiere niemals die ganze Menge Alkohol sich nachweisen lässt, vielmehr schon  $2\frac{3}{4}$  Stunden nach der Injection in den Magen bereits  $\frac{1}{4}$  der resorbirten Alkoholquantität verschwunden ist. Wie Baudot (1863) die beim Menschen nach dem Genusse mässiger Mengen von Spirituosa (Wein, Kirsch, Rum oder Branntwein) durch Harn, Perspiration und Athmung eliminirten Alkoholquanta als unerheblich bezeichnete: haben auch Anstie und Dupré die Winzigkeit der eliminirten Weingeistquantitäten bei Einführung kleiner Dosen ziffermässig belegt. Auch bei berauschenden Weingeistmengen wird nach Dupré selten mehr als 1% durch den Harn eliminirt; die Elimination dauert dabei nicht länger als 9–12 Stunden (Dupré). Auch bei Fieberkranken ist nach Einführung grösserer antipyretisch wirkender Dosen die Elimination durch den Harn äusserst gering (Heubach) und durch die Lungen gleich Null (Binz und Schmidt). Andere Resultate hat Subbotin bei Versuchen an Kaninchen erhalten, bei denen schon in den ersten 5 Stdn. 4,85% der eingeführten Spiritusmenge durch Lungen und Nieren und 2% durch den Harn eliminirt wurden und die Elimination bis 24 Stunden fort dauerte.

Die entfernte Wirkung des Aethylalkohols macht sich vorzugsweise in doppelter Richtung geltend, einerseits auf das Nervensystem und insbesondere auf das Gehirn, andererseits auf das Blut und den Stoffwechsel. Diese Actionen sind nach den Dosen und nach der Art und Weise der Einverleibung in mannigfacher Weise

variabel und geben sich in Hinsicht auf das Nervensystem bei kleinen Mengen vorzugsweise in erregender (Rausch), bei sehr grossen in deprimirender Richtung (Sopor u. s. w.) zu erkennen. Die cerebralen Erscheinungen scheinen anzudeuten, dass zuerst (bei kleinen Mengen fast ausschliesslich) das Grosshirn, später Kleinhirn und Varolsbrücke (daher Störungen der Coordination) und schliesslich das verlängerte Mark (daher die respiratorischen Störungen) und auch wohl die Medulla spinalis (Auftreten von Convulsionen) getroffen werden. In welcher Weise die Einwirkung des Alkohols auf die Nervencentra sich geltend macht, ob durch directe Action auf die Nerven Elemente oder indirect durch Hervorrufung von Hyperämie des Gehirns, wie sich solche bei tödtlich verlaufener Vergiftung mit alkoholischen Getränken meist findet, ist eine unentschiedene Frage.

Die Wirkungen kleiner Dosen spirituöser Getränke, so weit sie aus subjectiven Erscheinungen erschlossen werden können, sind männiglich so bekannt, dass eine detaillirte Schilderung überflüssig erscheint. Ausser den bereits oben erwähnten örtlichen Reizungserscheinungen tritt bei einmaliger Einführung ein subjectives Wärmegefühl, das bei Wiederholung der Dosis sich in verstärktem Maasse geltend macht und mit einer vermehrten Blutzufuhr zu den Hautcapillaren in Verbindung steht, im ganzen Körper hervor. Mit diesem subjectiven Wärmegefühl verbindet sich die Empfindung allgemeinen Wohlbehagens, grössere Lebhaftigkeit der Muskelbewegungen und nicht selten Pulsbeschleunigung und leichte psychische Erregung. Bei Wiederholung solcher Dosen kommt es zu dem Rausch, der, wie dies Kubick 1846 ausführlich schilderte, nach der Individualität grosse Differenzen in seiner äusseren Erscheinung zeigt und bei welchem auf länger anhaltende Excitation eine geringe Depression folgt, weiterhin zur Betrunketheit, wo zu den psychischen Excitationsphänomenen, welche das vorwaltende Ergriffensein des Grosshirns andeuten, Erscheinungen sich gesellen, welche auf tiefere Perturbationen des Gross- und Kleinhirns schliessen lassen. Dahin gehört die stammelnde, lallende Sprache, die Unsicherheit des Ganges und der Muskelbewegungen überhaupt, die Beeinträchtigung des Coordinationsvermögens der Betrunknen, welche den Uebergang zu einer Umkehrung der vorherigen Lebhaftigkeit zu einer Abstumpfung der Perception, des Gedächtnisses und des Urtheilsvermögens und zu dem sonst normalen, aber tiefen Schläfe machen, in welchen der Betrunkene, meist nach stattgehabtem Erbrechen, verfällt und aus welchem er mit den ausgesprochenen Symptomen des acuten Magenkatarrhs (Katzenjammer) erwacht. Auch das Bild der Betrunketheit zeigt Variationen nach Charakter und Temperament, und kann es in einzelnen Fällen selbst zu Anfällen transitorischer Manie, zu Wuthausbrüchen und Delirien kommen, welche keineswegs immer von besonderen Arten der Spirituosa (Absinth) abhängen, wie dies von Einzelnen behauptet wird. Ein noch höherer Grad der Einwirkung der Spirituosa, wenn dieselben in enormen Quantitäten auf einmal consumirt werden, stellt die acute Alkoholvergiftung (Bessoffenheit) dar; hier geht das Bewusstsein und die Empfindung für alle äusseren Eindrücke völlig verloren und entwickelt sich rasch ein Zustand von Coma, in welchem das Gesicht meist blau und gedunsen, bisweilen blass und collabirt, die Augen vorgetrieben, injicirt, stier und glänzend, in anderen Fällen geschlossen, die Pupillen erweitert, selten verengert, bisweilen eigenthümlich oscillirend, die Respiration langsam, röchelnd und pfeifend, bisweilen stertorös, der Puls schwach, kaum fühlbar, in der Regel verlangsamt, die Musculatur schlaff, die Haut kalt und klebrig erscheinen. Dieser Zustand kann allmählig, meist nach zuvor stattgehabtem Erbrechen und unter dem Auftreten warmen reichlichen Schweisses, in gesunden Schlaf und Genesung übergehen, es kann jedoch auch der Tod eintreten, welchem unwillkürlicher Abgang von Urin und Koth, in anderen Fällen Zuckungen der Gesichtsmuskeln, Trismus und selbst allgemeine klonische und tonische Convulsionen (nach Magnan u. A.



besonders constant nach dem Genusse von Absinth, aber entschieden auch nach anderen Spirituosen) vorangehen. Der Tod ist mitunter ein apoplektischer, meist ein asphyktischer (durch Lähmung des respiratorischen Centrums bedingt) und kann in beiden Fällen schon wenige Minuten nach der Ingestion des Giftes eintreten, während in anderen Fällen der soporöse Zustand 24 Stdn. und länger anhält.

Die Erscheinungen seitens des Nervensystems nach Einführung von kleinen und grösseren Mengen von Alkohol bei Thieren sind im Wesentlichen die nämlichen wie bei den Menschen. Grössere Dosen (25,0—30,0 bei Kaninchen und Hunden) erzeugen auch hier Lähmung der Motilität und Empfindung, leichte Convulsionen der Extremitäten und der Augenmuskeln, Myosis und später Mydriasis, aussetzende und schwache Respiration und vibrirenden, fadenförmigen Puls; der Tod tritt meist in 1—2 Stdn. ein. Analog sind auch die Symptome bei Einbringung von 20—40—60 % Alkohol in die Drosselader, während bei Injection von 70—80 % Weingeist sofortige Coagulation des Blutes in den Lungenarterien eintritt (Falek und Jacobi).

Nach Albertoni und Lussana steht die Giftigkeit des Alkohols bei den verschiedenen Thierclassen in Beziehung zu der verschiedenen Entwicklung des Gehirns, so dass z. B. beim Menschen intellectuelle Störungen nach 0,4 per Kilo erfolgen, während bei Hunden 1,5 auf 1000,0 Körpergewicht, sowohl vom Magen aus als bei directer Application in die Venen, die Motilität beeinträchtigen und 0,5 per Kilo bei Ingestion per os den Tod herbeiführen. Bei Hühnern und Tauben wird die Motilität durch 1,5 und das Bewusstsein durch 4,0 gelähmt; Frösche ertragen ohne Befindensänderung eine Quantität, welche  $\frac{7}{1000}$  ihres Körpergewichts entspricht, und sterben erst von Mengen, welche etwa  $\frac{1}{100}$  ihres Körpergewichts betragen.

Dass der Alkohol seine Wirkung auf das Gehirn directer chemischer Affinität zu dessen Bestandtheilen verdanke, hat man daraus geschlossen, dass bei Thieren, welche Alkohol als Berausungsmittel erhielten, sich verhältnissmässig grosse Mengen Weingeist im Gehirn finden, und zwar sehr viel mehr als im Blute (Percy, Lallemand, Perrin und Duroy). Von Einzelnen sind sogar bestimmte Bestandtheile der Nerven als durch den Alkohol betroffen bezeichnet, so Protagon (L. Hermann) oder gar das als Kunstproduct erkannte Myelin (Gubler). Dass derartige Hyperämien, wie wir sie bei Personen und Thieren fast constant finden, welche an Alkohol zu Grunde gegangen sind, schon an sich soporöse Zustände hervorrufen können, kann keinem Zweifel unterliegen. Andererseits kann aber auch extreme Blässe der Hirnsubstanz (Todd) oder Anämie im Schädel (Casper) vorkommen. Neumann sah bei directer Beobachtung nach Einführung mittelgrosser Weingeistmengen in den Magen deutliche Erweiterung der Hirngefässe, insonderheit auch der arteriellen, während sehr grosse Verengerung oder abwechselnd Verengerung und Erweiterung erzeugten.

Neben den auf ein Ergriffensein der Nervencentra hindeutenden Erscheinungen bewirkt der Aethylalkohol von der Dosis abhängige Veränderungen des Herzschlages und des Blutdrucks, daneben bei physiologischen und toxischen Gaben — wenigstens in der Regel — Sinken der Temperatur.

Dass eine einmalige Zufuhr mittlerer Alkoholmengen in der Regel beim Menschen die Pulsfrequenz erhöht, ist sicher; doch folgt auf die vorübergehende Erhöhung auch eine Verlangsamung. Bei Kaninchen ist das Nämliche der Fall; bei Fröschen sinkt die Zahl der Herzschläge, bei Katzen und Hunden bedingt Einbringung nicht conc. Alkohols in den Magen keine constante Veränderung (Zimmerberg). Der arterielle Druck sinkt bei Vergiftung vom Magen aus selbst bis zu 15 % der ursprünglichen Druckhöhe, bei Injection in die Jugularis ist ebenfalls Sinken ausgesprochen; Vagusdurchschneidung steigert die Druckhöhe über die Norm und erhöht die Pulsfrequenz sofort (Zimmerberg). Entschiedene Zunahme der Herzfrequenz, und zwar proportional den Alkoholmengen, und gleichzeitig der Arbeitsleistung wollen Parkes u. Wollowicz constatirt haben; doch folgte auch in ihren Versuchen schliesslich unge-

wöhnliche Schwäche des Herzmuskels gleichzeitig mit Erweiterung der peripherischen Gefässe. Nach Albertoni und Lussana wird bei Einführung von 100,0—200,0 Weingeist in Verdünnung bei gesunden Menschen die Energie des Herzschlages gesteigert und die Höhe des aufsteigenden Schenkels der Pulscurve vermehrt; gleichzeitig erfolgt aber durch Erweiterung der peripheren Gefässe Sinken des Blutdrucks und Dikrotismus des Pulses. — Die Respiration bleibt bei kleinen Dosen ziemlich unverändert; ausnahmsweise wird dieselbe tiefer und seltener.

Wohl über keinen Gegenstand ist in neuerer Zeit so viel experimentirt worden wie über den Einfluss des Alkohols auf die Körpertemperatur. Nachdem Edw. Smith (1859) bei sich und seiner Familie das Sinken derselben als Alkoholwirkung constatirt hatte, wiesen es Demarquay und Leconte zuerst bei verschiedenen Warmblüthern nach, an denen sowohl für kleine (beim Hunde z. B. für 2 Ccm. 86% Alkohol) als für grosse Dosen die temperaturerniedrigende Wirkung durch die verschiedensten Experimentatoren (Tscheschischin, Marian Sulzinsky, Binz, Bouvier, Ringer, Magnan, Albertoni und Lussana, Dumouly u. A.) dargethan wurde. Auch beim gesunden Menschen kann das Sinken der Temperatur durch Einführung nicht zu diluirten Spiritus selbst bei kleineren Mengen, welche nicht berauschend wirken, als Regel angesehen werden, doch können auch Gleichbleiben der Temperatur oder selbst Zunahme derselben (Obernier, Rabow, Albertoni und Lussana) vorkommen. Nach ausgedehnten Versuchen von Riegel (1872) mit weissem Frankenweine von 10,8%, rothem Ungarweine von 9,9%, rothem Bordeaux von 9,9%, echtem Malaga von 13,8% Alkoholgehalt und mit mehr oder minder diluirtem Weingeist ergiebt sich, dass bei jugendlichen und an Alkoholgenuss nicht gewöhnten gesunden Individuen und Reconvalescenten geringe Mengen Spirituosa (1 Schoppen Franken- oder Ungarwein und darunter) selten beträchtliche Temperaturveränderung, meist nur einen geringen Abfall von einigen Decigraden bewirken, und dass bei Versuchen mit steigenden Dosen der Temperaturabfall im geraden Verhältnisse zur Grösse der Dosis steht. Wahrscheinlich wirkt bei den schwankenden Resultaten nach Einführung kleiner Dosen die rasche Verbrennung des Alkohols im Organismus mit, wodurch Wärme gebildet wird, während bei grösseren, wo der Alkohol als solcher im Blute und in den Geweben länger verweilt, dessen hemmender Einfluss auf die Oxydation prävalirt, wozu dann noch Förderung der Wärmeabgabe durch Anregung der Haut- und Lungenthätigkeit hinzukommt. Auch die ungleiche Wärmevertheilung durch Zuströmen des Bluts zur Körperoberfläche, wodurch diese auf Kosten der inneren Organe erwärmt werden, ist für das Sinken der Mastdarmtemperatur von Bedeutung (Brunton). Die durch den Alkohol bedingte Begünstigung der Wärmeabgabe erhellt besonders aus den enorm niedrigen Temperaturen, z. B. von 24° bei Personen im höchsten Stadium der Betrunketheit, wenn gleichzeitige Wärmeentziehung durch kalte Umgebung stattfindet, während sonst bei derartig Betrunkenen der Temperaturabfall in der Regel nur 2° beträgt. Lewis und Sanderson führen die durch Alkohol bedingte Herabsetzung der Temperatur einzig und allein auf die Dispersion der Wärme durch Lähmung der peripheren Vasomotoren zurück, während sie in den Geweben selbst stärkere Wärmeproduction durch Alkohol statuiren. Dass die Weine vermöge ihres Gehaltes an Oenanthäther und analogen Stoffen nicht anders auf die Temperatur wirken wie reiner Aethylalkohol, beweisen theils die gleichen Resultate Riegels bei Wein- und Alkoholfuhr, theils Versuche von Albertoni und Lussana, wonach Oenanthäther zu 1,0 und Buttersäureäther zu 3,0—5,0 intern weder die Temperatur beeinflussen noch überhaupt krankhafte Erscheinungen herbeiführen.

Die Einwirkung auf die Temperatur steht offenbar im Zusammenhange mit einer Herabsetzung der Verbrennung, welche sich auch durch die verminderte Ausscheidung von Harnstoff und anderen Harnbestandtheilen mit oder ohne gleichzeitige Vermehrung der Harnmenge (Marvaud, Riess) zu erkennen giebt. Auch die Ausscheidung der Kohlensäure wird durch Alkohol vermindert (Prout, Vierordt, Perrin).

Die neuerdings von Rabuteau stark accentuirte Vermehrung der Diurese durch Spirituosa (derselbe fand nach 100 Ccm. Cognac in den 3 Std. nach der Einführung die Harnmenge 5—6mal so gross wie nach 100 Ccm. Wasser) ist auch früher (1869) schon von Obernier neben Verminderung der Harnstoffmenge, Abnahme des spec. Gew. und Zunahme der sauren Reaction hervorgehoben. Die Verminderung des Harnstoffs fand Rabuteau nach 200 Ccm. Alkohol gleich 25%. Riess (1880) fand bei nicht fiebernden Personen nach 60,0 bis 80,0 und 160,0—320,0 in Verdünnung pro die constant starke Verminderung des Harnstoffs, des Chlornatriums, der Schwefelsäure, Phosphorsäure und Harnsäure, während nach den kleineren Gaben die Harnmenge nicht erheblich, bei den grösseren bedeutend vermehrt wurde. Nach Rabuteau wirkt Rothwein in Folge seines Tanningehaltes viel weniger diuretisch als Branntwein und Weisswein und steht die Vermehrung der Diurese in Zusammenhang mit einer Verminderung der Diaphorese. Im Gegensatz zu Obernier und Rabuteau constatirten übrigens Parkes und Wollowicz bei einem (wahrscheinlich an Alkoholgenuss gewöhnten) Soldaten keine Veränderung des Harnstoffes und der Harnmenge. Munk fand bei Hunden im Stickstoffgleichgewicht nach kleinen Alkoholgaben die Stickstoffausscheidung um 6—7% geringer, bei grossen Dosen gesteigert, ohne dass die vermehrte Harnstoffausscheidung durch die Vermehrung der Diurese zu erklären war. Auch Fokker erhielt bei gleichen Versuchen mit kleinen Dosen stärkere Verminderung der Stickstoffausscheidung als bei grösseren.

Worauf die Veränderung des Stoffwechsels beruht, ist eine nicht von allen Seiten gleich beantwortete Frage. Liebig nahm an, dass der Alkohol zu seiner Verbrennung viel Sauerstoff erfordere, welcher somit den stickstoffhaltigen Materialien entzogen werde, in Folge wovon die Verminderung des Harnstoffes sich ergebe; indessen wird damit nicht auch die Verminderung der Kohlensäureausscheidung sich erklären, die freilich E. Smith für abhängig von der Art des spirituösen Getränkes hält, indem nach reinem Alkohol, Rum, guten Bieren und Xeres Steigerung, dagegen bei Gin und Brandy Verminderung derselben erfolgen solle. Eine Einwirkung des Alkohols auf das Blut und die rothen Blutkörperchen wird von Albertoni und Lussana in Abrede gestellt, indem verdünnter Alkohol auf Blutkörperchen ausserhalb des Körpers nicht wesentlich anders wie Wasser wirke und bei directer Injection von 50% Weingeist im Verhältniss von 1,0 absolutem Alkohol auf 1000,0 Körpergewicht Veränderungen des Blutes nicht resultiren. Dagegen behauptet L. Hermann, dass directe Zuleitung von Alkoholdämpfen zum Blut lösend auf die rothen Blutkörperchen wirke, in welcher Beziehung sich Alkohol den Anaesthetica anschliesse, zu welchen jedoch Albertoni und Lussana den Weingeist nicht gerechnet wissen wollen, da die Sensibilität vollständig nur bei stark toxischen und letalen Dosen schwinde. Nach Bouchardat macht Weingeist arterielles Blut dunkler, nach Manassein verkleinert er die Dimensionen der rothen Blutkörperchen, die in Folge davon auch weniger Sauerstoff an die Gewebe abgeben können. Schmiedeberg nimmt an, dass Alkohol den Sauerstoff fester an das Haemoglobin binde. Gegen die Ansicht, dass die Temperaturerniedrigung von Oxydationshemmung abhängig sei, wird der schnelle Eintritt der ersteren geltend gemacht; für dieselbe spricht, dass auch die postmortale Temperatursteigerung durch Alkohol verhindert wird, wie auch die Temperatursteigerung nach Durchtrennung des Rückenmarks durch Alkohol herabgesetzt wird. Die Beziehungen der bei chronischem Alkoholmissbrauche entstehenden Verfettung verschiedener Organe, insonderheit der Leber (Säuferleber), zur Hemmung der Oxydation durch Spiritus sind noch nicht ganz aufgeklärt, aber wahrscheinlich findet enger Zusammenhang statt.

Auf die Hemmung der Oxydation durch Alkohol dürfte ferner theilweise die Beobachtung des Auftretens von Brandblasen auf der Körperoberfläche bei länger dauerndem Coma alcoholicum (Mitscherlich, Heinrich) zu beziehen sein, auf welches Phänomen vielleicht die durch Liebig längst widerlegte Fabel der Selbstverbrennung (Tachencausis) unter dem Einflusse unmässigen Genusses spirituöser Getränke sich reducirt.

Wohl eng im Zusammenhange mit der durch den Alkohol bedingten Oxydationshemmung steht die bekannte antiseptische



Wirkung desselben, welche ihn längst als Conservationsmittel organischer Substanzen in mannigfaltigster Weise gebrauchen lässt.

Trotz der vielfachen Benutzung des Alkohols zur Conservirung organischer Materien ist derselbe als Antisepticum anderen Antiseptica gegenüber entschieden sehr schwach. In Hinsicht auf die Hinderung der Bacterienentwicklung wirkt er 400mal schwächer als Sublimat. 40mal schwächer als Thymol und 4mal schwächer als Carbolsäure. In Bezug auf die Behinderung des Fortpflanzungsvermögens von Bacterien wird er vom Chlor 500mal, vom Thymol 45mal, von der Carbolsäure mindestens 6mal übertroffen. Die relativ geringe fäulnissbeschränkende Wirkung beweist der Umstand, dass kleine Mengen Alkohol sowohl im frischen als im faulen Muskelfleisch, Gehirn und Leber sich finden (Béchamp); auch findet bei Säuern Verzögerung der Fäulniss nicht statt.

Die Wirkungen des Alkohols erfahren bedeutende Modification durch die Gewöhnung, indem durch habituellen Genuss nicht allein die Menge, welche Gehirnerscheinungen zu produciren im Stande ist, für das einzelne Individuum immer eine grössere wird, sondern auch die Temperatur nicht allein bei Gewohnheitstrinkern, sondern auch bei längerer Darreichung an Personen, welche nicht dem Genuss der Spirituosa ergeben sind, nicht mehr beeinflusst wird (Riegel).

Der habituelle Missbrauch spirituöser Getränke, insbesondere stärkerer (Branntwein, Portwein, Porter und Ale), führt zu einer Reihe von pathologischen Processen, welche unter dem Namen der chronischen Alkoholvergiftung, *Alcoholismus chronicus*, zusammengefasst werden und zum Theil auch bei Thieren (Dahlström, Magnan) künstlich erzeugt werden können. Die äusserst variablen Krankheitsformen, deren genaueste Schilderung wir dem schwedischen Arzte Magnus Huss verdanken, betreffen theils die gesammte Ernährung (*Cachexia alcoholica*, *Polypiosis alcoholica*), theils einzelne Organe, unter denen das Gehirn (*Delirium potatorum* u. a. psychische Affectionen ex abusu spirituosorum) u. a. Nervenpartien (*Tremor alcoholicus*), die Leber (*Fettleber*, *Cirrhose*, sog. *Gindrinks liver*) und die Haut (*Acne rosacea*) am häufigsten afficirt werden, denen sich Nieren und Circulationsapparat (Herzverfettung, *Atherom*) anreihen. Auf diese interessante Partie der Alkoholwirkung einzugehen, wäre ein unberechtigter Eingriff in den Besitzstand der Pathologie und Toxikologie.

Die mannigfache Wirkungsweise des Alkohols und der Spirituosa lässt diese auch in verschiedenen Richtungen als Arzneimittel verwerthen. Die coagulirende Action auf Eiweissstoffe und die darauf basirende kaustische und irritirende Wirkung rechtfertigt die externe Anwendung zu verschiedenen Zwecken, unter denen die derivatorische Einreibung bei Sugillationen, Contusionen, Rheumatismus und schmerzhaften Affectionen die verbreitetste ist.

Dass bei Einreibungen verschiedener spirituöser Tincturen und sog. Spiritus (*Arnica-tinctur*, *Seifenspiritus* u. s. w.) bei Quetschungen u. dgl. der Spiritusgehalt Hauptantheil an der Wirkung hat, ist zweifellos. Franzbranntwein und Salz als Trost aller Schmerzleidenden ist bekannt genug. Als Derivans wirken auch die von M. Hall empfohlenen mit Spiritus befeuchteten Compressen bei Phthisikern (in der Subclaviculargegend applicirt), sowie die Umschläge (mit verhinderter Verdunstung) bei acutem Rheumatismus articulorum (Goolden). Auch bei Exanthemen ist Spiritus verwandt, z. B. bei Erysipelas (*Balbani*, wie *Iodtinctur*), bei Variolapusteln zur Beschränkung der Narbenbildung (*Jones*). Hieran reiht sich die oft höchst erfolgreiche Anwendung in conc.

Weingeist getauchter Compressen bei Furunkeln, die danach abortiv zu Grunde gehen (Nélaton) und bei Geschwülsten der Mamma.

Nicht ohne Erfolg lässt sich Alkohol zur Erzielung adhäsiver Entzündung bei Hydrocele (zu 8,0 nach Richard pure oder verdünnt), wogegen früher Einspritzung von heissem Rothwein besonders in England üblich war, benutzen. Auch andere Cysten, sowie Ascites hat man in dieser Weise zu heilen versucht; doch ist namentlich bei Ascites der Erfolg sehr precär. Wie früher Riberi aromatischen Wein in erectile Geschwülste injicirte, benutzt neuerdings mit vorzüglichem Erfolge Schwalbe Alkoholinjectionen bei Struma und Varicen (in die Nähe der Phlebektasie gespritzt). Leroy d'Etiolle brachte Spiritus mittelst Haarröhrchen sogar in Aneurysmen ein, um das Blut im Sacke zu coaguliren. In der That ist der Alkohol ein Hämostaticum, das sowohl bei Nasenbluten als bei Metrorrhagien Anwendung gefunden hat, indessen bei Gebrauch von zu starkem Spiritus zu Verätzung und Entzündung der Scheide und des Uterus führen kann. Hieran reiht sich die manchmal ausserordentlich erfolgreiche Anwendung kleiner Mengen Brantwein als Stypticum bei chronischer Diarrhoe im kindlichen Lebensalter, wogegen man übrigens auch Rothwein (wegen des Tanningehaltes) oft mit Nutzen verwendet. Auch als Protectivum kann Alkohol vermöge seiner Affinität zu Eiweissstoffen dienen, z. B. bei wunden Brustwarzen (Brantwein mit Rosenwasser und gebranntem Zucker nach Nägele), bei Decubitus, wo man ihn prophylaktisch zum Abhärten der Haut in die Umgebung der dem Druck ausgesetzten Hautpartie einreibt.

Ferner gehört hierher die sehr empfehlenswerthe Behandlung von Jucken und Kitzelgefühl in den Ohren, sowie von frischer Otitis externa mit 80–90% Spiritus, mit oder ohne Zusatz von etwas Sublimat in der Weise angewendet, dass der äussere Gehörgang 2–3mal täglich 5 Min. lang damit gefüllt und dann mit Charpie verstopft wird (Weber-Liel). Politzer (1880) empfiehlt öfteres Eingiessen von Alkohol in das Ohr zur Beseitigung von nicht entfernbaren Polypenresten im äusseren Gehörgange, am Trommelfell und in der Trommelhöhle, bei multiplen Granulationen an diesen Theilen und diffuser excessiver Wucherung der Mittelohrschleimhaut. Gosselin empfahl verdünnten Spiritus bei Conjunctivitis purulenta, Bronn bei Gonorrhoe, wo übrigens schon lange Rothwein (wegen dessen Tanningehalt) als Injectionsflüssigkeit für sich oder als Träger adstringirender Stoffe geschätzt ist.

Auf der irritirenden Action des Alkohols beruht auch seine Verwendung als Digestivum bei Dyspepsie, wo namentlich Brantwein in kleinen Mengen oft ausgezeichnete Dienste leistet. Inwieweit die Erfolge bei Vomitus gravidarum (Rothwein) Effect örtlicher oder entfernter Wirkung sind, steht dahin.

Sehr beliebt ist die Anwendung von Brantwein oder Rothwein zur Beschränkung der Schweisssecretion, besonders bei Phthisikern. Auch fötide Fusschweisse werden durch Waschen mit Brantwein beseitigt.

Die local anästhetische Wirkung kalten Alkohols lässt sich nach Horvath sowohl vor Operationen als bei Verbrennungen anwenden, welche letztern dadurch sogar besser als unter gewöhnlichen Verhältnissen heilen sollen, wie überhaupt Alkohol ein altes Mittel bei schweren Verbrennungen in englischen Bergwerken ist (Sydenham, J. Bell).

Als antiseptisches Verbandmittel hat Alkohol in Guérin, M. Sée, Nélaton, Maisonneuve, Borlée, Perrin u. a. französischen Aerzten warme Fürsprecher gefunden.

Die Anwendung von Wein als Verbandmittel ist uralte (Hippokrates), die des Brantweins datirt schon von Arnoldus von Villanova; das Verdienst der Wiedereinführung kommt Batailhe zu. Guérin sucht die günstigen Erfolge des Alkohols bei Wundbehandlung darin, dass er, abgesehen von der dadurch bedingten topischen Anästhesie, zuerst blutstillend durch Contraction der Gefässe und Beschleunigung der Blutgerinnung wirkt, dass er durch Hemmung

capillärer Blutungen und Mehrung plastischer Exsudation die Vernarbung fördert, dass er bei frischen Wunden entzündungswidrig wirkt, bei alten die wuchernden Granulationen beschränkt, endlich, dass er Entstehung und Fortschreiten von Gangrän und, indem er den Eiter coagulirt und dessen Secretion vermindert, das Auftreten von Septicämie verhindert. Die analoge günstige Wirkung diverser Tincturen (Aloëtinctur, Campherspiritus u. s. w.) ist ohne Zweifel zum grossen Theile Alkoholwirkung.

Als belebendes Mittel im Collapsus, um drohendem Sinken der Herzthätigkeit entgegenzuwirken, z. B. in acuten Krankheiten, nach Verletzungen und Operationen und bei acuter Erschöpfung überhaupt sind vorzugsweise die Weine in Gebrauch; doch können auch im Nothfalle andere Spirituosa benutzt werden.

Man bevorzugt gewöhnlich den Champagner oder andere moussirende Weine, doch sind alle guten Weine und selbst Brantweine zu verwenden. Im Nothfalle applicirt man dieselben per clysm (nach Williams z. B. bei schweren Geburten) oder warm in Form von Einreibungen (z. B. bei Cholera). Hierher gehört auch theilweise die Anwendung der Spirituosa bei narkotischen Vergiftungen (Vergiftung durch Opium, Kohlenoxyd u. s. w.), wo man neben der Herzthätigkeit auch die Hirnthätigkeit anzuregen beabsichtigt und meist die Spirituosa mit anderen Analeptica (Ammoniakpräparaten, Campher) verbindet. Bei Erstickten und Scheintodten sind Klystiere von warmem Wein oft von der vorzüglichsten Wirkung. Selbst bei krankhaften Zuständen in Folge von habituellem Alkoholgenuss, die mit Schwäche complicirt sind, z. B. in manchen Formen von Delirium tremens, sind Spirituosa am Platze. Einen andern Zweck verfolgt wohl die in einzelnen amerikanischen Ländern übliche Methode der Behandlung des Klapperschlangenbisses, indem man den Gebissenen Brantwein bis zu sinnloser Berauschung trinken lässt. Die etwaigen günstigen Erfolge erklären sich theils zunächst durch den Effect kleiner Dosen auf den durch die Verletzung gesetzten Shock, theils durch die herabsetzende Wirkung auf Stoffwechsel wie auf Gehirn und Rückenmark. Auch Strychninkrämpfe werden durch grosse Dosen Alkohol gemildert, doch steht Weingeist als dynamisches Antidot bei Strychnismus acutus dem Chloralhydrat entschieden nach (Th. Husemann und Hessling).

Eine ebenso grosse Bedeutung besitzen die Spirituosa, und ebenfalls wiederum in specie der Wein, als Bestandtheil des roborenden Heilverfahrens in chronischen Schwächezuständen jeder Altersperiode, namentlich in der Reconvalescenz von schweren acuten Krankheiten.

Der Wein ist nicht allein *lac senum*, wie die Alten sagten, er leistet Vorzügliches auch bei scrophulösen und rachitischen Kindern und erfreut das Herz chlorotischer Jungfrauen nicht minder. Ob er dabei als „Sparmittel“ dient oder ob er durch Anregung der Digestion günstig wirkt oder auf beide Weise, lassen wir dahingestellt sein. Welche Sorte man wählt, richtet sich nach den Umständen; meist giebt man stärkeren spanischen Weinen oder moussirenden den Vorzug; wo Neigung zu Diarrhöen besteht, ist Rothwein vorzuziehen. Bei rachitischen und scrophulösen Kindern pflegt man Ungarwein (auch Capwein) zu geben. Bei scorbutischen Zuständen ist Rothwein unbedingt anderen Spirituosa vorzuziehen, welche sonst auch wohl substituirt werden; wo dagegen Digestionsstörungen bestehen, leisten stärkere Spirituosa mehr als Weine, von denen namentlich die zuckerhaltigeren und rothen oft nicht gut tolerirt werden. Wein galt auch beim Diabetes (Bouchardat) für ein vorzügliches Restaurationsmittel (obschon Weingeist nach Cl. Bernard bei Hunden die Zuckermenge in Leber und Harn vermehrt). — Auch äusserlich ist Wein als Tonicum benutzt, z. B. als Klystier (bei Chlorose, Phthisis von Aran empfohlen), in Bädern: doch finden König Jérômes Rothweibäder ihrer Kostspieligkeit wegen wohl selten Nachahmung. Auch locale Einreibungen mit Spirituosen, z. B. der



Extremitäten nach Ueberanstrengung, scheinen in einzelnen Fällen kräftigend zu wirken.

In neuerer Zeit hat sich besonders die Aufmerksamkeit auf die Anwendung der Spirituosa als Antipyreticum gerichtet. Seit der Empfehlung derselben durch Todd bei febrilen Affectionen, insbesondere entzündlichen Leiden der Respirationsorgane, hat man sich davon überzeugt, dass die alte Lehre von der Schädlichkeit des Weines in fieberhaften entzündlichen Affectionen eine Irrlehre ist und dass namentlich in adynamischen Zuständen Spirituosa erheblichen Nutzen stiften können; dagegen scheint Alkohol als eigentliches Antipyreticum der Kälte sowohl als dem Veratrin und Chinin nachzustehen.

In England ist die Spiritusbehandlung acuter Krankheiten so sehr Mode-sache geworden, dass man davon Gefahren für die Moralität befürchtet, indem die Kranken sich gar zu leicht an den Trunk gewöhnen. In Frankreich haben Béhier, Gingeot und Marvaud das Verfahren mehr verallgemeinert; in Deutschland, wo Leyden und Rabow die antipyretischen Effecte des Alkohols nicht bestätigten, hat ihm Bouvier das Wort geredet, nachdem er mit Binz dargethan, dass auch bei Thieren, bei denen durch Eiterinjection künstlich Fieber erzeugt war, die antipyretische Action hervortrat. Riegels höchst sorgfältige Versuche über die antipyretische Wirkung der Spirituosa zeigen, dass Alkohol im Fieber (Typhus, Pneumonie, Erysipelas) in grösseren Dosen allerdings herabsetzend auf die Temperatur wirkt, dass aber der erzielte Abfall in vielen Fällen nur äusserst gering ist, während durch kleinere Dosen oft geradezu Steigerung herbeigeführt wird. Sehr gering ist der antipyretische Effect namentlich bei Kranken, welche an Spirituosa gewöhnt sind. Hiernach erscheinen die Spirituosa für sich als Fiebermittel kaum ausreichend, wohl aber als Adjvantia der Kälte u. a. Mittel zur Beschränkung der Oxydation der Körperbestandtheile bei hochgradigem Fieber, endlich als Analeptica bei eintretendem Collapsus geeignet. Auch Marvaud, welcher im grossen Stil Alkohol bei Fieberkranken in Anwendung brachte, vindicirt demselben seine hauptsächlichsten Erfolge bei den meisten febrilen Krankheiten in Bekämpfung der Adynamie, d. h. als Analepticum, zumal bei Scharlach, Pocken und im Typhus, wo er häufig das bestehende Delirium beseitigt, obschon er auch einen günstigen Einfluss auf die Fiebercurven bei Typhus beobachtete, während er bei Pneumonie und Rheumatismus acutus wirkliche antifebrile Action (beträchtliches Sinken der Pulsfrequenz und der Temperatur bei Abnahme der Delirien und örtlichen Schmerzen, mitunter bei gleichzeitiger starker Diaphoresis) behauptet. Vielleicht dürfte der Alkohol als Antipyreticum im kindlichen Lebensalter sich qualificiren, wo ihn besonders Gingeot präconisirt hat. Nach Faliu kommen bei Alkoholbehandlung der Pneumonie häufig unerwartete asphyctische Todesfälle vor; nach Croq verzögert dieselbe die Reconvalescenz bei Typhus und Pneumonie. Die Anwendung beschränkt sich in Frankreich vorzugsweise auf putride Infection und Puerperalfieber, excessiv hohes Fieber bei Pneumonie und Collaps im Typhus (Dujardin-Beaumetz).

Eine besondere Anwendung hat man endlich von Spirituosen als blutstillende Mittel innerlich bei Metrorrhagien (Campbell, Legrand, Charrière) gemacht. Die Anwendung des Alkohols oder eines starken Weines mit Aromatica (Wachholder, Zimmt), zu 3–4 Weinglas voll in  $\frac{1}{4}$ stündl. Intervallen kurz vor einem Wechselfieberanfall, bei Gewohnheitstrinkern im Klystier, führt nur in seltenen Fällen zum Ziele (Bouvier).

Die anästhesirende Wirkung collossaler Dosen Weingeist hat schon frühzeitig zu dem Vorschlage geführt, behufs Vornahme grösserer chirurgischer Operationen die Patienten in den Zustand completter Bewusstlosigkeit durch Spirituosa zu versetzen. Nach der Einführung des Aethers und Chloroforms kann jedoch von dieser Anwendung gewiss nicht mehr die Rede sein.

Schliesslich erwähnen wir noch die Anwendung der Spirituosa

als Diaphoreticum, zu welchem Zwecke dieselben erwärmt und meist mit Wasser oder warmen Aufgüssen verdünnt bei Katarrhen der Respirations- und Digestionswerkzeuge gebraucht werden.

In dieser Richtung dienen besonders die unter dem Namen Grog, Punsch und Glühwein bekannten Getränke, welche auf verschiedene Weise dargestellt werden, übrigens auch bei Collapsus, Cholera u. s. w. in Gebrauch gezogen worden sind. Als medicinischen Punsch verordnet man einen Aufguss von 10,0 Theeblättern mit 250,0 Wasser,  $\alpha\alpha$  150,0 Rum oder Cognac und Syrupus simplex, sowie den Saft einer Citrone. Auf die verschiedenen Varietäten desselben (Weinpunsch, Milchpunsch) und die sonstigen aus Spirituosen bereiteten Getränke (Bischof, Cardinal, Chaud'eau, Sabojan) kann hier nicht näher eingegangen werden. Ebenso müssen wir die bei Respirationsleiden (Asthma, Bronchialkatarrh, Lungenbrand) früher benutzten Inhalationen von Weingeistdämpfen und die bei Hydrops, Rheumatismus, Gicht, Cholera und andern Leiden benutzten Spiritusdampfbäder, deren Wirkung nur in der dadurch erzeugten feuchten Wärme beruht, übergehen. Die Anwendung von mit Weingeist getränktem Papier und Leinwandstücken oder auch von brennendem Spiritus als schnell zu beschaffende Moxen bei Narkose kann ebenfalls nur kurz berührt werden.

Als Contraindicationen des internen Alkoholgebrauches betrachtet man gewöhnlich das kindliche Lebensalter; doch ist, wenn man auch namentlich in früher Jugend sehr vorsichtig damit sein muss und selbst den Wein nur zu 10–15 Tr. pro dosi anwenden darf, der medicinische Gebrauch keineswegs überall zu verbieten, wie dies namentlich die Beobachtungen von Gingeot beweisen. Auch bei nervöser Schwäche, die man als Contraindication betrachtete, können kleine Dosen Wein mit Nutzen gegeben werden. Dagegen ist bei bestehender Tendenz zu Kopfcongestionen und bei Personen mit sog. Habitus apoplecticus die Anwendung der Spirituosa in der That contraindicirt.

Bei Potatoren wirken Alcoholica in gewöhnlichen Dosen meist nicht, doch ist es nicht zweckmässig, in Krankheitsfällen denselben ganz den Alkohol zu entziehen, weil sie sonst leichter collabiren. Dass, wie Einzelne behaupten, durch eine totale Entziehung der Spirituosen bei Säufern Delirium tremens hervorgerufen wird, ist durchaus nicht erwiesen.

Was die Anwendungsweise der Spirituosa anlangt, so reicht man sie innerlich als Analepticum theelöffel- bis esslöffelweise mehrmals täglich, wobei man in der Regel den Weinen den Vorzug giebt. Auch in fieberhaften Affectionen werden weingeistreichere Weinsorten (Portwein) den Branntweinen in der Regel vorgezogen, doch ist auch Cognac, Rum, Arrac wiederholt verwendet, welche man zu 50,0–100,0 pro die in  $\frac{1}{2}$ –2stündlichen Intervallen nehmen lassen kann. Bei Metrorrhagie empfiehlt Rabuteau Champagner zu verwenden, weil er der darin enthaltenen Kohlensäure eine besondere Fähigkeit, den Uterus zur Contraction zu reizen, zutraut. Häufig wird der Wein als Vehikel für pulverförmige Medicamente (z. B. Cubebenpulver und Chinapulver) oder für Tropfen (besonders aus bitteren Tincturen) oder zur Herstellung von Macerationen und Digestionen (bittere und aromatische Pflanzentheile, Eisen) verwendet.

Zum antiseptischen Verbands ist von Guérin 20° Spiritus mit  $\frac{1}{2}$  Wasser verdünnt als die beste Mischung empfohlen, meist wird in Pariser Hospitälern verdünnter Spiritus camphoratus statt desselben angewendet. Perrin applicirt 90° Spiritus unmittelbar auf die Operationswunde und irrigirt bei unreinen Wunden mit 45° Weingeist. Bei Benutzung des Weins zu äusseren Zwecken (Verbänden, Injectionen, Klystieren) ist der Gebrauch von billigeren Weinsorten anzurathen. Auch äusserlich wird der Wein als Vehikel für Medicamente (z. B. Tannin bei Gonorrhoe) häufig gebraucht.

**Anhang:** Alcohol amylicus, Amylalkohol. — In ähnlicher Weise wie Aethylalkohol berauschend, jedoch in gleichen Dosen weit länger anhaltendes Coma bedingend wirkt der zur Reihe der einsäurigen Alkohole (vgl. S. 20) gehörende Amylalkohol, ein bei der Gährung der Branntweinmaische und des Rübensyrups neben Aethylalkohol entstehendes und durch Rectification des sog. Fuselöls in reinem Zustande erhaltenes, unangenehm riechendes, zum Husten reizendes und brennend schmeckendes Liquidum, welches bei der Oxydation sich in Valeraldehyd und Valeriansäure verwandelt (Cros, B. W. Richardson). Nach Cros wirkt Amylalkohol 15mal stärker toxisch als Aethylalkohol und 30mal so stark wie Methylalkohol. Auch die Temperatur setzt Amylalkohol stärker herab als Aethylalkohol (Dujardin-Beaumetz und Audigé). M. Huss empfahl den Amylalkohol gegen Zittern der Säuer, Storer bei Lungentuberculose zu 0,05—0,15 mehrmals täglich.

Auch der bei trockner Destillation des Holzes entstehende Methylalkohol,  $\text{CH}^4\text{O}$ , ist unter dem Namen Holzgeist, Spiritus pyrolignosus s. pyroaceticus s. pyroxylicus s. Aether lignosus, früher als Analepticum empfohlen, diente jedoch meist ohne rationellen Grund bei Lungentuberculose, chronischem Katarrh, Gicht, Indigestion, Erbrechen und Helminthen (Lippmann), wo man ihn zu 10—20 Tropfen mehrmals täglich gab. Auch Methylalkohol wirkt dem Aethylalkohol analog und nach den neuesten Versuchen von Dujardin-Beaumetz sogar stärker toxisch als dieser. Der Holzgeist soll das von Hastings unter dem Namen Naphtha gegen Lungenschwindsucht empfohlene Mittel darstellen, das gewöhnlich als Aceton, d. h. als das durch trockne Destillation essigsaurer Salze entstehende dünnflüssige, erfrischend riechende Methylacetone,  $\text{C}^3\text{H}^6\text{O}$ , angesehen wird, welches schon von den alten Alchymisten (Spiritus Aeruginis von Becker) benutzt wurde, übrigens trotz der Empfehlung von Becker, der in ihm den geheimen Weingeist der Adepten sieht, seine Rolle bei uns ausgespielt hat. *Aceton*

Der Allylalkohol scheint weit stärkere antiseptische Action durch Tödtung organisirter Fermente zu besitzen als Aethylalkohol und hindert namentlich die Faulniss des Fleisches, während er die Wirkung nicht organisirter Fermente nicht beeinträchtigt. Dieser die Respirationswege stark reizende und bei Inhalation in kleinen Dosen betäubende Alkohol (Collignon) hat in der Medicin bisher Bedeutung nicht erlangt. *Allylalkohol*

Es reihen sich ferner hier manche sog. zusammengesetzte Aether oder Ester an, welche vorzugsweise als Analeptica dienen, übrigens wegen ihrer nahen Verwandtschaft mit dem Aether am besten im Anhang an diesen betrachtet werden.

### Ammoniakpräparate; Ammoniacalia.

Ihrer therapeutischen Anwendung nach schliessen sich an die Encephalica analeptica verschiedene Ammoniakverbindungen, bei denen jedoch die Einwirkung auf das Grosshirn nicht so ausgeprägt hervortritt wie bei den ätherischöligen Stoffen und bei den Spirituosa, während die Medulla oblongata und das Rückenmark, sowie das Herz durch dieselben vorwaltend afficirt werden. Obschon alle Ammoniakverbindungen in derselben Weise auf das Nervensystem einwirken, und zwar der Menge des in ihnen enthaltenen Ammoniaks proportional in verschiedener Stärke, benutzt man einzelne, z. B. Chlorammonium und Liquor Ammonii acetici, doch nicht als Excitantien, weshalb wir auf diese später zurückkommen werden und hier nur Ammoniak und Ammoniumcarbonat betrachten.



**Liquor Ammonii caustici**, Spiritus Salis ammoniaci causticus, Ammoniacum liquidum s. solutum; **Ammoniak**, Salmiakgeist, Aetzammoniak-flüssigkeit.

Der Liquor Ammonii caustici ist eine 10% wässrige Lösung des unter dem Namen Ammoniak bekannten Gases.

Das Ammoniak oder Ammoniakgas,  $\text{NH}_3$ , ein farbloses Gas von eigenthümlichem äusserst stechendem Geruche, welches durch Erhitzen von Chlorammonium (Salmiak) oder Ammoniumsulfat mit gelöschtem Kalk und Auffangen über Quecksilber dargestellt werden kann, wird von Wasser und Weingeist unter starker Erwärmung in reichlicher Menge aufgenommen. Der officinelle Salmiakgeist kann entweder aus dem Chlorammonium durch Glühen mit Kalk und Einleiten in Aqua destillata und Verdünnen bis zum spec. Gew. von 0,960 bereitet werden, oder man stellt ihn einfacher aus dem sog. Liquor Ammonii caustici duplex des Handels, welcher aus dem bei der Leuchtgasfabrication als Nebenproduct gewonnenen Ammoniumsulfat im Grossen gewonnen wird und 19–20% Ammoniak enthält, durch gelindes Erwärmen dar. Er ist eine wasserklare, farblose, völlig flüchtige Flüssigkeit, die sehr stark nach Ammoniak riecht und stark alkalisch reagirt.

Neben dem Liquor Ammonii caustici war früher ein Liquor Ammonii caustici spirituosus s. Spiritus Ammoniaci caustici Dzondii s. Spiritus Dzondii, Dzondischer Salmiakgeist officinell. Dieses Präparat, welches durch Einleiten von Ammoniakgas in Weingeist von 0,830 spec. Gew. erhalten wurde, bildet ein farbloses Liquidum von 0,808–0,810 spec. Gew., das sich im Ganzen dem Salmiakgeist analog verhält.

Auf Hühnereiweiss wirkt Ammoniak so, dass sich geronnenes Eiweiss darin auflöst und beim Abdampfen gelbe, durchsichtige Stücke hinterlässt, die in Wasser aufschwellen und sich lösen; die Lösung gerinnt beim Kochen nicht, wohl aber durch wenig Essigsäure oder durch Weingeist. Casein löst sich leicht in wässrigem und kohlensaurem Ammoniak. Fibrin verhält sich gegen Ammoniak wie gegen Kali. Mucin löst sich leicht in Ammoniak, selbst bei Anwesenheit sehr geringer Mengen des letzteren; die Lösungen verhalten sich wie Lösungen in Kali. Auf Hornstoffe wirkt kaustisches Ammoniak lösend, auf Fette verseifend.

Dem Salmiakgeist kommt örtliche und entfernte Wirkung zu, von denen erstere sich sowohl auf Haut und Schleimhäuten geltend macht und bei länger dauernder Einwirkung sich als kaustische, bei kürzer dauernder Application als erethistische darstellt.

Auf der äussern Haut resultirt nach Einreibung mit Liq. Amm. caust. oder nach Application eines anderen Präparates, z. B. Gondrets Salbe, sehr rasch (in 5–10 Min.) Wärmegefühl, Brennen und selbst Schmerzempfindung; bei höheren Graden der Einwirkung kommt es zu Exsudation und Blasenbildung, wobei Bildung kleiner Vesikeln schon in 10–30 Min. sich zeigt, mit lebhafter Röthung der Umgebung, bei leichteren zu blosser Abschuppung der Epidermis. Wirkt Ammoniak längere Zeit ein, indem man die Verdunstung verhindert, so erfolgt Auflösung der Epidermis und sehr rasche Verwandlung der darunter liegenden Theile in einen weichen, pulpösen, grau gefärbten Schorf, welcher Aehnlichkeit mit dem durch Kalihydrat erzeugten zeigt. Diese Einwirkung ist stets von lebhaften Schmerzen begleitet und findet ihre Erklärung in der Action des Ammoniaks auf Fette und Albuminate, welche durch das tiefere Eindringen des Ammoniakgases sich ziemlich weit ausdehnt, wie dies C. G. Mitscherlich bei Application auf die Bauchhaut beim Kaninchen nachwies.

Ammoniakdämpfe verursachen auf der Augenbindehaut lebhaften Schmerz und Röthung mit Thränenfluss. Selbst in beträchtlicher Verdünnung bewirken sie durch Reizung der Membrana Schneideri Niesen und Vermehrung des

Nasenschleimes. In conc. Form und längere Zeit eingeathmet bedingen sie Respirationsbeschwerden, Schmerzen in der Brust, Husten, selbst Stickenfälle (Castan), Blutauswurf und croupartige Entzündung der Luftwege (Barclay, Patterson). Bei Einathmung minder conc. Dämpfe kommt es nur zu Vermehrung der Secretion und Hyperämie.

In den Magen gebracht wird Liq. Amm. caust., in kleinen Dosen (2—5—10 Tropfen) und diluirt angewendet, durch die Salzsäure des Magensaftes neutralisirt und ruft keine topischen Erscheinungen, vielleicht mit Ausnahme von Ructus (Wibmer), hervor. Auch bei längerer Darreichung resultiren selten Digestionsstörungen. Bei Einführung grösserer Mengen macht sich die Affinität zum Eiweiss geltend. Bedeutendere Quantitäten (15,0—30,0) haben äusserst heftige Irritation der Magenschleimhaut zur Folge. Bei damit vergifteten Kaninchen findet sich im Magen und in den oberen Theilen des Dünndarms eine grosse Menge rothgefärbten Schleims, theilweise Auflösung und theilweise Aufquellung des Pflasterepithels, sowie Hämorrhagien, in denen die Blutkörperchen z. Th. aufgelöst erscheinen (C. G. Mitscherlich). Bei Vergiftungen am Menschen kommt es zu Gastroenteritis mit schwärzlicher Verfärbung der Lippen und Zunge (Barclay, Taylor). Durchfälle kommen nach toxischen Gaben Ammoniaks nur ausnahmsweise vor (Wilkins).

Ueber die Schicksale des resorbirten Ammoniaks haben neuere Untersuchungen mit Sicherheit dargethan, dass dasselbe im Organismus sich mit Carbaminsäure zu Harnstoff verbindet.

Dass Ammoniak nicht als solches in den Harn übergehe, ist an sich schon durch den Umstand bewiesen, dass der Harn bei acuter Ammoniakvergiftung stets sauer reagirt. Während man früher der Ansicht war, dass kaustisches Ammoniak bei medicamentösen Dosen wohl nie als solches, sondern stets als Chlorammonium in den Harn übertrete, wurde die Vermehrung der Harnstoffmenge ohne gleichzeitige Zunahme der Harnstoffausscheidung nach Einführung von Ammoniumcarbonat und verschiedenen anderen Ammoniaksalzen (Ammoniumacetat, Ammoniumformiat) für Hunde (Hallervorden, Adamkiewicz, Salkowski) und auch für den Menschen (Coranda) mit Sicherheit nachgewiesen. Schon Boecker zeigte die Vermehrung des Harnstoffs nach Ammoniakalien und Böhm und Lange (1864) wiesen auf die Verbindung mit Carbaminsäure hin.

Die entfernte Wirkung des kaustischen Ammoniaks ist — wie auch bei allen Ammoniakverbindungen — vorwaltend auf die Medulla oblongata, das vasomotorische Nervensystem und das Rückenmark gerichtet, während das Grosshirn verhältnissmässig wenig afficirt wird. Die Action ist bei grösseren Dosen zwar eine intensive, aber auch verhältnissmässig rasch vorübergehende.

Beim Menschen sah Wibmer nach 10—25 Tropfen Aetzammoniakflüssigkeit Druck in den Schläfen und kurzdauerndes Eingenommensein des Kopfes mit oder ohne Pulsbeschleunigung, so dass ein gewisser Einfluss auf die Hirnthätigkeit nicht in Abrede gestellt werden kann, die jedoch hinter der des Camphers und verschiedener ätherischer Oele entschieden zurückbleibt. Von Anderen wurde Steigerung der Hautwärme, gesteigerte Diaphorese und Diurese und leichte Aufregung beobachtet. Bei Intoxicationen durch per os eingeführtes Ammoniak kommt mitunter rascher Verlust des Bewusstseins und plötzlicher Tod vor; in manchen Fällen finden sich ausgeprägte Convulsionen und Tetanus; in der Regel compliciren sich mit Gastroenteritis Reizungsphänomene seitens der Bronchien, Stickenfälle, Hämoptoe, selbst croupartige Entzündung, welche mit directer Einathmung des Gases in Zusammenhang stehen. Bei Kaninchen sah Mitscherlich nach 8,0 Aetzammoniak (intern) grosse Puls- und Athemfrequenz, hochgradigen Collapsus, Tetanus und klonische Convulsionen. Injection von verdünnter Ammoniakflüssigkeit in grösseren Mengen in die Venen ruft beim

Menschen (Tibbits) ebenso wie bei Hunden und Kaninchen (Orfila) Tetanus hervor und tödtet rasch. Diese krampferregende Wirkung ist allen Ammoniakverbindungen eigen, auch den nicht irritirend wirkenden Salzen, z. B. dem Chlorammonium, und kann somit nicht von der nur dem kaustischen Ammoniak zukommenden massenhaften Auflösung der Blutkörperchen und Aufhebung der Gerinnbarkeit bei Infusion abhängen (C. G. Mitscherlich). Die Krämpfe kommen auch bei durchschnittenem Halsmark vor und sind somit spinale (Funke und Deahna, Böhm und Lange). Die Wirkung entspricht bei Fröschen im Wesentlichen der des Strychnins, doch folgt meistens schon auf den ersten Anfall Erschöpfung; die Erregbarkeitssteigerung der nervösen Centra, von denen die Erregung der motorischen Nerven ausgeht und in denen die reflectorische Uebertragung auf erstere übergeht, ist so gross, dass auch bei stark curarisirten Thieren Krämpfe und Reflexzuckungen durch Ammoniak hervorgerufen werden (Funke und Deahna). Aehnlich starke Erregung bedingt Ammoniak nach Funke und Deahna auch auf das vasomotorische Centrum, woraus hochgradige Verengerung der Arterien hervorgeht, die nach Durchtrennung des Halsmarks niemals in so hohem Grade auftritt. Hiervon leitet Funke auch das constant nach Ammoniakalien hervortretende Steigen des Blutdrucks ab, welches bald mit Beschleunigung, bald mit Verlangsamung des Herzschlages einhergehe. In der Regel ist der Puls accelerirt, nach Böhm und Lange durch Erregung spinaler Beschleunigungsnerven; eine Verstärkung der Arbeitsleistung des Herzens findet nicht statt. Einen abnorm hohen Erregungszustand bietet auch das Athemcentrum (Böhm und Lange), daneben auch das Vaguscentrum und die peripheren Vagusendigungen in der Lunge.

Man schreibt dem Ammoniak ferner eine erregende Wirkung auf die Secretion zu, welche namentlich an den Bronchialschleimdrüsen und den Schweissdrüsen sich documentiren soll.

Hertwig sah bei Pferden nach 8,0 stark vermehrte Secretion der Bronchien und Röthung der Bronchialschleimhaut. Auch bei subcutaner Application sind dieselben zu beobachten. Der Harn wird nach Ammoniak nicht alkalisch, nach Brücke bleibt er sogar bei nachweisbarem Gehalte an Ammoniak sauer.

Die medicinische Anwendung des Aetzammoniaks zur Hervorrufung entfernter Wirkungen ist heutzutage eine sehr seltene geworden. Nach den physiologischen Wirkungen lässt es sich als flüchtig erregendes Mittel in Collapsus und Ohnmachten rationell benutzen; doch findet es bei letzteren vorzugsweise als Riechmittel Verwendung, um auf reflectorischem Wege eine Erregung der Hirnthätigkeit hervorzurufen. Besonders gerühmt ist es bei manchen Vergiftungen, namentlich durch thierische Gifte, wo es theilweise auch wirklich antidotarisch wirkt, wie bei den Stichverletzungen der Bienen, Wespen, Hornissen und Hummeln.

In den meisten Fällen, wo man Ammoniak als Excitans in Anwendung bringen will, bevorzugt man das Ammonium carbonicum. Nur bei Vergiftung durch Schlangenbiss hat das Ammoniak in Lösung vorwiegend Verwendung gefunden. Hier steht seit alter Zeit als internes Mittel die Aqua Luciae, Eau de Luce, Liquor cornu cervi succinatus, eine nicht immer gleich componirte Mischung aus Aetzammoniak, Bernsteinöl und Alkohol, die man bis zu 2,0 pro dosi gab, in Ansehen (E. Home, Jussieu). Dieselbe ist der sog. weisse Schlangentrank der Indianer, welcher wohl nicht mehr leistet wie Liquor Ammonii causticus, dessen Nutzen übrigens sehr problematisch ist, obschon aus neuerer Zeit Mittheilungen über einzelne geheilte Fälle vom Bisse der Cobra di capello vorliegen, welche durch Injection von Aetzammoniakflüssigkeit in die Venen geheilt sind (Smith, Jenkins, Halford). In Ostindien und Australien angestellte beweiskräftige Versuche zeigen evident, dass bei Subcutaninjection letaler Dosen des Najagiftes Ammoniakinfusion ohne jenen



Erfolg bleibt. Eine Neutralisation des Schlangengiftes durch Ammoniak, das man auch äusserlich auf die Bisswunden brachte (und nicht bloss um ätzend zu wirken, worin Ammoniak jedenfalls dem Kali causticum und Antimonchlorid nachsteht), dürfte kaum anzunehmen sein, da das Schlangengift nicht zu den Säuren gehört, wie dies bei dem Gifte der bereits oben genannten Insecten (*Apis mellifica* L., *Vespa vulgaris*, *Vespa Crabro*, *Bombus terrestris* u. a. m.) der Fall ist, wo wahrscheinlich Ameisensäure das Gift bildet. Hier ist die örtliche Application von verdünntem Salmiakgeist oft von ganz überraschender Wirkung und sind Ammoniakalien wegen ihrer Flüchtigkeit offenbar den fixen Alkalien vorzuziehen. Natürlich ist hier interne Application völlig überflüssig. Viperngift mit Ammoniak gemischt büst dagegen seine Giftigkeit nicht ein (Fontana). Antidotarische Wirkung hat man früher auch bei Blausäurevergiftung angenommen und deshalb Inhalationen von Ammoniak empfohlen, doch wirkt Cyanammonium, das sich dabei bilden sollte, nicht viel weniger giftig als Cyanwasserstoffsäure, die noch dazu meist so rasch tödtet, dass jedes Antidot überflüssig wird. In gleicher Weise empfehlen Kastner, Bischoff und Devergie Ammoniakinhalaationen bei Intoxication durch Chlordämpfe, um unschädliches Chlorammonium zu bilden; vielleicht ist Ammoniak bei schleuniger Application zu gebrauchen, später steigert es die Entzündung. Als Analepticum ist Ammoniak auch bei Morphinismus, Chloroformasphyxie, Alcoholismus acutus u. a. narkotischen Vergiftungen benutzt, theils als Riechmittel, theils sogar bei Chloroformsyncope (Neild) direct in die Venen injicirt. Vielfach hat sich die Ansicht Bahn gebrochen, dass Ammoniak vom Magen aus keine Wirkung entfalten könne, weil es hier in Chlorammonium umgewandelt werde und sind deshalb andre Einführungswege versucht. So hat Zülzer bei Adynamie im Typhus, wo in älterer Zeit Ammoniak und Ammoniumcarbonat viel gebraucht waren, Liq. Ammonii caustici (mit Ol. Anisi) zur subcutanen Injection empfohlen. Im Bellevue-Hospital zu New York hat Griswold die Infusion bei Collaps nach Verletzungen wiederholt mit Erfolg in Anwendung gebracht. Da indess alle Ammoniaksalze in gleicher Weise das Nervensystem beeinflussen, so ist auch die interne Anwendung durchaus gerechtfertigt. Bei synkoptischen Zuständen benutzt man Ammoniak als Riechmittel.

Weniger gerechtfertigt als die Anwendung als Excitans erscheint der Gebrauch als Antispasmodicum, wo vielleicht nur die örtliche Application von Ammoniakdämpfen bei Keuchhusten (Perroton, Stillé) und Asthma noch einigermaßen rationell erscheint. Die älteren und neueren Empfehlungen gegen Epilepsie (Pinel, Herpin) und Tetanus (Rigaud, M'Aniffé, Cherbonnier), bei Paralyse (Bichat) und bei Delirium tremens (Teissier u. A.) sind ohne Bedeutung.

Entschieden günstigen Erfolg zeigt kaustisches Ammoniak manchmal bei Bronchitis und Laryngitis, wo es oft die Heiserkeit in kurzer Zeit beseitigt.

Die rasch vorübergehende Wirkung des kaustischen Ammoniaks macht dasselbe schwerlich zu längerem Gebrauche gegen chronische Krankheiten geeignet. Empfohlen ist dasselbe gegen chronischen Rheumatismus (gleichzeitig zur Erregung der Hautthätigkeit und Neutralisation überschüssiger Milchsäure) und Scrophulose (Verdier), ferner bei Diabetes, wo Ammoniak schon früher (Naumann, Golding Bird, Barlow) als Surrogat der fixen Alkalien und neuerdings von Adamkiewicz, der durch Ammoniakalien nicht nur Abnahme des Zuckers, sondern auch solche der Diurese und des Durstes eintreten sah, empfohlen wurde.

Die Anwendung des Ammoniaks als örtlich wirkendes Mittel geschieht vorzugsweise zur Hervorrufung von Blasenbildung oder Röthung auf der Haut, um dadurch die im Allgemeinen von den Dermerethistica, in specie Canthariden und Senf, bedingten Effecte zu erreichen; ferner als Riechmittel, um durch Reizung des Trigeminus und Vagus reflectorisch auf das Gehirn zu wirken,

endlich, jedoch seltener, bei chronischen Katarrhen der Respirationswege (Coryza, Angina, Bronchitis chronica) in Form von Inhalationen.

Als Vesicans ist Ammoniak besonders in Frankreich gebräuchlich, meist in Form der Gondretschen Salbe; maassgebend erscheint dabei der Umstand, dass es verhältnissmässig rasch und nicht auf die Nieren wirkt. Als eigentliches Aetzmittel ist die Ammoniakflüssigkeit kaum anzuwenden. Als hautreizendes Mittel steht Ammoniak (und noch mehr seine Präparate) namentlich bei Rheumatismus in Ruf, nicht minder der oben erwähnte L. A. c. spirituosus zur Beförderung der Aufsaugung bei Contusionen, Blutextravasaten und Oedemen. Hautentzündung und theilweise auch Cauterisation hat man nicht nur zur Erzielung reflectorischer Wirkungen, sondern auch bei localen Affectionen, z. B. bei Pernionen und Verbrennungen (wo ihn Guérard u. A. als Abortivmittel benutzten), auch bei Pruritus, Favus, Acne indurata, Sommersprossen (hier besonders auch die oben erwähnte Aqua Luciae) u. s. w., mit dem Mittel zu Wege gebracht. Auch in Fistelgänge und auf torpide Geschwüre ist er in diluirter Lösung gebracht; selbst bei Hydrocele und bei Prendarthrose hat man solche injicirt. Einen besonderen Gebrauch machte Lavagna davon, indem er bei Amenorrhoe L. A. c. verdünnt in den Uterus injicirte; Andere leiteten Ammoniakgas in denselben. Bei Angina tonsillaris, Diphtheritis (hier auch um die Membranen zu lösen, nach Bridger) u. s. w. ist Aetzammoniak auch direct applicirt, entweder aufgepinselt (Ducros) oder in Gurgelwässern. Bei Amaurose bestrich man die Augenlider und die Umgebung des Auges damit (mit aa Tr. Castorei oder mit Aether und Pfefferminzöl), selbstverständlich ohne Nutzen.

Innerlich wendet man den Liquor Ammonii caustici zu 0,15—1,0 mehrmals täglich an, theils in Tropfenform, theils in Mixturen. Die Darreichung muss stets in schleimigem Vehikel und in starker Dilution geschehen, um Entzündung des Magens zu verhüten, wie solche wiederholt z. B. bei Anwendung gegen Schlangenbiss und Scorpionenstich bei Kindern in sehr störender Weise hervorgetreten ist (Guyot). Erhöhung der Dosis ist wegen der zu befürchtenden Krämpfe gefährlich. Auch hier genügen 5—10—15 Tropfen pro dosi und 8,0—10,0 im Ganzen (v. Hasselt). Für den inneren Gebrauch ist Ammonium carbonicum unzweifelhaft vorzuziehen.

Zu Klystieren (bei Bewusstlosen und des Schluckens Unfähigen) setzt man 5—15 Tropfen dem Vehikel (lauwarmem Haferschleim) unmittelbar vor der Application zu. Bei Infusion in die Vene hält Griswold selbst Dosen von 4,0 in starker Verdünnung gerechtfertigt und unschädlich. Zur Subcutaninjection empfahl Zülzer eine dem Liq. Amm. anisatus (vergl. Präparate) nahe stehende Mischung.

Zur Hervorrufung von Hautröthung reibt man Ammoniak für sich oder in Verbindung mit aromatischen und spirituösen Flüssigkeiten mehrere Minuten lang ein; noch häufiger jedoch bedient man sich einzelner der unten genannten Präparate. Als Vesicans wird Ammoniak oder noch besser der Dzondische Ammoniakspiritus, da bei diesem auch der Alkohol mitwirkt, in der Weise benutzt, dass man eine 8—10fach gefaltete Compresse damit tränkt und das Verdunsten durch Bedecken mit Wachstaffet oder Guttaperchapapier verhindert, wobei man, um die Wirkung zu begrenzen, den Verband mit einem breiten Collodiumrande bestreicht. Dies Verfahren macht die alte Applicationsweise der Gondretschen Salbe, Unguentum ammoniacatum Gondretii, statt deren man eine Mischung von 1 Th. Liquor Amm. caust. mit 4 Th. Ungt. cereum benutzen kann, oder von Mischungen mit Oelen in einem Schröpfkopfe oder Fingerhute oder auf einem Stücke Zündschwamm entbehrlich. Zu Injectionen in die Scheide bei Amenorrhoe nahm Lavagna anfangs 10, später allmählig steigend bis 40 Tropfen auf 50,0 lauwarme Milch. Zu Injectionen in Fistelgänge und zu Ueberschlägen bei torpiden Geschwüren nimmt man Verdünnungen von 1:5—10 (Richard), zu sonstigen externen Zwecken meist solche von 3—6:100.

Als Riechmittel und Inhalationsmittel ist der Liq. Amm. caust. stets mit Vorsicht zu benutzen, um nicht heftige Irritation der Luftwege zu erhalten.

Man hat hier übrigens auch Ammoniakgas direct bereitet angewendet, wovon natürlich das Nämliche gilt. Besondere Vorsicht erheischt die Application bei Bewusstlosen.

Bei der Verordnung sind als zersetzend Säuren, saure Salze, Erd-, Metall- und Alkaloidsalze zu meiden. Gefahren können auch durch Verordnen mit Präparaten, welche freies Chlor und Iod enthalten, z. B. Chlorwasser, Iodtinctur und Chlorkalk, resultiren, indem sich beim Contact mit denselben möglicherweise Iod- und Chlorstickstoff bilden, deren höchst explosive Eigenschaften bekannt sind.

#### Präparate:

1) **Linimentum ammoniatum** s. **ammoniacatum**, **Linimentum volatile**; **flüchtiges Liniment**, flüchtige Salbe. Durch Zusammenschütteln von 3 Th. Olivenöl, 1 Th. Mohnöl und 1 Th. Salmiakgeist bis zu vollständiger Vereinigung erhalten, bildet das flüchtige Liniment eine weissliche, dickflüssige Masse, die auch bei längerem Aufbewahren sich nicht in zwei Schichten trennt. Nach Hager ist es keine Seife, sondern nur eine Emulsion, in der sich indess mit der Länge der Zeit Amidverbindungen bilden können (Boullay). Es dient sehr allgemein zu zertheilenden und schmerzlindernden Einreibungen, häufig in Verbindung mit andern Substanzen, z. B. Opiumtinctur, Cantharidentinctur, Chloroform, Petroleum u. s. w. Bei kräftiger oder wiederholter Einreibung macht das Liniment Schmerzen und Excoriationen, die bei einmaliger gelinder Einreibung nicht eintreten; wird damit bestrichener Flanell auf die Haut applicirt und die Verdunstung gehindert, so kann es geradezu als Vesicans wirken. Für die Armenpraxis lassen sich billigere Mischungen von gleicher Wirksamkeit durch Mischen von Baumöl oder Rüböl mit Aetzammoniak darstellen.

2) **Linimentum ammoniato-camphoratum**, **Linimentum volatile camphoratum**; **flüchtiges Campherliniment**. Durch Zusammenschütteln von 3 Th. Campheröl, 1 Th. Mohnöl und 1 Th. Salmiakgeist erhalten; weisslich, halbflüssig und homogen. Es wird genau wie das flüchtige Liniment benutzt. Aehnlich ist das **Linimentum Ammoniae compositum** der Engländer.

3) **Linimentum saponato-camphoratum**; **Opodeldok**. 60 Th. medicinische Seife, 20 Th. Campher bei gelinder Wärme in 810 Th. Weingeist und 50 Th. Glycerin gelöst und warm in das zur Aufbewahrung des Opodeldoks bestimmte Gefäss filtrirt, dazu 4 Th. Thymianöl, 6 Th. Rosmarinöl und 50 Th. Liqueur Ammonii caustici hinzugefügt und das Gemenge schnell abgekühlt. Das Präparat bildet eine halb durchscheinende, wenig opalisirende, weissgelbliche, gallertartige Masse, welche bei der Wärme der Hand schmilzt und keine harten Körperchen enthalten darf. Die dem Präparate gegebene deutsche Bezeichnung ist bis auf den heutigen Tag nicht genügend erklärt. Sie stammt aus England, wo die Benennung im 17. Jahrhundert für ein Pflaster gegen Syphilis und Pestbeulen benutzt wird. Am wahrscheinlichsten ist die von Borland versuchte Etymologie, wonach es aus *ὀπός*, Saft und *τέλειον*, besänftigen, lindern, zusammengesetzt ist, natürlich in etwas barbarischer Weise. Der Opodeldok ist ein Hauptmittel gegen Rheumatismus, Verstauchungen, Drüsengeschwülste u. s. w.

4) **Linimentum saponato-camphoratum liquidum**; **flüssiger Opodeldok**. 120 Th. Campherspiritus, 350 Th. Seifenspiritus, 24 Th. Salmiakgeist, 2 Th. Thymianöl, 4 Th. Rosmarinöl gemischt und filtrirt. Klare, gelbliche Flüssigkeit, welche, wie der gewöhnliche Opodeldok benutzt wird. Der Name flüssiger Opodeldok wurde früher auch einem nicht campherhaltigen, eine flockigtrübe Flüssigkeit darstellenden Einreibungsmittel gegeben, welches unter der Bezeichnung **Linimentum saponato-ammoniatum** officinell war.

6) **Liquor Ammonii anisatus**, **Ammoniacum solutum anisatum**, **Spiritus Salis ammoniaci anisatus**; **anisaltige Ammoniumflüssigkeit**. Anisöl 1 Th. in 24 Th. Spiritus gelöst, Liquor Ammonii caustici 5 Th. Das Präparat stellt eine vollkommen klare, gelbliche, durch Wasserzusatz sich milchig trübende,



nach Ammoniak und Anisöl riechende und schmeckende Flüssigkeit dar, welche vorzugsweise zum innern Gebrauche dient und zu 5—15 Tropfen 3—4 mal täglich, nicht selten auch in höheren Gaben als Expectorans, Carminativum und Diaphoreticum gereicht wird. Man wendet es meist in schleimigem Vehikel an oder als Expectorans in Form des S. 351 erwähnten **Brustelixirs**. Selten wird es Salben oder Linimenten zugesetzt; v. Siebold benutzte es mit 15 Th. Lavendelspiritus zu Einreibungen bei Singultus der Kinder. Zülzer injicirte es mit Zusatz von Alkohol subcutan bei typhöser Adynamie, Kocher empfahl es bei Hyperemese und Collapsus in Folge von medicinalen Dosen Veratrin bei Pneumonikern.

Aehnliche Präparate mit andern ätherischen Oelen waren früher unter den Bezeichnungen *Liquor Ammoniaci lavandulatus*, *foeniculatus*, *foetidus* und *aromaticus* in gleicher Richtung gebräuchlich. Der *Liquor Ammoniaci aromaticus* entspricht im Wesentlichen dem in früherer Zeit als krampfstillendes Mittel sehr geschätzten *Liquor oleosus Sylvii* s. *Sal volatile oleosum Sylvii* und enthält Anis-, Nelken-, Zimmt-, Macis- und Bernsteinöl.

### Verordnungen:

- |   |  |
|---|--|
| <p>1) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Liquoris Ammonii anisati</i><br/> <i>Tincturae Opii benzoicae</i> āā 5,0<br/> <i>Aquae Amygdalarum amararum</i> 10,0<br/> <i>Syrupi Althaeae</i> 60,0<br/> <i>M. D. S.</i> 3—4mal täglich 1 Theelöffel voll. (Bei chronischen Katarrhen der Respirationsorgane).</p> | <p><i>M. D. S.</i> Esslöffelweise. (Bei Cholera, Alcoholismus u. s. w. <i>Potion ammoniacale Cod. Fr.</i>)</p>   |
| <p>2) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Liquoris Ammonii caustici</i> 0,5<br/> <i>Aq. comm.</i> 100,0<br/> <i>Syrupi simpl.</i> 25,0</p>   | <p>3) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Liq. Amm. caust. spir.</i> 40,0<br/> <i>Spiritus Camphorae</i> 30,0<br/> <i>Olei Terebinthinae</i> 10,0<br/> <i>M. D. S.</i> Zum Einreiben.</p> |

**Ammonium carbonicum**, *Ammoniacum carbonicum*, *Sal volatile* s. *Ammoniaci*, *Alkali volatile* s. *A. v. siccum*. *Carbonas Ammoniae alkalinus*, *Carbonas* s. *Sesquicarbonas ammonicus*; **Ammoniumcarbonat**, flüchtiges Laugensalz, reines Hirschhornsaltz, kohlen-saures Ammoniak.

Das Ammoniumcarbonat, welches durch Erhitzen von Salmiak oder Ammoniumphosphat mit gepulvertem Calciumcarbonat fabrikmässig dargestellt wird, ist nicht, wie man früher annahm, Ammoniums-sesquicarbonat, sondern eine Verbindung von Ammoniumcarbonat und Ammoniumcarbaminat und bildet dichte, harte, durchscheinende, faserig-krystallinische Massen von stark ammoniakalischem Geruche, welche an der Luft verwittern und sich mit einer weissen zerreiblichen Masse von Ammoniumbicarbonat (sog. *Offa Helmontii*) bedecken. Es löst sich in 4 Th. Wasser langsam, aber vollständig, braust mit Säuren auf und verflüchtigt sich ganz bei mässiger Wärme. In früherer Zeit bereitete man das Salz durch trockene Destillation stickstoffhaltiger Materien (daher der Name Hirschhornsaltz), wobei ein mit brenzlichen Producten verunreinigtes Ammoniumcarbonat sich verflüchtigt, welches als *Ammonium carbonicum pyro-oleosum* (vgl. Präparate) officinell war. In England benutzt man auch das doppeltkohlen-saure Ammoniak, *Ammonium bicarbonicum*, ein weisses, fast gar nicht nach Ammoniak riechendes und schmeckendes Salz, welches keine kautische Action besitzt und zu 0,5—1,0 in wässriger Lösung oder in Brausemischungen gegeben wird. In Berlin wird dasselbe durch die *Aqua Ammonii carbonici*, eine mit Kohlensäure gesättigte Lösung von *Ammonium carbonicum* in Wasser (1:2000), ersetzt (Simon).

Das Ammoniumcarbonat schliesst sich in seiner Action fast vollständig dem Aetzammoniak, dessen Wirkung auf Proteinstoffe es im Allgemeinen theilt, an, ist hinsichtlich seiner örtlichen Action jedoch entschieden milder und wird deshalb für den inneren Gebrauch demselben vorgezogen.

Ueber die Wirkung beim gesunden Menschen liegen wenige exacte Beobachtungen vor. Wibmer will nach 0,4 nur ein leichtes Eingenommensein des Kopfes, besonders in Stirn und Schläfen, wahrgenommen haben, welche sich nach zwei weiteren, ebenso grossen, binnen 20 Min. ingerirten Gaben steigerte und neben welchem nach einer 4. Gabe Hustenreiz und vermehrte Bronchialsecretion auftrat; die Pulsfrequenz stieg dabei ganz unbedeutend, und Beeinträchtigung der Esslust oder sonstiger Functionen fand in keiner Weise statt. Gaben von 0,8 (Neligan) oder 2,0 (Pereira) können Nausea und Erbrechen hervorrufen. Ueber die Effecte länger fortgesetzten Gebrauches des kohlensauren Ammoniaks bei Menschen gehen die Angaben auseinander. Pereira reichte einem Epileptiker 3mal täglich 1,0 2 Monate hindurch ohne irgend welche Schädigung der Gesundheit und gab mit gleichem Effecte wiederholt Scrupeldosen 2—4 Wochen hindurch, während Cazenave dem längeren Gebrauche des Salzes Störungen der Digestion und daraus resultirende Emaciation und Schwäche vindicirt. Selbst Hämorrhagien aus Mund, Magen und Darm, Erweichung der Muskeln und allgemeine Tabes mit nachfolgendem Tod sollen nach längerem Consum von Ammoniumcarbonat eingetreten sein (Huxham). Sicher ist die örtliche Action auf die Magenschleimhaut von der Form der Darreichung (Substanz, Lösungen von verschiedener Concentration) abhängig.

Thierversuche liegen in Hinsicht auf kohlensaures Ammoniak in nicht unbedeutender Anzahl vor, doch beziehen sich dieselben vorzugsweise auf die Wirkung der Injection in das Blut, wonach Erscheinungen sich manifestiren, wie sie im Verfolge chronischer Nephritis auftreten und als urämische bezeichnet werden (Erbrechen, Würgen, Unruhe, Convulsionen, Sopor). Die Frage, ob die sog. Urämie auf wirkliche Intoxication mit kohlensaurem Ammoniak, das im Blute aus Harnstoff unter der Einwirkung eines Ferments entstehe (Frerichs), oder aus dem im Darne abgeschiedenen Harnstoff sich bilde (Treitz u. Jaksch), zu beziehen sei, kann noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden und ist hier selbstverständlich nicht weiltäufiger zu erörtern. Nach Rosenstein soll kohlensaures Ammoniak stets zu epileptiformen Krämpfen, das urämische Agens dagegen bald zu Epilepsie, bald zu Coma, Convulsionen oder Delirien Veranlassung geben. Sicher erscheint die Injection kohlensauren Ammoniaks in das Blut minder intensiv wirkend wie die Infusion von Liq. Ammon. caustici, vielleicht in Folge geringerer Einwirkung auf die Blutkörperchen, so dass, wie schon Seybert angab, Hunde von Injection von 0,8 in die Venen nach eingetretener Zittern und Krämpfen sich wieder erholen können. Bei subcutaner Injection bewirken toxische Dosen Convulsionen und gesteigerte Reflexerregbarkeit; die Temperatur, welche Laborde danach steigen gesehen haben will, sinkt nach eignen Versuchen dabei constant, selbst um mehrere Grade. Der Herzstillstand ist ein diastolischer (Th. Husemann und Selige). Ammoniumcarbonat steht dem Chlorammonium an Giftigkeit nach.

Bei medicinalen Dosen A. c. geht offenbar kaum eine Spur desselben als solches in das Blut über, aber selbst bei Einspritzung in das Blut wird das kohlensaure Ammoniak rasch gebunden oder verändert, so dass es nicht mehr in demselben nachweisbar erscheint. Böhm u. Lange konnten weder im Blut, noch in der Expirationsluft, noch im Urin von Thieren, denen A. c. zu 0,1—0,5 in das Blut injicirt wurde, freies Ammoniak constatiren und sind der Ansicht, dass dasselbe sich in Harnstoff umwandle. Andererseits behauptet Rabuteau — welcher nach seinen Versuchen besonders die diaphoretische Wirkung des kohlensauren Ammoniaks bestreitet — in der Expirationsluft mit A. carb. vergifteter Thiere geringe Spuren von Ammoniak nachgewiesen zu haben. Eigene Versuche, in denen das Salz subcutan injicirt wurde, ergaben in einzelnen Fällen ein positives Resultat, in den meisten dagegen ein negatives.

Genauere physiologische Versuche über die Einwirkung von kohlensaurem

Ammoniak liegen aus neuester Zeit von Böhm und Lange vor. Ausser den tetanischen Convulsionen, welche Böhm u. Lange vom Rückenmarke abhängig machen, da sie auch nach Durchschneidung des Halsmarkes eintreten, ruft die Injection von kohlensaurem Ammonium auffallende Veränderungen der Athmungsfunktionen, des Blutdrucks und der Circulation hervor. Nach einem inspiratorischen Athmungsstillstande von wenigen Secunden Dauer folgt bei mittleren Giftmengen (0,1—0,2) enorme Beschleunigung der Athemfrequenz ohne eigentliche Dyspnoe, bei stärkeren (0,3—0,5) beträchtliche Retardation derselben und später Acceleration. Da die Beschleunigung der Athmungsfrequenz durch Vagusdurchschneidung nicht herabgedrückt wird und nach vorher ausgeführter Vagusdurchschneidung nur der kurze inspiratorische Stillstand ausfällt, ist mit Bestimmtheit anzunehmen, dass die Ammoniakalien in mittleren Dosen das respiratorische Centrum in der Medulla oblongata in einen abnorm hohen Erregungszustand versetzen, während bei Steigerung der Dose Lähmung desselben erfolgt. In Hinsicht auf den Blutdruck fanden Böhm und Lange sowohl bei curarisirten als bei nicht curarisirten Thieren nach kurz vorübergehendem Sinken ziemlich jähes Ansteigen desselben, womit gleichzeitig bedeutende Pulsbeschleunigung erfolgt; Steigerung der Dose über eine bestimmte Grenze hinaus bewirkt rasch Drucksenkung und Herzstillstand. Die Blutdrucksteigerung ist unabhängig vom vasomotorischen Centrum im verlängerten Mark, dessen Abtrennung dagegen die Steigerung der Pulsfrequenz ausfallen lässt. Die Vagi sind bei diesen Phänomenen nicht betheiligt, ebenso ist die Drucksteigerung von den tetanischen Convulsionen unabhängig.

Als Medicament kommt — von dem externen Gebrauche abgesehen — Ammonium carbonicum in allen Fällen in Anwendung, wo kaustisches Ammoniak benutzt wird, und dient als Excitans, Analepticum, Antispasmodicum sogar in praxi häufiger als dieses.

Eine detaillirte Aufzählung der Krankheiten, wo man Amm. carb. gegen Adynamie und Collapsus gab, erscheint hiernach überflüssig, und wollen wir nur hervorheben, dass die Effecte, welche man bei derartigen Zuständen im Scharlachfieber beobachtete, dem Mittel in England geradezu den Ruf eines Specificums in dieser Krankheit verschafft haben (Peart, Wilkinson, M'Nab, Witt u. A.), die Einzelne sogar von Mangel an Ammoniak im Blute abhängig ansahen. Auch bei Masern (Strohl, West), Erysipelas und asthenischer Pneumonie (Laënnec, Neligan, Guérard, Rognetta) ist das Mittel in Ansehen. Bei Cholera rühmen es im asphyktischen Stadium (hier meist mit Opium oder Campher) Broeks, Hamburger und Donalson. Besondere Empfehlung fand es auch bei Sonnenstich (Baxter, Darrach u. A.) und bei Pneumonie überhaupt und im kindlichen Lebensalter insbesondere (Patton), wo es die Hyperinose des Blutes herabsetzen soll. Von chronischen Affectionen, wo A. carb. Gebrauch fand, nennen wir Psoriasis und squamöse Exantheme überhaupt, bei denen Cazenave und Anderson schon nach acht-tägigem Gebrauche günstige Effecte beobachteten. Von der früher üblichen Anwendung als neutralisirendes Mittel bei Magensäure und davon abhängigem Tympanites und Darmkatarrh dürfte besser zu abstrahiren sein, da hier Natr. carb. das Nämliche leistet. Als Riechmittel lässt sich Amm. carb. ebenfalls verwenden; der Gebrauch zu Fomenten, Waschungen und Salben kann als obsolet gelten.

Man giebt das Ammonium carbonicum zu 0,2—0,5 mehrmals täglich, am besten in Solution.

Pulverform ist unzumessig, jedenfalls muss dabei charta cerata angewendet werden. Vielfach dient es auch zu Saturationen (vgl. S. 172), die man wie Amm. carbon. benutzt.

Früher hatte man eine nicht unbeträchtliche Anzahl officineller Präparate des Ammoniumcarbonats. Das einfachste derselben war eine als Liquor Ammonici carbonici, Ammoniacum carbonicum solutum, Spiritus salis Ammoniaci aquosi, bezeichnete Lösung von 1 Th. Ammoniumcarbonat



in 3 Th. Wasser. Dieselbe diente zur Bereitung von Saturationen, ferner für sich zu 1,0–3,0 3–4mal täglich in Tropfen oder Mixturen überall statt des trockenen Salzes. Zu 15–30 Tropfen im Katzenjammer empfohlen.

Sehr geschätzt war in früherer Zeit ein Gemisch von 32 Th. Ammoniumcarbonat und 1 Th. Oleum animale aethereum, welches als Ammonium carbonicum pyro-oleosum, Sal volatile cornu cervi, brenzliches Hirschhornsalz, bezeichnet wurde. Es stellt ein weisses, mit der Zeit gelb werdendes, in Wasser mit gelblicher Farbe lösliches Pulver dar, welches theilweise wie das später zu besprechende Thieröl wirkt und bei Typhus, Krämpfen, Lähmungen, Asthma, chronischem Rheumatismus und Hysterie zu 0,2–0,5 gegeben ist. Lebert empfahl es besonders gegen Pneumonia potatorum. Eine Lösung des Präparats in 3 Th. Wasser bildete den Liquor Ammonii carbonici pyro-oleosi, welchen man innerlich zu 5–15 Tropfen in aromatischem Thee administrirte und äusserlich bei cariösen schmerzenden Zähnen oder bei Amaurose mit aa Wasser verdünnt einrieb.

Als bernsteinsäure Ammoniumflüssigkeit, Liquor Ammonii succinici, Ammoniacum succinicum solutum, Liquor Cornu cervi succinatus, Ammonium succinicum pyro-oleosum, war ein durch Sättigung von 1 Th. Acid. succinicum in 8 Th. Aq. dest. gelöst mit Amm. carb. pyro-oleosum q. s. resultirendes klares, bräunliches, allmählig braun werdendes, neutrales, beim Erwärmen sich völlig verflüchtigendes Liquidum von empyreumatischem Geruch officinell. Das Präparat entbehrt der kautistischen Action ganz und kann als milderer Ammoniakpräparat zu 20–30 Tropfen gereicht werden. Mit aa Spir. aethereus bildete es den früher bei Gicht und Krämpfen im kindlichen Lebensalter gerühmten Liquor antarthriticus Elleri s. antispasticus s. Liquor Amm. succinici aethereus. In ähnlicher Weise wie L. A. succ. sind auch Sättigungen von Ammonium carbonicum pyro-oleosum mit Benzoësäure (sog. Liquor Ammonii benzoici) oder mit Weinsäure (Liq. Ammonii tartarici) angewendet.

#### Verordnungen:

- |   |   |
|---|---|
| <p>1) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Amm. carbon.</i> 1,0<br/> <i>Syrupi Sarsaparillae comp.</i> 100,0<br/> <i>M. D. S.</i> Täglich 1–3 Theelöffel. (Bei Psoriasis und Lepra. <b>Cazenave.</b>)</p> | <p><i>M. D. S.</i> Zweistündlich 1 Esslöffel. (Bei Scharlach und Pneumonie.)</p>  |
| <p>2) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Ammonii carbonici</i> 1,0–2,0<br/> <i>Aq. Menth. pip.</i> 100,0<br/> <i>Syrupi Althaeae</i> 15,0</p>   | <p>3) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Liquoris Ammonii succinici</i> 1,0–2,0<br/> <i>Aq. Melissae</i> 80,0<br/> <i>Syrupi simpl.</i> 20,0<br/> <i>M. D. S.</i> Stündlich 1 Esslöffel. (Bei typhöser Bronchitis und Lungenödem. <b>Öppolzer.</b>)</p> |

**Anhang.** Ammonium valerianicum; Ammoniumvalerianat, baldriansaures Ammoniak. — Das ursprünglich in Form einer Lösung, Solutio Ammonii valerianici, die in ähnlicher Weise wie der Liquor Ammonii succinici durch Sättigung von Amm. carb. mit Baldriansäure erhalten wurde, angewendete Präparat bildet schneeweisse, seidenglänzende Krystalle von angenehmem, süsslichem Geschmacke und eigenthümlichem Geruche, welche sich in der Wärme verflüchtigen und in Wasser und Alkohol leicht lösen. Nach Vulpian soll es selbst zu 10,0 auf Hunde nicht toxisch wirken (?). Von verschiedenen französischen Autoren wird es als Heilmittel bei Neuralgien — nach Déclat kann es zu 7,5 pro die in Zuckerwasser in kürzester Zeit selbst Prosopalgie beseitigen — und gegen Singultus (Devaux) empfohlen. Auch bei Hysterie, Chorea und Epilepsie soll es Günstiges leisten. Frerichs verordnete es mit Extr. Belladonnae gegen Hepatalgie und Cardialgie; Oettinger im Stadium asphycticum der Cholera. Pfeuffer, Skoda, Hoenigsberg u. A. sahen gar keine Erfolge davon und nach der physiologischen Action

der Baldriansäure dürfen wir keine anderen Effecte als die des Ammonium carb. davon erwarten. Man kann es zu 0,1—0,5 pro dosi in Lösung oder in Pillen verordnen.

**Semina Cocculi, Kokkelskörner.** — Der physiologischen Wirkung nach reihen sich an die erregenden Hirnmittel die zum Vergiften von Fischen und hier und da zum Verfälschen von Bier benutzten, für die Therapie ziemlich irrelevanten Kokkelskörner, die beerenartigen Früchte einer asiatischen Menispermee, *Anamirta Cocculus* Wright und Arnott (*Menispermum Cocculus* L.). Dieselben enthalten neben verschiedenen indifferenten basischen Körpern einen sehr giftigen, nicht glykosidischen Bitterstoff, **Pikrotoxin**, welcher durch Erregung der im Hirn und in der Medulla oblongata belegenen Krampfcentren bei allen Thierclassen Krämpfe hervorruft, abwechselnd tonische und klonische (Dreh- und Schwimmbewegungen), und gleichzeitig durch Einwirkung auf die psychomotorischen Centren Coma bedingt. Auch die Reflexerregbarkeit wird im Laufe der Vergiftung nach anfänglicher Herabsetzung gesteigert; daneben wirkt Pikrotoxin erregend auf das Vaguscentrum, vermehrend auf die Secretion der Speicheldrüsen und der Schleimhäute und lähmend auf das Herz (Falck, Roeber). Nach Browne und Amagat bewährt sich Chloralhydrat selbst bei 5—8fach letalen Dosen. Wegen ihrer deleteren Wirkung auf Epizoen bei Kopfausschlägen in Salbenform benutzt, haben die Kokkelskörner wiederholt zu Intoxication geführt. Rationell wäre vielleicht die Verwendung des Pikrotoxins bei Lähmung des Facialis u. a. motorischen Hirnnerven.

#### b. *Encephalica anaesthetica, Anästhesirende Gehirnmittel.*

Wir fassen unter dieser Gruppe die vorzugsweise zu chirurgischen Zwecken behufs Herstellung eines Zustandes von Bewusstlosigkeit, in welchem schmerzhaft Eindrücke nicht zur Perception gelangen und deshalb Operationen schmerzlos ausgeführt werden können, angewendeten Mittel zusammen. Indem die hierher gehörigen Stoffe zunächst mehr oder weniger Excitation erregen, schliessen sie sich dem Alkohol und den Analeptica an, als welche sie zum Theil ebenfalls angewendet werden; indem sie auch bei schmerzhaften Leiden und zur Beruhigung krankhafter Zustände dienen, bilden sie den Uebergang zu den *Cerebrospinalia sedativa*.

Die Entdeckung der anästhesirenden Mittel und deren Verwendung zu chirurgischen Zwecken kann als ein Triumph der Medicin der Gegenwart betrachtet werden, obschon bereits aus dem Mittelalter über Stoffe berichtet wird, welche von Chirurgen (Hugo v. Lucca u. A.) zum Einschlafen in der Weise benutzt wurden, dass man die Patienten davon athmen liess. Ebenso soll in China seit uralter Zeit das anästhesirende Verfahren in Gebrauch gestanden haben. Von den jetzt verwendeten Stoffen ist das Stickstoffoxydul zuerst zu chirurgischen Zwecken als Anästheticum vorgeschlagen, indem bereits dessen Entdecker Humphrey Davy seine Anwendung in dieser Richtung empfahl. Gewöhnlich verknüpft man die Entdeckung der Anästhesie mit den Namen der Bostoner Jackson und Morton, welche sich um die Ehre streiten, den Aether als Anästheticum introducirt zu haben, dessen Eigenschaften der zuerst genannte Chemiker 1846 erkannte und sie dem Zweitgenannten, einem Zahnarzt, mittheilte, welcher dann davon praktischen Gebrauch machte. Die einschläfernde Wirkung des Aethers auf das Gehirn ist übrigens schon früher aus Intoxicationen bekannt gewesen und ebenso hat schon 1842 W. C. Long zu Athen Gebrauch von dem Mittel als Anästheticum gemacht. Auch das Stickstoffoxydul ist behufs Extraction von Zähnen früher als der Aether, nämlich am 10. Dec. 1844 von Horace Wells in Hartford in Connecticut angewendet. Jedenfalls ist der Aether derjenige Stoff, welcher zuerst allgemeinere Verwendung fand, wozu in

Frankreich Malgaigne und Velpeau, in Deutschland Dieffenbach u. A. beitrugen. Jedoch nur kurze Zeit beherrschte derselbe das Gebiet der allgemeinen Anästhesie, indem ihm bereits im Jahre 1847 in dem Chloroform, dessen anästhetische Eigenschaften zuerst durch Thierversuche von Flourens und fast gleichzeitig am Menschen durch Simpson dargethan wurden, ein Rivale erstand, der ihn fast völlig verdrängte, so dass der Aether gegenwärtig nur noch in einzelnen Städten (Boston, Lyon) und kleineren Territorien (Massachusetts) fast ausschliesslich angewendet wird, sonst aber nur von Einzelnen, z. B. von dem Zahnarzt Weiger in Wien, De Morgan in Dublin u. A., trotz dem Chloroform beibehalten wurde. Der Umstand, dass unter der Anwendung des Chloroforms als Betäubungsmittel eine grössere Anzahl von plötzlichen Todesfällen vorgekommen sind, welche nur dem betreffenden Mittel, nicht äusseren Umständen zur Last gelegt werden können, hat einestheils zu Versuchen, den Aether (Joy Jeffries) und das Stickoxydul (Colton u. A.) wieder allgemeiner zur Geltung zu bringen, andererseits zu dem Studium anderer Körper geführt, welche in gleicher Richtung wirken. Obschon eine grössere Anzahl derselben zu Zwecken allgemeiner Anästhesie empfohlen sind, haben doch nur wenige (Amylen, Methylenbichlorid, Aethylidenchlorid, Aethylbromür) eine etwas ausgedehntere Verbreitung gefunden, aber keines hat die Stellung des Chloroforms erheblich zu erschüttern vermocht. Dagegen haben diese Studien zu einem neuen Verfahren geführt, nämlich zu dem von B. W. Richardson 1866 begründeten Verfahren, durch Verdunstung von Substanzen mit niedrigem Siedepunkte kälterzeugend und damit local anästhesirend zu wirken. Das Nähere über die locale Anästhesie, sowie die Fragen über den Werth der einzelnen Anästhetica wird weiter unten erörtert werden. Hier wollen wir uns begnügen, unsere Ansicht über letztere dahin zu formuliren, dass nicht die Frage, wie sie gewöhnlich von den Partisanen des einen oder des anderen Anästheticums gestellt wird, ob Aether oder Chloroform oder Stickoxydul das beste Anästheticum sei, erlaubt sein kann, sondern dass es nothwendig erscheint, zu untersuchen, ob es nicht concrete Indicationen für jedes einzelne Anästheticum giebt. Solche existiren in der That und sind mit den physiologischen Wirkungen der Mittel in Einklang zu bringen.

Die Frage, ob überhaupt der Gebrauch der Anästhetica zulässig sei, braucht jetzt nicht mehr ventilirt zu werden. Die Einwendung Magendies u. A. gegen die Einführung des Aethers, dass es eines Chirurgen unwürdig sei, an einem Cadaver zu operiren, und dass die durch Aether hervorgerufenen wollüstigen Träume die Moralität gefährdeten, sind ebenso bedeutungslos wie die Anfeindungen des Gebrauchs des Chloroforms bei Entbindungen durch englische Geistliche, welche das Wort der Schrift, dass das Weib mit Schmerzen Kinder gebären soll, in jedem Falle erfüllt wissen wollen.

Die Beurtheilung des relativen Werthes eines Anästheticums muss einerseits die Effecte auf den Organismus, andererseits die Bequemlichkeit der Anwendung zur Grundlage haben. Die letztere wird vorzugsweise durch die physikalischen Eigenschaften, insbesondere den Aggregatzustand, und bei flüssigen Substanzen durch Siedepunkt und Dampfdichte bedingt.

Die zur Anästhesirung verwendeten Mittel sind theilweise Gase, theilweise Flüssigkeiten, welche sich leicht verflüchtigen und in Dampfform den Lungen zuleiten lassen. Die letzteren müssen somit einen niedrigen Siedepunkt besitzen, der, von einzelnen irrelevanten Stoffen (z. B. Amylalkohol) abgesehen, in den Grenzen von  $+11^{\circ}$  (Aethylchlorür) und  $+78^{\circ}$  (Zweifach-Chlorkohlenstoff) liegt. Stoffe von sehr niederem Siedepunkte sowohl als solche von sehr hohem Siedepunkte sind insofern minder zweckmässig, als erstere zu leicht, letztere zu langsam verdunsten. Erstere sind deshalb relativ schlecht zu manipuliren und erfordern, wie die Gase, besondere Apparate, wenn sie als Anästhetica dienen sollen. Die Schwierigkeit der Anwendung erhöht sich noch mehr, wenn zu dem niederen Siedepunkt eine sehr geringe Dampfdichte hinzukommt, auf deren Bedeutung besonders Richardson hingewiesen hat. In diesen Momenten



liegt z. B. der Grund für die weit bequemere Handhabung des Chloroforms (Siedepunkt 62°, Dampfdichte 59) gegenüber dem Aether (Siedepunkt 34°, Dampfdichte 37).

Von untergeordneter Bedeutung sind einzelne andere Eigenschaften, z. B. der Geruch. Fast alle hierher gehörigen Stoffe besitzen einen eigenthümlichen Geruch, der bei manchen Kranken Widerwillen einflösst (Schwefelkohlenstoff, Amylen). Ferner ist das Verhalten zu brennenden Stoffen wichtig, indem der Dampf einzelner Anästhetica, z. B. des Aethers, des Amylens und Caprylwasserstoffs, sich mit grosser Leichtigkeit an der Luft entzündet, weshalb die Ausführung der Anästhesirung mit denselben bei Lampenlicht unzuträglich erscheint, während andererseits z. B. Chloroform die Flamme auszulöschen vermag.

Siedepunkt und Dampfdichte haben für die Verwendung der Anästhetica noch insofern Bedeutung, als die durch das Verstäuben derselben erzielte Localanästhesie auf der dadurch bedingten Kälte beruht, welche um so stärker ausfällt, je leichter die Verdunstung statthaben kann.

In dieser Beziehung muss daher das Chloroform dem Aether stark nachstehen, indem ein direct auf eine Thermometerkugel bei Zimmertemperatur von 19° R. gerichteter zerstäubter Strahl von Chloroform das Thermometer in 60 Secunden auf  $-3^{\circ}$ , von Aether dagegen in 30 Secunden auf  $-12^{\circ}$  bringt (Rosenthal).

Die physiologischen Effecte sind nicht bei allen die gleichen. Alle Anästhetica können bei längerer und übertriebener Zuleitung dem Leben durch Asphyxie ein Ende machen, indem sie das respiratorische Centrum lähmen; aber einzelne Stoffe afficiren ausserdem in sehr hervorragender Weise das Herz, dessen Thätigkeit sie herabsetzen, und können dadurch Veranlassung zu plötzlichen Todesfällen werden, die auf Herzlähmung beruhen. Diese letzte Kategorie ist offenbar gefährlicher als die erste und führt in der That während der Narkose oft zu unvorhergeahnten Unglücksfällen, und es ist sehr zu beklagen, dass die in Folge der mangelnden oder geringeren Wirkung auf das Herz an sich gefahrloseren Stoffe nicht auch in Bezug auf die Bequemlichkeit der Handhabung den Vergleich mit jenen aushalten und dass die sonstigen Erscheinungen der Narkose bei ihnen manche Inconvenienzen hervortreten lassen.

Hierin liegt der wesentlichste Punkt in Bezug auf die Vergleichung der beiden wichtigsten aller Anästhetica, des Aethers und des Chloroforms, indem ersterer vermöge der ihm zukommenden geringeren deleteren Action auf das Herz gefahrloser als das Chloroform, dagegen viel schlechter zu manipuliren ist und auch einzelne Nebenerscheinungen hervorbringt, welche wenigstens in manchen Fällen davon absehen lassen.

Ausser den durchgreifenden Unterschieden der beiden genannten Gruppen ergeben sich bei den Angehörigen derselben verschiedene Differenzen in Bezug auf die Zeit des Eintrittes, die Entwicklung und die Dauer der Narkose.

Die betreffenden Verhältnisse sind allerdings individuellen Schwankungen unterworfen; doch lassen sich einige allgemeine Sätze als berechtigt hinstellen. Bei allen geht dem Stadium des Schlafes und der Anästhesie ein Excitationsstadium voraus, welches bei den einzelnen Stoffen sich sehr nach der Applicationsweise und nach dem Individuum richtet, im Allgemeinen aber beim Aether weit länger ausfällt als beim Chloroform. Da diese Excitation nicht allein die Fortsetzung der Inhalation hindert, sondern auch im Uebrigen störend für den

Operateur und die Umgebung ist: so liegt auch hierin ein Umstand, der das Chloroform als besser praktisch anwendbar erscheinen lässt. Die Dauer der Narkose variirt bei den einzelnen Stoffen sehr; sie ist am kürzesten beim Stickstoffoxydul, welches deshalb auch nur in solchen Fällen dienen kann, wo kurzdauernde Operationen angestellt werden sollen, z. B. bei Zahnextractionen. Auch die Art des Erwachens aus der Narkose ist verschieden; bei den mit starkem Excitationszustande narkotisirenden Mitteln kommt ein Zustand von Excitation und Delirien nach dem Aufhören des Schlafes häufiger vor, als nach den minder excitirenden Anästhetica.

In Bezug auf die Inhalationsweise muss auf die einzelnen Substanzen verwiesen werden.

**Kohlensäure, Acidum carbonicum.** — Die Kohlensäure oder das Kohlen-säureanhydrid,  $\text{CO}_2$ , ist das im Anfange des 17. Jahrhunderts von van Helmont entdeckte Gas, welches an einzelnen Orten, namentlich in vulkanischen Gegenden, als solches der Erde entströmt, z. B. in der sog. Hundsgrotte bei Neapel, in den Dunsthöhlen bei Pyrmont, am Laacher See u. s. w., und als Product des Athmungs- und Verwesungsprocesses einen constanten, dem Volum nach etwa  $\frac{1}{20}$  % betragenden Bestandtheil der atmosphärischen Luft bildet. Ausserdem findet sie sich gelöst in allen Wässern und in grosser Menge (von  $\frac{1}{2}$  bis zum gleichen Volumen) in verschiedenen Mineralwässern, den sog. Säuerlingen, *Aquae acidulae s. gazosae*, von denen die durch andere Bestandtheile (Eisen, Alkalien) ausgezeichneten bereits früher ihre Erledigung gefunden haben. Sie findet sich auch in allen Theilen des Organismus, besonders im Blute und in den Muskeln (als Alkalicarbonat und frei), ausserdem weit verbreitet in der unorganischen Natur in Verbindung mit Basen, insonderheit Kalk. Sie bildet ein farbloses Gas von etwas stechendem Geruche, schwach säuerlichem Geschmacke und 1,529 spec. Gew., welches Lakmuspapier schwach und vorübergehend röthet, nicht brennbar ist und bei hohem Druck zu einer farblosen, sehr beweglichen, durchsichtigen Flüssigkeit, welche durch Verdunstung sich theilweise in eine weisse, schneeartige Masse verwandelt, condensirt wird. Sie löst sich in Wasser; wird letzteres unter höherem Druck damit gesättigt, so entweicht beim Nachlassen des Drucks der Ueberschuss der gelösten Kohlensäure unter Schäumen oder Perlen (Champagner, Sodawasser). Im Contact mit der äusseren Haut übt Kohlensäure einen gelinden Reiz aus, der sich durch ein Gefühl von Stechen und Wärme, mitunter durch leichte Röthe zu erkennen giebt; an zarten Hautstellen entsteht Contraction der glatten Muskelfasern, z. B. am Scrotum. Diese Erscheinungen sind die wesentlichen, welche bei kürzerer Einwirkung des Gases, z. B. in Bädern mit kohlensäurereichen Mineralwässern, örtlich resultiren; wird dagegen das Gas auf eine bestimmte Stelle  $\frac{1}{2}$  Std. geleitet, so tritt ein Gefühl von Erstarrung ein, welchem endlich vollkommene locale Anästhesie nachfolgt. Nach Kisch steigert Kohlensäure zunächst die Tastempfindlichkeit und vermehrt die Secretion und die Turgescenz der Haut. Auch auf Wundflächen und Schleimhäuten wirkt Kohlensäure irritirend und local anästhesirend. Beide Effecte sind sogar prompter. Die einzelnen Schleimhäute verhalten sich etwas verschieden, insofern z. B. auf der Conjunctiva Brennen, Stechen und Röthung viel intensiver sind als auf der Vaginalschleimhaut, wo sich dagegen rasch die Anästhesie geltend macht.

Auch bei externer Application, z. B. in Bädern oder bei Eintauchen von Gliedern in eine Kohlensäureatmosphäre bei geschützten Respirationsorganen (Collard de Martigny), kann die Kohlensäure resorbiert werden und entfernte Erscheinungen veranlassen, wie solche durch Einführen in den Magen (in Gestalt sog. moussirender Getränke) und in höherem Grade bei Inhalation hervortreten. Bei interner Einverleibung überwiegen in der Regel die örtlichen Phänomene, welche in Kriebelgefühl in Mund, Schlund und Nase, säuerlichem Geschmack, bei grösseren Mengen in Ructus, Gefühl von Wärme und Spannung im Epigastrium bestehen, während nur bei Genuss sehr grosser Quantitäten von Brausemischungen sich entfernte Erscheinungen seitens des Nervensystems zu erkennen geben. Dobson will nach dem Genusse einer Brausemischung eine Steigerung der Pulsfrequenz um 10 Schläge (nur 20 Minuten anhaltend) und

Vermehrung der Diurese (die eingeführte Flüssigkeitsmenge übersteigend) constatirt haben. Der Durst wird durch kohlenensäurereiche Getränke weit besser gestillt als durch reines Wasser. Auf die Resorption vom Magen aus influirt namentlich die grössere oder geringere Anfüllung desselben mit Nahrungsmitteln; ist der Magen leer, so tritt die Kohlensäure in das Blut ein und wird durch die Lungen, die Haut und die Nieren ausgeschieden, während bei gefülltem Magen vorzugsweise Ructus entstehen (Lehmann). Kleine Mengen kohlenensäurehaltiger Wässer scheinen den Appetit und die Peristaltik zu erregen; grössere wirken verdauungsstörend und lähmen die Peristaltik, woraus Meteorismus und damit verbundene Unruhe resultiren. Dass der rasche Genuss einiger Flaschen Selterswasser Heiterkeit, grössere Lebhaftigkeit und einen halben Rausch produciren kann, ist Thatsache; ja nach Lender soll der längere Genuss selbst zu Angstanfällen, Schwermuth, unerträglichen Kopfschmerzen und an Irrsinn grenzender Aufregung führen können.

Bei Inhalation von Kohlensäure differiren die Erscheinungen bei Menschen und Thieren, je nachdem das Gas rein oder im Gemenge mit Sauerstoff oder atmosphärischer Luft inhalirt wurde. Wird Kohlensäure rein oder mit wenig atmosphärischer Luft inhalirt, so tritt ein Gefühl von Erstickung, welche das weitere Athmen unmöglich macht, vielleicht in Folge eines auf die Glottis ausgeübten Reizes, auf (H. Davy, Pilâtre de Rozier), während bei Einathmung von Gemengen mit Sauerstoff oder atmosphärischer Luft sich vorzugsweise cerebrale Erscheinungen manifestiren. Die leichtesten bestehen in Schwindel, Beschleunigung der Respiration, Röthung des Gesichts und Kopfschmerz; bei stärkerer Zufuhr treten Uebelkeit, Brechneigung, starke Dyspnoe, Prominenz der Bulbi, Erweiterung der Pupillen und Beschleunigung des Pulses, der zugleich schwächer und minder voll wird, ein. Wird die Einathmung prolongirt, so erfolgt Schwäche der Gliedmaassen und es entwickelt sich ein tiefes Coma, in welchem völlige Anästhesie besteht und in dem der Tod unter den Erscheinungen der Asphyxie — d. h. der durch Anhäufung der im Körper producirten Kohlensäure entstandenen Kohlensäurevergiftung — eintritt, gewöhnlich nach vorausgängigen Convulsionen. Schädliche Wirkungen scheint bei Menschen bereits die Beimengung von 3—5% Kohlensäure zur Atmosphäre zu haben; zur raschen Production von Sopor sind jedoch 10—12% nöthig. Eine gewisse Gewöhnung kommt bei Minenarbeitern vor und ist auch von einzelnen Experimentatoren (Leblanc, Snow) an sich selbst constatirt. Bei Thieren finden noch viel bedeutendere Unterschiede statt. So werden Frösche nur in reiner Kohlensäure betäubt; Vögel werden früher ergriffen als Kaninchen. Convulsionen scheinen bei langsamer Einwirkung viel weniger rasch und intensiv als bei rascher Einführung des Gases aufzutreten (Eulenberg).

Die Theorie der Kohlensäurewirkung gehört zu den Territorien, welche seit jeher der Gegenstand von Streitigkeiten gewesen sind. Man hat namentlich darüber gestritten, ob die Kohlensäure an sich giftig sei oder ob sie nur dadurch wirke, dass sie Sauerstoffmangel im Blute bedinge. Offenbar ist ein direct giftiger Einfluss der ersteren nicht zu leugnen, da die mit den Phänomenen der Intoxication durch Aether und Alkohol übereinstimmenden Erscheinungen auch dann eintreten, wenn das Gas mit der zur Unterhaltung der Respiration nothwendigen Menge Sauerstoff (79%  $\text{CO}_2$  + 21% O) inhalirt wird, und da es selbst mit einer weit grösseren Menge gemischt den Tod herbeiführt. Die Thatsache, dass auch von der äusseren Haut durch Resorption von Kohlensäure Vergiftung und Tod bedingt werden kann (Collard de Martigny), beseitigt die Theorie, dass durch die Inhalation die Diffusion der Gase in den Lungen gestört werde. Die Versuche mit directer Injection von Kohlensäure in das Blut (Nysten, Demarquay) sind wegen der kleinen Mengen, welche eingespritzt werden können, ohne den durch Luftentritt in die Venen bedingten plötzlichen Tod herbeizuführen, ohne Bedeutung; als Resultat der Einbringung kleiner Mengen auf diesem Wege ergibt sich Muskelschwäche, welche bei Inhalation stark diluirter Kohlensäure erst in zweiter Linie erscheint. Uebrigens können 320 Ccm. bei einem Hunde von 5 Kgm. binnen 16 Minuten direct in die Vene eingeführt werden (Casse), während schon die 16mal geringere Menge Schwefelwasserstoff in kurzer Zeit tödtet. Bei geringem Kohlensäuregehalt der Einathmungsluft (bis 20%) sieht man bei Thieren nur Reizungserscheinungen, Beschleunigung



des Athems und Steigerung des Blutdrucks und selbst bei einstündiger Inhalation kommt es nicht zu Coma; erst das Gemenge von etwa 30% Kohlensäure führt nach mehr oder weniger kurzer Excitation zu Depression, Athemverlangsamung und Abnahme der Ausgiebigkeit der einzelnen Respirationen, Sinken des Blutdrucks und mehrstündigem Coma mit tödtlichem Ausgange (Friedländer und Herter). Man sieht bei Thierversuchen evident, dass das Bewusstsein und die Sensibilität zuerst schwinden, dann erst die Bewegung und zuletzt die Athmung, welche sich am längsten erhält. Das letztere ist um so auffallender, als die Kohlensäure gerade auf die Athmung von besonderem Einflusse ist. Wie die Kohlensäure höchst wahrscheinlich das auslösende Moment für die normalen Athembewegungen bildet, so ist auch Dyspnoe, d. h. die Anregung sämtlicher respiratorischer Muskeln, eins der ersten Phänomene durch Zuleitung grösserer Mengen von Kohlensäure. Auch die Convulsionen, welche vor dem Eintritt der eigentlichen Asphyxie auftreten, scheinen als directer Reiz der krampferregenden Centren aufgefasst werden zu müssen. Die Erregbarkeit der motorischen Nerven und Muskeln ist bei Kohlensäurevergiftung nicht herabgesetzt und die Wirkung somit eine centrale (Friedländer und Herter). Bei der unzweifelhaft erregenden und später deprimirenden Wirkung der Kohlensäure auf die peripheren Nerven ist deren Integrität bei Vergiftung auffallend, ebenso die der quergestreiften Muskeln, da solche in Kohlensäure sehr rasch ihre Erregbarkeit einbüssen und todtstarr werden. Von localen Wirkungen der Kohlensäure ist noch die vernichtende Action auf Flimmerbewegung und die erregende auf glatte Muskelfasern hervorzuheben, welche letztere namentlich aus Versuchen von Brown-Séquard hervorgeht, wonach die Einleitung von Kohlensäure in die Vagina Contraction des Uterus bedingt. Nach Nasse erregt Kohlensäureanhäufung im Blute auch die Darmperistaltik, womit auch die Wirkung kohlenensäurereichen Wassers bei interner Einführung harmonirt, während beim Einleiten von Kohlensäuregas in das Darmlumen oder in die Aorta ebenso wie nach dem Genusse grosser Mengen von kohlenensäurehaltigem Wasser Abnahme der Darmperistaltik erfolgt. Bei Inhalation von toxischen Kohlensäuremengen wird die Sauerstoffaufnahme im hohen Grade herabgesetzt (Friedländer und Herter).

Therapeutisch wird die Kohlensäure als Anæstheticum trotz der Empfehlung von P. Bert niemals Verwendung finden können, weil die dazu nöthigen concentrirten Gasgemenge Blutdruck und Athem rasch in gefährlicher Weise herabsetzen; dagegen hat sie nicht zu verkennende Bedeutung zur Beschwichtigung örtlicher Schmerzen. Schon im Alterthume soll man kohlen-sauren Kalk (Lapis Memphites) mit Essig zur Hervorrufung localer Anæsthesie benutzt haben. In neuerer Zeit hat Demarquay die Kohlensäure zur Behandlung schmerzhafter Geschwüre empfohlen, wobei das Mittel nicht allein die Empfindlichkeit lindern, sondern auch die Heilung derselben in ausgezeichneter Weise fördern soll. Auch putride und diphtheritische Geschwüre erfahren dadurch nach Demarquay eine auffallende Besserung ihrer Beschaffenheit und vernarben rascher, wie auch die Subcutaninjection von Kohlensäure bei Tenotomie die Verwachsung der Sehnenenden befördern soll. Diese Wirkungen dürften sich theils durch den gelinden Reiz, welchen die Kohlensäure ausübt, erklären, theils auf antiseptische Eigenschaften derselben beziehen, welche schon früher zur Anwendung der Bierhefe bei putriden Geschwüren führten. Besonders hülfreich ist die Kohlensäure (in der Form der Kohlensäuredouche als Gas oder in Wasser gelöst) bei ulcerösen Affectionen des Uterus (Follen, Demarquay), wo Schmerzen und Fötor dadurch gemindert werden, wie sie sich auch bei anderen schmerzhaften Affectionen der Gebärmutter bewährt, z. B. bei Neuralgia uterina, bei Metritis chronica, bei Dysmenorrhoe (Mojon). Die Erfolge bei diesen Leiden haben das Medicament zu einem bei Sexualkrankheiten des Weibes allgemein verwendeten Mittel gemacht, mit dem man selbst Sterilität und Amenorrhoe heben wollte, und wenn vielleicht bei chronischen Katarrhen der Reiz der Kohlensäure günstig wirkt (wie in der That nicht selten Leukorrhoe sich darnach bessert), oder wenn in Folge der Contraction, welche das Mittel an glatten Muskeln hervorruft, ein atonischer Zustand dadurch gehoben werden mag: so ist doch im Auge zu behalten, dass bei Deviationen u. a. tiefen Leiden des Uterus davon nichts zu erwarten ist, dass bei Schwangeren wegen des durch die Uteruscontraction zu

befürchtenden Abortus davon überall kein Gebrauch gemacht werden darf, wenn man sie nicht geradezu nach Scanzonis Vorgange zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt benutzen will, und dass durch den unvorsichtigen Gebrauch der Kohlensäuredouchen selbst Intoxicationen veranlasst werden können.

Die örtlich sensibilitätsvermindernde Wirkung der Kohlensäure macht sie auch zu einem Mittel zur Beseitigung verschiedener Symptome bei Magenaffectionen. Bekannt genug ist die günstige Wirkung der Kohlensäurewässer (Selters) bei Nausea (Katzenjammer, Indigestionen) und bei Erbrechen, gegen welches sie sowohl beim Vorhandensein von Structurveränderungen als bei Hyperemese in Folge von übertriebener Anwendung von Emetica als bei consensuellem Erbrechen, z. B. bei Vomitus gravidarum, angewendet werden können. Auch bei Magenschmerzen sieht man von Brausemischungen oft entschiedenen Erfolg. In allen diesen Affectionen, sowie bei anderen Digestionsstörungen wird die Kohlensäure meist mit Alkalien combinirt, doch kann es kaum zweifelhaft sein, dass die digestiven Effecte derartiger Combinationsformen (Sodawasser, Sationen, Brausepulver) zum Theil der Kohlensäure zugeschrieben werden müssen, wenn man erwägt, dass die Kohlensäure selbst als Reiz wirkt und dadurch die Magensaftsecretion erregt, theils die Einwirkung diastatischer Fermente auf Amylum bedeutend erhöht.

Die Herabsetzung der Sensibilität durch den Einfluss der Kohlensäure erklärt auch die günstigen Effecte bei manchen Krankheiten der Respirationorgane, welche besonders bei chronischen Bronchial- und Lungenkatarrhen hervortreten, wo namentlich das Trinken kohlenensäurehaltiger alkalischer Mineralwässer sich bewährt (Selterswasser mit Milch, Fms). Inhalationen von Kohlensäuregas sind sowohl hier als bei Phthisis empfohlen, doch passen sie nur, wenn keine acute Exacerbation zu befürchten ist, da das inhalirte Gas stets reizend wirkt. Neigung zu congestiven Zuständen und Pulpitationen contraindiciren dieselben. Bei Phthisis scheint überhaupt der Gebrauch der Kohlensäure besser zu vermeiden zu sein. Die früher üblichen Viehstallsuren, deren Effecte man der Kohlensäure vindicirte, nützen wohl mehr durch die warme, feuchte Beschaffenheit der inhalirten Luft als durch die von den Kühen ausgeathmete Kohlensäure. Von Spengler u. A. ist Kohlensäureinhalation namentlich bei Angina und Pharyngitis granulosa empfohlen; auch bewährt sich das Gurgeln mit kohlenensäurehaltigen Wässern bei chronischen Anginen überhaupt, wahrscheinlich in Folge der dadurch ausgeübten gelinden Irritation. Die letztere Wirkung kommt auch offenbar in Betracht bei der Anwendung gegen chronischen Schnupfen, Blepharitis, Conjunctivis und Otorrhoe, sowie bei manchen Affectionen, gegen welche namentlich kohlenensäurehaltige Bäder in Anwendung gezogen werden, z. B. bei chronischem Muskelrheumatismus und rheumatischen Neuralgien, bei chronischen Hautkrankheiten, z. B. Ekzem und Psoriasis, hysterischen Hautanästhesien u. a. m. Dass die Wirkungen der Stahlbäder und mancher alkalischer und muriatischer Thermen, so weit dieselben äusserlich angewendet werden, auf der Action der Kohlensäure auf die Hautnerven beruhen, wurde bereits oben angegeben.

Besondere Anwendung wird von kohlenensäurehaltigen Wässern bei phosphatischer Diathese gemacht, indem Kohlensäure Calciumphosphat und Ammoniummagnesiumphosphat aufzulösen vermag. Nach Rabuteau muss man dabei den Gebrauch von kohlen-sauren oder pflanzensauren Alkalisalzen vermeiden. Die hauptsächlichste Anwendung, welche man jedoch von der Kohlensäure macht, besteht in ihrem Gebrauche als durstlöschendes Mittel, als welches es besonders unter der Form des Selterswassers trotz der gegen die Kohlensäure als Auswurfstoff erhobenen Angriffe noch immer in heisser Jahreszeit in ausgedehntester Weise benutzt wird. Auch bei Fieberkranken wird Kohlensäurewasser als durstlöschendes und kühlendes Mittel im grossen Maassstabe gegeben.

Was die externe Application der Kohlensäure anlangt, so sind in vielen Badeörter, welche kohlen-säurereiche Mineralquellen besitzen, besondere Vorrichtungen zu Douchen und Gasbädern vorhanden. Als physiologische Wirkungen ergeben sich bei halbstündigem Gebrauch Herabsetzung der Pulsfrequenz, Steigerung des Harndrangs, Vermehrung der 24stündigen Harnmenge ohne Steigerung der Harnstoffausscheidung und bei Frauen nach längerem Gebrauche Vermehrung der Katamenien (Kisch). Man benutzt diese kohlen-sauren Gas-

bäder theils bei Neuralgien, theils bei peripheren Lähmungen, bei chronischen Hautkrankheiten und Rheumatismus, Impotenz, Dysmenorrhoe, Amenorrhoe, chronischem Blasenleiden u. s. w. Will man Kohlensäure anderweitig verordnen, so kann man sie auf Geschwüre in der von Demarquay und Leconte angegebenen Weise bringen, indem man Apparate von Kautschuk mit Kohlensäure füllt und die Extremitäten, an denen die Geschwüre sich finden, 4—6 Stdn. in derselben verweilen lässt, oder man entwickelt einfach in einer Flasche aus Kreide oder doppeltkohlensauern Alkalien mittelst Säure das Gas und leitet letzteres in passenden Röhren zu den Theilen (Vagina, Rectum, Haut) hin. Der Vorschlag, im Rectum selbst Kohlensäureentwicklung aus den betreffenden Materialien vornehmen zu lassen, um bestehender Obstipation entgegen zu wirken, ist wohl kaum ernst gemeint. Uebrigens sind für die Einführung in Rectum und Vagina besondere Apparate, z. B. von Fordes, angegeben.

Zum internen Gebrauche dient die Kohlensäure, abgesehen von den früher erörterten Saturationen und Brausepulvern, vorzugsweise in der Form damit gesättigten Brunnenwassers, Aqua carbonica s. Selterana artificialis, welches man, um so wenig Kohlensäure wie möglich beim Gebrauche zu verlieren, in den sog. Siphons administriert. Die Aqua carbonica wird häufig als Excipiens für schlecht schmeckende Stoffe (Magnesium sulfuricum, Chinin, Eisensalze) benutzt.

**Nitrogenium oxydulatum;** Stickstoffoxydul, Stickstoffmonoxyd, Lustgas. — Ähnliche Zustände wie durch Kohlensäure können auch durch Gase herbeigeführt werden, welche den Sauerstoff aus dem Blute verdrängen. In dieser Richtung wirkt namentlich das bereits oben erwähnte Stickoxydulgas, welches besonders in der Dentistik als Anästheticum neuerdings viel benutzt wird, seit es die damit operirenden amerikanischen Zahnärzte Colton und Evans in Europa bekannter gemacht haben. Bei uns ist es von Berghammer und Patruban (Wien), später von Grohnwald und Sauer (Berlin) zuerst empfohlen.

Das von Priestley entdeckte Gas besitzt einen schwachen angenehmen Geruch, hat ein spec. Gew. von 1,527, lässt sich bei 0° und einem Drucke von 30 Atm. zu einer Flüssigkeit verdichten und erstarrt bei —114° zu einem festen Körper. Es löst sich in geringer Menge in Wasser. Im Stickoxydulgas entzündet sich ein glimmender Spahn, und Kohle, Schwefel, Phosphor verbrennen darin mit derselben Lebhaftigkeit wie in Sauerstoff. Wasserstoff mit Stickoxydul gemengt und angezündet verbrennt mit Knall. Das Gas wird durch Erhitzen von Ammoniumnitrat und Leiten durch Eisenvitriollösung (zur Entfernung von etwa gebildetem Stickoxyd), Aetzkalilösung und Kalkmilch rein erhalten und lässt sich mehrere Tage in Gummiballons, zweckmässiger, wo es in Menge gebraucht wird, in grösseren Gasometern aufbewahren. Auch das comprimirt Gas ist behufs leichteren Transportes und längerer Aufbewahrung in Anwendung gekommen.

Bei der Einathmung von Stickoxydulgas ist es wohl zu unterscheiden, ob dasselbe für sich allein oder in einem Gemenge mit atmosphärischer Luft geathmet wird. Wird es mit Sauerstoff inhalirt, so bildet sich der von Humphrey Davy beschriebene Rausch aus, welchem das Gas den Namen Lustgas oder Lachgas verdankt; er beginnt mit Brausen und Trommeln in den Ohren, Undeutlichwerden der Gegenstände, angenehmem Wärmegefühl, Rieseln in den Gliedmaassen und einem Gefühl von ausserordentlicher Leichtigkeit der Glieder; darauf treten maasslose Bewegungen, Analgesie, schwunghafter Ideengang, grosse Heiterkeit ein, wobei die Pupille etwas erweitert, die Bindehaut geröthet und die Pulsfrequenz wenig vermehrt ist. Die Erscheinungen verlieren sich in kurzer Zeit ohne Nachwirkung, und nur bisweilen bleibt etwas Abspannung zurück; bei häufiger Wiederholung der Versuche schwächen sie sich deutlich ab und treten nach Entwöhnung wieder intensiv ein (L. Hermann).

Wird unvermishtes Stickstoffoxydul geathmet, so kommt es nicht zu einem Rausche, sondern — bei ruhiger Athmung ohne vorausgängige Symptome von Unbehagen, bei plethorischen und zu Kopfcongestion geneigten Personen nach etwas Ohrensausen und Funkensehen — zu allmählichem Verlust des Bewusstseins, wobei das Gesicht ein mehr geröthetes Ansehen annimmt und die



Athemzüge länger und tiefer werden. Das Bewusstsein schwindet in der Regel nach 50—60 Secunden (zwischen 20 und 210 Sec. nach Grohnwald), bisweilen früher, womit gleichzeitig Schliessen der Augen und Erweiterung der Pupillen (selten Contraction) und ein glasiges Aussehen des Auges erfolgt. Dem Einschlafen geht Kriebeln in Händen und Füssen und Analgesie voraus, während anfangs das Gefühl des Contacts noch erhalten bleibt; dann schwindet das Vermögen zu sehen, hierauf die willkürliche Motilität und zuletzt die Gehörspception. Bei noch weiterer Inhalation wird das Athmen schnarchend (tiefe Narkose) und wird die Einathmung noch weiter fortgesetzt, so stellen sich anfangs Zittern, dann convulsivische Bewegungen der Hände und krampfhaftige Streckung des Körpers, Schielen, livide Färbung der Körperoberfläche, Verlangsamung und Weichheit des Pulses und Intermittenz des Athmens ein. Der Schlaf ist ruhig, nicht selten von heiteren Träumen begleitet. Wird das Gas entfernt, so kehrt nach 1 Min. das Bewusstsein wieder und nach einer weiteren Minute verliert sich jede Spur von Benommenheit des Kopfes. Lippen und Gesicht sind nach dem Erwachen lebhafter geröthet, die Versuchspersonen spüren ein behagliches Wärmegefühl und in der Regel durchaus keine unangenehmen Nachwehen. Der durch Stickoxydul bedingte Schlaf ist meist angenehm, die Musculatur in den gelinderen Graden der Narkose schlaff. Nach Holden geht der Betäubung der Sinne eine Verschärfung derselben voraus, insbesondere des Gehörs. Bisweilen schreien die Narkotisirten während der ganzen Dauer des Verfahrens, ohne etwas davon zu wissen; manchmal erfolgt das Erwachen mit Lachen, bei Frauen auch mit Weinen. Bei fortgesetzter Zuleitung des Gases kann Tod durch Asphyxie eintreten.

Aehnliche Narkose ohne initiale Excitation lässt sich auch durch Einathmung eines Gemenges von Stickoxydul mit atmosphärischer Luft unter Erhöhung des Luftdrucks, z. B. in einem pneumatischen Cabinet erzielen, wobei die Farbe des Blutes, der Herzschlag und die Temperatur normal bleiben (P. Bert).

Was die Theorie der Wirkung des Stickstoffoxyduls auf den Organismus anlangt, so ist die verbreitete Anschauung von Humphrey Davy, dass das Gas nach Art des Sauerstoffes die Respiration unterhalten könne, von L. Hermann (1865) widerlegt. Kaninchen bekommen durch die Inhalation des unvermischten Gases in kurzer Zeit Krämpfe und gehen rasch zu Grunde, Frösche sterben in dem Gase nach einigen Stunden. Im Blute giebt es keinen Sauerstoff ab; vielmehr wird das Gas vom Blute nur in der Menge absorbiert, die dem Wassergehalte desselben entspricht (L. Hermann) und unverändert wieder exhalirt (Frankland). L. Hermann nimmt deshalb an, dass die durch Stickoxydul hervorgerufene Analgesie und Anästhesie ausschliesslich Folge der mangelnden Oxydation, also von Asphyxie, sei, wie er auch durch Einathmung von Kohlensäure und Elaylgas mit Sauerstoff ähnliche rauschähnliche Zustände erzeugte, wie sie das Lustgas hervorbringt. Gegen die Theorie, dass Stickstoffoxydul ausschliesslich durch Sauerstoffentziehung wirke, hat Coleman geltend gemacht, dass die Inhalation von Stickstoff nicht genau dieselben Wirkungen habe. Dass durch letztere, wie durch Versuche von Sanderson und Murray (1868) erwiesen ist, erst nach 3—4 Min. Anästhesie eintritt, die Wiedererholung später als nach Stickstoffoxydul erfolgt, kann zwar durch eine langsamere Absorption des Stickstoffs sich erklären, immerhin aber bleibt es auffallend, dass Stickstoff keine Lividität der Haut bedingt und dass bei Einathmung mit kleinen Mengen Sauerstoff rauschartige Erscheinungen nicht resultiren. Auch Zuntz und Goldstein (1878) betrachten die Asphyxie als nicht ausreichend zur Erklärung der Stickoxydulnarkose, da auch bei Inhalation mit hinreichenden Mengen Sauerstoff ein herabsetzender Einfluss auf das Nervensystem, insbesondere der tonischen Erregung des Vagus durch Verlangsamung der Athmung und Beschleunigung des Herzschlages, sich zu erkennen giebt und Frösche in reinem Stickoxydul nach wenigen Minuten, in reinem Wasserstoffgas dagegen erst nach mehreren Stunden ihre Reflexerregbarkeit einbüssen. Die Athemnoth ist bei Säugethieren nach Stickoxydul viel geringer als nach indifferenten Gasen und zeigt zwar die bei einfacher Erstickung gewöhnlichen drei Stadien, doch erfolgt die Anästhesie bereits im Stadium der heftigen activen Inspiration und hält auch bei sofort eingeleiteter künstlicher Athmung 1—2 Min. an. Sinken der Pulsfrequenz und Steigen des Blutdrucks finden sich in der Stickoxydulnarkose allerdings in ana-

loger Weise wie bei der Erstickung, jedoch in weit geringerem Maasse, dagegen steigt während der Erholung der Blutdruck mehr als bei einfacher Erstickung (Zuntz und Goldstein).

Die sehr ausgedehnte Anwendung, welche man namentlich in Amerika vom Stickoxydul als Anästheticum gemacht hat, berechtigt zu dem Ausspruch, dass dasselbe verhältnissmässig ungefährlich und besonders bei kleinen Operationen, welche mit grösseren Schmerzen verbunden sind, mit Vortheil zu benutzen ist. Der von L. Hermann dagegen erhobene Einwand, dass man doch nicht einen Menschen strangulieren werde, um ihn unempfindlich zu machen, klingt zwar erschreckend, fällt aber bei den nach Hunderttausenden zählenden Fällen mit glücklichem Erfolge als rein theoretisches Bedenken hinweg. In der Literatur sind einige Todesfälle in der Stickoxydulnarkose verzeichnet, doch ist die Mehrzahl derselben offenbar vom Stickoxydul unabhängig oder durch grobe Fahrlässigkeit veranlasst. Sogar im dritten Stadium der Dyspnoe wirkt künstliche Respiration lebensrettend (Zuntz und Goldstein). Selbst die wiederholte Anwendung des Gases bei grösseren Operationen kann bei gehöriger Vorsicht ohne Gefahren geschehen (Marion Sims).

Die Inhalation, welche selbstverständlich die Anwendung von Apparaten erfordert, muss, wenn man nicht unter erhöhtem Atmosphärendruck narkotisiert, in der Weise erfolgen, dass das Gas ohne Beimengung von atmosphärischer Luft in die Lungen eindringt, weil sonst rauschähnliche Zustände entstehen, während es zu completer Anästhesie dabei nicht kommt. Wird dagegen reines Gas unvermischt inhalirt, so schwindet Bewusstsein und Gefühl nach wenigen Athemzügen, ohne dass es zu Hustenreiz oder anderen unangenehmen Beiwirkungen kommt. Für den Operateur hat das Verfahren nur das Unbequeme, dass das Gas häufig frisch dargestellt werden muss, und dass zur Einleitung der Inhalation ein voluminöser und ziemlich kostspieliger Apparat nothwendig ist. Die in der Regel oder doch sehr häufig zu beobachtende Lividität des Narkotisirten kommt bei ihrem raschen Schwinden nicht in Betracht, dagegen ist es unangenehm, dass bei vielen Patienten die Narkose nicht zu Stande kommt und der Operateur schliesslich doch zum Chloroform greifen muss. Die Narkose dauert bei gewöhnlicher Anwendung des Gases 70–120 Secunden, selten 3 Minuten. Bei Erwachsenen reichen dazu 25–30 Liter, bei Kindern 15 Liter Stickoxydul aus. Die Anästhesie betrifft auch die Cornea. Bei Zahnextractionen ist indess die Tiefe der Narkose nicht durch Berühren der Conjunctiva festzustellen, weil in früheren Stadien der Narkose dadurch häufig Rückkehr des Bewusstseins bedingt wird. Sobald die Haut und Fingernägel ein cyanotisches Aussehen darbieten und das Athmen stertorös zu werden beginnt, ist die Narkose tief genug, um selbst mehrere Zähne zu extrahieren. Ist nur ein einziger Zahn zu extrahieren, so kann schon früher bei nicht vollständig erloschenem Bewusstsein die Operation gemacht werden, da der Kranke dann nur einen Ruck, aber nicht den Schmerz verspürt. Nach der Extraction ist der Kopf etwas nach vorn zu neigen, um das Blut ausfliessen zu lassen und dessen Aspiration zu verhüten. Anrufen oder Rütteln der Operirten ist zu meiden, da dadurch leicht bei hysterischen Personen Aufregung hervorgerufen wird. Nervöse Symptome beim Erwachen schwinden in der Regel rasch.

Um länger dauernde Narkose ohne extensive Cyanose mit Stickstoffoxydul zu erzielen, hat Sauer eine Mischung von 13,5 Liter Stickoxydul, 0,75 Liter atmosphärischer Luft und 8,0 Chloroform, das im Gasometer verdunstet, empfohlen. Hierbei sollen die Muskelcontractionen ausbleiben. Zweckmässiger ist es gewiss, bei mehreren in einer Sitzung vorzunehmenden Zahnextractionen auch jedesmal eine neue Stickoxydul-Narkose einzuleiten, da die Kranken sich dies gern gefallen lassen und selbst bei fünfmaliger Anwendung keine üblen Nachwirkungen vorkommen, oder unter erhöhtem Luftdruck längere Anästhesie durch Inhalation von Stickoxydul und Sauerstoff unter erhöhtem Luftdrucke zu erzeugen. Diese zuerst von P. Bert angegebene und in den letzten Jahren in Paris ausserordentlich viel angewandte Methode ist offenbar die gefahrloseste der bisher bekannten allgemeinen Anästhesien, wenn sie auch keineswegs überall bei Trinkern oder Hysterischen den Eintritt von Excitation und vorübergehender Muskelcontracturen verhütet, und beugt namentlich auch dem Erbrechen nach dem Erwachen vor. Leider setzt das Verfahren das Vorhandensein von In-

halationsapparaten für comprimirte Luft voraus und ist deshalb nur in grösseren Städten oder Hospitälern verwendbar. Morphiuminjection verlängert die Stickoxydulnarkose nicht (Charropin).

Inhalation von 4 Th. Stickoxydul und 1 Th. Sauerstoff empfahl Klikiwitsch bei reflectorischem Erbrechen, Stenocardie, Asthma bronchiale, phthisischem Husten und bei der Geburt, wo die Wehenschmerzen aufgehoben, dagegen die Wehentätigkeit nicht alterirt wird.

**Carboneum sulfuratum, Alcohol sulfuris, Sulfidum carbonei;** Schwefelkohlenstoff. — Der von Lampadius 1796 entdeckte Schwefelkohlenstoff,  $CS_2$ , welcher beim Ueberleiten von Schwefeldämpfen über glühende Kohlen entsteht, bildet eine farblose, stark lichtbrechende, sehr bewegliche Flüssigkeit von 1,272 spec. Gew., unangenehmem penetrantem Geruche und brennendem, gewürzhaft starkem Geschmacke, welche bei  $47^\circ$  siedet und ausserordentlich schnell an der Luft verdunstet, wobei er grosse Kälte erzeugt, so dass beim Verdampfen im feuchten Luftzuge die Feuchtigkeit der Luft an seiner Oberfläche zu Eis verdichtet wird. Er entzündet sich leicht und verbrennt mit blauer Flamme zu Kohlensäure und schwefliger Säure. In Wasser löst er sich kaum, dagegen leicht in Spiritus, Aether, ätherischen und fetten Oelen; er selbst ist ein vorzügliches Lösungsmittel für Schwefel, Phosphor, Iod, Kautschuk und Harze. Der käufliche Schwefelkohlenstoff enthält häufig Schwefelwasserstoff beigemengt und riecht nach demselben.

Der Schwefelkohlenstoff verhindert in kleinen Mengen Hefe- und Harngährung und conservirt Fleisch und animalische und vegetabilische Substanzen sehr lange (Zöllner, Schiff). Er besitzt örtliche und entfernte Wirkung, von denen die erste bei Application auf Wunden und Geschwüre oder bei Thieren auch beim Contact mit dem isolirten Ischiadicus durch lebhaftes Schmerzgefühl, auf welches jedoch nach einiger Zeit Anästhesie folgt, zu erkennen giebt. Auch bei Intoxication bei interner Einführung zeigt die Magenschleimhaut Irritationserscheinungen (Tamassia). In seiner entfernten Wirkung reiht sich der Schwefelkohlenstoff den anästhesirenden Mitteln an, indem er in Dampfform inhalirt rasch betäubend wirkt, wobei die Herzthätigkeit stark aufgeregt erscheint und nach Rückkehr des Bewusstseins Kopfschmerz, Uebelkeit und Erbrechen zurückbleiben (Simpson). Inwieweit die letzteren Phänomene von beigemengtem Schwefelwasserstoff herrühren (Eulenberg), steht dahin; jedenfalls ist man bei Warmblüthern im Stande, durch concentrirtere Dämpfe völlig reinen Schwefelkohlenstoffs den Tod nach vorausgegangenen klonischen Krämpfen, completter Anästhesie und Paralyse herbeizuführen. Höchst interessant ist die zuerst von Delpech (1856) genauer studirte chronische Vergiftung durch Inhalation von Schwefelkohlenstoffdämpfen in Kautschukfabriken, welche ein ausserordentlich starkes Ergriffensein fast sämmtlicher Abtheilungen des Nervensystems darthut. So zeigen die betreffenden Kranken in der psychischen Sphäre Schwäche des Gedächtnisses, Confusion der Gedanken, bald mit intensiver Aufgeregtheit, Delirien und Tobsucht, bald mit Schlaflosigkeit, schweren Träumen, Niedergeschlagenheit und Trägheit verbunden; in der sensiblen Sphäre Eingenommenheit des Kopfes, Kopfschmerz, Schwindel, rheumatismusähnliche Schmerzen, bisweilen Ameisenkriechen, seltener Anästhesie; in der motorischen Sphäre bisweilen schmerzhaft Krämpfe und Contracturen der Muskeln, fast immer grosse Muskelschwäche, besonders in den Beinen, selten Tremor und Muskelatrophie; in der sensoriellen Sphäre Amblyopie und Anfälle von Taubheit. Fast constant soll bei der chronischen Schwefelkohlenstoffvergiftung vollkommenes Aufhören des Geschlechtstriebes und Impotenz bestehen. Ausserdem finden sich auch Störungen des Verdauungsapparats (Appetitlosigkeit, Uebelkeit und Erbrechen, ferner abwechselnd Obstipation und Durchfälle). Palpitationen, Kurzathmigkeit und intercurrente Fieberanfälle. Auch bei interner Application wirkt reiner Schwefelkohlenstoff giftig. Das Intoxicationsbild nach grösseren Mengen (60,0) entspricht der narkotischen Vergiftung mit Gesichtsblasser, Lividität der Lippen, Pupillenerweiterung, Beschleunigung und Schwäche des Pulses und Sinken der Temperatur, von zeitweisen Schüttelkrämpfen unterbrochen, auf welche nach Rückkehr des Bewusstseins Brennen im Halse, Schwindel und Kopfschmerz folgen, welche mehrere Tage persistiren. Nach Knaf soll schon nach 2—3 Tr. Entzündung im Munde und



Schlunde, später überriechnendes Aufstossen, Kollern im Leibe, Abgang von Blähungen, Drang zum Uriniren, nach 8—10—30 Tr. ausserdem starke Hitze über den ganzen Körper, Abnahme des Appetits, Schwefelgeschmack, Eingenommenheit des Kopfes, Pulsbeschleunigung und Vermehrung der Diaphoresis folgen. Auch bei Thieren lässt sich vom Magen aus tödtliche Vergiftung erzielen, doch wirken vom Magen und Rectum erst 120,0—150,0 tödtlich, während bei Subcutaninjection schon 12,0—15,0 genügen und bei Infusion 2,5—3,0 den Tod in  $\frac{1}{2}$  Stunde herbeiführen. Ebenso lässt sich chronische Vergiftung in Gestalt von Parese oder Paraplegie durch wiederholte Inhalationen herbeiführen (Poincaré). Die toxischen Wirkungen des Schwefelkohlenstoffs sind nach Tamassia auf eine bei jeder Applicationsweise hervortretende Veränderung der rothen Blutkörperchen zu beziehen, welche in schweren Fällen sich in kleine Fragmente auflösen, ohne dass jedoch Hämatin im Blute auftritt, während er die rapide Herabsetzung der Sensibilität auf eine directe Einwirkung auf das Gehirn ansieht. Ein der Schwefelkohlenstoffvergiftung vollkommen entsprechendes Bild giebt die im Organismus leicht in Alkohol und Schwefelkohlenstoff zerfallende Xanthogensäure, doch findet sich hier im Blute post mortem der Hämatinstreifen; ähnlich wirken xanthogensaure Alkaliverbindungen, wenn dieselben in den Magen eingeführt werden, wo die Salzsäure des Magensafts Xanthogensäure abspaltet, während dieselben bei subcutaner Einführung heftige Durchfälle bedingen (L. Lewin). Auch trisulfocarbon-saure Alkalisalze geben im Blute unter der Einwirkung der Kohlensäure Schwefelkohlenstoff, doch entspricht die durch dieselben hervorgerufene Vergiftung der durch das gleichzeitig abgespaltene Schwefelwasserstoffgas bedingten Asphyxie, und im Blute findet sich spectroscopisch der Sulfhämoglobinstreif (L. Lewin).

Die therapeutische Benutzung des Schwefelkohlenstoffs ist gegenwärtig eine sehr unbedeutende. Man gab ihn früher innerlich zu 1—2 Tr. mehrmals täglich, in Zuckerwasser, Milch, Haferschleim oder in Weingeist oder Aether gelöst, bei chronischem Rheumatismus und Gicht, chronischen Hautkrankheiten, Tumor albus, Amenorrhoe, Lähmungen, Amaurose, Wehenschwäche und andern Leiden, auch als Analepticum bei Ohnmachten, Cholera, Asphyxie u. s. w. Als allgemeines Anästheticum ist er nicht brauchbar, dagegen kann er wegen der bei Verdunstung desselben erzeugten Kälte als örtlich anästhesirendes Mittel benutzt werden, um geringere Operationen, z. B. Exstirpation kleiner Geschwülste, Operation des eingewachsenen Nagels, Entfernung von Glassplittern, schmerzlos auszuführen (Delcominète, Simonin, Perrin, Ch. Bernard). Auch örtliche Application an den Schläfen oder hinter dem Ohre wirkt sehr günstig bei Kopiweh (Kennion). In gleicher Weise ist auch das Mittel bei Zahnschmerz (Ragsky), bei eingeklemmten Brüchen und Verbrennungen als schmerzlindernd empfohlen. Verschiedene französische Aerzte (Guillaumet und Costilhes, Obissier) empfehlen Schwefelkohlenstoff zur Bepinselung atonischer Geschwüre der Haut und sichtbaren Schleimhäute; besonders günstig soll die Methode bei Ulcera syphilitica, aber auch bei varicösen und lupösen Geschwüren, zumal in Verbindung mit Iod (1:10—50) oder Iodtinctur (1:5) wirken. Zur localen Anästhesirung gebraucht man den Schwefelkohlenstoff pure und befördert die Verdunstung durch Blasebälge oder sonst in geeigneter Weise. Mit Schwefelkohlenstoff bepinselte Geschwüre bestreut man zweckmässig mit Amylum oder Wismutnitrat. Als Geruchscorrigens empfehlen sich Bittermandelöl, Pfefferminzöl oder Perubalsam.

**Aether**, Aether sulfuricus, Naphtha vitrioli; **Aethyläther**, Schwefeläther, Aether.

Wichtiger als die bisher abgehandelten Anästhetica ist der noch jetzt in einzelnen Städten (Boston, Lyon) als allgemeines Anästheticum ausschliesslich benutzte Aethyläther, der Hauptrepräsentant einer Gruppe organischer Verbindungen, welche man

früher als Oxyde organischer Radicale ansah, als deren Hydrat der zu dem Radicale gehörige Alkohol betrachtet wurde, während man sie jetzt unter Verdopplung der Formel in eine ähnliche Beziehung zu den Alkoholen wie die Anhydride einbasischer Säuren zu letzteren stellt.

Die Formel des Aethyläthers, die nach der ersten Auffassung  $C^2H^5O$  (Aethylalkohol  $\equiv C^2H^5O, HO$ ) ist, wird deshalb jetzt allgemein  $C^4H^{10}O$  oder  $\left. \begin{matrix} C^2H^5 \\ C^2H^5 \end{matrix} \right\} O$  geschrieben. Er ist seiner chemischen Stellung nach völlig verschieden von den meist auch als Aether bezeichneten Estern und Alkylhaloiden (sog. zusammengesetzten Aethern), welche den Salzen vergleichbare Verbindungen der Alkohole darstellen und im Verein mit Alkohol mehr oder weniger in Aether zerfallen.

Der schon von Raimundus Lullus gekannte Aethyläther entsteht bei Destillation von Schwefelsäure mit Weingeist, wie dies bereits Valerius Cordus angab, und wird meist nach dem von Boullay entdeckten Verfahren der continuirlichen Aetherbereitung dargestellt, indem man eine siedende Mischung von 60 Th. englischer Schwefelsäure und 5 Th. 90% Weingeist durch nachfliessenden Weingeist constant auf dem gleichen Niveau erhält, das Destillat, welches ausser Aether, Weingeist und Wasser auch noch schweflige Säure und andere Körper enthält, mit etwas Kalkmilch und dem gleichen Volumen Wasser vermischt, einer neuen Destillation unterwirft, dem zuerst übergegangenen Drittel durch Schütteln mit Wasser den Weingeist entzieht, dann den abgehobenen Aether mit Chlorcalcium entwässert und nochmals rectificirt. Der chemische Vorgang hierbei ist der, dass die Schwefelsäure mit dem Alkohol Wasser und Aethylschwefelsäure (Monäthylsulfat, saurer schwefelsaurer Aethyl-ester) bildet, welche letztere in höherer Temperatur mit noch 1 Molekül Weingeist in Aether und Schwefelsäure zerfällt. Enthält das zur Aetherdestillation nöthige Gemisch von Weingeist und Schwefelsäure zu wenig Weingeist, so entstehen unter Erhöhung des Siedepunkts Oxydationsproducte, welche man in der Pharmacie als schweres Weinöl bezeichnet hat. Der Aethyläther ist ein wasserhelles dünnflüssiges Liquidum von angenehmem Geruche und brennendem Geschmacke, welches bei  $34-35,5^\circ$  siedet und ein spec. Gew. von 0,7185 bei  $17,5^\circ$  besitzt. Er ist äusserst leicht entzündlich und brennt mit leuchtender Flamme; mit atmosphärischer Luft gemengter Aetherdampf explodirt bei Contact mit flammenden Körpern mit grösster Intensität. Wasser löst vom Aether nur  $\frac{1}{10}$  seines Volums, während Aether mit Weingeist in jedem Verhältnisse mischbar ist. Der Aether löst Schwefel und Phosphor in geringer Menge, Iod, Brom, verschiedene Chlormetalle und eine grosse Anzahl organischer Verbindungen, namentlich Fette, Harze, ätherische Oele, Gerbsäure und verschiedene Alkaloide und wird deshalb in der Pharmacie häufig als Solvens oder als Extractionsmittel benutzt.

Der officinelle Aether ist nicht völlig frei von Weingeist und darf nach dem angegebenen spec. Gew. (0,724–0,728) bis 10% Weingeist enthalten. In Frankreich unterscheidet man von dem gewöhnlichen Ether hydrique den reinen Aether, ether pur, welcher letztere angeblich bei Inhalation weit weniger excitirend wirkt. Mit Aether getränktes Fliesspapier darf nach Verdunsten desselben nicht mehr riechen und befeuchtetes Lakmuspapier nicht geröthet werden.

Dem Aether homolog und gleichfalls anästhesirend wirkend sind Methyläther und Amyläther. Methyläther, ein brennbares Gas von geringerer Dichtigkeit als Aetherdampf, ist nach Richardson das sicherste Anästheticum, bedingt aber nach C. H. Taylor leicht Erbrechen. Verschieden davon ist Richardsons Methylated Ether, eine als sicheres Anästheticum zu 15,0 empfohlene Mischung von Aethyläther und Methylenbichlorid, die jedoch schon zu Todesfällen in der Narkose geführt hat (Lawson Tait).

Der Aether besitzt örtlich irritirende und entfernte narkotische und anästhesirende Wirkung. Erstere tritt auf der Haut jedoch

nur ein, wenn die Verdunstung gehindert wird, wo es zu Röthung und Blasenbildung kommt, während bei freier Verdunstung desselben Kältegefühl, Blässe der Haut und Contraction ihrer Elemente (*Cutis anserina*) entsteht. Die anästhesirende Wirkung macht sich besonders geltend, wenn der Aether durch die Lungen in Dampfform eingeführt wird, kann aber auch bei Einbringung in den Magen und in das Rectum oder bei subcutaner Injection sich zeigen und unterscheidet sich von der durch das Chloroform bewirkten Narose durch das Voraufgehen eines verhältnissmässig langen Stadiums der Excitation.

Die örtlich irritirende Wirkung des Aethers zeigt sich auch bei Ingestion in den Magen, zumal bei Einführung grosser Dosen, oder bei habitueller Benutzung; in letzterem Falle kann ähnlich wie beim Alkohol *Vomitus matutinus* und *Cardialgie* (G. Martin) eintreten. Auf die tieferen Schichten der Magenwandungen scheint er ohne Einfluss; dagegen sollen grosse Mengen durch Umwandlung in gasförmigen Zustand ungemein starke Auftreibung des Bauches und durch Verdrängung des Zwerchfells Erstickungsgefahr herbeiführen können (Mitscherlich). Auf die Bronchialschleimhaut scheint selbst reiner Aetherdampf mitunter irritirend zu wirken (Jessop, Lawson Tait), möglicherweise nur durch die mit der Aetherverdunstung verbundene Abkühlung. Aether, welcher längere Zeit mit Luft in Berührung gewesen, enthält oft freie Essigsäure, deren Dämpfe selbstverständlich die Luftwege reizen können.

Der Aether bildet hinsichtlich seiner entfernten Action den Uebergang von den Inebriantia zu den Anästhetica und steht gewissermaassen in der Mitte zwischen Alkohol und Chloroform. In einzelnen Gegenden Nordirlands (Londonderry, Antrim) scheint Aether zu 8,0—15,0 mehrmals täglich als Ersatzmittel von Gin und Whisky allgemein zu dienen (Draper). Ein solcher Ersatz ist jedoch kaum zu billigen, da habitueller Aethergenuss auch chronische Intoxication (*Tremor*, *Vomitus matutinus*), und zwar sehr rasch, bedingen kann (G. Martin). Nothwendig ist dies freilich nicht; in dem von Ewald beschriebenen bekannten Falle des Berliner Aetherfritze, welcher 10 Jahre hindurch täglich bis zu 2 bis 2½ Pfund Aether inhalirte, natürlich mit grossen Verlusten, war der *Tremor* nur sehr mässig und ausser etwas Leberhypertrophie und Hyperämie der Augenbindehaut fanden sich keine krankhaften Erscheinungen.

Verschieden vom Chloroform ist die Wirkung des Aethers auf die Reflexe, die z. Th., wie Sehnen- und Periostreflexe, Patellar-, Tibial- und Fussreflexe, bis zu enormer Intensität gesteigert werden. Der Cornealreflex wird durch Aether verhältnissmässig spät abgeschwächt und nicht völlig aufgehoben (Eulenburg).

Der Aether wird meist durch die Lungen eliminiert; auch im Urin (Pitha, Snow) und in der Milch (Seifert) will man ihn constatirt haben.

Schon vor seiner Einführung als anästhesirendes Mittel wurde der Aether als kräftiges Excitans und Antispasmodicum nach Art des Aethylalkohols und namentlich in Verbindung mit demselben (vgl. Präparate) benutzt. Man kann ihn als solches innerlich, im Klystier, hypodermatisch oder als Riechmittel benutzen.

Die Affectionen, wo er in Gebrauch stand, sind im Wesentlichen dieselben, wie beim Campher. Im Collaps nach Blutungen wirkt die subcutane Aetherinjection, welche mit Ausnahme von Brennen keine localen Inconvenienzen hat, eben so günstig wie Transfusion (Verneuil, Zenaïde Ocounkoff). Aether ist allerdings ein Excitans für Gehirn und Herz, wenn derselbe in kleinen Dosen zur Anwendung kommt, in denen er bei gesunden Menschen und Thieren Steigen der Temperatur um einige Zehntelgrade, Steigerung des Blutdrucks, Vermehrung der Secretionen und in Folge davon auch des Appetits, daneben auch



Vermehrung der Kohlensäureausscheidung, Agitation, Hyperästhesie der Sinne und der Haut, sowie Mydriasis hervorruft (Oocunkoff). Bestimmte Vorzüge des Aethers als Analepticum von Spirituosen u. a. Excitantien, sowie besondere Indicationen lassen sich nicht aufstellen. Als Antispasmodicum benutzte man Aether inhalirt bei Asthma und intern in grösseren Dosen bei Convulsionen der Kinder (Gellé). An diese letzte Gebrauchsweise schliesst sich auch diejenige als Sedativum bei Mania puerperalis (im Klystier). Einzelne andere Anwendungen des Aethers sind obsolet, so gegen Intermittens (Barbier), Aphonie (Delioux), Cholera (Trousseau), bei hysterischen Paroxysmen (als Riechmittel), Bandwurm (mit Ol. Ricini oder Rhiz. Filicis). Der Anwendung bei Gallensteinen wurde schon beim Ol. Tereb. gedacht.

Als allgemeines Anästheticum empfiehlt sich der Aether als Ersatzmittel des Chloroforms in allen Fällen, wo es darauf ankommt, den zu Operirenden längere Zeit in Narkose zu halten, ferner da, wo ein starker Schwächezustand oder das Vorhandensein eines Herzfehlers Collaps in Folge von Chloroforminhalationen befürchten lässt, während bei der Abwesenheit von Contraindicationen des Chloroforms dieses letztere wegen des unangenehmeren Geruches des Aethers und der unbequemen Anwendung desselben den Vorzug verdient.

Wir haben bereits oben das Historische der Aethernarkose erwähnt und hervorgehoben, dass der Aether bis auf wenige ihm treu gebliebene Territorien und Partisanen sein Reich an das Chloroform hat abtreten müssen. Der Grund davon liegt in den schon oben von uns betonten Momenten, welche das Chloroform als weit besser verwendbar erscheinen lassen. Der niedrige Siedepunkt und die geringe Dampfdichte des Aethers lassen ihn kaum ohne Apparat benutzen, und wenn auch Einzelne den Aether aus einem kegelförmig zusammengelegten Tuche oder aus Trichtern von Papier oder Cartons (Squire) inhaliren lassen, in welchen ein in Aether getauchter Schwamm liegt (Joy Jeffries), so sind doch die meisten Anhänger des Mittels einig darüber, dass ein Apparat zweckmässiger sei. Freie Verdunstung des Aethers vom Tuche aus belästigt durch den nicht eben angenehmen Geruch den Operateur und Assistenten. Ferner kommt hinzu, dass die Patienten die Chloroforminhalationen durchweg als angenehmer bezeichnen. Hustenreiz scheint durch reinen Aether nicht viel mehr als durch Chloroform erzeugt zu werden, Erbrechen bei beiden ziemlich gleich stattzufinden, nach Einigen selbst energischer beim Aether, jedoch nicht so lange anhaltend (Norton). Wenn man vom Aether als ferneres Inconveniens angiebt, dass er langsamer als Chloroform zur Narkose führe, so ist das nur unter der Voraussetzung richtig, dass man den Aether ähnlich wie das Chloroform mit einer grösseren Menge atmosphärischer Luft in die Lungen eintreten lässt. Bei Inhalation eines Gemenges von etwa 60 % Aether und 40 % atm. Luft (aus dem Apparate von Norton) erfolgt die Anästhesie in 3–4 Minuten; bei Ausschluss der Luft (z. B. im Apparate von De Morgan), wo dann die Anhäufung von Kohlensäure im Blute natürlich mitwirkt, oft schon in  $\frac{1}{2}$  Minute, also früher als durch Chloroform. In diesem Falle fehlt auch die lärmende Excitation, welche bei Inhalation von Aetherdampf und grössern Mengen Luft, wo die Narkose meist 8–10 Minuten dauert, höchst störend, wenn auch keineswegs gefährlich ist. Dass die Aethernarkose minder tief sei als die Chloroformnarkose (Nothnagel), kann nicht behauptet werden; dagegen ist es trotz der entgegengesetzten Behauptung der Lyoner Chirurgen Thatsache, dass selbst bei Anwendung von Ether pur beim Erwachen aus der Narkose, welche in der Regel etwas früher als beim Chloroform eintritt, Delirien und Agitation häufig sind, wie sie beim Chloroform fast nie vorkommen und während derer die Kranken oft den angelegten Verband entfernen (Jessop). Unangenehm ist ferner das Auftreten acuter Bronchitis von mehrtägiger Dauer (Jessop, Lawson Tait). Erbrechen ist während der Erholung mindestens ebenso häufig wie beim Chloroform. In Boston erbricht jeder Aetherisirte in diesem Stadium, das man, um die anderen Kranken nicht zu stören, in einem besonderen Zimmer durch-

machen lässt. Nach Einzelnen soll Aether sehr leicht Samenergüsse bedingen (Alexander).

Diesen Inconvenienzen gegenüber steht die geringere Gefährlichkeit der Aethernarkose im Vergleich zur Chloroformnarkose, welche von den Aetherfreunden mit vollem Rechte betont wird. Die Wirkungsweise des Aethers als Anästheticum ist insofern der des Chloroforms gleich, als sie auf directer Beeinflussung der Substanz der Nervencentra beruht (Cl. Bernard), vielleicht auch der peripheren Nerven (Ocounkoff), dagegen kommt dem Aether die stark deprimirende Wirkung des Chloroforms auf das Herz nicht in gleichem Grade zu, wodurch die Gefahr plötzlich synoptischen Todes verringert oder beinahe auf Null reducirt wird. In Folge hiervon tritt bei Thieren nach Zuleitung von Aether mit atmosphärischer Luft oder Sauerstoff der Tod viel später ein als nach Chloroform (nach Norris selbst 30mal so spät) und erscheint das Herz der so getödteten Thiere meist elektrisch reizbar. Knoll (1879) zeigte in ausserordentlich exacten physiologischen Versuchen, dass Aether sowohl bei intacten als bei durchschnittenen Vagis den Blutdruck weit weniger herabsetzt als Chloroform und denselben auch bei einer mehrere Minuten lang fortgesetzten Inhalation stets ausreichend lässt, während Chloroform bei etwas verlängerter Narkose denselben bis auf wenige Mm. über die Nulllinie sinken lässt. Auch die Respiration wird durch Aether in weit geringerer Weise beeinflusst als durch Chloroform. Der bei durchschnittenen Vagis nach beiden Anästheticis eintretende Expirationstetanus und der terminale Athemstillstand erfolgen durch Chloroform weit rascher als durch Aether (Knoll). Während bei künstlich respirirenden Warmblütern die Herzwirkung des Chloroforms am blossgelegten Herzen sich unmittelbar durch Ausdehnung und Blutüberfüllung des rechten Ventrikels zu erkennen giebt und Herzstillstand schon in 1 Minute eintritt, kann Aether eine Stunde lang zugeleitet werden, ohne dass das Herz irgendwie afficirt erscheint (Coats, Ramsay und Mc. Kendrick). Am isolirten Froschherzen wirkt Aether noch in Dosen beschleunigend, in denen Chloroform die Muskelsubstanz lähmt (Sydney Ringer). Bei künstlicher Circulation des Froschherzens wirken kleine Dosen beschleunigend, mittlere verlangsamen, während bei grossen das Herz für längere Zeit unthätig wird, doch schwinden diese Effecte rasch bei Durchströmung mit frischem Blute (Kronecker und M'Gregor-Robertson). Die Arbeitsleistung des Herzens beim Menschen ist in der Aethernarkose nach sphygmographischen Untersuchungen von De Morgan sogar gesteigert. Jedenfalls ist das Vorkommen von Todesfällen in der Aethernarkose mehr von der Beeinträchtigung der Respiration als von der des Herzens abhängig. Ausserdem sind aber derartige Fälle weit seltener als in der Chloroformnarkose, nicht allein was die absolute Zahl betrifft, deren Höhe bei der ungleich grösseren Zahl der Chloroformisationen bei dieser auch selbstverständlich weit bedeutender ausfallen muss, sondern auch relativ. Befriedigende statistische Erhebungen liegen nicht vor; ob wirklich von Aetherisirten nur 1 unter 23,504 und von Chloroformirten schon 1 unter 2573 in der Narkose stirbt (De Morgan), steht dahin. Gewiss aber existiren ebenso gut sog. Aethertodesfälle wie Chloroformtodesfälle, und die Bemühungen der Lyoner Aerzte, dieselben als zufällige, vom Aether unabhängige darzustellen, sind nicht geeignet, die Wahrheit ans Licht zu bringen, da unter Anwendung der nämlichen Logik auch die Chloroformtodesfälle sich wegräsonniren liessen. Dass die Gefahren des Aethers übrigens weit geringer sind, beweist das Verfahren in Boston, wo man den Aether ungemessen auf den Inhalationsschwamm schüttet und die Aetherisation selbst Wärdern und Hausknechten anvertraut, so dass der Consum von  $\frac{1}{2}$  Pfund bei einer Operation nicht zu den Seltenheiten gehört. In einem Falle wurden sogar  $4\frac{1}{2}$  Pfund binnen 12 Stunden gebraucht (Bigelow).

Die vorliegenden Facta sind die Basis für die von uns gegebenen Indicationen des Aethers in solchen Fällen, wo das Chloroform besondere Gefahren hat, d. i. wo die längere Zeit nöthige Narkose oder ein individuelles Verhalten des Patienten entschieden Gefahren darbietet. Dahin gehört ausser Herzfehlern auch Collaps durch schwere Verletzungen (Bigelow), wo sogar Einzelne die Aethernarkose geradezu als Excitans wirken gesehen haben wollen. Starke Anämie durch vorausgegangene Blutung contraindicirt zwar das Chloroform

viel mehr als Aether, indessen ist gerade nach Blutungen Sistirung der Athmung in der Aethernarkose beobachtet worden. Dagegen ergeben sich auch für den Aether einzelne bestimmte Contraindicationen. Man vermeide ihn in allen Fällen, wo das Delirium im Stadium der Reconvalescenz Gefahren mit sich bringt, z. B. bei Kataraktoperationen (Hutchinson), ferner da, wo Hirnerscheinungen zu fürchten sind, indem Aether offenbar nach Art des Alkohols stärker hyperämisirend wirkt, daher jedenfalls bei alten Leuten und Apoplektikern, wo nicht gleichzeitig Herzfehler vorhanden sind, das Chloroform den Vorzug verdient. Hutchinson giebt auch im kindlichen Lebensalter dem letzteren den Vorzug. Auch bei Trinkern, wo bei jedem Anästheticum das Excitationsstadium lang und intensiv ist, tritt dies beim Aether mehr hervor. Uebrigens giebt es einzelne Individualitäten, welche jedesmal bei der Aetherisation Lividität des Gesichts, Aussetzen der Respiration und Muskelrigidität bekommen (Bigelow). Selbst plötzliches Schwinden der Herzaction kommt bei Einzelnen vor (Priestley Smith). Eine besondere Contraindication bilden Operationen im Munde wegen des in der Aethernarkose nicht seltenen Speichelflusses (Engdahl) und insbesondere widerräth man den Gebrauch des Aethers bei Staphylophorie. Auffallend ist die grosse Zahl der Aethertodesfälle bei Operationen im Munde (Engdahl).

Statt der tiefen Aethernarkose, welche allein Gefahren bedingt, benutzen übrigens einige amerikanische Chirurgen eine ziemlich früh eintretende Periode von Analgesie, welche selbst bis zu 3 Min. anhalten kann (Packard, Weir), doch ist das Operiren im Excitationsstadium bei Schreien und Lärmen nicht Jedermanns Sache. Muskelschlaffung ist in dieser Periode nicht vorhanden. Im Uebrigen ist die Möglichkeit gegeben, dass bei zu frühzeitiger Operation sehr leicht reflectorisch Stillstände der Respiration oder des Herzens erfolgen (Arloing). Jedenfalls erheischt die Aethernarkose gerade so gut wie die Chloroformnarkose genaue Ueberwachung der Patienten, insbesondere in Bezug auf die Athmung.

Eine besondere Bedeutung besitzt der Aether wegen seiner Eigenschaft, beim Aufträufeln und Verdunsten starke Kälte und in Folge davon Abnahme der Sensibilität und Contraction zu erzeugen, worauf die Anwendung als örtlich schmerzstillendes Mittel, als Stypticum und Antiphlogisticum beruht. Der Umstand, dass die Verdunstungskälte erheblich stärker wird, wenn man sie durch einen Luftstrom oder durch Verstäuben befördert, und dass in Folge davon zunächst in den oberflächlichen Theilen, später selbst in tiefern Gebilden vollkommene Aufhebung der Sensibilität erfolgt, hat zu dem von B. W. Richardson angegebenen Verfahren der localen Anästhesie, welches namentlich für kleinere Operationen passt, geführt.

Als örtlich schmerzstillendes Mittel ist Aether z. B. bei Algien, Rheumatismus, schmerzhaften Geschwüren, hysterischem Kopfweh (aufgeträufelt und spontan verdunstet), bei Otagie (Dämpfe), Zahnschmerz (besonders als Odontine, mit  $\frac{1}{10}$  Nelkenöl) benutzt. Bei Rheumatismus wandte man ihn auch als Erethisticum (als *Ether gélatinisé*, mit 4 Th. Eiweiss geschüttelter Aether, unter Kautschukplatten applicirt) an. Als Antiphlogisticum träufelt man Aether auf Hernien, Furunkel, deren Entwicklung dadurch gehemmt wird, u. s. w., als Stypticum benutzt man ihn bei Nasenbluten (Gintrac). Selbst als allgemeines Verbandsmittel für Wunden und Geschwüre hat Aether in Lordat u. A. Empfehler gefunden. Black rühmt Aether als vortreffliches Mittel bei ulcerösen Zuständen und Entzündungen in Mund oder Schlund. Inwieweit der örtlichen Application bei Amaurose ein Nutzen zukommt, ist durch neuere Erfahrungen nicht festgestellt.

Das Verfahren der localen Anästhesie beruht im Wesentlichen auf der Verstäubung von Aether oder einer anderen Flüssigkeit von niederem Siede-



punkte (Bromäthyl, Petroleumäther, Schwefelkohlenstoff). Mit einem guten Apparate (z. B. Richardsons) erreicht man in 15–50 Secunden Anästhesie von solchem Grade, dass Einschnitte nicht gefühlt werden. Nur reiner Aether erzeugt dieses Phänomen ohne gleichzeitiges Brennen, welches letztere stets bei alkoholhaltigem Aether hervortritt. Die Haut nimmt dabei weisse Farbe an, wird aber nicht hart wie bei Kaltemischungen. Wird die Verstäubung längere Zeit fortgesetzt, so erfolgt auch Anästhesie tieferer Theile (selbst 4–5 Cm. tief) und kann man selbst durch die Schädeldecken hindurch das Gehirn von Thieren zum Gefrieren bringen. Die Erfahrungen am Krankenbett lehren, dass man mit Richardsons Verfahren in der That kleine Operationen schmerzlos auszuführen im Stande ist, wenn man, nachdem die Theile weiss geworden, incidirt; so nach C. Lauenstein (1880) besonders Spaltung von Weichtheilsabscessen, Incisionen von Phlegmonen und Panaritien, Tenotomien, Anlegung von Gegenöffnungen bei Eitersenkung, Spaltung und Auslöfelung oberflächlich verweiterter Schleimbeutel, Entfernung kleiner Fremdkörper und kleiner cutaner und subcutaner Geschwülste, z. B. Condylome, Umstechung von Varicen, Hauttransplantationen, Spaltung der Phimose und Abtragung von Stücken des Präputiums nach gangränösen Schankern, Cauterisation von Lupus und Granulationsgeschwülsten, Operation des eingewachsenen Nagels, bei welcher schon früher Richet das Aufträufeln von Aether empfahl. Hier umgeht man dadurch die Gefahren der allgemeinen Anästhesie. Auch das Ferrum candens lässt sich nach Aetherverstäubung ohne Feuersgefahr anwenden (C. Lauenstein), wenn die betreffende Stelle mit Watte abgewischt wird. Für Zahnextractionen eignet sich das Verfahren nicht, da der Aether im Munde nicht so leicht verstaubt und in Folge davon Verbrennung der Mucosa entstehen kann; meist kommt es bei Anwendung im Munde auch zu den Anfängen allgemeiner Anästhesie (Magitot). Am Scrotum ist die Application sehr schmerzhaft (Demarquay). Dass auch grössere Operationen sich unter dem Verfahren ausführen lassen, beweisen Fälle von Ovariectomie (Spencer Wells), Kaiserschnitt (Greenhalgh), Resection der Scapula (Dolbeau) u. a. m.; bei den ersten Operationen ist die Vermeidung des Erbrechens offenbar eine Indication dafür. Eine Unannehmlichkeit des Verfahrens bildet die in einzelnen Fällen, jedoch selten beobachtete Gangränescenz der localen Anästhesie unterworfenen Hautpartien (Labbé, Heiberg). Offenbar contraindicirt dies die Anwendung bei plastischen Operationen. Nach Letamendi wird der Eintritt der localen Anästhesie durch eine leichte Hautincision oder durch Reiben mit einer Bürste beschleunigt. Dass Aetherverstäubung auch gegen Algien ebenso wie die blosse Aetherverdunstung anwendbar ist, liegt auf der Hand.

Innerlich benutzt man Aether in der Regel zu 10–30 Tr., nöthigenfalls selbst kaffeeöffelweise (so nach Rademacher und Trousseau bei apoplektischen Lähmungen), entweder für sich auf Zucker oder in Wein oder aromatischen Wässern. Verordnung in Mixturen ist bei der Schwerlöslichkeit des Aethers unzweckmässig. In Frankreich sind mit Aether (zu etwa 5 Tr.) gefüllte Gallertcapseln (Perles d'éther) gebräuchlich, auch ein Sirop d'éther (Aether, Spiritus aa 5, Aq. dest. 10, Syr. simpl. 8 Th.). Zu Klystieren verwendet man 2,0–4,0, am besten mit 100,0–150,0 kaltem Wasser; das Vehikel darf niemals eine höhere Temperatur als der Aether besitzen. Dagegen traufelt man ihn behufs Inhalationen kleinerer Mengen wohl auf einen heissen Schwamm oder in heisses Wasser. Zur Subcutaninjection hat man bei hochgradigem Collaps eine volle Spritze (0,7), bei Kindern gegen Convulsionen 10 Tr. injicirt.

Zur Inhalation sind Apparate zweckmässig; ob man dabei freien (Clover) oder beschränkten (Norton) oder gar keinen Luftzutritt (De Morgan) gestatten soll, ist streitig. Ersteres ist entschieden minder gefährlich, erzeugt jedoch langdauernde Excitation; letzteres rasche Narkose. Einzelne Apparate bezwecken die Application erwärmten Aethers, um Bronchitis zu vermeiden (Lawson Tait). Die Dosis lässt sich nicht genau bestimmen, ist aber grösser als die des Chloroforms. Bei asphyktischen Zuständen soll nach Bigelow Zulassung atmosphärischer Luft zur Wiederherstellung genügen.

**Präparat:**

**Spiritus aethereus**, Liqueur anodynus mineralis Hoffmanni, Sp. Aetheris, Sp. sulfurico-aethereus, Sp. Vitrioli dulcis, Aether alcoholicus; **Aetherweingeist**, Hoffmannstropfen, Schwefeläthergeist. Mischung aus 1 Th. Aether und 3 Th. Weingeist; klar, farblos, neutral, flüchtig, von 0,807—0,811 sp. Gew. Wird, abgesehen von der Anwendung des Aethers als allgemeines und örtliches Anästheticum, ganz wie Aether benutzt und ist beim Volke namentlich gegen den Magenkrampf und Kolikschmerzen, auch als Antispasmodicum überhaupt, sehr beliebt. Der ursprünglich von Martmeir, Apotheker in Eisleben bei Halle, angegebene und von dem berühmten Fr. Hoffmann empfohlene Liqueur anodynus mineralis war nicht ein Gemisch von Spiritus und Aether, sondern enthielt ausserdem Weinöl, welches in England lange Zeit als Oleum aethereum oder Spiritus aethereus oleosus (Oleum vitrioli dulce) officinell war und zu 15 Tropfen bei Kaninchen stark berauschend (Pereira), bei Menschen in erethischen Krämpfen und Schmerzen nach Art des Aethers beruhigend wirkt (Physick). Von dem Spiritus aethereus, den man zu 20—60 Tropfen giebt, entspricht 1,0 40—50 Tropfen. Zuelzer empfahl in schweren Fällen von Abdominaltyphus 30—40 Tr. an 4 verschiedenen Stellen zu injiciren, doch ist Aether als weniger örtlich irritirend vorzuziehen.

**Aether aceticus, Naphtha aceti; Essigäther.**

Dieser zusammengesetzte Aether, früher auch als Aether s. Naphtha vegetabilis bezeichnet, ist Essigsäure-Aethylester oder Essigsäure-Aethyläther,  $\text{CH}^3(\text{C}^2\text{H}^5)\text{O}^2$ , und stellt in reinem Zustande eine farblose, klare, neutrale, flüchtige, leicht entzündliche Flüssigkeit von ätherartigem, angenehm erfrischendem Geruch und Geschmack dar, welche bei 74° siedet und ein spec. Gew. von 0,904 bei 17,5° besitzt. Der officinelle Essigäther, welcher etwa 1½ % Spiritus und Wasser enthält, hat ein spec. Gew. von 0,900—0,904. Der Essigäther bildet sich beim Zusammentreffen von Essigsäure im Entstehungszustande mit Weingeist und wird durch Destillation von Natrium- oder Bleiacetat, Schwefelsäure und Weingeist erhalten. Er löst sich in 9 Th. Wasser und wird bei längerem Contacte mit demselben sauer; in Alkohol und Aether ist er in jedem Verhältnisse löslich.

Genaue physiologische Untersuchungen liegen nicht vor. Man versuchte ihn zur Zeit der ersten Einführung des Aethers in Wien und Prag als Anästheticum; die Wirkung tritt langsamer ein, ist aber mit weniger Hustenreiz verbunden. Hauptsächlich dient er jedoch als Analepticum bei Ohnmachten und Collapsus, auch bei Sonnenstich und bei Asthma, theilweise innerlich, theils äusserlich als Riechmittel, wo er wegen des angenehmen Geruches dem Aether vorgezogen wird; auch ist er bei Hustenreiz und Erbrechen, sowie bei hysterischen und hypochondrischen Zuständen, selbst bei Lungentuberculose empfohlen. Manche vindiciren ihm hervorragende diuretische Wirkungen und gebrauchen ihn bei Hydrops, doch fehlt es an beweiskräftigen Erfahrungen vollständig. Innerlich giebt man ihn zu 10—30 Tr. entweder für sich oder in Mixturen. Früher war eine Mischung mit 3 Th. Spiritus unter dem Namen Spiritus Aetheris aceticus s. Spiritus acético-aethereus s. Liqueur anodynus vegetabilis officinell, die man in ähnlicher Weise wie die beim Aether erwähnten Hoffmannstropfen anwandte.

Auch die entsprechenden Essigsäureester des Methyls, Propyls, Isopropyls, Butyls und Amyls wirken dem Essigäther analog (Rabuteau). Der Essigsäure-Methyläther soll Brechneigung und Erbrechen stillen, profuse Bronchialsecretion beschränken, aber wenig anästhetisch wirken (Turnbull). Der Essigsäure-Amyläther, das sog. Birnöl der Parfumeurs, reizt heftig zum Husten (Turnbull); der Athem damit betäubter Thiere riecht stundenlang nach dem Aether.

In ähnlicher Weise wie Essigäther wirkt Ameisensäure - Aethyl-

äther, der die berauschende Wirkung der Spirituosen stärker als Essigäther steigert (Rabuteau). Von zusammengesetzten Aethern ist auch das Aethylnitrat ein Anästheticum, das zu 50—60 Tr. complete Narkose beim Menschen bedingt, der jedoch Schwindel und Geräusch im Kopfe vorausgehen und heftige Kopfschmerzen und Benommenheit nachfolgen (Simpson). Auch bei Thieren wirkt Aethylnitrat anästhesirend, aber unbedeutend (Reichert), selbst langsamer als Aether und bedingt leicht Muskelstarre und Tod (Chambers).

**Chloroformium**, Formylum trichloratum; **Chloroform**, Formyltrichlorid.  
Trichlormethan.

Weitaus das am häufigsten in Anwendung gezogene allgemeine Anästheticum ist das von Soubeiran und Liebig fast gleichzeitig entdeckte und von Flourens und Simpson ebenfalls fast zu der nämlichen Zeit (1847) als anästhesirendes Mittel erkannte Chloroform, welches eines der Producte der Einwirkung von Chlor auf Sumpfgas (Methan) darstellt, übrigens auch aus verschiedenen Aetherverbindungen erhalten werden kann.

Das Chloroform,  $\text{CHCl}_3$ , welches durch vorsichtige Destillation von Weingeist (von 86 Gewichtsprocenten) mit gutem Chlorkalk (von 25% activem Chlor) fabrikmässig dargestellt wird, ist eine farblose, klare, eigenthümlich riechende und süsslich schmeckende, völlig sich verflüchtigende Flüssigkeit von 1,525 spec. Gew. bei  $0^\circ$ , welche bei  $62^\circ$  siedet und schwierig mit grünesäumter Flamme brennt, sich wenig in Wasser, leicht in Weingeist, Aether und fetten Oelen löst. Wie Aether löst auch Chloroform Phosphor, Schwefel, Iod, Fette, Harze, Kautschuk u. a. organische Körper. In Dampfform durch ein glühendes Rohr geleitet zerfällt es in Salzsäure, Chlor,  $\text{C}^2\text{Cl}^6$ ,  $\text{C}^2\text{Cl}^2$ , Kohle u. s. w. Mit weingeistigem und wässrigem Kali und mit wässrigem Ammoniak bildet es ameisensaures Kalium und Kalium- resp. Ammoniumchlorid; trockenes Ammoniakgas erzeugt mit Chloroformdampf bei Rothglühhitze Ammoniumchlorid und Ammoniumcyanid.

Das officinelle Chloroform entspricht keineswegs dem chemisch reinen, sondern enthält bei dem vorgeschriebenen Siedepunkte von  $60-61^\circ$  und dem spec. Gew. von 1,485—1,489 eine bestimmte Menge Weingeist, welcher für die Haltbarkeit des Präparates von wesentlicher Bedeutung ist. Nicht nur, wie man früher annahm, bei der Darstellung mit anderen Chlorsubstitutionsproducten verunreinigtes Chloroform, sondern auch völlig reines zersetzt sich bei längerem Stehen im Lichte und sehr rasch in directem Sonnenlichte, wobei der Geruch sich wesentlich verändert und saure Reaction eintritt. Auch das reinste Chloroform, wie man solches durch Zersetzen von Chloral mit Natronlauge darstellt (sog. Chloralchloroform), das von verschiedenen Chirurgen als gefahrloseres Anästheticum angesehen wird, ist nur bei Zusatz von  $\frac{3}{4}-1\%$  Weingeist haltbar, schützt übrigens keineswegs vor Chloroformsyncope (Bardeleben).

Wie dem Aether und den meisten übrigen Anästhetica kommt auch dem Chloroform örtliche, irritirende, und entfernte, auf die Nervencentra, die Muskeln und das Herz vorzugsweise gerichtete Action, welche letztere nach verhältnissmässig kurzer Excitation rasch den Charakter der Depression annimmt, zu. Die Resorption des Chloroforms erfolgt von allen Applicationsstellen aus, am raschesten von den Lungen, welche auch hauptsächlich die Elimination übernehmen.

Auf die äussere Haut applicirt erzeugt Chloroform beim Verdunsten weniger Kältegefühl als Aether, bei minder rascher Verdunstung und rascher



noch bei aufgehobener Verdunstung ein Gefühl von Brennen, welchem Röthe und selbst Vesikel- und Blasenbildung folgen kann. Locale Anästhesie tritt dabei oder bei Zuleitung in Dampfform nur in sehr untergeordnetem Maasse ein, etwas mehr bei Application in Vagina und Uterus. Auch bei Application des Mittels in unverdünntem Zustande auf Wunden oder Schleimhäute (Mund, Mastdarm, Urethra) bewirkt es zuerst heftiges Brennen, später Verminderung des Gefühls. Werden grössere Mengen Chloroform in den Magen oder das Rectum gebracht, so resultiren auch von hier aus die entfernten Erscheinungen, jedoch in der Regel weit unvollkommener und unausgeprägter, so dass es zu completer Anästhesie nur bei hochgradiger Vergiftung kommt; oft folgt der scheinbaren Wiederherstellung heftige Gastroenteritis.

Die entfernten Wirkungen des Chloroforms sind vorzugsweise in Bezug auf die Inhalation studirt und gestalten sich beim Menschen in folgender Weise: Zuerst kommt eine Zeit, wo der Inhalirende noch freies Bewusstsein besitzt (1. Stadium oder Stadium der Willkür nach Nussbaum) und wo ihm selbst die örtlichen und entfernten Wirkungen des Mittels zur Kenntniss gelangen, so namentlich der für die Meisten unangenehme Geruch des Chloroforms, der manchen Patienten zum Widerstande reizt, brennendes Gefühl in der Conjunctiva mit Thränen der Augen, Kratzen im Schlunde und Kehlkopf, Hustenreiz und Husten, namentlich bei Athmen des Chloroforms aus zu grosser Nähe stark hervortretend und, sobald die entfernten Wirkungen manifest werden, verschwindend; danach ein Zustand von angenehmem Behagen und Leichtsein, wie es bei den Spirituosa im Anzuge des Rausches sich geltend macht; hierauf Alterationen in den Sinnesperceptionen, welche dem Schwinden ihrer Thätigkeit und des Bewusstseins vorausgehen, zunächst des Gefühls (Pelzigsein und Eingeschlafensein der Finger und Extremitäten), dann des Geruchs und Geschmacks, schliesslich auch des Gehörs (Abnahme der richtigen Auffassung der Art und Entfernung von Tönen und Geräuschen, subjective Wahrnehmung monotoner Geräusche) und des Gesichtes (Verschleierte sehen). In einzelnen Fällen soll auffallende Schärfung der Sinne der Abnahme vorausgehen. Auf das Stadium der Willkür, welches meist 1—3, manchmal 5—6 Minuten, selten länger dauert, folgt dann das Stadium der Excitation, manchmal, zumal bei Kindern, nur leise durch abnorme Spannung an irgend einem Körpertheile (Strecken der Finger, Steifwerden des Kniees, krampfhaftes Schliessen der Lider oder des Mundes), angedeutet, meist aber auf den ganzen Körper sich erstreckend (Strecken der Glieder, Zittern, rasches und kurzes Inspiriren bei sehr verlangsamtem, manchmal kreischendem oder singendem Exspiriren); bisweilen durch eine Art kataleptischen Zustand sich manifestirend, meistens in unverständlichen oder halbverständlichen Reden und Irrreden, Singen, Lachen, fortwährendem Ausspucken von Schleim, bisweilen selbst durch furibunde Delirien sich zu erkennen gebend. Am stärksten ausgesprochen sind Hallucinationen und Delirien bei Trinkern, bei denen das Stadium der Excitation selbst  $\frac{1}{4}$  Stunde währen kann, während es sonst in 1—2 Min. vorüber ist. In diesem Stadium gelangen Schmerzenseindrücke unvollkommen zur Perception, indem der Kranke Berührungen, Schnitte u. s. w. schreiend heftig abwehrt, nach der Operation jedoch weder des Schmerzes noch des Vorgefallenen sich erinnert. Der Puls und die Athmung sind im Willkür- und Excitationsstadium beschleunigt; nur selten beobachtet man bei der ersten Inhalation eine Verlangsamung oder auch ein mehrere Secunden dauerndes Aussetzen. Das Gesicht wird meist röthlich, die Haut feucht und warm. Die Pupille ist in diesem Stadium in der Regel dilatirt und die Reizbarkeit der Iris herabgesetzt (Westphal, Budin und Coyne). Ist das Excitationsstadium vorbei, so folgt das Stadium der Narkose oder Anästhesie (Stadium der Toleranz nach Nussbaum), durch Erschlaffung der Muskeln — und zwar meist in umgekehrter Reihenfolge wie bei der Excitation eintretend, am spätesten an den Masseteren (Simonin) manifest — so dass die Glieder passiv in jede Stellung gebracht werden können, schnarchendes Athmen in Folge von Erschlaffung der Gaumensegel und Aufheben der Reflexe charakterisirt. Die Sensibilität erlischt jetzt völlig, am spätesten an der Stirn und Schläfengegend. Von den Reflexen, welche z. Th. anfänglich durch Chloroform gesteigert werden, verschwindet der Patellarreflex erheblich früher als der mit dem Eintritt der Myose cessirende Cornealreflex und tritt beim Nachlassen der Narkose

auch viel später wieder ein. Der Nasenreflex überdauert den Cornealreflex bis zur tiefsten Hypnose (Eulenburg). Die Erschlaffung der Muskeln ergreift auch in manchen Fällen die Sphinkteren (besonders bei Kindern und alten Leuten). In der Narkose ist stets die Temperatur gesunken, die Haut von Schweiss bedeckt, der Kranke im Flabitus und Gesichtsausdrucke einem Schlafenden ähnlich. Der Puls ist ruhig und langsam, in seiner Stärke meist etwas herabgesetzt, die Triebkraft des Herzens gemindert, so dass Operationswunden weniger stark bluten; die Athemzüge sind seltener und minder tief. Die Contractionen der glatten Muskeln (Uterus, Darm) werden nicht herabgesetzt, die Darmperistaltik sogar bei eintretender Verlangsamung des Blutumlaufs gesteigert (Nussbaum). Die Pupille wird verengt, erweitert sich aber auf starke Hautreize oder Schreien in die Ohren bei nicht allzutiefer Narkose. In diesem Stadium wird der Schmerz operativer Eingriffe nicht empfunden, nur vereinzelt werden dabei leise Schmerzen gefühlt oder Berührungen wahrgenommen (sog. Analgesie).

Das Erwachen aus der Chloroformnarkose erfolgt entweder (während oder am Ende der Operation) ziemlich langsam oder plötzlich, meist in 5—30 Min. nach Aussetzen der Inhalation, nicht selten, namentlich bei protrahirten Narkosen, mit starkem Würgen und Erbrechen, oder (beim weiblichen Geschlechte) mit Weinen und Lachen, auch mit Schüttelfrost, dem starker Collapsus folgt. Die Pupille erweitert sich dabei. Einige Personen verspüren noch längere Zeit, selbst 24 Stunden, Eingenommensein und Schmerzen im Kopf und sind übel, während bei anderen die Chloroformnarkose keinerlei Nachwehen hinterlässt. Die Meisten verfallen, der Ruhe überlassen, bald wieder in Schlaf, aus dem sie mit Leichtigkeit zu erwecken sind. In diesem Stadium findet sich fast bei der Hälfte der Chloroformirten ein Venenpuls an der Jugularis (Laréginie und Noël), vielleicht in Folge fortdauernder Schwäche des Herzmuskels. In seltenen Fällen hat man, wohl stets nach länger dauernder Zufuhr von Chloroform, ikterische Färbung der Haut und Auftreten von Gallenfarbstoff im Urin beobachtet (Leyden, Bernstein, Fischer). In einzelnen Fällen erfolgt das Erwachen aus der Narkose erst viel später, in 6—12 Stunden, ja selbst erst nach Tagen; in anderen Fällen soll das Bewusstsein wieder eintreten, dann aber aufs Neue schwinden und der Tod plötzlich oder unter Convulsionen eintreten (O. Fischer).

Fälle der letzteren Art hat man fälschlich als chronische Chloroformvergiftung bezeichnet, welchen Namen man richtiger auf die durch den habituellen Genuss von Chloroform vereinzelt vorgekommenen Intoxicationen beschränkt, welche in manchen Beziehungen an Alcoholismus chronicus erinnern. Am häufigsten scheinen periodische Anfälle von Manie und Verfolgungswahn sich nach letzterem zu entwickeln (Büchner, Svetlin), daneben Magenschmerzen, Erbrechen und Appetitlosigkeit (selbst bei Inhalationen), auch Insomnie (Anstie); bisweilen kommt es zu einer ähnlichen Leidenschaft zum Chloroform wie bei Trinkern zu Spirituosa und bei Opiophagen zum Opium (Kurrer). Die allgemeine Ernährung wird ebenfalls dadurch sehr gestört (Anämie, Abmagerung) und der Tod kann der Ausgang sein.

Wird die Chloroforminhalation im Stadium der Narkose nicht unterbrochen, so erfolgt schliesslich der Tod, und zwar meist plötzlich durch Herzparalyse oder durch Lähmung der respiratorischen Thätigkeit, selten unter epileptiformen Krämpfen.

Bei Thieren steht bei Fortsetzung des Chloroformirens bis zu dem Tode regelmässig die Athmung etwas früher still als das Herz; bei Menschen bisweilen letzteres vor ersterem (siehe weiter unten).

Die nicht unbeträchtliche Anzahl physiologischer Untersuchungen über die entfernte Wirkung des Chloroforms lassen zwar unsere Kenntniss darüber nicht als abgeschlossen erscheinen, haben indessen doch Aufklärung über manche Punkte gegeben.

Ein gewisses Hemmniss für solche Versuche liegt in dem verschiedenen Verhalten der Thiere dem Chloroform gegenüber. So werden Frösche leicht narkotisirt, ebenso Vögel, während Eidechsen und Schlangen wieder viel grössere Mengen nöthig haben und bei Hunden, Katzen, Kaninchen die durch Inhalation hervorgebrachte Betäubung meist viel schlechter als beim Menschen ausfällt. Einen Ziegenbock haben wir vergeblich zu narkotisiren versucht. Am besten qualificiren sich Tauben zu solchen Inhalationsversuchen.

Die Wirkung des Chloroforms ist wahrscheinlich abhängig von einer directen Action desselben auf das Gehirn, obschon weder ein Einfluss auf die peripherischen Nerven noch auf das Blut geleugnet werden kann.

Dass das Blut unter der Chloroformnarkose eine dunklere Farbe annimmt, ist factisch und dieses Factum ist wohl nicht durch blosse Kohlensäureanhäufung zu erklären. L. Hermann fand, dass Chloroform wie die meisten übrigen Anästhetica Auflösung der rothen Blutkörperchen bewirken kann, welche er auf Einwirkung dieser Mittel auf das Protogon zurückführt. Boettcher machte darauf aufmerksam, dass mit Chloroform gemischtes Blut lackfarben werde. Schmiedeberg wies nach, dass kleine Mengen Chloroform in defibrinirtem Blute ein hell ziegelrothes, lockeres Coagulum bilden, welches die Ozonreaction mit Guajak giebt und durch Umrühren in 24–28 Stunden sich löst, während Blutserum durch Chloroform nicht getrübt wird; in dem Coagulum erscheinen die Blutkörperchen zackig und unregelmässig aggregirt. Nach Witte (1874) quellen bei vorsichtiger Versetzung von Blut mit Chloroform die Ränder der Blutkörperchen auf, die Zellen werden kugelig und treiben 8–10 und mehr lange Fortsätze, welche an ihren peripheren Enden kolbenförmig aufgetrieben sind. Inwieweit im lebenden Thiere und Menschen derartige Veränderungen der rothen Blutkörperchen vor sich gehen, ist zweifelhaft. Nach Witte finden sich die betreffenden Blutkörperchenveränderungen, welche sich von den durch Ammoniak, Aether und Alkohol hervorgebrachten leicht unterscheiden lassen, in jedem Blutstropfen chloroformirter Individuen. Andere Beobachter, z. B. Schenk, wollen im circulirenden Blute keinerlei Veränderung der Blutkörperchen gesehen haben, auch nicht im Mesenterium eines lebenden Frosches bei Einwirkung von Chloroformdampf. Nach Witte und Hueter ist weniger die Blutkörperchenveränderung als Ursache der Chloroformnarkose zu betrachten als die eigenthümliche globulöse Stase, welche sich z. B. bei Application einiger Tropfen Chloroform auf die Bauchhaut eines Frosches in exquisiter Weise zu erkennen giebt. Die durch das Chloroform veränderten Blutkörperchen sollen dann weiter fortgespült und an anderen Stellen des Kreislaufes, insbesondere in den Capillaren der Hirncentren haften bleiben. Dass man bei der Ableitung der Narkose von derartigen Vertheilungen der Blutveränderung eine coordinirte unabhängige Erscheinung als Grund der Narkose supponirt, kann nicht zweifelhaft sein; denn der Umstand, dass auch bei wirbellosten Thieren und bei völlig blutleeren Fröschen (Bernstein) durch Chloroform Anästhesie hervorgerufen wird, beweist, dass letztere nicht indirect durch das alterirte Blut, sondern direct durch Veränderung der Nervensubstanz bedingt ist. Die Untersuchungen von Bernstein lehren, dass nicht nur die Nervencentra, sondern auch die peripherischen Theile des Nervensystems vom Chloroform afficirt werden, und zwar in der Weise, dass anfangs Excitation, später Depression eintritt. Die Wirkungen auf die einzelnen Theile des Nervensystems verhalten sich übrigens in ihrer Intensität und in der Schnelligkeit des Eintritts sehr verschieden. Wie beim Alkohol und Aether ist das Grosshirn die zuerst betroffene Partie; auf die daraus resultirende Alteration der psychischen Function folgt die vielleicht vom Kleinhirn abhängende Störung der Coordination der Bewegungen, hierauf die Vernichtung der vom Rückenmark abhängigen Reflexerregbarkeit, schliesslich werden auch das verlängerte Mark und die peripherischen Nerven ergriffen, welche letzteren zu einer Zeit, wo die Nervencentra bereits vollständig gelähmt sind, noch normal fungiren. Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass das Chloroform rascher und intensiver auf die Nervenzellen als auf die Nervenfasern wirkt, und zwar werden, wie Bernstein nachwies, die sensibeln Ganglienzellen



häufig schon zu einer Zeit gelähmt, wo die Beeinträchtigung der motorischen noch sehr unbedeutend erscheint. Auch das eben erwähnte Factum, dass manchmal bei Chloroformnarkose Schmerzindrücke nicht empfunden werden, wenn tactile Reize noch zur Wahrnehmung gelangen, hat man daraus erklärt, dass die im Rückenmarke verlaufenden Nervenfasern später als die graue Substanz afficirt werden. In welcher Weise aber die Nervensubstanz betroffen wird, darüber divergiren die Ansichten. Die Annahme von Claude Bernard, dass die Chloroformwirkung einfach auf Anämie des Gehirns beruhe, ist wohl kaum mit der Thatsache in Einklang zu bringen, dass sehr häufig bei mit Chloroform getödteten Thieren (auch bei Menschen) Hirnhyperämie besteht. Hermann hat Einwirkung auf das Protagon angenommen; Hoppe-Seyler und Bernstein eine solche auf das Cholesterin, während Ranke die Eiweissstoffe der Nervensubstanz überhaupt als betroffen ansieht. Letzteres hat insofern gewisse Wahrscheinlichkeit, als neben dem Hämoglobin auch das Myosin in besonderer Weise durch Chloroform verändert wird. Nach Ranke produciren Chloroformdämpfe in klar filtrirter Myosinlösung in ca.  $\frac{3}{4}$  Stdn. (später auch in filtrirter Lösung von Nervensubstanz) Trübung, was beim Aether und Amylen weit langsamer statthat. Auch tritt bei den in einer Chloroformatmosphäre gelähmten Fröschen nach  $\frac{1}{2}$  Stunde Spreizung der Zehen und complete Starre der Musculatur ein, und auch bei Warmblüthern erfolgt der Rigor mortis weit rascher. Es ist somit auch eine Einwirkung des Chloroforms auf die Muskeln nicht zu verkennen, welche sich auch bei Injectionen von Chloroform in eine Arterie an den von denselben versorgten Muskeln in Form tetanischer Starre zu erkennen giebt; doch hört die Reizbarkeit der Muskeln später auf als die der Nerven (Ranke).

Dass das Chloroform eine primäre Wirkung auf das Athemcentrum besitzt, hat Knoll (1877) bei Thieren, welche durch eine Trachealfistel athmeten, erwiesen. Dasselbe scheint zuerst erregt, dann herabgesetzt und gelähmt zu werden. Die Wirkung ist selbst stärker als beim Aether, tritt früher ein als die Veränderungen des Blutdrucks und der Herzaction und ist von letzterer unabhängig, da sie auch bei Einspritzung in die Carotis ganz ohne jene vorkommen kann. Die Athemcurven zeigen charakteristische Differenzen von den gewöhnlichen Erstickungscurven; letztere werden durch Einleiten von Chloroform unmittelbar modificirt (Knoll).

Sehr bedeutend ist die herabsetzende Wirkung des Chloroforms auf die Circulation, bei welcher theils das vasomotorische Nervensystem, theils die Herznerven, theils auch die Herzmuskel betroffen sind.

Bei Thieren und auch wohl bei Menschen kommt im Anfange der Inhalation momentaner Herzstillstand und Respirationstillstand vor, welcher offenbar durch reflectorische Reizung der Vagi, vom Trigeminus oder Olfactorius aus erregt, bedingt ist (Dogiel, Holmgren und Grape). Nach Scheinsson sinkt in der Chloroformnarkose der Blutdruck durch Herabsetzung der Energie der Herzthätigkeit auf  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$  des gewöhnlichen Druckes, ohne dass Erweiterung der Gefässe durch Lähmung des Sympathicus oder die mangelhafte Oxydation des Blutes und die Herznerven dabei theilhaftig wären; dagegen sollen die Veränderungen in der Frequenz des Pulses von den Nerven abhängig sein, da sie bei durchschnittenen Vagi und Sympathici nicht mehr eintreten. Knoll constatirte bei tracheotomirten Thieren durch Chloroform constant Senkung des Blutdrucks neben den verschiedenartigsten Veränderungen des Herzschlages, meist Verlangsamung mit geringer Erhöhung oder Gleichbleiben der Welle, bald Beschleunigung mit Verkleinerung der Wellenhöhe, bald Arrhythmie. Das Sinken des Blutdrucks erfolgt sowohl bei intactem als meist in noch erhöhtem Grade bei durchschnittenem Vagus und tritt auch bei curarisirten Thieren ein. Hiernach kann die Drucksenkung nicht ausschliesslich auf das Herz bezogen werden, zumal da selbst bei der intensivsten Chloroformwirkung Frequenz und Energie des Herzschlages mitunter nicht geändert ist. Ob der hieraus sich ergebende verminderte Tonus der Blutgefässe von den peripheren Vasomotoren oder vom vasomotorischen Centrum abhängig ist, steht dahin. Knoll supponirt

eine Lähmung der Vasoconstrictoren, da, wie schon früher Cl. Bernard fand, bei Durchschneidung des Sympathicus die Temperatur des Ohres an der entsprechenden Seite sinkt, während sie an der anderen steigt; ob dabei Veränderungen in der Blutfülle der Ohrgefäße stattfinden, ist zweifelhaft. Bei Einführung von Chloroform in den Magen scheint das Sinken geringer zu sein (Lenz). Spritzt man Chloroform in eine Vene, so erfolgt rasch Stillstand des Herzens (Gosselin, Glover, Ranke, Knoll). Man bezeichnete früher allgemein den Stillstand als durch Tetanus des 1. Herzens bedingt und parallelisirte diesen Zustand mit der bei Thieren und Menschen, welche während der Chloroformnarkose starben, häufig gefundenen Contraction des linken Ventrikels bei starker Dilatation der rechten Herzhälfte. Nach Knoll ist bei Vivisectionen auch der linke Ventrikel in der Ruhe schlaff und dilatirt, so dass es richtiger erscheint, die Lähmung auf die Herzganglien und nicht auf Veränderungen des Herzmuskels zu beziehen.

Die Abnahme der Temperatur durch Chloroform steht mit einer Herabsetzung des Stoffwechsels zweifelsohne in Zusammenhang (Scheinesson).

Das von Duméril und Demarquay zuerst constatirte Sinken der Temperatur ist bei leichter Narkose, z. B. bei Kreissenden, unbedeutend, hochgradig bei tiefer Narkose und kann bei Thieren 3° und darüber betragen. Bei nicht zu weit ausgedehnter Narkose wollen Lichtenfels und Fröhlich an sich selbst geringe Steigerung der Eigenwärme beobachtet haben. Der tiefste Stand der Temperatur fällt nicht mit der Akme der Narkose zusammen. Scheinesson hat durch physiologische Experimente dargethan, dass nicht erhöhte Wärmeabgabe seitens der Haut (die Hautperspiration ist vermindert) und Lungen Ursache des Phänomens ist. Steigen der Temperatur vor deren Sinken (Duméril und Demarquay) scheint nur durch zufällige Unruhe der Thiere veranlasst (Scheinesson),

Als Grund der Stoffwechselverlangsamung dürfte das Verhalten des Chloroforms zu den rothen Blutkörperchen sich ergeben, mit welcher möglicher Weise auch die Verfettung der Leber und des Herzens (seltener auch an Nieren und willkürlichen Muskeln vorkommend) zusammenhängt, welche man bei Thieren, die durch Chloroform vergiftet wurden, beobachtete. Nothnagel sah solche besonders nach der Einführung des Chloroforms in den Magen oder unter die Haut, weniger nach Inhalationen. Im Urin finden sich häufig reducirende Substanzen; ob wirklich Glykose (Reynoso u. A.), ist noch nicht mit völliger Evidenz dargethan.

Die oben dargestellte Veränderung der Pupille, welche übrigens mancherlei Modificationen erfährt, insofern z. B. eintretendes Erbrechen oder Asphyxie und andere Umstände mehr die Myosis in Mydriasis verwandeln, sind nicht Wirkungen des Chloroforms auf die peripherischen Irisnerven, sondern scheinen central von primärer Erregung (Myosis) und späterer Lähmung (Mydriasis) des Oculomotorius bedingt zu sein. Lähmung des Sympathicus scheint erst sehr spät zu erfolgen (Dogiel, Westphal).

Das Chloroform ist dasjenige Anästheticum, welches durch seine äusseren Eigenschaften sich vor allen übrigen zur Einleitung von Narkosen zur Vornahme schmerzhafter chirurgischer Operationen oder Untersuchungen empfiehlt, wenn dieselben nicht zu geringfügig sind oder zu lange Zeit in Anspruch nehmen, indem im ersten Falle die durch das Medicament bedingte Gefahr nicht im Verhältnisse zu der Schwere des operativen Eingriffes steht und im zweiten Falle die stark paralisirende Action des Chloroforms auf das Herz besonders zu fürchten ist.

Es ist selbstverständlich, dass Operationen, welche die Einleitung allgemeiner Anästhesie überhaupt contraindiciren, auch eine Gegenanzeige gegen

Chloroform bilden, so Tenotomie, wo die Spannung der Sehne erhalten werden muss, und Lithotritie. Operationen im Pharynx und Munde verbieten zwar das Anästhesiren nicht ganz, machen aber besondere Vorsicht nöthig, dass das Blut nicht in die Luftwege gerath und Erstickung bedingt. Sehr schlechte Narkosen sollen bei *Fistula ani* vorkommen (Nicaise). Besondere Aufmerksamkeit verdienen die neuesten Ermittlungen von Brown-Sequard, wonach die Application von Chloroform auf die Haut von Warmblüthern, ebenso auf die Nasen- und Mundschleimhaut zu vollkommenem Verlust der Sensibilität und des Reflexvermögens führt, welchen Erscheinungen Excitationssymptome vorausgehen.

Während in den angeführten Umständen (Siedepunkt, Dampfdichte) sich die Gründe für die allgemeine Anwendung des Chloroforms klar genug darstellen, ergeben sich Gegengründe in den durch das Mittel bisweilen bewirkten sog. schlechten Narkosen und in den während seiner Anwendung manchmal vorkommenden plötzlichen Todesfällen, die man wohl als Chloroformasphyxie, richtiger aber als Chloroformsynkope bezeichnet, da es sich in ihnen um einen durch plötzlichen Stillstand des Herzens bedingten Tod handelt. Es ist nicht in Abrede zu stellen, dass in der Casuistik der sog. Chloroformtodesfälle, worunter man alle beim Chloroformiren vorgekommenen Todesfälle begreift, sich sehr viele befinden, welche nicht dem Chloroform Schuld gegeben werden können, wie es ja bekannt ist, dass vor der Einführung der Anästhetica plötzliche Todesfälle auf dem Operationstisch wiederholt vorgekommen sind. Es lässt sich auch nicht bestreiten, dass in manchen derartigen Chloroformtodesfällen Verstösse wider die Regeln der Anwendung gemacht wurden. Immerhin aber bleibt eine Anzahl übrig, wo nur die deletere Wirkung des Chloroforms auf das Herz als Ursache des Todes betrachtet werden kann. Es sind dies diejenigen Fälle, wo unter plötzlichem Blasswerden des Gesichts die Thätigkeit des Herzens plötzlich erlischt und der Puls unfühlbar wird, während die Respiration noch eine Zeit lang fortgeht, und wo nach dem Tode das Herz in stark erschlafte Zustand angetroffen wird. Der Tod kann in dieser Weise schon nach wenigen Inspirationen erfolgen, ehe die eigentliche Operation begonnen hat, und ohne dass in der Art und Weise des Eintritts der Narkose sich irgend welche Zeichen für die Möglichkeit eines solchen Ausgangs gezeigt hätten. Diese Chloroformsynkope ist wohl zu unterscheiden von der Chloroformasphyxie, deren Eintreten durch starke Lividität des Gesichtes und schnarchende Respiration sich zu erkennen giebt und bei welcher im Falle tödtlichen Ausganges die Respiration vor oder mit dem Herzschlage cessirt. Ein plötzliches Dunkelwerden des Blutes macht den Operateur bisweilen auf diese Gefahr der Asphyxie aufmerksam, in der Regel wird sie durch sorgsame Beobachtung des Athems schon früher erkannt. Sie ist wohl stets die Folge ungenügenden Zutrittes atmosphärischer Luft zu den Lungen und häufig durch mechanische Hindernisse hervorgerufen, welche in Folge eines paralytischen Zustandes der Schlundkopfmuskeln die nach hinten und unten gesunkene Zunge dem Eintritt der Luft in den Kehlkopf entgegenstellt. In vielen Fällen genügt Erhebung des Kinns oder das Hervorziehen der Zunge zur Wiederherstellung des normalen Zustandes, während in andern Tracheotomie oder künstliche Respiration die asphyktischen Zufälle beseitigen. Dieselben bilden den grössten Theil der sog. schlechten Narkosen, doch fallen unter diesen Begriff auch manche andere Erscheinungen, namentlich die besonders bei Trinkern beobachtete, aber auch bei keineswegs dem Alkoholgenusse ergebenden Individuen vorkommende prothabirte Excitation und das Vorkommen von Erbrechen vor oder in der Narkose. Es ist unsere feste Ueberzeugung, dass nicht allein derartige schlechte Narkosen, sondern auch manche Fälle von Chloroformsynkope sich vermeiden lassen, wenn die für die Anwendung des Chloroforms nöthigen Cautelen einerseits und die individuellen Verhältnisse des der Anästhesie zu Unterwerfenden gehörig berücksichtigt werden.

In erster Linie ist die Reinheit des Chloroforms ins Auge zu fassen. Durch die Erfahrungen von Bartscher, Hueter, König u. A. wissen wir mit Gewissheit, dass zersetztes Chloroform, wie solches aus vollkommen normalem Chloroform beim Stehen in nicht völlig vollen Flaschen im zerstreuten Lichte und namentlich leicht unter directem Einflusse der Sonnenstrahlen entsteht,



nicht allein schlechte Narkosen, sondern sogar Lebensgefahr bedingen kann. Es wird hierbei Chlor frei, welches theilweise in Chlorwasserstoffsäure übergeht und, wenn es eingeathmet wird, zu Reizung der Athemwerkzeuge führt, so dass in Folge des dadurch hervorgerufenen Hustens der Eintritt der Narkose sehr langsam erfolgt. Das freierwerdende Chlor bleibt aber auch nicht ohne Einfluss auf das Chloroform selbst und erzeugt damit Zweifach-Chlorkohlenstoff, welcher noch weit intensiver als das Chloroform auf das Herz wirkt und bei Einathmung in grossen Mengen leicht Herzlähmung bewirken kann. Da der Zweifach-Chlorkohlenstoff einen höheren Siedepunkt als das Chloroform besitzt, ist die Erkennung dieser Beimengung durch fractionirte Destillation nicht schwierig. In manchen Fällen sind aber sowohl Siedepunkt als spec. Gewicht des Chloroforms völlig richtig und nur ein auffallend unangenehmer Geruch, der beim Verdunsten an den letzten verdunstenden Partien sich geltend macht, deutet auf das Vorhandensein eines gefährlichen Stoffes (Almén, Girard).

Ein stets zu berücksichtigendes Moment ist ferner, dass Chloroform nie allein, sondern stets mit atmosphärischer Luft gemischt inhalirt werden muss. Nach Snow darf das Gemenge nie mehr als 8—5 Volumprocente Chloroform enthalten.

Die Dosis des Chloroforms kommt bei der Inhalation zwar allerdings auch in Betracht, aber in viel untergeordneterer Weise. Die meisten Patienten werden durch 4,0 nicht in vollkommene Anästhesie versetzt; viele bedürfen 8,0 bis 15,0; ausnahmsweise, und nicht allein bei Trinkern, sondern selbst bei Kindern, tritt complete Anästhesie erst nach 25,0—50,0 ein, wenn vom Tuche geathmet wird.

Einer Vorbereitung für die Narkose bedarf es nicht; doch ist es von Wichtigkeit, dass der zu Anästhesirende einige Stunden vor der Operation Nichts geniesst, da so die Narkose rascher eintritt und Uebelkeiten und Erbrechen minder häufig vorkommen. Am besten giebt man etwa 3 Stunden vorher Bouillon mit etwas Brod. In England reicht man gern vorher etwas Sherry, um den moralischen Muth zu heben; Destefanis und Vacchette empfehlen zur Stimulation des Herzens und der Vasomotoren die Darreichung von 100,0—200,0 Bordeaux, bei Trinkern Cognac, doch lassen diese Methoden das Auftreten von Emese befürchten. Priestley Smith befürwortet die Anwendung von Chloralhydrat eine Stunde vor der Narkose, wodurch die Herabsetzung der Circulation aber eine grössere wird. Richardson empfiehlt auch drastische Pillen Tags zuvor, um etwa bestehende Anfüllung der Gedärme mit Gas oder Fäces zu heben. Bei der Instituirung der Anästhesie richtet die Lage des Patienten sich nach dem Orte der zu machenden Operation. Wo es angeht, wähle man die halb-liegende Position; die sitzende scheint für das Herz schädlich zu sein, starke Neigung nach rückwärts hindert die Athmung und befördert das Rücksinken der Zunge. Jedes Hinderniss der Athmung und der Circulation ist zu vermeiden; alle einschnürenden Kleidungsstücke, Halstücher, Schnürleiber u. s. w. sind zu entfernen. Von grosser Wichtigkeit ist die Art der Inhalation. Wir sind, auf eine hinreichend grosse Erfahrung gestützt, der auch neuerdings von Nussbaum ausgesprochenen Ansicht, dass Apparate, und selbst die neueren, welche sorgfältig für die Zuleitung von atmosphärischer Luft sorgen, für Arzt und Kranke lästiger und in vielen Fällen gefährlicher sind als die bei uns allgemein übliche Chloroformisation von einem zusammengelegten leinenen Taschentuche, wenn dieselbe sorgfältigen Händen anvertraut wird. Man hält das mit einem kleinen Löffel Chloroform benetzte Tuch dergestalt vor Nase und Mund, dass von unten her atmosphärische Luft frei in Nase und Mund einströmen kann. Die Inhalation, bei welcher directe Berührung des Chloroforms mit der Haut zu verhüten ist, geschieht am besten durch die Nase, obschon die Narkose beim Einathmen durch den Mund rascher erfolgt; doch kommt es hier leichter zu Hustenreiz und Vomituritionen, auch zu Ohrensausen und starker Eingenommenheit des Kopfes (Nussbaum). Der Zutritt der atmosphärischen Luft ist stets frei zu halten; nur bei sehr lange dauerndem Excitationsstadium darf man denselben einige Secunden etwas mehr beschränken. Im Allgemeinen aber wird

man auch im Excitationsstadium violente Manipulationen vermeiden und dem Delirirenden Raum und Zeit lassen, ihn nur vor Beschädigung behütend. Richardson räth, nach Beendigung des Excitationsstadiums etwas mehr Chloroform zuzuleiten. — Man hat statt des Chloroforms ausser den verschiedenen Surrogaten desselben auch eine Reihe von Mischungen empfohlen, so mit Alkohol (Snow), mit Aether, mit Alkohol und Aether (Medico-chir. Society), mit Eau de Cologne (Pritchard), Methylchlorür (Richardson), neuerdings Terpenthinöl und Oleum Pini (Wachsmuth, Frank). Alle diese Mischungen sind unzweckmässig, weil sie in Folge des verschiedenen Siedepunktes der einzelnen Bestandtheile nur ungleichmässig verdunsten und weil dieselben meist die nur langsam eintretende Narkose mit einem nach derselben eintretenden Rausche compliciren; auch fehlt es nicht an Todesfällen im Verlaufe der durch solche Mischungen producirt Narkosen.

Die Zuleitung des Chloroforms muss ohne jeden Zwang geschehen. Kinder und Frauen sind, wenn nöthig, durch Zuspruch zu beruhigen. Während der ganzen Dauer der Narkose ist sorgsame Ueberwachung des Pulses und nicht weniger der Respiration durch Assistenten nothwendig. Auch die Pupille verdient Beachtung, da das Umschlagen der Myosis zu Mydriasis in der Narkose häufig entweder Erwachen oder Asphyxie prognosticirt.

Nach Richardson soll man nicht bei zu feuchter Luft und nicht bei zu hoher Temperatur chloroformiren, indem durch erstere das Eintreten und die Verdichtung der Chloroformdämpfe im Blute verzögert, die einzelnen Stadien und die Erholung in die Länge gezogen werden, auch leicht Niederschläge auf der Bronchialschleimhaut entstehen, die zu Respirationstörung führen, während durch zu hohe Temperatur die Ueberführung des Chloroforms in den gasförmigen Zustand zu rasch geschieht.

Die Operation darf nicht eher vorgenommen werden, bis der Patient im Stadium der Narkose ist. Obschon Einzelne, z. B. Eulenburg, das Schwinden des Patellarreflexes als geeigneten Zeitpunkt zur Vornahme von Operationen bezeichnen, wird man im Allgemeinen wohl thun, doch das Schwinden des Cornealreflexes und den Eintritt von Myosis abzuwarten. Aus der Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmassregel sind eine Anzahl Chloroformtodesfälle entstanden. Man wird bei genauer Betrachtung der Statistik überrascht durch die grosse Zahl solcher Todesfälle, welche bei kleinen Operationen, z. B. Zahnextractionen, vorgekommen sind (fast  $\frac{2}{3}$  sämmtlicher Chloroformtodesfälle) und kann sich der Ansicht nicht entziehen, dass die Todesursache im Stillstand der Athmung oder des Herzens liegt, welcher reflectorisch durch den chirurgischen Eingriff bei noch nicht völlig geschwundener Sensibilität hervorgebracht wurde. Der Rath, bei solchen kleineren Operationen sich mit dem Excitationsstadium zu begnügen, ist sehr gefährlich. Man sollte bei derartigen Operationen das Stickoxydul oder, wo dieselbe passt, die locale Anästhesie durch Verstäubung von Aether, Bromäthyl oder Aether Petrolei verwenden. Da die Sensibilität, wie oben bemerkt, an den Augen spät schwindet, ist es auch erklärlich, dass Schieloperationen und ähnliche unbedeutende Eingriffe an den Augen wiederholt zu Chloroformtodesfällen oder doch zu Chlorophormasphyxie Veranlassung wurden, weil einerseits das zu frühe Operiren Shock, andererseits das zu lauge Chloroformiren Tendenz zu Herzparalyse bewirkt. Shock kann aber auch in späteren Stadien entstehen, was nach Richardson besonders bei Operationen im Abdomen (Ovariectomie, Lithotripsie, geburtshülflichen Operationen) und bei Streckungen von Anchylosen der Fall sein soll, wo deshalb grosse Vorsicht geboten erscheint. Nach Richardson kann z. B. bei Ovariectomie durch die Einführung der Hand in die Bauchhöhle momentaner Herzstillstand eintreten.

Eine ganz besondere Berücksichtigung verdient ferner die Individualität des zu anästhesirenden Patienten. Es giebt gewisse krankhafte Störungen, welche den Gebrauch des Chloroforms contraindiciren, vor Allem manche Affectionen des Herzens und der grossen Gefässe und hochgradige Anämie. Es ist durchaus erwiesen, dass sehr viele an Herzklappenfehlern laborirende Personen ohne Schaden chloroformirt worden sind, andererseits aber muss die lähmende Wirkung des Chloroforms auf das Herz gerade bei Affectionen dieses

Organs das Mittel doppelt so gefährlich erscheinen lassen. Eine vorherige auscultatorische Untersuchung ist geboten, sei es auch nur, um sich selbst vor Vorwürfen zu schützen. Ob man Erweiterung des rechten Ventrikels und des venösen Systems, nicht aber andere Herzfehler, als ausschliessliche Contraindication gelten lassen soll (Richardson), ist fraglich. In den neueren Sectionsberichten findet sich Fettentartung des Herzens oft genug als Befund, der zu denken giebt. Lungenaffectionen werden im Allgemeinen als nicht gegen Chloroform sprechend bezeichnet; starke Verwachsungen der Pleuren sind indess wiederholt bei Chloroformtodesfällen constatirt. Dass bei Anämie das Chloroform sowohl intensiver auf das Blut als auf die Herzwandungen einwirken kann, liegt auf der Hand. Nach schweren Blutungen unterlasse man daher das Chloroformiren. Manche durch Chloroform Verunglückte waren starke Trinker. Im Allgemeinen sind Potatoren schlecht zu narkotisiren, das Excitationsstadium ist sehr lang, und sie bedürfen sehr viel Chloroform zur completen Anästhesie. Ist ein atheromatöser Process wahrscheinlich, so chloroformire man dieselben nicht. Sehr unangenehme Narkosen sieht man bisweilen bei Hysterischen, indem der completen Anästhesie starke Rigidität der Muskeln und Krämpfe vorausgehen. Richardson nimmt sogar eine besondere Form des Chloroformtodes (Tod durch epileptiforme Synkope) in seltenen Fällen an. Andererseits giebt es Hysterische, welche Chloroform ausgezeichnet vertragen und das Beispiel von Wurm, der eine Hysterica in 6 Jahren 1305mal chloroformirte, wobei stets über 30,0 verbraucht wurden, zeigt, dass Hysterie keine Contraindication darstellt.

Erwacht der Kranke gegen Ende der Operation, so dass noch mehrere Minuten bis zur Beendigung nöthig sind, so kann durch wiederholtes Aufschütten von Chloroform die Narkose verlängert werden. Hierbei ist dann wieder vorsichtig zu verfahren und namentlich die Zulassung atmosphärischer Luft nicht zu beschränken, da hier wiederum Tod durch synkopale Apnoe zu befürchten ist, wie dies mehrere der Chloroformtodesfälle beweisen. Bei allen länger dauernden Operationen, welche eine Anästhesie von  $\frac{1}{2}$ —1 Stunde erfordern, ist, ob schon wiederholt mehrstündige Operationen unter fortdauernder Chloroformnarkose ohne Schaden vollzogen sind und ob schon derartige prolongirte Narkosen, z. B. bei Tetanus, selbst Tage lang unterhalten wurden, immerhin Paralyse des Herzens zu befürchten und deshalb der Aether anzuwenden oder durch Morphin die Anästhesie zu prolongiren. Störungen beim Erwachen (Vomiturationen, Erbrechen) weichen am besten unter dem Einflusse frischer Luft.

Epileptiker bekommen leicht durch das Narkotisiren einen Anfall. Bestehende Tendenz zu Ohnmachten muss als das Chloroform völlig ausschliessend und den Aether indicirend angesehen werden. Dass man bei Greisen und sehr jungen Kindern vorsichtig mit dem Chloroformiren sein muss, ist klar, doch scheint Chloroform bei beiden angemessener als Aether, und die Chloroformcasuistik weist keine besonderen Beziehungen des Alters zu den Todesfällen nach. Von Einzelnen wird die Gravidität als Gegenanzeige betrachtet, weil das Chloroformiren zu Abortus führen könne (Melicher).

Ueber die sog. Chloroformcasuistik können wir sehr kurz hinweggehen, weil die Zahlen nicht sicher gestellt werden können, da manche Fälle nie in die Oeffentlichkeit gelangt sind. Eine Zunahme der Zahl der Todesfälle unter Chloroformnarkose in neuester Zeit lässt sich nicht erkennen, namentlich ist dies in England der Fall. Snow sammelte bis 1853 37 Fälle, Taylor bis 1859 50, Sabarth bis 1863 schon 110; von 1870—1880 kamen in Grossbritannien allein 120 Chloroformtodesfälle vor (Burton und Jacob). Das Verhältniss der Todesfälle zu der Zahl der Chloroformirten steht nicht fest, Nussbaum nimmt ziemlich willkürlich auf 10,000 Chloroformnarkosen 1 Todesfall, was jedenfalls nicht für England gilt, wo B. W. Richardson das Verhältniss auf 1:3500 taxirt.

Was die Behandlung der plötzlichen Unglücksfälle unter der Chloroformnarkose anlangt, so wird man in den Fällen, wo es sich um Herzparalyse handelt, schwerlich etwas erreichen; indessen ist dies nach Ausweis von Sabarths Casuistik die Minderzahl (11 Fälle auf 36 Asphyxien). In vielen Fällen wird das Hervorziehen des Unterkiefers in toto mittelst des sog. Esmarchschen Hand-



griffs und, wo dieser nicht ausreicht, das Hervorziehen der Zunge das Auftreten von Asphyxie verhüten, in vielen die methodische Einleitung künstlicher Respiration das tödliche Ende abwenden. Die Anwendung äusserer Reizmittel zur Erregung von Athembewegungen auf reflectorischem Wege (Frictionen mit Eau de Cologne), Sinapismen, Bespritzen des Gesichts mit kaltem Wasser, Riechenlassen an Ammoniak oder Amylnitrat (Bader) sind von untergeordneter Bedeutung. Richardson weist darauf hin, dass bei der Einleitung künstlicher Athmung jede Bewegung des Kranken möglichst zu meiden sei. Vielfach befürwortet ist in neuerer Zeit die Inversion (Nelaton, Marion Sims, Cormack, Schuppert), für sich oder mit künstlicher Athmung und anderen Hilfsmitteln combinirt, deren günstige Wirkung auf Beseitigung von Hirnanämie (Gubler) oder von globularen Embolien in den Hirncapillaren (Hueter) oder auf Füllung des rechten Ventrikels mit Blut und Wiederherstellung des Lungenkreislaufes (Richardson) bezogen wird. Spörer empfiehlt pendelartiges Hin- und Herschwingen des Körpers bei herabhängendem Kopfe. Die von einzelnen Seiten empfohlene Einspritzung von Ammoniak in die Venen ist insofern nicht irrationell, als das zum Stillstande durch Chloroform gebrachte Froeschherz regelmässig durch Ammoniak wieder in Thätigkeit kommt (Sydney Ringer). Tracheotomie und Transfusion haben bestimmt nur untergeordnete Bedeutung.

Als allgemeines Anästheticum erweist sich das Chloroform auch bei verschiedenen schmerzhaften Affectionen und namentlich bei manchen Krampfkrankheiten von bedeutenderem Werthe.

Hierher gehört in erster Linie die Anwendung des Chloroforms in der Geburtshülfe, wo man dasselbe, namentlich in England, selbst bei normalem Verlauf der Geburt zur Beseitigung der Wehenschmerzen benutzt. Die normale Wehenthätigkeit wird dadurch nicht aufgehoben; obschon die Wehenpausen anderthalbmal so lange währen und die Akme der Wehe fast um die Hälfte kürzer wird, erscheint die Geburt nicht verlängert (Kurowicz). Schädlicher Einfluss auf die Frucht findet nicht statt, obschon das Chloroform in das Placentarblut und in den Harn des Fötus übergeht (Zweifel, Porak). Einzelne Geburtshelfer behaupten, dass durch das Chloroformiren leicht Störungen in der Nachgeburtsperiode, insbesondere Blutungen und verzögerte Ausstossung der Placenta resultiren; ersteres ist allerdings möglich, insofern auch nach dem Chloroformiren bei chirurgischen Operationen leichter Nachblutungen eintreten, indem erst nach dem Wiederausteigen des Blutdruckes kleine Arterien zu spritzen beginnen. Uebrigens ist es auffallend, dass bei der Anwendung von Chloroform bei normalen Geburten niemals ein Fall von Chloroformtod vorgekommen ist, was theilweise darin seinen Grund haben mag, dass man verhältnissmässig wenig Chloroform inhaliren lässt. Bei uns beschränkt man den Gebrauch des Chloroforms in der Geburtshülfe — von sehr schmerzhaften Operationen abgesehen — auf pathologische Verhältnisse und wendet es vorzugsweise bei Krampfwehen (Strictura uteri, Tetanus uteri) an, und selbst hier meist erst nach vorausgehender Benutzung antispasmodischer Mittel. Aber auch bei starker Empfindlichkeit der Kreissenden und bei ungewöhnlicher Schmerzhaftigkeit der Wehen ist es gewiss indicirt. Ob man dagegen durch das Chloroformiren bei Primiparae mit stürmischen Expulsionswehen bei starker Rigidität der Weichtheile eine Zerreissung derselben unter allen Umständen wird verhüten können, steht dahin. Bei heftigen Nachwehen sind subcutane Morphininjectionen wohl den Chloroforminhalationen vorzuziehen. Am häufigsten kommen Chloroforminhalationen während der Geburt bei Eklampsie in Anwendung, wo sie schon Simpson, Kiwisch, Scanzoni empfohlen und sie in der That oft die vorzüglichsten Dienste leisten. Auf die Bedeutung des Chloroforms bei Strychninvergiftung wurde schon früher hingewiesen; doch ist, obschon praktische Resultate für dessen Anwendung sprechen, das Chloralhydrat wegen seiner länger anhaltenden Wirkung vorzuziehen. Bei Chorea, Epilepsie, Manie, Delirium tremens, Convulsionen der Kinder, wo man nur die Absicht hat, rasch Schlaf herbeizuführen, um der aus der Unruhe der Kranken oder aus ihren Krämpfen resultirenden Lebensgefahr zu begegnen, sind die früher gebräuch-

lichen Chloroforminhalationen jetzt durch das Chloralhydrat und die subcutanen Injectionen durch Morphin verdrängt. Bisweilen sieht man bei asthmatischen Anfällen von Emphysematikern ausserordentlichen Erfolg von Chloroforminhalationen. Dasselbe gilt von dyspnoëtischen Anfällen bei Herzkranken, wo allerdings das Mittel mit Vorsicht angewendet werden muss (Vergely). Clemens' und Baumgärtner's Behandlung der Pneumonie mit Chloroforminhalationen (zu 15–30 Tropfen 1–2stündlich) ist trotz mannigfaltiger Empfehlungen fast ganz der Vergessenheit anheimgefallen. Günstige Wirkung hat Chloroform manchmal bei Menstrualkolik (Spengler), bei Photophobie (Mackenzie, Snow), auch bei Cardialgie und Neuralgien überhaupt, obschon es bei letzteren offenbar dem Morphin nachsteht. Man muss in allen diesen Fällen die Gefährlichkeit des Chloroforms im Auge behalten und darf deshalb das Chloroform nie den Händen der Patienten überlassen. Mehrere Todesfälle sind durch Nichtbeachtung dieser Vorschrift entstanden; auch droht die Gefahr chronischer Intoxication.

Abgesehen von der Inhalation hat das Chloroform übrigens auch intern und extern Anwendung gefunden, und zwar im Wesentlichen bei denjenigen Zuständen, wo man die Inhalationen benutzte, d. h. um entweder Schmerzen zu lindern oder um Krämpfe zu beseitigen. Im Ganzen sind aber sowohl die interne als die äussere Application wenig im Gebrauch.

Von den mit Chloroform behandelten Leiden nennen wir zuerst Erbrechen, weil wir in verschiedenen Fällen uns von der Wirksamkeit des Mittels zu überzeugen Gelegenheit hatten. Es ist ein vortreffliches Palliativum sowohl beim Vomitus gravidarum als beim Erbrechen der Phthisiker und bisweilen selbst der Säuer. Ueber die Effecte bei Singultus Cholerae oder bei Cholera überhaupt und bei Seekrankheit (Yvonneau) besitzen wir keine Erfahrungen. Aran empfahl es bei Bleikolik, Bogue bei Koliken überhaupt, wo es das Morphin an Activität übertreffen soll. Im Froststadium bei Intermittens empfahlen es Serrano und M'Clellan; dass man auch Intermittensanfälle damit coupiren kann, bezeugen Delioux und Berens. M'Clellan rühmte den inneren Gebrauch bei Delirium tremens, Delirien, Insomnie, Epilepsie und selbst gegen Ikterus; Osborne bei Manie und Hypochondrie; Adams in grossen Dosen bei drohenden Hirn- und Lungencongestionen (wie Aether). — Aeusserlich ist Chloroform in Klystierform und Dampfform (Ehrenreich) bei Tenesmus empfohlen; ferner in Dampfform bei Taubheit (Rau) und verschiedenen schmerzhaften Affectionen des Uterus, z. B. Krebs (Scanzoni), bei Pruritus vaginae und selbst bei Amenorrhoe, in Form von Einreibungen oder Salben bei den mannigfachsten schmerzhaften Affectionen (Zahnschmerz, Ohrenscherz, Ischias, gichtischen Entzündungen, Panaritien, Verbrennungen), auch bei juckenden Hautausschlägen (Dubreuil, Michéa) und Pediculi. Ein örtliches Anästheticum ist es nur in untergeordnetem Maasse; bei manchen der genannten Affectionen dient es theilweise wohl als äusserer Hautreiz, als welcher das Chloroform geradezu statt des Sinapismus, zumal für Kinder, vorgeschlagen ist (Rau, Snow). Dahin gehört auch die Application mit Chloroform befeuchteter Compressen auf das Abdomen bei Gallenstein- und Bleikolik (Fleischmann) oder auf die Brust bei Lungenblutung (M'Cooke). Die Einspritzung bei Tripper als Abortivum (Venot, Behrend) ist wegen ihrer Schmerzhaftigkeit verwerflich; ebenso ist die von B. v. Langenbeck eingeführte Injection in Hydrocelesäcke keineswegs ohne Gefahr (Esmarch), obschon adhäsive Entzündung dadurch fast immer erreicht wird.

Innerlich giebt man Chloroform zu 5–15–20 Tropfen pro dosi, entweder pure oder in Mixturen.

Von verschiedenen Aerzten werden die Dosen viel höher genommen; so gab M'Clellan bei Cholera selbst bis 0,36 pro dosi alle 10 Minuten, Adams 2,0 bei Lungen- und Hirnapoplexie. Zweckmässig giebt man Chloroform in Gallertkapseln (Perles de chloroforme) oder in Haferschleim. Aus schlei-

migen Mixturen scheidet es sich leicht aus; etwas haltbarer ist eine Emulsion. Jaillard empfiehlt das Chloroform in 120,0 reiner oder mit Bittermandelwasser aromatisirter Milch zu vertheilen. Im Clysmata reicht man Chloroform ebenfalls zu 5–10 Tropfen mit Eidotter verrieben. Auf die Haut reibt man es entweder pure ein oder applicirt damit befeuchtete Compressen, wobei man, um Hautentzündung zu bewirken, die Verdunstung hindert. Zu Salben und Linimenten kann man 1:1–10 Th. Fett oder Oel nehmen (das in England officinelle Linimentum Chloroformi enthält aa Chloroform und Linimentum Camphorae). Zu subcutanen und parenchymatösen Injectionen (Bartholow, Besnier, Lemattre) bei Prosopalgie, Ischias u. s. w. dient Chloroform zu 5–10 Tropfen pure; zur Hypnose ist dies noch dazu mit unangenehmer Nebenaffecten (Schmerz, Emphysem, Bildung schmerzhafter Knoten und Mumification der Einstichstelle) verbundene Verfahren wegen der grossen Dose (8,0–12,0) nicht zu gebrauchen. In den äusseren Gehörgang ist Chloroform stets verdünnt (5–10 Tr. auf 20,0 Flüssigkeit) zu bringen.

Bei innerer und äusserer Anwendung wird Chloroform nicht selten mit anderen narkotischen Stoffen verordnet, namentlich mit Morphin, auch mit Blausäure, Tinct. Aconiti, Bilsenkrautpräparaten, Veratrin, Terpenthin u. s. w. Manche solcher Mischungen sind Geheimmittel, z. B. das in England als vorzügliches Antispasmodicum und Sedativum angepriesene Chlorodyne (wohl von verschiedener Composition, ursprünglich mit Morphin, Blausäure und Tinct. Capsici), analog dem Anodynum der Engländer (0,1 Morph., 8,0 Chloroform und 2,0 Spir. dil.), diverse Zahnwehmittel, z. B. das English Odontine (1 Th. Campher, 8 Th. Chl.), Feytonia (Chl. mit Camph., Ol. Cajep. und Ol. Caryoph.), Idiatio (angeblich Chl. mit Tereb. und Liq. Ammon. caust.).

Zur örtlichen Anästhesirung hat Fournié ein Gemisch von aa Eisessig und Chloroform (sog. Chloro-acetisation) in Dampfform empfohlen.

Das zum Anästhesiren im Hause des Arztes etwa vorrätthige Chloroform ist, um Zersetzung zu vermeiden, im Dunkeln aufzubewahren und möglichst vor den Einflüssen der Luft zu schützen.

#### Verordnungen:

- |  |  |
|--|--|
| <p>1) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Chloroformii</i> 2,0<br/> <i>Tragacanthae</i> 4,0<br/> <i>Aq. dest.</i> 100,0<br/> <i>Syrupi simpl.</i> 25,0<br/> <i>M. D. S.</i> Stündlich einen Esslöffel voll. Bei Bleikolik. <b>Aran.</b></p> | <p><i>Vitell. ovi unius</i><br/> <i>Aq. comm.</i> 125,0<br/> <i>F. l. a. Emulsio.</i> D. S. Zum Klystier.<br/> (Bei Bleikolik. <b>Aran.</b>)</p> |
| <p>2) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Chloroformii</i> 1,0<br/> <i>Tragacanth.</i> 8,0</p>  | <p>3) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Chloroformii</i> 5,0<br/> <i>Axung. porci</i> 25,0<br/> <i>M. f. ungt.</i> D. S. Aeusserlich.</p>         |

**Anhang:** Durch Einwirkung von Chlor auf Sumpfgas entstehen ausser dem Chloroform noch mehrere als Anästhetica benutzte Stoffe. Dahin gehört in erster Linie die dem Aethylchlorür entsprechende Methylverbindung, das Methylchlorür,  $\text{CH}_3\text{Cl}$ , das allerdings, weil es bei gewöhnlicher Temperatur ein Gas bildet, für die Praxis schlecht verwerthbar ist. Mit Methylchlorür gesättigtes Wasser wirkt schon zu 15,0 stark berauschend; die durch Inhalation bei Thieren dadurch bedingte Narkose tritt sanft ein und dauert lange (Richardson). Mit Methylchlorür gesättigtes Chloroform soll nach Richardson ein sehr wirksames Anästheticum sein.

Mehr Bedeutung für die Praxis besitzt die meist als Methylenbichlorid (Methylglykolchlorür) bezeichnete, in ihrem Geruche dem Chloroform sehr ähnliche Verbindung,  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$ , die einen niedrigeren Siedepunkt als Chloro-



form und Aether besitzt (30,5°) und in ihrer Dampfdichte zwischen Aether und Chloroform die Mitte hält, weshalb sie rascher verdampft als Chloroform und zur Erzeugung von Anästhesie geringerer Mengen bedarf als Aether, so dass sie schon zu 8,0 5—7 Min. lange Narkose hervorruft. Die grossen Vorzüge, welche Richardson im Methylenbichlorid dem Chloroform gegenüber fand (Fehlen der Excitation, des Hustenreizes und Erbrechens), sind von deutschen Chirurgen (Nussbaum u. A.) nicht bestätigt und ist die grössere Sicherheit um so mehr problematisch, als unter dem Gebrauche des Mittels in England Synkope und Todesfälle vorgekommen sind und das theure Anästheticum manchmal mit Chloroform verfälscht im Handel sich findet (Clover). Vom Chloroform unterscheidet es sich durch seine Wirkung auf die Reflexe, indem es dieselben herabsetzt, ohne dieselben vorher zu steigern. Auch schwindet der Pupillarreflex später als der Cornealreflex und kehrt früher als derselbe zurück (Eulenburg).

Gefährlicher als Chloroform und Methylenbichlorid ist der Zweifach-Chlorkohlenstoff, Tetrachlorkohlenstoff,  $\text{CCl}_4$ , ein bei 78° siedendes, eigenthümlich riechendes, dünnes Oel, welches ebenfalls als Anästheticum (Sansom, Protheroe Smith), jedoch wegen seiner sehr intensiven Einwirkung auf das Herz nur zu kurz dauernden Narkosen zum Zwecke momentaner Linderung von Schmerzen oder bei Wehen, Verwendung gefunden hat. Da es auf Thiere weit giftiger als Chloroform wirkt, heftige Krämpfe erzeugt und den Blutdruck enorm herabsetzt (Laffont), die Anästhesie erst sehr spät beginnt und die Grenze zwischen derselben und dem Tode sehr kurz ist (Nunneley), ist das Mittel zu perhorresciren, um so mehr, als es wahrscheinlich die Ursache verschiedener Todesfälle durch unreines Chloroform gewesen ist (vgl. S. 1024).

Dem Chloroform analog zusammengesetzt ist das Bromoform,  $\text{CHBr}_3$ , eine wasserhelle, angenehm riechende, jedoch erst bei 152° siedende Flüssigkeit, welche als Anästheticum sich kaum anders wie Chloroform verhält (Nunneley.) Eulenberg bezeichnet die Narkose als flüchtig und nur bei geringfügigen Operationen verwendbar.

*Spiritus Aetheris chlorati, Spiritus muriatico-aethereus, Spiritus salis dulcis, Aether chloratus alcoholicus; versüsster Salzgeist, Chlorätherweingeist.* — Dieses früher officinelle Präparat, welches schon Basilus Valentinus und Isaak Hollandus bekannt gewesen zu sein scheint, ist ein durch Destillation von Salzsäure und Weingeist über Braunstein erhaltenes Gemenge verschiedener, durch Einwirkung von nasirendem Chlor und Salzsäure auf Weingeist entstehender organischer Verbindungen. Es besitzt keine constante Zusammensetzung; durch das Chlor wird zunächst Aldehyd,  $\text{C}^2\text{H}^4\text{O}$ , erzeugt, aus welchem vermöge Substitution von  $3\text{Cl}$  Trichloraldehyd oder Chloral, durch Oxydation Essigsäure entsteht, welche letztere mit dem unzersetzt gebliebenen Weingeist Essigsäure-Aethyläther bildet, der seinerseits wiederum der substituierenden Einwirkung des Chlors unterliegt, wodurch diverse eigenthümlich ätherisch riechende chlorirte Essigester entstehen. Zu diesen kommt durch Mitbetheiligung der theils ursprünglich vorhandenen, theils bei der Bildung des Aldehyds und Chlorals resultirenden Salzsäure noch Aethylchlorid (Aethylchlorür, Chloräthyl, leichter Salzäther, Salzsäureäther) hinzu. Der Spiritus Aetheris chlorati, welcher eine farblose, neutrale Flüssigkeit darstellt, wird ganz wie Sp. Aetheris nitrosi und Essigäther benutzt und innerlich zu 10—30 Tropfen gegeben. Werber empfahl Umschläge davon bei schmerzhaften rheumatischen Fussgeschwüren.

Das Aethylchlorid,  $\text{C}^2\text{H}^5\text{Cl}$ , eine penetrant ätherisch riechende Flüssigkeit, wurde schon 1870 von Heyfelder beim Menschen als Anästheticum benutzt; die dadurch bedingte Anästhesie gleicht im Wesentlichen der durch Aether hervorgebrachten, doch ist der niedrige Siedepunkt des Aethylchlorids (+ 12°) ein Hinderniss für dessen Verwerthung.

Aethylbromid (Bromäthyl) und Aethyljodid (Jodäthyl). — Dem Aethylchlorid homologe Verbindungen, welche bei Einwirkung von Brom- resp. Iodwasserstoffsäure auf Alkohol resultiren, sind die vorgenannten Verbindungen, von denen das Aethylbromid, welches schon 1849 von Nunneley als allgemeines

Anæstheticum empfohlen wurde, in den Jahren 1879 und 80 ausgedehnte Verwendung in Amerika und Frankreich gefunden hat und dem Chloroform erst-haftige Concurrenz machte, bis das Vorkommen mehrerer Todesfälle in der Bromäthylnarkose (Marion Sims, Roberts) die Ueberzeugung lieferte, dass auch dieses Mittel, welches den Blutdruck ebenso stark wie Chloroform herabsetzt und das mindestens eben so häufig wie letzteres Erbrechen bedingt, nicht sicherer oder angenehmer wirke. Bei seiner Leichtzersetzlichkeit kann es mitunter heftige Irritation des Pharynx bedingen (Richardson). Zur Narkose genügen in der Regel 8,0. Rabuteau empfahl dasselbe bei Inhalationen bei Keuch- und Krampfhusten und innerlich bei Gastralgie.

Versuche von Terrillon und Tourreil (1880) scheinen darzuthun, dass Bromäthyl sich, wie bei seinem niedrigen Siedepunkte (41°) zu erwarten stand, für die Erzeugung localer Anästhesie bei Verstäubung vorzüglich eignet. Bei geringen Abständen übertrifft es sogar den Aether in Bezug auf die Schnelligkeit der Temperaturherabsetzung; ausserdem ist es nicht entzündlich und daher auch bei Anwendung des Thermocauters oder Glühseisens unmittelbar geeignet.

Das Iodäthyl wirkt bei Thieren langsamer, aber anhaltender anästhesirend als Bromäthyl; im Organismus spaltet er sich und geht als Iodnatrium in den Harn über (Rabuteau). Die innerliche Anwendung von 0,2—0,5 als Iodmittel bei Scrophulose, chronischem Rheumatismus (Turnbull) ist daher keineswegs irrational und jedenfalls begründeter als die antidotarische Verwendung bei giftigen Alkaloiden, um daraus im Körper minder giftige Aethylbasen zu bilden (Huette, Strumpf).

Huette vindicirt dem Mittel diuretische Effecte bei Herzklappenfehlern mit Hydrops. Turnbull empfahl es äusserlich in Salbenform bei schmerzhaften Geschwülsten und Geschwüren. Fischer zur Inhalation bei phthisischem Hustenreiz. Besonders wohlthätig wirkt Iodäthyl zu 6—10 Tr. täglich 6—8mal inhalirt, bei asthmatischen Anfällen und dyspnoëtischen Zuständen, die vom Herzen oder Larynx ausgehen (Sée).

Auch die entsprechenden Iod- und Bromverbindungen des Methyls und Amyls sind Anæsthetica. So bedingt Methyljodid, welches im Organismus sich wie Aethyljodid spaltet, schon in sehr geringen Mengen inhalirt, ausserordentlich starke Anästhesie, deren Folgen erst in einigen Tagen verschwinden. Amyljodid bewirkt heftiges Brennen und intensive Röthe (Turnbull, Simpson) und ist wegen seiner irritirenden Beiwirkung auf die Bronchialschleimhaut kaum als Anæstheticum zu verwenden (Richardson).

Aethylidenchlorid; Aethylidenum bichloratum s. chloratum. — Durch Einwirkung von Chlor auf Aethylchlorür entsteht durch Ersatz von 1 H durch 1 Cl der sog. Vinylchlorür-Chlorwasserstoff oder Regnaults Ether chlorhydrique monochloruré,  $C^2H^4Cl^2$ , eine dem Elaylchlorür isomere, jetzt meist als Aethylidenchlorid (Chloräthyliden, Aethidenchlorid) bezeichnete Verbindung, welche auch als Nebenproduct bei der Chloralbereitung erhalten werden kann und eine wasserhelle, süsslich und später brennend schmeckende, angenehm obstartig riechende Flüssigkeit von einem dem des Chloroforms ähnlichen Siedepunkt (+ 60°) darstellt. Das von Liebreich empfohlene Mittel bewirkt nach B. von Langenbeck, Steffen u. A. schnelle und ruhige Narkose, welche rasch vorübergeht, und eignet sich wegen seines angenehmen Geruches sehr gut zur Betäubung von Kindern. Die narkotisirende Wirkung ist etwas grösser als die des Chloroforms, das Erbrechen etwas seltener und geringer, die Herabsetzung der Pulsfrequenz nicht so ausgesprochen (M'Kendrick, Ramsay und Coats). Auf die Reflexe wirkt es wie Methylbichlorid (Eulenburg). Obschon Aethylidenchlorid den Blutdruck weniger stark als Chloroform herabsetzt, hat es doch zu einem Todesfalle bei einem Herzkranken geführt.

Dem Aethylidenchlorid isomer ist die unter dem Namen Aethylenchlorid oder Elaylchlorür, Aethylenum chloratum s. Elaylum chloratum, bekannte, und früher officinelle Verbindung. Der 1795 von vier holländischen Chemikern entdeckte Stoff (daher die Benennungen Liquor Hollandicus oder Oleum Bata-vorum), welcher bei Einleiten von Elayl (Aethylen, ölbildendes Gas,  $C^2H^4$ )

in eine schwach erwärmte Chlormischung erhalten wird, ist ein wasserhelles, dünnes, angenehm ätherisch riechendes Liquidum, welches mit grüner, stark russender Flamme brennt, das sp. Gew. von 1,275 und einen Siedepunkt von  $85^{\circ}$  besitzt und nicht in Wasser, dagegen leicht in Weingeist oder Aether löslich ist. Von chemischem Gesichtspunkte ist es als Haloidester des Aethylens (Aethylglycolalkohol) anzusehen, welches wie Aethyl- und Methylchlorür durch Cl weitere Veränderungen erleiden kann. Von Nunneley, Reynoso und Simpson als allgemeines Anästheticum vorgeschlagen, weil es sicherer als Chloroform sei, in grösseren Gaben von Thieren ohne Schaden inhalirt werde, keine Excitation (höchstens etwas Reizung im Pharynx) mache und selbst länger dauernde Narkose bedinge, jedoch wenig in Gebrauch gezogen, hat das Elaylchlorür besonderen Ruf als örtlich schmerzlinderndes Mittel erlangt, indem man es auf schmerzhaft Theile aufpinselt oder einreibt, wonach zuerst etwas Brennen, später 6—14stündige Analgesie ohne Verminderung der Tastempfindung (Jos. Meyer) erfolgt. Es bewährt sich besonders bei rheumatischen Schmerzen (Wutzer), auch bei Rheumatismus acutus, wo es die spontanen Schmerzen total beseitigt, ferner bei Neuralgien, z. B. Intercostalneuralgien (Virchow). Zur Einreibung genügen 1,0—2,0 pure oder mit Aether vermischt, auch in Salbenform (1:5).

Mit dem Elaylchlorür ist nicht das von Wiggers als Aether anaestheticus bezeichnete Gemenge von Chlorsubstitutionsproducten zu verwechseln, welches unter dem Namen Éther chlorhydrique chloré von Mialhe und Aran als locales schmerzstillendes Mittel empfohlen wurde. Das Präparat, dessen Siedepunkt zwischen  $110$  und  $130^{\circ}$  variirt, besteht vorzugsweise aus Tri- und Tetrachloräthylenchlorid und bewirkt nach den Versuchen von Aran bei Application auf schmerzhaft Hautstellen in  $2\frac{1}{2}$ —10 Min. das Verschwinden jedes Schmerzes und in 5—15 Min. völlige Unempfindlichkeit, die bei normaler Haut  $\frac{1}{2}$ —1 Stunde anhält. Die günstigen Erfolge, welche Aran, Schott, Schuchardt u. A. bei vielen schmerzhaften Affectionen, namentlich auch bei rheumatischen Zahnschmerzen, durch Einreibung von 10—20 Tr. in unmittelbarer Nähe der schmerzhaften Partie erhielten, lassen neue ausgedehnte Versuche wünschenswerth erscheinen. Schlechte Präparate scheinen zu Entzündung und Blasenbildung führen zu können (Schroff).

Zu den Chlorsubstitutionsproducten des Aethylchlorids gehört auch das neuerdings von Tauber als allgemeines Anästheticum empfohlene Monochloräthylidenchlorid oder Methylchloroform, welches wesentlich wie Chloroform wirkt, jedoch Respiration und Circulation weniger afficirt. Das diesem Körper isomere Monochloräthylenchlorid wirkt nach Tauber ebenfalls anästhesirend, doch tritt die Narkose beim Menschen erst nach 15—18 Min. ein u. verbindet sich mit Steigerung der Pulsfrequenz, was, wie die hervortretende Röthung des Gesichts und die Salivation, auf Analogie mit dem Aether hinweist. Möglicherweise ist eine Mischung dieser bei  $115^{\circ}$  siedenden, dem Chloroform ähnlich riechenden Flüssigkeit mit Chloroform ein zweckmässiges Anästheticum. Monochloräthylenchlorid wird im Blute zum grossen Theile gespalten (Tauber).

Als Endproduct der Einwirkung von Chlor auf Aethylchlorid resultirt das Kohlenstoffsesquichlorid, Perchloräthan oder Carboneum sesquichloratum s. trichloratum,  $\text{C}_2\text{Cl}_6$ , ein campherähnlich riechender, bei  $160^{\circ}$  schmelzender und bei  $182^{\circ}$  siedender, krystallinischer Körper, welcher in hohem Grade excitirend wirken soll und von King zu 0,3—0,4  $\frac{1}{2}$ stdl. bei Cholera asphyctica gegeben wurde.

Als ein einige Zeit praktisch verwendetes Anästheticum generale ist schliesslich der Kohlenwasserstoff Amylen,  $\text{C}_5\text{H}_{10}$ , zu nennen, eine bei  $35^{\circ}$  siedende, brennbare Flüssigkeit, von keineswegs angenehmem, an faulenden Kohl erinnerndem Geruche, welche von Snow (1856) wegen der sehr rasch dadurch zu bedingenden Anästhesie, des sehr unbedeutenden Stupors und der raschen Erholung ohne Nebenerscheinungen, insbesondere Erbrechen, dem Aether und Chloroform vorgezogen wurde. Nachdem das Vorkommen von 2 Todesfällen den Beweis geliefert hatte, dass auch dieses Anästheticum nicht ohne Gefahren sei, wurde dasselbe verlassen. Auch Amylchlorid (Chloramyl),  $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{Cl}$ , von angenehmerem Geruche und höherem Siedepunkte ( $102^{\circ}$ ), ist als allgemeines Anästheticum verwendbar (Snow, Richardson).



c. *Encephalica hypnotica*, Schlaf machende Hirnmittel.

Wir fassen unter dieser Bezeichnung diejenigen Hirnmittel zusammen, welche vorzugsweise zur Herbeiführung von Schlaf in den verschiedensten Krankheitszuständen benutzt werden. Es sind dies die eigentlichen Narcotica, insofern als die den Hirnmitteln zukommende Erregung in weit geringerem Maasse nach denselben zur Erscheinung kommt, obschon sie keineswegs, wie man früher meinte, vollständig fehlt. Manchen der hierher gehörigen Mittel kommen auch noch besondere Nebenwirkungen zu, worüber bei den einzelnen das Nöthige angegeben werden wird.

**Opium**, Opium Smyrnaeum Laudanum, Meconium, Succus Thebaicus; **Opium**, Mohnsaft. **Alcaloidea Opii**; **Opiumalkaloide**.

Dieses unentbehrliche Medicament ist der durch Einschnitte in die unreifen Samenkapseln des Gartenmohns, *Papaver somniferum* L. (Fam. *Papaveraceae*), gewonnene und eingetrocknete Milchsaft. Das aus Kleinasien stammende Türkische oder Levantinische Opium, nach den Hauptausfuhrorten auch in das geschätzteste Smyrnaische und in Constantinopolitanisches unterschieden, wird wegen seines vor den meisten übrigen Sorten ausgezeichneten höheren Gehaltes an dem wirksamsten Bestandtheile, dem Morphin, ausschliesslich als Medicament verwendet und ist allein officinell; doch kommt auch in Folge von Verfälschung nicht selten wenig wirksames levantisches Opium in den Handel, weshalb die Pharmakopoe Opium vorschreibt, welches in getrocknetem Zustande wenigstens 10 % Morphin enthält.

Das Levantische Opium stellt braune, in Mohnblätter eingehüllte und meist mit lose haftenden Ampferfrüchten (*Rumex*) bestreute Brode von 300,0—700,0 Gewicht dar; die Masse ist häufig im Innern noch feucht und klebrig, löst sich theilweise in Alkohol und in Wasser und besitzt eigenthümlich widrig-narkotischen Geruch und scharf bitteren Geschmack. In der sonst gleichartigen Masse sind einzelne hellere Körner, sog. Thränen, zu unterscheiden. Trockne mit Benzol zerriebene Stücke zeigen bei mikroskopischer Betrachtung Nadeln und unausgebildete Kryställchen. Selbst ziemlich trocken anzuführendes kleinasiatisches Opium enthält noch 9—14 % Wasser. — Die übrigen nicht europäischen Opiumsorten, wie Persisches und Indisches, welches beide zum grössten Theile in China als Genussmittel (Opiumrauchen) consumirt werden, stehen an Morphingehalt dem Levantischen bedeutend nach. Als Mittelzahl für gutes kleinasiatisches Opium sind 12—15 % anzusehen (Fayk Bey), nur ausnahmsweise kommen 20 % und darüber vor; unter 10 % haltiges ist verfälscht. Ostindisches hat höchstens (Patna Garden Opium) 8—9 %, meist weniger. Culturopium in europäischen Ländern hat wiederholt höheren Morphingehalt als Opium Smyrnaicum aufgewiesen. Guibourt fand in trockenem Opium, welches in Frankreich im Département de la Somme gewonnen war, 22,8 %, Biltz in deutschem Opium bis 20 %, Hesse (1869) in württemberger Opium 12—15 % Morphin. Auch nordamerikanisches Opium aus Vermont war von gleicher Stärke (Procter).

Die wirksamen Bestandtheile des Opiums müssen in verschiedenen, demselben eigenthümlichen, basischen Pflanzenstoffen

gesucht werden, von welchen bis in die neueste Zeit mit Sicherheit mindestens 17 aufgefunden sind, zu denen noch einige zweifelhafte hinzukommen und neben welchen noch einige neutrale Körper, z. B. Opianyl oder Meconin, ein flüchtiger, den Geruch des Opiums bedingender Stoff, und eine eigenthümliche Säure, die Mekonsäure, als Opiumbestandtheile constatirt sind. Von den Opiumalkaloiden sind nur Morphin und Codein in die Pharmakopoe aufgenommen, obschon auch einzelne andere (Narcein, Papaverin und Narkotin) therapeutische Anwendung gefunden haben.

Das Morphin, die erstentdeckte aller Pflanzenbasen, 1805 von Serturner in Hameln aufgefunden, in krystallisirtem Zustande von der Formel  $C^{17}H^{19}NO^3 + H^2O$ , bildet feine, weisse, seideglänzende Nadeln oder farblose sechsseitige Säulen, schmeckt in Lösungen stark bitter, reagirt stark alkalisch, löst sich in 1000 Th. kaltem und 400 Th. kochendem Wasser, nicht in Aether und Benzol, reichlich in Weingeist. Die Salze sind zum grössten Theile krystallisirbar und in Wasser löslich. Mit Salzsäure im zugeschmolzenen Rohre erhitzt giebt Morphin salzsaures Apomorphin,  $C^{17}H^{17}NO^2$ , HCl, das schon bei den Brechmitteln Erwähnung fand.

Das von Robiquet 1832 entdeckte Codein,  $C^{18}H^{21}NO^3 + H^2O$ , bildet weisse oder gelblich weisse, oft deutlich rhombische Krystalle von alkalischer Reaction und bitterlichem Geschmacke, welche mit Wasser gekocht, schon ehe sie sich lösen, schmelzen und in 80 Th. kaltem und 17 Th. kochendem Wasser, leichter in Weingeist und Aether sich lösen. In wässrigem Ammoniak löst es sich etwa so reichlich wie in Wasser, dagegen nicht in conc. Kali- oder Natronlauge, leicht in verdünnten Säuren. Die Codeinsalze sind meist krystallisirbar, schmecken sehr bitter und sind in Aether fast unlöslich. Die farblose Solution des Codeins in conc. Schwefelsäure färbt sich auf Zusatz von äusserst wenig Eisenchloridlösung blau.

Von den übrigen Opiumalkaloiden ist das Narkotin (schon 1803 von Derosne dargestellt (Derosnes Salz), jedoch erst 1817 von Robiquet als Alkaloid charakterisirt, auch als Opian bezeichnet, vielleicht identisch mit dem in den Knollen von Aconitum Napellus gefundenen Aconellin), besonders reichlich im Indischen Opium. Es krystallisirt aus Weingeist oder Aether in farblosen perlgänzenden Prismen oder büschelig vereinigten Nadeln, ist geruch- und geschmacklos, reagirt neutral, löst sich in Wasser fast gar nicht, dagegen in 100 Th. kaltem und 20 Th. kochendem Weingeist, ferner in Aether, Chloroform und Benzin. Die Salze sind meist unkrystallisirbar und lösen sich in Wasser, Aether und Alkohol.

Das Narcein, 1832 von Pelletier entdeckt, nach Winckler auch in den reifen Mohnkapseln vorkommend, im Opium zu etwas mehr als  $\frac{1}{10}$  %, krystallisirt in langen 4seitigen rhombischen Prismen oder feinen Nadeln, löst sich sehr schwierig in Wasser, leicht in kochendem Weingeist und heisser Essigsäure, nicht in Aether. Auch die krystallisirbaren Salze des Narceins lösen sich schwer in Wasser. Das von Merck 1848 entdeckte Papaverin bildet weisse, verworren zusammengehäufte Nadeln oder Schuppen, ist in Wasser kaum, in kaltem Weingeist schwierig, in heissem reichlich löslich; auch die Salze sind meist in Wasser schwerlöslich.

Als bisher für die Therapie ohne Werth sind von länger bekannten Opiumalkaloiden Thebain und Pseudomorphin, beide 1835 von Thiboumery entdeckt, hervorzuheben, woran sich das Porphyroxin von Merck, das Opianin von Hinterberger und das Metamorphin von Wittstein schliessen. Von den neueren Opiumbasen ist Cryptopin von T. und H. Smith (1864) entdeckt; der Rest (Hydrocotarnin, Rhoeadin, Lanthopin, Laudanin, Laudanosin, Protopin, Codamin und Mekonidin) ist durch die sorgsamsten Untersuchungen von O. Hesse 1865 und 1871 sicher gestellt.

Das indifferente Mekonin bildet glänzende weisse Nadeln, welche unter Wasser bei 77°, für sich bei 110° schmelzen und bei 156° sieden; es löst sich

in 20 Th. siedendem Wasser und kann durch Erhitzen von Narkotin mit Salpetersäure, sowie aus einem Spaltungsproducte des Narkotins, der Opiansäure, künstlich erhalten werden. Die bereits 1805 von Sertürner entdeckte Mekonsäure bildet aus Wasser krystallisirt (mit 3 At. Krystallwasser) weisse glimmerartige Schuppen oder rhombische Prismen, welche sich bei 100° in eine weisse undurchsichtige Masse verwandeln; sie schmeckt sauer und löst sich leicht in Weingeist und kochendem Wasser.

Die Wirkung des Opiums muss als die Resultante aller in demselben enthaltenen Alkaloide angesehen werden, welche in ihrer Action auf das Nervensystem nicht unbedeutende Differenzen zeigen, indem einzelne derselben vorzugsweise die Function des grossen Gehirns herabsetzen und in medicinalen Dosen Schlaf, in toxischen Gaben Sopor herbeiführen. während andere besonders auf die Reflexaction steigernd wirken und in grösseren Mengen Tetanus bedingen, noch andere eine Herabsetzung der cerebralen Thätigkeiten veranlassen und gleichzeitig Convulsionen erregen. Manche Opiumalkaloide wirken auch in ausgeprägter Weise auf das Herz und auf die Pupille. Im Allgemeinen kann jedoch die Opiumwirkung annähernd gleichgestellt werden mit der Action des Morphins, da dieses Alkaloid in weit grösseren Mengen als alle übrigen zusammengenommen im Opium sich findet. Wir betrachten daher zunächst genauer die Wirkung dieser Base und schliessen daran eine gedrängte Darstellung der Wirkung der übrigen basischen Stoffe, welche man gewöhnlich unter der Collectivbezeichnung der Nebenalkaloide des Opiums zusammenfasst.

Wirkung des Morphins. — Morphin besitzt sowohl örtliche als entfernte Wirkung, von denen jedoch erstere gegen letztere sehr zurücktritt.

Die locale Action zeigt sich auf der entblösten Cutis bei der endermatischen Methode, wo Application von Morphin oder Morphinsalzen in Substanz minutenlanges Gefühl von Stechen und Brennen, mitunter selbst heftige Schmerzen (Valleix) hervorbringt, während Morphinlösung, endermatisch oder subcutan injicirt, keinen nennenswerthen Schmerz bedingt. Bei interner Anwendung ist ausser der bitteren Geschmacksempfindung in der Regel kein Symptom örtlicher Wirkung bei mässigen Dosen erkennbar, doch kommt es bei stärkeren Gaben zu Vermehrung der Speichelsecretion, Druck im Epigastrium und Erbrechen, bei längerem Gebrauch zu Trockenheit im Munde und Schlunde.

Die entfernte Wirkung des Morphins ist in erster Linie auf das Gehirn gerichtet, indem es bei Menschen und Thieren in medicinalen Gaben Schlaf und in toxischen Dosen einen comatösen Zustand herbeiführt. Eigenthümlich ist die Action auf die Pupille, welche bei stärkerer Einwirkung fast regelmässig stark verengt erscheint; daneben kommen Ischurie mit Harndrang und excessives Hautjucken häufig als entfernte Wirkungen vor. Ferner ist eine obstruirende Wirkung auch bei Einführung von Morphin unter die Haut in manchen Fällen nicht zu verkennen.

Bei Menschen bedingen kleine medicinale Dosen (0,01–0,015) meist rasch eine gewisse Aufregung des Geistes, welcher bald Neigung zum Schlafe und häufig selbst tiefer und ruhiger Schlaf von  $\frac{1}{2}$ –12 Std. Dauer folgt, womit sich Verlangsamung des Pulses verbindet. Bisweilen kommt es selbst nach diesen



kleinen Mengen zu etwas Kopfschmerz und geringer Verengung der Pupille. Bei etwas grösseren Dosen (durchschnittlich 0.02—0.03) fehlt gewöhnlich die Aufregung vollständig und erfolgt sofort Betäubung und Schläfrigkeit, meist mit Sinken der Athem- und Pulszahl verbunden. Noch höhere, jedoch nicht eigentlich toxische Gaben bedingen ausserdem meist noch Uebelkeit, Erbrechen, Kolik, Dysurie und Hautjucken (Bally, Rougier, Schroff).

Noch höhere Dosen führen zu den Erscheinungen der acuten Morphinvergiftung, welche, im Wesentlichen identisch mit denen der acuten Intoxication mit Opium, eine Steigerung des bei etwas zu hohen Morphindosen erfolgenden Symptomencomplexes ist und sich im Allgemeinen unter dem Bilde eines allmählig sich entwickelnden comatösen Zustandes darstellt, in welchem fast immer die Pupille contrahirt ist und welcher nach längerer Dauer (meist zwischen 6—12 Std.) entweder unter Sinken des Pulses und der Körpertemperatur und allgemeinem Collapsus zum Tode führt, dem manchmal Convulsionen vorausgehen, oder nach und nach in ruhigen Schlaf übergeht, nach dessen Aufhören nicht selten Kopfweh, Hautjucken, Obstipation und Dysurie persistiren. Als Kriterium der Opiumvergiftung, um dieselbe vom Coma aus andern Ursachen zu unterscheiden, ist die Myosis, welche in einzelnen Fällen selbst nach dem Tode noch fort dauert, meist jedoch im Momente des Todes oder kurz vorher einer Pupillenerweiterung Platz macht, zu betrachten. Der Leichenbefund nach Morphinvergiftung ist ziemlich inconstant, doch findet sich häufig Hyperämie des Gehirns und seiner Häute, meist auch der Lungen, sowie Füllung der Blase.

Symptomatisch etwas abweichend ist die durch Subcutaninjection vermuthlich beim directen Eindringen in eine Vene zu Stande kommende acute Intoxication, indem hier plötzliche Brustbeklemmung, Athemnoth, grosse Angst, Blässe des Gesichts und der Lippen. Irregularität des Pulses, Mydriasis, Nackenstarre, Trismus und Krampf der Gesichtsmuskeln eintreten und die Kranken plötzlich bewusstlos hinstürzen (Braine, Tupper).

Die Symptome der Morphinwirkung bei Thieren sind nach kleineren Dosen Schlaf und Betäubung, nach grösseren die der narkotischen Vergiftung. Erbrechen ist bei Thieren, welche brechen können, fast constant. Auffallend ist die Immunität der Tauben, Hühner und Enten, welche durch enorme Quantitäten Opium und Morphin, intern oder subcutan applicirt, weder betäubt, noch sonst in ausgeprägter Weise vergiftet werden (S. Weir Mitchell). Die Symptome der Morphinvergiftung bei Säugethieren sind zwar nicht immer genau dieselben, doch zeigen sich meist früher oder später Zittern und Krämpfe, Pupillenverengung (bisweilen Dilatation), Erbrechen, unwillkürliche Urinexcretion und Kothabgang, Zucken in den Hinterbeinen, später Lähmung derselben, Stupor und Somnolenz, worin bisweilen die Sensibilität sehr herabgesetzt, bisweilen gesteigert erscheint; das Athmen ist anfangs schwierig, intermittirend, später sehr tief, der anfangs wenig veränderte Puls wird nachher klein und langsam und der Tod erfolgt nach langdauernder Agone. Bisweilen wechseln Agitation und Somnolenz ab, manchmal zeigen sich auch epileptische Convulsionen, am häufigsten kurz vor dem Tode, doch auch früher. — Bei der Anwendung kleiner hypnotischer Dosen (0.05 bei Hunden mittlerer Grösse) ist nach Cl. Bernard besonders auffallend, dass die Thiere in einem Zustande intellectueller Störung, welcher längere Zeit, manchmal 12—15 Std. anhält, sich befinden, mit dem das Verkriechen in dunkle Ecken und die Lähmung der Hinterbeine in Zusammenhang steht, wodurch sich der Morphinschlaf von dem durch Narcein hervorgerufenen Schlafe unterscheiden soll.

Die Behandlung der Morphin- und Opiumvergiftung ist im Wesentlichen die der narkotischen Vergiftung überhaupt. Die mechanische Entfernung des Giftes kann durch Brechmittel oder durch die Magenpumpe bewerkstelligt werden. Erstere reichen häufig nicht aus und manchmal wird selbst durch grosse Gaben von Zinkvitriol Erbrechen nicht herbeigeführt. Bei Anwendung der Magenpumpe kann man sich zum Ausspülen des Magens gerbstoffhaltiger Decocte, z. B. starker Kaffeeaufgüsse, bedienen. Auf das Tannin als Antidot darf man sich nicht allein verlassen, da Morphintannat im Magensaft kaum weniger löslich als reines Morphin ist. Ist ausgebildetes Coma vorhanden, so sind Excitantien äusserlich und innerlich in Anwendung zu ziehen. Am

häufigsten benutzt wird starker Kaffeeaufguss, den man im Nothfall als Klystier applicirt. Ein sehr zweckmässiges Verfahren ist das in England übliche sog. *ambulatory treatment*, welches jedoch nur vor Eintritt des Coma anwendbar ist und wobei man den Patienten zwischen zwei Assistenten fortwährend gehen lässt, um Eintritt von Schlaf und Sopor zu verhüten. Als Mittel zum Erwecken aus dem Sopor sind kalte Begiessungen auf Kopf, Brust und Wirbelsäule, sowie Eintauchen in ein warmes Bad und plötzliches Aussetzen an die kühle Luft empfehlenswerth und jedenfalls dem in England wiederholt in Anwendung gebrachten stundenlangen Peitschen mit nassen Handtüchern vorzuziehen. Im Stadium der Prostration, wenn die Respiration zu erlöschen droht, ist Einleitung und Unterhaltung der künstlichen Respiration das einzig zuverlässige Mittel. Hier kann auch Sauerstoff (Onsum) und Faradisation des Phrenicus in Anwendung kommen. Der früher bei Morphinvergiftung sehr gebräuchliche Aderlass ist wegen der Steigerung des Schwächezustandes verwerflich, ebenso die früher allgemein übliche Anwendung von Essig, welcher, so lange noch Morphin im Magen vorhanden ist, durch Beförderung der Lösung und Resorption schädlich wirken kann. Ueber die Behandlung der Morphinvergiftung mit Atropin wird bei letzterem Stoffe das Nöthige mitgetheilt werden.

Die physiologische Wirkung des Morphins ist zwar in dem letzten Decennium durch detaillirte Untersuchungen sehr erheblich gefördert, doch bestehen in den Anschauungen der einzelnen Pharmakologen auch in Bezug auf die Hauptwirkungen grosse Differenzen, welche z. Th. auch darauf beruhen, dass man die Wirkungsverschiedenheiten kleiner und grosser Dosen ignorirte und von den nach ersteren oder letzteren gemachten Wahrnehmungen Schlussfolgerung auf die Wirkung des Opiums im Allgemeinen zog. Besonders divergiren die Ansichten in Bezug auf den Grund des Zustandekommens der Morphinwirkung überhaupt. Zwar hat die alte Hypothese von Hünefeld und Plattner, dass Morphin resp. Opium Zersetzung des Blutes und eine mangelhafte Ernährung des Gehirns in Folge davon herbeiführe, kaum noch Vertreter, und die Mehrzahl der Pharmakologen und Toxikologen huldigt der von Liebig, Pickford u. A. ausgesprochenen Ansicht, dass es sich um eine chemische Verbindung des Morphins mit der Nervensubstanz handle. Binz suchte dieselbe durch die neuerdings von ihm gemachte Beobachtung zu stützen, dass Morphin die dem Chloroform und anderen anästhetischen Mitteln zukommende Verdunklung der Hirnganglienzellen bei Contact in Körperwärme hervorbringe. Verschiedene Toxikologen erklären den durch Morphin und Opium hervorgerufenen Sopor und Stupor aus dem durch Blutanhäufung in der Schädelhöhle auf das Gehirn ausgeübten Druck. Hiergegen ist indess einzuwenden, dass in einzelnen Fällen von Opiumvergiftung bei Menschen geradezu Blutleere des Gehirns gefunden wird und bleibt es fraglich, ob nicht die Gehirnhyperämie eine Folge mechanischen Einflusses der nach und nach abnehmenden Athmungs- und Herzbewegung während der in der Regel sehr langen Agonie sei. An diese Anschauung schliesst sich auch die neuerdings besonders von Picard betonte Theorie, dass die Herabsetzung des Blutdrucks die eigentliche Ursache der narkotischen Phänomene sei und dass der Ausgangspunkt für die Beeinträchtigung der Hirnfunctionen eine Parese des Sympathicus sei. Erwägt man indessen, dass der Sympathicus bei Morphinvergiftung reizbar bleibt (Gscheidlen) und dass im Laufe der Morphinvergiftung ein Parallelismus von Blutdrucksenkung und Narkose in keiner Weise existirt (Binz), so wird man Picards Theorie als beseitigt ansehen. Jedenfalls bleibt als primärer Effect des Morphins eine der Dosis proportionale Lähmung der Centren der bewussten Empfindung und willkürlichen Bewegung im Gehirn bestehen, auf welche nach toxischen Dosen Herabsetzung und Lähmung des respiratorischen Centrums folgt, in welcher letzteren man die Todesursache bei acuter Morphinvergiftung zu suchen hat. Die Reihenfolge des Betroffenseins der einzelnen Hirnpartien ist zwar keineswegs, wie Witkowski angab, dass immer zuerst das Grosshirn, dann die Vierhügel und schliesslich die Medulla oblongata gelähmt werden, und gar nicht selten treten Theile des Mittelhirns als erst betroffen in den Vordergrund; jedenfalls aber ist die ältere Theorie Onsums, wonach Morphin zunächst die Medulla oblongata erregt und später lähmt, nicht zur Erklärung der Effecte kleiner Dosen zu verwenden, wenn schon bei der Symptomatologie der Morphinvergiftung, die durch die

Herabsetzung des Athemcentrums bedingte Kohlensäureanhäufung eine nicht unbedeutende Rolle spielt. Die Herabsetzung des Athemcentrums ist allerdings eine directe; dieselbe tritt sehr früh durch Abnahme der Zahl und Tiefe der Athemzüge und Sinken der gesammten Athmungsgrösse (Leichtenstern) und unmittelbar nach Einspritzung von Morphin in die Carotis zur Erscheinung. Mitunter kommt in frühen Stadien der Morphinvergiftung das Cheyne Stokesche Athemphänomen vor (Filehne). Nur in colossalen Dosen subcutan oder intravenös vernichtet Morphin die Fähigkeit des Gehirns auf elektrischen Reiz zu reagiren (Hitzig). Man nahm früher allgemein an, dass der centralen Lähmung eine Erregung vorausgeht, und obschon neuerdings Witkowski den Versuch gemacht hat, die beim Menschen und auch bei einzelnen Thieren wahrgenommenen Erregungserscheinungen auf Störungen des Gleichgewichts zu beziehen, sprechen doch einzelne Erfahrungen, namentlich bei habituellem Opiumgenuss, für das Vorhandensein wirklicher Excitation. Am auffallendsten tritt eine solche bei Orientalen, namentlich bei Malayen, ein, wo statt des Coma nach grossen Opiummengen manchmal Delirien mit Steigerung des Bewegungstriebes sich zeigen. Dahin gehört das Amoklaufen der Opiophagen in Java, sog. wegen des Rufes „Amok“, „tödtet“, womit sie auf den Strassen umherlaufen, alles umbringend, was ihnen in den Weg kommt.

Neben der Wirkung auf das Gehirn besitzen Morphin und Opium auch eine solche auf das Rückenmark, welche in auffallendster Weise bei Kaltblüthern auftritt und sich hier vorwiegend durch Steigerung der Reflexaction zu erkennen giebt, während bei Warmblüthern entweder in Folge hochgradiger Herabsetzung der Grosshirnfunction die Reflexe nur langsam ausgelöst werden (Wundt) oder die Reflexerregbarkeit wirklich direct vermindert wird (Meihuyzen). Der bei Fröschen auftretende Tetanus ist weder an die Anwesenheit des Gehirns, noch an die der Medulla oblongata gebunden, verschwindet aber nach Durchschneidung des Rückenmarks unterhalb des fünften Wirbels. Mit der Steigerung der Erregbarkeit verbindet sich leichte Erschöpfbarkeit der Rückenmarksfunction, so dass nach jedem Krampfanfalle die Reflexerregbarkeit für einige Zeit vollkommen erlischt (Witkowski). Die peripheren motorischen Nerven und Muskeln sind nicht primär afficirt (Witkowski), obschon bei directer Application von conc. Opiumlösungen auf dieselben schneller Verlust ihrer Reizbarkeit eintritt. Die Versuche über eine herabsetzende Wirkung auf die Sensibilität sind nicht conclusent. Selbst die Angabe Eulenburs, dass Subcutaninjection locale Herabsetzung der Tastempfindung bedinge, ist nicht unbestritten.

Erwähnt werden mag hier noch, dass man früher dem Opium eine eigenthümliche erregende Action auf den Geschlechtstrieb vindicirte, wofür das Vorkommen anhaltender Erectionen bei Opiumvergiftung spricht, während andererseits die im Verlaufe von Gonorrhoe auftretenden Erectionen oft durch eine Gabe Opium beseitigt werden. Wood hält sogar den Mangel wollüstiger Empfindung für den Opiumrausch charakteristisch.

Die bei Opium- und Morphinvergiftung sehr frühzeitig und mitunter sogar vor Eintritt der Hypnose zu beobachtende Myose wird durch Atropie leicht beseitigt; locale Instillation von Morphinsalzlösungen hat keine Pupillenverengung zur Folge.

Auf das Herz scheint Morphin einen directen Einfluss nicht auszuüben. Beim Menschen resultirt nach medicinalen Dosen wohl in der Regel Abnahme der Pulszahl um 8–12 Schläge in der Minute (Preissendörffer), doch giebt es fast so viel Ausnahmen, wie die Regel beweisende Fälle. Die in der Narkose constante Pulsverlangsamung wird von Picard auf Sympathicusparese, von Witkowski auf den Wegfall accelerirender centraler Einflüsse zurückgeführt. Bei Warm- und Kaltblüthern überdauert der Herzschlag die Respiration und die übrigen Functionen. Bei Einwirkung grosser Dosen ist ein herabsetzender Einfluss auf die vasomotorischen Functionen nicht zu verkennen, wie dies die an der Haut und den sichtbaren Schleimhäuten hervortretende Gefässerweiterung zeigt. Medicinale Dosen (0,01–0,02) setzen den Gefasstonus bei gesunden und kranken Menschen, bei letzteren selbst bei sehr geschwächtem Herzen nicht herab (Preissendörffer). Infusion von Morphin in die Venen führt zu Sinken des Blutdrucks, das jedoch weit geringer als das durch Chloralhydrat bedingte ist. In späten Stadien der Morphinvergiftung erscheint das vasomotorische Centrum stärker afficirt als das respiratorische (Filehne).



Die obstipirende Action des Morphins und des Opiums, welche letzterem sogar in höherem Grade als dem Alkaloide zukommt, wurde früher meist auf directe Hemmung der Peristaltik zurückgeführt; doch scheint eine solche Retardation nach Nasse nur mittelbar durch Verminderung der Erregbarkeit der reflexvermittelnden sensibeln Nervenendigungen im Darm stattzufinden. Rabuteau bezeichnet das Mittel als Anexosmoticum, doch ist weder eine solche Wirkung noch directe Beschränkung der Darmsecretion physiologisch erwiesen. Auch die Abnahme der Verdauungsthätigkeit durch Morphin, welche auch bei subcutaner Application eintritt (Cl. Bernard), ist vielleicht Folge von Einwirkung auf das Nervensystem. Ob es sich hier um einen durch Elimination vermittelten directen Einfluss auf die Magennerven handelt, steht dahin. Diese doppelte Wirkungsmöglichkeit liegt auch beim Erbrechen vor, das wohl in der Mehrzahl der Fälle centralen Ursprungs ist. Dass Opium die sensibeln Magennerven herabsetzt, scheint aus dem Umstande hervorzugehen, dass es mit crethistischen Brechmitteln gegeben deren emetische Wirkung verhütet. Die bei grösseren Dosen auftretende Retention des Urins in der Blase ist vielleicht auf Verminderung der Reizbarkeit der Blasenschleimhaut zurückzuführen.

Eine beschränkende Einwirkung des Morphins resp. Opiums auf verschiedene secretorische Vorgänge ist seit Alters her als eine Hauptwirkung betrachtet. Experimentell erwiesen ist eine solche nur auf Schleimdrüsen der Trachea und Bronchien (Rossbach). Schweiss- und Speichelsecretion scheinen durch kleine Dosen herabgesetzt zu werden, während bei Vergiftungen häufig stark vermehrte Schweisssecretion, bei Thieren auch Speichelfluss beobachtet wird.

Auf den Stoffwechsel scheint Morphin nur einen geringen Einfluss auszuüben. Nach von Boeck setzt Morphin die Ausscheidung des Stickstoffs nur in sehr geringem Maasse herab, während Fubini und Ottolenghi von 0,01 gar keinen Einfluss sahen. Die Kohlensäureausscheidung ist bei ausgeprägter Narkose verringert, bei Convulsionen gesteigert (Bauer und von Boeck). Auf die Verdauung von Eiweissstoffen wirkt Morphin stärker hemmend als Strychnin und Veratrin (Wolberg). Bei acuter Vergiftung kann im Harn sowohl Eiweiss als Zucker auftreten (Krage).

Toxische Dosen Morphin setzen die Temperatur offenbar in Folge der Unthätigkeit der Muskeln constant herab. Auch bei medicinalen Dosen sinkt die Temperatur meist um einige Zehntelgrade, doch kommt mitunter auch Steigen vor (Oglesby), namentlich bei Melancholischen (Mickle). Bei Fiebernden wird die Temperatur nicht herabgesetzt (auch nicht die Pulsfrequenz); Morphin ist eben so wenig ein Antipyreticum wie ein Antisepticum, insofern es geradezu die Fäulniss organischer Gemische befördert (Dougall).

In früherer Zeit identificirte man gewöhnlich die Wirkung des **Opiums** und des Morphins vollständig; doch sind gewisse Differenzen nicht zu verkennen. Nach Schroff bewirkt Opium zu 0,1—0,2 in kurzer Zeit mit Sopor verbundene Narkose, die, ohne bedeutende Nachwirkung zu hinterlassen, rasch verschwindet; nach 0,06 Morphin, entsprechend 0,6 Opium, erfolgt niemals soporöse Narkose, dagegen hält die Wirkung länger an. Opium steigert objectiv die Wärmeentwicklung als Erstwirkung und bringt ein angenehmes Wärmegefühl hervor; letzteres fehlt auch bei Morphinwirkung nicht, während die Körpertemperatur sinkt. Opium steigert zunächst die Pulsfrequenz und setzt dieselbe dann im Stadium der soporösen Narkose herab; Morphin verringert die Pulszahl ohne vorausgegangene Steigerung. Opium wirkt weniger feindselig auf den Magen, Morphin erregt häufig Ekel und Erbrechen, sowie länger dauernde Störungen des gastrischen Systems. Diese letztere Differenz wird nach unseren eigenen Erfahrungen auch bei kleineren Dosen von Morphin und Opium beobachtet, während Bally die entgegengesetzte Ansicht vertritt. Doch giebt es auch Individuen, welche besser Morphin als Opium toleriren. Schroff bezeichnet auch als Folge der oben erwähnten Opiumdosen stärker hervortretende Ischurie mit Harndrang.

Für die Wirkung des Morphins und des Opiums sind eine Menge von Momenten als modificirend zu betrachten, welche namentlich für die toxische und letale Dose, aber auch für die medicinale

Verwendung von Bedeutung sind. Die tägliche Erfahrung lehrt, dass Kinder besonders stark durch relativ kleine Gaben von Opium und seinen Alkaloiden afficirt werden und dass andererseits bei allen Altersclassen durch den längeren Gebrauch eine Toleranz für Gaben sich entwickelt, welche bei Ungewohnten unfehlbar Vergiftung und selbst den Tod herbeiführen würden. Auch manche krankhafte Zustände, namentlich Exaltationszustände, begründen eine derartige grössere Toleranz.

Die kleinste letale Dosis eines Morphinsalzes, welche bei Erwachsenen beobachtet wurde, betrug 0,06 Morphinhydrochlorat (Paterson) und in einem Falle von Ebert (1873) hatte 0,25 den Tod einer an Pneumonie leidenden Frau in 40–70 Min. zur Folge. Sehr ernste Symptome können schon nach 0,03 intern (Kelso), oder 0,02 subcutan, oder 0,06 endermatisch (Bonnet und Trousseau) eintreten. Bei Kindern scheinen 0,015 essigsäures Morphin letal wirken zu können (Wimmer), während schon 0,01 sehr intensive Vergiftung bedingt (Melion). Die Gefährlichkeit wächst, je jünger das Kind ist, so dass z. B. bei Kindern unter  $\frac{1}{2}$  Jahr schon 0,003 Morphinsalz 36stündigen Schlaf herbeiführen können. Vom Opium können im Allgemeinen 1,0–2,0 als Dosis letalis für den Erwachsenen gelten, doch giebt es Fälle von sonderbaren Idiosynkrasien, wie z. B. Babbington 3tägige Erkrankung durch 0,3 Dover'sches Pulver, entsprechend 0,03 Opium, Christison soporösen Zustand nach 0,5 Laudanum, entsprechend 0,03–0,04 Opium, Sharkey eine tödtliche Intoxication mit 0,1 Opiumextract beobachtete. Auch hier sind die toxischen und letalen Dosen im kindlichen Lebensalter höchst niedrige. So soll nach Edwards der Tod eines 14 Tage alten Kindes durch eine  $\frac{3}{4}$  Mgm. Opium entsprechende Menge von Tinctura Opii benzoica und nach Smidt bei einem etwas älteren Kinde durch eine 0,003 Opium gleichkommende Quantität von Syrupus Diacodion veranlasst sein. Mag bei diesen Fällen der Gehalt der Opiumpräparate vielleicht nicht den Vorschriften der Phkp. entsprochen haben, so giebt es doch eine reichhaltige Casuistik, welche den Beweis liefert, dass Kinder (bis zu 5 Jahren) durch weniger als 0,01–0,02 Opium zu Grunde gehen können. Giebt es nun andererseits aber auch Fälle, wo kleine Kinder nach mehr als 0,6 Opium sich wieder erholten, so lehren die obigen Beobachtungen jedenfalls, dass der Arzt bei Säuglingen nur mit der grössten Vorsicht Opioceen verordnen darf. Auch auf junge Thiere wirken Opiumalkaloide weit energischer als auf alte. Wie bei Kindern ist übrigens auch bei hochbetagten Personen nach gewöhnlichen Opium-dosen Coma beobachtet.

Auch das Geschlecht ist nicht ganz ohne Einfluss. Erbrechen nach Opium ist viel häufiger beim weiblichen als beim männlichen Geschlechte (sowohl bei interner als bei subcutaner Application), ebenso treten Excitation, Kopfschmerz und Schwindel häufiger bei Frauen ein. Ischurie ist dagegen vorwaltend bei Männern zu beobachten (Bally). Kräftigere Constitutionen ertragen in der Regel mehr Opium als abgemagerte und anämische Personen, doch giebt es Idiosynkrasien auch unter ersteren, bei denen kleine Mengen, z. B. 0,002 Morphin endermatisch (Donyan) schon heftigen Narkotismus erregen können. Neben dieser echten Idiosynkrasie kommen sehr häufig andere vor, in denen Uebelkeit und Erbrechen oder Urticaria, Miliaria und andere Exantheme auftreten. Bei Personen mit apoplektischem Habitus soll Opium leicht zu bedenklichen soporösen Zuständen führen.

Der Einfluss der Gewöhnung auf die Opiumwirkung zeigt sich sehr häufig bei Kranken, welche längere Zeit Opium wegen schmerzhafter Leiden oder Insomnie erhalten, und bei denen man nach einiger Zeit stets die Dosis erhöhen muss, um gleiche therapeutische Erfolge zu erzielen. Derartige Kranke können im Laufe der Zeit mitunter ganz enorme Quantitäten von Opium oder Morphin consumiren, wie z. B. ein Patient 3 Jahre hindurch täglich 0,2–0,3 Morphin und in einer genau controlirten Periode von 323 Tagen nicht weniger als 83,0 verzehrte (Samter), und eine an Metritis und Darmfistel leidende Dame in der Zeit von 3 Jahren 820,0 Morphinum aceticum, oft 1,5 im Tage,

nahm (J. Beer). In einem Falle von Eder wurde sogar bis 4,0 pro die intern genommen und der allmählig gesteigerte Consum 11 Jahre lang bis zum Tode fortgesetzt. Diese Toleranz tritt auch bei subcutaner Injection von Morphin ein, so dass z. B. eine Patientin von Otis im Laufe von 4 Jahren  $1\frac{1}{2}$  Pfd. schwefelsaures Morphin in dieser Form consumirte. Auch bei Subcutaninjection steigen die Patienten auf 1,0 und darüber. Die Gewöhnung an toxische Opiumdosen bei allmählicher Steigerung findet übrigens in gleicher Weise wie bei Kranken auch bei Gesunden statt. Sie ist an kein Lebensalter gebunden, wie dies die Beobachtungen von Grainger darthun, wonach in englischen Fabrikdistrikten Kinder, welche von der Geburt an von ihren Müttern oder Wärterinnen zur Herbeiführung von Schlaf Opiumtinctur erhalten, allmählig 15—20 Tropfen, entsprechend 0,06 Opium, ohne Schaden verzehren. Nach Little ist die Steigerungsfähigkeit so gross, dass selbst beim Säuglinge 0,2 Morphin im Tage gegeben werden können. Wenn die Gewöhnung auch zu einer hochgradigen Toleranz führt, so erzeugt dieselbe doch keineswegs eine Immunität, da erheblich grössere Dosen als die zuletzt eingeführten und bei Aufgabe der Gewohnheit selbst die gewöhnlichen toxischen Gaben heftige acute Vergiftungserscheinungen hervorrufen können. Bekannt ist die Benutzung des Opiums als narkotisches Genussmittel bei den verschiedensten orientalischen Völkern, wo das Opium entweder in Pillenform im Zusatz von Süssigkeiten gegessen oder in eigenthümlicher Weise als sog. Chandu geraucht wird. Auch in Europa und Nordamerika, vereinzelt auch in Deutschland, kamen schon früh sog. Opiophagen vor, am meisten in England, wo vorzugsweise Opiumtinctur genossen wird. Selten ist das Morphin intern in ähnlicher Weise gemissbraucht, dagegen ist die Subcutaninjection desselben in den letzten 10 Jahren die Ursache einer sehr verbreiteten Leidenschaft geworden, welche unter dem Namen der Morphiumsucht oder Morphiomanie bekannt ist. Die Leidenschaft entwickelt sich meist bei Personen, welche ursprünglich das Präparat als schlafmachendes oder schmerzstillendes Mittel in kleinen Dosen gebrauchen, von denen sie sich nur schwer wieder entwöhnen können. Die Morphiumsucht entspricht im Wesentlichen der Opiophagie und namentlich sind die schlimmen Erscheinungen, welche man bei dem Entziehen des gewohnten Morphins beobachtet, die sog. Morphinanitionssymptome, vollkommen dieselben, während in der Regel wenigstens die eigentlichen Symptome der chronischen Vergiftung nicht so ausgeprägt hervortreten. Als solche bezeichnete bei asiatischen Opiophagen schon Engelbert Kämpfer Abmagerung, Schlafwerden, Trübsinn und Abstumpfung des Geistes, wie sie auch neuere Reisende im Orient übereinstimmend schildern. Nach Oppenheim charakterisiren ausser dem völligen Schwinden des Fettpolsters blasses, verwelktes Gesicht, schleppender Gang, glänzende, tiefliegende Augen und Krümmung des Rückgrats den habituellen Opiumesser; bei Allen kommt es zu intensiven Störungen der Verdauung, anfangs zu hartnäckiger Obstipation, später zu Diarrhoe und Dysenterie, und zu einem Verfall der körperlichen und geistigen Kräfte; dabei treten Schwindel, Kopfschmerz, Zittern, Neuralgien, Insomnie, manchmal eine Art von Delirium tremens, bei Manchen schliesslich Blödsinn und Paralyse ein, und in der Regel gehen die Opiophagen frühzeitig zu Grunde. Auch das Opiumrauchen scheint auf die Dauer zu ähnlichen körperlichen und geistigen Störungen zu führen, obschon nach den Untersuchungen von Reveil im Opiumrauche kein Morphin vorhanden ist. Nach den Beschreibungen von G. H. Smith tritt beim Opiumrauchen zunächst mehr die erregende als die narkotische Wirkung des Opiums zu Tage, auch erhält sich der Appetit länger als bei der Opiophagie. Sind bei Personen, welche habituell Morphin injiciren, Erscheinungen chronischer Morphinvergiftung vorhanden, so beschränken sich dieselben meist auf schlaffe und welke Haut, Verminderung der Speichelsecretion, Vermehrung des Schweisses, Abnahme der Muskelkraft und Pupillenverengung, ausnahmsweise findet sich Tremor, Palpitationen, circumscribte Anästhesien oder Parästhesien, Delirien, Hallucinationen, mitunter eigenthümliche typische Fieberanfälle (Levinstein, Burkart). In der Regel tritt die Mehrzahl der eigentlichen chronischen Vergiftungserscheinungen in prägnanter Form erst nach der Entziehung ein, nach welcher es in einigen Stunden zu Frösteln, Gähnen, Kopfschmerz und qualvollen Neuralgien, ferner zu Diarrhöen, oft auch zu Erbrechen und constant zu Schlaflosigkeit kommt, welche 4—5 Nächte an-



hält. In schwereren Fällen entwickelt sich der von Levinstein als *Delirium tremens acutum* der Morphiumsüchtigen bezeichnete Zustand von acuter maniakalischer Aufregung mit nachfolgendem Halluciniren und Steigerung des Tremor, welcher meist nicht länger als 40 Std. dauert. Der schwerste Symptomencomplex ist der Collaps, der mitunter nach prodromaler Störung der Articulation oder ohne Vorboten zu einer Zeit auftritt, wo die schwersten Abstinenzsymptome, wie Brechen und Durchfälle, verschwunden sind und in welchem der Tod eintreten kann. Man hat deshalb die früher von Fleming für Opiophagen überhaupt und später von Levinstein für die Morphiumsüchtigen empfohlene plötzliche Entziehungscure wegen der intensiveren Inanitionerscheinungen vielfach mit einer allmäligen Entziehung vertauscht (Parrish, Burkart, Müller); indessen lassen sich nach Levinstein selbst die schwersten Anfälle von Collaps durch eine rechtzeitige Morphineinspritzung heben. Bei beiden Methoden kommen übrigens Rückfälle in die alte Gewohnheit häufig genug vor.

Von Krankheitszuständen, welche die Dosis der Opiaceen modificiren, sind namentlich manche Neurosen, insbesondere Tetanus, *Delirium tremens*, Strychnin- und Atropinvergiftung, Hydrophobie und Psychosen (Melancholie, Manie) hervorzuheben. Bei manchen Darmaffectionen, z. B. Cholera und Ruhr, erklärt sich die Toleranz gegen innerlich verabreichte grosse Dosen wohl daraus, dass der grösste Theil des Mittels den Tractus, ohne resorbirt zu werden, passirt, während bei den genannten Neurosen auch die subcutane Injection bedeutender Quantitäten ertragen wird. Bei ausbrechender Puerperalmanie können z. B. 2,0 Morphin in 24 Std. genommen werden, ohne Vergiftungserscheinungen zu bedingen (Kellock). Für die Praxis ergiebt sich hier die Nothwendigkeit grösserer medicinaler Dosen im Tetanus und ähnlichen Affectionen; doch ist es gewiss nicht gerechtfertigt, dem Beispiele Michéas zu folgen, welcher bei Wahnsinnigen allmählig auf 8,0 Opium pro die stieg!

Schliesslich ist noch zu erwähnen, dass die Tageszeit der Darreichung für den Effect von Bedeutung sind. Abends 2–3 Stunden vor der gewöhnlichen Schlafzeit wirkt Opium besser hypnotisch als am Morgen oder Mittag. Dass es bei vollem Magen besser als bei leerem Schlaf erzeuge, ist Fabel, doch treten gastrische Erscheinungen bei nüchternem Magen leichter ein.

Das Morphin unterliegt im Organismus keiner totalen Destruction.

Es findet sich bei damit vergifteten Thieren stets im Harn (Dragendorff und Kauzmann, Hilger), wahrscheinlich auch in Leber und Galle; bei Subcutanapplication erscheint es nicht im Darm. Bei Menschen ist es wiederholt im Urin Vergifteter (Kratter u. A.) oder bei Morphiumsüchtigen (Levinstein) nachgewiesen, aber selbst nach medicinalen Dosen (0,06 Morphin oder einer entsprechenden Opiummenge) gelingt der Nachweis im Harn. Nach Burkart soll sich bei Morphiumsüchtigen im Harn ein Stoff finden, welcher zwar stark narkotisch wirkt, aber nicht die Reactionen des Morphins zeigt. Mitunter soll bei Opiumvergiftungen in Athem- und Hautausdünstung Opiumgeruch sich manifestiren, auch sollen Säuglinge durch Milch von Personen, welche Opium genommen haben, vergiftet worden sein.

Wirkung der Nebenalkaloide des Opiums. Von den Nebenalkaloiden des Opiums ist eine hypnotische Wirkung mit Sicherheit dem Narcein, Cryptopin, Opiatin und Metamorphin eigen, wahrscheinlich auch dem Papaverin, während Thebain, Laudanin und Laudanosin als convulsionserregend (durch Steigerung der Reflexerregbarkeit Tetanus hervorrufend) bezeichnet werden müssen. Neben diesen tetanisirenden Alkaloiden finden sich andere, wie Codein und Hydrocotarnin, welche durch Erregung im Gehirn und im verlängerten Marke belegener motorischer Centren krampfhaftige Muskelbewegung, klonische und

tonische Krämpfe erregen. Eigenthümlich ist es, dass auch den krampferregenden Opiumalkaloiden herabsetzende Wirkung auf das Grosshirn zukommt, während andererseits das Morphin und verschiedene hypnotische Nebenalkaloide eine geringe krampferregende Beiwirkung zeigen. Am ausgesprochensten sind die hypnotischen Nebenwirkungen beim Codein, welches in kleinen Dosen rein hypnotisch, in grossen dagegen nach Art des Pikrotoxins wirkt, doch fehlt auch dem tetanisirenden Thebain eine herabsetzende Wirkung auf die Sensibilität nicht.

Uebedingt ist nächst dem Morphin das **Narcein** das wesentlichste und zugleich das reinste hypnotische Alkaloid des Opiums. Nachdem zuerst Orfila und Magendie das Narcein als wirkungslos bezeichnet hatten, wies Lecomte (1852) die schlafmachende Wirkung des Mittels nach; später (1864) erklärte es Claude Bernard nach zahlreichen Versuchen an den verschiedensten Thieren für denjenigen Opiumbestandtheil, welcher den ruhigsten Schlaf herbeiführe, der keine nachtheiligen Folgen, namentlich nicht das nach Morphin hervortretende Verstopfsein und Gelähmtsein der hintern Extremitäten hinterlasse. Auch bei Kranken tritt bei innerer und subcutaner Application nach Dosen von 0,25 und darüber in der Regel ruhiger Schlaf ein, obschon es einzelne Refractäre gegen das Mittel giebt. Auf die Digestion wirkt Narcein im Allgemeinen nicht störend ein, dagegen theilt es mit dem Morphin die retardirende Action auf den Stuhl, die es nach Rabuteau indess in geringerem Grade besitzt. Mitunter kommt bei Narcein Dysurie vor, wie es auch die Secretion der Bronchien vermindert, während es die Schweisssecretion steigern soll (Debout, Liné und Delpech). Trockenheit im Munde und Schlunde wird häufig beobachtet. Zur Erzielung von Hypnose bei Gesunden bedarf es weit grösserer Dosen. Nebenwirkungen hat Narcein selbst in Dosen von 0,1—0,2 in der Regel nicht. Schwindel, Ohrensausen, Kopfschmerz, Uebelkeit und Erbrechen beim Erwachen (J. Bouchardat, Sichtung) oder Excitation und Insomnie, wie sie Krueg und Fossek bei Selbstversuchen beobachteten, kommen nur ausnahmsweise vor. Puls und Athemfrequenz werden durch hypnotische Gaben herabgesetzt, ersterer nach vorgängiger Beschleunigung (Eulenburg, Sichtung), bei längerer Dauer der Narkose auch die Temperatur; im Narceinschlaf besteht keine Myose, auch ist die Reflexerregbarkeit weniger herabgesetzt als im Morphinschlaf (Sichtung). Nach Fubini und Ottolenghi soll Narcein die Harnstoffausscheidung vermehren. Bei längerem Gebrauche findet Abstumpfung gegen die Einwirkung des Medicaments statt. Auch Kinder toleriren Narcein sehr gut (Laborde). Bei subcutaner Injection wirkt es auf die Tastempfindung in ähnlicher Weise herabsetzend wie Morphin, bei localer Application auf das Auge erfolgt keine Veränderung der Pupille (Eulenburg). Das Narcein wird bei interner Einführung bis auf einen kleinen, mit den Fäces abgehenden Theil vorzugsweise durch Harn und Galle eliminirt (Dragendorff und Schmemann).

Das **Cryptopin** bewirkt beim Menschen zu 0,06 Hypnose mit Athembeschleunigung und Mydriasis und ist in dieser Beziehung etwa doppelt so stark wie Narcein und 4mal so schwach wie Morphin (Harley). In toxischen Gaben (0,05 bei Kaninchen) setzt es die Respiration herab und tödtet durch Lähmung des Athemcentrums (Harley, Falck und Sippel); colossale Dosen wirken auch direct lähmend auf das Herz (J. Munk). Auch die motorischen Centren und die Reflexcentren des Rückenmarks (Munk), nach Sippel auch die motorischen Nerven und die willkürlichen Muskeln werden durch Cryptopin paralisirt.

Hinterbergers **Opianin** und Wittsteins **Metamorphin** wirken als Hypnoticum beim Kranken dem Morphin analog (Fronmüller), **Mekonin** wirkt subcutan zu 0,03—0,12 sedativ und hypnotisch (Harley); intern ist selbst 1,0 ohne hypnotischen Effect (Fronmüller). Auf Thiere wirkt es wenig giftig; bei Fröschen sah Albers nach 0,045 subcutan Zitterkrampf, Abstumpfung der Sensibilität und Tod in 6 Stunden.

Das von älteren Autoren, wie Barbier und Derosne, in Folge von Versuchen mit stark morphinhaltigen Präparaten dem Morphin gleichgestellte **Nar-**

**kotin** ist unzweifelhaft eine der unwirksameren Opiumbasen, der in höheren Dosen (1,5—4,5) narkotische Eigenschaften nicht ganz abgehen (Bally, O'Shaugnessy, Garden, Charvet). Kleinere hypodermatische Dosen erhöhen die Frequenz des Pulses und der Respiration, auch die Temperatur (Eulenburg). Auf 0,07—0,15 trat bei verschiedenen Schülern v. Schroffs dasselbe ein, doch folgte bald darauf Sinken unter die Norm, etwas Kopíweh mit Summen im Kopfe, Röthung des Gesichts, Injection der Bindehaut, Pupillenerweiterung, Kriebeln in den Gliedern, Wärmegefühl in der Brust, angenehme Gemüthsstimmung, Mattigkeit und Schläfrigkeit, schliesslich Kälte und Frösteln. Rabuteau nahm auf 0,4 bei sich selbst nicht die geringste Befindensstörung wahr und sah auf örtliche Application keine schmerzstillende Wirkung; Frommüller erzielte durch 1,0—2,0 Hypnose. Dass dem Narcotin die convulsions-erregende Wirkung nicht völlig abgeht, beweisen ältere und neuere Therversuche (Orfila, Kautzmann, Cl. Bernard). Nach Albers und Baxt steigert es bei Fröschen anfangs die Reflexe, bringt aber sehr rasch Insensibilität, Paralyse und einen schlafstüchtigen Zustand hervor. Auf den Stuhlgang wirkt dasselbe weder bei Menschen noch bei Thieren retardirend, auch verlängert es die Chloroformnarkose nicht (Rabuteau). Auf Tauben wirkt es giftiger als Morphin, indem 0,2 subcutan dieselben unter Convulsionen tödteten (Mitchell). Narcotin geht in den Harn der damit vergifteten Thiere über (Dragendorff und Kautzmann). Die Verdauung von Fibrin hemmt es weniger als Morphin (Wolberg); auf die Harnstoffausscheidung wirkt es nicht ein (Fubini und Ottolenghi).

Das **Codeín** erregt in kleinen Dosen bei Warmblüthern Schlaf (bei Hunden z. B. nach 0,05 Codeínhydrochlorat), doch ist der Schlaf nie so tief wie der Morphinschlaf, die Sensibilität nie so sehr gesunken und das Erwachen rascher und ohne intellectuelle Störungen oder Erschrecken, auch persistirt dabei keine Lähmung des Hintertheils (Cl. Bernard). Toxische Dosen erregen, wie schon Kunkel 1833 richtig angab, Streckkrämpfe und Zufälle, welche das Codeín in seiner Wirkung dem Pikrotoxin nahestellen (Falck). Das Bild der Intoxication bei Kaninchen, welche schon durch 0,06 Codeín subcutan getödtet werden (Crum Brown und Fraser), und Hunden beginnt mit Senken des Kopfes, dann folgt zunehmendes Zittern, plötzlich Zusammenstrecken, Dehnen und Strecken, spasmodisches Zucken der Bulbi und Lippen, selten masticatorischer Krampf, Rückwärtsgehen und Reithahnbewegung, Prominenz der Bulbi, Unruhe, vermehrte Athemfrequenz und Schwäche, hierauf ein Anfall von Opisthotonos mit unterdrückter Respiration und abwechselnde tonische und klonische Krämpfe (Schwimm- oder Trottbewegungen, Stosskrämpfe), als deren Ausgang allgemeine Adynamie eintritt (Falck und Wachs). Codeín ist gefährlicher als Morphin; versenkt man mit salzsaurem Morphin oder Codeín zwei völlig gleiche Thiere in Schlaf, so bedingt weitere successive Einspritzung von 0,001 Morphin nur tiefere Narkose, während schon nach Injection von 0,001 Codeín plötzlich convulsivische Erscheinungen, Mydriasis, Ansteigen der vorher stark gesunkenen Temperatur und Tod eintreten (Laborde).

Die meisten älteren Beobachter (Magendie, Bouchardat, Barbier, Robiquet, Berthé u. A.) bezeichnen Codeín als ein Hypnoticum, welches jedoch zu seiner Wirkung grössere Mengen als Morphin erfordert. Alle diese Beobachter sind einig darüber, dass es keine Obstipation bewirkt und die Verdauung nicht stört, dagegen das Hungergefühl stillt. Eine local schmerzstillende Wirkung (bei Neuralgien) konnte Barbier nicht constatiren, wohl aber Brennen bei endermatischer Application. Nach Robiquet rufen Dosen von 0,1—0,2 Stupor, Nausea und Erbrechen hervor. Schroff sah nach 0,1 (bei Dworzak und Heinrich) Aufstossen, heftige Magenschmerzen, Brechreiz, etwas Salivation, Eingenommenheit und Hitze des Kopfes, Druck in Stirn und Schläfen, Ohrenklingen, Gesichtsschwäche, Sinken der Pulsfrequenz, nach 4 Std. Zittern am ganzen Körper, welches mehrere Stunden bis zum Einschlafen anhielt, wonach noch am andern Tage Schläfrigkeit und Langsamkeit der Ideenassociation persistirte. Verminderung der Pulsfrequenz trat auch bei zwei andern Experimentatoren (Krueg und Fosseck) hervor, ebenso Magenschmerz und Brechneigung, bei dem einen auch angenehmes Wärmegefühl und Schläfrigkeit. Nach Rabuteau verursacht Codeín zu 0,05 Schwere des Kopfes und Mattigkeit in den



Beinen. Myrtle beobachtete bei einem Diabetiker nach 0,24 rauschartige Aufregung, der nach 2 Std. Schwindel, Erbrechen, Sprachlosigkeit, Angst und hochgradiger Collapsus folgten. Bouchut sah als Nebenerscheinungen nach 0,1 bei einem Kinde Convulsionen, einige Male auch Agitation und Schweiss. Chloralhydrat verhütet bei Thieren die Krämpfe höchstens in einfach letaler Dosis (Wehr). Das Alkaloid geht in den Harn über (Dragendorff und Schmemann). Die Harnstoffausscheidung wird nach 0,01 pro die stark vermehrt (Fubini und Ottolenghi).

Das **Papaverin** scheint, wie die meisten Opiumalkaloide, hypnotische und convulsionserregende Wirkung zu besitzen, von denen sich die erstere vorzugsweise bei Menschen, die letztere bei Thieren äussert. Die Angaben über die physiologische und therapeutische Wirkung differiren allerdings sehr, offenbar weil die Präparate des Handels höchst differente Substanzen darstellen. So bezeichnen z. B. Schroff und Hofmann Papaverin hypnotisch als unwirksam, da bei Letzterem sogar 0,42 ausser geringer Steigerung der Pulsfrequenz keine Erscheinungen hervorriefen. Andererseits beobachtete Leidesdorf bei Geisteskranken beträchtliches Sinken der Pulsfrequenz (von 100 auf 76) und ausgesprochene Hypnose nach 5–12 Tropfen einer Lösung von 0,42 in 60 Tr. Wasser. Gegenüber der Angabe von Albers und Claude Bernard, dass Papaverin auf Frösche tetanisierend wirke, wird von Baxt das Papaverin für das erste der hypnotisch wirkenden Opiumalkaloide erklärt, welches schon zu 0,01 in 1–5 Minuten Frösche in tiefen und langanhaltenden Schlaf versetze und in grösseren Dosen ähnlich auf Kaninchen und Meerschweinchen wirke, auch bei Fröschen das Auftreten von Strychnin- und Thebainkrämpfen verhindere oder dieselben abschwäche. Nach Schroff sind dagegen 0,05 bei Fröschen ganz wirkungslos, während 0,03 Muskeler schlaffung und Aufhebung der Respiration bei erhaltener und mitunter selbst gesteigerter Reflexaction bedingen. Baxt vindicirt dem Papaverin besondere herabsetzende Wirkung auf die Herzthätigkeit, auch am ausgeschnittenen Froscherzen und bei Lähmung des Vagus, jedoch nur beim Frosche, nicht bei Säugethieren. Die von Baxt constatirte Herabsetzung der Reflexaction beruht anscheinend auf directer centraler Wirkung, wobei die Hemmungscentren im Gehirn unbetheiligt sind; auf motorische Nerven und Muskeln wirkt Papaverin nicht (Baxt). Eine retardirende Wirkung des Papaverins auf den Stuhl ist nach Rabuteau weder bei Menschen noch bei Thieren zu constatiren, dagegen kann es ähnlich wie Morphin den Chloroformschlaf verlängern. Bei Vergiftungen an Thieren geht Papaverin nur in Spuren in den Harn über (Dragendorff und Schmemann).

Das **Hydrocotarnin**, welches zu 0,02–0,03 Kaninchen in 15–30 Min. tödtet und sich in seiner Giftigkeit zwischen Codein und Morphin stellt, bedingt entweder soporöse Narkose mit Convulsionen oder tödtet unter Erscheinungen von Opisthotonus, denen Zunahme der Athemfrequenz, Unruhe, Zittern und Mydriasis vorausgehen; das Herz schlägt bei Fröschen, welche gegen Hydrocotarnin sehr unempfindlich sind, lange fort (F. A. Falck, Pierce).

Das vorzüglichste krampferregende Alkaloid des Opiums ist das **Thebain**, welches sowohl bei Fröschen als bei Säugethieren von den verschiedensten Applicationsstellen aus Tetanus mit nachfolgender Paralyse bewirkt und schon zu 0,1 bei directer Einführung ins Blut Hunde von 7–8 Kgm. Schwere tödtet. Chloralhydrat hebt bei Kaninchen die krampferregende Wirkung doppelt letaler Dosen der Thebainsalze auf und rettet das Leben selbst bei 6fach letaler Dosis (Husemann u. Fliescher). Morphin und Atropin heben die Thebainkrämpfe nicht auf. Beim Menschen wirken selbst 0,4 nicht toxisch (Fronmüller), sogar Kinder toleriren 0,1 (Bouchut). Thebain wirkt weder verstopfend noch die Harnsecretion störend, steigert aber die tägliche Harnstoffausscheidung (Fubini und Ottolenghi). Nach Beobachtungen von Sée wirkt es bei subcutaner Injection stark schmerzstillend, selbst mehr als Morphin. Fronmüller vindicirt ihm (wie früher auch Harley) mässig hypnotische Effecte und ausgeprägte Herabsetzung der Pulsfrequenz. Bei vergifteten Thieren erscheint Thebain nicht im Harn (Dragendorff und Schmemann).

Das von Albers als stark krampferregend bezeichnete **Porphyroxin**, welches die Reflexfunction noch stärker als Strychnin steigern sollte, stellt Baxt zwischen Papaverin und Thebain, indem es in kleinen Mengen vorwiegend nar-

kotisch wirkt, in grösseren dagegen Convulsionen, jedoch schwächeren Tetanus wie Thebain bedingt. Zu 0,1 innerlich ist es bei Menschen ohne nachtheilige Wirkung (Schroff); Frommüller sah selbst nach 0,6 nur Spuren narkotischer Wirkung und Mydriasis.

Dem Thebain analog wirkt **Laudanin**, das nach 0,025 subcutan bei Kaninchen Tetanus und Erstickungstod bedingt, wonach es giftiger als Morphin und Codein, dagegen weniger giftig als Thebain ist (C. Ph. Falck). Weit weniger giftig ist das **Laudanosin**, das erst zu 0,075 subcutan Kaninchen tödtet, sich übrigens ebenfalls den tetanisirenden Opiumalkaloiden anreicht (Falck u. Wortmann). In kleinen Dosen wirkt es durch Erregung des vasomotorischen Centrums und der beschleunigenden Nerven drucksteigernd und pulsbeschleunigend, in grösseren setzt es Blutdruck und Pulsfrequenz durch directe Schwächung der Herzkraft herab.

Mekonsäure und Natriummekonat sind in vollkommen reinem Zustande, selbst in Gaben von mehr als 1,0 der Säure und 2,0—3,0 des Salzes, auf Warmblüter und Menschen ohne giftige Wirkung. Die Säure geht als solche in den Harn über.

Da kaum eine Krankheit existirt, bei welcher nicht Opium oder seine Alkaloide versucht wurden, würde bei einer detaillirten Besprechung das ganze Register der Pathologie vorgeführt werden müssen. Wir begnügen uns mit Aufstellung einiger Kategorien für die Anwendung der Opiaceen, wobei wir einzelne Punkte von Wichtigkeit besonders hervorheben. Zunächst kommen die Opiate in Betracht zur Herabsetzung der Erregung der Nervencentra, und zwar theils zur Herbeiführung von Schlaf in allen Fällen, wo Insomnie Leben oder Gesundheit gefährdet, sei es bei idiopathischer nervöser Schlaflosigkeit oder bei Agrypnie im Verlaufe acuter oder chronischer Krankheiten, theils bei Störungen der Gehirnfunction, sowohl mit exaltativem als mit depressivem Charakter, theils endlich bei Affectionen des Rückenmarkes.

Im Allgemeinen müssen die Opiate als die besten und sichersten Hypnotica bezeichnet werden, gegen welche nur der Umstand spricht, dass sie bei längerem Gebrauche stets eine Erhöhung der Dosis erfordern und eine Retardation des Stuhlganges bewirken. Nur wo es sich darum handelt, sehr rasch Schlaf herbeizuführen, stehen sie dem Chloralhydrat nach, und in solchen Fällen, wo sog. Idiosynkrasien bestehen, d. h. wo auch nach dem Gebrauche kleiner Dosen Kopfschmerz oder Dysurie beim Erwachen auftreten, müssen andere Hypnotica gegeben werden. In einzelnen Fällen von nervöser Insomnie, besonders wo dieselbe die Folge geistiger Ueberanstrengung ist, leistet Bromkalium mehr als Opiate. Vorwaltend empfehlen sich das Opium und das unter den Präparaten zu erwähnende Extractum Opii, sowie die Morphinsalze und das Narcein als Hypnotica. Welche von diesen Präparaten am besten ertragen werden, hängt von der Individualität ab, ebenso ist die schlafmachende Gabe nicht für alle Personen die nämliche und muss erst durch den Versuch festgestellt werden; sowohl zu kleine Dosen als zu grosse Gaben können Excitation herbeiführen. In chronischen und acuten Krankheiten bewähren sich Opium und die Opiumalkaloide als Schlafmittel besonders da, wo die Schlaflosigkeit Folge von Steigerung der Sensibilität ist, und namentlich bei vorhandenen Schmerzen liefern Opiaceen bessere Resultate als Chloralhydrat und andere Hypnotica. Dasselbe gilt bei gesteigerter Sensibilität der Respirationsschleimhaut, wodurch die günstige Wirkung bei Phthisis, wo das Opium keineswegs den Anschauungen der Alten gemäss contraindicirt ist, sich theilweise erklärt. Nur bei acuten febrilen Zuständen, wo die Insomnie aus der hohen Fiebertemperatur erklärt wird, leisten Opiate in der Regel wenig. Die günstige Wirkung bei Hydrops scheint auf die Beseitigung der durch letzteren hervorgerufenen Oppression und Präcordialangst bezogen werden zu müssen. In allen Fällen müssen die Opiaceen Abends dargereicht werden.

Der Gebrauch des Opiums bei Psychosen wurde 1851 durch Engelken besonders wieder angeregt, dessen Erfahrungen durch Schubert, L. Meyer, Erlenmeyer, Guislain, Michéa und viele andere Irrenärzte Bestätigung gefunden haben. Bei der von demselben befolgten Methode handelt es sich nicht um die schon früher gebräuchlichen und im Ganzen wenig Erhebliches und Dauerndes leistenden kleinen Opiumdosen, sondern um den längeren consequenten Fortgebrauch grösserer Gaben, wobei zuerst täglich 2mal 0,06 gereicht, dann nach und nach bis auf 0,2—0,4 2mal täglich gestiegen und diese Dosis mehrere Wochen gegeben wird. Es kommen danach weder Vergiftungssymptome noch ungünstige Wirkung auf die Ernährung zur Erscheinung, der Stuhl bleibt regelmässig und wird bei den grösseren Gaben selbst manchmal diarrhoisch, dabei bessern sich in passenden Fällen die Erscheinungen der Hirnreizung, die Hallucinationen nehmen ab, die Angstgefühle und die mit ihnen verbundenen Wahnvorstellungen schwinden, die Kranken werden zusehends ruhiger, und mitunter tritt rasch vollständige Genesung ein. Am meisten eignet sich diese Behandlung für recht frische Fälle, jüngere weibliche Individuen und Zustände trauriger Verstimmlung, welche unter Mitwirkung anämischer, hypochondrischer und hysterischer Dispositionen und psychischer Ursachen entstanden sind und sich oft zu grosser Unruhe und Aufregung steigern. Es sind somit die günstigsten Effecte vorzugsweise bei sog. activer Melancholie zu constatiren, und besonders günstig erweist sich die Methode bei vielen puerperalen Seelenstörungen. Bei Melancholie mit Stupor, bei typischen Formen, bei Tobsucht und der heiteren Aufregung des Wahnsinns nützt die Opiumbehandlung nichts. Vielfach hat man hier die interne Opiumdarreichung mit der Subcutaninjection von Morphin vertauscht; Voisin gab sogar 0,7, selbst 1,5 pro die in kaum nachahmungswerther Weise. Manche Kranke toleriren Opiumextract besser als Opium und Morphin. Dass intercurrente Excitationszustände im Laufe chronischer Psychosen häufig Morphin indiciren (Silomon), ist notorisch.

An die Psychosen schliessen sich diverse Intoxicationen chronischer und acuter Art, in denen die Gehirnthatigkeit besonders aufgeregt ist, vor Allem Delirium tremens, bei welchem in früherer Zeit fast ausschliesslich Opium in Anwendung gezogen wurde. In neuerer Zeit hat sich die zuerst von englischen Aerzten ausgehende Anschauung, dass Opium bei Behandlung des Säufers in vielen Fällen entbehrt werden kann, Bahn gebrochen; und beschränkt man dessen Anwendung vorzugsweise auf solche Fälle, wo keine Complication mit acuten entzündlichen Zuständen besteht und wo nicht stärkeres Gesunkensein der Kräfte die Anwendung von Reizmitteln nothwendig macht. Man hüte sich stets vor zu kleinen Dosen, welche oft die Aufregung steigern, vermeide aber auch zu grosse Gaben, weil dieselben statt gesunden Schlafes nicht selten einen comatösen Zustand bedingen. Von acuten mit Exaltation verbundenen Intoxicationen sind besonders die Vergiftungen mit den pupillenerweiternd wirkenden Solaneen Belladonna, Datura und Hyoscyamus hervorzuheben. Obschon sich nicht leugnen lässt, dass der aufgeregte Zustand der an diesen Vergiftungen leidenden Personen durch subcutane Morphininjection manchmal rasch beseitigt wird, ist die Frage, ob das Opium hier überhaupt nothwendig sei, doch nicht unbedingt zu bejahen, weil derartige Vergiftungen selbst durch enorme Dosen oft ganz spontan genesen, ja sogar bei offenbar verkehrter Behandlung günstig verlaufen. Auch bei Intoxication mit Digitalin (Erlenmeyer) und Chloroform (Eulenburg) ist Morphin subcutan mit Nutzen verwendet.

Es reihen sich hieran Delirien im Verlaufe verschiedener acuter Krankheiten. Man verwirft im Ganzen das Opium bei Fieberdelirien auf der Höhe acuter entzündlicher Krankheiten, während man es bei sog. Inanitionsdelirien mit Recht neben excitirenden Mitteln (Wein) in Anwendung bringt. Auf die günstige Wirkung bei solchen Delirien bezieht sich vorzugsweise die Empfehlung des Opiums im Typhus (Drasche u. A.), wo es die gewöhnlich gegen Ende der zweiten Woche oder später auftretende Nervenaufrregung mit Schlaflosigkeit, Delirien, Zittern und Sehnenhüpfen nicht selten beseitigt. Nach Vibert wirkt Morphin bei Delirien besonders günstig bei gleichzeitig bestehender Mydriasis und Asthenie. Die früher herrschende Furcht vor Opium ist beim Typhus ebenso wenig gerechtfertigt wie bei acut entzündlichen Zuständen der



Centralorgane des Nervensystems und ihrer Häute. Im Gegentheil kann Opium mit vorzüglichem Erfolge in passenden Fällen sowohl bei Meningitis cerebialis als bei Meningitis cerebrospinalis benutzt werden, obschon es hier selbstverständlich nicht als directes Heilmittel zu betrachten ist. Auch hier ist das Auftreten der oben bezeichneten nervösen Symptome als Theilerscheinung des Collapsus die Indication für das Opium, welchem bei diesen Affectionen die Opiumalkaloide nicht substituirt werden können.

Was die Krankheiten des Rückenmarkes angeht, so kommt besonders die Steigerung der Reflexaction, wie sie beim Tetanus und namentlich beim Tetanus toxicus (Strychninvergiftung) ausgeprägt ist, in Betracht. Die Literatur enthält nicht wenige Fälle von Tetanus aus traumatischer oder rheumatischer Ursache, wo Opium oder Morphin, namentlich endermatisch oder subcutan applicirt, von günstigem Erfolge waren, während andererseits Misserfolge keineswegs fehlen. Dasselbe gilt für die Strychninvergiftung, wo die Opiaceen freilich hinter dem Chloralhydrat an Zuverlässigkeit nachstehen. Bei den fraglichen Affectionen müssen die Dosen stets sehr hoch gegriffen werden, doch geht man selten bei Morphin über 0,06 hypodermatisch hinaus. Bei Trismus neonatorum hat Eulenburg von der subcutanen Morphininjection keine Erfolge gesehen.

An die hypnotische Anwendung der Opiaceen schliesst sich der Gebrauch derselben zur Verlängerung der Chloroformnarkose, auf welchen zuerst von Nussbaum hingewiesen wurde. Nussbaum beobachtete, dass die subcutane Morphininjection, während der Chloroformnarkose ausgeführt, die letztere 8—12 Stunden zu verlängern im Stande sei, und empfiehlt daher die Combination beider bei solchen langwierigen Operationen, welche die Erneuerung der Chloroforminhalation sehr erschweren, z. B. bei Resectionen des Oberkiefers. Das Verfahren hat verschiedene Lobredner (Pitha, Paget) gefunden, ist aber auch nicht ohne Tadel geblieben, weil bei Injection kleiner Morphinmengen (0,01) die Prolongation der Chloroformnarkose häufig nicht zu Stande kommt und grössere Gaben (0,06) nicht ohne Gefahr für das Leben der Kranken zu sein scheinen (Bartscher). Verschieden von Nussbaums Methode ist das Verfahren von Uterhard, das Excitationsstadium der Chloroformnarkose, insbesondere bei Säugern, durch eine 10 Minuten vor der Einathmung gemachte Subcutaninjection zu verhindern, wodurch in der That der Lebensgefahr insofern vorgebeugt wird, als in der Regel die zur Narkose erforderliche Chloroformmenge sehr verringert wird (Cl. Bernard) und als die im Beginn der Inhalation sonst vorkommenden Reflexstillstände der Athmung und des Herzens wegfallen, auch ein so tiefes Sinken des Blutdrucks wie bei der gewöhnlichen Chloroformnarkose nicht stattfindet (Mollow). Die Dauer der Narkose wird auch bei diesem Verfahren verlängert. Nimmt man etwas weniger Morphin (0,01--0,02), so lässt sich durch kleine Mengen Chloroform ein Zustand von Analgesie mit Integrität des Bewusstseins, der Sinnesthätigkeiten und der Willkürbewegung herbeiführen, der zur Vornahme kleinerer Operationen, besonders geburtshülfflicher, ausreichend erscheint. Eine ähnliche Combination von Morphin und Chloroform ist auch bei schmerzhaften Leiden, z. B. Gallensteinkolik, sehr empfehlenswerth. An Stelle des Morphins lassen sich auch andere Opiumalkaloide, z. B. Narcein, zur Verlängerung der Chloroformnarkose verwenden.

Eine zweite Hauptanwendung der Opiaceen besteht in der Beschwichtigung schmerzhafter Affectionen, wobei die Herabsetzung der Perception äusserer Eindrücke durch das Mittel als Hauptgrundlage der Wirkung angesehen werden muss, vielleicht auch eine directe Herabsetzung der Sensibilität im Spiele ist.

Als Anodynum nehmen die Opiaceen und insbesondere das Morphin und seine Salze unbestritten den ersten Platz ein; der alte Ruhm derselben hat sich durch die Einführung der subcutanen Injection noch erheblich vermehrt. Das letztere Verfahren bewährt sich besonders bei Neuralgien, wo es nur höchst ausnahmsweise keinen palliativen Effect zeigt, während es namentlich in frischen Fällen sehr häufig zu radicaler Heilung führt. Der Erfolg ist völlig unabhängig von der betroffenen Nervenbahn und von den causal Momenten und macht sich sowohl bei Neuralgien peripherischen als bei solchen centralen Ursprungs geltend.

Am meisten Nutzen schaffen die Subcutaninjectionen entschieden, wenn dieselben an den sog. Valleixschen Druckpunkten ausgeführt werden. An die Benutzung bei Neuralgien reiht sich die Verwendung bei Herpes Zoster, wo oft eine einzige Morphininjection den gesammten Schmerz beseitigt, und bei Hemikranie, wo Subcutanapplication von Morphin Lobredner (v. Graefe, Pletzer, Saemann u. A.) fand und das von Jung angegebene Einschnupfen einer Morphinelösung mit Blausäure oft günstigen Effect hat. In manchen Fällen hysterischer Hemikranie wirken Opiaceen entschieden ungünstig, vermehren die Nausea und führen oft zu Erbrechen. Innerlich kann Opium und Morphin mit Nutzen manchmal bei Gastralgie gebraucht werden, wo es ebenfalls am wenigsten günstig bei Hysterischen wirkt. Auch bei Gastralgie Chlorotischer leistet es wenig, und selbst bei Magenschmerzen paroxystischer Art, welche mit tieferen Störungen und anatomischen Läsionen der Magenwand in Verbindung stehen, leisten Atropin und Wismutnitrat in der Regel mehr als Opium; doch ist eine Verbindung von Bismutum nitricum mit Opium ausserordentlich geschätzt, die sich uns wiederholt bei Gastralgia alcoholica bewährte. Enteralgie und Kolik im Allgemeinen ist man bei uns mit Opiaten zu behandeln nicht gewohnt, während man in anderen Ländern mehr Gebrauch davon macht. Marshall empfiehlt in dieser Richtung besonders eine Verbindung von 0,5—1,2 Chloroform mit 4,0 -8,0 Tinctura Opii benzoica als in 3 Minuten schlafmachendes Anodynum bei Kolik. Bei Colica hepatica und Nephralgie können wir häufig die Opiate gar nicht entbehren. Bei Bleikolik ist Opium zu 0,05 bis 0,1 stündlich bis dreistündlich ein Hauptmittel, das für sich allein oft zur Heilung des Krankheitszustandes führt (Tanquerel, Bricheteau) und namentlich nie die Verstopfung steigert. Morphin wird hier weniger benutzt, doch ist auch hier die subcutane Injection entschieden von Nutzen (van Geuns, Vibert u. A.).

Wie bei periodischen Schmerzen bewährt sich die anodyne Wirkung der Opiaceen auch bei nicht paroxystischen Schmerzen, so namentlich auch bei rheumatischen Affectionen, wo z. B. Bally schon die interne, Lesieur die endermatische und neuerdings Sander und Erlenmeyer die subcutane Application des Morphins empfohlen. Bei acuten Gichtanfällen wird Opium im Allgemeinen für contraindicirt erachtet (Cullen, Garrod) und nur bei äusserst excessiver Schmerzhaftigkeit zugelassen. Auch bei febrilen, acut entzündlichen Affectionen macht der Schmerz sehr häufig die Anwendung eines Opiats nöthig; auch hier liefert oft Morphin subcutan die vorzüglichsten Dienste. Selbst auf der Höhe des Fiebers tritt dadurch Schmerzlinderung ein, während, wie oben bemerkt, das Mittel hier keinen Schlaf macht, sondern mitunter sogar die Aufregung verschlimmert. Es gilt dies sowohl für Rheumatismus acutus als für Pneumonie, Pleuritis, Peritonitis, Meningitis cereбрalis und cerebrospinalis, wo das Mittel auf der Höhe des Fiebers nur ausnahmsweise, d. h. wegen excessiver Schmerzen oder äusserst heftiger nervöser Symptome gegeben werden darf, während nach Ablauf des Fiebers oder bei mässigem Fieber den Opiaceen als Hypnoticum oder Anodynum keine Bedenken entgegenstehen. Beim acuten Rheumatismus hat man Opium übrigens auch in der Absicht, Diaphoresis hervorzurufen, gegeben und in dieser Richtung besonders das Doversche Pulver (vgl. Präparate) curmässig angewendet.

Die günstigen Effecte des Opiums bei chronisch verlaufenden schmerzhaften Affectionen kennt jeder Arzt. Die Schmerzen bei Skirrhen und Carcinomen, bei Cystitis chronica und vielen anderen chirurgischen Krankheiten werden namentlich durch subcutane Morphininjectionen in besonderer Weise gelindert.

Endlich mag hier noch die Anwendung der hypodermatischen Morphininjection zur localen Anästhesirung behufs Vornahme von Operationen erwähnt werden, welche Semeleder und Eulenburg vor der Aetzung mit Arg. nitr. oder Ferr. candens, Zülzer und Jarotzki vor Einwicklung des Scrotums bei Nebenhodenentzündung und vor der Operation des eingewachsenen Nagels, Bricheteau und Vibert vor Application von Vesicatoren, Walker und Ravoth vor der Taxis von Hernien empfohlen. Zur localen Anästhesirung des Larynx kann Morphin für sich oder in Verbindung mit Chloroform benutzt werden.

In dritter Reihe steht die Benutzung der Opiate zur Minderung von bestehendem Hustenreiz, was ihre Anwendung sowohl in acut entzündlichen als in chronischen Respirationskrankheiten nicht selten indicirt.

Eine directe Wirkung des Opiums auf die Secretion der Bronchialschleimhaut lässt sich nach den neuesten Versuchen von Rossbach nicht in Abrede stellen, so dass die günstigen Effecte bei chronischer Bronchitis und Laryngitis nicht allein auf die Herabsetzung der Sensibilität der Respirations Schleimhaut bezogen werden können. Irrig ist es deshalb auch, das Opium in solchen Fällen für contraindicirt zu halten, wenn profuse Secretion besteht; die befürchtete schädliche Anhäufung der Secrete (Traube, Nothnagel) tritt nicht ein. Ist dagegen die Expectoration in Folge von Schwächung der expiratorischen Muskeln mangelhaft, so passen Opiate niemals. Ueber die Anwendung der Opiate bei Pneumonie und Pleuritis war schon oben die Rede. Ebenso erwähnten wir bereits den Gebrauch in der Phthisis, wo so häufig bestehender Hustenreiz Insomnie veranlasst. Wir heben ausdrücklich hervor, dass etwaiges hektisches Fieber den Gebrauch von Opiaten nicht contraindicirt, vielmehr Patienten dieser Art gar nicht selten das Opium durchaus nicht entbehren können. Man giebt bei chronischen Respirationskrankheiten Opium häufig in Verbindung mit Adstringentien (Bleizucker, Tannin). Bei Hämoptysis kommt es nur in Anwendung, wenn eine geringere Blutung durch Hustenreiz unterhalten wird. Ziemlich irrelevant ist die Anwendung bei Keuchhusten, wo schon Meyer 1829 die endermatische Application von Morphin empfahl; in allen Fällen aber muss man äusserst vorsichtig sein, um nicht Intoxicationsphänomene hervorzurufen. Zur Beschränkung von Hustenreiz sind übrigens stets nur kleine Dosen der Opiaceen zulässig. Sehr günstige Wirkungen haben Opium und Morphin beim Asthma und bei Oppression der Brust überhaupt (Vibert, Renault u. A.), hier wohl durch directe Einwirkung auf das Athemcentrum. Der Effect beim Asthma ist übrigens an eine ausreichende Dose geknüpft, da kleine Dosen niemals günstig wirken. Moss rühmt Morphin subcutan gegen Sommer- und Herbstkatarrh; auch ist dasselbe überhaupt zum Coupiren von Schnupfen empfohlen.

Eine vierte Kategorie von Krankheiten, welche hier in Betracht kommen, sind spastische und convulsivische Neurosen, wo indess Opium keineswegs mit derselben Sicherheit wie bei Neuralgien wirkt.

Abgesehen von Tetanus und Asthma, welche bereits Besprechung gefunden haben, kommen hier insbesondere periphere Krämpfe in Betracht. So leisten subcutane Morphineinspritzungen längs des Nervus supraorbitalis Vorzügliches bei Blepharospasmus nach Hornhautentzündungen oder Verletzungen des Auges (A. v. Graefe), ebenso bei Myospasmen in Amputationsstümpfen (Eulenburg). Erlenmeyer und Schirmer sahen auch bei Krämpfen der Gesichtsmuskeln, Saemann bei Stottern von der hypodermatischen Application des Morphins entschiedene Erfolge. Minder günstig wirken Opiaceen bei Epilepsie, Chorea, hysterischen Convulsionen, Tremor und Paralysis agitans. Mehr Erfolg sieht man manchmal bei Eclampsia parturientium, wo bisweilen subcutane Morphinapplication die Krämpfe aufhebt, wenn Chloralhydrat seine Wirkung versagt. Die Empfehlung des Mittels durch Scanzoni bei dieser Affection, welche in der Praxis vielfach Bestätigung gefunden hat, lässt auch bei urämischen Convulsionen Nützliches erwarten, und in der That haben Whittler, Loomis und Flint bei Coma und Convulsionen im Verlaufe von Morbus Brighti sehr günstige Erfolge beobachtet, welche die alte Anschauung, dass bei dieser Krankheit in Folge der Unwegsamkeit der Nieren Opium und Morphin ganz und gar contraindicirt seien, als irrig erscheinen lässt. Sehr günstige Effecte sieht man auch vom Opium und wiederum am meisten von der subcutanen Injection von Morphin bei Krampfwegen, wo übrigens, um Erfolg zu haben, die Dosis nicht zu niedrig gegriffen werden darf. Auch bei schmerzhaften Nachwehen und zur Verhütung von Abortus bei vorzeitigen Uterincontractionen leistet die Morphininjection oft ganz Vorzügliches.



Endlich finden die Opiaceen ausgedehnte Anwendung zum Zwecke der Herabsetzung der peristaltischen Bewegung. Hier wird vorzüglich Opium selbst und seine galenischen Präparate, weniger Morphin und die übrigen Alkaloide, benutzt.

Unter diese Kategorie fällt zunächst der Gebrauch des Opiums beim Erbrechen, wo übrigens auch die Herabsetzung der Sensibilität der Magenerven entschieden von dem günstigen Erfolge beiträgt. Nur kleine Gaben sind von günstiger Wirkung, während grössere bei manchen Individuen das Erbrechen steigern. Opium kann bei den verschiedensten Arten des Erbrechens nützlich wirken, so bei Hyperemese durch zu starke Dosen von Brechmitteln, oder bei dem nach Intoxication mit kaustischen Substanzen zurückbleibenden Vomitus, auch beim Erbrechen der Trinker und der an tieferen Magenleiden (Krebs, Geschwür) laborirenden Personen, endlich auch bei sympathischem Erbrechen bei Erkrankung verschiedener Abdominalorgane. Budd rühmt es auch bei dem neben Schlaflosigkeit vorkommenden Erbrechen von Personen, welche durch Nahrungsmangel oder Ueberanstrengungen erschöpft sind. Bei den meisten Formen des Vomitus steht indess das Opium andern Narkotica, namentlich der Blausäure und der Belladonna, nach. Hierher gehört auch die Anwendung, welche man vom Opium macht, um die emetische Wirkung mancher kaustischen Medicamente zu verhindern, die man, wie z. B. den Aetzsublimat und das Quecksilberiodid, gern mit einer geringen Menge Opium darreicht. Häufiger als gegen Erbrechen wird das Opium bei Diarrhöen in Anwendung gebracht, wo es sich namentlich bei Erkältungsdurchfällen gesunder Personen, bei chronischen oder subacuten Darmkatarrhen mit Follicularverschwörung und bei Diarrhoe der Phthisiker empfiehlt, bei welchen letzteren es besonders in späteren Stadien passt und meist mit Bleizucker und ähnlichen Mitteln verbunden wird. Als Contra-indication ist das Vorhandensein von Verdauungsstörungen zu betrachten, da Opium in der Regel vorhandene Appetitlosigkeit verschlimmert. Bei Diarrhöen im Verlaufe acuter fieberhafter Krankheiten und bei Durchfällen im kindlichen Lebensalter wendet man meist andere Styptica an, um, wenn diese fehlschlagen, dennoch auf das Opium zu recurriren. Bei Dysenterie ist der Nutzen des Opiums als eigentliches Heilmittel bestritten, ja es wird von Einzelnen geradezu als schädlich hingestellt, indem es die im Darmcanale vorhandenen Absonderungen der Geschwüre retinire und dadurch zur Aufsaugung derselben Veranlassung gebe. Nichtsdestoweniger muss Opium als ein das Uebermaass der Entleerungen, die Kolikschmerzen und den Tenesmus am besten beseitigendes und in schweren Fällen von Ruhr geradezu unentbehrliches Mittel angesehen werden, das namentlich in Verbindung mit Ipecacuanha, Calomel und adstringirenden und tonischen Mitteln geschätzt und häufig in Klystierform verordnet wird. Ruhrkranke ertragen sehr oft ausserordentlich grosse Gaben Opium, nach Christison sogar 1,2—1,5 im Tage. Eine gleiche Wichtigkeit hat das Opium bezüglich der Behandlung der Cholera nostras, wo auch die subcutane Injection von Morphin (Hasse, Vibert) von günstigem Einflusse auf die dabei vorhandenen Wadenkrämpfe ist. Minder günstige Erfolge bietet es bei Asiatischer Cholera. Obschon es die Choleradiarrhoe meist beseitigt, nützt es dagegen beim ausgebildeten Choleraanfall äusserst wenig, ja von Einzelnen wird es in demselben geradezu als schädlich bezeichnet.

Wir erwähnen hier auch die Behandlung der Peritonitis mit Opium, wo dasselbe neben der beruhigenden Wirkung auf die Peristaltik Herabsetzung des Schmerzes und Schlaf bewirkt; man giebt hier nach stattgehabter Antiphlogose 3—6mal täglich 0,006—0,02 Morphin oder 0,03—0,06 Opium. Bei Typhlitis und Perityphlitis, sowie bei Entzündung des wurmförmigen Fortsatzes ist das Opium entschieden das am günstigsten wirkende Medicament, welches bei strenger Diät und Ruhe zur Beseitigung der genannten Leiden führt. Bei diffuser Perforationsperitonitis ist Opium vollständig unentbehrlich, um die dabei bestehenden heftigen Schmerzen zu calmiren.

An diese Affectionen reihen sich schwere Verletzungen der Eingeweide, sowie extreme Fälle von Darminvagination, Volvulus, Ileus und incarcerirten Hernien, wo man oft vor und statt der Operation bis 0,06 stündlich darreicht.

Besonders hervorgehoben werden muss, dass das Opium als Palliativum und zum Zwecke der Euthanasie bei allen schmerzhaften oder mit Krampf oder Aufregung verbundenen unheilbaren Leiden in Gebrauch gezogen und in dieser Beziehung von kaum einem andern Mittel übertroffen wird.

Hierher gehört, von Krebs und Tuberculose abgesehen, die Anwendung bei sehr schweren und absolut tödtlichen Verletzungen, nach grösseren Operationen, ferner bei Krankheiten des Herzens und der grossen Gefässe, bei Pneumothorax, Empyem, endlich bei Hydrophobie.

Schliesslich haben wir noch einiger besonderer Zustände zu gedenken, wo Opiaceen gerühmt worden sind. In früherer Zeit hielt man viel vom Opium bei Intermittens, gegen welche es Hauptmittel vor Einführung der Chinarinde war; es sollte sogar eine Dosis Opium Fieberanfälle coupiren können; gegenwärtig giebt man es höchstens als Unterstützungsmittel des Chinins bei perniciösem Wechselfieber mit stark ausgesprochenen Hirnsymptomen. Ferner gab man es bei Diabetes theils als den Durst minderndes Medicament, theils als directes Heilmittel, als welches Opium (zu 0,015–0,4 mehrmals täglich) und Morphin (nicht aber Narcein und Narkotin) neuerdings auch Pavy und Kratschmer bezeichnen. Der Zuckergehalt sinkt nach Opium und Morphin allerdings, aber das Allgemeinbefinden wird selten gebessert. Friedrich empfahl bei Graviditas extrauterina Tödtung der Frucht mittelst subcutaner Injection von Morphin; Estlander gebraucht dieselbe mit Erfolg bei Erysipelas traumaticum (in der Nähe der gerötheten Stelle injicirt), wo der Schmerz beseitigt und das Fortschreiten gehindert werden soll. Raoul, Skey u. A. wollen auch scorbutische und atonische Fussgeschwüre mit Opium geheilt haben.

Man giebt das Opium zu 0,06–0,15, als schlafmachendes Mittel gewöhnlich zu 0,05–0,1; höhere Dosen sind bei Tetanus und Delirien gebräuchlich, wo die Verzettlung der Gesamttgabe in kleine Einzeldosen überhaupt unzweckmässig ist. Die beste Form ist die der Pulver oder Pillen.

Die Pharmacopoe gestattet zum inneren Gebrauche als höchste Einzelgabe 0,15 pro dosi und 0,5 pro die. Im Allgemeinen ist vor den kleinen Dosen (unter 0,03) bei Erwachsenen, wo man damit Hypnose erzielen will, zu warnen, da sie häufig Unruhe und Insomnie erzeugen. Sehr niedrig ist dagegen die Dosis bei Kindern zu stellen, namentlich in den ersten Lebenswochen, wo schon minimale Mengen Morphin oder Opium den Tod herbeiführen können; die Application kalter Umschläge auf den Kopf soll hier die Gefahren zu starker Narkose beschränken. Die obstruierende Wirkung des Opiums zu vermeiden, combinirt man dasselbe mit Kaliumsulfat, Brechweinstein oder selbst Calomel. Ipecacuanha sollte eine excessive Wirkung auf das Hirn hindern; andererseits soll auch die Combination kleiner Dosen Opium mit Castoreum, Asa foetida, Valeriana stärker sedirend als Opium allein wirken (Frerichs). — Zu Lösungen und als Zusatz zu Mixturen sind die Opiumpräparate vorzuziehen; hier und da sind auch Opiumpastillen gebräuchlich.

Die äusserliche Verwendung des Opiums, vorzugsweise zu örtlichen Zwecken üblich, geschieht fast in allen Formen, doch werden hier meist die Präparate bevorzugt.

So gebraucht man Opium zu Zahnpillen (selbst pur), in Klystieren (entweder emulgirt oder mit Haferschleim subigirt, in nicht grösseren Dosen als bei interner Application), Suppositorien und Mastdarpillen (bei Mastdarmkrebs und schmerzhaften Leiden der Urogenitalorgane, entzündeten Hämorrhoiden, 0,1–0,2 mit Seife oder Ol. Cacao), Vaginalkugeln (in derselben Art gemacht), Augenpulvern (mit 10 Th. Calomel oder Zucker), zu Einreibungen (bei schmerzhaften Affectionen des Auges 0,25–0,4 in die Umgegend des Auges mit Speichel eingerieben, nach Jüngken), zu Streupulvern,

Kataplasmen, selbst zu Verbandwässern und Räucherungen. Sogar das Opium-rauchen hat Empfehlung bei Asthma gefunden, wobei man entweder eine Opium-pille mit Tabak rauchen liess oder Cigarettes opiacées (mit Opium ge-tränkte Tabaksblätter) anwendete.

Bei der Verordnung des Opiums wie auch seiner Präparate ist es bei der Angst, welche manche Patienten vor dem Mittel haben, nicht unzweck-mässig, die Nebenbenennungen (Meconium, Laudanum) im Recepte zu gebrauchen. Ist längere Darreichung nothwendig, so kann man der zu befürchtenden Toleranz gegen das Mittel am besten durch periodisches Aussetzen begegnen; auch ist es nicht unzweckmässig, von Zeit zu Zeit statt des Opiums ein anderes Hyp-noticum zu benutzen. Kirchner empfahl das Wechseln mit den verschiedenen Opiumpräparaten in gleicher Absicht.

Das geröstete Opium, sog. Chandu, wie solches in Indien zum Rauchen benutzt wird, hat dieselbe hypnotische Kraft wie das Opium, scheint aber weniger Betäubung und Schwindel nach dem Schlafe, fast gar kein Haut-jucken und geringere Tendenz zu Obstipation zu bedingen (Fronmüller).

### Präparate:

1) **Pulvis Ipecacuanhae opiatu**s, P. I. compositus, Pulvis Doveri, P. alexiterius; **Doversches Pulver**. Opium, Ipecacuanha aa 1 Th., Milchzucker 8 Th. In 10 Th. ist somit 1 Th. Opium enthalten. Dient besonders als Schlaf-pulver zu 0,5—1,0 pro dosi und gilt als schweisstreibend und Obstipation ver-hütend. Das frühere Präparat enthielt statt Milchzucker Kaliumsulfat.

2) **Extractum Opii**, Extr. Opii aquosum s. gummosum, Extr. thebaicum aquosum, Opium depuratum; **Opiumextract**, Mohnsaftextract. Trocknes Extract, dargestellt durch Maceration von 2 Th. Opium mit anfangs 10, später 5 Th. dest. Wasser, von rothbrauner Farbe, in Wasser trübe löslich. Das Ppt., welches nur die in kaltem Wasser löslichen Bestandtheile des Opiums enthält, wird zwar von Orfila u. A. wegen seines relativ grösseren Morphingehaltes als das Opium an Stärke der Wirkung übertreffend angesehen, ist aber nach meinen Erfahrungen demselben gleichwerthig und macht sogar bei manchen Personen viel weniger Uebelkeit als Opium. Es ist deshalb in der Dosis des Opiums zu ver-ordnen (0,005—0,1) und überall statt desselben anzuwenden, wo Opium inner-lich oder äusserlich (z. B. in Collyrien, Injectionen) in wässriger Lösung gereicht werden soll. Natürlich kann man es auch intern in Pulver- oder Pillenform verwenden. Maximalgabe 0,15 pro dosi und 0,5 pro die.

3) **Tinctura Opii simplex**, Tinct. Thebaica s. Meconii s. anodyna sim-plex; **einfache Opiumtinctur**. Macerationstinctur, aus 1 Th. Opium mit aa 5 Th. Spir. dil. und Aq. dest. bereitet, von dunkelrothbrauner Farbe und 0,974—0,978 spec. Gew. In 10 Th. ist das Lösliche von 1 Th. Opium enthalten. Sie ersetzt die mit Spir. dil. und Aq. Cinnam. bereite Tinctura Opii Eckardi und wird als Stypticum zu 5—10, als Hypnoticum zu 10—20 Tr. verordnet. In praxi wird sie indess sowohl zum inneren als zum äusseren Gebrauche meist durch die folgende ersetzt. Mit aa Linimentum saponatum camphoratum bildet sie das Linimentum Opii Ph. Br. Sie dient auch zur Darstellung von Cigarettes opiacées, die man bei Asthma empfahl. Maximalgabe 1,5 pro dosi und 5,0 pro die.

4) **Tinctura Opii crocata**, Laudanum liquidum Sydenhami, Tinct. Meconii crocata, Vinum paregoricum, Vinum Opii aromaticum; **Safranhaltige Opiumtinctur**. Aus 30 Th. gep. Opium, 10 Th. Safran und aa 2 Th. Nelken und Zimmt mit aa 150 Th. Spir. dil. und Wasser bereitet. Von dunkelbraun-gelber, verdünnt rein gelber Farbe, safranähnlichem Geruche, bitterem Ge-schmacke und 0,980—0,984 spec. Gew. 10 Th. enthalten das Lösliche aus 1 Th. Opium, so dass 20 Tr. 0,1 Opium entsprechen. Die früher mit Sherry be-reitete Tinctur ist in Folge des Gerbsäuregehalts der mit ausgezogenen Aromata nicht ganz so reich an Alkaloiden wie die vorige, doch wird dies in praxi dadurch ausgeglichen, dass bei der gewöhnlichen Darreichung in Tropfen jeder einzelne



Tropfen fast doppelt so schwer ausfällt wie von der Tinct. Op. simplex. Innerlich wird die Tinctur als stuhlverstopfendes Mittel zu 2—6 Tropfen, als Hypnoticum zu 10—20 Tropfen, entweder pure oder mit Syrup oder in Mixturen gegeben. Als höchste Einzelgabe gestattet die Phkp. 1,5, als höchste Tagesgabe 5,0. Aeusserlich findet dieselbe häufig für sich oder mit 1—2 Th. Aq. dest. verdünnt in der Augenheilkunde bei scrophulöser Conjunctivitis mit Lichtscheu und Hornhauttrübungen (eingepinselt oder eingeträufelt) mit Nutzen Anwendung. Ausserdem kann sie als Zusatz zu Linimenten, Salben und Einspritzungen dienen. Zum Klystier nimmt man 5—10—20 Tr.

5) **Tinctura Opii benzoica**, Elixir paregoricum, Tr. Meconii benzoica, Tr. Camphorae composita; **Benzoëhaltige Opiumtinctur**, beruhigendes Elixir. Aus aa 1 Th. Opium und Anisöl, 2 Th. Campher und 4 Th. Benzoësäure mit 192 Th. Spir. dil. bereitet, bräunlichgelbe, nach Anisöl und Campher riechende, kräftig aromatisch, süsslich schmeckende, sauer reagirende Tinctur, welche in 100 Th. das Lösliche von  $\frac{1}{2}$  Th. Opium enthält. Innerlich zu 20—60 Tropfen rein oder in einem Syrup, auch mit Aq. Amygdal. amar., besonders bei chronischer Bronchitis und Hustenreiz; bei Kindern zu 5—10 Tropfen.

Aus dem Opium selbst direct dargestellte Präparate waren in früherer Zeit in verhältnissmässig grosser Menge officinell. Dahin gehört die früher sehr beliebte Latwerge aus Opium, Eisenvitriol, Meerzwiebel und verschiedenen Excitantien und Gewürzen, welche unter dem Namen Theriak, Electuarium Theriaca s. theriacale s. opiatum s. aromatico-opiatum, Confectio Opii, Theriaca, Theriaca Andromachi bekannt ist. Das noch in der ersten Ausgabe der deutschen Pharmacopoe officinelle Präparat mit 10 Ingredientien bildet den bescheidenen Rest einer von Neros Leibarzt Andromachus angegebenen Mischung von mehr als 60 Heilstoffen, daher auch der Name Electuarium polypharmacum, welche das ganze Mittelalter hindurch als Universalmedicin im höchsten Ansehen stand und in verschiedenen Städten alljährlich auf dem Rathhause mit grossen Feierlichkeiten bereitet wurde. Auch sonst gab man in älterer Zeit Opium viel in Latwergenform, weshalb die Electuarien geradezu den Namen Opiate erhielten, daneben aber auch in Pillen, z. B. in den sehr complicirten Pilulae de Cynoglosso (mit Hyoscyamus) und den Pilulae anodynae (mit Succ. liquir.). Zum äusserlichen Gebrauche bestimmt schliessen sich hieran die Zahnpillen oder Zahnschmerzpillen, Pilulae odontalgicae, aus Opium, Belladonna, Bertramwurzel, Cajeputöl, mit Wachs und Mandelöl bereitet und zur Application in hohle Zähne bestimmt. Auch ein schmerzlinderndes Deckpflaster, welches auf 20 Th. Pflastermasse 1 Th. Opium enthielt, war unter dem Namen Emplastrum opiatum s. cephalicum, Opium- oder Hauptpflaster, officinell. Von flüssigen Formen war auch ein destillirtes Wasser, Opiumwasser, Aqua Opii, das bisweilen als Constituens für Augenwässer diente, übrigens nur den flüchtigen Riechstoff des Opiums enthält, gebräuchlich. Ausser den oben aufgeführten officinellen Tincturen giebt es noch eine Reihe anderer spirituöser Auszüge, welche jedoch recht wohl entbehrt werden können. Viele übertreffen an Opiumgehalt die Tinct. Opii crocata und simplex. So namentlich die in Grossbritannien und Nordamerika viel benutzten sog. Black drops, Tinctura Opii nigra s. Liquor Opii sedativus Battleyi s. Acetum Opii, mit Essig bereitet, welche übrigens nach den verschiedenen Vorschriften an Stärke sehr variirt, so dass sie bald in 8, bald in 3 Th. das (in Essig) Lösliche von 1 Th. Opium enthält; ferner die Tinctura Opii ammoniata, mit Liq. Ammonii spirituosus bereitet und doppelt so stark wie Tr. Opii simplex, und das in sehr umständlicher Weise durch Fermentiren gewonnene Laudanum de Rousseau s. Tinct. Opii fermentata s. Vinum Opii fermentatione paratum, in Frankreich gebräuchlich, wovon 4 Th. 1 Th. Opium entsprechen. In England u. a. Ländern giebt es auch eine Reihe theils als Arcana verkaufter opiumhaltiger Mixturen, z. B. Godfreys Cordial, welche bei den dort so häufigen Intoxicationen kleiner Kinder, denen sie als Husten- oder Schlafmittel gereicht wurden, eine grosse Rolle spielen. Ausserdem waren früher auch noch verschiedene Präparate des Opiumextracts gebräuchlich; so ein schlafmachender Syrup, Syrupus opiatas, Opiumsyrup, welcher in 1000 Th. Syrupus simplex 1 Th. Opiumextract enthielt und thee-

bis esslöffelweise mehrmals täglich gegeben wurde, ferner eine schmerzlinde-  
rende Salbe, Opiums Salbe, Unguentum opiatum s. Opii und in älteren Zeiten auch  
ein bei schmerzhaften Hämorrhoidalknoten benutztes Unguentum Gallac  
et Opii.

6) **Morphinum hydrochloricum; Morphinhydrochlorat**, salzsaures Morphin,  
chlorwasserstoffsäures Morphin. Dieses Salz,  $C^{17}H^{19}NO^3, HCl + 3OH^2$ , bildet  
weisse, seidenglänzende Nadelbüschel oder Prismen von neutraler Reaction und  
sehr bitterem Geschmacke, die sich in 16—20 Th. kaltem und in weniger als  
1 Th. kochendem Wasser, in 60 Th. kaltem und in 10 Th. kochendem 80 %  
Weingeist, in 19 Th. Glycerin und in 8000 Th. fettem Oel lösen. Es ist das  
beste Morphinsalz, welches zwar keineswegs, wie dies früher Christison be-  
hauptete, völlig von Nebenwirkungen frei ist, aber keinerlei Zersetzung unter-  
liegt und vermöge seiner krystallinischen Beschaffenheit bessere Gewähr der  
Reinheit leistet als z. B. Morphinacetat. Zum inneren Gebrauche wird  
es in Dosen von 0,005—0,03 gegeben. Die Pharmacopoe gestattet als  
höchste Einzelgabe 0,03, als Tagesgabe 0,1, welche Gaben bei acquirirter  
Toleranz oder bei diversen Exaltationszuständen (Tetanus) in praxi nicht  
selten überschritten werden müssen. Bei Kindern sind 0,0005—0,001 als er-  
laubte Dosis zu bezeichnen. Man beginne in Fällen, wo längerer Gebrauch  
vorauszusehen ist, mit einer möglichst niedrigen Gabe, um nicht zu rasch  
zu enormen Dosen emporsteigen zu müssen. Man giebt es in Pulvern (mit  
Zucker oder bei bestehender Tendenz zu Erbrechen mit Brausepulver), in  
Pillen (mit Eibischpulver oder Succ. Liquir. depurat.) oder sehr zweckmässig  
in der Form der Gelatina in lamellis (nach Alméns Vorschrift enthält jedes  
kleine Quadrat 0,015 Morphinum hydrochloricum). Minder zweckmässig sind  
Morphinpastillen. Auch in Form von Lösungen, die man mit Wasser oder  
Zuckersyrup anfertigt, ist das Salz anwendbar. Eine Lösung von salzsaurem  
Morphin in Wasser und Spir. dilutus, welche zu 20 Tropfen gegeben werden  
kann, ist der Liquor Morphiae Hydrochloratis Ph. Br. Eine Solution  
von 1 Th. Morph. hydr. in 100 Th. Wasser und 1900 Th. Syr. Sacch. giebt einen  
Syrupus Morphini, welcher theelöffelweise pur genommen oder beruhigenden  
Mixturen hinzugesetzt werden kann.

Aeusserlich ist die gebräuchlichste Form der Anwendung die subcutane  
Injection. Man benutzt das Salz am zweckmässigsten in einer 5% Lösung in er-  
wärmtem Glycerin und Wasser (vgl. S. 169). Die Dosis schwankt zwischen 0,002 und  
0,02, welche letztere Dosis in der Praxis nicht selten, besonders bei längerem  
Gebrauche, überschritten wird. Vibert empfiehlt bei Anwendung von Morphin-  
injectionen mit kleinen Mengen beginnend so weit zu gehen, bis deutliche Wirkung  
auf die Pupille eintritt. Zur endermatischen Anwendung dürfte die interne Dosis  
am passendsten sein, doch ist man hier nicht selten auf 0,12 und darüber gestiegen.  
Als örtliches Anästheticum bei Neuralgien u. s. w. kann man auch Linimente  
anwenden, wobei das Morphinhydrochlorat wegen seiner Schwerlöslichkeit in  
fetten Oelen schlecht in diesen, am zweckmässigsten in Glycerin (1:20—50)  
verordnet wird (Soubeiran, Debout). Letztere Lösung kann auch bei Kehl-  
kopfleiden örtlich applicirt werden, wo übrigens auch die Insufflation in Pulver-  
form zu 0,004—0,01 mit Zucker, Alaun oder nach Fieber mit 0,06 Zinkoxyd  
statthaft ist. Im Klystier ist ebenfalls die zum inneren Gebrauche dienende  
Gabe zu benutzen, doch giebt man zu dieser Application meist den Opium-  
tincturen den Vorzug. Die englische Phkp. hat auch Morphinzäpfchen,  
Suppositoria Morphiae, officinell, welche 0,03 Morph. hydrochl. enthalten.  
Zu schmerzlindehenden Zwecken empfahl Albers nach Cardigals Vorgange  
bei Dysmenorrhoe auch Vaginalkugeln (mit 0,06 Morph.) in die Scheide  
mehrere Tage vor dem Eintritt der Katamenien einzulegen. Zu Zahnwehtropfen  
ist eine Lösung in Kreosot empfehlenswerth.

Man verbindet das Morphinhydrochlorat nicht selten mit andern Narkotica,  
z. B. bei Neuralgien mit Atropin, als Sedativum mit Chloralhydrat oder  
Blausäure.

Bei der Verordnung des salzsauren Morphins, wie auch der übrigen Mor-  
phinsalze, sind alle die Abscheidung von Morphin oder die Bildung eines unlös-  
lichen Präcipitates bewirkenden Substanzen zu meiden. Dahin gehören die Salz-

bilder, Alkalien und kohlensauen Alkalien, alkalische Erden und Metallsalze; bei einzelnen Morphinsalzen, z. B. Morphinacetat, auch Gerbsäure.

7) **Morphinum sulfuricum; Morphinsulfat**, schwefelsaures Morphin. Das Morphinsulfat bildet farblose, seideglänzende, büschlig vereinigte, leichte Nadeln, die bei 100° 12% Wasser verlieren, sich in 14,5 Th. Wasser und auch mit Leichtigkeit in Weingeist mit neutraler Reaction lösen. Wegen seiner Leichtlöslichkeit eignet es sich zu Subcutaninjectionen und zur Application in den Kehlkopf und ist im Uebrigen wie Morph. hydrochl. zu benutzen. Es ist in Nordamerika das gebräuchlichste Morphinsalz, ist aber auch in einzelnen Theilen Deutschlands (Baden) sehr beliebt. Morphinsulfat empfiehlt sich besonders als das haltbarste Morphinsalz für länger vorrätig zu haltende Lösungen zur Subcutaninjection. Man löst dasselbe dazu in 15 Th. durch Kohle gereinigtem destillirtem Wasser in der Siedhitze und bewahrt die filtrirte Lösung in kleinen wohlverschlossenen Glasgefäßen auf (Hamburg). Die Maximaldosis entspricht der des Morphinum hydrochloricum.

Das früher officinelle Morphinacetat oder essigsäure Morphin, *Morphinum aceticum*, ist ebenso wie die daraus bereiteten, früher officinellen Morphinpastillen oder Schlafpastillen, *Trochisci Morphinici acetic*, aus der Pharmakopoe entfernt, weil es bei längerer Aufbewahrung sich zersetzt, indem es Essigsäure verliert und sich theilweise in Morphin verwandelt, welches sich sowohl aus wässriger als aus weingeistätherischer Lösung absetzt und als Bodensatz in Tropfenmixturen leicht Gefahren bedingen kann. Diese Zersetzung geht auch in den Trochiscen, welche 0,005 Morphinacetat enthielten und zu 1—2 Stück bei Erwachsenen als schlafmachendes und hustenreizendes Mittel verordnet wurden, vor sich (Hamburg). Das Morphinacetat ist auch das in der *Solutio Morphi* s. *Tinctura sedativa* von Magendie, die noch jetzt in Frankreich und in den Vereinigten Staaten viel benutzt wird, enthaltene Morphinsalz. Dieselbe enthält 0,1 in 3,0 Aq. dest. mit Hilfe von etwas Essigsäure und Spir. dil. gelöst. Da das in Deutschland als Morphinsalz früher ausschließlich gebrauchte Acetat noch immer häufig verschrieben wird, verordnet die Pharmakopoe, bei dessen Vorkommen in Recepten Morphinhydrochlorat zu dispensiren.

Sonstige Morphinsalze, z. B. das als bei schmerzhaften Leiden länger tolerirt bezeichnete und wegen seiner Leichtlöslichkeit für hypodermatische Injectionen empfohlene *Morphium meconicum* (Squire), die aus gleichen Rück-sichten empfohlene *Morphium hydroiodicum* (Bouchardat), *M. stibicum* (Falciani) und *M. citricum* (Fronmüller), so wie das von Tanchon gegen schmerzhaftes Erektionen gebrauchte *M. camphoricum* sind ohne Bedeutung, können aber ganz wie Morphinhydrochlorat verordnet werden. Das zu 0,01 bis 0,0015 pro die bei Gastralgie, Kehlkopf- und Bronchialleiden, Neurosen der Lungenerven und äusserlich zu schmerzstillenden Waschungen von Evans, Bewley und van den Corput empfohlene *Morphinum hydrocyanicum* ist als leicht zersetzliches Salz nicht zweckmässig.

Früher war auch das reine Alkaloid unter der Bezeichnung *Morphinum* s. *Morphium* s. *Morphina* officinell. Dass dasselbe ebenso wirksam wie seine Salze ist, haben Schroff und Fronmüller experimentell gezeigt. Gegen Anwendung desselben in Pulvern und Pillen, wo es nicht auf sehr rasche Resorption ankommt, ist nichts zu erinnern, dagegen eignet es sich seiner Schwerlöslichkeit wegen nicht für wässrige Solutionen, höchstens in Säuren oder Chloroform. So wurde Lösung von Morphin in Oelsäure zu schmerzlindernden Einreibungen empfohlen, ebenso eine Solution in Chloroform, welche annähernd in 40 Tr. 0,1 Morphin enthält, als *locales Anæstheticum* für den Larynx (Türk) oder bei cariösem Zahnschmerz, auch innerlich zu 20—30 Tr. in Camillenthee bei Cardialgie und Koliken (Bernatzik).

8) **Codeinum, Codein**. — Dieses einzige Nebenalkaloid des Opiums, welches in die Phkp. Aufnahme gefunden hat, ist (vorzugsweise in Frankreich) als Substitut des Morphins, und zwar sowohl als Hypnoticum (Magendie, Robiquet, Berthé, Aran und Krebel), wie auch als örtlich schmerzlinderndes Mittel bei Cardialgien und Koliken (Barbier, Berthé, Miranda,



Krebel, Rieken) und als Sedativum bei Neuralgien (Magendie, Des Brulais, Krebel, Marcé), ferner besonders als Sedativum bei Krankheiten der Respirationsorgane, so bei Bronchitis, Pneumonie, Hustenreiz (Vigla und Aran), sowie bei Tussis convulsiva (Guibert), endlich sogar bei massenhaftem Auswurf und Diarrhöen zur Beschränkung der Hypersecretion (Vigla und Aran) und gegen Ohrentönen (Woakes) benutzt.

Das Codein wird intern zu 0,015–0,05 in Pulvern, Pillen oder in Syrup verordnet. Die Phkp. gestattet als höchste Einzelgabe 0,05, als höchste Tagesgabe 0,2. Diese Dosen entsprechen jedoch den Angaben von Trousseau und Frommüller nicht, indem Ersterer 0,3 Codein nicht stärker wirkend als 0,012 Morphin fand, und nach Frommüller zur Erzeugung von Schlaf vom Codein die 6–8fache Dose des Morphins nöthig ist. Nach Robiquet bringen freilich 0,02–0,03 schon Schlaf hervor, nach Reissner erfolgt auch bei Geisteskranken nach 0,06–0,12 subcutan Hypnose. Trotz der Empfehlungen des Mittels durch Bouchut wird das nicht ungefährliche Mittel in der Kinderpraxis stets nur mit Vorsicht zu verwenden sein und am besten durch Narcein ersetzt. Schon 0,01 kann bei Kindern gefährliche Narkose bedingen (Robiquet). Der in Frankreich gebräuchliche Sirop de Codéine ist insofern unzweckmässig, als in den Pariser Pharmacien unter diesem Namen Syrupe von ganz verschiedener Stärke verkauft werden, so dass namentlich für das jugendliche Lebensalter durch Substitution des einen für den andern Gefahren erwachsen können. Von Magendie sind auch Codeinum hydrochloricum und Codeinum nitricum, von Frommüller Codeinum sulfuricum versucht. Diese Salze eignen sich auch zur Subcutaninjection, doch scheinen die hypnotischen Effecte bei innerlicher Darreichung constanter als bei Einspritzung unter die Haut zu sein (Frommüller).

Das Narcein ist in Frankreich (Debout, Béhier, Laborde, Bouchardat, Liné und Delpech, Rabuteau) und auch in Deutschland (Eulenburg, Erlenmeyer, Oetinger, Sichtung) nach Art des Morphins nicht ohne Erfolg benutzt, doch lassen die vielen negativen Erfahrungen der verschiedensten Therapeuten (Da Costa, Frommüller, Schroff), die z. Th. mit sehr grossen Dosen, z. B. 1,2 intern, experimentirten, darüber keinen Zweifel, dass die hypnotische Wirkung des Narceins weit weniger constant als die des Morphins ist. Andererseits ist wegen der geringen Nebenerscheinungen beim Narcein der Versuch des Mittels bei Schwerkranken oder bei solchen Personen, welche Morphin oder Opiumpräparate nicht ohne Nebenerscheinungen gebrauchen können, wohl gerechtfertigt, zumal in solchen Fällen, wo gleichzeitig obstipirende Wirkung des Mittels oder Beschwichtigung bestehenden Hustenreizes erwünscht ist, wonach Narcein als Hypnoticum bei Phthisikern besonders indicirt zu sein scheint, wie es auch bei einfacher oder symptomatischer Insomnie bei Frauen (Brown-Séguard) und Kindern (Laborde) dem Morphin vorzuziehen ist. Weitere, theils palliative, theils radicale Erfolge des Narceins hat man bei Reizungszuständen des Respirationstractus, z. B. Keuchhusten (Laborde), Bronchitis acuta (Liné), Asthma (Levi) und bei schmerzhaften Affectionen, insbesondere Neuralgien (Behier, Eulenburg u. A.), ferner bei hysterischem Krampf und spastischer Contractur (Eulenburg) erzielt. Als Sedativum bei psychischen Affectionen ist es mitunter bei acuter Tobsucht, besonders bei maniakalischen Anfällen der Epileptiker, auch bei motorischen Exacerbationen Schwachsinniger von Nutzen, nicht aber bei Melancholie oder typischen Formen. Rabuteau empfahl Narcein zur Verlängerung der Chloroformnarkose. Der Anwendung des Alkaloids steht im Allgemeinen der theuere Preis desselben, ausserdem der Subcutaninjection die Schwerlöslichkeit entgegen. Das Narcein wird innerlich zu 0,06–0,2 mehrmals täglich und zu 0,03 subcutan als Hypnoticum in Pulverform oder in angesäuerter Lösung gegeben. Laborde empfahl bei Keuchhusten Lösung von 0,02 Narcein mit einigen Tropfen Essigsäure in aa 125,0 Infusum Coffeae und Syr. simplex zu täglich mehrmals einen Kinderlöffel. Zur Subcutaninjection dient am zweckmässigsten eine Lösung von 0,3 Narcein in 4,5 erwärmtem Glycerin, mit 1,0 Salzsäure und Aq. dest. q. s. ad 6,0 (Harley).

Die Anwendung des **Narcotins** als Medicament ist verschiedentlich versucht, aber wieder aufgegeben. Als Hypnoticum, wozu es neuerdings Fron-



- 8) R  
*Morphini sulfurici* 0,1 (dgm. 1)  
*Asae foetidae* 2,0  
*F. pilul.* No. 20. *Consp.* D. S. 1—4  
 Pillen zu nehmen. (Bei nervöser  
 Schlaflosigkeit. Green.)
- 
- 9) R  
*Morphini hydrochlorici* 0,1 (dgm. 1)  
*Aq. Amygdalarum amararum* 10,0  
*M. D. S.* Abends 20 Tropfen. (Schlaf-  
 mittel bei Insomnie durch Hustenreiz,  
 im Nothfalle auf 30 Tropfen zu stei-  
 gern. 20 Tropfen enthalten 0,01  
 Morphinhydrochlorat.)
- 
- 10) R  
*Morphini* 0,2  
*ope Acidi acetici* gtt. 3  
*leni calore sol.*  
*Spir. vini* 4,0  
*Chloroformii* 16,0  
*M. D. S.* Auf Watte 1 Tropfen in  
 den hohlen Zahn zu bringen. (Ber-  
 natzik.)
- 
- 11) R  
*Morphini hydrochlorici* 0,1 (dgm. 1)  
*Tinct. amarae*  
 — *Quassiae* āā 50,0  
*M. D. S.* Mehrmals täglich 1 Thee-  
 löffel voll. (Bei Insomnie und Dys-  
 pepsie von Trinkern. Nach Graves.)
- 
- 12) R  
*Morphini hydrochlorici* 0,05  
*in Aquae dest.* 2,0 *soluti*  
*Syrupi emulsivi* 125,0  
*M. D. S.* Abends einen Esslöffel voll.  
 (Schlafsyrop.)
- 
- 13) R  
*Tincturae Opii benzoicae*  
*Aquae Foeniculi*  
*Syrupi Althaeae* āā 25,0  
*M. D. S.* 2—3ständl. 1 Theelöffel. (Bei  
 Hustenreiz. Ziemssen.)
- 
- 14) R  
*Extracti Opii* 0,2 (dgm. 2)  
*Elixirii e succo Liquiritiae* 50,0  
*Aq. Foeniculi* 20,0
- 
- M. D. S.* 3mal täglich 1 Theelöffel.  
 (Bei Husten. Ziemssen.)
- 
- 15) R  
*Tinct. Opii simpl.* 1,0—2,0  
*Acidi hydrochlorici* 2,0  
*Aq. dest.* 175,0  
*Mucilaginis Gi. Arab.*  
*Syrupi simpl.* āā 10,0  
*M. D. S.* Zweistündlich 1 Esslöffel.  
 (Bei Durchfällen. Ziemssen.)
- 
- 16) R  
*Extracti Opii* 0,5  
*Aq. Amygdal. amarar. dilutae*  
 25,0  
*M. D. S.* Zum Einträufeln ins Auge. (Bei  
 Blepharospasmus und chronischer  
 Augenentzündung.)
- 
- 17) R  
*Tincturae Opii crocatae*  
*Aq. Sambuci* āā 5,0  
*M. D. S.* 2mal täglich zum Einstreichen  
 in die Augenlidspalte. (Bei Ophthal-  
 mia neonatorum. Niemeyer.)
- 
- 18) R  
*Tinct. Opii simpl.*  
*Spir. Aether. chlorati* āā 10,0  
*Balsami Peruviani* 2,5  
*M. D. S.* Umgeschüttelt zum Einreiben.  
 (Bei Pernionen. Henschel.)
- 
- 19) R  
*Tinct. Opii crocatae*  
*Olei Menth. pip.*  
*Spiritus aetherei* āā 1,0  
*M. D. S.* Stark umgeschüttelt auf  
 Baumwolle in den hohlen Zahn zu  
 bringen. (Doberaner Zah-  
 n-tropfen.)
- 
- 20) R  
*Opii* 0,8  
*Extracti Hyoscyami* 0,4  
*Ungt. Hydrargyri cinerei* 5,0  
*M. f. ungt. D. S.* In die Umgegend des  
 Auges einzureiben. (Bei Blepharo-  
 spasmus. A. v. Graefe.)
- 
- Verschiedene andere Vorschriften für  
 Morphin- und Opiumpräparate finden  
 sich Bd. I. S. 135, 136, 167, 168 und  
 an anderen Stellen.



**Fructus Papaveris immaturi, Capita vel Capsulae Papaveris: unreife Mohnköpfe, Mohnkapseln.**

Diese zunächst dem Opium sich anschliessende Droge stellt die etwa walnussgrossen, unreifen Früchte von *Papaver somniferum* L. dar, welche von dem bei uns cultivirten Gartenmohn entnommen und mit den Samen getrocknet werden. Sie sind grünlichgrau, kugelig oder eiförmig, 3—3,5 Cm. lang und ohne die Samen 3,0—4,0 schwer, oben von der grossen, flachen, in tiefe Buchten ausgeschnittenen Narbenseibe gekrönt, am Grunde wulstig in den Stiel übergehend, und im Innern durch zahlreiche, gegen das Centrum vorspringende, wandständige Samenträger in viele unechte Fächer abgetheilt. Sie schmecken widerlich bitter; der eigenthümliche narkotische Geruch der frischen Mohnkapseln verliert sich beim Trocknen. Die jetzt officinellen unreifen Mohnkapseln gelten für wirksamer als die früher officinellen reifen Capita Papaveris, welche nach Meurein und Aubergier ärmer an Morphin sind. Ueberhaupt aber scheint der Gehalt an Opiumbasen auch in den getrockneten unreifen Mohnkapseln sehr zu variiren. In reifen Mohnkapseln fand Hesse Rhoeadin, auch scheinen darin Narkotin (Deschamps), Narcein (Winckler), Codein (Graves) und eine eigenthümliche, als *Papaverosin* bezeichnete Base (Deschamps) zu existiren. Morphin kann in reifen Früchten vollständig fehlen (Buchner, Deschamps), obschon dieselben eine stark betäubende Wirkung besitzen.

Bei ihrem variablen Gehalte an wirksamen Principien ist die Droge ein zum inneren Gebrauche sich wenig eignendes Narkoticum, das seine Hauptverwendung in Abkochung missbräuchlich in verschiedenen Ländern zur Beschwichtigung unruhiger kleiner Kinder in der Laienpraxis findet und oft genug das frühzeitige Absterben derselben verursacht. Aeusserlich benutzt man sie hie und da mit Leinsamen zu schmerzlindernden Breiumschlägen oder in Abkochung (1 : 5—10) als Fotus.

Die Mohnköpfe dienen zur Darstellung des officinellen **Syrupus Papaveris s. capitum Papaveris s. Diacodion** (*διακωδιόν*, daher nicht Diacodii), des **Mohnsaftes** oder Beruhigungssaftes, richtiger Mohnkopfsyrup genannt. Es ist dies eine Lösung von 65 Th. Zucker in 35 Th. einer filtrirten Colatur, welche durch Digeriren von 10 Th. zerschnittener Mohnköpfe (nach Durchfeuchtung mit 5 Th. Spiritus) mit 50 Th. Wasser während 1 Std. im Dampfbade erhalten wird. Man giebt das schon von Mesue als Sedativum bei Katarrhen und Husten empfohlene Mittel thee- bis esslöffelweise. Jedenfalls ist ein aus Opiumextract oder Opiumtinctur mit Syrupus simplex bereiteter Syrup rationeller. Bei der Verwendung der Mohnkapseln in geschnittener Form sind die Samen zu beseitigen.

**Anhang:** Flores Rhoeados, Petala Rhoeados, Klatschrosen, Klatschrosenblätter. An die Mohnköpfe schliessen sich die früher officinellen, getrocknet schmutziggpurpurrothen, am Grunde mit einem schwarzen Flecke versehenen Blumenblätter von *Papaver Rhoas*, dem bei uns auf Aeckern ausserordentlich häufigen Klatschmohn, an. Im frischen Zustande riechen sie stark narkotisch, doch verliert sich dieser Geruch beim Trocknen; der Geschmack ist schleimig und etwas bitterlich. Die Klatschrose enthält nach den Untersuchungen von Hesse ein auch im Opium vorhandenes und bei demselben erwähntes Alkaloid, das Rhoeadin, welches in Wasser und Alkalien löslich ist, aber keine narkotische Wirkung besitzt. Wahrscheinlich sind indess darin noch andere Opiumalkaloide vorhanden, da grössere Mengen der Samenkapseln und Blumen wiederholt zu Vergiftungen bei Kindern geführt haben, die das Gepräge der narkotischen Intoxication mit vorausgehendem rauschähnlichem Zustande tragen (Palm). Auch bei Thieren sind dadurch Vergiftungen beobachtet (Weber). In den Flores Rhoeados konnten Beetz und Ludwig kein Morphin constataren, während Chevallier Spuren davon gefunden haben will. Der Farbstoff derselben, welcher vom Wasser reichlich aufgenommen wird, soll nach L. Meier aus zwei Säuren (Klatschrosensäure und Rhoeadinsäure) bestehen. Die Klatschrosen dienen ausschliesslich als Decorationsmittel für Species und zur Darstellung des früher officinellen, durch intensiv rothe Farbe ausgezeichneten

Syrupus Rhoeados s. Papaveris rubri, Klatschrosensaft, Klatschrosensyrup. Derselbe wird durch Maceration frischer Klatschrosen mit kochendem Wasser und Auflösen von 36 Theilen Zucker in 20 Theilen Colatur erhalten und dient hier und da noch als färbender Zusatz zu Mixturen, wozu er sich um so mehr eignet, als die rothe Farbe durch Säuren nicht verändert wird.

**Lactucarium, Lactucarium Germanicum; Giftlattichsaft, Lactucarium.**

Zu den rein cerebralen und hypnotischen Mitteln gehört das von Coxe in Philadelphia (1797) in den Arzneischatz eingeführte **Lactucarium**, der nach Art des Opiums (daher der Name Lettuce opium) durch Einschneiden in die Stengel und Abschneiden der Spitzen des Giftlattichs, *Lactuca virosa* L., gewonnene und spontan eingetrocknete Milchsafte.

Aus dem Giftlattich, einer im westlichen, mittleren und südlichen Europa auf steinigem Boden vorkommenden milchsafthührenden Composite mit 1—2 Mr. hohen, glatten, dünnen Stielen, gelben Blumen und fast wagrecht von dem Stiele abstehenden, ganzrandigen oder buchtig gezähnten Blättern, wurde früher auch ein Saftextract gewonnen, welches unter dem Namen Giftlattichextract, *Extractum Lactucæ virosæ*, bei uns officinell war. Zur Bereitung desselben diente die mit den blühenden Zweigen (im August und September) gesammelte zweijährige Pflanze. Statt des besonders bei Zell an der Mosel gewonnenen *Lactucarium Germanicum* dient in anderen Ländern auch der getrocknete Milchsafte von anderen Species der Gattung *Lactuca*, so in Frankreich von *L. altissima* (von Aubergier in Clermont Ferrand gebaut). Das aus unserem als Kopfsalat oder Kopflattich bezeichneten Culturgewächse, *L. sativa* L., welches viel weniger Milchsafte als *L. virosa* enthält, bereitete, meist als *Thridax* bezeichnete sog. *Lactucarium Gallicum* steht dem *Extractum Lactucæ virosæ* weit näher. Früher war englisches oder schottisches *Lactucarium*, welches jetzt ausschliesslich von *L. virosa* stammt, während früher *L. sativa* vorzugsweise zu dessen Bereitung diente, sehr geschätzt. Der Giftlattichsaft bildet gelbbraune, innen weissliche, unregelmässige Brocken, welche schwer zerreiblich, von eigenthümlichem an Opium erinnerndem Geruche und bitterem Geschmacke sind, mit Wasser erst unter Zusatz von Gummi eine Emulsion geben und sich weder in Wasser noch in Weingeist vollkommen lösen.

Als das hauptsächlichste active Princip des *Lactucariums* scheint ein eigenthümlicher als *Lactucin* bezeichneter Bitterstoff angesehen werden zu müssen.

Von den verschiedenen von Kromayer im *Lactucarium* nachgewiesenen eigenthümlichen Stoffen kann nur dem in perlgänzenden weissen Schuppen oder rhombischen Tafeln krystallisirenden *Lactucin*, welches sich ziemlich gut in heissem Wasser und leicht in Alkohol löst, mit Sicherheit Activität zugeschrieben werden, während die übrigen *Lactucastoffe* (*Lactucopikrin*, *Lactucocerin* oder *Lactuon*, *Lactucasäure*) bezüglich ihres Verhaltens zum Organismus nicht untersucht sind. Nach Frommüller repräsentirt das *Lactucin* nicht die vollständige hypnotische Kraft des *Lactucariums*.

Die im Alterthume sehr hoch geschätzten hypnotischen Wirkungen des Giftlattichs können zwar nicht in Zweifel gezogen werden, sind jedoch sehr variabel, was vielleicht im Zusammenhange mit dem wechselnden Gehalte an *Lactucin*, der nach Kromayer manchmal im deutschen *Lactucarium* zwischen 0,15—0,3 % schwankt, steht. Ob durch Substitution von *Lactuca sativa* für *L. virosa* ein minder wirksames Präparat erzeugt wird, ist nicht sicher dargelegt, doch sprechen die Misserfolge, welche z. B. Garrod mit Dosen von 4,0 3—4 mal täglich von englischem *Lactucarium* hatte, für eine relativere Unwirksamkeit des

aus Gartenlattich bereiteten Lactucariums. Verhältnissmässig gute Erfolge zeigt die von Fronmüller ausgeführte Versuchsreihe, welche das englische und deutsche Lactucarium als in ihrer Wirksamkeit fast gleichstehend erscheinen lassen, während das französische (wahrscheinlich das fälschlich als Lactucarium bezeichnete Extract) beiden Sorten erheblich nachsteht. Man hat dem Lactucarium vor dem Opium nachgerühmt, dass es nicht retardirend auf den Stuhlgang wirke, doch trat in einigen Versuchen von Fronmüller nach Lactucin Obstipation ein. Ein gewisser Vorzug liegt darin, dass selbst grosse Mengen ohne intensive Nebenerscheinungen tolerirt werden, doch kamen in Fronmüllers Versuchen nach sehr hohen Gaben (4,0 englisches und 2,0 deutsches Lactucarium) mehrmals schwere Träume, Ohrensausen, Schwindel, Kopfschmerz in der Nacht und am folgenden Morgen, in den meisten Fällen auch Mydriasis und verminderte Diurese, constant Schweiss vor.

Die Dosis des Lactucarium als Hypnoticum beträgt 0,5—2,0. Die maximale Einzelgabe (0,3) und die maximale Tagesgabe (1,0) liegen unterhalb der Grenzen, innerhalb deren Fronmüller überhaupt hypnotische oder sedative Effecte eintreten sah.

Als Formen zu innerlicher Anwendung empfehlen sich Pulver und Pillen; minder zweckmässig sind Lösungen oder Emulsionen. Aeusserlich hat man Lactucarium bei erethischen katarrhalischen Augenentzündungen zu 0,2—0,3 auf 25,0 angewendet. Das früher officinelle Extractum Lactucæ virosæ wird von Einzelnen für stärker, von Anderen nur für halb so stark wie das Lactucarium gehalten. Lactucin kommt therapeutisch kaum in Betracht und ist auch insofern ein wenig empfehlenswerthes Medicament, als im Handel diverse Sorten sich finden, von denen das krystallisirte Lactucin von Ludwig und Kromayer als Hypnoticum zu 0,1—0,3 gereicht werden muss (Fronmüller). Das von Fronmüller geprüfte amorphe Lactucin von Merck steht dem krystallisirten Lactucin in seiner Wirksamkeit erheblich nach.

Die früher dem Lactucarium neben der hypnotischen Action zugeschriebenen Wirkungen, wie Herabsetzung der Frequenz und Stärke des Pulses (Schroff), sowie der Körpertemperatur (François), welche zur Anwendung desselben bei entzündlichen Affectionen (Rothamel, Hueter) führte, und die directe Verminderung der Sensibilität (Fischer), welche den Gebrauch bei Neuralgien, gichtischen und rheumatischen Affectionen indiciren könnte, verdienen Nachprüfung. Nach Tierversuchen von Skworzoff (1876) bewirkt Extractum Lactucæ subcutan und in die Venen injicirt Herabsetzung der Willkür- und Reflexbewegung, anfangs Beschleunigung, später Verringerung der Herzaction und Athmung, Sinken des Blutdrucks und Tod durch Herzlähmung. Duncan, welcher zuerst das Lactucarium in Aufnahme brachte (1816), empfahl es besonders gegen Hustenreiz und in Phthisis; in Frankreich gebraucht man es vorzugsweise als Antiasthmaticum.

#### **Herba Cannabis Indicae, Summitates Cannabis; Indischer Hanf.**

Die Droge bildet die getrockneten, während der Blüthe oder der beginnenden Fructification im Norden Indiens gesammelten Zweigspitzen der weiblichen Pflanzen von *Cannabis sativa* L., oder die davon abgestreiften warzig-rauhhaarigen Blätter. Die Hanfpflanze, welche ursprünglich in West- und Centralasien wild wächst und in verschiedenen Ländern der gemässigten und heissen Zone cultivirt wird, entwickelt in ihrem Vaterlande und in wärmeren Klimaten überhaupt ein stark narkotisches Princip. In ihrer Heimath zeigt sie Abweichungen im Habitus, welche jedoch nicht berechtigigen, eine besondere Species *Cannabis Indica* Lam. zu unterscheiden, da die Samen der in tropischen Ländern gewachsenen Varietät beim Aussäen in kalten Ländern Pflanzen mit den Eigenschaften des bei uns cultivirten Hanfes liefern. In geringerem Grade scheint auch bei uns der Hanf einen betäubend wirkenden Stoff zu produciren, doch schwitzt nur die tropische Hanfpflanze, und zwar vorzugsweise die weibliche Pflanze, in reichlicher Menge Harz aus, in welchem das active Princip des



Hanfes steckt. Selbst in einzelnen Gegenden Indiens soll das dort als Churus oder Tschers bezeichnete und als Berausungsmittel gebrauchte Harz nicht gewonnen werden können (Jameson). Das Kraut des Indischen Hanfes kommt in zwei Formen im Handel vor, welche als Bhang (Siddhi oder Salz, Haschisch) und Ganja (Gunja, Guaza) unterschieden werden. Die letztere Sorte, welche in den Gebirgsländern Nordindiens vorzugsweise gewonnen zu werden scheint, wird als kräftiger geschätzt und entspricht der officiellen Droge. Sie besteht meist aus den von den gröberen Blättern befreiten Blüthenzweigen, welche mit einer harzigen Masse dicht bedeckt sind, in welcher die Deckblätter und Blüthen oder halbreifen Früchte sich befinden. Guter Indischer Hanf muss mehr grün als braun aussehen, nur wenig holzige Stengel und Handfrüchte einschliessen, unter Vergrösserung zahlreiche grosse Oeldrüsen zeigen und kräftig und eigenthümlich aromatisch riechen.

Ueber das wirksame Princip des Indischen Hanfes sind wir in chemischer Hinsicht noch nicht völlig aufgeklärt. Man betrachtete früher allgemein das von T. und H. Smith zuerst im reinen Zustande dargestellte braune amorphe Harz (Cannabin oder Haschischin), welches unter  $50^{\circ}$  schmilzt und in Alkalien nicht löslich ist, indem dasselbe schon zu 0,04 narkotisch wirkt und zu 0,06 starke Berausung bedingt, als actives Princip des Indischen Hanfs. Martius isolirte daraus einen bitterschmeckenden Stoff, der mit Salpetersäure ein krystallinisches Product (Oxycannabin) liefert. Ausserdem findet sich darin ein von Personne dargestelltes ätherisches Oel, das aus einem flüssigen, bei  $235-240^{\circ}$  siedenden Kohlenwasserstoffe, Cannaben,  $C^{18}H^{20}$ , und einem krystallisirenden Bestandtheile, dem Cannabenwasserstoffe,  $C^{18}H^{22}$ , bestehen soll. Der Dampf des Cannabens soll hochgradig erregend und später depressirend wirken und dürfte somit für die Wirkung nicht indifferent sein. Nach Lefort und Martius soll der Indische Hanf ein sauerstoffhaltiges, aromatisches, aber physiologisch wenig wirksames ätherisches Oel enthalten, während Bohligh aus frischem, eben verblühtem Hanfkraute ein der Wirkung nach dem Cannaben verwandtes Product erhielt. Fronmüller fand ätherisches Oel aus Indischem Hanf bei Subcutanapplication stark entzündungserregend. Preobraschensky will aus Haschisch Nicotin isolirt haben, was bei dem Zumengen von Tabaksblättern zu Indischem Hanf in einzelnen Gegenden recht wohl möglich ist; doch ist sicher Nicotin an der erregenden Wirkung der Droge unschuldig. Dagegen scheint allerdings ein flüchtiges Alkaloid (Cannabinin) daraus dargestellt werden zu können (E. Siebold und Broadbury). Merak hat die Verbindung des activen Princips mit Gerbsäure als Cannabinum tannicum in den Handel gebracht, welches nach Fronmüller zu 0,15—0,4 als Hypnoticum vorzüglich wirkt, ohne Obstipation zu bedingen, und selbst zu 1,0—1,5 tolerirt wird.

Der Indische Hanf bildet bekanntlich in ähnlicher Weise wie das Opium ein im Orient bei den Arabern und Hindus sehr beliebtes berauschendes Genussmittel, welches den Namen Haschisch (d. h. Kraut) führt. Dasselbe kommt in verschiedenen Formen vor, theils fest, theils in Latrogenform (sog. Majoon) oder butterartig, theils flüssig (Fröhlichkeitstinctur, Chazrak). Einzelne Formen dienen auch zum Rauchen, z. B. das sog. Esrar (d. h. Geheimniss). In allen diesen Haschischsorten sind die Blüthenspitzen oder die Blätter des Indischen Hanfes mit aromatischen Stoffen, mitunter auch mit Reizmitteln, wie Campher, Moschus, Canthariden gemengt, und nach der Masse dieser Beimengungen ist selbstverständlich die Stärke der einzelnen Präparate verschieden. Schon 4—5 Züge des Rauches von Gunjah sollen zur Hervorrufung von Berausung dienen, während vom Bhang die zehnfache Menge nöthig sein soll. Die Angabe, dass 8,0—12,0 Haschisch einen Menschen zu tödten im Stande sind und dass 0,5 schon heftige Erscheinungen bedingen können, bezieht sich wohl auf die stärksten Haschischarten. Der fortgesetzte Gebrauch von Haschisch scheint noch schädlicher als der Opiumgenuss zu sein und namentlich Veranlassung zu psychischen Störungen geben zu können. Nach Wise verdankt  $\frac{1}{3}$  der Maniaci Bengalens sein Leiden dem Haschischgenusse, und in dem von Mehemed Ali Bey dirigirten Irrenhause Moriston zu Kairo sind sämtliche Blödsinnige Haschischraucher, ein Umstand, welcher zum Verbote der Hanfcultur in Aegypten führte. Grössere Dosen von Haschisch verursachen nicht selten Zustände acuter Vergiftung, welche unter der Form mehrtägiger Katalepsie mit völlig

aufgehobenem Bewusstsein, Anästhesie und erloschener Reflexaction oder als maniakalische Anfälle und Delirien sich darstellt.

Die Wirkung des Hanfes und seiner Präparate ist vorzugsweise auf das Gehirn gerichtet und betrifft unter den Thätigkeiten desselben ganz besonders das Vorstellungsvermögen, welches manchmal in eigenthümlicher Weise alienirt wird. Die Symptome der Wirkung beim Menschen gestalten sich in der mannigfachsten Weise je nach dem Temperamente und der psychischen Stimmung der einzelnen Persönlichkeiten. Bei der Wirkung auf das Gehirn ist die Erregung in der Regel weit ausgesprochener als beim Opium, doch kommen auch depressive Formen der Hanfberauschung vor. Eigenthümlich für die Wirkung sind die nach dem Hanf vorkommenden Hallucinationen und die Fortdauer des Bewusstseins während der ganzen Dauer des Rausches. Schroff, welcher sowohl mit ägyptischem Haschisch als mit einer Abkochung der Herba Cannabis an sich und mehreren Schülern Versuche anstellte, giebt als Unterschiede des Haschischrausches vom Opiumrausche die heitere, oft lachlustige Stimmung und die Steigerung des Triebes zur Aeusserung der Muskularkraft an, vindicirt aber gewissen Haschischarten eine besondere deprimirende Action, welche sich in trüber Stimmung und melancholischen Illusionen documentirt. Den Grund dafür sucht er in den oben erwähnten Beimengungen (Opium u. a.). Uebrigens kann dasselbe Haschisch bei einer und derselben Person bald lärmende Fröhlichkeit, bald gedrückte psychische Stimmung erzeugen, wie ich dies aus eigener Erfahrung weiss. Das dem Haschisch als eigenthümlich zugeschriebene Phänomen, dass dadurch die Vorstellung von Raum und Zeit verwischt werde, kommt allerdings manchmal in exquisiter Weise vor (H. C. Wood). Ebenso finden sich auch Perioden der Verzückerung, in welchen der Zusammenhang zwischen der Welt und den Patienten gewissermaassen abgeschnitten erscheint und wilde Träume und Ideen ohne Zusammenhang einander jagen. Wollüstige Aufregung, wie sie bei Orientalen stets durch Haschisch hervorgerufen werden soll, ist weder von Wood noch von irgend einem europäischen Experimentator constatirt (Judée, De Luca, Schroff). Die Hallucinationen betreffen in der Regel sowohl das Gesicht als das Gehör (Farbensehen, Ohrensausen), seltener den Geruch (Judée). In manchen Fällen wechselt im Haschischrausche grösste Traurigkeit mit extremer Lustigkeit, häufig von Steigerung geläufiger Ideen begleitet, die sich mit grosser Rapidität folgen, nicht selten auch unter dem Einflusse gewisser Melodien, welche der Berauschte entweder selbst singt oder singen hört (Naquet). Eigenthümlich ist auch das nicht seltene Vorkommen der Hallucination, dass der Berauschte reite, jage, fahre, schwimme, fliege oder kein Gewicht habe (Naquet). Als Folge des Haschisch in kleinen Dosen constatirte Schroff anfangs Sinken der Pulsfrequenz, später ein Erheben derselben über die Norm und mehrfachen Wechsel von Sinken und Steigen, constant Pupillenerweiterung und Fernsichtigkeit, bisweilen Undeutlichsehen, meist Verminderung des Tastgefühls mit der Empfindung des Eingeschlafenseins in den Extremitäten, ausnahmsweise Hyperästhesie, ziemlich constant häufiges Uriniren, immer Schläfrigkeit und festen Schlaf ohne Träume oder mit gleichgültigen, höchst ausnahmsweise mit wollüstigen Träumen. Gegenüber dem Opium hat der Indische Hanf keine retardirende Wirkung auf den Stuhlgang.

Ueber die Wirkung der Cannabis Indica auf Thiere liegen nur vereinzelte Versuche vor. Carnivoren und Fische werden am schnellsten und stärksten davon afficirt; Herbivoren verzehren das Gewächs selbst in grossen Mengen ohne Schaden (Christison, O'Shaugnessy). Bei Hunden tritt unsicherer, schwankender Gang, später Schläfrigkeit und Schlaf ein. Bei Fröschen bewirkt 0,1 unter die Rückenhaut applicirt nach einigen Stunden lebhafteres Athmen und einen Zustand von Aufregtheit, anscheinend auch etwas Hyperästhesie, später Trägheit und Mattigkeit, worauf Wiederherstellung erfolgt (Valentin).

Als Medicament wird der Indische Hanf bei uns verhältnissmässig selten benutzt. Am genauesten studirt ist derselbe bezüglich seiner schlafmachenden Wirkung, welche nach 1000 von Frommüller angestellten Versuchen zwar der des Morphins an Sicherheit und Intensität nachsteht, immerhin aber Aufmerksamkeit verdient, da in mehr als der Hälfte der Fälle Schlaf durch das Mittel herbeigeführt wurde, manchmal sogar noch da, wo Morphin den Dienst versagte. Es empfiehlt sich daher der Indische Hanf als Hypnoticum zum Opiumsurogat

theils bei Intoleranz der Kranken gegen Opiaceen, theils als intercurrentes Schlafmittel bei längerem Gebrauche von Opium oder Morphin, wo man die Dosen der letzteren nicht steigern möchte, oder wo dieselben hartnäckige Obstipation bedingen. Auch fieberhafte Krankheiten verbieten den Gebrauch des Hanfes nicht; überhaupt scheint nach Frommüllers Versuchen der hypnotische Effect ziemlich unabhängig von der Krankheit, wenn das Mittel in der richtigen Dosis (0,2—0,5 Extr. Cannab. Ind.) verabreicht wird. Die meisten Misserfolge wurden beim Rheumatismus wahrgenommen. Nebenerscheinungen (Erbrechen, Kopfschmerz, Schwindel) beobachtete F. äusserst selten unmittelbar nach dem Einnehmen, während bei etwa 12% Schwindel und Kopfschmerz am folgenden Morgen vorkam. Steigerung der Puls- und Athemfrequenz, Verminderung des Appetits und Retardation des Stuhles fehlten stets, während die Temperatur in einzelnen Fällen unerheblich (um  $\frac{1}{2}^{\circ}$ ) herabging. Inwieweit der Hanf längere Zeit hindurch als Hypnoticum gegeben werden kann, ohne dass Gesundheitsstörung eintritt, müssen weitere Versuche lehren. Abstumpfung der Wirkung ist Regel (Frommüller). Auch als Sedativum hat das Mittel wiederholt, wenn auch in beschränkterem Maassstabe, mit Erfolg Benutzung gefunden. Selbst gegen Tetanus, gegen welchen ihn O'Shaugnessy und andere britische Aerzte empfahlen, erweist er sich manchmal wirksam, wie wir selbst an einem im Würzburger Julius-Spitale damit behandelten und von Biron beschriebenen Falle zu beobachten Gelegenheit hatten. Ebenso hat die Literatur der Strychninvergiftung aus neuerer Zeit mehrere unter dem Gebrauche des Indischen Hanfes günstig verlaufene Fälle aufzuweisen. Bei Delirium tremens ist derselbe von Cairns u. A. gerühmt. Bei Geisteskrankheiten ist der Hanf zuerst von Moreau, später von Berthier u. A. in Anwendung gebracht, und zwar sowohl bei Aufregung mit Schlaflosigkeit, Präcordialangst und Hallucinationen als bei Apathie und Depression, doch sind die Resultate ziemlich zweifelhaft. Auch bei Metrorrhagien, übermässiger Menstruation und selbst als wehentreibendes Mittel (Simpson, Christison, Churchill, Michel), sowie als Diureticum bei Hydrops (Bryan), ferner bei Rheumatismus (O'Shaugnessy) ist Hanf benutzt. Als wehenförderndes Mittel soll Cannabis Indica nach den Angaben der Engländer sogar das Mutterkorn übertreffen und schon in 2—3 Min. wirken, die Wirkung auch auf einige Wehen kurz nach der Application sich beschränken. Willemin empfahl das Mittel gegen Cholera, Michel bei Katarrhen der Greise.

Die Herba Cannabis Indicae wird vorzugsweise in ihren Präparaten benutzt. Frommüller liess daraus mit Zucker und Tragantenschleim Haschischkuchen bereiten, die er zu 0,5—2,0 als Narkoticum verordnete oder deren beim Verbrennen auf heissem Blech entwickelte Dämpfe er inhaliren liess.

#### Präparate:

1) **Extractum Cannabis Indicae; Indisch-Hanfextract.** Macerationsextract, aus 1 Th. Indischem Hanf mit 2mal 5 Th. Weingeist bereitet; von gewöhnlicher Consistenz, schwarzgrün, in Wasser nicht löslich. Zu 0,5—1,0 bewirkt es nach Schropp stetiges Fallen des Pulses, Eingenommenheit des Kopfes, Kopfschmerz, Mattigkeit, Neigung zum Schlaf und tiefen Schlaf ohne andere Nebenwirkungen. Als Hypnoticum reicht man es zu 0,2—0,5 (Frommüller, Berthier); ob schon die Phkp. nur 0,1 als Einzelgabe und 0,3 als Tagesgabe in maximo gestattet, sind diese Dosen in keiner Weise ausreichend, um Schlaf zu erzielen. Andererseits können auch Personen schon durch 0,2 in einen starken Haschischrausch versetzt werden (Gardner). In einem Versuche von Schropp riefen sogar 2,0 ausser Eingenommenheit des Kopfes keine Erscheinungen hervor. Bei Wehenschwäche, Rheuma u. s. w. genügen Gaben von 0,03—0,5. Es kann in Pillen- und Pulverform, auch in Trochiscen gegeben werden. Frommüller benutzte es auch zu 0,2 mit 25,0 Linimentum amm. camph. oder Ol. Papaveris zu Einreibungen bei rheumatischen Schmerzen.

2) **Tinctura Cannabis Indicae; Indisch-Hanf tinctur.** Lösung von 1 Th. Extr. Cann. Ind. in 19 Th. Spiritus, dunkelgrün, eigenthümlich narkotisch riechend und bitterlich schmeckend, mit Wasser sich milchig trübend. Zu 4—10—40 Tropfen und mehr als Narkoticum, bei Wehenschwäche und Metrorrhagie zu



4—6 Tr. halbstündlich; nur für sich zu verordnen, da selbst jeder Zusatz von schwächeren Tincturen das Harz ausfällt.

### Verordnung:

R

*Extract. Cannabis Indicae*  
*Herbae Cann. Ind. pulv. aa 2,5!*

*M. f. pilul. No. 50. Consp. D. S. 1—2*  
Pillen auf einmal Abends zu nehmen.  
(Als Hypnoticum. Frommüller.)

**Anhang:** Ausser *Lactuca* und *Cannabis* giebt es noch eine Reihe rein narkotischer Stoffe, welche nach Art des Opiums wirken. So die als *Semina Indurjuo* bezeichneten Samen der ostindischen Apocynce *Wrightia antidysenterica*, deren narkotische Wirkung Th. Husemann 1864 zeigte. Sowohl die Samen als die früher unter dem Namen *Cortex Conessi* gegen Ruhr viel gebrauchte Rinde enthalten, wie auch eine ähnliche westafrikanische Rinde von *Holarrhena Africana* (Wulfsberg), ein als *Conessin* bezeichnetes Alkaloid, welches primär auf das Gehirn, in grösseren Dosen auch auf die Reflexfunction des Rückenmarks und das vasomotorische Centrum herabsetzend wirkt und schliesslich durch Lähmung des *Athemcentrums* tödtet (Keidel). Auf die Peristaltik wirkt *Conessin* schon in kleinen Dosen erregend. Neuerdings benutzt man in Nordamerika als Substitut des Opiums besonders bei schmerzhaften Affectionen ein *Fluidextract* aus der Rinde eines in Jamaica wachsenden Baumes aus der Familie der Leguminosen, *Piscidia erythrina*, die in ihrer Heimath als fischbetäubendes Mittel längst benutzt wird. Nach den Versuchen von Ott (1882) setzt dasselbe bei Warmblüthern die Sensibilität herab, erweitert die Pupille und bedingt in letalen Dosen complete Anästhesie, Schlaf, Speichelfluss und Tod durch Lähmung des *Athemcentrums*. Beim gesunden Mann setzt es die Pulsfrequenz herab und bedingt Schlaf und die dem Opium zukommenden Nebenerscheinungen, Sch weiss, Speichelfluss, Sehstörungen und Hautjucken. Grössere Dosen scheinen stärker herabsetzend auf die Herzthätigkeit und auf das vasomotorische Centrum zu wirken und in Folge davon Collaps herbeizuführen. Man giebt das *Extract* als Hypnoticum und Sedativum zu 4,0 und darüber. Primär auf das Gehirn wirkende Stoffe finden sich übrigens noch in manchen anderen Leguminosen und Apocynen, z. B. *Erythrina corallodendron* (Boche-fontaine und Rey) und in der Paopereirarinde von *Geissospermum laeve* (Boche-fontaine und Freitas).

**Chloralum hydratum**, Chloralum hydratum crystallisatum, Hydras Chlorali; **Chloralhydrat**, krystallisirtes Chloralhydrat.

Als das vorzüglichste Surrogat des Opiums ist das von Liebreich zuerst als Hypnoticum empfohlene Chloralhydrat anzusehen.

Das Chloralhydrat,  $C^2OHCl^3 + OH^2$  oder  $CCl^3CH(OH)^2$ , bildet trockne, luftbeständige, durchsichtige, farblose Krystalle von aromatischem, etwas stechendem Geruch und etwas bitterem, schwach ätzendem Geschmack; es löst sich leicht in Wasser, Weingeist und Aether, weniger in fetten Oelen und Schwefelkohlenstoff, nicht in kaltem Chloroform. Bei  $58^\circ$  schmilzt es zu einer Flüssigkeit, die bei  $+15^\circ$  erstarrt und bei  $95^\circ$  siedet und sich unverändert vollständig verflüchtigt. Mit Schwefelsäure erhitzt giebt Chloralhydrat wasserfreies Chloral oder Trichloraldehyd,  $C^2OHCl^3$ , dessen Hydrat es darstellt. Das Chloral ist eine leicht bewegliche, durchdringend riechende und stark zu Thränen reizende Flüssigkeit, welche beim Aufbewahren in ein weisses Pulver von unlöslichem Chloral oder Metachloral sich verwandelt, das beim Erhitzen auf  $200—250^\circ$  wieder zu gewöhnlichem Chloral wird. Das von Liebig 1832 entdeckte Chloral entsteht bei Einwirkung von Chlor auf Alkohol und zwar aus dem dabei gebildeten Aldehyd durch Substitution von 3 Wasserstoff-Atomen durch 3 Chlor-Atome oder nach Liebig durch directe Einwirkung von Chlor auf Alkohol, da es bisher nicht gelungen ist, aus Aldehyd direct durch Behand-

lung mit Chlor Chloral zu erzeugen. Wird Chloral mit conc. Schwefelsäure destillirt, so wird es theilweise unter Bildung eines krystallinischen, dem Chloral ähnlich riechenden Körpers (Chloralid) zersetzt. Von wässrigen Alkalien wird Chloral in Chloroform und Ameisensäure zerlegt, wobei die Ameisensäure mit dem Kalium sich verbindet.

Für die Anwendung des Chloralhydrats ist sorgfältig auf die Reinheit des Präparats zu achten und sind sowohl Sorten, welche andere Producte der Einwirkung von Chlor auf Alkohol, z. B. Aldehyd, enthalten und in Folge davon weit stärkere excitirende und viel geringere hypnotische Wirkung besitzen, als auch solche, welche in Folge der Einwirkung des Sauerstoffs der Luft Oxydationsproducte des Chloralhydrats und freies Chlor enthalten, in Folge wovon denselben stärkere örtlich crethistische Wirkung zukommt, zu vermeiden. Das zuerst von Roussin in den Handel gebrachte Chloralalcoholat, in welchem ein Atom Alkohol die Stelle des Wasseratoms im Chloralhydrat vertritt, soll nach Limousin dem Chloralhydrat gleich, nach Andern mehr excitirend wirken.

Das Chloralhydrat zeichnet sich vor den übrigen Encephalica hypnotica durch intensive örtliche, bei Application in Substanz oder conc. Lösung selbst kaustische Wirkung aus.

Mit gelöstem Chloralhydrat versetzte Albuminlösungen geben zwar keinen Niederschlag, aber erhebliche Trübung; beim Kochen entsteht ein Coagulum, welches nach Auswaschen mit Alkohol nur wenig Chloral enthält (Byasson). Auf Haut und Schleimhäute applicirt führt Chloral in Substanz zur Bildung einer mehr oder minder ausgedehnten Phlyktäne unter lebhaften, 1—2 Stunden anhaltenden Schmerzen. Auch bei subcutaner Einspritzung conc. Lösungen zeigt sich kaustische Wirkung, die jedoch schon bei 10% Solution sich auf leichtes Brennen reducirt, bei 1% Lösung gar nicht hervortritt. Auf Wunden erzeugt Chloralhydrat einen dünnen, halb durchsichtigen, leicht ablösbaren Schorf; auch hier ist 1% Lösung ohne irritative Action. Metachloral wirkt in ähnlicher Weise, jedoch minder intensiv (Dujardin-Beaumetz und Hirne). Auch bei Thieren treten nach subcutaner Injection conc. Lösung Irritation, diffuse Entzündung und Mortification des Unterhautzellgewebes ein. Chloraldämpfe wirken reizend und können bei Thieren selbst zur Bildung croupöser Membranen in den Luftwegen führen (Porta). Bei Einführung tödtlicher Dosen diluirter Chlorallösungen in den Magen von Thieren resultirt niemals Gastroenteritis, dagegen erzeugt Chloralhydrat in Substanz sowohl bei Menschen als bei Thieren Symptome von Magenirritation und selbst von Gastritis.

Dem Chloralhydrat kommt auch eine ausgesprochene antiseptische und antifermentative Wirkung zu, welche auch in Verdünnungen eintritt, welche Eiweiss nicht coaguliren (Richardson, Personne, Dujardin und Hirne).

Chloralhydrat verhütet die Zersetzung von Lösungen unreiner Chinasäure, von Eiweiss, Muskelfleisch, Milch und Urin, verhindert dagegen bei Thieren die Folgen der Einspritzung septischer Stoffe in das Blut nicht; Milchsäuregärung hemmt schon Zusatz von 1% (Dujardin-Beaumetz und Hirne). Auch die Hefegärung wird durch Chloral retardirt und bei Zusatz von 3% sofort sistirt (Lissonde). Leichname halten sich bei Injection von  $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$  Pfund Chloral in 4% Lösung ausgezeichnet und bleiben völlig geruchfrei bei persistenter natürlicher Hautfarbe; besonders vorthellhaft ist Chloral zur Aufbewahrung von Tumoren (Kien).

Die Resorption des Chloralhydrats erfolgt sowohl von der Magen- als von der Mastdarmschleimhaut, auch vom Unterhautzellgewebe aus, hier jedoch nicht immer mit gleicher Schnelligkeit und Intensität.

Auch von der Nasenschleimhaut findet Aufsaugung statt (Zani). Sehr langsam ist die Resorption von serösen Häuten (Tunica vaginalis) und aus

Cysten (*Struma cysticum* u. s. w.), in welche enorme Dosen gebracht werden können, ohne anhaltende entfernte Erscheinungen hervorzurufen. Inhalation von Chloraldämpfen wirkt irritirend, aber nicht hypnotisch. Nach Björnström ist die Wirkung vom Rectum aus bei gleichen Dosen intensiver als vom Magen.

In Hinsicht auf die Schicksale des Chloroforms im Organismus ist die ursprünglich von Liebreich aufgestellte Theorie, dass dasselbe durch die Alkalien des Blutes in Chloroform und ameisen-saures Kalium gespalten werde, welche dann weiteren Oxydationen unterliegen, und dass die Action des Mittels durch das abgespaltene Chloroform bewirkt werde, fast allgemein angenommen, obschon dieselbe gegründeten Bedenken unterliegt und positive Beweise dafür vollständig fehlen.

Liebreichs Theorie basirt nur auf dem Umstande, dass Chloral in einer alkalischen Flüssigkeit Chloroform bildet und dass die Wirkung von Chloralhydrat und Chloroform einander äusserst nahe stehen. Wenn es sich nun auch nicht leugnen lässt, dass mit Chloral längere Zeit stehen gelassenes Blut, namentlich bei erhöhter Temperatur, zur Bildung von Chloroform führt, so ist doch die Entstehung des letzteren im Blute lebender Thiere in keiner Weise erwiesen, und die in Bezug darauf angestellten exacten Versuche von Hammarsten zeigen zur Gewissheit, dass bei der Anwendung nicht letaler Chloralgaben während mehrstündiger tiefer Hypnose wohl Chloral, aber kein Chloroform im Blute vorhanden war, so dass also die medicinale, d. h. Schlaf herbeiführende Wirkung des Chloralhydrats nicht auf Chloroformbildung beruhen kann, da das Chloroform, z. B. bei Application in Klystieren, im Blute schon nachweisbar ist, ehe die anästhesirende Wirkung eintritt. Im Harn wird weder Chloroform noch Chloral wahrgenommen, dagegen eine Vermehrung der Chloride (Liebreich, Personne). In der Expirationsluft findet sich weder bei interner und subcutaner Application, noch bei Injection von Chloral in eine Vene Chloroform (Hammarsten, Rajewsky); nur ausnahmsweise kommt Chloralgeruch im Athem vor. Der Nachweis von Chloroform im Urin von Thieren, welche Chloralharnstoff erhalten hatten (Langaard), darf nicht direct auf das Chloral selbst bezogen werden. Sicher festgestellt ist, dass Chloralhydrat zu einem geringen Theile unverändert im Harn mit der Isocyanphenylreaction nachweisbar ist, während der grösste Theil in eine linksdrehende und alkalische Kupferlösung reducirende Säure von der Formel  $C^8H^{11}Cl^3O^7$ , Urochloralsäure, die sich beim Kochen mit Salzsäure oder Schwefelsäure in Trichloräthylalkohol und Glykuronsäure spaltet, sich verwandelt (Musculus und v. Mering). Hermann fand in dem Urin von Geisteskranken, welche täglich 4,0–6,0 erhielten, constant Chloral, aber kein Chloroform. Die Wirkung von Chloroform und Chloralhydrat zeigt zwar in vielen Punkten Analogien, aber auch solche Differenzen, dass sich die Anhänger der Spaltungstheorie zu einer neuen Hypothese, dass das Chloroform aus dem Chloral im Blute sich nur ganz allmählig entwickle, gedrängt sehen. Auf die fraglichen Differenzen werden wir weiter unten zurückkommen.

Die Anhänger der Spaltungstheorie sehen mit wenigen Ausnahmen (Byasson, Richardson, Arloing) das bei der Spaltung entstehende ameisen-saure Kalium als für die Wirkung irrelevant an; Richardson schreibt die von ihm bei rasch durch Chloralinfusion getödteten Thieren beobachtete Schrumpfung und Zackenbildung an den rothen Blutkörperchen auf Rechnung des Formiats. Djurberg konnte im circulirenden Blute verschiedener Thiere während subcutan bewirkter hochgradiger Chloralnarkose keine Veränderung der rothen Blutkörperchen und ebensowenig im Urin derselben Gallenfarbstoff constatiren, so dass von einer Auflösung der Blutkörperchen nicht die Rede sein kann. Nach Djurberg besitzen stärkere Chloralsolutionen das Vermögen, bei directem Contact mit Blut Hämoglobin in Lösung zu bringen und das Blut lackfarben zu machen, dagegen nicht wie das Chloroform das Blutkörperchenstroma aufzulösen. Bei Infusion concentrirter Chlorallösung ist Hämaturie und Hämoglobi-nurie keine seltene Erscheinung (Feltz u. Ritter, Vulpian). Sehr schlagende Argumente gegen die Spaltungstheorie sind, dass Chloralhydrat seine Wirkung



auch an Fröschen entfaltet, denen das Blut vollständig durch eine Salzlösung verdrängt wurde.

Als die hauptsächlichste Wirkung mittlerer Gaben des Chloralhydrats muss Erzeugung von Schlaf betrachtet werden, welcher durch raschen Eintritt und annähernde Identität mit dem natürlichen Schlaf charakterisirt erscheint.

Nach Dosen von 1,0–2,0 tritt häufig schon nach 4–5 Min., selten erst nach Verlauf von  $\frac{1}{2}$  Std., unwiderstehliche Müdigkeit und rasch darauf Schlaf ein, welcher im Durchschnitt 2–6 Stdn. anhält und bei ruhiger, meist etwas verlangsamter Respiration und in der Regel nicht bedeutend veränderter Circulation verläuft; die Pupille ist dabei verengt, und der Schlafende kann durch lautes Anrufen, Stechen oder Kneifen zum klaren Bewusstsein gebracht werden, um entweder völlig zu erwachen oder nach kurzer Zeit wieder einzuschlummern. Die Reflexaction ist dabei in keiner Weise afficirt. Beim Erwachen besteht im Anfange etwas Somnolenz, in der Regel zeigt sich aber weder Kopfschmerz noch Erbrechen wie beim Opium.

Das sehr einfache Bild des Chloralschlafes erfährt in manchen Fällen wesentliche Modificationen. Wenn bei den Meisten der Schlaf ohne vorausgehende Excitation eintritt, kommen doch gar nicht selten Fälle vor, in denen ein ausgesprochenes Excitationsstadium vor dem Eintritte des Schlafes sich geltend macht. Dasselbe ist viel gewöhnlicher, als man im Allgemeinen annimmt, meist aber von kurzer Dauer (Jastrowitz, Bouchut), ausgeprägte Aufregung von längerer Dauer zeigt sich höchstens bei 2–4% der Chloralisirten (Porta, Monckton). Bisweilen gleichen die Erregungserscheinungen in auffallender Weise dem Chloroformrausche, indem sie sich erst nach zuvor schon aufgetretener Bewusstlosigkeit einstellen, bisweilen dem Alcoholismus acutus, ja es kommen dabei die nämlichen Hallucinationen vor, welche das Delirium potatorum charakterisiren (Grainger Stewart). Am häufigsten kommen derartige Excitationen bei zu kleinen Dosen und bei sensibeln Personen (Oppenheimer, Rupstein), ausnahmsweise bei athletisch gebauten Individuen mit vollkommen normaler Gemüthsstimmung vor (Porta). Wie der Eintritt des Schlafes kann bisweilen auch der Schlaf selbst ein unruhiger sein. Träume im Chloralschlaf sind nicht so selten, wie man meist annimmt; sowohl bei grossen als bei kleinen Dosen kommt bei einzelnen Personen Sprechen und Schreien im Schlaf vor. Die Länge des Intervalls zwischen dem Einnehmen des Chloralhydrats und dem Schlaf kann in Ausnahmefällen mehrere Stunden betragen; nach Oppenheimer verlängert sie sich bei fortgesetztem Gebrauche immer mehr, wobei auch die Excitationerscheinungen stets zunehmen sollen. Statt der Myosis wird manchmal normale Weite der Pupille und ausnahmsweise Mydriasis constatirt. Beim Erwachen schwindet die Myosis sofort (Maxwell Adams). Die Einwirkung hypnotischer Chloraldosen auf die Circulation variirt sehr. In der Regel wird die Zahl der Pulsschläge etwas vermindert, bisweilen auch erheblich beschleunigt, manchmal (nach Jastrowitz' Beobachtungen an Geisteskranken) anfangs beschleunigt, später vermindert und schliesslich wieder beschleunigt. Bei Typhuskranken fand Russell ausser geringer Pulszahl und Resistenz der Arterie auch vorübergehende Irregularität des Herzschlages. Die Körpertemperatur sinkt, meist um weniger als 1°, sehr selten mehr (Demarquay, Bouchut, Da Costa, Björnström); nach Bouchut geht dem Sinken geringe Steigerung voraus. Beträchtliche Steigerung der Empfindlichkeit gegen äussere Eindrücke (Demarquay) ist im gewöhnlichen Chloralschlaf Ausnahmefall. Die Dauer des Schlafes variirt ausserordentlich und hängt nicht allein von der Individualität, sondern auch von äussern Umständen und der Tageszeit ab. Nicht immer ist das Erwachen ohne Nebenerscheinungen, vielmehr kommt bei manchen Patienten gelinder Stirnkopfschmerz, leichte Nausea und Gastralgie, auch etwas unstäter Gang und starker Schweiss (auch während des Schlafes) vor; seltenere Zufälle in dieser Periode sind Taubsein und Kriebeln in den Extremitäten (Keyser) oder Nasenbluten (Mauriac). Constante Vermehrung der Diurese (Da Costa, Bouchut) findet nicht statt, ebenso kommt ein retardirender Einfluss auf die Defaecation dem Chloralhydrat nicht zu.

Bei Einwirkung grösserer Dosen gesellt sich zu dem viel tiefer werdenden Schlafe auch Herabsetzung der Sensibilität, so dass Reflexe weniger leicht ausgelöst werden, und bisweilen kommt es zu vorübergehender vollständiger Anästhesie und zu Erschlaffung der Musculatur. Sehr grosse Mengen sind im Stande, einen comatösen Zustand herbeizuführen, in welchem Herzschlag und Temperatur stark sinken und welcher mitunter in Folge von Herzparalyse, meist aber durch Lähmung des respiratorischen Centrums den Tod herbeiführt.

Wiederholt sind auch bei Menschen nach Gaben von 4,0 derartige Anästhesien beobachtet worden, dass selbst bei Berührung der Cornea keine Reflexe mehr ausgelöst wurden und nur von der Nasenschleimhaut aus tiefere Inspirationen erregt werden konnten (Jastrowitz). Complete Anästhesie tritt bei Einspritzung grösserer Mengen Chloralhydrat in die Venen in der Weise ein, dass langdauernde Operationen vorgenommen werden können (Oré, Deneffe u. van Wetter). Die eigentlichen acuten Intoxicationen durch Chloralhydrat tragen ein sehr verschiedenes Gepräge. In einer Reihe von Fällen wurde hochgradige Excitation mit heftigem Blutandrang zum Gehirn und starker Injection der Conjunctiva beobachtet (Chesney). In der Mehrzahl der Intoxicationen handelt es sich um Coma mit Collaps und mit oder ohne Respirationsstörungen, ohne vorhergehende Excitation oder mit solcher verbunden, oder um Tod durch Herzparalyse in tiefem, aber anscheinend normalem Chloralschlafe. Wiederholt sind auch plötzliche synkoptische Todesfälle nach Chloralhydrat beobachtet, wobei die Section manchmal Lungenödem als Todesursache nachweist (Jolly). Die Dosen, welche derartige schwere Intoxicationen herbeiführen können, sind sehr variierend. Beunruhigende Erscheinungen sind bereits nach einer Gabe von 3,0 wahrgenommen (Reynolds), ja selbst bei einem Hemiplegischen nach 1,0 (Shaw), plötzlicher Tod nach 4,0 (Jolly). Jedenfalls mahnen diese Fälle zur grössten Vorsicht, wenn auch andererseits Beobachtungen vorliegen, wo z. B. nach 18,0—24,0 30—36stündiger, aber natürlicher Schlaf eintrat (Maxwell, Wildt und Levinstein) oder wo schwere Vergiftung durch 30,0 unter Anwendung geeigneter Hilfsmittel überstanden wurde (Ludlow und Eshelman). Besonders bei Delirium tremens kommt mitunter Tod nach kleinen Gaben (z. B. nach dreimal 1,5) vor (Frank). Die comatöse Form des Chloralismus acutus erfordert die Anwendung von Excitantien, z. B. die subcutane Injection von Campher oder Aether, kalte Begiessungen u. s. w., unter Umständen auch künstliche Respiration; das von Liebreich als Antidot vorgeschlagene Strychnin hat mir bei Thierversuchen gar keine Resultate gegeben.

Die Wirkung des Chloralhydrats bei Thieren entspricht im Wesentlichen dem für den Menschen gegebenen Bilde.

Katzen sind sehr empfindlich, Hunde sehr unempfindlich dagegen, letztere zeigen meist viel ausgeprägtere Excitation. Der Schlaf tritt bei Säugethieren bisweilen ohne Excitation, manchmal erst nach ziemlich erheblicher Aufregung ein, die auch dem reinsten Chloralhydrat folgen kann und bei kleinen Dosen und bei subcutaner Injection (in Folge der Schmerzen) am auffallendsten ist. Die Respiration wird verlangsamt, seltener zuerst beschleunigt; die Temperatur sinkt (bei rascher Wirkung selbst um 6°). Die Pupille ist auch hier contrahirt, die Urinsecretion bisweilen stark vermehrt. Bei grösseren Dosen kommt es auch hier zu Anästhesie, welche im gewöhnlichen Chloralschlaf nicht zu Stande kommt, obschon derartige Thiere auf Glühbitze wenig reagieren, während sie gegen tactile Reize (Kneifen) energisch reagieren. Der Tod erfolgt bei Säugethieren nach starker Verlangsamung der Athmung ohne vorausgehende Krämpfe so, dass die Respiration erlischt, ehe das Herz stillsteht. Dies ist auch bei subcutaner Injection (Th. Husemann) und gewöhnlich auch bei Einspritzung in die Venen der Fall; nur bei Einspritzung sehr bedeutender Chloralmengen in die Jugularis erfolgt sofortiger Tod durch Herzstillstand (P. Rokitansky, Heger).

Vergleichen wir die Action des Chloralhydrats und des Chloroforms nach

den äusseren Erscheinungen, so lässt sich eine grosse Aehnlichkeit nicht verkennen, obschon die grosse Differenz, dass Chloralhydrat in kleinen Dosen nur Schlaf, und zwar von viel längerer Dauer als der gewöhnliche Chloroformschlaf, und erst in grossen Dosen, dann aber auch nur relativ rasch vorübergehende Anästhesie bedingt, nicht übersehen werden kann. Noch weitere Analogien ergeben sich aber aus der genaueren physiologischen Prüfung beider Körper. Der Gang der Wirkung ist der nämliche; zunächst wird offenbar das Grosshirn afficirt, wonach ein Ergriffensein des Rückenmarks folgt, worauf schliesslich die Medulla oblongata und das Herz in Mitleidenschaft gezogen wird. Besonders auffallend ist die Uebereinstimmung des Verhaltens von Herz und Blutdruck sowohl bei Fröschen als bei Säugethieren, welche offenbar auf eine Lähmung des vasomotorischen Centrums deuten, dessen reflectorische Erregbarkeit in hohem Grade abnimmt. Kleine Gaben bewirken vorübergehend, grössere fast continuirlich Sinken des Blutdruckes bis zum Nullpunkt, während die Pulsfrequenz anfangs gesteigert, später dauernd herabgesetzt wird (Rajewsky, v. Mering). Die Vagi sind bei der Herzverlangsamung sowohl central als peripherisch unbetheiligt (Rajewsky, P. Rokitsky). Ob die offenbar gleichzeitig vorhandene directe Action auf das Herz die musculomotorischen Ganglien oder die Muskelsubstanz betrifft, ist nicht zu entscheiden; ein Einfluss auf die Musculatur ist deshalb nicht in Abrede zu stellen, weil bei Einführung von Chloral in eine Arterie — grade wie beim Chloroform — sofortige hochgradige tetanische Starre in dem zugehörigen Muskelgebiet eintritt (Zuber). Uebrigens ist der Herzstillstand, welcher nach wiederholten Pausen im Herzschlage erfolgt, diastolisch. Ein Einfluss des Chloralhydrats auf das vasomotorische Centrum giebt sich auch in dem wiederholt beobachteten Blutreichthum und Heisswerden der Ohren bei gesunkener Körpertemperatur zu erkennen, wie solche ebenfalls beim Chloroform vorkommt; constant ist dies Phänomen jedoch bei beiden nicht. Das Sinken der Temperatur ist wie beim Chloroform nicht von vermehrter Wärmestrahlung abhängig (Hammarsten). Ob bestimmte Differenzen beider Substanzen in physiologischer Hinsicht bestehen, müssen weitere Untersuchungen lehren. Rajewsky bestreitet z. B. beim Chloral eine Einwirkung auf die peripherischen Nerven, welche Bernstein für Chloroform nachwies. Nach Arloing existiren bei Pferden und Eseln entschiedene Differenzen in Bezug auf die Wirkung der Infusion von Chloral und Chloroform. Der Pulsschlag wird durch Chloroform weit intensiver und rascher beschleunigt, der Blutdruck im rechten Ventrikel durch Chloral herabgesetzt und durch Chloroform erhöht, die Energie der Systolen durch Chloroform verstärkt und durch Chloral verringert. Ferner will Arloing nach Chloralinfusion anfangs schwache Zunahme des arteriellen Blutdrucks, verbunden mit leichter Vermehrung der systolischen und Verminderung der diastolischen Blutgeschwindigkeit, worauf rasch Sinken des Drucks und Vergrösserung der constanten Geschwindigkeit eintrete, die während der ganzen Anästhesie persistiren, gesehen haben, während Chloroform anfangs schwache Dilatation, dann ausgeprägte Constriction, die im dritten Stadium der Chloroformnarkose schwächer wurde, erzeugte. Bei chloroformirten Thieren soll Infusion von ameisensaurem Natrium die durch das Chloroform bewirkten Veränderungen des Blutdrucks, der Herzschläge und der Blutgeschwindigkeit in diejenigen des Chlorals überführen (Arloing).

Von weiteren Wirkungen des Chloralhydrats erwähnen wir noch nach Rajewsky, dass dasselbe bei sehr kleinen Dosen die Reflexaction erhöht und erst später herabsetzt, wobei die Setschenowschen Centren unbetheiligt sind, während grosse Dosen sofort die Reflexaction herabsetzen. Analog verhält sich das Rückenmark bei Reizung mit Inductionsströmen. Die Wirkung auf die Respiration ist unabhängig vom Vagus und daher durch eine Einwirkung auf das respiratorische Centrum zu erklären.

Durch den längeren Gebrauch von Chloralhydrat, wie solcher besonders in einzelnen Irrenanstalten en vogue ist, können Vergiftungserscheinungen herbeigeführt werden, welche mitunter ein ganz eigenthümliches Gepräge tragen, das die Ursache derselben



schwer erkennen lässt, und welche nicht selten gefährlicher und schlimmer als die der Opiumvergiftung sind.

Ueber die Frage, ob längere Anwendung von Chloralhydrat eine Toleranz gegen die hypnotischen Effecte des Mittels erzeuge, sind die Ansichten divergent. Nach meinen eigenen Erfahrungen ist bei vielen Kranken Erhöhung der Dose nöthig, wenn auch nicht in den von Oppenheimer angegebenen Fristen, wonach schon nach 2—3maligem Gebrauche Steigerungsbedürfniss eintrete. Man kann übrigens durch Interposition von Morphin die Zeit des Eintritts der Toleranz hinausschieben. Bei anderen Kranken reicht dieselbe Gabe selbst Jahre lang aus.

Das Vorkommen von Chloralismus chronicus ist trotz der vielfach wahrgenommenen Unschädlichkeit des langen Gebrauchs bei einzelnen Personen (so gab Macleod z. B. einem Geisteskranken in 95 Tagen 150,0) nicht zu bezweifeln. Dieselbe stellt sich jedoch in äusserst variabler Weise dar. Am wenigsten Bedeutung zeigt die schon von Balfour beobachtete Conjunctivitis, welche beim Baden der Augen mit Thee oder warmem Wasser und Aufenthalt in freier Luft rasch verschwindet. Dann kommen mancherlei Hautaffectionen vor, von Urticaria (Fisher) und Hauterythem (Husband, Gellhorn) bis zu Infiltration und Ulceration der Phalangen (Smith) oder gar bis zu Petecchien (Pelman) und ausgebildeter Purpura haemorrhagica (Crichton Browne). Bei manchen dieser Affectionen scheint es sich um lähmende Einwirkung auf den Sympathicus (bei Purpura wohl gleichzeitig um wirkliche Alteration des Blutes) zu handeln, wie solche sich wohl auch durch das Vorkommen von fleckiger Röthe im Gesicht und am Halse, auch am Augenhintergrunde (Schüle) zu erkennen giebt, welche nicht selten an Chloralhydrat gewöhnte Personen zeigen, sobald sie nur sehr geringe Mengen von Spirituosa oder selbst von starkem Kaffee ingeriren (Kirn u. A.). Vielleicht haben auch die hier und da beobachteten ausgedehnten Hautoedeme denselben Grund. Eine andere Form des Chloralismus chronicus stellt starke Dyspnoe mit Angst, die sich selbst zu Asphyxie steigern kann (Kirn, Schüle), dar. Die ausführlichste Schilderung der unter dem Einflusse chronischer Chloralzufuhr eintretenden Störungen verdanken wir Gellhorn, welcher ausser den schon erwähnten Formen auch noch Gliederschmerzen und ähnliche Sensationen, wie sie früher auch schon Coghill sah, Beschleunigung des Pulses, Disposition zu Diarrhoe und Marasmus nach chronischem Chloralgebrauche wahrnahm. Uebrigens lässt sich auch nicht verkennen, dass bei geistesgesunden Personen durch übertriebenen Chloralgebrauch psychische Alterationen eintreten können, theils Aufregungszustände mit Hallucinationen (Verfolgungswahn), Delirien und ein der Morphiumsucht analoger Hang, theils complete Imbecillität, wie solche Murphy neben Trübung des Sehvermögens und partieller Paralyse der Schlundkopfmuskeln, so dass die Schlundmuskeln sich unter dem Reize von Speisen und Getränken nur schwach contrahirten, bei einer Frau, welche das Mittel anfangs zu 1,2, später zu 10,0 in 24 Stunden nahm, beobachtete. Ferner kommt Paralyse der untern Extremität mit Verminderung der Sensibilität in derselben (Kirkpatrick Murphy) vor. Nach Reimer bedingt sowohl Chloral als Morphinchloral Tendenz zu Decubitus.

Seine Hauptbedeutung hat das Chlorhydrat als schlafmachendes Mittel, in welcher Beziehung es manche Nachtheile, aber auch manche Vorzüge vor den Opiumpräparaten besitzt.

Die grossen Hoffnungen, welche man kurz nach der Einführung des Chloralhydrats in die Therapie auf dasselbe setzte, und die kühne Erwartung, dass es alle sonstigen Hypnotica vollständig überflüssig machen würde, haben sich leider bei nüchterner Prüfung nicht realisirt, und der enorme Consum in den ersten Jahren hat sich auf ein bescheidenes Maass reducirt. Sicher ist das Chloralhydrat dasjenige Präparat, zu welchem der Arzt in solchen Fällen greifen wird, wo frühere Erfahrungen Inconvenienzen der Opiaceen sich herausstellten. Wo Opium und Morphin Appetitmangel und Erbrechen nach jeder Dosis, sowie Kopfschmerz nach dem Erwachen und hartnäckige Obstipation bedingen, ist das Chloralhydrat entschieden demselben zu substituiren, da dasselbe meist den

Appetit nicht stört (nur bei längerer Dauer der Darreichung entsteht bisweilen eine Intoleranz des Magens gegen das Mittel) und die Defaecation nicht verzögert. Nicht selten kommen auch Fälle vor, wo das Chloralhydrat hypnotische Effecte zeigt, nachdem das Opium oder Morphin ihre Dienste versagten. Es lässt sich jedoch nicht behaupten, dass Chloralhydrat im Allgemeinen sicherer als Opium und Morphin hypnotisch wirkt, da von einer Unfehlbarkeit des Medicaments durchaus nicht die Rede sein kann; namentlich da, wo die Schlaflosigkeit in Folge von schmerzhaften Affectionen besteht, scheint die Wirkung der Opiate geradezu sicherer zu sein. Dagegen hat es den Vorzug, dass es den Schlaf rascher hervorbringt als Opium, und in allen Fällen, wo schleunige Herbeiführung von Schlaf nothwendig ist, kennen wir kein zuverlässigeres Mittel als das Chloralhydrat. Dahin gehören z. B. Krankheitszustände, wie sie zuerst den Ruf des Chloralhydrats begründeten, wo im Verlaufe von schweren Verletzungen bei Trinkern sich Delirien entwickeln und wo durch die Unruhe der Patienten, z. B. bei Comminutivfracturen, ein ungünstiger Ausgang mit Sicherheit zu erwarten ist. Seit der Benutzung des Chloralhydrats in einem solchen Falle durch B. v. Langenbeck liegt eine Anzahl analoger Beobachtungen, in denen das Chloralhydrat geradezu lebensrettend erscheint, vor (Dobson, Lausdown). Ein weiteres, das Chloralhydrat indicirendes Moment bildet das Lebensalter der Patienten, indem das Mittel bei Kindern weit weniger gefährlich erscheint als Morphin und Opium (Bouchut, Oppenheimer, Rupstein u. A.). Auch bei Schlaflosigkeit alter Leute kann es ohne Gefahr gereicht werden (Ogle, Moleschott). Eine Inconvenienz des Chloralhydrats giebt der schlechte Geschmack des Mittels, welcher selbst durch die besten Syrupe nicht völlig verdeckt werden kann. Auch lässt es sich nicht wie das Morphin subcutan appliciren, da es zu starke Entzündung bedingt. Bei manchen Patienten, die an einfacher nervöser Insomnie leiden, scheint Chloral einen nicht so erquickenden Schlaf herbeizuführen (Lange).

Ueber die günstigen Wirkungen des Chloralhydrats als Hypnoticum liegen Beobachtungen bei den verschiedensten Arten von Insomnie vor, so bei Schlaflosigkeit durch geistige Ueberanstrengung (Ogle), bei *Insomnia potatorum* (Ballantyne) u. s. w. Bennett zieht das Chloralhydrat bei Phthisikern den Opiaten vor, weil es nicht so depressirend wie diese wirke; neben der Nachtruhe schafft es hier auch eine Verminderung der copiösen Schweisse. Auch bei Gehirnkrankheiten ist Chloralhydrat ohne Scheu zu geben, selbst bei Gehirnentzündung (Meningitis, Insolation), und bei Erschütterung von Gehirn und Rückenmark hat es wiederholt guten Schlaf herbeigeführt (Strange, Cochrane). Minder empfehlenswerth scheint wegen der depressirenden Einwirkung des Chloralhydrats auf das Herz die Anwendung als Schlafmittel bei Individuen, welche an Herzklappenfehlern oder an Aneurysma aortae leiden, wo nicht selten durch die gewöhnlichen Chloralgaben Collapsus mit Schwäche und Irregularität des Pulses beobachtet ist (Da Costa, Drasche, Habershon), obschon andererseits Fälle existiren, wo das Mittel bei Herzkranken ohne jeden Schaden gereicht wurde. Nach Strange wirkt Chloralhydrat in kleinen Dosen sogar tonisirend und excitirend auf das Herznervensystem, so dass es in solchen keineswegs contraindicirt erscheinen kann. Ausgedehnte Erfahrungen liegen über die günstigen Effecte des Chloralhydrats in febrilen Affectionen, besonders im Typhus, vor, wo das Mittel im Wesentlichen, namentlich beim Eintritte von Collapsus, contraindicirt erscheint, jedoch um hypnotische Effecte zu erzielen, manchmal eine Erhöhung der Dosis nothwendig ist (Fraser und Muirhead). Russell bezeichnet Chloralhydrat überhaupt als das beste und zuverlässigste Hypnoticum im Typhus, da es nicht die ihm zugeschriebene Neigung zu Paralyse der Brustmuskeln und Respirationstörungen bedinge. Wie mit dem Opium können auch mit dem Chloralhydrat im Typhus Excitantien verbunden werden. Günstig wirkt Chloralhydrat als Hypnoticum auch bei Rheumatismus acutus, Scarlatina, acuten Gichtanfällen, Peritonitis und Metritis puerperalis und bei febrilen Affectionen überhaupt. Donovan warnt dagegen vor der Anwendung als Hypnoticum bei Pneumonie, Pleuritis und allen mit Beeinträchtigung der Respiration verbundenen Affectionen, wo er wiederholt nach 1,5 Delirium, Collaps und selbst Tod erfolgen sah.

Da der Chloralschlaf meist ohne Träume verläuft, erklären sich die gün-

stigen Effecte, welche einzelne Aerzte bei Pollutionen (Porta) und Enuresis nocturna beobachteten, während das Mittel in anderen Fällen erfolglos blieb.

Bei Anwendung des Chloralhydrats als Sedativum bei Geisteskranken scheint dasselbe für sich dem Opium und Morphin nachzustehen, obschon es auch hier als Hypnoticum verwendet werden kann. Am meisten bewährt hat es sich bei Delirium potatorum und bei Puerperalmanie, während bei sonstigen Psychosen selten eine andauernde Beruhigung geschafft wird. Einen günstigeren Erfolg hat entschieden eine Combination von Chloralhydrat und Morphin (sog. Morphinchloral).

Das Chloralhydrat ist trotz der ihm fehlenden directen Action auf Psychopathien eine Wohlthat für die Irrenanstalten, und wenn sich auch die Erwartung von Jastrowitz, dass es die Zwangsjacke in denselben überflüssig machen werde, vielleicht nicht überall ganz realisirt hat, so ist es doch für die Herstellung der Nachtruhe unentbehrlich und bedingt bei tobenden Kranken auch häufig Besserung des Allgemeinbefindens in Folge des Aufhörens der allgemeinen Kräftevergeudung. Die schlafmachende Wirkung ist an keine Form der Psychopathie gebunden; bei grösseren Dosen folgt auf den Schlaf mitunter noch ein Zustand von Schläfrigkeit. Die längere Darreichung macht oft der Eintritt von unwiderstehlichem Widerwillen gegen das Medicament oder von chronischen Intoxicationssymptomen unmöglich. Mitunter steigert der längere Gebrauch in chronischen Fällen die Aufregung. — Seit dem oben erwähnten glücklichen Erfolge, welchen B. v. Langenbeck in einem ohne das Mittel zweifellos letal verlaufenen Falle von Delirium potatorum (traumaticum) hatte, ist die Bedeutung desselben für die Behandlung dieses Leidens durch zahlreiche Beobachtungen festgestellt. Drasche bezeichnet die Behandlungsmethode als billiger und weit rascher zum Ziele führend als die Opiumtherapie; Da Costa, der in schwereren Fällen Morphin vorzieht, fand es besonders wirksam im Anfange, wo es oft die Hallucinationen beseitigt und dadurch das Leiden gewissermaassen coupirt. Hayne bezeichnet Chloralhydrat (1,2—2,0) in Verbindung mit Bromkalium (2,0—2,5), mit oder ohne kleine Mengen Spirituosa, als das beste Hypnoticum beim Säuerwahnsinn, das in der Regel nach 2—3 Dosen seine Schuldigkeit thut. Es fehlt indessen keineswegs an Misserfolgen und jedenfalls ist, wenn schon manche Kranke Tagesgaben von 12,0—15,0 toleriren, das Vorkommen von intensivem Collaps und selbst von plötzlichen Todesfällen (Pinching, Frank) nach kleinen Dosen geeignet, zur vorsichtigen Anwendung gerade bei Alkoholismus zu mahnen. Rasche günstige Wirkung bei Puerperalmanie haben Clouston, Alexander, Teller, Mandesley u. A. constatirt; in manchen Fällen schafft es zwar Schlaf, aber keine Beruhigung; in anderen führt es zu Collapsphänomenen.

Auch als Anästheticum und Anodynum kommt dem Chloralhydrat nur eine geringere Bedeutung als andern in dieser Richtung angewendeten Mitteln zu.

Ein eigentliches Anästheticum ist das Chloralhydrat in den gewöhnlichen Gaben nicht. Im gewöhnlichen Chloralschlaf ist schon die kleinste chirurgische Operation (Anlegung von Suturen, Onkotomie, Haarseilziehen) im Stande, den Schlaf zu unterbrechen, und selbst bei dem durch intern verabreichte grössere Chloralhydratmengen hervorgebrachten Schläfe kommt nur vorübergehend wirkliche Anästhesie vor. Nichtsdestoweniger kann man durch Darreichung von 0,2—0,3 Chloralhydrat nach der Vollendung grösserer chirurgischer Operationen in vielen Fällen längeren Schlaf, aus welchem die Patienten ohne Schmerzen erwachen, herbeiführen (Porta, Demarquay, Minich). Miquel will prophylactisch namentlich bei Operationen an den Urogenitalorganen 1,0 und nach der Operation kleinere Dosen verabreichen. Strange empfiehlt Chloralhydrat Abends 1—2 Stunden nach der Application von Vesicatoren an-



zuwenden. Bei Neuralgien und ähnlichen Leiden, z. B. Herpes Zoster, auch bei rheumatischen und gichtischen Schmerzen wirkt Chloralhydrat in vielen Fällen hypnotisch und schmerzlindernd, doch steht es dem Morphin und Atropin nach, indem heftige und persistente Schmerzen dadurch nicht gehoben werden und bei solchen der hypnotische Effect entweder ausbleibt oder nur von kurzer Dauer ist (Ogle, Maxwell Adams). Nur selten scheint es bei Neuralgien curativ zu wirken. Günstigere Erfolge gewährt Chloralhydrat bei internen Schmerzen, z. B. bei Cardialgie (Swift, Walker), wo es jedoch bei Structurveränderungen der Magenwandungen wegen seiner reizenden Wirkung, die selbst zu Magenblutungen führen kann (Liebreich), contraindicirt ist, ferner bei Koliken, namentlich auch bei Bleikolik (Da Costa), endlich bei Blasen- und Uterinschmerzen (More Madden, Brady), bei Dysmenorrhoe und Tenesmus vesicovaginalis (Verga und Valsuani). Auch schmerzhafte Nachwehen schwinden unter dem Einflusse des Mittels (Madden). Playfair empfiehlt 2 Gaben von 1,0 binnen 20 Minuten und eine dritte nach einer Viertelstunde bei normalen Geburten an Stelle des Chloroforms; Chiarleoni verordnet zu demselben Zwecke alle 10 Minuten einen Esslöffel voll einer Lösung von 6,0 in 100,0 Wasser oder ein Halbklystier (4,0:60). Die Wehentätigkeit wird dadurch nicht unterbrochen. Mauriac hatte sehr günstige Erfolge bei Schmerzen auf syphilitischer und venerischer Basis, Verga und Valsuani bei hysterischer Hyperästhesie; dagegen übt das Mittel auf die excentrischen Schmerzen der Tabetiker (Moleschott, Weidner) keinen Einfluss. Besondere Anwendung fand Chloralhydrat bei cutaner Hyperästhesie und Prurigo senilis (Ipovic), Zahnweh und Panophthalmie (Keyser).

Ob das Chloralhydrat örtlich anodyn wirkt, steht dahin. Die Erfolge bei Neuralgien und Rheumatalgien stehen denjenigen der subcutanen Morphin-injection jedenfalls nach. Bei Variola empfahl es Pollard in Verbindung mit Kalkwasser.

Ausgedehnte Empfehlungen fand Chloralhydrat bei spasmodischen Affectionen der Respirationsorgane, namentlich auch bei Keuchhusten (Murchison, Adams, Rigden, Lorey) und Asthma (Plomley), aber auch bei einfachem Reizhusten bei Bronchitis (Maxwell Adams); doch fehlt es hier nicht an Misserfolgen und scheint mir bei Hustenreiz im Allgemeinen Morphin bessere Dienste zu leisten. Leavitt fand Chloralhydrat auch bei Singultus im Typhus wirksam.

Von günstigerem Erfolge scheint die Anwendung des Chloralhydrats bei convulsivischen Leiden zu sein, besonders bei Eclampsia gravidarum und puerperarum, auch bei urämischen Krämpfen in andern Lebensperioden, ferner bei Tetanus und vielleicht auch bei Chorea.

Für die Anwendung bei Eklampsie liegen seit der Empfehlung durch Martin eine Reihe von günstigen Zeugnissen vor, ja mehrere Aerzte stellen das Mittel geradezu über Opium und Chloroform. Andererseits fehlt es aber auch nicht an Nichterfolgen (C. Paul, Dujardin-Beaumetz). Auch bei Epilepsie kann Chloralhydrat benutzt werden, um bei Eintritt prämonitorischer Symptome den Anfall zu coupiren (Weidner, Zani). Pallen hält Chloralhydrat im Säuglingsalter für indicirt zur Verhütung epileptiformer Convulsionen, welche mit Kolik einhergehen. Bei hysterischen Convulsionen hat Chloralhydrat die nämlichen Bedenken gegen sich wie Opium. Im Tetanus ist die Anwendung des Chloralhydrats nicht irrationell und verdient jedenfalls schon der genaueren Dosirung wegen vor dem Curare den Vorzug. In der Mehrzahl der bis jetzt vorliegenden Fälle von Behandlung des Tetanus mit intern oder in Infusion angewandtem Chloralhydrat wurde der Tod durch das Mittel nicht abgewendet, gleichviel, ob dasselbe in fractionirten oder in grossen Dosen angewendet wurde, welche letztere offenbar palliativ viel günstiger wirkten; in den günstig verlaufenen Fällen wurden in der Regel ausser Chloralhydrat noch andere Medicamente gegeben, so dass sich der therapeutische Werth nicht sicher feststellen lässt. Bei Tetanus toxicus (Strychninvergiftung) hat sich Chloralhydrat bereits in mehreren Fällen trefflich bewährt. Mit Strychnin vergiftete

Kaninchen werden durch nicht letale, aber tiefen Schlaf herbeiführende Dosen Chloralhydrat constant gerettet, wenn die subcutan injicirte Strychninmenge das 5—6fache der minimal letalen Gabe nicht übersteigt, und bei grösseren Strychninmengen vermag Chloral den Exitus letalis in so ausserordentlicher Weise hinauszuschieben, dass die Thiere statt nach 5 Min. erst in 18 Std. zu Grunde gehen (Th. Husemann und Kröger). Die gleiche antidotarische Wirkung besitzt Chloral auch gegen Brucin des Handels und gegen Thebain, dagegen in weit geringerem Grade gegen die nach Art des Pikrotoxins wirkenden Krampfgifte, wie Codein und Santonin, wo höchstens die anderthalbfach letale Dosis durch Chloralhydrat unschädlich gemacht wird, gar nicht gegen Ammoniakalien, Barytsalze und Phenol (Th. Husemann, Fliescher und Wehr). Beim Strychnismus macht der rasch hypnotische Effect das Chloralhydrat antidotarisch geeigneter als Morphin und Cannabis, und die Aufhebung des Bewusstseins erspart den Vergifteten Qualen der intensivsten Art, die er unter Behandlung mit Curare oder Bromkalium erduldet. Bromkalium verstärkt die antidotarische Wirkung des Chlorals nicht (Th. Husemann und Hessling). Ueber die Wirkung bei Chorea mit sehr heftigen Zuckungen divergiren die Angaben; nicht nur palliative Effecte, sondern geradezu rasche Heilungen werden von Bouchut, Strange, Russel, Cantani verbürgt, während in vergleichenden Versuchen von Althaus sich der tonisirenden Behandlung gegenüber keine erhebliche Differenz zeigte und Da Costa und Cairns gar keine Erfolge sahen. Bei Spasmus sutorius wandte Drasche Chloralhydrat mit Erfolg an, ebenso Verga und Valsuani bei spastischen Contracturen Paralytischer.

Die unbestreitbaren Erfolge, welche man bei innerer Anwendung von Chloralhydrat bei Ruhr (Curci, Newell), bei Sommerdiarrhoe kleiner Kinder (Tyson) und bei acuter Gastroenteritis im kindlichen Lebensalter (Kjellberg) constatirt hat, hängt offenbar mit der gleichzeitig dem Chloral zukommenden antiseptischen und irritirenden Wirkung zusammen, welche das Mittel auch zu einem vielfach zum Verbande bei ulcerativen Zuständen der Haut und verschiedener Schleimhäute oder auch zur Erzeugung adhäsiver Entzündung verwendeten gemacht haben.

Chloralhydratlösungen wurden zuerst von Dujardin-Beaumetz und Hirne zum Verbande bei Gangrän im Gefolge fieberhafter Krankheiten, bei phagedänischem Schanker und bei phagedänischen und krebigen Geschwüren überhaupt, wo Chloral wie Iodoform zugleich desodorisirend wirken soll, zur Bepinselung bei Stomatitis ulcerosa membranosa, bei Vaginitis und Muttermundgeschwüren, als Collyrium bei Ophthalmia neonatorum und chronischer Conjunctivitis, endlich zu Injection bei Empyem und eiternden Cysten, wobei selbst grössere Mengen keine entfernten Erscheinungen produciren sollen, empfohlen. Porta benutzte Chloralhydrat in  $\text{ää}$  oder 2 Th. Wasser gelöst zur Hervorrufung adhäsiver Entzündung in serösen Cysten (Hydrocele, Ranula, Ganglion, Struma cystica), sowie bei Teleangiectasien und Varicen der Saphena und empfiehlt sie namentlich in letzterem Falle als den Injectionen von Metallsalzen an Gefährlichkeit nachstehend. Die Erfolge bei serösen Cysten sind dagegen nicht so günstig wie bei Iodinjction, auch erfolgte in 1 Falle von Hydrocele Suppuration und Brand. Wreden und Lucae benutzten das Mittel zur Injectionen (1:30) in die Trommelhöhle bei trocknen Mittelohrkatarrhen. Bei erectilen Geschwülsten spritzte Pupi 10% Chlorallösung ein, was selbst bei halbjährigen Kindern, wo 18 derartige Injectionen gemacht werden konnten, ohne Schaden geschehen kann. Ortega rühmte 1% Lösung als souveränes Mittel bei tödten Fusschweissen, Martineau 5% Solution leicht erwärmt bei Pityriasis capitis. Peyraud verwendete Pasten aus  $\text{ää}$  Chloral und Traganth zum Ersatz der Canquoinschen Paste und äusserlich applicirt als Vesicator, welche letztere Wirkung jedoch etwas langsamer als beim Cantharidenpflaster einzutreten scheint. Marc Sée empfahl 1% Chlorallösung zum antiseptischen Wundverbande. 2% Lösung wirkte zu reizend. Nach Lohmüller wirkte 1% Solution bei atonischen Geschwüren selbst schneller als Höllenstein, desgleichen

bei scrophulösen Ulcerationen und *Eczema chronicum*. Marc Sée gebrauchte Chloral bei Wunden der Lippe und des Mundes, bei Halsaffectionen und Fötor oris, Vallin wendete 1% Waschungen und Bäder mit 20,0 Chloral zur Desinfection bei Blatterkranken an. Nach Sée wird Erysipel und diffuse Phlegmone durch 3tägige Anwendung 1% wässriger Lösung beseitigt und empfiehlt sich Chloralhydrat auch bei Ozaena und Stomatitis. Ciattaglia empfahl mit Chlorallösung getränkte Charpie gegen Hämorrhagien, besonders bei Gebärmutterkrebs. Parona und Valerani die Behandlung von Varicen nach dem Portaschen Verfahren. Coignard und Guyon die Behandlung varicöser Fussgeschwüre mit 1% Lösung, wobei ein die Vernarbung fördernder Einfluss nicht nachweisbar ist, so dass das Mittel nach einiger Zeit ausgesetzt werden muss, ferner bei Lupus, Bubonen und breiten Condylomen, bei welchen letzteren 1% Solution vollständig ausreichend ist. Bei Gonorrhoe wirkt 4% Chloralsolution in 4 Tagen heilend (Keen und Dickson); 1% Lösung ist unwirksam. Bei Cystitis sind Chloralinjectionen zu irritirend. Bei nicht operirbaren Krebsen sind nach Coignard 4% Lösungen am zweckmässigsten, bei Uteruskrebs Suppositorien mit 0,2 Chloralhydrat. Crequy empfiehlt 1% Chloralsolution als Verbandmittel bei Mastdarmfisteln, die bei 15maliger Application danach geheilt werden. Zu Suppositorien empfiehlt Mayer eine Mischung von 3,0 Chloral, 3,0 Cacaobutter und 2,0 Cetaceum. Bei Fisteln und Caries hat Dickson ausserordentlich günstige Erfolge von Chloralsolutionen gesehen.

Man giebt Chloralhydrat als Hypnoticum zu 0,5—1,0—2,0, welche Dosen nur bei besonders dringenden Fällen überschritten werden dürfen. Als Sedativum wird es zu 0,2—0,5 1—2stdl. gegeben, welche Gaben bei Kindern als hypnotische zu gebrauchen sind.

Die kleineren hypnotischen Dosen sind bei Personen mit Herzaffectationen stets zu benutzen, grössere besonders bei Delirium tremens, Puerperalmanie und Tetanus, überall aber mit Vorsicht. Zu kleine Dosen wähle man übrigens auch beim ersten Versuche nicht, da gerade diese mitunter excitirend statt sedirend wirken. Die Maximalgabe der Phkp. beträgt 3,0 pro dosi und 6,0 pro die.

Am zweckmässigsten wird das Mittel intern und im Klystier gegeben, während die keineswegs unwirksame subcutane Injection wegen Schmerzen und Abscessbildung sich verbietet.

Intern sind Pulver in Gallertkapseln (Limousin) wegen irritativer Wirkung unzuweckmässig; auch Pillenform ist wegen der grossen Anzahl Pillen, welche als Hypnoticum nöthig sein würden, unpassend. Besser sind Boli, namentlich bei längerer Anwendung, z. B. bei Geisteskranken (Zani); am zweckmässigsten bei nicht zu langer Anwendung jedoch ist Verordnung in einer Mixtur, welche stets Zusatz von Schleimen erfordert, um örtliche Reizung zu vermeiden. Der schlechte Geschmack wird am meisten durch Syrupus Aurantii cort., Syr. Rub. Id. oder Syrupus toltanus (Squire) verdeckt. Bei Geisteskranken ist auch Darreichung in Porter empfohlen. Man giebt das Mittel stets bei vollem Magen. Zum Klystier braucht die Dosis nicht erhöht zu werden; auch hier ist Zusatz von Amylum nöthwendig, weil sonst starkes Brennen eintritt. Letzteres ist auch bei der Form der Suppositorien intensiv der Fall, welche, wie die der Vaginalkugeln oder der mit Chloralhydratsalbe bestrichenen Vaginaltampons, sich höchstens bei Schmerzen der im kleinen Becken gelegenen Organe eignen würde. Chloralsalben zum epidermatischen Gebrauch bei Neuralgien u. s. w. sind, da ihr local anästhesirender Effect sehr problematisch ist, irrelevant. Drasche empfiehlt dazu Einreibungen aus 2,0—4,0 Chloralhydrat und 8,0 Glycerin, wodurch zuerst gelinde Kühle, später Nachlass der Schmerzen erfolge. Zani mischte bei Geisteskranken, welche stark schnupfen, Chloralhydrat unter den Tabak, was jedoch zu Entzündung und Eiterbildung in den Choanen (Jastrowitz) führen kann. Von Oré wurde 1874 die Infusion von Chloralhydrat als Mittel zu Anästhesie empfohlen, doch hat das von ihm und von Deneffe selbst zu 10,0 in wenig verdünnter Lösung eingespritzte Mittel in weniger als 100 Versuchen mindestens 3mal den Tod der betreffenden



Patienten herbeigeführt. Dieser Umstand und das wiederholt bei Thierversuchen beobachtete Auftreten von Embolien oder von Hämaturie und Hämoglobinurie (Vulpian, Colin) macht die Methode völlig verwerflich.

Als Hypnoticum und Sedativum wird Chloralhydrat nicht selten mit analog wirkenden Mitteln combinirt, welche zum Theil entschieden die Wirkung verstärken. Bei Psychopathien, Delirium tremens und Neuralgien ist eine häufig als Morphinchloral bezeichnete Mischung sehr empfehlenswerth und offenbar weit kräftiger sedativ; es scheint dabei das Chloral der Obstipation und das Morphin der Einwirkung des Chlorals auf das Herz entgegenzuwirken. Viel gerühmt ist Verbindung mit Bromkalium, wodurch mitunter die hypnotischen Effecte auffallend verstärkt und prolongirt werden. Weniger gebräuchlich ist Combination mit Digitalis (bei Herzkranken nach Ogle) oder mit Aether u. a. Excitantien (bei Dementia paralytica nach Macleod oder bei Nervosität nach Ogle). Th. Clemens empfahl Nachtrinkenlassen einer Kalisaturation, um die Chloroformbildung im Blute zu befördern.

Im Recept ist die Benutzung der Benennung Hydras Chlorali, welche zuerst dem Mittel beigelegt wurde, unzweckmässig, da die Abkürzung Hydr. chlor. leicht zu Verwechslung mit Hydrargyrum chloratum führen könnte.

#### Verordnungen:

- |   |  |
|---|--|
| <p>1) R<br/> <i>Chlorali hydrati</i> 1,0—2,0<br/> <i>Aquae Menth. pip.</i><br/> <i>Mucilaginis Gummi Arab.</i><br/> <i>Syrupi Aurantii corticis</i> aa 10,0<br/> <i>M. D. S.</i> Auf einmal vor dem Schlafengehen zu nehmen. (Als Sedativum 1—2stdl. einen Theelöffel.)</p> | <p><i>Decocti Althaeae</i> 150,0<br/> <i>Succi Liquirit. dep.</i> 10,0<br/> <i>M. D. S.</i> Abends 1 Esslöffel. (Morphinchloral von Jastrowitz.)</p>   |
| <p>2) R<br/> <i>Chlorali hydrati</i> 5,0<br/> <i>Aq. destill.</i> 10,0<br/> <i>M. D. S.</i> Abends 1 Theelöffel voll in Bier, Wein oder Limonade. (Schlaftrunk.)</p>  | <p>4) R<br/> <i>Chlorali hydrati</i> 4,0<br/> <i>Decocti Alth.</i> 50,0<br/> <i>Mucilaginis Amyli</i> 100,0<br/> <i>M. D. S.</i> Die Hälfte zum Klystier. (Im Fall dasselbe abgeht, wird die andere Hälfte nachgegeben. Martin.)</p>           |
| <p>3) R<br/> <i>Chlorali hydrati</i> 5,0—10,0<br/> <i>Morphini hydrochlorici</i> 0,1 (dgm. 1)</p>   | <p>5) R<br/> <i>Chlorali hydrati</i> 2,0<br/> <i>Gi. Arab.</i> 1,0<br/> <i>Syrupi simpl.</i><br/> <i>Pulv. rad. Liquiritiae</i> aa q. s.<br/> <i>ut f. l. a. bolus.</i> <i>D. S.</i> Auf einmal zu nehmen. (Bei Geisteskrankheiten. Zani.)</p> |

**Surrogate des Chloralhydrats.** — Von den als Surrogat des Chloralhydrats empfohlenen Substanzen hat nur das bei Einwirkung von Chlor auf Aldehyd entstehende Butylchloral einige praktische Bedeutung gewonnen. Dieser von Krämer und Pinner entdeckte, zuerst als Chlorsubstitutionsproduct des Aldehyds der Crotonsäure betrachtete und als Crotonchloral bezeichnete Körper, welcher krystallinische Flittern bildet, die sich nur schwierig in Wasser lösen, bedarf zur Erzeugung von Hypnose weit grösserer Dosen von Chloral, so dass selbst 6,0 beim Erwachsenen (Emmert) keinen Schlaf erzeugen, während erst 2,5 bei Kindern (Liebreich, Bouchut) hypnotisch wirken. Bei Thieren ist die Narkose nur  $\frac{1}{3}$  so lang wie beim Chloral und geht mit starker Respirationsverlangsamung bei relativ geringer Abnahme der Pulsfrequenz einher (Liebreich, Eulenburg u. Windelschmidt). Eigenthümlich ist dem Mittel, dass es vorwaltend Anästhesie der Hirnnerven bedingt, während es die Sensibilität am Rumpfe weit weniger herabsetzt, weshalb es besonders als Palliativum bei Neuralgie des Trigeminus (Liebreich, Yeo, Emmert, Berger) oder zur Herabsetzung der Empfindlichkeit des Auges oder des Gesichtes vor Operationen anwendbar erscheint. Yeo sah vorzügliche Erfolge bei Krampf- und Reizhusten,

Nicholson bei Keuchhusten. Berger wandte das Mittel bei Tabetikern gegen neuralgische Schmerzen mit Erfolg an. Die von ihm angegebene Dosis (als schmerzstillendes Mittel 0,1—0,3, als Hypnoticum 0,3—1,0) reichen nicht aus. Liebreich empfiehlt als beste Darreichungsform eine Lösung von 5,0—10,0 in 20,0 Glycerin und 30,0 Wasser zu 1—3 Esslöffel, am besten nach der Mahlzeit genommen. Ob es indicirt ist, in Fällen, wo hohe Dosen Chloralhydrat notwendig sind, Butylchloral mit diesem zu combiniren oder bei Herzkranken das Chloralhydrat durch Butylchloral zu ersetzen, scheint zweifelhaft, da es auf den Blutdruck in derselben Weise wie Chloralhydrat einwirkt (von Mering) und leicht zu Arrhythmie führt. Im Thierkörper verbindet sich Butylchloral mit Glycuronsäure und geht als Urobetylchloralsäure in den Harn über (von Mering).

Ein acetalähnend sehr empfehlenswerthes Chloralsurrogat ist das meist als Acetal bezeichnete, in 18 Theilen Wasser lösliche, mit Weingeist in jedem Verhältnisse mischbare, aromatisch und etwas kühlend schmeckende Diäthylacetal (Aethylidendiäthyläther), ebenfalls ein Nebenproduct bei der Chloralbereitung, welches nach Analogie des Chlorals auf das Grosshirn, dagegen nicht auf das Herz wirkt und in Dosen bis zu 10,0 bei kräftigen Erwachsenen rein hypnotisch wirkt. Das Mittel, welches in Emulsion mit Mandelsyrup oder im Klystier verabreicht werden kann, empfiehlt sich zum Ersatz des Chloralhydrats bei bestehenden ulcerativen Processen im Magen oder Herzkrankheiten (von Mering). Eine dem Acetal analoge Wirkung besitzt auch Dimethylacetal, das allerdings doppelt so schwach ist, jedoch wegen seines niederen Siedepunkts sich zu Inhalationen eignet und mit  $\frac{1}{2}$  Volum Chloroform gemischt eine ausgezeichnete Narkose liefert, in welcher der Blutdruck nicht herabgesetzt wird (von Mering). Auch die als Paraldehyd bezeichnete polymere Modification des Aldehyds wirkt hypnotisch, ohne die Herzthätigkeit direct zu beeinflussen (Cervello).

Dem Chloralhydrat in seiner Wirkung nahestehend scheint auch das Bromalhydrat, das entsprechende Bromsubstitutionsproduct, doch ist danach der Schlaf nicht so tief und die Excitation grösser (Steinauer, Dougall). Bei Thieren ist Bromalhydrat bedeutend giftiger als Chloralhydrat (letale Dosis beim Kaninchen nur 0,3). Die Einwirkung auf das Herz ist intensiver; bei Vergiftung treten häufig tonische Krämpfe und fast constant Speichelfluss ein (M'Kendrick). Therapeutische Anwendung hat es trotz anscheinend günstiger sedativer Effecte bei Epileptikern (Steinauer) nicht eben gefunden.

#### d. *Encephalica mydriatica*, Pupillenerweiternde Hirnmittel.

Unter dieser Bezeichnung fassen wir die officinellen Theile verschiedener zu den Solaneen gehöriger Pflanzen und daraus dargestellte Stoffe zusammen, welche durch ihren Einfluss auf die Pupille sich von allen Neurotica unterscheiden. Ihre Zusammengehörigkeit ergibt sich übrigens auch aus einer grösseren Anzahl gemeinsamer Einwirkungen auf einzelne Theile des Nervensystems. Von Seiten des Gehirns machen sich bei toxischen Dosen derartige Störungen geltend, dass man die hier zu betrachtenden Stoffe als *Narcotica delirifacientia* s. *spileptifacientia* in früherer Zeit zusammenzufassen gewohnt war.

**Atropinum sulfuricum**, *Atropium sulfuricum*; **Atropinsulfat**, schwefelsaures Atropin. **Folia Belladonnae**, *Herba Belladonnae*; **Belladonnablätter**, **Tollkirschenblätter**.

Das Atropinsulfat ist das in der Heilkunde gebräuchlichste Salz eines als Mydriaticum bekannten Alkaloids, welches die eigen-

thümliche narkotische Wirkung der im mittleren und südlicheren Europa, so wie auch in Kleinasien einheimischen Solanee *Atropa Belladonna* L. bedingt, welche wegen ihrer, den Kirschen im Aeusseren ähnlichen, leicht cerebrale Störungen veranlassenden Beeren bei uns als Tollkirsche und in Folge ihrer früheren Benutzung als *Cosmeticum* in Italien (Mathiolus) als *Belladonna* bezeichnet wurde und von der die Blätter noch gegenwärtig als Arzneimittel in verschiedener Weise Anwendung finden.

Die *Folia Belladonnae* sind höchstens 2 Dm. lang und 1 Dm. breit, spitz, elliptisch, keilförmig in den Blattstiel auslaufend, der mehr als um die Hälfte kürzer als die Blätter ist, dünn, kahl oder unten mit sehr sparsamen Flaumhaaren versehen, oben bräunlich-grün, unten grau, beiderseits weiss punktiert, von widerlich bitterlichem Geschmacke und ohne Geruch. Der Atropingehalt der Belladonnablätter ist während der Blüthezeit bis zur Zeit der Fructification am bedeutendsten (Schroff, Lefort, Gerrard); in Wurzel und Blättern im Juni um  $\frac{1}{3}$  grösser als im Mai, auch scheint derselbe in cultivirten Pflanzen geringer als in wilden zu sein. Gerrard fand im September in Blättern von Culturpflanzen 0,4 % Atropin, dagegen in wilden 0,58 %. Diese Zahlen sind etwas höher als die von Lefort (1872) gefundenen (0,4—0,48), dagegen niedriger als die von Dragendorff ermittelten (1873). Der Asparagingehalt der Belladonnablätter ist für deren Wirkung irrelevant.

Neben der *Folia Belladonnae* war früher auch noch die *Belladonnawurzel*, *Radix Belladonnae*, officinell, deren Atropingehalt unter verschiedenen Verhältnissen ausserordentlich zu variiren scheint. Nach Schroff ist die während der Blüthezeit gesammelte *Radix Belladonnae* doppelt so giftig wie im Herbst oder Frühjahr. Nach Lefort sind junge Wurzeln wegen ihres relativ grösseren Gehaltes an Rinde reicher an Atropin (0,6 %) als alte (0,25—0,31 %). Gerrard constatirte in der Wurzel wilder Pflanzen 0,45, in der von cultivirten Pflanzen nur 0,35 %. Zur Darstellung des Atropins dient in Fabriken ausschliesslich die *Belladonnawurzel*.

Das Atropin, welches 1831 von Mein in der Tollkirsche entdeckt wurde, bildet farblose und geruchlose, seidenglänzende Büschel von Säulen und Nadeln von unangenehm bitterem, lange anhaltendem Geschmacke. Es reagirt alkalisch, schmilzt bei 90° und sublimirt bei vorsichtigem Erhitzen. Es löst sich in etwa 300 Th. kaltem und 58 Th. kochendem Wasser, äusserst leicht in Weingeist und Amylalkohol, auch in Chloroform (3 Th.). Mit Säuren bildet es in Wasser und Weingeist lösliche Salze, welche theilweise krystallisiren. Bei längerem Contact mit Luft wird das Atropin unkrystallisirbar, gelb und widrig riechend. Durch Zersetzung mit Kaliumchromat und Schwefelsäure liefert Atropin Benzoesäure und Propylamin (Ludwig und Pfeiffer). Bei längerer Einwirkung von rauchender Salzsäure, Barytwasser oder Natronlauge wird das Atropin schon bei gewöhnlicher Temperatur in einen basischen Körper, das Tropin,  $C^8H^{16}NO$ , und in Tropasäure,  $C^9H^{10}O^3$ , gespalten; beim Erhitzen auf 100—110° entstehen dabei noch zwei andere Säuren von der Formel  $C^9H^8O^3$ , die Atropasäure und Isatropasäure. Keines dieser Spaltungsproducte besitzt die Wirkung des Atropins auf die Pupille, wohl aber das Tropin die auf Herz und Peristaltik (Fraser). Aus dem Tropin hat Ladenburg das Atropin künstlich dargestellt.

Das einzige officinelle Atropinsalz, das Atropinsulfat, welches das in England auch jetzt noch häufig benutzte Alkaloid bei uns fast völlig verdrängt hat, bildet ein weisses, krystallinisches Pulver, welches mit gleichen Theilen Wasser und mit 3 Th. Weingeist neutrale Lösungen giebt. Von Aether und Chloroform wird Atropinsulfat nicht aufgenommen. Die Lösungen schmecken selbst bei 1000facher Verdünnung bitter und kratzend. Früher wurde auch eine Zeit lang baldriansaures Atropin, *Atropinum valerianicum*, namentlich als Antiepilepticum benutzt, welches qualitativ und quantitativ mit Atropinsulfat in seiner Wirkung übereinstimmt.



Neben dem Atropin kommt in der Belladonnawurzel nach Ladenburg noch Hyoscyamin (leichtes Atropin) und ein isomeres, amorphes Alkaloid, das Belladonnin von Hübschmann, vor, welche die mydriatische Wirkung verstärken. In den Blättern findet sich auch Asparagin.

Die Wirkung der Belladonnapräparate fällt mit der des Atropins zusammen, weil keine modificirend wirkenden Stoffe in ersteren sich finden, doch wird durch manche indifferente Bestandtheile derselben die örtlich irritirende Wirkung des Alkaloids und seiner Salze gemildert.

Oertliche Irritation als Folge von Atropin manifestirt sich durch Brennen bei epidermatischer und endermatischer Application (Bouchardat und Stuart), welche Salben aus Belladonnaextract nicht bewirken. Auch tritt ein solcher Reiz öfters bei Application von Atropinsulfat auf die Conjunctiva auf, zumal wenn Atropinlösung bei schon bestehendem Bindehautkatarrh in Anwendung kommt, und bei manchen Personen, welche eine besondere Empfindlichkeit gegen das Mittel zu besitzen scheinen. Bei manchen wird dann Lösung von Belladonnaextract besser ertragen, auch mindert ein Zusatz von Gummi zur Atropinlösung die Reizbarkeit; bei Anderen rufen auch solche Collyrien Röthung und Schwellung der Bindehaut, erysipelatöse Lidanschwellung und Thränenfließen hervor. Bisweilen bilden sich auch nach Gebrauch von Atropincollyrien Ekzem und Furunkeln in der Umgebung des Auges. Bei Einzelnen kommt es auch wohl in Folge örtlicher Einwirkung, indem das Atropin durch den Ductus nasolacrimalis und von dort durch die Choanen weiter gelangt, zu Trockenheit im Halse, ja sogar zu wirklich toxischer Wirkung, die namentlich bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen, wiederholt beobachtet ist (Galezowski).

Weitere örtliche Wirkungen sind die Herabsetzung der Sensibilität, welche bei subcutaner Injection oft noch bedeutender ausfällt als bei Morphin, und die bei Application auf die Conjunctiva, und zwar bei einseitiger Application ausschliesslich an dem atropinisirten Auge, eintretende Pupillenerweiterung, welche schon nach sehr geringen Quantitäten entsteht. Diese Erscheinung macht den Uebergang zu den entfernten Wirkungen, indem sie auch nach interner und subcutaner Application eintritt, hier jedoch immer erst nach grossen und namentlich nach toxischen Dosen.

Dass die mydriatische Wirkung des Atropins bei Application auf die Augenbindehaut eine locale ist, erhellt daraus, dass sie auch am ausgeschnittenen Bulbus eintritt (Donders und De Ruyter). Sie erfolgt um so rascher, je dünner die Hornhaut ist, daher bei jüngeren Individuen schneller als bei alten, bei Kaninchen rascher als bei Hunden und Menschen, wo sie durchschnittlich in 15 Min. eintritt. Sie entsteht auch, wenn das Atropin auf einen Theil der Cornea oder vermittelt eines Haarröhrchens direct zur Iris gebracht wird (Chamisso). Nach Fleming dilatirt bei sorgfältiger Atropinapplication an der äusseren Seite des Bulbus sich auch zuerst die äussere Seite der Pupille. Bezüglich der Intensität der Wirkung existiren bei einzelnen Thierarten grosse Verschiedenheiten; am empfindlichsten ist das Katzenauge, sehr unempfindlich sind Fische. Bei Fröschen constatirte Rossbach im Gegensatz zu älteren Experimentatoren Verengung der Pupille durch Atropin, auch fand derselbe am Kaninchenaugen bei Anwendung minimalster Mengen (0,06 Mgm.) Myosis, welche nach einiger Zeit wieder zur Normalweite oder zur Dilatation führte. Diese Erscheinung ist indess vielleicht weniger Folge des Atropins als Reflexerscheinung durch den Reiz der Instillation (Harnack). Beim Menschen beginnt die Wirkung einer Solution von 1:120 in 6—7 Min., erreicht den höchsten Grad in 10—15 Min. und persistirt 6—8 Tage; Lösungen von 1:500 wirken zuerst in 15—20 Min., und der höchste Stand wird in 20 Min. erreicht.

Solutionen von 1 : 28000 bedingen in  $\frac{3}{4}$ —1 Std. mässige Dilatation und Trägheit der Iris (A. v. Graefe). Nach De Ruyter kann schon  $\frac{1}{2000}$  Mgm. Atropin 20stündige Pupillenerweiterung bedingen. Die Mydriasis verbindet sich mit Accomodationsparalyse, die schon vor der Erweiterung eintritt und früher als dieselbe verschwindet; das Auge wird für den Fernpunkt und über denselben hinaus eingestellt, so dass das Sehen durch Convexgläser verbessert wird. Neben der Hyperpresbyopie kommt in einzelnen Fällen auch Mikropie vor.

In Bezug auf die physiologische Erklärung der Atropinmydriasis ist die Ansicht von Bezold und Bloebaum, wonach es sich um Paralyse des Oculomotorius und des Sphincter pupillae handle, als die wahrscheinlichste anzusehen, woneben Andere noch gleichzeitige Reizung des Sympathicus (A. von Graefe, Rossbach) und des Dilatator annehmen. Bezold betrachtet die Lähmung des Sympathicus als primär, Rossbach als secundär nach vorausgehender primärer Reizung. Luchsinger und Szpilmann betrachten die Action als auf den glatten Muskel gerichtet, da das Atropin auf Regenbogenhäute mit quergestreiften Muskeln nicht wirkt und bei Vögeln und Schildkröten nicht mydriatisch wirkt.

Man schreibt der Belladonna und dem Atropin auch eine örtlich antiphlogistische Wirkung zu.

Nach Zeller bewirkt Atropinsulfat, in möglichst indifferenter Kochsalzlösung gelöst, Erweiterung der Arterien mit gleichzeitiger Beschleunigung des Kreislaufes in den nicht erweiterten Venen und Capillaren, wodurch der Austritt weisser Blutkörperchen in die Gewebe stark beschränkt wird; auch büssen die emigrierten Leucocyten im Contact mit Atropin ihre amöboide Bewegung ein und werden rund und trübe. Einfache wässrige Atropinsolution wirkt auf die weissen Blutkörperchen wie destillirtes Wasser. Contraction der Gefässe, wie solche von Fleming, Jones u. A. dem Atropin als Wirkung zugeschrieben werden, hat Zeller weder primär oder als Nachwirkung bei  $2\frac{1}{2}\%$  Atropinsulfatsolutionen wahrgenommen. Schon Hayden erklärte das etwaige Auftreten von Gefässcontraction in der Froschschwimmhaut als ein Reflexphänomen. Wie die Mydriasis kommt auch die Erweiterung der Gefässe als entfernte Atropinwirkung vor. Nach Meuriot geht der Parese der Vasomotoren eine durch Gefässcontraction sich kundgebende Erregung der Vasomotoren voraus. Bezold und Bloebaum stellen letztere in Abrede.

Als örtliche Wirkung scheint endlich die freilich auch als entfernte Erscheinung sich documentirende Lähmung der Peristaltik bei internem Gebrauche kleiner Atropindosen betrachtet werden zu müssen.

Die entfernten Wirkungen können von allen Applicationsstellen, auch von der unverletzten Epidermis aus erfolgen. Das Atropin wird im Organismus nicht destruiert, sondern kann im Blut und in verschiedenen Organen (Leber, Muskeln, Hirn) und im Urin nachgewiesen werden.

Wiederholt sind toxische Wirkungen bei endermatischer und subcutaner Application vorgekommen. Dasselbe ist durch Application von Belladonnalinenten (namentlich ammoniakhaltigen), auch bei solchen von Belladonnasalben und Pflastern auf zarte Hautstellen (Mamma) beobachtet. Taucht man die Füße von Mäusen u. s. w. in Atropinlösungen, so entsteht Mydriasis, und zwar rascher bei Solution in Chloroform als in Alkohol oder Wasser. Vom Mastdarm aus erfolgt die Resorption etwas später und schwächer als vom Magen und der entblösten Cutis; auch von der Schleimhaut der Genitalien aus kann Intoxication herbeigeführt werden. Schon 1819 zeigte Runge die mydriatische Wirkung des eingedickten Harns von Thieren, welche mit atropinhaltigen Substanzen vergiftet waren. Die Elimination durch den Harn erfolgt ziemlich rasch, nach Dragendorff und Koppe selbst bei 9tägiger Fütterung mit Belladonna bei Kaninchen schon in 36 Stunden.

Die entfernte Action des Atropins äussert sich in sehr verschiedener Weise. Die auffallendsten Erscheinungen, welche jedoch nur bei grösseren toxischen Dosen hervortreten, sind cerebrale Störungen, welche den Charakter der Exaltation oder eine Abwechslung von Depression und Aufregung tragen und mit Hallucinationen sich verbinden. Schon nach kleineren Mengen zeigt sich eine Action auf die Circulation, durch Steigen der Pulsfrequenz charakterisirt, Erweiterung der Pupille und sehr auffallende Trockenheit der Haut im Munde und Halse. Bei stark toxischen Dosen kommt es auch zu Beschwerden beim Schlucken und Sprechen, zu Heiserkeit und selbst zu Aphonie, auch zum Verluste der Articulation. Nicht selten kommt nach toxischen Dosen neben den übrigen Vergiftungserscheinungen, mitunter auch nach medicinalen Gaben, scarlatinöse Röthe der Haut vor.

Die Symptome der Atropinwirkung kommen selten nach einer einzigen kleinen Gabe von Atropin (0,001—0,0015) oder Rad. Belladonnae (0,02—0,05) zur Beobachtung, wohl aber häufiger, wenn solche einige Male wiederholt werden. Das erste Phänomen ist dann in der Regel Trockenheit im Halse, womit sich auch vermehrtes Bedürfniss zum Trinken einstellt; fast gleichzeitig zeigt sich die Mydriasis, mit welcher sich Accomodationslähmung in höherem oder geringerem Grade combinirt. Letztere erfolgt fast constant nach 0,002 Atropin. Mitunter kommt hier auch die Röthung der Haut mit subjectivem Gefühl von Brennen oder Trockenheit vor, welche häufig am Halse ihren Sitz hat, aber auch über den ganzen Rumpf sich verbreiten kann. Wird die Zufuhr nicht fortgesetzt, so verschwinden die subjectiven und objectiven Erscheinungen in einigen Stunden, am spätesten die Pupillenerweiterung. Auch auf der Augenbindehaut und der Membrana Schneideri macht sich ein Gefühl von Trockenheit nicht selten bemerkbar. Diurese und Defaecation werden durch medicinale Gaben kaum verändert; wohl aber kommt manchmal Nausea und Erbrechen vor. Gray bezeichnet die Harnsecretion als vermehrt; nach Harley sollen während Belladonnagebrauch Harnstoff, Phosphate und Sulfate vermehrt, dagegen die Chloride vermindert sein. Wird die Zufuhr der Belladonna nach Auftreten der ersten physiologischen Wirkung nicht unterbrochen, oder werden grössere Dosen auf einmal gegeben, so kommt es zu cerebralen Störungen, die sich meist durch Schwindel, Aufgeregtsein, Unruhe, Umherlaufen kundgeben, manchmal auch zu wirklichen Delirien, die bisweilen mehr still, häufig heiter und mit närrischer Lachlust, nicht selten auch furibund und mit maniakalischen Ausbrüchen verbunden sind. Veitstanzähnliche Bewegungen, wie zum Fliegen, Tanzen, Schwimmen, seltener erotische Bewegungen machen sich dabei geltend und stehen theilweise mit Hallucinationen des Gesichts (nicht selten haschen derartige Patienten nach Käfern, Schmetterlingen u. a. nicht vorhandenen Gegenständen) in Zusammenhang. Gehörshallucinationen sind seltener. Die Gefühls-perception ist verringert, bisweilen besteht Analgesie. Manchmal kommt in diesen leichteren Intoxicationsfällen Ischurie oder Harndrang vor. Sehr frühzeitig zeigt sich auch schon die auffallende Pulsbeschleunigung, die auch selbst nach medicinalen Dosen 12—30—40 Schläge in der Minute beträgt; bei ausgebildeten Intoxicationen kommen Pulse von 130—140 gar nicht selten vor. Lichtenfels und Fröhlich sahen in Selbstversuchen der Steigerung eine Verringerung der Pulszahl vorausgehen, welche auch v. Schroff und Wertheim in einer ausserordentlich grossen Anzahl Beobachtungen constatirten, die aber von den meisten Beobachtern sonst nicht angegeben wird. Meuriot sah schon nach 0,001 Atropin Pulsbeschleunigung; nach grösseren Dosen hielt dieselbe mehrere Tage an und machte dann einer Pulsverlangsamung Platz. Bei grösseren Gaben fällt die Temperatur rasch (Schroff), um später zu steigen (Oglesby), bei kleineren steigt sie (Meuriot, Oglesby). Minder gesteigert erscheint die Athemfrequenz (Erlenmeyer). Die in alten Zeiten den atropinhaltigen Pflanzen, insbesondere dem Stechapfel, zugeschriebene Erregung des Geschlechtstriebes



kommt als Erscheinung der Wirkung grösserer Dosen Atropin nur höchst vereinzelt vor. Die Symptome schwinden meist in 12–24 Stunden; ausser Mydriasis persistirt nicht selten die Trockenheit im Schlunde weitere 24–48 Stunden, auch hinterlässt die Intoxication mehrtägige Abgeschlagenheit in Folge ungemässiger Kraftanstrengungen in der Periode der Delirien.

In sehr schweren Fällen von Intoxication kommt es zu völliger Aphonie und Aphagie; der Versuch, Flüssigkeiten zu verschlucken, führt manchmal zu Convulsionen, welche dem Krankheitsbilde Aehnlichkeit mit dem der Hydrophobie geben. Ausserdem schwindet hier das Bewusstsein und kommt es zu completer Anästhesie; die Extremitäten sind paretisch, in den schwersten Fällen die Sphinkteren der Blase und des Mastdarms gelähmt. Sehr auffallend ist manchmal ein Wechsel von Sopor und Delirien (Coma vigil), der sich im Laufe der Intoxication mehrmals wiederholt. Die Respiration wird bei schwererer Intoxication schneller und stertorös, der Herzschlag irregulär. Gleichzeitig damit oder auch schon früher kommt es zu fibrillären Zuckungen einzelner Muskeln, weiterhin zu klonischen Krämpfen, namentlich der Gesichtsmuskeln, zu Zähneknirschen und wirklichem Trismus. Der Tod erfolgt in 3–36 Stunden asphyktisch; im Falle der Genesung halten Sehstörung und Mattigkeit meist noch mehrere Tage an. Das Bewusstsein kehrt allmähig zurück; bisweilen soll, namentlich bei Kindern, Idiotie die Folge von Belladonnavergiftung sein (van Hasselt). In der Leiche an Atropinismus acutus Verstorbener finden sich im Wesentlichen nur die Zeichen des Erstickungstodes; sehr häufig ist hochgradige Blutüberfüllung der Meningen und der Hirnsubstanz.

Die Therapie der acuten Atropinvergiftung ist — von der mechanischen und antidotarischen Behandlung abgesehen, wo sich Tannin praktisch bewährt hat (J. Morel), während Saiz Rioyo und Reil dem Iodiodkalium das Wort reden — eine symptomatische. Lussana empfiehlt Wein als organisches Antidot, welches selbst die Emetica überflüssig machen soll; auffallend ist die Toleranz der Vergifteten gegen spirituöse Getränke, so dass z. B. ein  $\frac{1}{2}$ jähriges Kind 400,0 starken Wein vertrug (Castaldi). In der Neuzeit hat man besonders Opiaceen und Morphin angewendet (vgl. unten).

Bei Thieren sind die Wirkungen des Atropins im Ganzen in ihren Erscheinungen den beim Menschen zu beobachtenden ähnlich. Die Athmung nimmt bei Säugethieren anfangs an Zahl ab und wird später beschleunigt und keuchend. Der Puls nimmt — in der Regel wenigstens ohne vorgängige Verlangsamung — an Frequenz zu, und zwar bedeutender beim Hunde als beim Kaninchen. Im Allgemeinen sind bei Säugethieren die Zeichen der Agitation nicht gross; vielmehr überwiegen Lähmung und Schwäche. Die Coordination der Bewegungen schwindet und bisweilen kommt es zu einer Art Reitbahngang. Vor dem Tode finden sich nicht selten Convulsionen, selbst mit tetanischem Charakter. Auch bei Fröschen tritt die Lähmung in den Vordergrund; bei sehr stark toxischen Gaben kommt es nach Aufhören der Lähmung, oft sehr spät, zu Convulsionen (Fraser, Ringer). Der Herzschlag wird auch beim Frosche durch kleine Dosen beschleunigt, durch grosse resultirt Verlangsamung und sogar Herzstillstand.

Besonderes Interesse gewähren verschiedene Immunitäten bei einzelnen Thieren. Kaninchen, Meerschweinchen, Beutelhie und Ratten toleriren intern und subcutan Atropindosen, welche beim Menschen geradezu letal wirken würden. Manche Kaninchen ertragen sogar 1,0 Atropinsulfat subcutan, ohne Vergiftungserscheinungen. Auch Tauben sind sehr resistent und bekommen selbst nach grösseren Dosen keine Mydriasis (H. C. Wood), welche auch bei Application auf das Auge sehr spät und unvollkommen eintritt. Die Ansicht Heckels, dass die Immunität der Nagethiere für Belladonna und andere mydriatische Solaneen (Bilsenkrant, Stechapfel) von Zersetzung des Atropins im Blute herühre, ist kaum zulässig, da den negativen Resultaten in Bezug auf das Auftreten der Belladonna im Harn mit Tollkirschenblätter gefütterter Kaninchen positive Resultate Dragendorffs entgegen stehen.

Bei längerer Zufuhr von Atropin findet auch bei Carnivoren (Hunde) Gewöhnung an grosse Gaben statt, so dass selbst in der Norm letale Gaben bis zu einer gewissen Grenze ertragen werden; die Reaction auf die Pupille geht dabei nicht verloren, dagegen kommt es zu einer gewissen Herzschwäche, wobei die normale Zahl der Herzpulsationen nicht erreicht wird (von Anrep). Auch

bei Menschen kann übertriebenes Einträufeln von Atropin aufs Auge zu einem Zustande erethischer Schwäche und zum Darniederliegen der Assimilation führen, welche nur durch das Unterlassen des Atropinisirens beseitigt werden (A. von Graefe).

Die physiologische Wirkung des Atropins ist in neuerer Zeit der Gegenstand einer grösseren Anzahl vorzüglicher Arbeiten geworden, welche uns über einzelne Punkte sehr genau aufgeklärt, dagegen über manche, z. B. die Hauptwirkung auf das Gehirn, keineswegs zu sicheren Resultaten geführt haben.

Die vorzüglichsten Studien sind von v. Bezold und Bloebaum angestellt, welche zu der Ansicht gelangten, dass das Atropin eine ausschliesslich lähmende, nicht aber eine reizende Action besitze. Diese direct lähmende Wirkung auf die verschiedensten Theile des Nervensystems erscheint indessen nicht überall vollkommen erwiesen; doch ist die Excitation meist rasch vorübergehend, und bei Anwendung etwas grösserer Dosen macht sich oft sofort directe paralysirende Wirkung geltend. v. Bezold will selbst die Gehirnphänomene durch lähmende Einwirkung auf hemmende Centren erklären und leitet die Delirien von Aufhebung des Willens und Bewusstseinflusses ab. Meuriot hat andererseits versucht, die psychischen Erscheinungen, sowie auch verschiedene andere Phänomene der Atropinvergiftung auf Störungen des capillären Kreislaufes zurückzuführen und Schlaflosigkeit und Insomnie auf Beschleunigung desselben, das Coma auf tiefere Störungen zu beziehen. Eine Nothigung dazu liegt nicht vor, da ein Einfluss des Atropins auf Nervenpartien nicht in Abrede zu stellen ist, indessen bringt Atropin nicht Dunkelung der Ganglienzellen wie Morphin hervor (Binz).

Völlig festgestellt ist eine herabsetzende und bei grossen Dosen lähmende Wirkung auf die peripherischen Enden der motorischen Nerven in den Muskeln und der sensibeln Nerven in der Haut, während die Muskeln selbst nicht afficirt werden (Botkin, Lemattre, Bezold und Bloebaum, Meuriot).

Bei Säugethieren lähmen selbst grosse Dosen die peripherischen Nervenendigungen nicht vollständig. Häufig schwindet die Sensibilität vor der Motilität (Botkin), doch findet auch das Umgekehrte statt (Meuriot, Lemattre). Vermuthlich stehen mit diesen Wirkungen der Taumel und der wankende Gang, sowie die Anästhesie beim Atropinismus acutus in Zusammenhang.

Ein solcher herabsetzender Einfluss findet auch auf die peripherischen Endigungen der Herzvagi oder den mit ihnen zusammenhängenden gangliösen Apparat, sowie auf die motorischen Ganglien des Herzmuskels, dessen Erregbarkeit durch Atropin ebenfalls herabgesetzt wird (Bezold und Bloebaum, Meuriot, Keuchel), statt, während es auf den Nervus depressor nicht einwirkt (Keuchel).

Mit Ausnahme von Rossbach, welcher auch in Hinsicht auf die Vagusendigungen im Herzen die Lähmung als eine secundäre bezeichnet, fanden die Experimentatoren eine directe Herabsetzung derselben durch Atropin. Es erklärt sich daraus vor Allem die Pulsbeschleunigung, die, mag sie secundär oder primär sein, stets als für die Atropinvergiftung charakteristisch aufgefasst werden muss. Auch beim Menschen ist die Lähmung der Hemmungsfasern des Vagus eclatant darzuthun, insofern nach 0,001 Atropinsulfat subcutan Compression der Carotiden kein Aussetzen des Pulses, sondern nur leichte Verlangsamung bedingt (Albertoni und Bernabei). Bei Thieren wird der Beweis insgemein darin gesucht, dass Atropin den durch Muscarin bedingten, auf Reizung der Herzvagusendigungen beruhenden diastolischen Herzstillstand auf-

hebt. Dass auch noch andere Theile des Herzens vom Atropin betroffen werden, beweist der Umstand, dass auch verschiedene andere Herzstillstände, z. B. durch Chloroform, Kaliumsalze, Oxalate und gallensaure Salze, Apomorphin, Kupfer oder Zink, Antimon oder Chinin (Luchsinger und O. Socoloff) vom Atropin aufgehoben werden. — Die Wirkungen auf die Herznerven und auf die Vasomotoren (vgl. S. 1082) bedingen natürlich das Verhalten des Blutdrucks, welcher bei Injection kleiner Dosen (0,0025) in die Venen etwas zu steigen scheint, während bei mittleren Dosen (0,01) ein Sinken desselben eintritt (Bezold und Bloebaum, Meuriot). Von Keuchel u. A. wird das erwähnte Steigen des Blutdrucks in Abrede gestellt. Meuriot leitet von der Störung der capillären Circulation ausser den Hirnerscheinungen auch die bei Atropinismus vorkommende Trockenheit und Röthe der Schleimhaut und der Haut, die Angina und Dysphagie, Aphonie und Dysurie ab, welche zum Theil gewiss in anderer Weise erklärt werden müssen.

Bezüglich der Wirkung des Atropins auf die Respiration geben Bezold und Bloebaum an, dass Atropin die peripherischen Vagusendigungen in der Lunge vorübergehend paralisirt, daneben aber die Erregbarkeit des inspiratorischen Centrums ausserordentlich steigert, indem bei Einspritzung von Atropin in die Venen zuerst eine geringere Athemverlangsamung, dann eine sehr starke Erhöhung der Athemfrequenz eintritt, während bei Einspritzung in die Carotis nur letztere sich geltend macht. Meuriot fand bei grösseren Dosen nur Verlangsamung der Respiration.

Eine therapeutisch wichtige Wirkung des Atropins ist die herabsetzende, resp. lähmende Wirkung auf die Secretion des Speichels, des Schweisses und des Bronchialschleims.

Die Wirkung ist hier jedenfalls vorwaltend eine peripherische und auf die Drüsennerven gerichtete. Nach Keuchel paralisirt Atropin die von der Chorda tympani zum Ganglion submaxillare verlaufenen Hemmungsfasern und wirkt in ähnlicher Weise auf die der Parotis. Vielleicht ist auch die Drüsensubstanz (Rossbach) bei diesen Vorgängen theilhaft. Nach Bezold und Bloebaum wirkt Atropin in sehr geringen Mengen erregbarkeitsvermindernd, in grösseren lähmend auf die Ganglienapparate des Darmcanals, der Blase, des Uterus und der Ureteren und vielleicht auch auf die glatten Muskelfasern selbst. Nach Meuriot geht der Lähmung der letzteren stets eine höhere Energie der Contractionen voraus und erfolgt überhaupt nur bei starken Dosen Lähmung derselben. Nach Keuchel paralisirt Atropin den hemmenden Einfluss der N. splanchnici auf die Bewegungsfasern der Darmperistaltik, während es die übrigen Fasern derselben nicht afficirt. Luchsinger und Szpilmann halten auch beim Darne die glatte Muskelfaser für den Angriffspunkt des Atropins, weil das Alkaloid zwar den glattemuskelligen Kropf und Oesophagus der Vögel lähmt, aber selbst in den stärksten Dosen den quergestreiften Oesophagus der Kaninchen nicht afficirt und bei Katzen das untere glattemuskelige Viertel, nicht aber den oberen quergestreiften Abschnitt paralisirt.

Sowohl die Belladonna als das Atropin haben Verwendungen bei einer grossen Anzahl von Krankheitszuständen gefunden, von denen indessen manche durchaus nicht auf rationeller Basis beruhen.

So ist z. B. die jetzt der Geschichte anheimgefallene prophylaktische Benutzung gegen Scharlach (Hahnemann, Hufeland) reine Glaubenssache. Bei Geisteskrankheiten ist das von Erlenmeyer bei periodischen Tobsuchtsanfällen benutzte Atropin nach Maresch ohne jeden Einfluss und jedenfalls auch weniger rationell als das hypnotisch wirkende Hyoscyamin. Die Nutzlosigkeit der Einreibungen von Belladonnaextract in die Orbitalgegend bei Delirium tremens braucht nicht erörtert zu werden. Auch für die Effecte bei Intermittens, wo jetzt noch einzelne Aerzte eine Combination des Chinins mit Belladonna als kräftiger wirkend als ersteres allein bezeichnen, fehlt jeder Grund; vielleicht dürfte dieselbe bei intermittirenden Neuralgien indicirt sein.



In wie weit sich die weitgehenden Erwartungen amerikanischer Aerzte (Weber, Burr) auf die Heilwirkung der Belladonna erfüllen, welche theilweise das Atropin als Erregungsmittel der Respiration und Circulation ins Auge fassen, theilweise auf dessen Wirkung auf die glatten Muskelfasern basirt werden, steht dahin. Weber betrachtet Belladonnaextract in Dosen von 0,015—0,005 als vorzüglichstes Mittel im Collaps acuter Krankheiten oder bei Cholera und rühmt es ausserdem in Verbindung mit Kaliumacetat bei Compensationsstörungen Herzkranker. Barnett versuchte Atropin bei Hitzschlag, Burr empfahl es namentlich in fieberhaften Affectionen (Typhus, Scharlach). Tacke glaubt Atropin an Stelle des Mutterkornes bei profuser Menstruation und Lungenblutungen indicirt.

Die hauptsächliche Anwendung findet das Atropin in der Augenheilkunde in allen Fällen, wo Erweiterung der Pupille indicirt ist, sei es zum Zwecke ophthalmoscopischer Untersuchung, sei es zu curativen Zwecken, wo es besonders bei Iritis zur Verhütung der Entstehung von Adhäsionen oder zur Zerreissung frisch gebildeter Synechien im Gebrauch steht.

Die moderne Ophthalmologie benutzt jetzt fast ausschliesslich Atropinsulfat, und nur in Ausnahmefällen, wo dieselben nicht ertragen werden, aus Belladonna dargestellte Präparate. Zur Vorbereitung der Untersuchung des Augenhintergrundes mittelst des Augenspiegels kommt es besonders bei grosser Enge der Pupille oder bei Opacitäten der brechenden Medien in Anwendung. Auch bei Untersuchung mit schräger Beleuchtung, zumal zur genauen Feststellung von Linsentrübungen, endlich zur Diagnose von Refraktionsanomalien, um dabei die Accomodation vollständig auszuschliessen, ist es im Gebrauch. Donders empfahl Atropin auch bei *Cataracta centralis* oder *centraler Cornealtrübung*, um das Sehen zu ermöglichen. Bei Iritis lindert es die intensiven Schmerzen der Patienten und schützt vor Verwachsungen der Regenbogenhaut mit der Linsenkapsel und der hintern Hornhautwand, wirkt vielleicht direct antiphlogistisch, steigert jedenfalls aber niemals die Entzündung. Von demselben Werthe wie bei Iritis und bei frischen Synechien, welche selbst bei 9tägigem Bestehen noch durch Atropin zerrissen werden können, ist Atropin bei perforirenden Hornhautwunden und Hornhautgeschwüren, wenn Einklemmung oder Vorfall der Iris entweder eingetreten ist oder eintreten droht. Ferner dient Atropin vielfach nach operativen Eingriffen zur Verhütung von Iritis oder suppurativer Augenentzündung, so nach Iridectomie, Cataractoperation und insbesondere nach der Discission, um die Iris dem Einflusse der quellenden und nach der vordern Augenkammer dringenden Linsenmassen zu entziehen. Man hat auch zur Herabsetzung des intraoculären Drucks, z. B. bei Glaukom, Atropin versucht, doch sind nicht allein die Erfolge ungünstig, sondern auch erfahrungsmässig festgestellt, dass Atropin in einem dazu disponirten Auge einen acuten Anfall von Glaukom bedingen kann. Dagegen erweist es sich von grossem Nutzen bei vielen entzündlichen Zuständen des Auges, insbesondere bei Keratitis und überhaupt da, wo Ophthalmien mit heftigen Schmerzen und Photophobie complicirt sind. Die günstigen Effecte sind hier offenbar auf die durch Atropin bedingte Herabsetzung der Sensibilität zu beziehen, welche auch den Reflexkrampf beseitigt. Die accomodationslähmende Wirkung wird therapeutisch zur Behandlung der mit Accomodationskrampf verbundenen progressiven Myopie der Kinder verwerthet. Endlich verdient die Angabe von Mosler Erwähnung, wonach adstringirende Augenwässer, besonders stärkere Causticisationsmittel, besser ertragen werden und rascher Erfolg haben, wenn die übermässig gesteigerte Reizbarkeit vorher durch Atropin abgestumpft wurde. Dass in allen besprochenen Fällen das Atropin direct auf die Conjunctiva applicirt wird, bedarf wohl keiner Erwähnung.

Die herabsetzende Wirkung des Atropins auf die Endigungen der sensibeln Nerven machen dasselbe, von Augenentzündungen abgesehen, zu einem nicht zu unterschätzenden Mittel bei den

verschiedensten schmerzhaften Affectionen, gegen welche auch die Belladonnapräparate theilweise noch heute in Gebrauch stehen.

So wird z. B. noch jetzt *Extractum Belladonnae* in Verbindung mit oder ohne *Bismutum nitricum* oder Bittermandelwasser bei Cardialgie häufig mit Erfolg gegeben und ist in kleinen Mengen innerlich genommen manchmal von vorzüglichem Nutzen bei rheumatischem Zahnschmerz. Auch bei Otitis externa und media stillt Einträufeln von Atropinlösung ins Ohr den Schmerz und scheint auch auf die Entzündung günstig zu influiren (Theobald). Fonssagrives sah günstigen Erfolg bei nervöser Kolik der Tropen; auch bei Bleikolik ist es gerühmt (Malherbe), doch scheint hier Opium im Allgemeinen nützlicher zu sein. Mojon, Burr u. A. empfahlen es bei Gallen- und Nierensteinkoliken. Einen besonderen Werth besitzen die Subcutan-injectionen von Atropin bei Neuralgien, indem sie sich noch in manchen Fällen als palliativ und selbst als curativ bewähren, wo Morphininjectionen sich unwirksam erweisen. Dasselbe Verfahren ist auch bei Nervenentzündung (Oppolzer), bei Myalgia rheumatica (Béhier, Da Costa), bei syphilitischen Knochenschmerzen (Südeckum) und bei Verwundungen (Béhier) von ausgezeichnetem Nutzen und steht der früher üblichen Cataplasmirung mit Belladonnablättern oder der Einreibung mit Belladonnasalbe bei weitem voran. Von einzelnen Autoren ist eine Combination mit Morphin als besonders empfehlenswerth bezeichnet (A. von Graefe, Fraigniaud, Dumas).

Aus der Herabsetzung der Sensibilität erklärt sich, von dem günstigen Effecte bei Photophobie abgesehen, der Nutzen der Belladonna und des Atropins bei Krämpfen und Contracturen, welche reflectorisch durch Steigerung der Erregbarkeit sensibler Nerven zu Stande kommen.

Hierher gehört zunächst einfacher Hustenreiz, gegen welchen *Extractum Belladonnae*, besonders in chronischen Fällen, wo keine allzugrosse Schleimabsonderung besteht, sich vortheilhaft erweist, indem es gleichzeitig die Sensibilität beschränkt und mässige Absonderung zum Schwinden bringt. Bei Keuchhusten empfahlen Wetzler, Bretonneau, Burr u. A. die Belladonna, Ingmann das Atropin, doch haben die Belladonnapräparate häufig keinen Nutzen, höchstens gegen Ende der Krankheit (Nothnagel). Bei Angina tonsillaris, wo Popper und Holsbeck Belladonnatinctur und Ingmann Atropin empfehlen, wird die Schmerzhaftigkeit und der Reizzustand gelindert, doch die Entzündung wenig beeinflusst. Bei Asthma lässt Belladonna häufig im Stich, ja wir haben Fälle beobachtet, wo dadurch die Dyspnoe geradezu gesteigert wurde, was vielleicht durch die vom Atropin bedingte Reizung des inspiratorischen Centrums sich erklärt. Sehr günstigen Erfolg hat dagegen Atropin bei Blepharospasmus (Graefe) und Belladonnasalbe bei krampfhafter Stricture des Sphincter ani in Folge von Fissura ani, wo zugleich der Schmerz stark herabgesetzt wird. Hierher gehört endlich die Anwendung von *Extractum Belladonnae* gegen Erbrechen, wo das Mittel sowohl bei nervösem Erbrechen Hysterischer, als bei Vomitus gravidarum, als endlich beim Erbrechen in Folge chronischer Entzündungszustände, z. B. bei Säuern, passt. Hierher gehört auch die Benutzung bei Enuresis, wo das Mittel bisweilen günstig wirkt, wenn eine Hyperästhesie der Blase das Bett-nässen verursacht (Trousseau, Tutschek). Auch bei Irritabilität der Blase und bei Blasenkrampf leistet Atropin Günstiges. Girard rühmt Atropin bei Oesophagismus.

Versuche bei sonstigen krampfhaften Affectionen haben nicht ungünstige Resultate bei Behandlung der Epilepsie mit Atropin und Atropinsalzen geliefert.

In der Epilepsie war eine Zeitlang das von Michéa und Schroeder van der Kolck, Maresch und Scholz warm empfohlene Atropinum

valerianicum, welches übrigens recht wohl durch Atropinsulfat ersetzt werden kann, gewissermaassen Modemittel. Es ist nicht zu verkennen, dass unter dem Gebrauche des Atropins die Anfälle bei Epileptikern seltener werden und selbst Jahre hindurch ausbleiben können oder gar völlig verschwinden. Nächste dem Bromkalium scheint uns Atropin das beste Antiepilepticum zu sein, doch lassen sich specielle Indicationen nicht wohl feststellen. Die meisten Beobachter (Namias, Croserio, Lange) rühmen es in frischen Fällen, doch kann es auch bei inveterirter Epilepsie monatelanges Ausbleiben der Anfälle hervorbringen. Schroeder van der Kolck erklärt es für contraindicirt bei Fallsucht, welche mit sexueller Aufregung verbunden ist. Nach Erlenmeyer wirkt es in älteren Fällen von Epilepsie hauptsächlich günstig durch Abkürzung der Anfälle psychischer Störung. Der Nutzen des Atropins bei Epilepsie wird durch die lähmende Action auf den Sympathicus erklärt, wodurch die vielleicht durch Anämie der Medulla oblongata bedingten epileptischen Convulsionen verhindert werden. Andere Krampfkrankheiten, bei denen Belladonna und Atropin Empfehlung fanden, sind Ekklampsie (Michéa), Hysterie (Azario) und dabei bestehende spastische Contracturen (Benedikt), Chorea (Bouchardat und Cooper), Tetanus traumaticus (Vial, Bresse), einseitige Contractur der Gesichtsmuskeln (Cullerier), ja selbst Hydrophobie (Oulmont), wo früher Pulvis rad. Belladonnae prophylaktisch zu 0,5—1,0 gegeben wurde (Münch).

Es schliesst sich hieran die Anwendung der Belladonna in der Geburtshülfe, wo sie namentlich bei krampfhaften Stricturen des Muttermundes während und nach der Geburt sowohl äusserlich als innerlich von Oslander, Dalmas u. A. bis in die neueste Zeit hinein viel Lobpreisung gefunden hat, ohne dass es den Ansprüchen der Geburtshelfer jedesmal gerecht würde. Die physiologischen Versuche Bezolds geben allerdings eine gewisse Stütze für die Verwendung bei Krampfwehen (Breslau); inwieweit aber eine Erweiterung des Muttermundes durch Atropin zu Stande gebracht werden kann, ist nicht ersichtlich. Somma will es freilich auch gradezu als wehentreibendes Mittel gebrauchen.

Von sonstigen Affectionen, gegen welche Atropin und atropinhaltige Drogen gebraucht wurden, heben wir zunächst die Obstipation hervor. Wie früher Schmidt u. A. eine Combination des Rhabarbers mit Extractum Belladonnae bei Atonie des Darmcanals als kräftiger wirkend bezeichneten als Rhabarber allein, so geben neuere Aerzte auch stärkere Drastica (Aloë, Podophyllum) mit Belladonna oder Atropin zur Beseitigung der Kolikschmerzen, und A. Martin und Fleming empfehlen geradezu das Atropin bei hartnäckiger Verstopfung. Fleming hält hier das Alkaloid für indicirt, weil es die Schleimabsonderung im Darne beschränke und der Contact der Fäcalsmassen mit der entblösten Schleimhaut Contractionen der Gedärme auslöse. Kaum einzusehen ist, wie Belladonnaklystiere oder gar die Einreibung von Belladonnasalbe bei incarcerirten Hernien wirken soll. In zweiter Linie steht der Gebrauch bei Paralyse, welche vom Rückenmark ausgehen, wo Brown-Sequard Belladonna in denselben Fällen verabreicht wie Secale cornutum.

Endlich findet Atropin in neuerer Zeit eine ausgedehnte Anwendung als Antidot verschiedener Vergiftungen, namentlich derjenigen mit Opiaceen und Morphin, welche in der That neuere Erfahrungen am Krankenbette unter gewissen Verhältnissen völlig berechtigt erscheinen lassen.

Der in den letzten Jahren überaus häufig besprochene Antagonismus des Atropins und Morphins erstreckt sich nach den Untersuchungen an Thieren und Menschen nicht auf alle Systeme des Organismus. Er ist am ausgesprochensten in Hinsicht auf die Pupille und Accomodation (A. von Graefe) und betrifft vielleicht auch die Respiration und die cerebralen Erscheinungen (Erlenmeyer), fehlt dagegen in Bezug auf Puls, Trockenheit der Schleimhäute und der Sensibilität (Erlenmeyer, Mitchel, Kean und Morehouse). Derselbe ist nicht ein solcher, dass der gleichzeitige Gebrauch beider Substanzen alle Vergiftungserscheinungen aufhebt, vielmehr giebt es complexe Vergiftungen mit beiden, in denen bald die Symptome des Morphinismus, bald die des Atropinis-



mus in den Vordergrund treten (Wickham Legg, Denis, Lente, Colter). Ebenso wenig ist der Antagonismus ein derartiger, dass der Tod in allen Fällen von Atropinvergiftung durch Morphin oder umgekehrt abgewendet werden kann. Bei Thieren scheint die letale Dosis des Atropins resp. Morphins durch die Combination mit dem Antagonisten nicht geändert zu werden; dagegen wirkt selbst bei completer Lähmung des Sensorium, bedeutender Verlangsamung und Verminderung der Energie des Herzschlages und starkem Sinken der Rectaltemperatur bei morphinisirten Hunden Subcutaninjection kleiner Mengen Atropin bessernd auf Herz- und Athemfunction bei gleichbleibender Körperwärme; der Effect ist vorzugsweise durch Steigerung des Blutdrucks bedingt (Binz und Heubach). In Bezug auf den menschlichen Organismus ist nicht zu leugnen, dass in manchen Fällen, wo dieser mit dem einen Alkaloide imprägnirt ist, sehr erhebliche Quantitäten des anderen tolerirt werden, und dass bei complexen Vergiftungen die Erscheinungen manchmal viel geringer sind, als wenn nur eins der Gifte genommen wäre. Es ist ferner ausgemacht, dass in Morphinvergiftungen bei antagonistischer Behandlung der Tod manchmal nach so grossen Dosen nicht eintritt, welche sonst aller Wahrscheinlichkeit nach einen letalen Ausgang bedingt haben würden (Johnston). In einigen Fällen scheint die Anwendung des Antagonisten sehr rasch Besserung zu bringen (Höring), was indess manchmal nur bei den ersten Dosen, nicht nach späteren sich bemerkbar macht (Evans). Die Belladonnabehandlung bei der Opiumvergiftung ist nicht in leichten Fällen indicirt; wo der Kranke bei Bewusstsein ist und gehen kann, wo die Pupillen nicht contrahirt und beweglich sind, reicht die gewöhnliche Behandlungsweise mit Brechmitteln aus. Nach den ausgedehnten Erfahrungen von Johnston in Shangai ist dagegen beim Bestehen von starkem Sopor und Pupillencontraction oder bei stark excessiver Myosis ohne tiefe Beeinträchtigung des Sensoriums die sofortige Application des Atropins angezeigt. In solchen Fällen muss aber das Alkaloid, um Wirkung zu haben, in grossen Dosen subcutan injicirt werden. Bei Anwendung von 0,015—0,03 Atropin im tiefsten Opiumcoma erweitert sich die Pupille meist in 10—20 Min. und entfalten sich in etwa 2 Std. die vollen Effecte des Mittels: ruhige, wenn auch langsame Respiration, Verlangsamung und Vollwerden des Pulses und ruhiger Schlaf, deren Nichteintritt die Wiederholung der Atropininjection erfordert. Nach Johnston stört künstliche Respiration in diesem Stadium den natürlichen Schlaf und ist daher zu vermeiden, während beim Eintreten von Erschöpfung äussere Hautreize, Wärme und Stimulantien anzuwenden sind. H. C. Wood empfahl wiederholt kleine Dosen und sucht die Wirkung des Atropins in der durch dieses hervorgerufenen Reizung der Medulla oblongata und die dadurch bedingte Verbesserung der Blutlüftung. Auch bei Vergiftung mit Chloralhydrat dürfte Atropin zu versuchen sein und neuerdings hat man dasselbe empfohlen, um Chloroformirte vor dem Eintritte von Syncope und Asphyxie zu bewahren (Schäfer).

Ein ähnlicher Antagonismus wird dem Atropin nach Versuchen an Thieren auch gegen verschiedene Gifte andrer Art zugeschrieben; besonders gegen Physostigmin (Fraser), Muscarin (Schmiedeberg und Koppe) und Blausäure (Preyer). Anwendung als Antidot bei den entsprechenden Vergiftungen an Menschen ist bisher nicht gemacht, wohl aber mit Erfolg bei Collaps durch Pilocarpin (Fronmüller). Bei Blausäurevergiftung, wo übriges Lecorché, Meuriot und Böhm den Antagonismus, besonders in Bezug auf die Respiration bestreiten, dürfte davon selten praktischer Nutzen zu ziehen sein, weil der Tod in den meisten Fällen zu rasch erfolgt. Bei Fliegenpilzvergiftung sind die Symptome der Excitation (Delirien, maniakalische Anfälle) nicht geeignet, das Atropin, welches genau dieselben Phänomene erzeugt, als praktisch verwendbares Gegengift erscheinen zu lassen; andere Giftpilze enthalten kein Muscarin.

Die Trockenheit, welche Belladonna auf Schleimhäuten und auf der äusseren Haut erzeugt, lässt dasselbe auch zur Beseitigung verschiedener krankhafter Secretionen geeignet erscheinen, weshalb das Atropin in neuester Zeit ein allgemein verbreitetes Mittel bei

den profusen nächtlichen Schweissen der Phthisiker geworden ist.

Nachdem zuerst Sydney Ringer die Aufmerksamkeit auf die anidrotische Wirkung des Atropins gerichtet hatte, wurde dieselbe von den verschiedensten Klinikern (Vulpian, Oettinger, Fothergill, Fraentzel) in vollem Maasse bestätigt. Unzweifelhaft ist Atropin das sicherste Mittel bei colliquativen Nachtschweissen, wenn dasselbe in nicht zu kleinen Dosen (0,5—2 Mgm.) applicirt wird. Die Anwendung erscheint bei Phthisikern um so angemessener, als gleichzeitig Hustenreiz und Diarrhoe vermindert werden. Die Medication ist nach dem Aufhören der Schweisse, das oft schon nach der ersten Dosis erfolgt, nicht gleich zu unterbrechen, sondern unter Beschränkung der Gabe noch 8—10 Tage fortzusetzen. Allzulanger Gebrauch stumpft die Wirksamkeit ab (Vulpian und Royer). Auch die beschränkende Wirkung des Atropins auf die Speichelsecretion ist bei Behandlung des Speichelflusses therapeutisch verwerthet. Stephanides und Nowatschek empfehlen Atropin bei Spermatorrhoe und Pollutiones nimiae. In England reibt man Belladonnasalbe nicht selten bei Stillenden auf die Mammae ein, um die Milchsecretion zu beschränken. Fraentzel rühmt Atropin auch gegen Urticaria, wo die Wirkung vielleicht mit der Einwirkung auf die peripheren Nerven im Zusammenhange steht. Die Erfolge bei profuser Menstruation (Tacke) wird man schwerlich mit den Secretionsveränderungen in Zusammenhang bringen können.

Die Belladonnablätter dienen vorzugsweise zur äusseren Anwendung, während man innerlich nur daraus dargestellte Präparate oder häufiger noch das Atropinsulfat verwendet.

Als höchste Einzelgabe der Folia Belladonnae bezeichnet die Phkp. 0,2, als maximale Tagesgabe 0,6. Innerlich benutzt wurde die nicht mehr officinelle Wurzel, welche wegen ihres grösseren Atropinreichthums in kleineren Gaben, 0,05—0,1, verwendet wurde, doch überschritt man diese Dosen bei der prophylaktischen Cur der Lyssa häufig. Aeusserlich finden die Blätter als Zusatz zu narkotischen Kataplasmen (mit 5—10 Th. Leinsamen oder mit Fruct. Papaveris) und ausserdem als Rauchmittel bei Asthma Verwendung, wo entweder mit Opiumfinctur getränkte und wieder getrocknete Belladonnablätter aus kleinen Pfeifen (anfangs eine, später mehr) geraucht (Cruveilhier) oder die sog. Cigarettes pectorales d'Espic (mit einer Auflösung von Opiumextract in Kirschlorbeerwasser getränktes Gemenge von 2 Th. Fol. Bellad. und  $\overline{aa}$  1 Th. Fol. Stramonii und Fol. Hyoscyami) verwendet werden. Gebräuchlicher sind indessen Stechapfelblätter. Früher mussten Aufgüsse von 0,5—1,0 auf 100,0 Colatur (auch aus der Wurzel dargestellt) die Atropinlösungen in der Augenheilkunde ersetzen, während sie jetzt höchstens als Ersatzmittel derselben dienen, wo Collyrien aus Atropin oder Extr. Belladonnae nicht ertragen werden. Die Anwendung im Clymsa (zu 0,2—1,0 auf das Klystier) oder zu Vaginalinjectionen und Dampf-inhalationen kommt jetzt wohl kaum noch in Betracht.

Die Maximaldosis des Atropinsulfats beträgt nach der Phkp. 0,001 für die Einzelgabe und 0,003 für die Tagesgabe. Dieselben Dosen gelten auch für die interne Anwendung des Atropins und des Atropinvalerianats.

Intern giebt man Atropinsulfat (z. B. bei Epilepsie oder andern chronischen Leiden) meist in der Weise, dass man mit  $\frac{1}{2}$  Mgm. beginnt und allmählig steigt, bis die ersten Intoxicationssymptome (Kratzen im Halse) sich zeigen. Bei der verschiedenen Receptivität der einzelnen Individuen ist das Beginnen mit kleinen Dosen wie 0,5 Mgm. unerlässlich. Am zweckmässigsten ist Pillen- und Pulverform; wässrige Lösungen schmecken bitter und verlieren bei längerer Aufbewahrung an Wirksamkeit. Zu Pillen wählt man indifferente Vehikel, z. B. Honig und Eibischwurzel, denen das Atropinsulfat stets in Lösung zugesetzt werden muss (cf. Verordnungen). Bei Kindern, welche am Keuchhusten leiden, empfiehlt Bouchardat Prisen, welche  $\frac{1}{4}$  Mgm. enthalten; doch ist eine solche Form gewiss nicht zweckmässig. Aus dem reinen Atropin lässt man in Frankreich nach Bouchardats Vorgange mit Zucker inkrustirte Pillen, von

denen das Stück  $\frac{1}{2}$  Mgm. enthält (Dragées d'atropine) anfertigen. Bouchardat benutzt auch einen Syrupus Atropini, welcher in 100,0 0,005 Atropin mit Hilfe von Salzsäure gelöst enthält und zu 10,0—30,0 verordnet wird.

Vielfach wird Atropinsulfat subcutan angewendet, am besten in Lösung von 1:100, wovon 10 Tropfen 0,002 Atropinsulfat enthalten (Béhier). Bei Neuralgien sind kleinere Dosen als 0,001 unnütz, grössere unnöthig. Verbindung mit der 4fachen Menge Morphiumsulfat wirkt nach Bourdon noch günstiger. Application in der Nähe der schmerzhaften Partie ist nach Da Costa nicht immer erforderlich. Die Dosen bei hektischen Schweissen sind 0,0008—0,0025. Die nach Johnston bei schweren Fällen von Morphinismus angewandten grossen Gaben wurden schon oben erwähnt. Epidermatisch verwenden Guibert u. A. 0,2—0,3 in Wasser aufgelöstes Atropinsulfat mit 5,0 bis 12,0 Fett; diese Salben sind überall da zu meiden, wo Excoriationen bestehen! Auch Lösungen in Alkohol (1:250) oder Wasser sind zu Einreibungen oder Fomenten (unter Wachstuch) empfohlen (Garrod). Endermatisch können 0,001 bis 0,003 und selbst mehr administriert werden.

Am häufigsten dient Atropinsulfat zur Darstellung von Augentropfen zur Erzeugung von Pupillenerweiterung. Vor dem früher statt des Sulfats angewandten Alkaloide hat es den entschiedenen Vorzug, dass es zur Lösung keines Zusatzes von Säure bedarf, da nur völlig neutrale Atropinlösung ohne Irritation der Bindehaut in Anwendung gebracht werden darf. Man bevorzugte früher das in England dargestellte Atropinsulfat, weil dasselbe auf die Bindehaut nicht irritierend wirken sollte; indessen thut es dies genau so wie das deutsche, ist bedeutend theurer und kommt im Handel unter Umständen in einem Zustande vor, welcher geradezu Zersetzung andeutet, z. B. mit blauen oder violetten Punkten durchsetzt (Hager). Die bei Atropingebrauch resultirende Irritation rührt häufig davon her, dass alte Lösungen verwendet werden, in denen sich Algen und Pilzbildungen finden, deren Entwicklung auf Kosten des Atropins geschieht, weshalb derartige alte Solutionen auch stets schwächer mydriatisch sind (Gubler). Die Lösungen des Atropinsulfats zu mydriatischen Zwecken müssen je nach dem Effecte, welchen man mit der Pupillenerweiterung erzielen will, von verschiedener Stärke sein. Zu Augenspiegeluntersuchungen genügen sehr diluirte, zur Untersuchung von Refractionsanomalien sind stärkere und zur Beseitigung von Iritis und Synechien die stärksten Solutionen nothwendig. Als Lösungen von mittlerer Concentration sind solche von 1:250—500 zu betrachten; bei Iritis benutzt man eine Solution von 1:100, von welcher alle 5—10 Minuten und nach Beseitigung der Entzündung 8—14mal täglich 6—8 Wochen hindurch ein oder mehrere Tropfen mit einem Pinsel auf die Innenfläche des unteren Augenlides gebracht werden. Von Einzelnen wird das Einträufeln in den äusseren Augenwinkel vorgezogen, um Weiterbeförderung durch den Thränen-Nasengang zu verhüten, welche bei Manchen zu Trockenheit im Munde und Schlunde Veranlassung giebt. Zweckmässig macht man die Patienten vor Einträufelung darauf aufmerksam, dass sie die aus dem Auge herabfliessenden Tropfen, Thränen u. s. w. nicht verschlucken. Wird 1 Th. dieser Lösung mit 100 Th. Wasser verdünnt, so erzeugen wenige Tropfen, einige Secunden zwischen die Augenlider gebracht, in  $\frac{1}{2}$ —1 Std. eine zur ophthalmoskopischen Untersuchung ausreichende Pupillenerweiterung ohne merkliche Störung des Sehvermögens. Diese Atropinlösungen sind dem sog. Atropinpapier, Charta atropinisata, welches in England häufig gebraucht wird, vorzuziehen, da die einzelnen Quadrate, in welche dasselbe getheilt ist, nicht immer gleichen Atropingehalt besitzen und ausserdem das Papier mechanisch irritierend wirkt. Gleichförmiger ist die Vertheilung in den neuerdings empfohlenen Gelatineblättchen, welche sich leicht in der Thränenflüssigkeit lösen, ohne zu irritiren. Die von Almén angegebenen enthalten in jedem kleinen Quadrate 0,6 Atropinsulfat.

Bei Gebrauch der Atropinsalze vermeide man alle gerbstoffhaltigen Substanzen, sowie Iodpräparate, da dieselben fälegend und in Folge davon störend auf die Resorption wirken.

Die Verordnung der Belladonna und des Atropins erfordert stets die grösste Vorsicht, zumal im kindlichen Lebensalter, ob-



schon keineswegs die Empfänglichkeit der Kinder in demselben Maasse eine erhöhte ist, wie beim Opium und Morphin.

Die Empfänglichkeit im kindlichen Lebensalter scheint übrigens sehr durch den krankhaften Zustand modificirt zu werden. Nach Fuller toleriren chorea-krankte Kinder Atropin in auffällender Weise. Daneben kommen übrigens in allen Lebensaltern Idiosynkrasien vor. So beobachtete Sadler scarlatinösen Ausschlag bei einem 3 Monate alten Kinde nach 0,075 Mgm., Boissario beim Erwachsenen nach subcutaner Injection von 12 Tr. einer Lösung von 1:400. Selbst bei Application auf die Conjunctiva ist bei einzelnen Individuen Vergiftung nach 3—4 Tropfen einer Lösung von 1:600 beobachtet. Nervöse Personen, namentlich Hysterische, sind sehr empfindlich, Idioten und Blödsinnige sehr unempfindlich, so dass dieselben selbst 3,0 Atropinsulfat in 59 Tagen toleriren (Lussana).

Vor zu lange fortgesetztem Atropinisiren ist nicht nur wegen zu befürchtender Reizung der Bindehaut, sondern auch wegen der Gefahr chronischer Intoxication zu warnen.

### Präparate der Belladonna:

1) **Extractum Belladonnae; Belladonnaextract.** Zur Bereitung dieses Extractes werden 20 Th. frische Blätter und blühende Zweige von *Atropa Belladonna* mit 1 Th. Wasser besprengt, in einem steinernen Mörser zerstossen und stark ausgepresst, der Rückstand nochmals mit 3 Th. Wasser in gleicher Weise behandelt, die Flüssigkeiten bis 80° erhitzt, colirt und im Wasserbade auf 2 Th. abgedampft, bierauf mit 2 Th. Spiritus unter öfterem Umschütteln 24 Stunden stehen gelassen, dann durch ein Leinentuch geseiht, der Rückstand mit 1 Th. Spir. dil. verrieben, nochmals ausgepresst, dann die vereinigten Flüssigkeiten filtrirt und zur Extractconsistenz eingedampft. Dunkelbraun, in Wasser mit brauner Farbe fast klar löslich. Es ist das gebräuchlichste Belladonnapräparat, welches innerlich zu 0,01—0,1 pro dosi (Maximalgabe der Phkp. pro dosi 0,05, pro die 0,2) 3—4 mal täglich in Pillen, Pulvern oder Tropfen (in Aq. Laurocerasi gelöst) gebraucht wird und äusserlich im Klystier (in der nämlichen Dosis wie innerlich) oder in Suppositorien, in Collyrien und Augensalben (Lösung von 0,2—0,5 in 10,0 Wasser oder Glycerin oder Mischung derselben Mengen mit Fett, wenn Atropinlösung nicht tolerirt wird), Salben (1:5—10 Fett) und Pflastern (1:5 Pflastermasse) benutzt werden kann. Bei Stricturen empfahl Tyrrel mit Belladonnaextract bestrichene Bougies, um die Einführung ohne Schmerz bewirken zu können. Auch zu Zahnpillen und endermatisch (zu 0,2—0,3 bei Algien), sowie als Zusatz zu schmerzstillenden Kataplasmen (bei Rheum. acutus, Podagra) kam es in Anwendung.

2) **Extractum Belladonnae siccum; Trocknes Belladonnaextract.** Das vorige mit ää Süssholzpulver, zur Administration in Pulverform, in doppelter Dosis wie Extractum Belladonnae.

Aus dem Belladonnaextract wird die früher officinelle Belladonnasalbe, Unguentum Belladonnae (1 Th. Extract und 9 Th. Wachssalbe), bereitet, welche besonders zur Einreibung bei Neuralgien, Fissura ani und sonstigen schmerzhaften Affectionen und auch bei Stricturen des Muttermundes von Geburtshelfern eingebracht wurde. Dagegen wurde das ebenfalls früher officinelle Belladonnapflaster, Emplastrum Belladonnae, aus Belladonnablättern (1:3 Pflastermasse) dargestellt.

Früher war auch eine Macerationstinctur aus frischen Belladonnablättern und den blühenden Zweigen als Belladonnatinctur, Tinctura Belladonnae, Tinctura Belladonnae e succo, Essentia Belladonnae, officinell, welche innerlich und im Klystier zu 0,3—1,0 verordnet wurde. Sie diente sonst vielfach zu 1—2—3 Tropfen pro dosi bei Angina catarrhalis und Keuchhusten (Popper u. A.), als Zusatz zu Mixturen oder in Form von Tropfen zu Pulvern oder Trochisken, auch extern zur Einreibung bei Algien.

## Verordnungen:

- 1)  $\mathcal{R}$   
*Extracti Belladonnae* 0,2  
*Extr. Gentianae* 0,6  
*Pulv. rad. Gentianae q. s.*  
*ut. f. pilul. No. 20. Consp. D. S. Mor-*  
*gens 1—4 Stück nüchtern zu nehmen.*  
*(Bei habitueller Obstipation. Nunne-*  
*ley.)*

- 2)  $\mathcal{R}$   
*Extracti Belladonnae* 10,0  
*solve in*  
*Aquae Amygdalarum amararum*  
*150,0*  
*adde*  
*Aetheris* 5,0  
*M. D. S. Zum Umschlage oder zur*  
*Einreibung bei Neuralgien, Gicht*  
*u. s. w. Roux.)*

- 3)  $\mathcal{R}$   
*Extracti Belladonnae*  
*Unguent. Glycerini aa* 10,0  
*M. f. ungt. D. S. Zur Einreibung in*  
*die Brustdrüse. (Bei profuser Milch-*  
*secretion. Fountain.)*

- 4)  $\mathcal{R}$   
*Atropini sulfurici* 0,1 (dgm. 1)  
*solve exactissime terendo in*  
*Spiritus diluti q. s.*  
*Mellis depurati* 10,0  
*Pulv. rad. Althaeae q. s.*

*ut f. pilul. No. 200. Consp. D. S.*  
 Zweimal täglich 1 Pille, allmählig bis  
 5—6 Pillensteigend. (Bei Epilepsie,  
 wo die Cur bei Eintritt von Intoxi-  
 cationsphänomenen 8—14 Tage aus-  
 zusetzen und später von Neuem auf-  
 zunehmen ist, bis die Anfälle schwin-  
 den. Bouchardat.) Jede Pille ent-  
 hält  $\frac{1}{2}$  Mgm. Atropinsulfat.

- 5)  $\mathcal{R}$   
*Atropini sulfurici* 0,006 (mgm. 6)  
*Boli albae* 1,0  
*F. l. a. pilulae No. 10. Comp. Bolo alb.*  
 Abends 1—4 Pillen. (Bei Nacht-  
 schweissen Phthisischer. Fraentzel.)  
 Jede Pille enthält 0,3 Mgm. Atropin-  
 sulfat.

- 6)  $\mathcal{R}$   
*Atropini sulfurici* 0,1 (dgm. 1)  
*Aq. destillatae* 10,0  
*D. in vitro cum signo veneni et sub*  
*sigillo. S. Augentropfwasser. Des-*  
*marres.* Dieselbe Mischung kann zur  
 Subcutaninjection und zum internen  
 Gebrauche verordnet werden.)

- 7)  $\mathcal{R}$   
*Atropini sulfurici* 0,01 (mgm. 1)  
*Infusi florum Tiliae* 150,0  
*Syrupi Sacchari* 30,0  
*M. D. S. Stündlich 1 Theelöffel voll.*  
*(Bei Keuchhusten. Nach Bosrédon.)*

**Folia Stramonii, Herba Stramonii, Folia Daturae; Stechapfelblätter.**

In ihrer Wirkung mit der Belladonna identisch sind die officiellen Blätter der als Unkraut in der gemässigten Zone überall vorkommenden, nach De Candolle ursprünglich an den Ufern des Caspischen Meeres einheimischen, wegen ihrer eiförmigen, mit Stacheln besetzten Fruchtkapseln als Stechapfel bezeichneten Solanee *Datura Stramonium* L.

Die zur Blüthezeit gesammelten Stechapfelblätter sind dünn, eiförmig, zugespitzt, buchtig gezähnt, im jungen Zustande etwas flaumig, völlig entwickelt höchstens 2 Dm. lang und bis zu 1 Dm. breit, glatt, bis auf sehr vereinzelte Haare an den ziemlich feinen Nerven, und gehen keilförmig oder fast herzförmig in den 1 Dm. langen und 1—2 Mm. dicken Blattstiel über. Der widerlich narkotische Geruch verliert sich beim Trocknen ganz; der Geschmack ist unangenehm bitterlich salzig. Neben den Stechapfelblättern waren früher auch die länglich nierenförmigen, aussen matt schwärzlichen, sehr feingrubig punktirten, beim Zerquetschen widrig riechenden, bitterlich schmeckenden Stechapfelsamen, *Semina Stramonii* s. *Daturae*, officinell.

Man schrieb die Wirkung des Stechapfels früher einem besonderen, als Daturin bezeichneten mydriatischen Alkaloide zu, welches *Planta* und neuerdings Regnault und Valmont für identisch mit dem Atropin bezeichneten. Wahrscheinlich ist manches Daturin ein Gemisch von Atropin und Hyoscyamin, welche beide nach Ladenburg im Stechapfel vorkommen. Die Schmelzpunkte des Hyoscyamins und Daturins, sowie ihrer Goldverbindung sind gleich (Ladenburg und H. Meyer). Nach Schroff wirkt Daturin sowohl bei localer Application auf das Auge als bei interner Einführung weit stärker mydriatisch als Atropin, nach Bouchardat sogar 3mal so stark. Die Wirkung auf das Herz soll nach kleinen Dosen Daturin schwächer, nach grossen stärker hervortreten, als dies beim Atropin der Fall ist (Lemaitre). In den Stechapfelblättern finden sich viele Salze, in den Samen viel fettes Oel (25 %). Günther konnte aus Stechapfelblättern nur 0,76  $\frac{00}{100}$ , aus den Samen dagegen 2,55  $\frac{00}{100}$  Atropin, jedoch nur in amorphem Zustande, gewinnen.

Eine genaue Darstellung der physiologischen Wirkungen der Stechapfelblätter und Samen brauchen wir nicht zu geben, da dieselben genau mit denen der Belladonnapräparate übereinstimmen.

Vergiftungen, welche namentlich durch den Genuss der Stechapfelsamen bei Kindern gar nicht selten sind, tragen genau das Gepräge des Atropinismus (Mydriasis, Delirien u. s. w.), oft mit ausgeprägtester Steigerung des Bewegungstriebes. In einzelnen Vergiftungsfällen findet sich deutliche Reizung der ersten Wege. Ausserdem werden mehrere Fälle berichtet, wo die Erhöhung des Geschlechtstriebes (Nymphomanie bei Frauen und Mädchen und mehrstündiger Priapismus bei Männern) in auffallender Weise unter den Symptomen hervorstachen. Im 17. und 18. Jahrhundert wurden die Stechapfelsamen nach dem Zeugnisse von Bauhin, Boerhave und Sauvages ausserordentlich häufig gemissbraucht, indem man sie zu gemahlenem Kaffee oder zu Schnupftabak (sog. tabac à l'endormie, poudre aux sorciers) mengte, um Jungfrauen zur Prostitution zu bringen, und französische Autoren bezeugen, dass solche Endormeurs noch nicht verschwunden sind. In Peru wird aus Stramonium ein stark narkotischer Trank, Manga oder Tonga genannt, bereitet (Tschudi). In Ostindien benutzen die sog. Thugs die gepulverten Samen von *Datura ferox*, *D. tatula*, *D. metel*, *D. alba* und ähnlichen Arten oder ein daraus dargestelltes starkes Extract zur Narkotisirung von Personen, um dieselben ungestört zu berauben. Die Mehrzahl der Vergiftungen verläuft günstig. Sehr verschieden ist die Empfindlichkeit, so dass in einzelnen Fällen der Inhalt ganzer Samenkapseln ohne letalen Ausgang von Kindern verzehrt wurde, während in anderen der Tod nach 12—16 Stunden eintrat.

Als Medicament hat Stramonium besonders bei psychischen Störungen und Asthma Anwendung gefunden.

Bei Manie und Melancholie wurden Stechapfelpräparate von Störk benutzt, später rühmten sie Michéa, Moreau, Woodward u. A. bei Neigung zu Selbstmord und bei lebhaften Hallucinationen, bei welchen Zuständen indess andere Irrenärzte, z. B. Brierre de Boismont, keine Erfolge sahen, obschon das Mittel in steigenden Dosen selbst bis zum Eintritte von Vergiftungsscheinungen gegeben wurde. Noch weniger ist Stramonium wohl bei Nymphomanie und Puerperalmanie von Nutzen. Amelung empfahl es beim idiopathischen Schwindel. Bei Asthma sind Stechapfelpräparate ausserordentlich beliebt. Hier lässt sich, da das Atropin das inspiratorische Centrum bei mittleren und grossen Dosen reizt, ein directer sedirender Einfluss bei nervösem Asthma nicht annehmen, dagegen ist der Effect grösserer Dosen auf das Gehirn manchmal von günstigem Einflusse, und wie schon Laennec angab, empfindet der Kranke, wenn auch das Athmen in Wirklichkeit nicht freier wird, die Störung weniger, zumal weil auch die sensiblen Nervenendigungen dadurch paralisirt werden. So kommt es denn auch, dass selbst Fälle von Dyspnoe, deren Ursache in einem bestehenden Bronchialkatarrh zu suchen ist, vorübergehende Besserung durch Stramonium erfahren, welches übrigens meist in einer Form angewendet wird, bei welcher die Wirkung des Daturins nur in untergeordnetem Maasse sich



geltend machen kann (Rauchen der Blätter). Erwähnung verdient, dass die Tscherkessen eine Abkochung der Samenkapseln als Anästheticum vor Operationen verwenden und dass Trousseau Stechapfelextract zu 0,01 pro dosi in Pillen bei Stuhlverstopfung besonders empfiehlt.

Zum inneren Gebrauche dienen Folia Stramonii kaum jemals. Die von der Phkp. festgestellten Maximalgaben betragen für Folia Stramonii 0,2 pro dosi und 1,0 pro die; für die Samen sind sie dem Alkaloidgehalt entsprechend 2—3mal so niedrig zu setzen. Aeusserlich finden Stechapfelblätter vorzugsweise zum Rauchen Verwendung, wo man sie meist in Form der Stramoniumcigarren, welche nach Art der gewöhnlichen Cigarren aus 4,0 Stechapfelblättern als Einlage und einem Deckblatte von Tabaksblättern angefertigt werden. Man darf dieselben übrigens nur mit Vorsicht rauchen lassen (anfangs nur wenige Züge), da sehr leicht Narkose erfolgt, und muss sofort aussetzen, sobald leichter Schwindel sich einstellt. Statt der Stramoniumcigarren kann man auch die S. 1091 erwähnten Cigarettes pectorales d'Espic oder die aus Stechapfelblättern, welche mit Opiumextract getränkt werden, dargestellten Cigarettes antispasmodiques verwenden. Auch lässt man ein Gemenge von 2 Th. Tabak und 1 Th. Stechapfelblättern oder mit Stechapfelaufguss getränkten Tabak aus Pfeifen rauchen.

Das aus dem Stechapfel dargestellte Alkaloid (Daturin) ist als Mydriaticum von einzelnen französischen Augenärzten (Cunier, Jobert de Lamballe) statt Atropin empfohlen, ist aber als 6—7mal theurer kaum dem gewöhnlichen Atropin zu substituiren. A. v. Graefe empfahl es bei Intoleranz des Auges gegen Atropin in der Formel Daturini 0,06, Acidi sulf. dil. quant. minim. suff. solv. in Aq. dest. 8,0. D. S. Ein Tropfen mit einem Pinsel in das Auge einzutragen. In der Regel folgt bei Iritis auch bald Intoleranz gegen Daturin (Chamisso).

Nicht mehr officinell ist eine früher aus Stechapfelsamen mit 10 Th. Spir. dil. (1:10) bereitete Tinctura Stramonii, welche man innerlich zu 5—10—20 Tr. mehrmals täglich und äusserlich theils zu schmerzstillenden Einreibungen, theils bei Photophobie und Blepharospasmus als Zusatz von Augenbähungen (1:25 Wasser) benutzte.

Eia aus frischem Stechapfelkraut bereitetes Saftextract war früher als Extractum Stramonii officinell und wurde innerlich zu 0,01—0,1 3—4mal täglich in Pillen und Solutionen oder auch äusserlich wie Belladonnaextract benutzt. Die in anderen Ländern officinellen Extracte aus Stechapfelsamen sind nur unbedeutend stärker.

### **Folia Hyoscyami, Herba Hyoscyami; Bilsenkraut.**

Die Folia Hyoscyami stammen von dem in allen Welttheilen an unbebauten Stellen, in Europa vom mittleren Norwegen bis Portugal und Griechenland, wachsenden Bilsenkraut, *Hyoscyamus niger* L. (Fam. Solaneae).

Die Blätter, welche von der blühenden, am besten zweijährigen Pflanze im wilden Zustande gesammelt werden, sind spitzeiförmig, grobgezähnt und wie Stengel und Kelch von sehr langen, weichen und breit bandartigen Gliederhaaren zottig, welche letzteren in eine mit schmierigem Inhalte versehene Drüse auslaufen, wodurch das frische Bilsenkraut sich sehr klebrig anfühlt. Der Inhalt dieser Drüsen bedingt den widrig narkotischen Geruch der frischen Blätter; getrocknet riechen dieselben nicht und schmecken salzig und etwas bitter, nicht scharf. Die cultivirte Pflanze ist weniger zottig und von geringerem Geruche. Die wenig über 1 Mm. messenden und kaum über  $\frac{1}{2}$  Mgm. wiegenden, rundlichen oder eiförmigen, graubräunlichen oder gelblichen, ölig bitter schmeckenden Bilsensamen, *Semina Hyoscyami*, sind nicht mehr officinell. Im südlichen Europa werden Blätter und Samen von *Hyoscyamus albus* an Stelle der betreffenden Theile von *H. niger* benutzt.

Der wirksame Bestandtheil des Bilsenkrauts ist ein dem Atropin isomeres Alkaloid, das Hyoscyamin, neben welchem noch eine amorphe Base, das Hyoscin, sich darin findet.

Das Hyoscyamin bildet seideglänzende, bisweilen durchsichtige, stern- oder büschelförmig vereinigte Nadeln von scharfem, unangenehmem Geschmacke; es löst sich schwierig in kaltem Wasser, leichter in heissem, ferner in Weingeist, Chloroform und Aether. Das Hyoscyamin giebt nach Ladenburg dieselben Spaltungsproducte wie das Atropin, Tropasäure und Tropin (früher von Reichardt und Höhn als Hyoscin und Hyoscinsäure und von Preyer und Hellmann als den Spaltungsproducten des Atropins analog wirkend bezeichnet). Das Hyoscin, früher amorphes Hyoscyamin genannt, ist dem Atropin und krystallisirten Hyoscyamin isomer, liefert aber bei der Spaltung Tropasäure und Pseudotropin, das sich vom Tropin durch einen höheren Siedepunkt unterscheidet. Die Angaben über den Hyoscyamingehalt des Bilsenkrauts und der Bilsensamen sind nicht übereinstimmend und auch nicht zuverlässig, da man früher Hyoscyamin und Hyoscin nicht trennte. Die Samen, welche nach Höhn 0,05 % enthalten, sind im Allgemeinen entschieden kräftiger als die Blätter. Nach Schroff wirken dieselben dreimal so intensiv wie das zweijährige Kraut, welches seinerseits das einjährige Kraut an Intensität der Wirkung übertrifft. Schon 1,0 Bilsensamen sollen heftige Delirien hervorrufen können. Frische Blätter sind entschieden wirksamer als getrocknete, da sowohl Hyoscyamin als Hyoscin sehr leicht der Zersetzung unter Ammoniakentwicklung unterliegen.

Die Wirkungen des Bilsenkrauts sind im Wesentlichen der Belladonna gleich, obschon gewisse Differenzen in der Action des Hyoscyamins und Atropins existiren. Auf die Pupille scheint Hyoscyamin stärker als Atropin zu wirken (Schroff). Nach Gnauck ist reines Hyoscyamin bedeutend stärker hypnotisch als Atropin.

Die Versuche Schroffs, wonach Hyoscyamin sowohl beim Menschen als beim Kaninchen (hier schon nach 0,0083 Mgm.) rascher und länger dauernde Mydriasis bedinge, bedarf der Nachprüfung mit völlig reinem Alkaloid, zumal da französische Autoren (Lemattre u. A.) zu entgegenstehenden Resultaten kamen. Die auf Grundlage mit völlig reinem Hyoscyamin von Gnauck (1881) betonte Differenz des Hyoscyamins gegenüber dem Atropin, dass es keine Steigerung des Bewegungstriebes und Aufregung, sondern Ruhe und Schlaf hervorbringe, hat bereits Schroff nach den Selbstversuchen von Dillnberger, welcher nach zweimal 0,002 die gewöhnlichen leichten Belladonnasymptome, nach 0,005 Kopfschmerz, Verminderung der Geruchs- und Geschmacksempfindung und Neigung zu Schlaf, der tief und ruhig war, bekam, betont. Auch Fronmüller bezeichnete nach Versuchen an Kranken Hyoscyamin als Hypnoticum in seiner Wirkung den zweiten Opiumsorten gleichkommend. Nach Gnauck bewirkt Hyoscyamin in kleinen Dosen subcutan injicirt beim Menschen kurzdauernde Verlangsamung des Pulses, die bei grösseren Gaben mitunter ausbleibt, dann Pulsbeschleunigung und schliesslich Rückkehr zur Norm in 1–2 Std., ferner geringe Vermehrung der Athemthätigkeit, Durst und Trockenheit im Halse, Heiserkeit, Pupillenerweiterung, unklares Sehen, auch leichten Schwindel, Kopfdruck und schwankenden Gang; zur Zeit der höchsten Pulszahl oder etwas vorher tritt Müdigkeit ein, der während der Pulsabnahme ruhiger und tiefer mehrstündiger Schlaf folgt, in welchem die erweiterten Pupillen sich verengen und die Armgefässe sich wie im normalen Schlafe erweitern. Bei grösseren Dosen kommt es übrigens zu Delirien. Eine Differenz des Hyoscyamins und Atropins zeigt sich auch in physiologischen Versuchen darin, dass ersteres vorübergehend die Bauchgefässe erweitert und in ähnlicher Weise wie Morphin und Chloral Steigen der Hauttemperatur bei Fallen der Rectaltemperatur bedingt, was Atropin nicht thut (Gnauck). Ferner ist die Immunität der Kaninchen dem Hyoscyamin gegenüber nicht in gleicher Weise ausgesprochen, da etwa 0,03 Hyoscyamin Kaninchen in 24–45 Stdn. nach vorausgängiger Dyspnoe, beschleunigter Respirationsfrequenz und Mydriasis tödten. Gleichheit der physiologischen

Effecte zeigt sich namentlich darin, dass Hyoscyamin wie Atropin die peripherischen Vagusendigungen lähmt, das Stadium der erhöhten Erregbarkeit der motorischen Nerven während des Absterbens aufhebt, die Reflexerregbarkeit wahrscheinlich in Folge von Lähmung der Hautnervenendigungen herabsetzt und die Respiration bei Fröschen verlangsamt, bei Säugethieren zuerst verlangsamt, später beschleunigt (Laurent, Hellmann und Preyer). Die Muskelerregbarkeit wird dadurch nicht alterirt, die Peristaltik durch grosse Dosen gelähmt, durch kleine angeblich beschleunigt, die Temperatur durch grosse Mengen herabgesetzt, durch kleine gesteigert. Die Wirkung auf das Froschherz ist bei Atropin und Hyoscyamin gleich, das Sinken der Herzschläge bei Atropin bedeutender, ebenso die vaguslähmende Wirkung beim Kaninchen nach letzterem anhaltender. Vollkommen verschieden stellt sich das Hyoscyamin dem Atropin gegenüber nach seiner relativen Unschädlichkeit, indem Hyoscyamin niemals zu 0,003 und gewöhnlich selbst nicht zu 0,01 subcutan bedrohliche Symptome erzeugt. Das Hyoscin wird von Gnauck für 10mal stärker wirkend als Hyoscyamin erklärt, doch ist die individuelle Receptivität äusserst verschieden, so dass manche Personen nicht einmal 0,001 subcutan, andere 0,025 ohne starke Nebenerscheinungen ertragen. Hyoscin macht bei diesen Dosen oder bei der doppelten Menge weit stärkere Nebenerscheinungen als Atropin in medicinaler Dose, insbesondere starkes Hitzegefühl, Röthung des Gesichts und Hautjucken, taumelnden Gang und Delirien, daneben führt es auch wie Hyoscyamin Ermüdung und Schlaf herbei, der jedoch rascher vorübergeht, dagegen weicht es von beiden darin ab, dass es niemals, selbst nicht bei grossen Dosen Pulsbeschleunigung, sondern stets Verlangsamung, im Allgemeinen mit der Grösse der Dosis wachsend, bewirkt. Die Differenzen der Wirkung des Atropins und Hyoscyamins steigern sich übrigens bei Vergiftungen mit Belladonna und Bilsenwurzel nicht prägnant oder überhaupt nicht.

Im Ganzen wird Hyoscyamus in denselben Richtungen wie die Belladonnapräparate gebraucht, innerlich namentlich häufig zur Beseitigung von Hustenreiz, äusserlich zur Milderung schmerzhafter Affectionen.

Als hustenreizlinderndes Mittel leistet Bilsenextract nach den Erfahrungen älterer Praktiker mehr als Extractum Belladonnae und mitunter selbst mehr als Opium oder Morphin und beseitigt die durch den Husten bedingte Schlaflosigkeit. Bei Keuchhusten und Asthma scheint Hyoscin sicherer als Atropin zu wirken (Edelefsen und Illing), ebenso bei Epilepsie und Enteralgie. Bei Neuralgien, wo Bilsenkraut schon in älterer Zeit, namentlich in Verbindung mit Zinkoxyd (bei Prosopalgie) in Form der Meglinschen Pillen Lobredner fand, haben neuerdings Oulmont und Pierce Hyoscyamin mit Glück versucht. Vorzügliche Wirkungen will Oulmont bei Tremor mercurialis vom Hyoscyamin gesehen haben. Die hypnotischen Effecte des Hyoscyamins und in geringerer Weise auch des Hyoscins machen die schon von Störck und Fothergill als Mittel bei Manie empfohlenen Bilsenkrautpräparate und in specie das Hyoscyamin zu einem ausgezeichneten Beruhigungsmittel bei psychischen Aufregungszuständen. Namentlich in England ist das Hyoscyamin in den letzten Jahren in Irrenanstalten hypodermatisch viel gebraucht (Lawson, Prideaux, Browne und Hilston), und scheint es sich besonders bei Manie und Aufregungszuständen, bei Epilepsie und semiler Demenz, weniger bei Melancholie und Dementia paralytica zu bewähren. Als topisches Mydriaticum macht der theuere Preis und die Inconstanz der Handelswaare das Hyoscyamin zu allgemeiner Anwendung unbrauchbar, doch lässt es sich in Fällen, wo Atropin nicht tolerirt wird, versuchsweise benutzen.

Die Folia Hyoscyami kommen innerlich fast nur in Form ihrer mannigfachen Präparate in Anwendung. Man kann sie mit  $\alpha\alpha$  Extr. Hyoscyami (als sog. *Pilulae sedativae Phkp. paup.*) zu 0,05--0,3 geben. Die Phkp. gestattet 0,3 als höchste Einzeldosis, 1,5 als Tagesgabe. Aeusserlich werden sie zu narкотischen Kataplasmen (mit *Herba Conii*, Sem. *Lini*  $\alpha\alpha$  oder mit  $\alpha\alpha$  Species emollientes), hier und da auch als Rauchmittel bei Asthma oder Zahnschmerz



(mit Tabak oder Fol. Stramonii) benutzt; auch kommen sie selten im Infus (1:5—20) als Mydriaticum in Anwendung.

Das Hyoscyamin würde, wenn es im reinen Zustande billig zu haben wäre, zur subcutanen therapeutischen Verwendung an Stelle des Atropins sehr zu empfehlen sein. Das Hyoscyamin des Handels ist jedoch stets, das sog. Hyoscyaminum crystallisatum eingeschlossen, ein Gemenge des mehr hypnotischen Hyoscyamins mit Hyoscin, bei längerer Aufbewahrung ausserdem mit verschiedenen Zersetzungsproducten, die in dem amorphen oder extractförmigen Hyoscyamin des Handels prävaliren. Nach Harnack ist krystallisirtes Hyoscyamin  $2\frac{1}{2}$ mal so stark wie amorphes, doch kommt noch weit schwächeres amorphes Hyoscyamin im Handel vor. Man muss daher mit kleinen Dosen beginnen und allmählig steigend die Dosis des einzelnen Präparats ausprobiren. Man verwendet dasselbe entweder intern in Pillenform oder in Pulvern mit Milchzucker, oder subcutan. Von dem am meisten gebräuchlichen Merckschen Hyoscyamin ist als Hypnoticum oder schmerzstillendes Mittel in der Regel die Dosis von 0,001—0,003, bei aufgeregten und gewaltthätigen Geisteskranken die von 0,003 bis 0,004 ausreichend. Kleine Dosen wirken überdies häufig besser hypnotisch als grosse. Zur Subcutaninjection ist eine Lösung von 0,25 in  $\bar{a}\bar{a}$  15,0 Aq. dest. und Glycerin empfehlenswerth, die ohne Anwendung von Wärme bereitet wird, da sonst das Hyoscyamin sich fast ganz zersetzt. Concentrirtere Solutionen lassen sich ohne Erwärmen nicht herstellen.

### Präparate:

1) **Extractum Hyoscyami; Bilsenkrautextract.** Nach Analogie des Extractum Belladonnae aus den Blättern und Zweigen des blühenden Bilsenkrauts bereitet; braungrünlich, in Wasser mit brauner Farbe trübe löslich. Man verwendet dasselbe innerlich zu 0,01—0,2 mehrmals täglich in Pulvern, Pillen oder Lösung, häufig Mixturen, auch Emulsionen hinzugesetzt; äusserlich im Klystier (zu 0,03 bis 0,2) und Suppositorien (in derselben Menge), in Salben, Linimenten und Pflastern, auch zu Augenwässern und Augentropfwässern (0,5—1,0 auf 25,0) und Augensalben (0,5—1,0 auf 10,0 Fett). Zum inneren Gebrauche beträgt die Maximalgabe pro dosi 0,2, pro die 1,0. Ein früher aus den entölten Samen bereitetes spirituöses Extract, Extractum Hyoscyami e seminibus, ist in seiner Wirkung angeblich etwas stärker (nach Simon schwächer).

2) **Extractum Hyoscyami siccum; Trocknes Bilsenkrautextract.** Das vorige mit  $\bar{a}\bar{a}$  Süssholzpulver; in doppelter Dosis zur Dispensation in Pulverform benutzt.

3) **Oleum Hyoscyami infusum; Fettes Bilsenkrautöl, Bilsenöl.** Durch Digestion von 4 Th. Herba Hyoscyami, welche mit 2 Th. Spiritus einige Stunden im verschlossenen Gefässe gestanden haben, mit 40 Th. Oleum Olivarum, Auspressen und Filtriren der Colatur erhalten. Das bräunlich-grüne, fast nur den Riechstoff des Bilsenkrauts enthaltende Oel ersetzt das durch Kochen bereitete Oleum Hyoscyami coctum. Früher selbst innerlich zu 1,0—2,0 in Emulsion bei Hustenreiz benutzt, ist es jetzt noch immer populär als Einreibungsmittel bei schmerzhaften Affectionen, zu denen es pure oder mit Talg u. a. Mitteln in Salbenform oder in Combination mit hautreizenden oder anästhesirenden Mitteln benutzt wird. Es dient auch zu Einträufelungen in den Gehörgang bei Otalgie, selten zu Klystieren und Injectionen.

Obsolet ist eine aus Bilsenkrautextract (1 Th. mit 9 Th. Wachssalbe) bereite, zu schmerzlindernden Einreibungen gebrauchte Salbe, Unguentum Hyoscyami, Bilsenkrautsalbe oder Bilsensalbe, und ein aus gepulverten Blättern dargestelltes Bilsenkrautpflaster, Emplastrum Hyoscyami, welches als Deckpflaster bei Algien und auch als angeblich schlafmachendes Pflaster (mit  $\frac{1}{10}$  Opiumpflaster in der Schläfengegend applicirt) Anwendung fand.

In älterer Zeit benutzte man auch eine aus dem Samen des Bilsenkrauts bereitete Tinctur zu 10—30 Tr. intern, sowie Emulsionen der Samen mit süssen oder bitteren Mandeln, die als Emulsio Seminum Hyoscyami (aus 1 Theil Bilsensamen, 6 Th. süssen Mandeln und 150 Th. Wasser bereitet) und als

**Emulsio Amygdalarum composita** (aus 4 Th. süßen Mandeln und 1 Th. Bilsensamen mit 64 Th. Aqua Amygdalarum amararum diluta, 6 Th. Zucker und 1 Th. Magnesia usta bereitet), bezeichnet wurden. Bei Zahnweh gebrauchte man Dämpfe von 1 Th. Bilsensamen und 4 Th. Bernstein (auf Kohlen gestreut, mit einem Trichter in den Mund geleitet). Das als *Oleum Hyoscyami seminum pressum* in älterer Zeit officinelle fette Oel der Bilsensamen wirkt ganz nach Art der *Olea pinguis*.

### Verordnungen:

1)  $\mathcal{R}$   
*Extracti Hyoscyami* 1,0 (gm. 1)  
*Liquoris Ammonii anisati* 15,0  
*M. D. S.* 4mal täglich 20 Tropfen in  
 Brustthee. (*Liquor pectoralis*  
 der Berliner Charité. **Horn.**)

2)  $\mathcal{R}$   
*Opii* 0,2 (dgm. 2)  
*Fol. Digitalis*  
*Rad. Ipecacuanhae* aa 0,5 (dgm. 5)  
*Extr. Hyoscyami* 3,0 (gm. 3)  
*Pulv. rad. Alth. q. s.*  
*ut f. l. a. pilul.* 50. *Consp. D. S.* Drei-  
 stündlich 1 Pille. (Bei Krampfhusten.  
**Heim.**)

3)  $\mathcal{R}$   
*Extracti Hyoscyami* 0,3  
*Elixirii e succo Liquiritiae* 25,0  
*Aq. Foeniculi* 50,0  
*Aq. florum Aurantii* 100,0  
*M. D. S.* 3—4mal täglich 1 Esslöffel.  
 (Bei Hustenreiz. **Frerichs.**)

4)  $\mathcal{R}$   
*Zinci oxydati puri*  
*Extracti Hyoscyami*  
*Extr. Valerianae* aa 2,0.  
*F. l. a. pilul. No. 40. D. S.* 2—3mal  
 täglich 1 Pille. (*Pilulae Meglini*  
**Code Fr.**)

**Duboisin.** — Aus der in Neusüdwaies, Queensland und Neucaledonien einheimischen Solanee *Duboisia myoporoides* ist ein als Duboisin bezeichnetes Alkaloid isolirt, welches sämtliche physiologische Effecte des Atropins besitzt und als Mydriaticum weit intensiver als Atropin wirkt (Sydney Ringer, Tweedy u. A.). Nach Ladenburg ist das Duboisin mit Hyoscyamin identisch. Nach Tweedy lähmt es die Accommodation weit weniger lange als Atropin. Sollte die Angabe von Ladenburg sich bestätigen, dass *Duboisia myoporoides* kein Hyoscin enthält, so würde sich die Verwendung derselben zur Darstellung von Hyoscyamin empfehlen. Im Ganzen hat Duboisin wenig Anwendung gefunden, zumal da es leichter als Atropin die Anfänge und selbst intensivere Symptome von Vergiftung bei Application auf die Bindehaut bedingt. Zur Gattung *Duboisia* gehört auch die als Berausungsmittel von australischen Völkerstämmen benutzte Piturypflanze, *Duboisia Hopwoodii*, welche ebenfalls ein mydriatisches Alkaloid, Piturin, enthält, doch ist die Mydriasis weit geringer und von kürzerer Dauer und deutlich von einem Vorstadium der Myose begleitet, die Wirkung ausserdem dadurch vom Atropin verschieden, dass Piturin die Schweiss- und Speichelsecretion nicht beschränkt, vielmehr in grossen Dosen geradezu steigert.

**Homotropinum.** — Ladenburg hat aus der aus dem Atropin sich abspaltenden Base Tropin eine von ihm als Tropaeine bezeichnete Reihe von Basen dargestellt, unter denen das aus dem mandelsauren Tropin gewonnene Homotropin als bromwasserstoffsäures Salz auf das Auge applicirt wie Atropin die Pupille ohne vorübergängige Myose erweitert, ohne jedoch letztere gleich lange zu beeinträchtigen und ohne irritirend auf die Bindehaut zu wirken (Völckers, Tweedy). Dasselbe empfiehlt sich daher zum Ersatz des Atropins bei Instillation zum Zwecke ophthalmoskopischer Untersuchungen, wo es in 2% Lösung verwendbar ist. Auch sonst besitzt Homotropin die physiologischen Wirkungen des Atropins, z. B. auf die Vagusendigungen und die Schweissnerven, jedoch erst in Dosen von 0,04 subcutan beim Menschen. Fronmüller empfiehlt das Präparat bei Nachtschweissen und als Antidot gegen Pilocarpin.

#### 4. Ordnung. Neurotica cerebrosppinalia, auf Gehirn und Rückenmark gleichzeitig wirkende Mittel.

Bei einer grösseren Anzahl neurotischer Substanzen ist die Wirkung gleichzeitig auf das Gehirn und Rückenmark gerichtet, ohne dass der eine dieser Centraltheile vorwaltend afficirt wird. Manche der hierher gehörigen Stoffe wirken vorzugsweise auf die Medulla oblongata und das respiratorische Centrum. Man kann dieselben in 2 Gruppen als erregende und beruhigende Gehirnrückenmarksmittel bringen, von denen jedoch die erstgenannten bereits in früheren Abschnitten (Pikrotoxin, Codein, Santonin) Erledigung gefunden haben, da sie therapeutisch meist in andrer Richtung verwerthet werden, so dass wir hier nur noch die beruhigenden Hirnrückenmarksmittel zu behandeln haben.

**Kalium bromatum**, Kali hydrobromicum, Bromuretum kalicum s. potassicum;  
**Kaliumbromid**, Bromkalium, Kaliumbromür.

Vielleicht das wichtigste unter allen Cerebrosppinalia sedativa ist das besonders als Antiepilepticum mit Recht hochgepriesene, in seinen äusseren Eigenschaften dem Iodkalium ähnliche Haloidsalz.

Das Bromkalium, KBr., welches in geringer Menge im Meerwasser und in einigen Mineralquellen (Kreuznach, Adelheitsquelle) sich findet, bildet weisse, glänzende, luftbeständige Würfel von salzigem Geschmack, schmilzt in der Rothglühhitze und verdampft bei höherer Temperatur. Es löst sich in 2 Th. Wasser und in 200 Th. Spiritus. Mit Braunstein und Schwefelsäure erhitzt, liefert es freies Brom, welches bei Versetzen von wässriger Bromkaliumlösung mit wenig Chlorwasser ebenfalls frei gemacht wird und damit geschütteltes Chloroform oder Aether rothgelb färbt.

Die Reinheit des Präparats ist für die medicinische Verwendung von grosser Bedeutung. Nach Voisin sollen die sedativen Effecte bei Epilepsie und analogen Affectionen um so besser hervortreten, je freier das Bromkalium von Verunreinigungen ist. Besteht die Verunreinigung aus Kaliumcarbonat, so ist die schwächere Wirkung nicht zu bezweifeln. Nach Rabuteau ist eine Verunreinigung mit bromsaurem Kalium geradezu gefährlich, indem aus einem Gemenge von Kaliumbromür und Kaliumbromat im Magen Brom frei werde, welches irritirend auf die Magenwandungen wirke. Mit Kaliumbromat verunreinigtes Bromkalium färbt sich beim Uebergiessen mit verdünnter Schwefelsäure roth.

Kaliumbromid besitzt örtliche und entfernte Wirkung. Erstere ist unbedeutend und tritt nur nach interner Application in Substanz oder sehr concentrirter Solution ein, welche zu Brennen und Druck im Epigastrium, selbst zu Erbrechen und Diarrhöen führen kann.

Reines Bromkalium verhält sich in dieser Beziehung nicht anders wie Kochsalz oder Iodkalium. Bei der gewöhnlichen Darreichungsweise (1,0–4,0 in  $\frac{1}{2}$  oder einem ganzen Glase Wasser aufgelöst) treten solche Erscheinungen nur ausnahmsweise auf; in der Regel findet sogar dabei Zunahme des Appetits statt. Doch giebt es Fälle, wo auch solche bei bestehendem Magenkatarrh zu



Erbrechen führen (Amory und Clarke). Die Zweifel Einzelner, wie Pletzer und Krosz, dass Bromkalium Gastroenteritis bedingen könne, sind ganz unberechtigt; auch reines Bromkalium macht in 25% Lösung bei Kaninchen Corrosion der Magenschleimhaut (blutige Infiltration und Epithelabstossung). Völle und Druck im Magen, sowie Diarrhoe sind selbst bei interner Application verdünnter Lösungen nicht selten (Krosz). Beim Menschen erzeugt Bromkalium, subcutan injicirt, Abscessbildung (Amory und Clarke).

Die Resorption des Bromkaliums geschieht von allen Schleimhäuten und vom Unterhautzellgewebe, dagegen nicht bei Application in Lösung von der unverletzten Haut aus. Die Elimination erfolgt vorzugsweise durch den Urin, daneben auch durch Milch, Thränen und Schweissdrüsen, in geringem Grade auch durch Hautdrüsen und Schleimhäute.

Im Urin und Speichel findet sich nach Ingestion von 1,0 das Bromkalium schon nach 5 Minuten; die grösste Menge wird schon in den ersten 24–36 Std. eliminirt, doch finden sich noch nach 3–4 Wochen auf grössere Dosen kleine Quantitäten im Harn und Speichel (Rabuteau). In den Fäces zeigen sich nur Spuren (Rabuteau, Sonnerat). Im Urin wird in den ersten 24 Stunden  $\frac{1}{6}$ – $\frac{1}{4}$  des eingeführten Bromkaliums sowohl bei Kindern als bei Erwachsenen eliminirt (Sonnerat). Nach Amory und Clarke wird Bromkalium vom Rectum minder gut resorbirt als vom Magen aus. Es passirt auch die Placenta und findet sich nach Darreichung grosser Dosen im Harne Neugeborner in den ersten 48–60 Stunden (Porak). In dem Inhalt der bei Bromcuren auftretenden Acnepusteln ist Brom nachweisbar (Guttmann).

In Bezug auf die entfernte Wirkung des Bromkaliums im Organismus sind die Anschauungen insofern divergent, als Einzelne demselben ausschliesslich die Wirkung der Kalisalze vindiciren (Eulenburg und Guttmann, Binz, Schouten), Andere ihm eine besondere Wirkung als Bromverbindung zuschreiben (Laborde, Damourette und Pelvet), während eine dritte Ansicht, wonach das Bromkalium theils als Kalisalz, theils als Bromverbindung wirke, durch Rabuteau und Krosz (1876) vertreten wird. Die Erscheinungen, welche man sowohl am gesunden als am kranken Menschen nach den jetzt üblichen medicinalen Dosen als an Thieren nach toxischen und letalen Gaben auftreten sieht, zwingen allerdings in keiner Weise zu der Annahme, dass das Brom bei der Wirkung eine besondere Rolle spielt, und selbst die therapeutischen Effecte will man durch entsprechende Mengen Chlorkalium (Sander) erzielt haben. Auch die physiologischen Versuche stellen die Wirkung des Bromkaliums zunächst mit denen anderer Kalisalze in eine Linie. Indessen ist der neuerdings von Reichert erbrachte Beweis, dass die Bromwasserstoffsäure genau in derselben Richtung wie Bromkalium wirkt, und der Umstand, dass die therapeutischen Effecte des Bromkaliums auch durch Bromnatrium und Bromammonium herbeigeführt werden, geeignet, die Theilnahme des Broms an den Effecten des Salzes wahrscheinlich zu machen. Die Wirkung ist bei letalen Gaben Bromkalium namentlich auf das Herz gerichtet, während bei mittleren Dosen besonders die Sensibilität und die Reflexerregbarkeit und später auch die Motilität herabgesetzt wird.

Krosz will die Einwirkung des Bromkaliums auf das Herz und die damit

im Zusammenhange stehende Action auf Respiration und Temperatur als Kaliumwirkung betrachtet wissen, wohin er auch die Lähmung der Muskeln und Nerven zieht, während er die Herabsetzung der Reflexerregbarkeit, deren Vorkommen nach Vergiftung mit Kalisalzen sich nur durch Absterben der Muskeln und Nerven erkläre, und die cerebralen Phänomene (Herabsetzung der Gehirnreflexe, Müdigkeit, Abspannung), welche auch dem Bromnatrium und selbst in höherem Grade zukommen, als Bromwirkung auffasst. Mit ziemlicher Bestimmtheit können wir die bei Bromkaliumcuren überaus häufig eintretende Acne als Bromsymptom bezeichnen, da dieselbe auch nach Gebrauch von Bromnatrium und selbst von Bromeisen vorkommt. Ein weiteres Phänomen beim Menschen, das vielleicht als Bromsymptom aufzufassen ist, bildet ein eigenthümlicher Geruch des Athems bei Bromkaliumcuren, welcher oft geradezu als Bromgeruch bezeichnet wird.

Ueber die Wirkungen der Bromwasserstoffsäure, des Bromnatrium und Bromammonium wird weiter unten die Rede sein. Dass das Brom in organischen Verbindungen eine besondere Veränderung der Wirkung in dem Sinne hervorbringt, dass Motilität und Sensibilität mehr dadurch herabgesetzt werden, ist nach Versuchen Steinauers über Brombenzol, Brombenzoesäure und Bromessigsäure (Monobromessigsäure) sehr wahrscheinlich. Monobromessigsäure bewirkt zu 0,05–0,3 in 2–20% Lösung bei Fröschen in 10–30 Minuten Hypnose, Abnahme der Puls- und Athemfrequenz, Schwächung der Motilität, später Sistiren der Reflexaction durch Herabsetzung der Erregbarkeit und schliessliche Lähmung der reflexvermittelnden Ganglien des Rückenmarks, zuletzt systolischen Herzstillstand durch Beeinträchtigung der automatischen Herzzentren und des Herzmuskels und allmählicher Paralyse der peripheren Nerven und Muskeln. Bei Kaninchen sinkt nach 0,5–1,0 subcutan oder intern Puls- und Athemfrequenz, sowie der Blutdruck; auch tritt Narkose und Muskellähmung ein (Steinauer).

Die Erscheinungen, welche beim Menschen und bei verschiedenen Thieren durch Bromkalium in grösseren Dosen hervorgerufen werden, sind durch zahlreiche Beobachtungen an Kranken (Huette, Voisin, Krosz u. A.) und Thiersversuche (Eulenburg und Guttman, Laborde, Martin Damourette und Pelvet) genau festgestellt.

Nach Gaben von 0,1–0,5 treten bei Menschen keine irgendwie nennenswerthe Symptome auf. Bei Dosen über 1,0 stellt sich als erstes Phänomen ein Gefühl allgemeiner Schwere und Muskelermüdung ein, wozu sich dann schwankender Gang gesellt (Saison). Bei längerem Gebrauche, bisweilen schon am zweiten Tage, kommt es zu Schwere des Kopfes, Druck in Stirn und Schläfen und zu Störungen der Intelligenz und des Gedächtnisses, der Gesichtsausdruck wird stumpf, die Antworten erfolgen langsam, die Entschlüsse werden unsicher. Eine Abnahme der Sensibilität erfolgt und zeigt sich namentlich ausserordentlich deutlich an der Zungenwurzel, am Gaumen- und Rachengewölbe und an der hinteren Pharynxwand, wo oft schon nach kleinen Dosen eine solche Unempfindlichkeit entsteht, dass man den Finger oder einen Löffel tief in den Hals stecken kann, ohne dass danach Würgbewegungen sich zeigen. Auch an der Urethral- und Vaginalschleimhaut kommt es häufig zu einer derartigen Anästhesie (Riems-lagh), manchmal auch an der Cornea (Puche). Bei hohen Gaben kommt auch (nach Huette in etwa  $\frac{1}{6}$  der Fälle) Unempfindlichkeit der Haut gegen Stechen, Brennen u. s. w. vor; bei den Meisten Ermüdung oder Neigung zum Schlaf, bei Vielen Verminderung der Schärfe des Gehörs und des Gesichts, bisweilen Kurzsichtigkeit und Amblyopie, selbst Doppelsehen, sowie Verlust der Herrschaft über die Muskeln und Nerven der Sprachorgane (Krosz). In den Sexualorganen ist eine Erschlaffung und Herabsetzung der Erregbarkeit unverkennbar. Die Pulsfrequenz nimmt ab, die arterielle Spannung wird vermindert (Clouston, Pletzer); die Temperatur sinkt (Krosz). In vielen Fällen findet sich Stuhlverstopfung (Huette), seltener Diarrhoe (Pletzer); Vermehrung der Secretionen scheint nur ausnahmsweise vorzukommen; die Mundhöhle wird in der Regel trocken, die Speichelsecretion verringert. Auch im Schlunde ist Trockenheit Regel, häufig besteht Blässe (Martin-Damourette und Pelvet), in anderen Fällen Hyperämie der Pharyngealschleimhaut (Voisin). Bei Manchen tritt Schmerzhaftigkeit in der Nierengegend ein; bei Frauen scheint die

Menstruation bisweilen vermindert zu werden (Martin-Damourette und Pelvet). Die von Nickol behauptete Verengung der Retinalgefäße wird von Krosz und Voelkel in Abrede gestellt.

Bei Säugethieren hat subcutane Injection oder Infusion von grösseren Dosen (bei Kaninchen 2,0–4,0) rasch Collapsus, Anästhesie, Paralyse und Tod in 10–40 Min. unter Symptomen der Herzlähmung (Dyspnoe, Mydriasis, Exophthalmos und Krämpfe) zur Folge. Kleinere Dosen (1,0–2,0) bedingen vorübergehende Abnahme der Herzkraft, Motilitäts- und Sensibilitätsparalyse, Ataxie und vermehrte Abscheidung von oft eiweisshaltigem Urin. Bei Fröschen treten nach 0,1–0,15 subcutan fibrilläre Zuckungen, allmählicher Verlust der willkürlichen Bewegung, der Reflexaction und der Sensibilität der ganzen Körperoberfläche, auch der Cornea, dauernde Sistirung der Athembewegungen, Schwäche und Verlangsamung des Herzschlages und -rasch (durchschnittlich in 10 Min.) diastolischer Herzstillstand ein. Die Fähigkeit zu spontanen Bewegungen und die Sensibilität sind dabei zu einer Zeit erloschen, wo das Vermögen, auf Reize bestimmter Art reflectorisch zu reagiren, noch besteht. Das Herz wird bald mechanisch und elektrisch unerregbar, während die Erregbarkeit der peripherischen Nerven und der quergestreiften Muskeln zwar herabgesetzt, aber nicht aufgehoben wird (Eulenburg und Guttman). Nach Laborde gehen bei Fröschen der durch Bromkalium bedingten Depression Excitationsphänomene (Tetanus) von kurzer Dauer voraus, wenn man Bromkalium zu 0,2–0,4 auf die Schwimmhaut bringt und langsam resorbiren lässt, und cessirt dann die spontane Bewegung erst nach den Reflexbewegungen, während das Herz rhythmisch, aber langsam noch 2–3 Std. fortschlägt. Nach Martin-Damourette und Pelvet erlischt die Motilität früher als die Sensibilität und die Reizbarkeit der Nervenstämmen früher als die der Muskeln, welche auch länger reizbar als das Rückenmark bleiben, das im Allgemeinen erst später als die Nervenstämmen seine Reizbarkeit einbüsst. Nach Krosz lähmt Bromkalium das Rückenmark früher als die peripheren Nerven. Martin-Damourette und Pelvet beobachteten nach mittleren Dosen Abnahme der Capillarcirculation nach vorübergehender Beschleunigung, schliesslich Aufhören derselben nach Erlöschen der Nervenreizbarkeit und vor dem Stillstande des Herzens, das bei Dosen von 0,04 nach dem Absterben des Markes und der übrigen Theile zu schlagen aufhörte. Die respiratorischen Bewegungen cessiren etwas später als die spontanen. Bei hohen Dosen (0,08) erlischt die Herzaction vor derjenigen der Nerven und stellt sich statt der Anämie der Schwimmhäute Hyperämie (in Folge von Lähmung der Gefässmuskeln) ein. Die Wirkung auf das Herz ist vom Vagus unabhängig (Eulenburg und Guttman). Der Blutdruck sinkt bei grossen Dosen bedeutend (Schouten, Krosz). Schouten erklärt die Wirkung des Bromkaliums, welche er mit der der Kalisalze identificirt, aus Störung der Ernährung im Organismus, woraus Abnahme des Stoffwechsels, besonders im Muskel- und Nervensystem, resultire, wonach natürlich eine Abnahme der Herzaction erfolge. Kleine Gaben bedingen Erhöhung der Pulsfrequenz bei Sinken des Blutdrucks, grosse dagegen Verlangsamung der Pulsfrequenz, welche wie bei andern Kalisalzen nach Vagusdurchschneidung nicht eintritt, wobei dann gleichzeitig der Blutdruck steigt. Bei Anwendung geringer Mengen erlischt die elektrische Reizbarkeit des Herzens nicht sofort, wohl aber bei starken Dosen des Giftes (Schouten). Was übrigens den von Schouten behaupteten Einfluss des Bromkaliums auf den Stoffwechsel anlangt, so behauptet Bill nach Versuchen an Menschen, dass die Kohlensäureausscheidung zuerst vermindert, später vermehrt sei, während die wässrige Exhalation der Lunge nicht geändert werde; dass eine Vermehrung der Urinquantität, der Säure des Harns, der Farbstoffe und insonderheit der Chloride, aber keine Veränderung des Harnstoffs resultire. Nach Rabuteau soll bei der Einführung von täglich 1,0 die Harnstoffmenge um 9–13 % abnehmen, dagegen die Diurese nicht vermehrt werden. Krosz sieht die Hauptwirkung des Kaliumbromids in Lähmung der Verbindungsfasern zwischen den sensiblen und motorischen Nervenzellen des Rückenmarks und der Leitung zwischen den sensiblen Nerven des Gehirns und der Medulla oblongata einerseits und den motorischen Elementen und den psychischen Centren der Grosshirnhemisphären andererseits. Dass bei Thieren die Herabsetzung der Reflexerregbarkeit durch directen Einfluss auf die reflectorischen Apparate im



Rückenmark bedingt ist und die Setschenowschen Centren im Gehirn nicht erregt werden, zeigte schon früher Lewitzky.

Durch längeren Gebrauch von Bromkalium in grösseren Gaben können Erscheinungen chronischer Intoxication auftreten, welche theils an der Haut, theils in der nervösen Sphäre, theils an der Respirationsschleimhaut, theils in der gesammten Ernährung sich manifestiren.

Voisin, welcher Bromkalium in grossem Maassstabe Jahre lang bei Epileptikern anwandte, unterscheidet eine langsam auftretende und eine in wenig Stunden sich entwickelnde rapide Form von Bromismus chronicus. Die erstere kündigt sich durch weisse Farbe der Haut, besonders im Gesicht, Stumpfsinn, Stupor, Trockenheit im Munde, klebrigen Speichel, Diarrhoe, Abmagerung, wankenden Gang, tiefen Schlaf, eine Art Coma, Schwierigkeit zu sprechen und die Worte zu finden, endlich durch Bronchialkatarrh, welcher selbst suffocativ werden kann, an und giebt sich entweder als Adynamie mit stockender Sprache, heiserer Stimme, Schwäche des Gesichts und Gehörs, Zittern der Zunge und der Hände, sowie scorbutischen Affectionen der Mund- und Nasenhöhle, oder als Cerebrospinalaffection unter Delirien, maniakalischen Ausbrüchen, Störungen der Sprache und Ataxie der unteren Extremität und der Zunge zu erkennen. Sie kann nach Tagesgaben von 4,0—10,0, bei schlechtgenährten Individuen nach 1,5—2,0 sich nach mehreren Monaten entwickeln und schwindet beim Aussetzen des Bromkaliums unter angemessener symptomatischer Behandlung. Die rapide sich entwickelnde Form trägt den Charakter der Adynamie mit depressivem Charakter der cerebralen Störungen. Von beiden unterscheidet Voisin die Cachexia bromica, wo die Anämie und Abmagerung das auffallendste Symptom ist und schliesslich Korbunkel, Pneumonie, Erysipelas oder cholericiforme Enterocolitis dem Leben ein Ende machen. Neben diesen Formen des Bromismus kommen auch bei Frauen und Kindern Hustenparoxysmen mit beschwerlicher Inspiration und Erbrechen als Folge längeren Gebrauchs von täglich 4,0—6,0 Bromkalium vor. Die Mehrzahl der genannten Erscheinungen zwingen keineswegs zu der Annahme, dass das Brom dabei im Spiele sei; vielmehr finden sie sich fast sämmtlich auch nach chronischem Gebrauche von Kaliumnitrat oder Kaliumcarbonat. Dagegen gehört dahin ein eigenthümliches Exanthem, geradezu als Bromexanthem bezeichnet, und die oft bei Curen mit Bromüren (und zwar keineswegs bloss mit jodhaltigen, wie Rabuteau meint) zu beobachtende Acne. Ersteres bildet thalergrosse, längliche oder rundliche Plaques von kirschrother, an einzelnen Punkten wie von infiltrirtem Eiter gelblicher Farbe, mit centralen und marginalen Hervorragungen, welche aus acneförmigen Pusteln bestehen, die oft 3—4 Mm. weit den sehr harten und empfindlichen Grund überragen, nach einiger Zeit einsinken und an ihrer Spitze eine rahmartige Masse hervortreten lassen. I. Neumann charakterisirt das Exanthem als Entzündung der Hautdrüsen mit Vermehrung ihrer Zellelemente und consecutiver Zellwucherung im Cutisgewebe bei Vergrösserung der Hautpapillen. Von der Iodacne unterscheidet sich die Bromacne durch ihre Persistenz, grösseren Umfang und durch das Fehlen eines Entzündungshofes; der Sitz derselben ist Gesicht und Brust, während das eigentliche Bromexanthem meist nur an den Extremitäten auftritt. Mitunter ist auch Erythema nodosum mit nachfolgenden übelriechenden und schlechtheilenden Geschwüren beobachtet worden. Man soll dieselbe durch internen Gebrauch von Arsenikalien (Gowers) oder durch Fomente von Salicylsäurelösung (Prowse) verhüten können, doch will Bedford Brown den Bromausschlag absichtlich provociren, um bei inneren Entzündungen ableitend zu wirken.

Bei Thieren fand Aresu (1879) nach längerer Zufuhr verschiedener Bromverbindungen (Kalium-, Calcium-, Natrium- und Eisenbromid) constant diffuse parenchymatöse Myelitis, worauf er die Veränderungen der Sensibilität bezieht, und Alterationen des Blutes (Zunahme der weissen und Abnahme der rothen Blutkörperchen, welche blass, weniger elastisch und theilweise erweicht erschienen, seröse Krase und Auftreten von Melaninkörnchen und Fetttröpfchen); weniger afficirt waren Gehirn und verlängertes Mark, und in schweren chronischen Ver-

giftungsfällen zeigten die peripheren Nervenfasern mitunter körnige Trübung des Inhalts und constant Varicositäten und Fluidität des Myelins, wo dann auch die Muskeln und die Leber mehr oder weniger vorgeschrittene Verfettungserscheinungen darboten.

Während man in früherer Zeit das Bromkalium als antidyskratisches Mittel vorzugsweise bei Scrophulose und Lues anwandte, ohne jedoch die günstigen Erfolge der Iodtherapie damit zu erhalten, hat man in neuester Zeit in demselben ein bei einer Reihe von Nervenaffectionen günstig wirkendes Medicament entdeckt, welches anfangs nur als Anaphrodisiacum, dann zur Herabsetzung der Sensibilität von Schleimhäuten benutzt, später in ausgedehnter Weise bei Epilepsie in Anwendung gezogen wurde, wo es in der That kaum von irgend einem Mittel übertroffen wird, indem es bei richtiger und dauernder Anwendung nicht allein die Zahl der epileptischen Anfälle in auffallender Weise verringert, sondern auch in manchen Fällen völlige Heilung bewirkt. Auch bei vielen anderen Krampfkrankheiten sind günstige Erfolge mit Bromkalium erzielt worden, während dem Mittel als Hypnoticum nur eine untergeordnete Bedeutung zuzukommen scheint.

Die erste Anwendung, welche man von Bromkalium machte, ging von der Voraussetzung aus, dass dasselbe dem Iodkalium analog wirke. Dahin gehört die innerliche und äusserliche Anwendung des Medicaments bei Scropheln (Pourché, Magendie, Höring, Graf, Neuhof), Struma (Pourché, Höring, Heimerdinger), Milztumoren und Leberanschwellung (Cl. Bernard), Hoden- und Nebenhodenanschwellung (Pourché), Favus und herpetische Ausschläge (Graf, Radius), hydropische Ergüsse, Uterusanschwellungen, Hornhauttrübung (Graf), Menostase und Herzhypertrophie (Magendie, Gubler), endlich gegen Krebs (Spencer Wells) und Syphilis (Puche, Robin). In keiner der genannten Affectionen leistet übrigens Bromkalium dasselbe wie Iodkalium. Nach Lebert ist es bei Scrophulose ohne jeden Werth, nach Ricord, Hacker u. A. leistet es bei Syphilis gar nichts; höchstens lindert es in tertiären Fällen, wie auch Danielssen und Boeck bei Spedalsked fanden, die Knochenschmerzen (Guibert).

Auf die 1850 von Puche und Huette gemachte Beobachtung, dass Bromkalium die Geschlechtsfunction herabsetze, gründete Thielmann die Anwendung des Mittels gegen Priapismus und Chorda bei Gonorrhoe, gegen Spermatorrhoe, Satyriasis und Nymphomanie, wo es nach Binet, Morin und Monod, Bligh u. A. von vorzüglicher Wirkung ist. Die Ursache derselben scheint einer Herabsetzung der Sensibilität der Urethralschleimhaut, vielleicht auch der Reflexfunction des Rückenmarks, zugeschrieben werden zu müssen. Das Vorhandensein der ersteren erklärt auch das Factum, dass nach einer grossen Dosis Bromkalium Bougies und Katheter ohne Schmerzen sich einführen lassen. Auch steht damit die günstige Wirkung in manchen Fällen von Incontinentia urinae nocturna, wo in Folge gesteigerter Reflexerregbarkeit auch die wenig gefüllte Blase im Schlafe Harnentleerung bedingt (Lutz, Begbie), im Zusammenhange. Bligh (1874) empfahl Bromkalium theils innerlich, theils in Injection bei Tripper überhaupt.

Die bereits von Puche und Huette constatirte Aufhebung der Reflexsensibilität im Halse und Larynx führte zu dem Vorschlage von Riemsлагh, das Mittel vor Operationen im Pharynx und Larynx innerlich oder topisch zu verwenden.

Die Heilwirkung des Bromkaliums bei Epilepsie lässt sich nach den zahlreichen und z. Th. ausserordentlich concludenten Erfahrungen der verschiedensten Aerzte nicht in Abrede stellen; insbesondere bürgen die von Voisin neuerdings publicirten Beobachtungen, welche sich auf eine Beobachtungszeit von 10 Jahren beziehen, für die Möglichkeit, dass dauernde Heilung durch den

richtigen Gebrauch des Medicaments herbeigeführt werden kann. In verhältnissmässig grossen Gaben längere Zeit hindurch angewendet, ist das Bromkalium das zuverlässigste Antiepilepticum, welches wir besitzen, das in manchen Fällen Heilung (nach Voisin in mehr als  $\frac{1}{5}$  der Fälle und selbst dann noch, wenn vor der Anwendung des Mittels schon 4000 Anfälle und mehr dagewesen sind), in andern eine erhebliche Abnahme der Zahl der Anfälle herbeiführt, in andern die Intensität der Paroxysmen mässigt und ausgebildete Epilepsie in petit mal verwandelt. Die Abnahme der Zahl der epileptischen Anfälle ergibt sich besonders aus statistischen Erhebungen in englischen Irrenanstalten, wo nach der Einführung der Bromkaliumtherapie die Zahl der im Laufe eines Halbjahres vorgekommenen epileptischen Anfälle geradezu auf die Hälfte herabging. Nach Voisin wirkt Bromkalium besonders bei idiopathischer Epilepsie günstig und heilt Fälle derselben fast sicher, wenn noch nicht mehr als 50 Anfälle dagewesen sind. Selbst hereditäre Epilepsie ist nicht incurabel, und in einzelnen Fällen gelingt auch die Unterdrückung epileptiformer Anfälle, welche mit andern Gehirnleiden (Idiotie, Tumor cerebri) in Verbindung stehen; dagegen sind Schwindel, Aura und andere Formen von petit mal schwer durch Bromkalium zu heilen (Voisin). Bestimmte Indicationen, wie z. B. die anfangs von Locock, welcher das Bromkalium zuerst 1851 empfahl, und Mac Donnell angegebene, dass es vorzugsweise günstig bei Frauen wirke, deren Epilepsie in nachweislichem Zusammenhange mit Menstruationsanomalien und Uterinleiden stehe, oder die von Nothnagel hervorgehoben, dass es bei ausgesprochener erhöhter Reflexerregbarkeit oder bei Epilepsie aus peripherer Veranlassung den meisten Nutzen habe, lassen sich nicht aufstellen. Nach Voisin soll die Dosis des Mittels so lange gesteigert werden, bis die Reflexsensibilität der Nase und des Schlundes geschwunden ist, so dass das Hineinführen eines Löffels bis an die Epiglottis keine Reflexnausea und das Kitzeln der Nase mit einem Federbarte kein reflectorisches Niesen bedingt. Indessen kommen auch Fälle vor, wo trotz der Abwesenheit dieses Grades der Herabsetzung der Reflexsensibilität die Epilepsie geheilt wird. Nach den von Hasse in der Göttinger Klinik gemachten Erfahrungen sind bei der Cur Spirituosen zu vermeiden, da Excesse in Baccho leicht die bereits beseitigten Anfälle wieder hervorrufen (Michaelis). Die günstige Wirkung bei Epilepsie resultirt übrigens nur bei Anwendung grosser Dosen. Wie sich dieselbe erklärt, ob durch Zustandebringen von Contraction (Amory und Clarke, Sée) oder Dilatation der Gefässe in der Medulla oblongata (Michaelis), oder durch Herabsetzung der Reflexerregbarkeit (Voisin), oder durch Rückbildung molecularer Veränderungen in den Nervencentren oder peripherischen Nerven, welche durch die epileptischen Anfälle hervorgerufen und unterhalten werden (Krosz), muss bei der Unbekanntschaft mit dem Wesen der Epilepsie dahingestellt bleiben. Auch bei Eclampsia parturientium sind günstige Effecte von Bromkalium beobachtet (Shoyer). Ausser der Epilepsie scheint noch eine Reihe von Nervenleiden in günstiger Weise durch Bromkalium beeinflusst zu werden. So wurde es bei Krämpfen kleiner Kinder (Begbie, Bertherand), selbst bei Hydrocephalus chronicus und acutus (Brunton) mit Erfolg versucht. Begbie rühmt es bei Wadenkrämpfen (selbst im Verlaufe der Cholera) und bei Hysterie. Die zuerst von Gubler angegebene Wirkung bei Chorea, wobei die Affection äusserst rapide in 3—8 Tagen verschwand, hat durch Voisin Bestätigung gefunden, welcher mit grossen, die Reflexnausea aufhebenden Dosen selbst solche Fälle heilte, wo die Affection mit Verlust der Articulation, mit Paraplegie und Incontinentia urinae et alvi verbunden war. Auch bei andern vom Rückenmark herrührenden nervösen Störungen, wie Ameisenkriechen, Crampi und klonischen Convulsionen, gab Voisin Bromkalium mit Erfolg und glaubt während der Belagerung von Paris durch die Anwendung des Mittels gegen derartige Symptome als Vorboten des Tetanus verschiedene Verwundete vor dem Ausbruche des Wundstarrkrampfes behütet zu haben. Ferner hat Voisin in derselben Zeit mehrere Fälle von Tetanus, bei denen Chloral nichts nützte, durch die combinirte Anwendung von subcutanen Morphininjectionen und Bromkalium genesen sehen. Wie beim Wundstarrkrampf kann Bromkalium auch beim Tetanus toxicus Anwendung finden, wo es ausser der durch grosse Dosen bedingten Herabsetzung der Reflexfunction auch noch direct antidotarisch wirkt, indem das beim Contact mit Strychninsalzen ent-



stehende Strychninbromür eine verhältnissmässig schwer lösliche Verbindung darstellt, doch wirkt Chloral bei Warmblütern sicherer als Bromkalium oder selbst als eine Combination von Chloral und Bromkalium (Th. Husemann). Von andern krampfhaften Affectionen ist besonders das Asthma hervorzuheben, bei welchem Sée Abnahme der Dyspnoe bei gleichbleibender Absonderung der Bronchialschleimhaut wiederholt beobachtete. Auch bei Keuchhusten ist das Medicament häufig empfohlen, wo ihm jedoch Andere das Bromammonium vorziehen. Rooke und Stille gebrauchten es gegen Spasmus glottidis.

Nach Da Costa verhütet die Darreichung von 3,0—4,0 Bromkalium einige Stunden vor Anwendung von Opium das Auftreten von Nebenerscheinungen (Schwindel, Hautjucken, Nausea), steigert dagegen die hypnotische Wirkung des letzteren. Die Anwendung des Bromkaliums als alleiniges Hypnoticum ist ausserordentlich verschieden beurtheilt, doch wird selbst von den Anhängern des Medicaments zugegeben, dass bei Insomnie in Folge von Schmerzen dasselbe nicht hilft. Auch die schlafmachende Wirkung des Chloralhydrats wird durch Bromkalium gesteigert (Mickle). Nach Amory und Clarke erzeugt Bromkalium bei körperlich Ermüdeten manchmal keinen Schlaf, wohl aber angenehme, von Ruhe und Erholung begleitete Insomnie, während bei denselben Personen nach geistigen Anstrengungen durch Bromkalium Schlaf herbeigeführt wird, und soll dasselbe als arterienverengerndes Mittel vor Allem bei hyperämischen Zuständen des Gehirns indicirt, dagegen bei anämischen contraindicirt sein, weshalb es sich besonders bei Insomnie in Folge von geistiger Ueberanstrengung, Hysterie, Gravidität, Zahnweh, fieberhaften Zuständen und nervöser Reizbarkeit qualificire.

Als Hypnoticum und Sedativum fand Bromkalium vielfache Anwendung bei psychischen Störungen mit dem Gepräge der Excitation (Crichton Browne, Belgrave, Erlenmeyer) und insbesondere bei *Delirium tremens* (Burr, Begbie). Die bisher vorliegenden Erfahrungen lassen eine sedative Action keineswegs verkennen, doch muss auch hier das Medicament in grossen Dosen gereicht werden. In schweren Fällen maniakalischer Aufregung ist es für sich entschieden ungenügend. Siredey empfiehlt Bromkalium bei Ataxie, wo freilich ein Einfluss aus den physiologischen Wirkungen des Medicaments kaum zu folgern ist. Boudet gab es mit palliativem Erfolge bei Contracturen im Verlaufe acuter Muskelatrophie; Moutard-Martin rühmte es bei Aufregungszuständen von Säuglingen (zu 0,1—0,2 pro dosi) in der Dentitionsperiode. Raciborski heilte einen Fall von Vaginismus durch internen Bromkaliumgebrauch. Guttmann fand es bei Platzschwindel von Nutzen.

Von andern Anwendungen des Bromkalium heben wir noch hervor, dass Maclean dasselbe ganz nach Art des Salpeters als Antipyreticum benutzt hat. Günstig wirkt es mitunter in auffälliger Weise bei atypischer Prosopalgie hysterischer oder chlorotischer (Krosz). Danton rühmt Bromkalium als Adjuvans anderer Diuretica bei Compensationsstörung im Gefolge von Mitralisinsufficienz, Sohier bei Albuminurie und anämischen Anfällen; Heller wegen der Herabsetzung des Blutdrucks bei Lungenblutung. Ruvioni will einen Fall von Amblyopia alcoholica damit geheilt haben. Eine besondere Anwendung hat Rabuteau bei der Behandlung des Mercurialismus und Saturnismus chronicus vom Bromkalium gemacht, wo es in ähnlicher Weise wie das verwandte Bromnatrium auf die im Organismus deponirte Metallverbindung durch Bildung eines Doppelbromürs lösend (besser selbst als Iodkalium) und gleichzeitig herabstimmend auf die Schmerzen und Krämpfe wirkt und so in doppelter Weise sich nützlich zeigen kann. Bricheateau sah bei Tremor mercurialis unterschiedenen Erfolg. Wie früher Ozanam das Brom, gaben Hodgkins, Gimbert u. A. Bromkalium in schweren Fällen von Vomitus gravidarum, wo es auch bei Application in Klystierform sich bisweilen günstig erweisen soll. Stone empfahl Bromkalium gegen Nausea im Gefolge der Aetherisation. Oertlich rühmte es Ferrand gegen Spasmus des Sphincter ani, Geneuil bei Epistaxis und Schnupfen, Rossignol gegen Photophobie. Die Anwendung des Bromkaliums in Verbindung mit Brom bei Diphtheritis und ähnlichen Affectionen (Ozanam, Schütz) wurde schon S. 269 besprochen. Die Anwendung bei

Cholera, Sommerdiarrhoe, Intermittens, Diabetes und Basedowscher Krankheit (Begbie, Caro, Irving, Rosse u. A.) kann nur kurz erwähnt werden.

In Bezug auf die Anwendung des Bromkaliums hat sich allgemein die Ueberzeugung Bahn gebrochen, dass die im Anfange üblichen Dosen von 0,2—0,3 bei Nervenkrankheiten ohne Nutzen, vielmehr zur Heilung bei Epilepsie Gaben von Einzeldosen von mindestens 1,0—2,0 und Tagesgaben von 3,0—12,0 erforderlich sind.

Kinder toleriren dieselben Dosen wie Erwachsene und sind nach Voisin sogar weniger empfindlich. Nach Beach sind bei epileptischen Kindern mindestens 3 Gaben von 1,0 im Tage erforderlich. Das oben erwähnte Eintreten chronischer Intoxicationen kommt verhältnissmässig selten vor; excessive Schwäche und Incontinenz wird nach Brown-Séquard und Vulpian am besten durch Zusatz von etwas Strychnin oder Arsenik verhütet. Bei Insomnie kann nach Amory und Clarke die Dosis von 1,0—2,0 bei schwächlichen Individuen auch auf mehrere Einzelgaben vertheilt werden.

Die Verordnung geschieht am besten in Form von Pulvern ohne jeden Zusatz, welche man in einem Glase Wasser oder Zuckerwasser nehmen lässt. In Frankreich ist auch eine Lösung in Syrup (z. B. als Sirop de Henri Mure, der im Esslöffel 2,0 enthält) gebräuchlich.

Pillen sind wegen der grossen Anzahl der zu nehmenden Pillen im Allgemeinen unzweckmässig; Lösungen nur da zu verordnen, wo man das Mittel mit andern Substanzen combinirt, so z. B. mit Chloralhydrat bei Geisteskrankheiten, mit Ammonium bromatum (nach White bei Delirium tremens), Tinctura Aconiti, Tinctura Strychni, Tinctura Cannabis (Wood) u. a. Aeusserlich kann Bromkalium in Form von Streupulvern, Waschungen, Fomentationen, Klystieren, Gurgelwässern, Augenwässern und Injectionen gebraucht werden. Peyrand und Besnier bestreuen fungöse und hyperplastische Wundflächen mit Bromkaliumpulver. Ferrand applicirt bei Krampf des Sphincter ani eine Lösung von 1 Th. Bromkalium in 5 Th. Glycerin auf Compressen. Dieselbe Solution empfiehlt Waldenburg zum Touchiren des Pharynx und Larynx in Fällen, wo operative Eingriffe an diesen Theilen gemacht werden sollen, auch vor Einführung des Kehlkopfsspiegels bei starker Empfindlichkeit. Zu Augenwässern sind wässrige Lösungen von 1:25—50, zu Salben 1 Th. auf 5—10 Th. Fett zu benutzen. Zur Injection bei Gonorrhoe empfiehlt Blight Lösung von 1 Th. Bromkalium in 2 Th. Glycerin und 20 Th. Wasser; zur Einspritzung in die Nasenhöhle Geneuil conc. Solution, die nicht ohne Schmerzen ist. Zur Inhalation (Verstäubung) bei Keuchhusten dienen 2—5% Lösungen (Waldenburg).

#### Verordnungen:

- |  |  |
|--|--|
| <p>1) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Kalii bromati</i> 2,0<br/> <i>Glandularum Lupuli</i> 4,0<br/> <i>Extr. Gentianae</i> q. s.<br/> <br/> <i>nt f. pilul. No. 60. Consp. Lycopodio.</i><br/> <i>D. S.</i> Abends 3—4 Stück. (Bei<br/> Erectionen Tripperkranker. Henschel.)</p> | <p>2) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Kalii bromati</i> 20,0<br/> <br/> <i>F. pulv. Divide in partes aequales No. 10.</i><br/> <i>D. S.</i> 2mal täglich 1 Pulver in einem<br/> Glase Zuckerwasser. (Bei Epilepsie<br/> u. s. w.)</p> |
|--|--|

**Ammonium bromatum; Bromammonium.**

Dem Bromkalium in seiner Wirkung nahestehend und nach Einzelnen sogar stärker sedativ wirkend ist das namentlich beim Keuchhusten viel verwendete Bromammonium.

Das Salz bildet ein weisses, krystallinisches Pulver, das sich leicht in Wasser, in Weingeist schwierig löst, beim Erhitzen sich verflüchtigt, mit Natronlauge erwärmt Ammoniak ausgiebt und bei Zusatz einer kleinen Menge Chlorwasser und Chloroform zu einer wässrigen Lösung das Chloroform rothgelb färbt.

Das Bromammonium erregt in Dosen von 0,06—0,12 bei Fröschen tetaniforme Convulsionen, in welchen das Herz fort pulsirt. Grössere Dosen bewirken nur schwache Krämpfe und rasche Lähmung (Eulenburg und Guttmann). Auch bei Tauben und Kaninchen tritt nach toxischen Dosen Muskeler schlaffung, Reflex- und Empfindungslähmung ein und erfolgt der Tod unter tonischen und klonischen Krämpfen spinalen Ursprungs (Brechemin). Auf das Mittel richtete zuerst Brown-Séguard die Aufmerksamkeit, weil es die sedativen Effecte des Bromkaliums schon in geringerer Dose zeigte, doch fand es Belgrave bei Geisteskranken von geringer sedirender Wirkung. Bertherand rühmt es bei Angina pectoris. Beim Keuchhusten, gegen welchen zuerst Gibb das Bromammonium empfahl, soll es, abgesehen von seiner antispasmodischen Wirksamkeit, auch noch durch Verflüssigung des Schleims günstig wirken. Gibb schreibt dem Bromammonium steigernden Effect auf Harnstoff und Kohlensäureausscheidung zu, während Chéron und Fauquez bei Dosen von 1,0—4,0 Verminderung der Harnmenge, Abnahme der fixen Harnbestandtheile und Verringerung des Harnstoffs bei gleichzeitig ausgiebigerer Athmung, vollerer Beschaffenheit des Pulses, blühenderer Gesichtsfarbe, Zunahme der Hirnthätigkeit und anscheinend auch der Muskelkraft constatirten.

Harley empfahl Bromammonium bei Glottiskrämpfen zu 0,1—0,3 bei kleinen Kindern, Fauquez und Chéron bei Asthma.

Man giebt es in denselben Formen wie Kalium bromatum, nach Rabuteau in nur halb so grosser Dosis.

White und Bulkley wollen eine Verbindung von Bromammonium mit Bromkalium (ää 2,0 in 30,0 Wasser stündlich 1 Theelöffel voll) von besonders günstigem Effecte bei Delirium tremens gesehen haben.

**Surrogate des Bromkaliums.** — Neben dem Bromammonium sind noch eine Reihe von Verbindungen des Broms als Sedativa und insbesondere als Antiepileptica gebraucht worden. Unter diesen stehen dem Bromkalium das Lithium bromatum und das Calcium bromatum insofern am nächsten, als auch der Metallcomponent derselben die den Kaliumsalzen zukommenden Wirkungen auf Circulation und Nerven besitzt, doch haben beide trotz ihrer Empfehlung als Antiepilepticum durch Hammond und Mitchell sich allgemeinen Eingang nicht verschaffen können. Lévy (1875) fand Bromlithium in steigender Dosis von 0,5—3,0 bei Epilepsie nützlicher als Bromcalcium und constatirte günstigen Effect kleinerer Gaben (0,2—1,0) bei Hysterie und schmerzhaften Erectionen. Gebräuchlicher als beide Salze ist das Bromnatrium, Natrium bromatum. Dieses Salz, welches nach den Versuchen von Eulenburg u. Guttmann toxisch genau wie Chlornatrium wirkt, das Herz nicht afficirt und zur Herbeiführung des Todes 4—5mal so grosse Dosen wie Bromkalium erfordert und nach Rabuteau bei Thieren starke Abnahme der Reflexaction bedingt, wirkt bei Epilepsie (Decaisne, Stark, Fauquez und Chéron) und anderen Nervenaffectionen, z. B. Chorea (Gazeau), Asthma, Tetanie (Fauquez und Chéron), ebenso günstig wie Bromkalium, ohne, mit Ausnahme der Bromacne, selbst bei protrahirtem Gebrauche Nebenerscheinungen zu bedingen. Die Herabsetzung der Sensibilität des Pharynx tritt beim Bromnatrium ebenso entschieden wie beim Bromkalium ein (Stark, Fauquez und Chéron). In den Harn geht Bromnatrium als solches über (Rabuteau). Jedenfalls verdient das vor dem Bromkalium durch weniger unangenehmen Geschmack ausgezeichnete Salz, da es in hohen Dosen



(selbst zu 16,0 pro die) längere Zeit gegeben werden kann, ohne Muskelschwäche und Häsitationen der Stimme zu bedingen, in allen Fällen den Vorzug, wo hohe Dosen gegeben werden müssen, z. B. bei chronischen Metallvergiftungen. Chéron und Fauquez vindiciren dem Bromnatrium zu 1,0–4,0 pro die Vermehrung der Harnmenge und der ausgeschiedenen Fixa, so wie eine Regulirung der Harnstoffausscheidung bei längerem Gebrauche, weshalb sie das Mittel bei Arthritis, Hargries, Rheumatismus und Dyspepsie empfehlen. Von den Verbindungen des Broms mit Schwermetallen sind besonders Brom Eisen (Gillespie) und Bromcadmium (Belgrave) benutzt, von denen das erstere ganz nach Art des Eisenchlorids, das zweite wie andere Cadmiumsalze emetisch und sedirend wirkt. Diese scheinen im Organismus gespalten zu werden, so dass das Brom in Verbindung mit Kalium oder Natrium im Urin, das betreffende Metall dagegen in der Galle eliminiert wird (Rabuteau). Richardson will einen Einfluss des Bromcomponenten auch in Alkaloidbromüren statuiren, so dass z. B. im Brommorphin die sedirende Wirkung des Morphins erhöht, die obstruierende vermindert, ferner beim Bromstrychnin die Action auf die Musculatur verlängert werde und beim Bromchinin grössere Toleranz des Magens gegen Chinin resultire und empfiehlt das Bromchinin gegen Schmerzen und Ulcerationen im Gefolge von Syphilis, das Morphinum bromatum als Hypnoticum und eine Verbindung von Morphinum und Chinium bromatum (zu 0,008 Brommorphin und 0,06 Bromchinin) bei Neuralgien, Phthisis diabetica und bei intermittirendem Pulse aus verschiedenen Ursachen, endlich Bromstrychnin zu 0,002 bei Dyspepsie und in Verbindung mit Bromchinin bei gleichzeitiger Anwesenheit von Gastralgie. Erlenmeyer fand Bromchinin bei Hypochondrie und Insomnie sehr wirksam. Man reicht die Alkaloidbromüre in Syrup, wovon 1 Theelöffel (4,0) die Einzeldosis bildet.

Vielfach ist in neuester Zeit die Bromwasserstoffsäure, Acidum hydrobromicum, als sedatives Mittel in Anwendung gebracht. Nachdem zuerst Wade dieselbe zur Verhütung der bei einzelnen Personen nach Chinin auftretenden Kopfschmerzen empfohlen hatte, wurde sie von Fothergill als werthvolles Mittel bei nervöser Erschöpfung durch Excesse in Baccho, bei nervöser Reizbarkeit und Insomnie, Palpitationen, Hysterie, Keuch- und Krampfhusten, Vomitus gravidarum, Menorrhagie mit sexueller Erregung und bei gastrischer Reizbarkeit bezeichnet und von Hamilton, der ihren sedativen Effect nicht so dauernd fand wie den des Bromkalium und bei Epilepsie keinen Nutzen constatirte, bei cerebralen Fluxionen in Folge gestörter Herzaction und Schwäche gerühmt. Woakes rühmt die Säure bei Tinnitus aurium mit Vertigo. Nach Massini (1881), der die Säure bei Nervosität ausserordentlich wirksam fand, giebt man dieselbe am besten eine Viertelstunde nach der Mahlzeit zu 10 Tropfen der concentrirten oder 20–30 Tropfen der Fothergillschen (durch Fällen einer Lösung von 47 Th. Kaliumbromid in 350 Th. Wasser mit 58 Th. Weinsäure erhaltenen) verdünnten Säure in Zuckerwasser. Wade empfiehlt das Mittel auch im Fieber. In physiologischer Hinsicht verhält sich nach Versuchen von Reichert Bromwasserstoffsäure dem Bromkalium völlig analog und zeigt neben einer Wirkung auf die Nerven auch eine in ausgesprochener Weise auf den Herzmuskel gerichtete Action, indem mittlere Dosen Steigerung mit oder ohne vorübergehenden Abfall, grosse Dosen ausschliesslich Sinken des Blutdrucks bedingen, letzteres auch, wenn das Herz von den Nerven isolirt wurde, während das Steigen auf Erregung der peripheren Vasomotoren hindeutet, die sich bei localer Application durch capilläre Contraction und bei Vergiftung durch bleiche Farbe der Lippen und der Augenbindehaut zu erkennen giebt. Während Bromwasserstoffsäure die Pulsfrequenz in sehr verschiedener, mit der depressirenden Wirkung auf das Herz in Zusammenhang stehender Weise verändert, wirkt dieselbe auf das Nervensystem herabsetzend, bei Fröschen betäubend und die Bewegung und Reflexaction vermindern, bei Warmblüthern relativ schwach auf das Gehirn, ausgesprochen auf Reflexe und Willkürbewegung; die empfindenden Partien des Rückenmarks werden eher paralytisch als die motorischen, die übrigens auch, wie die peripheren motorischen und sensiblen Nerven eine Herabsetzung ihrer Reizbarkeit erfahren und schliesslich gelähmt werden. Auch die quergestreiften Muskeln werden durch Bromwasserstoffsäure geschwächt.

Die Beziehung der Bromkaliumwirkung auf das darin enthaltene Kali führte zu Versuchen mit dem in früherer Zeit als *Sal febrifugum Sylvii* bei Wechselfieber in Anwendung gezogenen Chlorkalium, *Kalium chloratum*, dessen von Sander behauptete Gleichwerthigkeit mit dem Bromkalium bei Epilepsie jedoch von Stark, Otto u. A. in Abrede gestellt wird. Das Salz ist nicht mit *Kalium chloricum* zu verwechseln, dessen günstige Wirkungen bei Speichelfluss und Mundgeschwüren es übrigens theilt (Sasse).

**Zincum oxydatum**, *Zincum oxydatum purum*; **Zinkoxyd**, reines Zinkoxyd.

Eine besondere beruhigende Wirkung auf das Nervensystem vindicirt man den Zinkverbindungen, von denen ausser den früher abgehandelten Salzen, dem Zinkvitriol und dem Zinkacetat, zu interner Verwendung noch das Zinkoxyd officinell ist.

Das Zinkoxyd, welches auch als *Zincum oxydatum via humida paratum* bezeichnet werden kann, weil es im Gegensatze zu dem S. 381 abgehandelten, nur zum äusseren Gebrauche dienenden unreinen Zinkoxyd durch Fällung von Zinksulfatlösung mit Natriumcarbonat und Glühen des Präcipitats erhalten wird, bildet ein zartes, geruch- und geschmackloses Pulver, das beim Erhitzen citronengelb wird und beim Erkalten seine weisse Farbe wieder annimmt, und welches in Wasser fast unlöslich ist, dagegen leicht in Säuren sich löst. — Neben demselben waren früher auch Verbindungen des Zinks mit Milch- und Baldriansäure, *Zincum lacticum* und *Zincum valerianicum*, sowie das Ferrocyanzink, *Zincum ferrocyanatum*, officinell. Als *Zincum valerianicum* benutzte man das wasserfreie neutrale Zinkvalerianat, welches kleine, weisse, perlmutterglänzende, sich etwas fettig anfühlende, nach Baldriansäure riechende und herbe metallisch schmeckende Krystalle bildet, die nahezu 30% Zinkoxyd entsprechen. Es löst sich in 90 Th. kaltem und schwieriger in heissem Wasser und in 60 Th. 80% Weingeist. Bisweilen ist die Handelswaare mit buttersaurem Zinkoxyd verfälscht. Das Zinklactat, welches durch Lösen von Zinkoxyd oder Zinkcarbonat in Milchsäure und Krystallisation oder durch Fällung von Calcium- oder Natriumlactat mit Zinkchlorid dargestellt wird, bildet weisse, glänzende, nadelförmige Krystalle oder ein sehr weisses Pulver, welches sich in 58 Th. kaltem und 6 Th. heissem Wasser, dagegen nicht in Spiritus löst. Das *Zincum ferrocyanatum* bildet ein weisses, in Wasser, Ammoniak und verdünnten Säuren unlösliches Pulver, welches beim Erhitzen einen alkalisch reagirenden Rückstand lässt, der nach Lösung in Salzsäure auf Zusatz von Kaliumeisencyanür einen blauen Niederschlag giebt.

Eine örtliche Wirkung kann bei dem intern eingeführten Zinkoxyd nicht in Abrede gestellt werden. Vermuthlich geht es, wie andre Zinksalze, als Albuminat ins Blut über.

Nach Michaelis verwandelt sich das Zinkoxyd im Magen, je nachdem die eingeführten Speisen animalische oder vegetabilische waren, in Zinkchlorid oder Zinklactat, welche sich im Entstehungsmomente mit den im Magen vorhandenen Eiweissstoffen zu Zinkalbuminat verbinden, und, wenn diese zur Bindung eingeführter grosser Mengen nicht ausreichen, die Magenschleimhaut selbst chemisch alteriren, so dass dadurch Schorfbildung, Erosion und Ulceration entsteht. Die bei Thieren durch Einführung grosser Mengen Zinkoxyd entstehenden Veränderungen im Magen verheilen sehr leicht und setzen sich nicht auf den Tractus fort. Das resorbirte Zink, dessen Aufsaugung nur durch die Venen, nicht durch die Chylusgefässe geschieht, wird vorzugsweise durch Galle und Darm wieder ausgeschieden; die Elimination durch den Harn tritt erst sehr spät ein, meist erst nach 4—5 Tagen (Michaelis). Wahrscheinlich wird übrigens beim Zinkoxyd nur ein geringer Theil resorbirt und geht der grösste Theil unverdaut mit den Fäces wieder ab. Das durch Präcipitation erhaltene Zinkoxyd wirkt auf die Digestionsorgane weit feindseliger ein als das auf

trockenem Wege erhaltene Zincum oxydatum venale, welches sich durch seine Indifferenz gegen Säuren auszeichnet. Hieraus erklären sich die Differenzen in Bezug auf die Dosis toxica bei verschiedenen Schriftstellern. So sah Orfila nach 10,0 u. m. bei Hunden nur einige Brechdurchfälle, und bei Menschen kann 1,0 (Barbier), ja selbst 8,0 Flores Zinci in 24 Std. ohne Störung genommen werden, während nach meiner eigenen Erfahrung 0,2–0,4 Zinkoxyd Aufstossen, Uebelkeit und Erbrechen hervorrufen können. Nach Herpin soll milchsäures Zink vom Magen besser tolerirt werden als Zinkoxyd.

Nach längerem Fortgebrauche kleiner Dosen sollen auch entfernte Symptome, Schwindel und Narkose, sowie eine eigenthümliche Zinkdyskrasie hervorgerufen werden (Nasse, Pereira, Herpin). Dieselbe zeichnet sich durch relative Ungefährlichkeit aus, indem sie nach dem Aussetzen des Mittels in der Regel rasch verschwindet, selbst wenn colossale Mengen, z. B. 480,0, nach und nach ingerirt waren. Auch bei Arbeitern, welche Zinkoxyddämpfen fortwährend ausgesetzt sind (Broncegiesser, Messingarbeiter) kommen Vergiftungserscheinungen vor (Plasellor, Maisonneuve, Popoff), welche bald mehr den Respirationsorganen (Husten, Kurzathmigkeit und Blutspeien), bald mehr den Verdauungsorganen (Uebelkeit, Erbrechen, heftige Durchfälle), bald mehr dem Gebiete der nervösen Störungen (Kopfschmerzen, Gliederzittern, Wadenkrämpfe, Gelenkschmerzen) angehören und häufig mit Frost und Fieberhitze sich verbinden. Nutritionsstörungen und chloroanämische Zustände kommen nach längerem Gebrauche von Zinklactat weniger häufig und erst nach grösseren Dosen (350,0) als nach Zinkoxyd (120,0) vor (Herpin).

Zinkoxyd gilt seit alter Zeit als besonders beruhigend für das Nervensystem und wird auch jetzt noch bei convulsivischen und schmerzhaften Nervenleiden verordnet.

Ältere Aerzte belegten das Zinkoxyd als Mittel bei Convulsionen geradezu mit dem Ehrentitel des Opium minerale. Bei Krämpfen im kindlichen Lebensalter, für welche eine Erklärung nicht zu finden war, aber auch, wenn dieselben in Verbindung mit Meningitis standen, war Zinkoxyd früher fast das einzig gebrauchte Medicament. Auch bei Keuchhusten, Glottiskrampf, Chorea war es sehr geschätzt. Herpin will auch durch die Darreichung von 4mal täglich 0,12 und steigenden Gaben bis 1,2 pro die, welche letztere noch 12 Wochen fortgereicht wurden, ausserordentlich günstige Effecte bei Epilepsie gehabt haben, so dass von 42 Fällen 28 geheilt wurden. Andere, wie Reynolds, beobachteten wohl Verminderung der Zahl der Anfälle, aber nur ausnahmsweise völlige Heilung. Häufig sieht man auch nach dem Gebrauche des Mittels die Anfälle zwar minder frequent, aber intensiver werden. Endlich hat Valleix Zinkoxyd in Verbindung mit Hyoscyamus (Meglinsche Pillen) bei Neuralgien (Gesichtsschmerz) gerühmt. Die früher gebräuchliche Verwendung des Mittels bei Magenkrampf, chronischen Durchfällen und überhaupt bei chronischen Affectionen des Magens und Darmcanals ist durch andere Medicamente (Magnesia, Wismut) so gut wie verdrängt. Waring Curran rühmt es neuerdings wieder gegen die wandernden Schmerzen im ersten und gegen Diarrhoe und colliquative Schweisse im letzten Stadium der Schwindsucht.

Das Zinklactat ist namentlich als Antiepilepticum (Herpin, Schroeder van der Kolk u. A.) verwendet; nach Schroeder van der Kolk passt es besonders in Fällen, wo sexuelle Aufregung besteht. Das Mittel ist nach Herpin dem Zinkoxyd vorzuziehen, weil es viel leichter und länger tolerirt wird; auch wird es offenbar vollständiger resorbirt (Michaelis). Weitere Anwendung fand das Mittel bei Hysterie, Veitstanz und Algien (Werber). A. v. Graefe benutzte Zinklactat bei spastischen Affectionen der Augenmuskeln und Hyperästhesie des Auges. Das Zinkvalerianat ist besonders durch Italienische Aerzte als Neuroticum zur allgemeinen Anwendung gelangt (Buffalini, Namias, Muratori u. A.) und trotz seines unangenehmen Geruches fast mehr als das Zinklactat angewendet. So gegen Epilepsie (Devay), Migraine und andere Schmerzen bei Hysterischen (Boccaccini), Prosopalgie, Ischias, Gastralgie, Veitstanz (Escolar), selbst bei Cholera (Ourgaud), Chlorose (Turchetti),



Insomnie (Heiberg) und äusserlich bei Katarrhen und Blennorrhöen (Fario). Dass Zinkvalerianat irgendwie besser als Zinklactat oder Zinkoxyd wirkt, ist kaum glaublich. Ebenso ist das von Barnes bei Epilepsie benutzte *Zincum phosphoricum* völlig entbehrlich. Das *Zincum ferrocyanatum*, welches von Hufeland als Nervinum in die Praxis eingeführt wurde, ist ganz obsolet.

Die Anwendung der Zinksalze als Neurotica lässt sich nach den vorliegenden Erfahrungen am Krankenbette einerseits und nach der physiologischen Wirkung derselben andererseits nicht eben als irrationell erklären, doch haben sie vor anderen Metallsalzen (Kupfer, Silber u. s. w.) höchstens den Vorzug, dass sie verhältnissmässig wenig den Magen afficiren. Dass sie nicht zu den infallibeln Mitteln gehören, beweist der Umstand, dass die Zinkpräparate in neuerer Zeit immer mehr verlassen werden.

Man giebt Zinkoxyd innerlich zu 0,05—0,2 mehrmals täglich in Pulvern oder Pillen, weniger zweckmässig in Schüttelmixturen oder Trochiscen. In gleicher Weise sind auch die Zinksalze zu verordnen.

Bei der Cur der Epilepsie sind die mittleren Gaben sowohl beim Zinkoxyd als beim Zinklactat von Herpin u. A. bedeutend höher gegriffen worden. Herpin steigt beim Zinklactat von 3,0 (bei Kindern 1,0—2,0) bis 15,0 und darüber wöchentlich. Man giebt die Zinksalze am besten nach der Mahlzeit, nicht nüchtern, wodurch man jede gastrische Irritation und Erbrechen vermeidet.

Das Zinkoxyd kann zu Augensalben in derselben Weise wie das *Zincum oxydatum venale* (vgl. S. 382) benutzt werden. Es bildet einen Bestandtheil mancher älteren antiepileptischen Pulver und Pillen, welche meist auch Bilsenkraut, Baldrian oder Teufelsdreck enthalten.

#### Verordnungen:

1)	R	2)	R
	<i>Zinci oxydati</i>		<i>Zinci valerianici</i> 1,0
	<i>Extr. Hyoscyami</i> aa 0,05		<i>Extr. Belladonn.</i> 0,1 (dgm 1)
	<i>Rad. Valerianae</i> 2,0		<i>Extr. Chinæ</i>
	<i>Olei Valerianæ</i> gtt. 1.		<i>Extr. Gentianæ</i> aa 1,0
<i>M. f. pulv. Disp. tal. doses No. 10. D.</i>		<i>F. pilul. No. 20. Obduc. argento. D. S.</i>	
<i>in charta cer. S. 3mal tägl. 1 Pulver.</i>		Morgens und Abends 2 Pillen. (Bei	
( <i>Pulvis antiepilepticus Ph.</i>		Neuralgien. Devay.)	
<i>p a u p.</i> )			

Wismutvalerianat, *Bismutum valerianicum*. — Aehnlich wie Zinkvalerianat findet auch das Wismutvalerianat Anwendung. Es gehört wie ersteres zu den modernen Compositionen, deren Anwendung sich vorzugsweise auf die falsche Prämisse von einer besonderen Wirksamkeit der Valeriansäure bei Nervenleiden gründet. Das von Righini angegebene Präparat soll in Dosen von 0,03—0,15 mehrmals täglich bei Neuralgien, insbesondere bei Cardialgie, ferner bei chronischen Magenschmerzen und Palpitationen von günstiger Wirkung sein.

Zinnpräparate: Ausser der anthelminthischen Wirkung, welche man früher dem metallischen Zinn (vgl. S. 210) und den Zinnverbindungen überhaupt zuschrieb, hat man demselben auch sedative Wirkung beigelegt. Schlesinger empfahl Zinnchlorür, *Stannum chloratum*, bei Epilepsie in *Spiritus Aetheris chlorati* gelöst zu 0,005—0,025 pro dosi. Die äusserliche Anwendung desselben Salzes, welches zu den scharf metallischen Giften gehört, bei chronischem Ekzem und Geschwüren ist obsolet. Nach Versuchen von White mit weinsaurem Zinnoxidulnatrium und mit Zinntriäthyl steht das Zinn in seiner Action dem Blei am nächsten, indem es einerseits den Verdauungstractus,

andererseits Rückenmark, Gehirn und Medullacentren afficirt. In dem gleichzeitig verminderten und eiweisshaltigen Urin ist das Metall constant 4—5 Tage nachweisbar. Die Wirkung auf das Rückenmark ist eine lähmende (Schwäche der Bewegungen und starke Herabsetzung der Reflexe), während Gehirn und Medulla oblongata in einen Reizungszustand versetzt werden, der sich durch Aufregung einerseits und durch Tremor, convulsivische Anfälle, Zunahme der Athemfrequenz und Dyspnoe andererseits charakterisirt. Die Dämpfe des Zinntriäthyls sind sehr giftig und können heftigen Kopfschmerz, Uebelkeit, allgemeine Schwäche, Durchfälle und selbst Albuminurie erzeugen (Harnack und White). Bei Fröschen lähmen Zinnsalze die quergestreiften Muskeln.

Wir erwähnen hier noch die von Simpson nach Art des Bismutum valerianicum, insbesondere bei Cardialgie und bei Vomitus gravidarum, aber auch bei katarrhalischen Affectionen des Magens und Darmcanals gegebenen Salze des zu den Erdmetallen gehörenden Ceriums, von denen das oxalsaurer Salz, Cerium oxalicum, und das Ceriumnitrat, Cerium nitricum, zu 0,05—0,12 gereicht werden sollen. Bei uns haben dieselben bisher keine Verwendung gefunden.

**Oleum animale aethereum, Oleum animale Dippelii**, ätherisches Thieröl. — Durch trockne Destillation stickstoffhaltiger animalischer Materien (Horn, Knochen) wird eine wenig dickliche, schwarzbraune, undurchsichtige Flüssigkeit von höchst intensivem, unangenehmem, empyreumatischem Geruche und widrig bitterlichem, rauchigem Geschmacke gewonnen, welche man als stinkendes Thieröl oder Hirschhornöl, Oleum animale foetidum s. Oleum cornu cervi, bezeichnet. Dasselbe stellt ein sehr variables Gemisch von Ammoniumcarbonat, Cyanammonium, verschiedenen Kohlenwasserstoffen und organischen Basen dar, welche sich auch zum grössten Theile in dem aus Thieröl durch Destillation erhaltenen dünnflüssigen, gelblichen ätherischen Thieröle, jedoch in geringeren Mengen, finden. Das Präparat verewigt den Namen des alten Alchymisten Dippel († 1734), welcher aus dem stinkenden Thieröl durch wiederholte Destillation ein nach Rosen riechendes Destillat erhalten haben will. Das ätherische Thieröl duftet freilich nicht nach Rosen, ist jedoch von dem eigenthümlichen stinkenden Geruch des Darstellungsmaterials frei, welchen es jedoch bei nicht sorgfältiger Aufbewahrung unter dem Einflusse der Luft, wobei es sich bräunlich färbt, in höherem oder geringerem Grade wieder annimmt. Es reagirt schwach alkalisch, löst sich in 80 Th. Wasser und leicht in Alkohol, Aether, auch in fetten Oelen.

Das ätherische Thieröl gilt in kleineren Dosen als Antispasmodicum und Analepticum, ist jedoch in grösseren Mengen ein intensives, zu einem Esslöffel beim Erwachsenen tödtliches Gift (Chaussier). Bei Thieren bedingt Ol. animale aethereum Lähmung und Schwäche der Hinterbeine und allgemeine klonische Krämpfe; quantitativ differiren einzelne Sorten; 4,0 der stärksten Sorte tödten mittelgrosse Hunde in 15 Min., trotzdem ein grosser Theil des Giftes nicht resorbirt wird (A. Werber). Bei der jetzt übrigens fast gar nicht mehr üblichen Anwendung des Medicaments ist daher mit grösster Vorsicht zu verfahren und die Dosis von 5—20 Tr. nicht zu überschreiten. Man muss es des unangenehmen Geruches und Geschmackes wegen in gelatinirten Pillen und Gelatinekapeln verabreichen. Ein ähnliches Destillat aus 1 Th. Oleum anim. foet. und 3 Th. Terpenthinöl bildete das früher als Wurmmittel und besonders zum Abtreiben von Tänien benutzte Oleum anthelminticum Chaberti, Chaberts Wurmol. Nach Krahmer ist das letztere ein sicheres Bandwurmmittel nur bei Anwendung grosser Dosen (15,0—30,0 pro die); doch rufen solche Durchfälle, Schwindel und nicht selten lästiges Harnbrennen hervor, welche Erscheinungen bei ruhigem Verhalten, kühlem Regime und nöthigenfalls einigen Dosen Opium binnen 24 Std. schwinden. Das rohe Thieröl wird nur noch in der Veterinärpraxis angewendet, ist übrigens nicht ganz so giftig wie das officinelle Präparat. Die Giftigkeit wurde früher dem darin vorhandenen Cyanammonium zugeschrieben, muss aber wohl grösstentheils auf die organischen Basen zurückgeführt werden, von denen einzelne äusserst deleter auf den thierischen Organismus wirken und selbst dem Nicotin in ihrer Giftigkeit gleichkommen. Dieselben gehören verschiedenen Gruppen der organischen Basen an,

unter denen die Pyridinbasen (den Anilinbasen isomere Nitrilbasen) die grösste Giftigkeit besitzen, welche dem Kohlenstoffgehalte und dem Siedepunkte adäquat ist (A. Werber, Mac Kendrick). Die Angabe A. Werbers, dass die höheren Glieder der Pyridinreihe furchtbare Krämpfe und grosse Dyspnoe hervorrufen, während die unteren unter paralytischen Erscheinungen tödten, ist von Mac Kendrick (1878) nicht bestätigt, der alle in Frage stehenden Basen ohne Krämpfe tödtend fand. Die kohlenstoffärmste dieser Basen, das Pyridin, erzeugt selbst zu 0,8 bei Kaninchen nur leichte Excitation und eine Art Rausch mit Athem- und Pulsbeschleunigung; die nächstfolgende, das Picolin, führt zu 0,4 pr. Kilo zu Benommenheit des Sensoriums und Sinken der Athem- und Herzaction, erzeugt jedoch zu 0,8 keinen Stupor, der nach Lutidin und den kohlenstoffreicheren Pyridinbasen hervortritt, von denen die letztgenannte zu 0,5, Collidin zu 0,2 und Parvolin zu 0,1 per Kilo Tod in wenigen Minuten bedingen. Weit giftiger und gleichzeitig krampferregend wirken Polymere des Pyridins und Picolins (Dipyridin und Dipicolin). Alle diese Basen coaguliren Eiweiss und wirken örtlich irritirend.

Dasselbe gilt von der den krampferregenden Giften zugerechneten, von Anderson ebenfalls im ätherischen Thieröl aufgefundenen, dem Pyridin isomeren Amidbase Anilin, welche Kaninchen zu 1,0—1,5 tödtet. Die Krämpfe scheinen Erstickungskrämpfe zu sein und stehen wahrscheinlich mit einer Wirkung des Anilins auf das Blut im Zusammenhange, welches braun wird und nicht an der Luft sich röthet, dabei den Geruch des Anilins zeigt, das auch im Gehirn und in den Muskeln chemisch nachweisbar ist; die Blutkörperchen sind dabei wie granulirt und theilweise des Farbstoffes beraubt (Ollivier und Bergeron). Bei Intoxicationen am Menschen fehlen in der Regel die Krämpfe und beschränken sich die Erscheinungen auf Mattigkeit, Schwindel und Dyspnoe mit oder ohne Verlust des Bewusstseins; als auffällende Vergiftungserscheinungen zeigen sich dabei neben schwachem Herzschlage Kälte und Blässe der Körperoberfläche und eine auffallende bläulichrothe Färbung des Gesichts, der Lippen, Nasenschleimhaut und Nägel. Letztere steht vermuthlich mit einer Veränderung des Hämoglobins in Zusammenhang. Lethébys Annahme, dass aus Anilin und Nitrobenzin ein eigenthümlicher Farbstoff im Organismus entstehe, scheint unhaltbar, da beide Körper als solche im Harn und Athem nachgewiesen wurden. Turnbull empfahl Anilinsulfat bei Chorea und krampfhaften Affectionen. Lailler und Leloir versuchten Anilinhydrochlorat äusserlich bei Psoriasis, doch rief die Application von 100,0 einer 2% Lösung die Erscheinungen der Anilinvergiftung hervor. Von den Derivaten des Anilins ist das Fuchsin, in welches sich, einzelnen Autoren zufolge, das Anilin im Organismus z. Th. verwandeln soll, in reinem Zustande nicht toxisch und von Bouchut u. A. bei Albuminurie zu 0,1—0,2 pro dosi angewendet. Nach Bouchut soll es selbst bei parenchymatöser Nephritis sich nützlich erweisen. Dies contrastirt sehr mit der Angabe von Fels und Ritter, wonach Fuchsin in minimalen Mengen Albuminurie erzeugen soll. Im Urin wird Fuchsin unverändert ausgeschieden.

Das im Oleum animale vorhandene Methylamin wirkt nach Versuchen von Béhier mit essigsaurem Methylamin zu 0,5—1,0 steigernd auf die arterielle Spannung, ohne die Pulsfrequenz wesentlich zu beeinflussen, und bewirkt in grösseren Dosen Irregularität des Pulses; im Uebrigen nähert es sich in seiner Wirkung dem Trimethylamin.

#### **Amygdalae amarae, Semen Amygdali amarum; Bittere Mandeln.**

Die bitteren Mandeln bilden das Material zur Bereitung eines destillirten Wassers, dessen Wirksamkeit in seinem Gehalte an der beim Destillationsprocesse sich entwickelnden Cyanwasserstoffsäure beruht. Durch dieses destillirte Wasser, das **Bittermandelwasser, Aqua Amygdalarum amararum**, welches in 1000 Th. 1 Th. Cyanwasserstoffsäure enthalten muss, werden alle übrigen Blausäurepräparate und namentlich die früher officinelle wässrige



Blausäure, Acidum hydrocyanicum s. hydrocyanatum dilutum s. Borussicum s. zooticum, ersetzt.

Die Cyanwasserstoffsäure oder Blausäure, CNH oder CyH, ist im wasserfreien Zustande (durch Zerlegung von Cyanquecksilber mittelst conc. Chlorwasserstoffsäure dargestellt) eine farblose, sehr flüchtige, leicht bewegliche Flüssigkeit von starkem, bittermandelartigem Geruche, welche bei 26,5° siedet und bei -15° zu einer krystallinischen Masse erstarrt. Sie brennt mit weisser Flamme und ist in jedem Verhältnisse in Wasser und Spiritus löslich. Beim Aufbewahren zersetzt sie sich unter Abscheidung eines braunen Körpers (Azulmsäure). Mit starken Säuren oder Alkalien zersetzt sie sich unter Wasseraufnahme in Ameisensäure und Ammoniak. Die wässrige Cyanwasserstoffsäure, wie sie durch Destillation von Cyankalium oder Ferrocyankalium mit verdünnter Schwefelsäure dargestellt wird, ist ebenfalls eine farblose Flüssigkeit von stärkerem oder schwächerem Bittermandelgeruch und erst süßlichem, dann scharf bitterem Geschmacke und gleichfalls sehr schnell der Zersetzung unterworfen, wovon Zusatz von etwas Salzsäure eine längere Zeit schützt. Die früher officinelle Blausäure enthielt in den verschiedenen Phkp. 2—3% wasserfreie Blausäure und war somit erheblich stärker als das allein officinelle blausäurehaltige destillierte Wasser, welches sie jetzt mit Recht ersetzt, weil die enorme Gefährlichkeit und Giftigkeit der Cyanwasserstoffsäure die Verwendung der sogenannten officinellen Blausäure ganz unzweckmässig erscheinen lässt, da hier von einigen Tropfen Leben und Tod abhängt. Noch verwerflicher als zweiprocentige Blausäure sind natürlich ältere, noch stärkere Präparate (Blausäure von Scheele, Vauquelin, Magendie, Robiquet u. a. m.), von denen einzelne sogar 38% wasserfreie Blausäure enthalten, da dieselben auch bei Verordnung in Tropfenform stets verdünnt werden müssen.

Die bitteren Mandeln sind die Samenkerne von *Amygdalus communis* L. oder der als *a. amara* DC. bezeichneten Varietät des Mandelbaumes, über dessen Vorkommen bereits S. 358 das Nöthige angegeben wurde. Von den ebendasselbst abgehandelten süßen Mandeln unterscheiden sie sich äusserlich nur durch ihre geringere Grösse und dadurch, dass sie beim Zerquetschen mit Wasser eine stark nach Blausäure riechende und bitter schmeckende Emulsion liefern. Die Blausäure ist in den bitteren Mandeln nicht präformirt enthalten, sondern entsteht erst bei der Einwirkung von Emulsin bei Gegenwart von Wasser auf das in den bitteren Mandeln und in den Fruchtkernen verschiedener Angehöriger der Familien der Amygdaceen und Pomaceen aufgefundene stickstoffhaltige Glykosid Amygdalin. Dieser Stoff, im wasserfreien Zustande von der Formel  $C^{20}H^{27}O^{11}$ , bildet mit 2 Atomen Krystallwasser farblose, perlglänzende Schuppen und mit 3 Atomen Wasser durchsichtige, orthorhombische Prismen von schwach bitterem Geschmacke und ohne Geruch, welche sich in jeder Menge kochendem und in 12 Th. kaltem Wasser, schwierig in Alkohol, gar nicht in Aether lösen; die Lösungen reagiren neutral. Das Amygdalin schmilzt beim Erhitzen über 120° zu einem wasserhellen Liquidum, welches über 160° hinaus sich bräunt und in höherer Temperatur vollständig zersetzt wird. Oxydirende Substanzen bilden aus Amygdalin Bittermandelöl, Benzoesäure, Ameisensäure, Ammoniak und Kohlensäure; verdünnte Schwefelsäure und Salzsäure zerlegen Amygdalin beim Kochen in Zucker, Bittermandelöl und Ameisensäure. Concentrirte Salzsäure erzeugt aus Amygdalin eine eigenthümliche Säure, die Mandelsäure,  $C^8H^8O^3$ , welche im Organismus sich in Hippursäure verwandelt. Interessanter als diese Zersetzungen ist diejenige, welche Amygdalin bei Gegenwart von Wasser durch den Contact mit Emulsin und einigen andern Fermenten (Diastase, Bierhefe, nicht aber Kälberlab, Pankreasferment oder gewöhnliches Pflanzenzeiweiss) erleidet, indem es damit schnell unter Bildung von Bittermandelöl, Blausäure und Zucker nach der Gleichung  $C^{20}H^{27}NO^{11} + 2H^2O = CNH$  (Blausäure) +  $C^7H^6O$  (Benzaldehyd) +  $2C^6H^{12}O^6$  (Glykose) zerfällt. Die Zersetzung erfolgt nur bei Anwesenheit einer genügenden Menge Wasser, und wenn das Emulsin sich in frischem und gelöstem Zustande befindet, am schnellsten bei 20—30°. Durch Kochen mit Wasser coagulirtes oder durch Behandlung mit kochendem Weingeist unlöslich gewordenes Emulsin ist unwirksam. Zusatz von starken Basen und Säuren, von Aether oder Alkohol verzögert die Zersetzung.

Das Amygdalin, welches in den Bittermandeln zu 2—3% existirt, hat medicinisches Interesse nur durch seine Spaltung mit Emulsin und die dabei resultirende Blausäure. Auf den menschlichen Organismus wirkt es auch in grösseren Mengen, selbst zu 4,0, nicht toxisch (Widtmann und Denk). Bei Kaninchen und Hunden soll es zu 1,0—2,5 langsam toxisch wirken, ohne Blausäureintoxication zu bedingen. Es geht rasch in das Blut über (Koelliker, Eulenburg) und wird, wenigstens theilweise, als solches auch bald im Urin ausgeschieden (Wöhler und Frerichs). Hippursäure tritt danach im Harn nicht auf, wohl aber bei Kaninchen bisweilen Ameisensäure (Ranke). Wöhler und Liebig proponirten als Blausäurepräparat eine Lösung von 1,0 (17 Gran) Amygdalin in 30,0 Süssmandelemulsion, wovon 10—15 Tropfen pro dosi gegeben werden sollten. Das Ppt. ist indess nicht sehr zweckmässig, da einerseits die Spaltung des Amygdalins erst in einigen Stunden vollendet ist und so der Kranke mit dem frischen Ppt. nicht das ihm zugedachte Blausäurequantum erhält, und da andererseits die Emulsion sich viel leichter zersetzt als Bittermandelwasser. Die Empfehlung des Amygdalins (gleichzeitig mit Ol. Hyoscyami äusserlich) bei Krebs und Markschwamm (Inosemtzeff) hat sich nicht bewährt.

Das Bittermandelwasser wird in der Weise bereitet, dass 12 Th. durch kaltes Auspressen von dem fetten Oele befreite und in ein feines Pulver verwandelte bittere Mandeln in einer geräumigen Destillirblase mit 80 Th. Wasser gut gemischt, 1 Th. Weingeist zugefügt und die Mischung gut verschlossen 12 Std. lang stehen gelassen wird und dann vorsichtig 11 Th. in eine Vorlage abdestillirt werden, welche 1 Th. Weingeist enthält, und das Destillat mit soviel von einer Mischung von 1 Th. Weingeist u. 5 Th. Wasser verdünnt wird, dass in 1000 Th. 1 Th. Cyanwasserstoff enthalten ist. Es stellt eine etwas trübe, stark nach Blausäure und Bittermandelöl riechende Flüssigkeit dar. Der Geruch nach Bittermandelöl bleibt auch nach Ausfällung des Cyanwasserstoffs mit Silbersalpeter erhalten. Beim Aufbewahren erleidet das Bittermandelwasser, namentlich im Lichte, Zersetzungen, welche theils die Blausäure, theils das darin enthaltene Bittermandelöl betreffen.

An der Wirkung der Aqua Amygdalarum amararum ist das Bittermandelöl, welches aus den bittern Mandeln in sehr verschiedenen Mengen (0,42 bis 0,95%), aus Kirschlorbeerblättern in etwas geringerer Quantität erhalten wird, unbetheiligt. Das Bittermandelöl des Handels enthält stets neben Benzoësäurealdehyd (Benzoylwasserstoff),  $C^7H^6O$ , etwas Blausäure und geringe Mengen von Benzoësäure, Benzoin und anderen Benzoylderivaten. Dasselbe wurde früher, jedoch selten, innerlich zu  $\frac{1}{3}$ —1 Tr. pro dosi in Weingeist oder Aether gelöst und äusserlich mit fetten Oelen oder Spiritus als schmerz- und krampflinderndes Mittel bei Lichtscheu, Blepharospasmus, Kolik, auch bei Leukom und Amaurose (Turnbull) benutzt, ist aber wegen seines inconstanten Gehaltes an Cyanwasserstoffsäure (3—14%) ein unzweckmässiges Präparat. Die Anwendung zu Haarölen hat wiederholt zu Vergiftungen geführt, wie auch die interne Einführung grösserer Mengen (1,0—8,0) mehrfach letale Intoxicationen veranlasste. Das reine Bittermandelöl, welches bei 180° siedet und ein spec. Gew. von 1,043 besitzt, sich in 30 Th. Wasser, leicht in Weingeist und Aether löst, wirkt nach Art anderer ätherischer Oele und tödtet Kaninchen erst zu 4,0—8,0 (Mitscherlich), Hunde erst zu 12,0 (MacLagan). Es geht durch Oxydation leicht in Benzoësäure über und verwandelt sich bei Einführung in mittleren Mengen im Organismus in Hippursäure (Wöhler und Frerichs), während nach grösseren Dosen der Urin Bittermandelgeruch zeigt. Statt des Bittermandelöls findet sich im Handel jetzt häufig das ähnlich riechende, sehr giftige Nitrobenzin (sog. Mirbanöl oder Mirbanessenz), welches in den letzten Jahren zu einer nicht unbedeutlichen Anzahl von Intoxicationen, mehrfach mit tödtlichem Ausgange, geführt hat.

Das Bittermandelwasser ersetzt auch alle früher gebräuchlich gewesenen Cyanmetalle, welche im Magen unter dem Einflusse der Salzsäure Cyanwasserstoffsäure frei werden lassen, sowie ver-

schiedene blausäurehaltige Destillate aus Pflanzentheilen, insbesondere das Kirschchlorbeerwasser, Aqua Laurocerasi.

Zu den früher statt der Blausäure benutzten Cyanmetallen, von denen einzelne äusserst unbeständig sind, so dass sie leicht durch verdünnte Säuren, namentlich Wasserstoffsäuren, und daher auch im Magen durch die Salzsäure unter Freiwerden von Cyanwasserstoffsäure zersetzt werden, gehören das zu 0,01 pro dosi (in wässriger Lösung) und äusserlich bei schmerzhaften Affectionen zu Waschungen oder in Salbenform (0,1–0,2 auf 25,0 Fett) epidermatisch und selbst endermatisch angewendete Cyankalium, Kalium cyanatum, dessen toxikologische Bedeutung seit der Verwendung in der Photographie eine ungemein hohe geworden ist, und das Cyanzink, Zincum cyanatum s. Zincum cyanatum sine ferro (so genannt zur Unterscheidung von dem bei den Zinkpräparaten erwähnten Zincum ferrocyanatum, mit welchem es durch Versehen in Folge des Gebrauches der für beide synonymen Bezeichnung Zincum borussicum verwechselt wurde, wodurch tödtliche Vergiftung entstand (Remer).

Die als Nitrile bezeichneten Verbindungen, welche Cyan mit Alkoholradicalen bildet, wie Cyanaethyl (Propionitril) und Cyanamyl (Isocapronitril) sind stark toxisch, jedoch weit weniger giftig als Cyanwasserstoffsäure (Pelikan, Maximowitsch). In kleineren Gaben bewirken sie Steigerung der Athemfrequenz ohne Betheiligung des Vagus, in grösseren epileptiforme Krämpfe mit Mydriasis und mit oder ohne Verlust der Willkürbewegung. Magendie empfahl Cyanaethyl unter der Bezeichnung Aether hydrocyanicus bei Hustenreiz.

Die Aqua Laurocerasi ist ein früher sehr geschätztes Destillat aus den lederartigen u. oben glatten und glänzenden Blättern des Kirschchlorbeer, *Prunus Laurocerasus* L., eines immergrünen Strauches aus der Familie der Amygdaleen, welcher in den russischen Kaukasusländern, im nördlichen Kleinasien und im nördlichen Persien ursprünglich einheimisch, in allen wärmeren Ländern mit mildem Winter als Zierstrauch verbreitet ist, der in tropischen Klimaten selbst bis zu 20 Fuss hoch wird. Die Kirschchlorbeerblätter sind geruchlos, entwickeln aber beim Zerreiben Geruch nach Bittermandelöl und Blausäure. Im Juli und August liefern sie ein fast doppelt so starkes Destillat wie im Winter und Frühling (Broekx.). Nach Christison geben Knospen und junge Blätter mehr ätherisches Oel. Die Folia Laurocerasi enthalten weder Emulsin noch krystallisirtes Amygdalin, sondern, wie die Blätter des Pfirsichbaums, *Persica vulgaris* s. *Amygdalus Persica* L., welche früher ebenfalls zur Darstellung eines blausäurehaltigen destillirten Wassers, Aqua Persicae foliorum, dienten und die grünen Theile verschiedener Pflanzen aus der Familie der Amygdaleen, einen dunkelgelben, durchsichtigen, harzartigen Stoff, das sog. amorphe Amygdalin, welches mit Emulsin Blausäure entwickelt. Die Aqua Laurocerasi ist weniger trübe als das Bittermandelwasser, vielleicht in Folge eines geringeren Gehaltes an ätherischem Oele, und wird von Einzelnen als angenehmer riechend betrachtet. Bei längerem Stehen zersetzt sie sich wie die Aqua Amygdalarum amararum.

Von den früher wegen ihres Blausäuregehalts benutzten Destillaten ist die Aqua Pruni Padi die wichtigste. Dieselbe wurde aus der Rinde von *Prunus Padus* L., der sog. Ahlkirschen- oder Faulbaumrinde, in welcher sich, wie auch in Blüten, Samenkernen und Blättern krystallisirtes Amygdalin (nach Riegel in der Rinde  $\frac{2}{3}$ –1%) neben sog. amorphem Amygdalin findet, bereitet und nach Art des Kirschchlorbeerwassers und Bittermandelwassers, jedoch in etwas grösseren Dosen, angewendet. In Amerika wird die Rinde der nah verwandten *Prunus serotina* s. *Prunus Virginiana* als Cortex Pruni Virginianae, welche namentlich im Herbst reichlich Amygdalin zu enthalten scheint, in ähnlicher Weise gebraucht. Dieselbe gilt als Antiperiodicum und ist neuerdings auch in England bei Herzaffectionen und febrilen Krankheiten (Allbutt) in Abkochung in Anwendung gezogen. Auch die Schlehenblüthen (von *Prunus spinosa* L.), früher als Flores Acaciae officinell und als blutreinigendes Mittel gebraucht, liefern Blausäure. Früher stellte man auch schwächere Blausäurelösungen durch Destillation saurer Kirschen und Kirschkerne, sog. Kirschwasser, Aqua Cerasorum nigrorum, mit-



unter mit Zusatz von bitteren Mandeln, sog. *Aqua Cerasorum amygdalata*, her, welche auch heute noch in der Receptur vorkommen, jedoch durch eine Verdünnung des Bittermandelwassers ersetzt werden, als welche geradezu unter dem Namen Kirschwasser oder *Aqua Amygdalarum diluta* eine Mischung von 1 Th. Bittermandelwasser mit 19 Th. destillirtem Wasser früher officinell war. Die nicht zur Familie der *Amygdaleae* gehörenden Pflanzen, welche, ohne Amygdalin zu enthalten, Blausäure bilden (*Jatropha Manihot*, *Ximenesia Americana* L., *Agaricus Oreades*) haben kein Interesse für die Pharmakologie.

Die officinelle Blausäure wird von allen Applicationsstellen aus, auch von der unverletzten Haut resorbiert, ohne an den Applicationsstellen wesentliche Veränderungen hervorzurufen. Ueber die Schicksale der Blausäure im Organismus sind die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen.

Oertliche Irritationsphänomene kommen bei Vergiftung mit Blausäure nicht vor, finden sich dagegen nicht selten nach Einwirkung von Cyankalium. In ganz kleinen medicinalen Dosen erzeugt Blausäure, innerlich genommen, ausser bitterm Geschmack auch Kratzen im Halse, Wärme im Magen und Vermehrung der Speichelsecretion. Auch bei Application auf die *Conjunctiva* ruft verdünnte Blausäure (2—3%) nur ein Gefühl von geringer Empfindlichkeit und Wärme mit Congestion der Gefässe von einigen Minuten Dauer hervor (James Vose-Solomon, Nunneley); die Pupille scheint dadurch etwas erweitert zu werden. Resorption erfolgt von allen Schleimhäuten aus; man kann Thiere sowohl vom Rectum, als von der Vagina, als vom äussern Gehörgange aus mit Blausäure oder Cyankalium tödtlich vergiften; vom Mastdarm und Magen aus erfolgt die Resorption mit gleicher Schnelligkeit (Savory). Von frischen Wunden aus kann Vergiftung eintreten, jedoch kommt es dazu viel weniger leicht, als gewöhnlich angenommen wird, und noch minder gefährlich erscheint die Application auf die äussere Haut. Man hat auf eine Elimination der Blausäure durch Lungen und Haut aus dem Geruche des Athems und der Transpiration nach dem Gifte geschlossen. Der Nachweis von Cyanwasserstoffsäure in Blut und Gehirn im unveränderten Zustande ist von mehreren Forschern (Hoppe, Everett, Rennard) bei Intoxicationen geliefert, in anderen Fällen scheint schon im Magen eine theilweise Zersetzung unter Bildung von Ameisensäure stattzufinden (Schauenstein). — Wird wasserfreie Blausäure auf die Cornea applicirt, so erzeugt sie einen weissen, leicht durch Reibung ablösbaren Schorf (Jobert de Lamballe) und selbst in nicht zu starker Verdünnung Trübung der Cornea. Bei directer äusserer Einwirkung auf die Haut wird die betroffene Hautpartie unempfindlich und taub (Robiquet); bei Verdünnungen von 1‰ im Bittermandelwasser ist Veränderung der Sensibilität nicht nachweisbar.

Die Blausäure unterscheidet sich von allen übrigen Neurotica dadurch, dass sie einen entschiedenen Einfluss auf das Blut selbst besitzt, dessen Beschaffenheit sie in eigenthümlicher Weise verändert, indem sie sich einerseits chemisch mit dem Hämoglobin verbindet und indem sie andererseits die Sauerstoffabgabe seitens der Blutkörperchen verringert.

Nach den Untersuchungen von Preyer verbinden sich sowohl Blausäure als Cyankalium bei Blutwärme mit Oxyhämoglobin und Hämoglobin, und ist der Sauerstoff der Luft nicht im Stande, diese vier Verbindungen in Oxyhämoglobin zurückzuführen. Die betreffenden Verbindungen sind aber nicht im Blute der mit Cyankalium vergifteten Thiere nachweisbar. Wässrige Lösung von krystallisirtem Cyanwasserstoffhämoglobin tödtet Meerschweinchen und Frösche unter den Symptomen der Blausäurevergiftung, jedoch treten dieselben später auf, was zusammengenommen mit dem Blausäuregeruch der Thiere (Cyankaliumhämoglobin besitzt einen solchen Geruch nicht) auf eine Zersetzung

schliessen und es wahrscheinlich erscheinen lässt, dass nicht die fragliche Verbindung, sondern die Blausäure selbst das wirksame Agens bei Blausäurevergiftung ist. Nach Hiller und Wagner lassen sich spectroscopische Veränderungen im circulirenden Blute mit Cyanwasserstoff vergifteter Thiere nachweisen, insofern die Oxyhämoglobinstreifen bei gleicher Lage geringere Absorption zeigen und die Absorption des Intervalls bedeutender ist; noch auffallender ist letztere Erscheinung post mortem. Das Blut mit Cyanwasserstoffsäure oder Cyankalium vergifteter Warmblüter ist häufig nicht ganz so dunkel wie bei gewöhnlicher Erstickung; bei Fröschen ist dasselbe auffallend hellroth, wahrscheinlich in Folge einer Gestaltveränderung der rothen Blutkörperchen, wobei dieselben mehr Licht reflectiren als im Normalzustande (Preyer). Ausserhalb des Körpers werden die rothen Blutkörperchen unter Einwirkung von Blausäure zuerst rundlicher, dann körnig und schliesslich farblos, bei Warmblütern erst maulbeerförmig, dann farblos; im lebenden Körper ist bei Blausäurevergiftung mikroskopisch eine Alteration nicht nachzuweisen (Geinitz). Blausäure hebt die katalytische Wirkung der rothen Blutkörperchen auf Wasserstoffsuperoxyd auf. Hoppe-Seyler und Gaetgens constatirten sehr erhebliche Verminderung der Kohlensäureausscheidung im Beginne der Giftwirkung, wobei auch das in den Venen enthaltene Blut eine hellrothe Färbung besitzt und worauf bei günstig verlaufenden Vergiftungen nach kurzer Zeit ein Zustand ungewöhnlich gesteigerter Oxydation folgt. Die Eigenschaft sauerstofffreien Blutes, einem umgebenden sauerstoffhaltigen Medium Sauerstoff zu entziehen, geht durch Blausäurezusatz nicht verloren; mit Sauerstoff gesättigtes frisches Blut giebt unter Einwirkung von Blausäure keinen Antheil seines Sauerstoffs ab, ja die Entziehung des letzteren durch sauerstoffverdrängende Mittel wird sehr erschwert (Gaetgens). Die von Zalesky behauptete Abnahme der Temperatur, welche mit den Veränderungen des Bluts in Connex stehen könnte, kommt nach Fleischer nach kleinen Blausäuremengen nicht zu Stande, wo die Eigenwärme constant bleibt oder nach kurzer Abnahme zunimmt; nur bei lebensgefährlichen Dosen erfolgt Abnahme der Temperatur, bei eintretendem Tetanus wird sie vorübergehend erhöht und steigt noch erheblicher nach dem Tode.

Die entfernten Wirkungen der Blausäure äussern sich vorwiegend in Erscheinungen seitens des Nervensystems, wobei in hervorragender Weise das Athemcentrum und vasomotorische Centrum afficirt sind.

Bei Einwirkung kleiner Mengen blausäurehaltiger Präparate, wie man sie therapeutisch verwerthet, treten nur bei längerem Gebrauche entfernte Erscheinungen auf. Werden diese medicinalen Dosen nicht erheblich überschritten, so macht sich neben Nausea Oppression der Brust, Herzklopfen, Schwere im Kopfe, manchmal stechender Schmerz im Hinterkopf, Schwindel, Gedankenverwirrung und Verlust der Muskelkraft geltend. Diese Symptome entsprechen dem ersten oder asthmatischen Stadium der Blausäurevergiftung (Orfila), in welchem objectiv stets keuchendes Athmen mit offenem Munde, verlangsamter Herzschlag und Prominenz der Augäpfel wahrgenommen wird. Aus diesem Symptomencomplex kann Rückkehr zur Norm erfolgen; schreitet die Intoxication fort, so kommt es unter Zunahme der Dyspnoe zu plötzlichen Hinstürzen des Patienten. Bei erloschenem Bewusstsein und völligem Darniederliegen der cerebralen Thätigkeit in diesem Stadium, welches von Orfila als das zweite oder convulsivische Stadium bezeichnet wird, besteht Anästhesie der Haut, Mydriasis und Unempfindlichkeit der Iris neben vollkommener Erschlaffung der Muskulatur; die Haut ist kühl und mit kaltem Schweisse bedeckt, der Puls beschleunigt, fast nicht zu fühlen, bisweilen kommt es zu unwillkürlicher Entleerung von Urin und Fäces. In diesem Stadium zeigen sich auch Convulsionen, theils tonischer, theils klonischer Art; die letzteren betreffen besonders die Extremitäten, die ersteren die Masseteren und die Nackenmuskeln. Dieses Stadium wird oft durch einen von spasmodischer Affection des Kehlkopfes herrührenden eigenthümlichen Schrei beim Hinstürzen eingeleitet, welcher mit Unrecht als charakteristisch für Blausäure-

vergiftung gehalten wird. Auch aus diesem Stadium kann Wiederherstellung erfolgen, doch geht dasselbe meist in das dritte oder asphyktische (paralytische) Stadium über, das durch tiefstes Coma, starkes Ausfliessen von Speichel aus dem Munde und stetiges Seltener- und Schwächerwerden von Herzschlag und Respiration sich charakterisirt und in nicht langer Zeit zum Tode führt. Viel häufiger als die geschilderte protrahirte Vergiftung beim Menschen ist die sog. apoplektische Form, in welcher die Patienten nach einer grossen Dosis schon während des Schluckens oder doch in wenig Sekunden hinstürzen und die Erscheinungen des zweiten oder dritten Stadiums (Krämpfe, Paralyse) darbieten. Die erschwerte Respiration, bei welcher die einzelnen Athemzüge durch grosse Intervalle getrennt sind, ist im Allgemeinen das am meisten charakteristische Symptom für diese Vergiftungsform; doch kommt bei ausgeprägtem Coma auch stertoröses Athmen vor.

Für den Erwachsenen können 0,05 wasserfreie Blausäure als kleinste letale Dosis angesehen werden, doch giebt es Fälle, wo der Tod nach 0,042 bis 0,045 eintrat (Geoghegan, Hicks), während in anderen weit grössere Dosen ohne tödtlichen Erfolg waren, so 0,08 (Bishop), 0,09 (Christison) und selbst 1,4 (Burmman).

Die Blausäure ist bekanntlich für thierische Organismen das stärkste Gift, welches durch die Schnelligkeit der toxischen und letalen Wirkung sich vor allen anderen auszeichnet und selbst von Nicotin und Aconitin nicht erreicht wird.

Die deletere Action erstreckt sich auf alle Thierklassen, doch ist die Resistenz eine verschiedene. Kaltblüter werden viel weniger davon afficirt als Warmblüter, was sich leicht aus der geringen Abhängigkeit der Herzthätigkeit von dem Athmungsprocesse erklärt (Preyer). Vögel sterben leichter als Säugethiere; Insekten, Crustaceen, Mollusken und Würmer schwerer als Wirbelthiere (Coullon). Nach Wedemeyer wirkt Blausäure auf Thiere um so mehr tödtlich, je mehr dieselben ein entwickeltes Rückenmark und eine vollkommene Respiration und Muskelkraft besitzen, je sauerstoffreicher ihr Blut und höher ihre Temperatur ist und je mehr sie des Sauerstoffs zum Fortleben bedürfen. Auch auf Pflanzen und selbst auf diejenigen, aus welchen sie producirt wird, wirkt Blausäure vernichtend (Coullon, Goepfert). Die Minimaldosis wasserfreier Blausäure, welche bei kleinen Säugethiern den Tod herbeiführt (bei Meerschweinchen 1, bei Kaninchen 3 Secunden langes Einathmen des Dunstes wasserfreier Blausäure) ist so klein, dass eine quantitative Bestimmung nicht möglich ist; sicher beträgt sie weniger als  $\frac{1}{1000}$  Milligramm bei Meerschweinchen (Preyer). Die Blausäure ist bekanntlich das Gift, welches wegen der Plötzlichkeit seiner Wirkung und insbesondere wegen des raschen Eintrittes des Todes der Anschauung zur Stütze diente, dass die Giftwirkung ausschliesslich durch Nervenleitung vermittelt werde, was für die Blausäure schon 1826 Krimer experimentell widerlegte.

Bei Thieren ist das Bild der Vergiftung im Ganzen das nämliche wie beim Menschen, so weit es sich um Warmblüter handelt. Alle Thiere zeigen als erstes Symptom Störungen der Athmung und später partielle oder totale Lähmung. Die Athemzüge werden vermindert, mitunter erschwert; besonders stark sinkt die Athemzahl während des Tetanus, während sie im paralytischen Stadium entweder bis zum Tode weiter sinkt, oder wieder etwas zunimmt, ja in günstig verlaufenen Fällen über die Norm hinaussteigt. Convulsionen kommen bei Amphibien, Fischen und im Wasser lebenden Insekten nicht vor, fehlen aber auch bei manchen Säugethiern und sind bei den meisten Warmblütern nicht völlig constant. Auch der beim Menschen erwähnte Schrei kommt inconstant bei Warmblütern vor, ebenso findet sich das gleichfalls beim Menschen vorkommende Erbrechen bei manchen Thierspecies. Der Herzschlag wird anfangs verlangsamt, wobei der Blutdruck zunimmt (Traube), später nimmt die Pulsfrequenz wieder zu. Bei Fröschen wird die Athmung anfangs beschleunigt, dann kommt es zu Dyspnoe mit Prominenz der Bulbi; hiermit stellt sich gleichzeitig Schwächerwerden der willkürlichen Bewegungen ein, dann nehmen die Reflexe ab und schliesslich erlischt jede Muskelbewegung,



während der gleich anfangs verlangsamte und später irreguläre und schwache Herzschlag noch eine Stunde andauern kann (Kölliker, Preyer). Die einzelnen Stadien der Vergiftung, von denen bei Warmblütern das erste gewöhnlich  $\frac{1}{2}$ —1 Min., das zweite und dritte je  $\frac{1}{2}$ —2 Min. dauern, sind bei Kaltblütern bedeutend länger ( $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  Std.).

Die Behandlung der Blausäureintoxication wird in der Regel in der Erfüllung der *Indicatio vitalis* zu bestehen haben, welcher am besten die schon von Brodie und Pereira empfohlene künstliche Respiration entspricht. Die früher als Antidot zur Inhalation und zur äusseren Darreichung empfohlenen Chlorpräparate können nicht als wirkliche Gegengifte angesehen werden, da durch dieselben giftige Verbindungen sich bilden. Theoretisch besser begründet sind die S. 246 besprochenen Gegengifte von T. und H. Smith (Eisenoxydhydrat mit Magnesia) und von Duflos, wodurch unschädliches Eisencyanür oder Magnesiumeisencyanür entsteht. In den meisten Fällen aber wird man mit chemischen Antidotem zu spät kommen. Ist es möglich, so reicht man innerlich Analeptica und unterstützt deren Wirkung durch äussere Reizmittel. Thénard empfahl Aether, weil bei ätherisirten Thieren die Blausäurevergiftungserscheinungen später und minder intensiv eintreten. Besonders gepriesen werden kalte Begiessungen auf den Kopf und längs der Wirbelsäure aus einer Höhe von 1—2 Fuss applicirt, während der Patient im warmen Bade sich befindet. Preyer empfahl nach Thierversuchen als antagonistisch wirkend das Atropin, dessen günstige Effecte vermuthlich auf Erregung des Athem- und Gefässcentrums, nicht aber auf Depression des Vagus beruht. Nicht irrationell ist die Einspritzung von Ammoniak in die Venen, wenn auch die interne Darreichung als chemisches Antidot verfehlt ist, da sich dabei Cyanammonium als stark toxische Substanz bildet. Auch der Transfusion lässt sich theoretisch die Berechtigung zur Verwendung bei Blausäurevergiftung nicht absprechen.

Das Vorhandensein einer chronischen Blausäurevergiftung, welche Mac Cleod, Granville u. A. auf Grund von Selbstversuchen und von Beobachtungen in Fabriken, wo die Entwicklung reichlicher Blausäuredämpfe stattfindet, annehmen, wobei sie als Symptome theils örtliche Phänomene (selbst Stomatitis ulcerosa), theils entfernte Wirkungen (Ohrensausen, Kopfschmerz, Dysphagie, Nausea, Palpitationen, Dyspnoe und selbst Convulsionen) angeben, ist nicht sicher gestellt und wahrscheinlich handelt es sich dabei nur um leichte repetirende acute Intoxication. Das Vorkommen einer acuten Blausäurevergiftung durch rasch hinter einander gegebene Dosen von Blausäure kann um so weniger in Abrede gestellt werden, als bei Thieren das Summiren von zwei nicht letalen Dosen, welche kurz nach einander gegeben werden, durch Nunneley erwiesen ist.

Die Wirkungen der Blausäure auf Athmung und Kreislauf sind von den Centren des verlängerten Marks und den Gefässcentren des Rückenmarks abhängig. Daneben wird auch das Vaguscentrum in Mitleidenschaft gezogen (Böhm und Knie, Lazarski).

Nach Lazarski (1881) erhöhen geringe Dosen Blausäure vorübergehend die Leistungen der Medulla oblongata und steigern Athemzahl und Blutdruck, auch erfolgt durch Reizung des Vaguscentrums bei intacten Vagus Verlangsamung des Pulsschlages. Grosse Dosen Blausäure machen die Centren des verlängerten Marks und die Gefässcentren gegen eine Steigerung der natürlichen inneren Reize (Erstickungsreiz) und gegen intensive Reize anderer Art (Inductionsströme, Strychnin, Antiarin) unempfindlich. Die Verlangsamung der Herzschlagzahl bei grösseren Dosen ist vom Vagus unabhängig, ebenso von den Acceleratoren, und kann auch nicht durch das Sinken des Blutdrucks seine Erklärung finden, da durch Aortenligatur die Pulszahl nicht erheblich steigt. Lazarski leitet sie daher von einer Wirkung auf das Herz ab, durch welche im letzten Stadium der Intoxication das Sinken des Blutdrucks noch verstärkt wird. Dass Blausäure, wie Traube meinte, ein eigentliches Herzgift sei, widerlegt ein Blick auf die Phänomene beim Frosch. Sicher wird der rapide Tod bei sehr grossen Dosen durch rasche Lähmung des

respiratorischen Centrums bedingt. Die von Preyer stark betonte Reizung der peripheren Vagusendigungen in den Lungen ist durch Böhm und Knie widerlegt; Vagusdurchschneidung hebt durchaus nicht den tödtlichen Einfluss der Blausäure auf. Auch centripetale Vagusreizung ist zur Zeit der Respirationsstillstände ohne Wirkung. Die durch Blausäure bedingten Convulsionen unterscheiden sich an sich nicht wesentlich von den Erstickungskrämpfen (Preyer), treten aber viel rascher ein, als dies selbst bei völliger Entziehung des Sauerstoffs der Fall ist; auch kommt bei Erstickung Lähmung des vasomotorischen Centrums ohne vorhergehende Reizung nicht vor. Dass die Blausäure direct reizend auf Krampfcentren im Hirn und Rückenmark wirkt, ist um so wahrscheinlicher, als die der Blausäure nahe verwandten Nitrile oder Cyanaether (Acetonitril, Propionitril) sämtlich epileptiforme Krampfanfälle neben Respirationslähmung hervorbringen (Maximowitsch).

Was die übrigen Partien des Nervensystems anlangt, so wird nach den Erscheinungen am Menschen zunächst das Gehirn betroffen, darauf erst das Rückenmark. Nach Krimer wirkt Blausäure nicht giftig, wenn sie direct auf Gehirn und Rückenmark gebracht wird; Jones fand dagegen bei jungen Alligatoren die schnellste Wirkung bei Application auf das verlängerte Mark. Die motorischen Nerven gehen bei Vergiftungen am Frosche erst sehr spät ihres Leitungsvermögens verlustig (v. Kiedrowski), dagegen schnell bei Befuchung mit Blausäure (Coullon, Preyer). Nach v. Kiedrowski werden die Stämme der motorischen Nerven nach Blausäurevergiftung um so früher gelähmt, je entfernter sie von den Centren und vom Herzen liegen (?). Nach Stannius werden die Nerven durch directe Berührung mit Blausäure (3,5—6,5%) viel langsamer leitungsunfähig als die Muskeln, welche letzteren nicht todtstarr werden (Köl liker), übrigens in Hinsicht auf die Stärke und Richtung des Muskelstroms sich wie normal verhalten (Dubois-Reymond). Wie die übrigen quergestreiften Muskeln wird auch das Herz bei directer Application von Blausäure betroffen und seiner Reizbarkeit je nach der Concentration nach wenigen Sekunden oder nach wenigen Minuten beraubt (Krimer, Preyer). Nach O. Funke verlieren die sensiblen Nerven nach Blausäurevergiftung ihre elektromotorische Wirksamkeit. Nach Valentin ist der Nervenstrom nicht verändert. Eine antiseptische Wirkung der Blausäure, auf welche schon C. F. Emmert 1803 hinwies, lässt sich nicht in Abrede stellen, doch ist dieselbe nicht sehr bedeutend und der Verwesungsprocess nach Blausäurevergiftung sogar meist beschleunigt. Krämer fand, dass Blausäure die Bewegung der Spermatozoiden aufhebe. Bei Leuchtkäfern wird die Phosphoreszenz dadurch sehr rasch aufgehoben.

Viel geringere Bedeutung als für die Toxikologie besitzt die Blausäure für die Therapie, indem der Kreis der Krankheiten, in denen man sie in den ersten Decennien dieses Jahrhunderts anwandte, sich auf wenige beschränkt hat, worunter schmerzhaft Affectionen verschiedener Art und Hustenreiz (Krampfhusten, Keuchhusten) die hauptsächlichsten sind.

In der geringen Concentration, wie die jetzt gebräuchlichen Präparate der Blausäure dieselbe enthalten, kann bei Innehaltung der richtigen Dosirung von keiner besonderen Gefahr die Rede sein. Wenn sich hieraus keine Contra-indication der Blausäure ergibt, so ist doch auch kein besonderer Grund für ihre therapeutische Verwendung gegeben, und namentlich bleibt es immerhin bei dem Vorhandensein vortrefflicher anderer Mittel unangemessen, die Blausäure als Wurmmittel oder Antitypicum zu verwenden. Der Gebrauch als Contrastimulans bei Pneumonien und ähnlichen Affectionen, wogegen Rasori und seine Schule Blausäure verwendeten, ist nach den physiologischen Versuchen, wonach nur stark toxische Dosen die Temperatur herabsetzen, nicht gerechtfertigt. Der Glaube an die Heilkraft der Blausäure als Antiphthisicum (Magendie u. A.) ist geschwunden, obschon gerade bei Phthisis das Mittel durch Verringerung des Hustenreizes von Nutzen sein kann. Nicht selten bewährt sich Blausäure bei Reizung des respiratorischen Centrums und asthmatischen Anfällen (in nicht zu kleinen Dosen), wofür ja auch die physiologische

Wirkung spricht. Strambio und Restelli empfahlen Blausäurepräparate bei Tetanus toxicus, doch scheinen sie nicht mehr als andere Cerebralia zu nützen. Krimer, West u. A. fanden Blausäurepräparate in einzelnen Epidemien von Keuchhusten nützlich, während das Mittel in anderen erfolglos blieb. Hake will es bei beginnender Herzhypertrophie mit Erfolg angewendet haben; gerade bei Herzfehlern aber darf Blausäure nur mit der grössten Vorsicht gegeben werden, weil wiederholt kleine Dosen bei Herzkranken Vergiftungserscheinungen hervorgerufen haben (Taylor). In einem Falle von Angina pectoris habe ich Blausäure mit palliativem Nutzen gegeben, doch schwächte sich der Effect sehr ab. Den meisten Vortheil gewährt das Mittel bei Gastralgie, und zwar vorzugsweise bei nervöser. Die Aufzählung aller einzelnen Krankheitsformen, bei welchen Blausäure innerlich versucht ist, hat keinen Sinn, da man sie gegenwärtig in der Praxis mehr und mehr vernachlässigt. Aeusserlich wurde sie bei Hautjucken und Neuralgien in Gebrauch gezogen, da sie aber nur in verhältnissmässig starker Concentration herabsetzend auf die Sensibilität wirkt, sind auch hier andere Mittel vorzuziehen. Auch in der Augenheilkunde, wo man sie gegen Lichtscheu und Blepharospasmus benutzte, ist sie durch Atropin und analoge Medicamente verdrängt.

Man giebt die Aqua Amygdalarum amararum zu 0,5—2,0 mehrmals täglich. Die Pharmakopoe gestattet 2,0 pro dosi und 8,0 pro die. Man verordnet sie meist für sich in Tropfenform, (zu 10—30 Tr. pro dosi) oder mit Wasser und Syrup verdünnt; auch kann sie Mixturen hinzugesetzt werden. Die bittern Mandeln werden zu 6—12 Stück bei Wechselfiebern, Neuralgien gegeben.

Aeusserlich kommt Bittermandelwasser vorzugsweise zu Waschungen in Verdünnung mit Wasser in Gebrauch, seltener dient es zu Augengewässern oder zu Inhalationen in Dampfform (auf heissen Sand gegossen oder aus einem Schälchen verdunstet), oder zu Injectionen, endlich zu Salben.

Ältere Aerzte bevorzugten das Kirschlorbeerwasser wegen eines angenehmeren Geschmacks. Die Ersetzung desselben durch Aqua Amygdalarum amararum ist jedoch völlig gerechtfertigt, da das Kirschlorbeerwasser nur einmal im Jahre bereitet werden kann und bei seiner leichten Zersetzlichkeit im Laufe des Jahres der Blausäuregehalt sich sehr vermindert, während das Bittermandelwasser immer frisch bereitet werden kann. Für längere Aufbewahrung ist stets ein Zusatz von Spiritus, wodurch die Zersetzlichkeit gemindert wird, zu machen. Auch empfiehlt sich die Ordination in vitro nigro, da das Tageslicht zersetzend wirkt. Zu vermeiden sind Alkalien, Chlorwasser, Salpetersäure und andere oxydirende Substanzen, endlich Metallsalze.

Die bittern Mandeln wurden früher auch als solche medicinisch benutzt und bei Wechselfieber, Neuralgien u. s. w. zu 6—12 Stück gegeben. Dieselben sind Volksmittel gegen Sodbrennen. Medicinisch benutzte man sie entweder im zerkleinerten Zustande oder geschält und entfettet als sog. Phyllis amara s. Farrina Amygdalarum amararum, Bittermandelkleie, welche von Kranichfeld als mildes Blausäurepräparat zu 0,03—0,2 empfohlen wurde. Die Bittermandelkleie kann auch als Ingrediens für kosmetische Waschpulver (mit Benzoe, Borax und Veilchenwurzel) benutzt werden.

#### Verordnungen:

- |    |   |    |  |
|----|---|----|--|
| 1) | ℞<br>Natrii bicarbonici 1,0<br>Aquae Amygdal. amar. 3,0<br>Emulsionis Amygdal. 50,0<br>M. D. S. Stündlich einen Theelöffel.<br>(Bei Keuchhusten von Kindern<br>unter 1 Jahr. West.) | 2) | ℞<br>Aq. Amygdal. amarar.<br>Liquoris Plumbi Goulardi aa 50,0<br>Aq. Rosae 100,0<br>M. D. S. Zur Waschung. (Bei Haut-<br>jucken und Schmerzen. Hufelands<br>Liquor antereethicus.) |
|----|---|----|--|

#### Folia Nicotianae, Folia Tabaci; Tabaksblätter.

Die Droge stellt die getrockneten Blätter der verschiedenen



Culturformen von *Nicotiana Tabacum* L., einer in Amerika einheimischen und zur Erzeugung von Rauch- und Schnupftabak neben andern Species der Gattung *Nicotiana* in den verschiedensten Ländern cultivirten Solanee, dar.

Die Blätter von *Nicotiana Tabacum* sind spitzlancettlich, in den Blattstiel herablaufend, ganzrandig und wie die ganze Pflanze mit langen, weichen Haaren und kleinen sitzenden Drüsen, welche bei der frischen Pflanze eine klebrige Flüssigkeit ausschwitzen, besetzt, von beträchtlicher Grösse, getrocknet von brauner Farbe. Sie stellen den sog. Virginischen Tabak, *Folia Nicotianae Virginianae*, dar, welcher von den Blättern anderer cultivirter Species von *Nicotiana* durch den Verlauf der Seitennerven sich unterscheidet, welche bei der officinellen Droge erst eine Weile parallel und ganz nahe dem Mittelnerven verlaufen und dann von diesem im spitzen Winkel auseinanderweichen, während bei dem am nächsten verwandten Marylandtabak von *Nicotiana macrophylla* Metz die Seitennerven in fast rechtem Winkel vom Mittelnerven verlaufen. Ebenso verhalten sich die Blätter der den Türkischen Tabak liefernden *N. rustica* L. (mit grüngelben Blumen und gestielten, eiförmigen Blättern) und anderen cultivirten Sorten, von denen *N. repanda* Willd. in Havanna angebaut wird. Alle diese Tabaksblätter besitzen einen scharfen Geschmack und einen eigenthümlichen Geruch. — Die Verwendung des Tabaks als Rauchmittel scheint in Amerika uralter Brauch bei den Indianern gewesen zu sein, bei denen die Bezeichnung *Tabaco* ursprünglich das zum Rauchen benutzte Instrument bedeutet. Nach Europa scheint die Tabakspflanze, welche zuerst von Oviedo beschrieben wurde, um 1555 oder 1559 gelangt zu sein. Die Bezeichnung *Nicotiana* verewigt den Namen von Jean Nicot, welcher als französischer Gesandter in Lissabon 1560 Samen nach Paris schickte.

Das wirksame Princip der Tabaksblätter ist das flüchtige Alkaloid Nicotin, neben welchem sich noch als eigenthümlicher Stoff das Nicotianin oder der Tabakscampher findet.

Das 1828 von Posselt und Reimann entdeckte Nicotin ist ein sauerstoffreies Alkaloid von der Formel  $C^{10}H^{14}N^2$  und bildet ein farbloses, öliges, stark alkalisch reagirendes Liquidum von starkem, besonders beim Erwärmen sehr hervortretendem Geruche und brennendem Geschmacke. Es wird noch bei  $-10^{\circ}$  nicht fest, bildet schon unter  $100^{\circ}$  deutliche Nebel und siedet bei  $250^{\circ}$ . An der Luft und am Lichte bräunt es sich rasch. Es löst sich leicht in Wasser, Weingeist und Aether und bildet mit verschiedenen Säuren schwierig krystallisirende Salze, welche sich in Wasser und Alkohol, meist aber nicht in Aether lösen. Die Menge des in Tabaksblättern enthaltenen Nicotins wechselt ausserordentlich. Schlössing fand im Virginiatabak 6,87%, im Marylandtabak 2,29%, in verschiedenen französischen Tabaken 6,29 bis 7,96%. — Das von Hermbstädt aufgefundene Nicotianin bildet weisse, wenig in Wasser, leicht in Weingeist und Aether lösliche Krystallblättchen von bitterlich gewürzhaftem Geschmack und feinem, tabakartigem Geruche, welche auf der Zunge und im Schlunde einen eigenthümlichen Reiz, bei Application auf die Nasenschleimhaut Niesen und zu 0,03 intern Kopfweh, Uebelkeit und Aufstossen bedingen (Hermbstädt).

Die Tabaksblätter werden viel weniger medicinisch als in der Form von Rauchtobak und Cigarren, Schnupftobak und Kautobak als narkotisches Genussmittel verwendet. Zu diesem Zwecke unterliegen sie einer besonderen Präparation und z. Th. einem Gährungsprocesse, durch welche ihr Nicotingehalt ein geringerer wird. In trockenem Schnupftobak fand Schlössing 2% Nicotin. Die Frage über den Nicotingehalt des Tabakrauches ist von verschiedenen Chemikern (Melsens, Guérard, Malapert, Le Bon) positiv, von andern (Vohl) negativ beantwortet. Der von Heubel angeblich geführte Nachweis ist nicht beweisend, da im Tabakrauch sich höhere Glieder aus der Reihe der Pyridinbasen, insbesondere Collidin (vgl. S. 1116), finden, welche ähnliche Wirkung zeigen. Auch Blausäure existirt im Tabaksdampf, nach Le

Bon in bedeutenderer Menge im Rauche von türkischem Tabak als von gewöhnlichem; ebenso findet sich Kohlenoxyd.

Die Wirkung der Tabaksblätter ist im Wesentlichen identisch mit der des Nicotins und zeigt nur insofern eine Differenz, als das Nicotin vermöge seiner äusserst rapiden deleteren Action auf den thierischen Organismus örtliche Irritationsphänomene in viel geringerem Grade zur Erscheinung bringt.

Das Nicotin gehört zu den stärksten Giften, welches nach den Versuchen von Schroff 16mal stärker als Coniin ist. Die Giftigkeit zeigt sich bei sämtlichen Thierclassen, doch besitzen einzelne grössere Resistenz. Verhältnissmässig am längsten widerstehen Darminfusorien dem Gifte (Berutti und Vella). Fliegen und Tausendfüsse sind resistenter als Schmetterlinge und Spinnen, Fische ertragen mehr als Frösche, Hunde und Kaninchen mehr als Katzen, doch sterben Hunde nach  $\frac{1}{2}$ —2 Tr., Kaninchen schon nach  $\frac{1}{4}$  Tr. Kleine Vögel gehen schon durch die blossе Annäherung eines in Nicotin getauchten Glasstabes an ihren Schnabel zu Grunde. Ziegen können grosse Quantitäten Tabaksblätter ohne Schaden verzehren.

Beim Menschen können sehr geringe Mengen Nicotin (0,003—0,004) erhebliche Intoxication bedingen (Dworzak und Heinrich). Die Schwierigkeiten für die Feststellung der Minimaldosis vermehren sich dadurch, dass Nicotin sich leicht zersetzt, so dass es bei jeder Oeffnung des Gefässes schwächer wirkt (Schroff).

Auch dem Nicotin fehlen bei Application in Substanz nicht die örtlichen Erscheinungen. So treten bei mit Nicotin vergifteten Säugethieren gar nicht selten anfangs Zeichen schmerzhafter Empfindungen auf und bei den von Dworzak und Heinrich angestellten Selbstversuchen mit 0,001—0,004 Nicotin bewirkten selbst die kleinsten Gaben Brennen im Munde, Kratzen im Schlunde und das Gefühl, als werde mit einer scharfen Bürste durch die Speiseröhre gezogen. Aehnliche Beobachtungen machte Wertheim bei Kranken und Stas bei sich selbst sowohl nach Beschmecken von Nicotin als nach dem Einathmen von Nicotindämpfen. Bei Thieren und Menschen fehlen Erbrechen und Durchfall bei Vergiftung mit Nicotin häufig ganz, weil der Tod zu rapide erfolgt, aber auch bei Tabaksvergiftung kommt es keineswegs immer zu einer wirklichen Entzündung des Darms, welche sich meist nur nach Intoxication mit präparirten Tabaksblättern in Pulverform oder mit dem in den Pfeifen sich ansammelnden Tabakssafte findet. Uebrigens sind Erbrechen und Durchfälle nach Tabak und Nicotin weniger Folge von Irritation der Schleimhaut als diejenige einer Wirkung auf das Nervensystem (Peristaltik). Eine örtliche (reflectorische) Action des Nicotins ist die bei Application auf die Conjunctiva hervortretende Myosis.

Das Nicotin wird von allen Applicationsstellen aus resorbiert, selbst von der unverletzten Haut aus.

Bei der Flüchtigkeit des Nicotins ist das Auftreten von Vergiftungserscheinungen nach der Application von Tabaksblättern auf die unverletzte Haut (Namas, Polko) oder durch in gleicher Weise angewendete, mit Tabaksinfus getränkte Binden (Martin) nichts Auffallendes. Sehr zahlreich ist die Casuistik der Vergiftungen durch Application von Tabak in Substanz oder Tabaksaufgüssen auf wunde Hautstellen, Haut- und Kopfausschläge, ebenso reichhaltig die der Vergiftung durch Klystiere von Tabaksinfusen, deren unvorsichtige Anwendung wiederholt zum Tode führte. Dessault will auch von den Tabaksrauchklystieren letale Folgen gesehen haben und ist in England die Anwendung derselben zur Wiederbelebung von Scheintodten geradezu verboten. Wie früher Hertwig, hat neuerdings Savory das Rectum für eine gefährlichere Applicationsstelle erklärt als den Magen. Auch von der Vagina (Vandenbroeck) und von der Conjunctiva (Janssen) kann man Thiere mit Nicotin tödtlich vergiften. Vom Unterhautbindegewebe und von der Cutis aus wirkt das Alkaloid in Substanz verhältnissmässig schwach; am stärksten bei

directer Einführung in das Blut (L. van Praag, René). — Das Nicotin ist in dem bekannten Bocarméschen Processe von Stas in verschiedenen Leichentheilen, namentlich in Lunge und Leber, von Orfila in Thierversuchen auch in der Milz und spurweise in den Nieren, von Taylor im Blute nachgewiesen. Ob der von Stoltz wahrgenommene exquisite Tabaksgeruch im Fruchtwasser einer Tabaksspinnerin durch Nicotin bedingt war, steht dahin. In Selbstversuchen von Dworzak und Heinrich zeigte die expirirte Luft deutlichen Tabaksgeruch (Schroff). Dasselbe ist wiederholt bei Individuen, welche Aufgüsse von Tabak im Clyma erhielten, beobachtet.

Die entfernte Wirkung des Nicotins äussert sich an fast allen Theilen des Nervensystems und zeigt sich bei grösseren Dosen namentlich in Functionsänderungen des Gehirns, Rückenmarks, der Respiration, Herzaction und Peristaltik. In geeigneten Dosen ist Nicotin ein äusserst gefährliches Gift, das bezüglich der Rapidität seiner Wirkung der Cyanwasserstoffsäure sich nähert.

Die bei Selbstversuchen von Dworzak und Heinrich (mit 0,001—0,004 Nicotin) notirten Erscheinungen waren ausser den oben angegebenen örtlichen Irritationsphänomenen ein vom Magen aus über Brust und Kopf in Finger und Zehenspitzen sich verbreitendes Wärmegefühl, grosse Aufregung, bei kleineren Dosen in der Regel Kopfschmerz, Eingenommenheit des Kopfes, Schwindel, Betäubung, Schläfrigkeit, Undeutlichsehen und Hören bei grosser Empfindlichkeit gegen Licht, Aura im Oberkiefer, häufige und beschwerliche Respiration, Pulsbeschleunigung, Beklommenheit und Trockenheit im Schlunde. Die grössten Gaben bedingten in etwa 40 Min. ungewöhnliche Schwäche, Gesichtsbässe, wechselnde Pulsfrequenz, Kälte der Gliedmaassen, auf den Rumpf sich verbreitend, Ructus, Nausea und Erbrechen, Auftreiben des Bauches mit heftigem Stuhldrang und Abgang von Winden. Schüttelkrämpfe des Rumpfes und Zittern der Extremitäten, 1 Std. anhaltend und später sich nochmals wiederholend, traten neben stossweise beschwerlichem Athmen bei dem einen, Ameisenkriechen in den Fingerspitzen und Schüttelfrost bei dem andern ein. Die Haut war trocken, die Harnausscheidung bei dem einen bedeutend vermehrt. Kopfweh, Schwindel, Zittern und Brustbeklemmung, Mattigkeit, Somnolenz und Nausea haben auch Falck und Wachenfeld bei Selbstversuchen beobachtet. Wertheim giebt nach Beobachtung von Kranken an, dass Pulse von 100 Schlägen und darüber schon durch minimale Mengen, solche von 80 Schlägen durch etwas grössere Mengen herabgesetzt werden, während Erhöhung der Dose Steigerung der Pulsfrequenz bewirkte. Tödtliche Dosen sind im Stande, in wenigen Minuten dem Leben ein Ende zu machen. In dem einzigen bisher genauer beobachteten Falle waren ein eigenthümlicher wilder Blick, anscheinend völlige Bewusstlosigkeit und ein tiefer Seufzer beim Sterben die einzigen beobachteten Symptome.

Mit Nicotin vergiftete Säugethiere verrathen, wenn die Dosis nicht eine äusserst starke war, zuerst entschiedene Aufregung und Angst, hierauf folgt Zittern, Harn- und Stuhlentleerung, ein eigenthümlicher Stupor, Schwanken und plötzliches Hinfallen auf die Seite; bei sehr grossen Dosen fehlt die Excitation oft ganz und das Thier stürzt sofort mit einem einzigen Schrei zu Boden. Mit dem Hinfallen treten klonische Krämpfe auf, manchmal mit tonischen abwechselnd, bisweilen ausgebildeter Tetanus, manchmal Schwimmbewegungen und Nystagmus. In diesen Krämpfen ist die Pupille stark verengt, Zahnfleisch und Zunge häufig livid und die Ohrgefässe erweitert. Der Tod erfolgt nach erheblichen Dosen gewöhnlich im Krampf nach 1—5 Min.; in einzelnen Fällen folgt auf die Krämpfe ein Stadium der Erschlaffung, in welchem die Reflexerregbarkeit rasch abnimmt. Das Athmen ist im Laufe der Vergiftung anfangs beschleunigt und keuchend, mühsam, mit einem eigenthümlichen Expirationsgeräusch, später seltener und tiefer, der Puls bei nicht zu grossen Gaben zuerst verlangsamt, dann beschleunigt und später wieder retardirt, bei grossen Gaben in der Regel von vornherein irregulär und accelerirt. Die Temperatur an der Körperoberfläche sinkt bei Nicotinvergiftung. — Kleine Vögel sterben in wenigen Secunden ohne besondere Erscheinungen. Bei



Fröschen wird die Respiration rasch sistirt, während der Herzschlag nach Lähmung aller übrigen Organe noch fort dauert. Das Hauptvergiftungssymptom ist starker tetanischer Krampf mit eigenthümlicher Stellung der Gliedmaassen, wobei die Vorderbeine nach hinten, die Hinterbeine gegen den Rücken zu gezogen sind und der Kopf nach unten gerichtet ist (Falek und Wachenfeld, Kroecker). In diesem Krampf ist die Locomotion aufgehoben; auf denselben folgt ein Stadium der Muskeler schlaffung, während dessen, wie auch schon vorher, flimmernde Muskelzuckungen beobachtet werden. In einzelnen Fällen dauern letztere auch noch nach dem Tode fort.

Bei der Behandlung der Nicotinvergiftung ist die Anwendung der Magenspumpe das einzige rationelle Verfahren; Tannin oder Iodiodkalium, welche als Antidote therapeutisch brauchbar erscheinen, können bei dem rapiden Verlaufe der Intoxication in praxi nur selten von Nutzen sein. Im Uebrigen ist symptomatisch ähnlich wie bei der Blausäurevergiftung zu verfahren (Excitantien, künstliche Respiration).

Bei fortgesetztem Gebrauche tritt auch beim Nicotin eine gewisse Abstumpfung der Wirkung ein, jedoch nicht in dem Grade wie gegen Opium. Chronische Vergiftungserscheinungen sind nach medicinaler Anwendung nicotinhaltiger Substanzen bisher nicht beobachtet. Die nach dem übermässigen Genuisse schwerer Tabake oder Cigarren resultirenden mannigfachen Störungen der Digestion und des Nervensystems, welche man unter dem Namen des Nicotismus chronicus zusammengefasst hat, können daher hier übergangen werden, um so mehr als sie auf die physiologische Wirkung des Nicotins kein Licht zu werfen im Stande sind.

Dass das Gift zunächst das Grosshirn afficirt, und zwar anfangs reizend, später lähmend, ergibt sich aus den oben mitgetheilten Vergiftungserscheinungen in deutlicher Weise. Eine gleiche Doppellaction äussert es auch auf das Rückenmark (Tetanus, Lähmung der Reflexfunction). Die Reflexfunction cessirt später als die Willkürbewegung. Kroecker nimmt auch eine erregende Wirkung auf die intramusculären Nervenendigungen, welcher später Lähmung folgt, an und bezieht auf erstere die bei den Vergiftungssymptomen erwähnten fibrillären Muskelzuckungen. Nach von Anrep sind dieselben z. Th. centralen Ursprungs, da sie erst bei Rückenmarksdurchschneidung unter der Abgangsstelle der Nerven zu den Hinterbeinen cessiren. Der Tetanus tritt bei Fröschen auch nach Decapitation ein und wird durch künstliche Respiration nicht aufgehoben (Uspensky). Bei Warmblütern sind die Nicotinkrämpfe vorzugsweise vom verlängerten Mark abhängig, entstehen aber auch bei Rückenmarksabtrennung, jedoch schwächer. Sowohl bei Warmblütern als bei Fröschen bleiben die Krämpfe nach vorheriger Vergiftung mit arseniger Säure, Brenzcatechin, Hydrochinon, Physostigmin, Coffein und Cocain aus (von Anrep). In der Nicotinparalyse steigern Pikrotoxin und Strychnin zwar die Reflexaction, rufen aber keinen Tetanus hervor. Directe Reizung des Rückenmarks verhält sich bei nicotinisirten Thieren nicht different (von Anrep). Eine Betheiligung der Sinnesnerven, wie solche namentlich durch die sog. Tabaksamaurose nach übermässigem Consum von Tabak als Genussmittel wahrscheinlich wird, deuten auch die von Dworzak und Heinrich an sich beobachteten Sehstörungen an, wenn solche nicht von der Pupillenveränderung abhängig sind. Die letztere ist nicht bei allen Thieren gleich, und ist um so weniger leicht zu entscheiden, ob dabei Lähmung des Sympathicus (Rosenthal, Hirschmann u. A.) oder Reizung des Oculomotorius (Grünhagen, Kroecker) im Spiele ist. Bei der durch örtliche Application bewirkten Myosis ist Reflex durch Reizung der Trigemini sendungen sehr wahrscheinlich. Nach Corso wirkt Nicotin auf sämtliche Nerven der Iris und zunächst durch Einfluss auf den Sympathicus mydriatisch, später vom Oculomotorius aus verengend. Die peripheren sensiblen Nerven werden früher als die motorischen gelähmt. Ein lähmender Einfluss auf die quergestreiften Muskeln wird von den meisten Experimentatoren (Kölliker, Kroecker) in Abrede gestellt.

Die Wirkung auf die peristaltische Bewegung ist nach Basch und Öser eine dreifache, indem zunächst schwache und kurzdauernde peristaltische Bewegungen an einzelnen Darmschlingen, hierauf ausgesprochener Darmtetanus mit darauf folgendem Ruhestadium, dann allmählig hochgradige

Steigerung der Peristaltik sämmtlicher Darmschlingen, welche allmählig wieder zur Ruhe zurückkehrten, sich einstellen. Die ersten sind durch Erregung von Nervencentren bedingt (Basch und Oser), während der Tetanus und die allgemeine Steigerung auf Reizung der Darmganglien beruhen (Nasse, Basch und Oser). Am meisten ist der Dünndarm afficirt, in zweiter Linie Dickdarm und Magen; auch Blase und Uterus participiren an der Contraction (Nasse), dagegen nicht die Milz (Truhart). Der Splanchnicus wirkt nicht hemmend auf den Darm-tetanus.

Die Einwirkung auf die Respiration ist zuerst eine erregende, dann eine lähmende; vom Vagus ist dieselbe unabhängig (Rosenthal). Atropin erhöht die durch Nicotin hervorgerufene Steigerung der Athemfrequenz (Truhart). Das eigenthümlich zischende Geräusch, welches Nicotin hervorbringt, ist wohl Folge vermehrter Absonderung in den Bronchien und kann durch Atropin beseitigt werden (Truhart).

Nach Traube, Rosenthal und Kroecker wirken kleine Dosen anfänglich erregend auf das regulatorische und im geringeren Grade auch auf das musculomotorische Herznervensystem (Herabsetzung und Stillstand des Herzens bei Warm- und Kaltblüthern auch nach zuvoriger Vagusdurchschneidung, dagegen nicht bei vorheriger Vaguslähmung durch Atropin), während grössere rasch sowohl das regulatorische (Steigerung der Pulsfrequenz) als das excitomotorische (Schwächerwerden der Contractionen) bei künstlicher Respiration lähmen, ohne dass indess hier der Tod durch Herzparalyse erfolgt. Der Umstand, dass Muscarin bei Fröschen nicht nach Atropin, wohl aber nach Nicotin nach dem Eingetretensein vollständiger Reizlosigkeit des Vagus dauernden Herzstillstand bedingt, scheint zu beweisen, dass Nicotin auf andere Theile des Vagus lähmend wirkt als Atropin und zwar solche, welche dem Stamme des Vagus näher liegen als die durch Atropin afficirten (Schmiedeberg und Truhart). Auf den Blutdruck wirkt Nicotin anfangs bei starker Contraction der Gefässe stark erhöhend, später herabsetzend in Folge einer anfangs reizenden, später herabsetzenden Action auf das vasomotorische Centrum (Surminsky, Basch und Oser). Auf Lähmung der vasomotorischen Nerven und dadurch bedingten grösseren Wärmeverlust an der Körperoberfläche bezieht Tscheschischin die von ihm beobachtete Abnahme der Körpertemperatur an der Körperoberfläche.

Auf die Speichelsecretion wirkt Nicotin zuerst vermehrend (Corso), später herabsetzend, auch die Membrana Schneideri wird zu stärkerer Secretion erregt. Die Wirkung des Nicotins schwächt sich, wie dies die bekannte Gewöhnung an das Rauchen hinlänglich beweist, allmählig ab. Auch bei Thieren lässt sich durch allmähliche Steigerung eine Gewöhnung erzielen, bei Kaninchen in 14 Tagen bis zu 0,12 Nicotin; dagegen wird bei wiederholter Einführung grosser, nahezu letaler Dosen die Gefährlichkeit gesteigert (von Anrep). Bei mehrmaliger Einführung toxischer Gaben fallen sowohl bei Warmblüthern als bei Fröschen die charakteristischen Krämpfe, bei letzteren auch die primäre Erregung und secundäre Lähmung des Vagus fort (von Anrep). Ueber die dem habituellen Gebrauche von Tabak zugeschriebenen chronischen Vergiftungserscheinungen (Palpitationen, Amaurose u. s. w.) sind weitere Untersuchungen nöthig; die von Jolly u. A. gehegten Befürchtungen sind jedenfalls übertrieben.

Im Ganzen werden die Tabaksblätter als Medicament wenig benutzt und nur bei Ileus und eingeklemmten Brüchen hat sich der Gebrauch von Tabaksaufgüssen in Klystierform erhalten.

Dass Tabak bei habitueller Obstipation von Nutzen sein kann, unterliegt bei der oben hervorgehobenen anregenden Wirkung auf die Peristaltik keinem Zweifel. Sehr viele ältere Leute kommen erst dann zur Defäcation, wenn sie eine Pfeife geraucht haben. Die Anwendung des Tabaks bei Ileus und auch bei *Hernia incarcerata* ging von der Anschauung aus, dass das Mittel ein Antispasmodicum sei und durch Aufhebung eines krampfhaften Zustandes wirke (Sydenham). Nun beruht aber der Ileus fast nie auf „Krampf“ und Nicotin bedingt nicht Lähmung, sondern Steigerung der Peristaltik. Aber gerade letztere kann in der That günstig wirken, wo Verengung des Darmes durch angesammelte Fäcalsmassen oder fremde Körper bedingt wird, welche

entweder ihrerseits Paralyse der Darmhäute veranlasst oder aus Atonie der letzteren hervorgeht (Rokitansky). Diese Formen des Ileus sind wohl die den Tabak indicirenden, während Achsendrehungen und Knickungen durch Nicotin gewiss nicht beseitigt werden. Auch bei Bleikolik ist Tabak als Evacuans benutzt.

Alle übrigen Anwendungen des Tabaks sind von untergeordneter Bedeutung. Die reizende Wirkung auf die Peristaltik ist auch hier und da zur Herbeiführung von Emese benutzt, namentlich bei Vergiftungen in Nothfällen, wo andere Emetica nicht zur Hand waren und wo man gewöhnlich den Schnupftabak anwendet. Uebrigens galt Tabak als directes Antidot bei manchen Vergiftungen, z. B. mit Pilzen, Arsenik (Emerson), und namentlich auch bei Strychnin (Haughton, O'Reilly). Auch bei Tetanus traumaticus haben Tabakklystiere (und Nicotin) wiederholt mit günstigem Erfolge Anwendung gefunden (Duncan, Andersson u. A.). Nach Curlings Statistik starben von 19 mit Tabak behandelten Tetanuskranken 10. Eine günstige Wirkung lässt sich hier nur dann denken, wenn verhältnissmässig grosse, die Reflexaction lähmende Dosen in Anwendung kommen. Von anderen krampfhaften Affectionen sind besonders Keuchhusten und Asthma Gegenstand der Tabaktherapie gewesen, und nach den physiologischen Wirkungen des Nicotins erscheint die Anwendung keineswegs irrationell, obschon bei Tussis convulsiva ungefährlichere Narcotica dasselbe leisten. Das Rauchen von Tabak ist bei krampfhaften Affectionen des Kehlkopfes (Spasmus glottidis, chronischem Singultus) wiederholt von günstigem Erfolge gewesen. Bei Asthma musste in einer Zeit, wo Lobelia nicht im Handel war, der Tabak zur Darstellung einer Pseudotinctur dienen und half excellent, doch kamen auch Intoxicationen dadurch vor (Salter). Als Antiepilepticum (Pitschaft, Fischer) ist Tabak ohne Werth. Im vorigen Jahrhundert galt Tabak für ein Diureticum (Fowler) und wurde auch bei Dysurie, Blasenkrampf, Harnverhaltung und Lithiasis gebraucht, ebenso bei Spermatorrhoe und Pollutionen. Die jetzt ziemlich in Vergessenheit gerathene Anwendung von Tabakrauchklystieren bei Asphyktischen und Ertrunkenen wirkt wohl durch den Reiz auf die Mastdarmschleimhaut. Die äusserliche Anwendung der Tabaksblätter im Klystier gegen Oxyuris, oder in Schnupfpulvern gegen chronische Nasenentzündung und Polypen, oder als schmerzlinderndes Mittel bei Gicht und Gelenkrheumatismus (Vetch), oder als Mittel gegen Hautjucken (Prurigo, Pityriasis und Scabies) sind in Vergessenheit gekommen.

Die Folia Nicotianae werden innerlich jetzt gar nicht mehr gebraucht; ältere Aerzte verwendeten sie zu 0,03—0,15 in Pulver oder Pillen, auch im Aufgusse (von 0,005 auf 100,0 Colatur).

Am häufigsten kommen die Folia Nicotianae in Klystierform in Anwendung, wobei man sich eines Aufgusses bedient. Man giebt am zweckmässigsten Klystiere von 0,5—1,0 auf 100,0 Colatur, nicht aber, wie gewöhnlich angegeben wird, 4,0—8,0, da schon durch Clysmata, zu deren Bereitung 2,0 dienen, tödtliche Vergiftung hervorgebracht ist (Mac Gregor).

Zu derartigen Klystieren können auch die käuflichen gebeizten Tabaksblätter, welche örtlich weit mehr reizend wirken, dagegen weniger Nicotin enthalten, in Anwendung gezogen werden, welche man dann als Folia Nicotianae venalia auf dem Recepte verordnen kann. Zu den mehrfach erwähnten, bei Asphyktischen und Ertrunkenen vielfach benutzten Tabakrauchklystieren sind diverse besondere Apparate angegeben, welche sich jedoch durch zwei gewöhnliche Pfeifen ersetzen lassen, indem man das Rohr einer brennenden Pfeife in den Anus bringt und auf deren Kopf denjenigen einer andern andrückt, durch deren Rohr man den Rauch in das Rectum bläst.

Aehnliche Aufgüsse, wie man als Klystier verordnet, und z. Th. noch stärkere, hat man auch zu Augentropfwässern (bei Blepharospasmus), Bähungen und Lotionen (bei verschiedenen Hautaffectionen) benutzt, doch sind die Effecte gering, und die Gefahr einer Vergiftung macht sich nicht bloss beim Vorhandensein von Excoriationen, sondern selbst bei unverletzter Haut geltend. Selbst



die Application von Tabaksblättern auf die äussere Haut, welche Stephenson bei Erysipelas empfahl und welche in tabaksfabricirenden Ländern Volksmittel gegen Rheumatismus und Algien ist, kann zu Intoxication führen. Zum Kauen von Tabak, das gegen Zahnweh empfohlen wird, zum Rauchen, das bei Asthmatikern, welche nicht an Tabak gewöhnt sind, nach Salter im Anfall oft vorzügliche Dienste leistet, und zum Schnupfen, welches nicht allein bei chronischen Katarrhen der Nasen- und Stirnhöhlen, sondern auch bei chronischen Augenentzündungen und Amblyopie früher Anwendung fand, bedient man sich der zu diesen Zwecken besonders präparirten und allbekannten Tabaksblätter. Tabaksrauch hat man auch bei Katarrh der Eustachischen Röhre und der Trommelhöhle in dieselbe eingeleitet.

Die Phkp. hat keine Präparate der Tabaksblätter aufgenommen. Man benutzte früher ein (verschieden dargestelltes) *Extractum Nicotianae* innerlich zu 0,03—0,1, in kleineren Dosen bei Keuchhusten (Wolfheim); äusserlich in der nämlichen Gabe mit Infusum Sennae und Eigelb verrieben im Klystier bei *Hernia incarcerata*, auch mit 5—10 Th. Fett als Salbe bei Neuralgien und Zahnschmerz (Chippendale), endlich zu Haarpomaden (1:10 *Medulla oss. bov.*) beim Ausfallen der Haare (Dorvault). Dieses Extract ist nicht identisch mit dem *Extractum Nicotianae Rademacheri*, welches aus *Nicotiana rustica* L., der oben erwähnten Species, welche den ostindischen und Latakia Tabak liefert, bereitet wurde und für schärfer als *N. Tabacum* gilt. Auch eine daraus dargestellte Tinctur und ein destillirtes Wasser finden bei Rademachers Schülern, das letztere sogar gegen Cholera, Anwendung. In England war früher ein weiniges Macerat als *Vinum Tabaci officinell.*

Das Nicotin ist wegen seiner grossen Wirkungsintensität und seiner leichten Zersetzlichkeit sehr wenig als Arzneimittel qualificirt. Das in den Apotheken aufbewahrte Nicotin verliert jedesmal bei Dispensation durch Contact mit der Luft an Wirksamkeit. Die etwas mehr constanten organisch sauren Salze, welche Reil empfahl, haben sich ebenso wenig wie das Sublimatdoppelsalz allgemeinere Anwendung verschafft. Als Antipyreticum und Antitypicum (Wertheim) ist es trotz seiner pulsverlangsamenden Action nicht im Entferntesten brauchbar; bei chronischen Dermatosen (L. v. Praag, Hebra), ebenso wie die Sublimatverbindung des Alkaloids, mindestens völlig überflüssig. Wertheim empfahl es auch bei krampfhaften Zuständen des Magens und Darmcanals, L. v. Praag bei chronischen Entzündungen, W. Reil bei chronischem Trachealkatarrh und Palpitationen; Pavesi will durch Injection von täglich 15,0—30,0 einer wässrigen und mit Gummi versetzten Lösung (1:600) einen Fall von Paralysis vesicae geheilt haben. Haughton, Tufnell und Erlennmeyer empfehlen es innerlich (zu 0,01—0,015 stündlich) oder subcutan (zu 0,001) bei tetanischen Krämpfen, zumal auch bei Strychninvergiftung. Innerlich lässt sich, vom Tetanus abgesehen, wohl die Dosis auf 0,001—0,003 normiren, welche man in spirituöser Lösung oder in schleimigem Vehikel giebt.

#### Verordnung:

℞  
*Fol. Nicotianae* 2,0  
 — *Sennae* 10,0  
*infunde*  
*Aq. ferridae q. s. ad colat.* 200,0

D. S. Zu 2 Klystieren. (Bei Bruch-einklemmung.)

#### Herba Lobeliae, Herba Lobeliae inflatae; Lobelienkraut.

Die auch als Indian Tobacco bezeichnete Droge, welche in Amerika zuerst von den Eingeborenen, später von amerikanischen Quacksalbern (Coffin u. A.) in einer grossen Anzahl von Krankheiten benutzt wurde und seit der Empfehlung von Cutler (1831) einen grossen Ruf als Antiasthmaticum erlangt hat, stellt eine im östlichen Theile der Vereinigten Staaten allgemein verbreitete Lobeliacee, *Lobelia inflata* L., welche bei uns bisweilen in Gärten cultivirt wird, dar. Die ganze Pflanze mit Stengeln, Blättern, Blüten und Früchten

bildet das Medicament, welches gewöhnlich gröblich zerschnitten in viereckigen, stark gepressten Paqueten in den Handel kommt und unangenehmen scharfen und kratzenden, an Tabak erinnernden Geschmack besitzt. *Lobelia inflata* ist ein einjähriges, bis 2 Fuss hohes Kraut mit kantigem Stengel und zerstreut sitzenden, ungestielten, eiförmigen und etwas gekerbten Blättern; an den Ausschnitten des Blatttrandes finden sich weissliche Drüsen, auf der Unterfläche und am untern Theil des Stengels borstige Behaarung. Die weiblichen zweilippigen Blüten haben einen 5blättrigen Kelch und werden von einem spitzeiförmigen Deckblättchen überragt; die Frucht ist eine dünnwandige, bauchige, kahle Kapsel, in deren 2 Fächern sehr zahlreiche braune, kaum 0,5 Mm. grosse, eiförmige Samen von ausserordentlich schwachem Geschmacke sitzen.

Nach den Untersuchungen von Bastick und Procter scheint die Wirksamkeit der *Lobelia* von einem flüssigen, flüchtigen Alkaloide von gewürzhaftem Geruche und stechendem Tabakgeschmacke, das sich in Wasser und leichter in Alkohol oder Aether löst und wovon 0.06 bei Katzen sofortige heftige Prostration und starke Pupillenerweiterung bedingen (Procter), herzurühren. Das Verhältniss dieses als Lobelin bezeichneten Alkaloids zu dem von Enders aufgefundenen, scharf schmeckenden Glykoside Lobelacrin, welche schon beim Kochen mit Wasser in Zucker und Lobeliasäure sich spaltet, steht nicht fest. Aetherisches Oel scheint nur in Spuren vorhanden zu sein. Nach Ott bedingt Lobelin in kleinen Dosen Erhöhung des Blutdruckes durch Reizung des peripherischen vasomotorischen Systems und anfangs Verminderung, später Zunahme der Pulsfrequenz, doch ist der Haupteffect auf das Athemcentrum gerichtet, durch dessen Lähmung bei letalen Dosen der Tod erfolgt; bei Katzen wird auch die Temperatur sehr stark herabgesetzt. In Selbstversuchen Barralliers mit Lobeliatinctur erzeugten Gaben von 10–40 Tropfen Brennen im Schlunde, Aufstossen und Brechreiz gleich nach dem Einnehmen, Pupillenerweiterung, Athembeschwerden, Gefühl von Zusammenschnüren der Brust, Koliken und flüssige Stühle in einigen Stunden, die grösseren Dosen tumultuarischen Herzschlag und Sinken der Pulsfrequenz. Der quacksalberische Gebrauch des Lobelienkrautes (sog. Coffinismus) hat in den Vereinigten Staaten und in England (Taylor, Letheby) wiederholt zu Vergiftungen geführt, deren Erscheinungen Combinationen einer Affection des Darmcanals und des Nervensystems darstellen, indem neben Erbrechen, Magenschmerzen, Purgiren und manchmal Brennen beim Harnlassen Schwindel, Eingenommenheit des Kopfes, ausserordentliche Prostration, Verengerung der Pupille und Convulsionen bei Lebzeiten und post mortem neben Entzündungen der Magen- und Darmschleimhaut starke Hyperämie des Gehirns sich finden. Schon 4.0 Lobeliapulver sind im Stande den Tod eines Erwachsenen herbeizuführen. Ursprünglich wurde das Lobeliakraut als Brechmittel benutzt. Dass dieser Gebrauch bei der grossen Giftigkeit der Droge völlig ungerechtfertigt ist, liegt auf der Hand, und unterliegt die Empfehlung von Bidault de Villiers bei Croup den gerechtesten Bedenken. Dagegen spricht für die Anwendung bei Asthma nicht nur die Beziehung des Lobelins zum Athemcentrum (Ott), sondern auch zahlreiche Erfahrungen von amerikanischen, englischen und deutschen Aerzten (Bigelow, Bower, Elliotson, Andrews, Neumann, Schlesier, Behrend), welche es z. Th. für das wirksamste aller Antiasthmatica erklären. In der That leistet es in asthmatischen Anfällen manchmal ganz vorzügliche Dienste. Bower erklärt es geradezu für heilsam bei jeder Art von Dyspnoe, und in der That scheint es manchmal auch in Fällen, wo die Athemnoth Folge von chronischer Bronchitis oder Herzkrankheiten (Elliotson) ist, palliativen Nutzen zu schaffen. Auch bei Keuchhusten (Andrews, Morelli) und krampfhaftem Husten überhaupt hat es Anwendung und Lobredner gefunden.

Man benutzt bei uns nur die officinelle *Tinctura Lobeliae*, *Lobeliatinctur*, welche durch Digestion mit 10 Th. Spirit. dilut. dargestellt wird und eine grünbraune Farbe hat. Man reicht dieselbe zu 10–30 Tropfen im asthmatischen Anfall, entweder für sich oder in Verbindung mit *Aqua Amygdalarum amararum*, *Tinct. Stramonii* und ähnlichen Mitteln, in Tropfenform. Als maximale Einzelgabe ist 1.0, als maximale Tagesgabe 5.0 in der Pharmakopoe angegeben. Eine früher gebräuchliche ätherische Tinctur ist reicher an Lobelin und deshalb in etwas kleinerer Dose verwendbar.

**Cortex Quebracho.** — Unter dieser Bezeichnung sind zwei völlig verschiedene Drogen in neuester Zeit aus Südamerika in den Handel gekommen und bei asthmatischen Beschwerden und überhaupt bei Athemnoth theilweise mit grossem Erfolg gebraucht worden. Als weisse Quebracho wird die Rinde einer Apocynce aus Brasilien und der Argentinischen Republik, *Aspidosperma Quebracho Schlechtl.*, bezeichnet, in welcher O. Hesse mehrere Alkaloide entdeckte, welche herabsetzend auf Respiration und Circulation wirken (Penzoldt, Gutmann) und schon zu 0,03—0,08 Kaninchen tödteten. Als *Quebracho colorado* werden die Rinde und das Holz einer südamerikanischen Terebinthacee, *Loxopterygium Lorentzii* Griseb., bezeichnet, von denen die Rinde ebenfalls ein Alkaloid einschliesst, das jedoch von den *Aspidosperma*-Alkaloiden völlig verschieden ist und erst zu 0,1 Frösche unter den Symptomen motorischer Lähmung tödtet. Im *Lignum Quebracho colorado* findet sich kein Alkaloid, überhaupt ist die Droge vorwaltend gerbstoffhaltig. Mit verschiedenen im Handel als *Aspidospermin* bezeichneten *Quebrachoalkaloiden* constatirten Gutmann und Eulenburg eine denselben zukommende allmähliche Herabsetzung der Herzfrequenz durch Lähmung der automatischen Herzganglien. Penzoldt vindicirt der *Quebracho* eine eigenthümliche Wirkung auf das Blut, welchem es nicht nur die Fähigkeit, grössere Quantitäten Sauerstoff aufzunehmen, sondern auch die Eigenschaft, denselben fester zu binden und schwerer an die Gewebe abzugeben, verleihe, wodurch Dyspnoe durch Sauerstoffmangel in der Medulla entstehe. Obschon die Theorie der antiasthmatischen Wirksamkeit der beiden *Quebrachorinden* keineswegs als sicher gestellt anzusehen ist und selbst nicht überall die gleichen therapeutischen Effecte erhalten wurden, liegen doch seit der Empfehlung des Mittels durch Penzoldt zahlreiche Erfahrungen vor, welche den Versuch mit dem Mittel bei verschiedenen Formen von Dyspnoe rechtfertigen. Nach Lutz und Lichtheim treten die eclatantesten Erfolge beim sog. symptomatischen Asthma, bei acuten Respirationserkrankungen und uräemischen und hoch febrilen Zuständen zu Tage, während chronische, durch Erkrankung der Respirationsorgane bedingte, oder auf Herzschwäche beruhende Dyspnoe wenig oder überhaupt nicht günstig beeinflusst wird. Als Antipyreticum scheint nur *Quebracho blanco*, nicht *Quebracho colorado* zu wirken. Von ersterem empfahl Penzoldt 2—3mal täglich 1—2 Theelöffel eines durch Extraction von 10 Th. gepulverter Rinde mit 100 Th. Alkohol, Eindampfen des Filtrats und Lösen des Rückstandes in 20 Th. warmen Wassers erhaltenen Auszuges. Von *Quebracho colorado*, auf welches sich die meisten günstigen Mittheilungen beziehen, hat man dieselbe Form oder ein aus dem Holze gewonnenes Extract, *Extractum ligni Quebracho colorado*, zu 0,5—1,0 pro dosi mehrmals täglich meist in wässriger oder alkalischer Lösung angewendet.

**Radix Gelsemii, Gelsemiumwurzel.** — Die von den amerikanischen Eklektikern als Antipyreticum benutzten unterirdischen Theile der nordamerikanischen Apocynce *Gelsemium nitidum* Michx. (*G. sempervirens* Ait.) haben in den letzten Jahren bei uns verbreitete Anwendung bei Neuralgien gefunden. Die Droge enthält eine eigenthümliche fluorescirende Säure, die von Sonnenschein mit Aesculin identificirte, nach Ott tetanisirende Gelsemiumsäure, und ein stark giftiges Alkaloid, das Gelsemin, welches Kaninchen bereits zu  $\frac{1}{2}$  Mgm. pro Kgm. tödtet. Dasselbe schliesst sich dem Atropin und Hyoscyamin insofern an, als es bei localer Application Erweiterung der Pupille bedingt, die auch bei interner Application eintritt (Ott). Nach Putzeys und Romée lähmt es auch die peripheren Nervenendigungen und die Vagusendigungen im Herzen; doch wird von den meisten Experimentatoren (Ott, Ringer u. Murrell, Eulenburg u. Moritz) die Wirkung auf die Herzaction nur als indirecte bezeichnet. Den hauptsächlichsten Angriffspunkt des Gelsemins bietet das Athemcentrum, das es herabsetzt und schliesslich lähmt; daneben setzt es nach voriger Erregung zunächst die motorischen, cerebralen und spinalen Centren und erst später die sensiblen herab, ohne die peripheren Nerven und die Muskeln zu afficiren. Beim Menschen sind besonders auffällig die bei physiologischen Dosen sich einstellenden motorischen Lähmungserscheinungen, wobei zunächst die Augenlider afficirt werden (Schwere des oberen Augenlids und vollständige Ptosis); hieran reihen sich Diplopie, Schielen, Schwindel, Doppelsehen, Erschwerung der Zungenbewe-



gung, Zittern der Hände, Taubheit der Finger, allgemeines Kältegefühl und Dyspnoe (Berger, Ringer und Murrell). In einem schweren Vergiftungs-falle mit 0,15 Gelsemin subcutan rettete künstliche Respiration das Leben (Fronmüller). Die therapeutische Verwendung beschränkt sich bei uns vorzugsweise auf Neuralgie des Trigeminus, besonders im Gefolge von cariösen Zähnen (Wickham Legg, Mackey, Jurasz, Massini), auch gegen die Schmerzen bei Iritis und Iridochorioiditis (Desmarres). Von physiologischem Gesichtspunkte dürfte Gelsemium eher bei Spasmus facialis und bei Hustenreiz (Ringer und Murrell) indicirt sein. Hertzka gebrauchte es mit Erfolg bei Klavierspielerkrampf. M'Genghi rühmt es bei Irritabilität der Blase (mit Bromkalium) und bei Intermittens, wo es die Wirksamkeit des Chinins bedeutend steigern soll. Man benutzt in Amerika meist ein Fluidextract zu 0,05–0,3 pro dosi mehrmals täglich, bei uns Tincturen, die aber in ihrem Gehalt sehr variiren, je nachdem die frische oder getrocknete Wurzel oder concentrirter Alkohol in verschiedenen Quantitäten einen sehr verschiedenen Wirkungsgrad besitzen. Für stärkere Tincturen (1:5) scheint es zweckmässig, die Dosis von 5–10 Tropfen nicht zu überschreiten. Die Empfehlung des Gelsemins als Mydriaticum (in Lösungen von 1:60) zur Feststellung von Refraktionsanomalien, weil die Accommodationsstörungen schon in 10–20 Std. aufhören (Tweedy), hat zur Einbürgerung des Gelsemins nicht geführt.

Flores Narcissi; Narzissenblumen. — Genauerer Untersuchung bedürftig sind die namentlich in Frankreich seit der Empfehlung von Dufrénoy (1815) gegen Epilepsie, Convulsionen, Chorea, Asthma, Neuralgien, Hemikranie zu 0,3–1,5 gebrauchten Blüthen der gelben Wiesennarzisse, *Narcissus pseudonarcissus* L. (Michéa, Pourché, Pichot u. A.). In grösseren Dosen (3,0 bis 4,0) wirken dieselben emetisch; noch stärker erregt die Zwiebel Erbrechen, welche im frischen Zustande in Nordamerika Hausmittel zur Hervorrufung von Emese ist, getrocknet indess viel von ihrer Activität einbüsst.

#### **Tubera Aconiti, Radix Aconiti; Eisenhutknollen, Sturmhutknollen.**

Die Droge stellt die von blühenden, wildwachsenden Exemplaren gesammelten Wurzelknollen einer auf den Alpen und Pyrenäen, auf den deutschen und österreichischen Mittelgebirgen, auch in Dänemark, Schweden, selten in England, desgleichen in Sibirien und auf dem Himalaya vorkommenden, bei uns vielfach als Zierpflanze in Gärten gezogenen Ranunculacee, *Aconitum Napellus* L., dar.

Die rübenförmigen Wurzelknollen von *Aconitum Napellus* sind oben ungefähr 2 Cm. dick und mit einem kurzen Stengelstumpfe oder einem Knospenreste gekrönt. Sie wiegen durchschnittlich ungefähr 6,0 und erreichen eine Länge von 8 Cm. und laufen sehr allmähig in eine einfache Spitze aus. Sie sind aussen mattbraungrau, mit tiefen Längsrünzeln und von den abgeschnittenen Nebenwurzeln herrührenden Narben versehen, innen weiss oder bräunlich, je nach dem Alter, indem die mit Stielresten versehenen Knollen oft missfarbige Beschaffenheit darbieten und in Folge von Aushöhlung leichter als die völlig compacten, mit der für die Entwicklung des nächstjährigen Stengels bestimmten Knospe versehenen, jüngeren Knollen sind. Auf dem Querschnitte zeigt sich eine dicke, punktirte Rinde und ein rundliches, braun umschriebenes Mark, welches in den oberen Regionen des Knollens rundlich oder elliptisch, 5–7eckig (mit oft ziemlich stark hervortretenden Ecken) erscheint. Die frische Wurzel hat einen scharfen, rettigartigen Geruch, der beim Trocknen verschwindet. Der Geschmack ist anfangs süsslich, wird aber allmähig ausserordentlich brennend und verbindet sich gleichzeitig mit einem Gefühl von Kriebeln und Taubsein in Zunge und Lippen. *Aconitum Napellus* ist die am stärksten wirkende blau-blühende Species von *Aconitum*, welche in Europa vorkommt. Bei der schwie-

rigen Unterscheidung von nahe verwandten Arten, welche auf den Alpen, woher die im Handel befindliche Waare stammt, wachsen, ist, da die Einsammlung durchgängig von ungebildeten Personen besorgt wird, das Vorkommen von Verwechslungen leicht erklärlich. Dahin gehören die Knollen von *Aconitum Störckeanum* Reichenb., meist etwas kräftiger als die echten Sturmhutknollen, in der Regel zu 3 oder mehr (bei *Napellus* zu 2 zusammenhängend), ferner diejenigen von *A. Cammarum* Jacq. s. *A. variegatum* L., welche kürzer und mehr kugelig eiförmig erscheinen. Die Wurzeln gelbblühender Sturmhutarten, *A. Anthora* L. und *A. Lycotomum*, lassen sich nicht wohl mit *Napellusknollen* verwechseln.

Die medicinischen Eigenschaften der Sturmhutwurzel differiren ganz ausserordentlich. Nach Schroff wirkt die Wurzel von in Gärten gezogenen Exemplaren des Sturmhufts weit schwächer und ist die Wurzel von cultivirtem *Aconitum Störckeanum* geradezu ohne giftige Eigenschaften. Schweizer Knollen sollen um  $\frac{1}{3}$  stärker sein als solche aus den Vogesen (Oulmont). Von grossem Einflusse ist auch die Vegetationsperiode; am kräftigsten wirkt die vor der Blüthezeit gesammelte Wurzel, und die im August gegrabenen Knollen von *A. neomontanum* wirken dreimal so stark wie die Octoberwurzel (Schroff). Von jeher hat man behauptet, dass der Sturmhut an gewissen Orten ungiftig sei; wie Martin Bernhard 1671 die Ungiftigkeit des Sturmhutkrautes für Polen angab, erzählt Munro, dass in Indien in einzelnen Districten die Sturmhutknollen als Nahrungsmittel dienen, während sie im nördlichen Indien als intensives Gift bekannt sind. Es fragt sich jedoch, ob hierbei nicht Verwechslungen mit anderen *Aconit*species stattgefunden haben, welche, wie die europäische Giftheilwurzel, *Aconitum Anthora* L., und die in Indien als *Atis* bezeichnete und zu 1,0 und mehr gegen Intermittens benutzte Species *Aconitum heterophyllum* Wallich keine giftig wirkenden Bestandtheile einschliessen. Uebrigens ist das Kraut von *Aconitum Lycotomum* L. ungiftig, während die Wurzel ausgeprägte toxische Eigenschaften besitzt. Das Trocknen übt auf die Giftigkeit der Sturmhutwurzeln ebenso wenig wie auf die *Folia Aconiti* einen zerstörenden Einfluss aus (Pereira, Schroff).

Die chemische Analyse der *Aconit*knollen hat das Vorhandensein verschiedener Alkaloide ergeben, welche in ihrer Activität sehr differiren und auch qualitative Wirkungsdifferenzen darbieten.

Lange Zeit war man gewohnt, die von Geiger und Hesse (1833) aus dem Kraute von *Aconitum Napellus* gewonnene und als *Aconitin* bezeichnete amorphe Base als das active Princip anzusehen. Dieses bei uns früher officinelle Alkaloid, auch Deutsches *Aconitin* genannt, welches ein weisses oder gelbliches, geruchloses, bitteres und später wenig brennend scharf schmeckendes Pulver von alkalischer Reaction bildet, sich kaum in Wasser, dagegen in 4–5 Th. Weingeist, 2 Th. Aether,  $2\frac{1}{2}$  Th. Chloroform, leicht auch in Benzin und Amylalkohol, hingegen nicht in Petroleumäther löst, kann als das einzige giftige Princip des Sturmhufts um so weniger betrachtet werden, weil ein aus *Aconit*knollen dargestelltes alkoholisches Extract Thiere in geringerer Dosis oder doch in derselben Menge tödtet, als Deutsches *Aconitin*, und weil den Pflanzentheilen von *Aconitum Napellus* eine entschiedene Schärfe zukommt, die dem Geigerschen *Aconitin* fehlt. Der Träger dieser scharfen Wirkungen ist wenigstens zum grössten Theil ein ebenfalls als *Aconitin* oder als krystallisirtes *Aconitin* bezeichnetes Alkaloid, welches in grösster Reinheit zuerst von Duquesnel dargestellt wurde (durch Extraction mit weinsäurehaltigem Alkohol). Dieses krystallisirte *Aconitin* spaltet sich nach Wright und Luff in Benzoësäure und ein physiologisch wenig actives, namentlich kein Kriebeln an den Lippen erzeugendes Alkaloid *Aconin* und ist vollkommen verschieden von einem ebenfalls in den Sturmhutknollen, jedoch in geringerer Menge, vorhandenen dritten Alkaloid, welches gewöhnlich als *Pseudaconitin*, mitunter auch als *Napellin*, *Nepalin* und *Acraconitin*, bezeichnet wird. Diese Base, welche sich in weit grösserer Menge neben kleinen Quantitäten krystallisirten *Aconitins* in den Knollen einer am Himalaya vorkommenden Sturmhutart, *Aconitum ferox* Wallich, findet, die unter dem Namen *Bish* (Gift) oder *Ativisha* in

Ostindien bekannt sind und zum Vergiften grosser Raubthiere benutzt werden, spaltet sich in Dimethylprotocatechusäure und eine harzartige, krystallinische, stickstoffhaltige Masse (Pseudaconin). Vermuthlich finden sich im Sturmhut neben amorphem und krystallisirtem Aconitin und Pseudaconitin nicht allein die beiden Spaltungsproducte Aconin und Pseudaconin, sondern auch noch verschiedene andere Basen (Pikraconitin von Groves, Napellin von Hübschmann, Aconellin von T. und H. Smith), ohne dass durch dieselben die giftigen oder medicinalen Wirkungen des Eisenhutes bedingt oder alterirt werden, an denen auch die in den Sturmhutarten vorkommende eigenthümliche Säure, die Aconit-säure, keinen Antheil hat.

Das krystallisirte Aconitin und Pseudaconitin unterscheiden sich von dem amorphem Aconitin in auffallender Weise durch die intensive Einwirkung auf die Haut und die Mundschleimhaut. Aeusserlich applicirt wirken dieselben ungefähr wie Veratrin und bedingen in den eingeriebenen Theilen die Empfindung von Wärme und Kriebeln, welcher ein Gefühl von Erstarrung und Zusammenziehung von 2—16 Std. Dauer folgt. An den betreffenden Stellen werden Tast- und Temperaturempfindung stark herabgesetzt. Ähnliche Erscheinungen erfolgen bei örtlicher Application auch auf der Zunge und auf der Conjunctiva, wobei leichte Hyperämie und Myosis eintritt. Auf die Nasenschleimhaut applicirt erregen sie heftiges Niesen und unangenehmes Bohren in der Nase. Ein weiterer Unterschied ist die grosse Giftigkeit des krystallisirten Aconitins und Pseudaconitins gegenüber der relativen Unwirksamkeit des Aconitins von Geiger und Hesse, wofür ziffermässige Belege weiter unten gegeben werden.

Die Elimination des Aconitins erfolgt durch die Nieren; bei innerer Einverleibung wird ein grosser Theil mit den Fäces entfernt (Dragendorff und Adelheim).

In Bezug auf die entfernten Erscheinungen ist, von der Rapi-dität der Wirkung abgesehen, keine wesentliche Differenz zwischen Aconitin, Pseudaconitin und den Aconitpräparaten ersichtlich. Grössere Dosen bedingen sowohl bei Menschen als bei Thieren einen Zustand von Adynamie mit Störungen der Respiration und Circulation, worauf bei sehr grossen Dosen der Tod nach oder ohne vorausgängige Convulsionen erfolgt. Constant scheint dabei Pupillenveränderung vorzukommen, bei Menschen und bei Thieren, welche brechen können, auch Emese.

In Selbstversuchen von Dworzak und Heinrich stellte sich sofort nach amorphem Aconitin eigenthümliches ziehendes Gefühl in Wangen, Oberkiefer und Stirn, also im ganzen Gebiete des Trigeminus ein, welches sich anfangs in remittirenden, umherwandernden, hierauf in continuirlichen Schmerz von ziemlicher Intensität verwandelte; der Puls war anfangs frequenter, sank dann aber tief unter die Norm, wurde klein und schwach und zeitweise doppel-schlägig; die Pupille zeigte im Beginne ungewöhnliche Beweglichkeit und wechselte zwischen Erweiterung und Verengung. Zu diesen Erscheinungen kam Aufstossen und Kollern im Bauche und bei erheblichen Dosen (0,02—0,03) starke Eingenommenheit des Kopfes, Ohrensausen, Gefühl von Druck in den Ohren, Schwindel und Unbesinnlichkeit, grosse Trägheit des Ideenganges, Steigerung des Kopf- und Gesichtsschmerzes nach den geringsten geistigen Anstrengungen, ungewöhnliche Mattigkeit und Abgeschlagenheit, Unfähigkeit zu körperlicher Bewegung, endlich vermehrte Diurese. Ähnliche Erscheinungen beobachtete Reil (auch Engbrüstigkeit und Neigung zum Tiefathmen, sowie nächtliche Pollutionen), während Achscharumow nach Dosen über 0,06 deutsches Aconitin nur Schwindel, Aufstossen und Schwäche, dagegen kein Schmerzgefühl im Bereiche des Trigeminus wahrnahm. Nach Selbstversuchen Hottots mit nicht völlig reinem krystallisirten Aconitin, wobei er allmähig bis 0,003 stieg, traten im Wesentlichen die nämlichen Erscheinungen wie bei Dworzak und Heinrich ein, auch die lancinirenden Schmerzen im Verlaufe des Trigeminus, daneben aber auch ein von Gubler nach französischem Aconitin wiederholt beobachtetes Phänomen, welches sich auch in einer Anzahl von Ver-



giftungsfällen durch Theile von *Aconitum Napellus* findet, nämlich Eingeschlafen-sein und Ameisenkriechen in den Extremitäten. Gubler fand auch eine Abnahme der Sensibilität und der Empfindung an der Zungenspitze, so dass Zucker nicht geschmeckt wurde, ferner nach zu hohen Dosen Sinken der Temperatur und Blässe des Gesichts. Aconitinnitrat von Petit rief zu 0,3 Mgm. Constrictionsgefühl vom Munde bis zum Magen und Kältegefühl im ganzen Körper und zu 0,001 Eiseskälte der unteren Extremitäten, Brennen in der Kehle, klebrigen kalten Schweiss, schweres und röchelndes Athmen, Taubheit, Schwindel und enorme Ermattung hervor; die Erscheinungen, zu denen nach mehrmaliger Wiederholung der Dosis auch Krämpfe, Schliessen der Augenlider und des Mundes, vorübergehende Blindheit und Oppression der Brust traten, liessen auf spontanes Erbrechen nach (Busscher). Von demselben Aconitin bedingten 0,03 unmittelbar nach der Mahlzeit genommen, nach anderthalb Stunden Schwindel, Neigung zum Hintallen und Unfähigkeit zu aufrechter Stellung, später Steigerung der Frequenz und Irregularität des Pulses, Pupillenverengung, Brennen und Schwellung der Zunge, Präcordialangst, Dysphagie, Verlust des Geschmackes, intensives Frostgefühl und Schwierigkeit bei Bewegung; später kam es zu Speichelfluss, intercurrenter Pupillenerweiterung und Dunkelheit vor den Augen und wiederholten convulsivischen Anfällen mit Röthung des Gesichts und schnarchender Athmung, worauf der Tod eintrat (Haakma Tressling). Harley sah nach 0,5 Mgm. englischen Aconitins Herabgehen der Athem- und Pulsfrequenz ohne erhebliche Allgemeinerscheinungen, nach 0,8—2 Mgm. Ameisenkriechen, besonders im Gesicht, Schwindel, Nausea, Somnolenz und Muskelschwäche. Bei Säugethieren bewirkt Geigers Aconitin Fallen auf die Seite, heftige Convulsionen und asphyktischen Tod; bei nicht so rasch tödtlichen Gaben kommt es rasch zu Verlangsamung des Herzschlages und der Respiration, Athemnoth, Verminderung der Energie des Herzschlages und Sinken der Temperatur, worauf ein paralytischer Zustand mit Irregularität der Herzaction, Convulsionen und asphyktischer Tod folgen. Die Empfindung nimmt ab, doch kommt es selten zu vollkommener Anästhesie (Falck und Schulz). Pseudoaconitin und krystallisirtes Aconitin rufen bei Warmblütern im Wesentlichen dieselben Erscheinungen hervor; nur verläuft die Vergiftung rascher (Böhm und Ewers, von Anrep). Bei Fröschen bedingt amorphes Aconitin zunächst allgemeine Erregungserscheinungen, die bei grossen Dosen nur kurze Zeit anhalten, Betäubung, Trägheit der Bewegungen, Verlangsamung und Schwächung der Herzaction, Athemstillstand, klonische Krämpfe und fibrilläre Muskelzuckungen, endlich diastolischen Herzstillstand, wie solcher auch bei Säugethieren und Vögeln eintritt (Falck und Schulz, von Anrep).

Als Hauptangriffspunkte ergeben sich für Aconit und die darin enthaltenen Alkaloide vorzugsweise die Medulla oblongata und das Athemcentrum, die sensibeln und motorischen Rückenmarksganglien, die motorischen Herzganglien und das vasomotorische Centrum, bei den stärker wirkenden Aconitalkaloiden werden auch die peripheren Nervenendigungen gelähmt.

Dass die psychomotorischen Centren des Gehirns, wenn die Thätigkeit derselben auch nach den Versuchen von Dworzak und Heinrich, so wie nach verschiedenen Beobachtungen von Vergiftung mit Aconitpräparaten nicht als unbeeinträchtigt angesehen werden können, erst spät und vielleicht nur secundär afficirt werden, lässt sich nicht in Zweifel ziehen. In dem oben erwähnten Vergiftungsfall mit krystallisirtem Aconitin (Aconitin von Petit) blieb das Bewusstsein bis zu den terminalen Krampfanfällen intact, nachdem längst die Fähigkeit zur aufrechten Stellung verloren gegangen war. Fröschen, welchen eine Sacralligatur angelegt wurde, machen oft mit den Hinterbeinen noch spontane Bewegungen, wenn die Vorderbeine bereits im completen Lähmungszustande sich befinden. Die paralytischen Erscheinungen sind vermuthlich von den Nervencentren (nach von Anrep von deren anämischen Zustände) abhängig, möglicherweise auch von der Lähmung der peripherischen Nerven (Plugge); die Muskeln erhalten ihre Erregbarkeit auch nach Vergiftung mit Aconitindosen, welche die Nervenendigungen lähmenden Mengen 5—10mal

übertreffen (Plugge). Frühzeitig wird das Rückenmark beeinträchtigt, nach Böhm und Wartmann sogar in erster Linie; zunächst erfolgt Abnahme des Reflexvermögens der sensibeln Rückenmarksganglien und etwas später eine Erregbarkeitsabnahme der motorischen Ganglien, welche bei kleinen Dosen häufig anfangs gereizt werden (klonische Krämpfe). Bei amorphem Aconitin bleibt die Lähmung der peripheren Nerven problematisch. Das Athemcentrum wird bei Fröschen und Warmblütern zunächst erregt und später gelähmt (von Anrep); bei letzteren schiebt künstliche Athmung nach Intoxication mit kleinen letalen Gaben den Eintritt des Todes mehrere Stunden hinaus (Achscharumow, Lewin, von Anrep). Böhm und Ewers betrachten die respiratorischen Störungen theilweise als Folge einer Reizung der peripherischen Vagusendigungen, weshalb sie durch Vagusdurchschneidung oder Atropinisirung aufgehoben werden, theilweise centralen Ursprungs; Zwerchfell und Phrenicus sind dabei unbetheiligt.

Grössere Gaben amorphes Aconitin lähmen die motorischen Herzcentren, mittlere nach vorgängiger Erregung, die bei kleineren ausschliesslich eintritt; krystallisiertes Aconitin wirkt auf das Herz hauptsächlich lähmend, am spätesten auf die Vagusendigungen, die bei gewissen Dosen eine Reizung erfahren (von Anrep). Bei Vergiftung mit amorphem Aconitin ist nach Böhm und Wartmann der mittlere Blutdruck bei Kaninchen meist im Anfange erhöht, bei Hunden und Katzen immer stark vermindert, die durch den einzelnen Herzschlag geleistete Arbeit stets stark vermehrt. Bei curarisirten Thieren sind in Folge von Fehlen der heftigen Respirationsstörungen grössere Dosen von Aconitin zur Erzielung des Herzstillstandes nothwendig. Das Gefässnervencentrum wird anfangs erregt, später geschwächt, nicht vollständig gelähmt (von Anrep, Mackenzie), dagegen hebt Aconitin den Reflex von den sensibeln Ganglien zum Gefässnervencentrum auf, indem es die ersten lähmt (Böhm und Wartmann). Die Krämpfe bei Aconitvergiftung scheinen theilweise durch directe Reizung des Krampfcentrums zu resultiren, doch wird, wie von Anrep hervorhebt, dieser Effect durch das schnelle Sinken des Blutdrucks wesentlich unterstützt; letzteres ist auch die erste Ursache der Dyspnoe; später kommt es zu wirklicher Erstickung mit paroxystischen Erstickungskrämpfen und Pupillenerweiterung. Obschon örtliche Application von krystallisiertem Aconitin auf das Auge in Folge starker Reizung der sensibeln Bindehautnerven Myosis bedingt, ist die während der Vergiftung auftretende Pupillenverengung doch aller Wahrscheinlichkeit nach als centrales Phänomen aufzufassen. Directes Bestreichen des Darmes mit Aconitlösung hemmt die Peristaltik.

Die Behandlung der Vergiftung mit Aconit und den Aconitinen erfordert schleunige Entleerung des Magens und Anwendung von Tannin als chemisches Antidot. Nach Fothergill wirkt Atropin in kleinen Dosen günstig, weniger Digitalin, das bei Thieren nur bei längere Zeit vorausgehender Einführung die Wirkung letaler Aconitindosen schwächt, bei gleichzeitiger oder nachträglicher Anwendung dagegen nicht lebensrettend wirkt. Atropin beschleunigt, kräftigt und regelt bei nicht allzutiefer Aconitinwirkung die geschwächte Herzaction beim Frosche und beseitigt den durch Aconitin bewirkten Herzstillstand (Sydney Ringer).

Die therapeutische Anwendung der *Tubera Aconiti* ist gegenwärtig keine sehr grosse und mehr auf Empirie als auf wirkliche Beobachtung gestützt. Am meisten Ruf geniessen dieselben bei rheumatischen u. a. schmerzhaften Leiden, z. B. Neuralgien, sowie als Abortivmittel bei entzündlichen und katarrhalischen Affectionen.

Als Antirheumaticum ersetzen die *Tubera Aconiti* die zuerst von Störck empfohlenen, als *Folia s. Herba Aconiti* bezeichneten Blätter von *Aconitum Napellus*, welche noch jetzt in England und Frankreich zur Bereitung officineller Aconitpräparate dienen. Dieselben sind wesentlich schwächer, nach Schrott 6mal so schwach wie die Knollen und enthalten vielleicht kein krystallisiertes Aconitin. Die Angabe von Störck, dass das Mittel selbst bei monatelanger Dauer rheumatischer Affectionen dieselben in wenigen Tagen beseitige,

sind höchst übertrieben. Die Indicationen sowohl bei chronischem als bei acutem Rheumatismus (Tessier, Fleming, Busse u. A.) werden höchst verschieden angegeben. Bei Gicht scheint Aconit von nicht sehr bedeutender Wirkung zu sein. Ein günstiger Einfluss bei Neuralgien lässt sich weder der internen Application (Gubler, Seguin, Oulmont) noch der äusserlichen Anwendung (Turnbull, Böhm) absprechen. Besonders günstig wird Prosopalgie beeinflusst, weniger gut Ischias. Von sonstigen Affectionen, bei denen Aconit gebraucht wurde, ist namentlich Herzhypertrophie zu nennen, gegen welche Lombard zuerst Aconit empfahl; nach Philipps ist es hier contraindicirt, wenn Klappenfehler vorliegen. Grimshaw gab Aconittinctur bei gleichzeitiger horizontaler Lage zur Cur von Aneurisma der Bauchorta. Die herabsetzende Wirkung auf den Puls und die Temperatur gab Veranlassung, Aconit überhaupt als Antipyreticum anzuwenden, wo es dann gleichzeitig auch bei entzündlichen Affectionen die Inflammation beseitigen sollte. Hierauf beruht der Gebrauch bei Pleuritis, Pleuropneumonie, Angina, Angina tonsillaris, Bronchitis, Kindbettfieber, Erysipelas (Philipps, Sydney Ringer, Radagliati), zum Coupiren des Schnupfens (Philipps) oder des Trippers (Sydney Ringer, Spark), zur Verhütung von Entzündung nach Staaroperationen (Cade) oder gar von Pyämie oder Phlebitis nach Amputationen (Teissier). Selbst beim Typhus (Deshaye und Levasseur) und bei remittirenden Fiebern (Bamford) ist Aconit als Antipyreticum gebraucht. Besondere Empfehlung fand dasselbe ferner bei Ruhr (Marbot), Hirnhyperämie und Suppressio mensium, Epistaxis und Hämoptysis, bei schlechten Geschwüren (Grantham) und bei Hydrops. Bei Hydrops tritt indess keine Vermehrung der Diurese danach ein, während allerdings bei Anwendung von Aconittinctur als Antipyreticum in der Regel gesteigerte Diurese erfolgt (Mackenzie). Auch Nervenaffectionen, z. B. Manie und Convulsionen im Puerperium (Philipps), Frostschauder nach forcirtem Katheterismus (Long), selbst Tetanus sind in England Gegenstand der Aconittherapie geworden, ohne dass sich irgendwie vollgültige Beweise, sei es für einen Vorzug des Mittels vor anderen Neurotica, sei es für die Wirksamkeit desselben überhaupt ergeben. Simon wendet Aconittinctur bei Keuchhusten an.

Die Tubera Aconiti benutzt man fast ausschliesslich in Form ihrer Präparate. Man kann sie zu 0,03—0,1 innerlich in Pulvern oder Pillenform anwenden. Die Phkp. bestimmt als Maximum für die Einzelgabe 0,1, für die Tagesgabe 0,5. Auch äusserlich macht man bei uns von den Sturmhutknollen kaum Gebrauch. Man kann sie im Infus oder Macerat verwenden. Ein unter Zusatz von  $\frac{1}{20}$  Campher bereitetes spirituöses Macerat bildet das zu sedativen Einreibungen benutzte Linimentum Aconiti Ph. Br.

Die Anwendung des Aconitins als Medicament ist auf die epidermatische Application möglichst zu beschränken, wo die Base jedoch durch Veatrin vollkommen ersetzt wird. Der internen und hypodermatischen Anwendung stellt sich die Verschiedenheit der im Handel unter dem Namen Aconitin vorhandenen Präparate entgegen. Dieselben sind sämtlich Gemenge von krystallisirtem Aconitin, Pseudaconitin und amorphem Aconitin, deren relative Toxicität so sehr differirt, dass die Verwechslung einzelner Handelssorten geradezu zur tödtlichen Vergiftung eines Erwachsenen führen kann. Nach Plugge ist z. B. Aconitinnitrat von Petit in Paris 170mal stärker als Aconitinnitrat von Trommsdorff und ist es daher gar nicht zu verwundern, dass das erstgenannte Präparat den Tod eines Arztes in Winschoten (1880) herbeiführte, welcher eine Dosis verschluckt hatte, welche, wenn das gewünschte schwächere Präparat genommen wäre, nicht einmal physiologische Effecte erzeugt haben würde. Der Tod erfolgte in diesem Falle nach 0,003—0,0036 des französischen Präparates, von welchem schon die zehnfach geringere Menge (0,3 Mgm.) heftige Vergiftungserscheinungen hervorrief. Im Gegensatz hierzu können 0,05 pro dosi häufiger wiederholt, so dass 0,35 in 3 Tagen genommen wurden, bei Anwendung eines vorzugsweise aus amorphem Aconitin bestehenden Präparate innerlich (Th. Husemann) und 0,045 hypodermatisch (Lorent) ohne Befindensstörung genommen werden. Der Arzt darf daher niemals Aconitin verordnen, von welchem er die quantitative Wirkung nicht genau kennt. In früherer Zeit war es möglich, die Präparate nach ihrer Herkunft in deutsches, französisches und englisches Aconitin zu sondern und davon das erstere als das schwächste



zu bezeichnen; aber es giebt deutsches Aconitin, welches nur 8mal schwächer als Aconitin von Petit und 20mal stärker als Trommsdorffsches Aconitin ist (Plugge), ja es giebt deutsches Aconitin, welches dem krystallinischen Aconitin von Duquesnel nur wenig nachsteht, so dass ersteres Frösche zu 0,05 Mgm. und Kaninchen zu 0,5 Mgm., letzteres Frösche zu 0,3 Mgm. und Kaninchen zu 0,25 Mgm. tödtet (von Anrep). Man gab das früher bei uns officinelle amorphe Aconitin bei Ohrentönen innerlich zu 0,01 in Lösung oder Pillen und verordnete äusserlich Salben oder Lösungen in Spiritus oder Glycerin (0,05 auf 5,0 Glycerin), oder hypodermatisch (als ex tempore bereitetes Aconitum hydrochloricum in 10 Th. Wasser gelöst) bei Algien und besonders Rheumatalgien; doch ist bis jetzt nur bei Gelenkrheumatismus ein palliativer Erfolg (Lorent. Eulenburg) constatirt, während die Effecte bei Neuralgien, Pruritus u. s. w. Null sind. Bessere Erfolge in dieser Richtung haben die vorwaltend aus krystallisirtem Aconitin oder Pseudaconitin bestehenden Aconitinsorten. Auf solche beziehen sich die Erfolge, welche Turnbull, Pereira u. A. mit Unguentum Aconitiae (aus 0,5 Aconitin, 2,0 Spir. und 30,0 Fett bestehend) oder mit alkoholischer Solution nicht nur bei Tic douloureux, rheumatischen Schmerzen, Coxalgie und Brustkrebs, sondern auch bei Iritis und diversen Ohrenaffectionen (Otalgie, Mangel an Ohrenschmalz, Schwellung der Tuba Eustachii), sowie bei Urincontinentenz hatte.

Auch innerlich ist derartiges starkes Aconitin bei Neuralgien benutzt (Gubler und Seguin). Man giebt hier das Aconitinnitrat von Duquesnel, welches jedoch höchstens zu 0,0005 pro die gegeben werden darf, da grössere Dosen Schwindel, Schwäche in den Beinen und Collaps (Molènes) bedingen. Vollständig rein ist übrigens das Duquesnellsche Präparat auch nicht, indem es nach Laborde in seiner Activität sehr variirt, je nachdem es aus Schweizer Napellusknollen oder aus solchen aus der Dauphiné oder aus Eisenhutknollen der Vogesen bereitet wurde, welche letzteren ein weit schwächer wirkendes Alkaloid liefern sollen. Darnach ist es wohl erklärlich, wenn Seguin mitunter intensive Erscheinungen nach  $\frac{1}{4}$  Mgm. eintreten sah, während andere Patienten 0,8 Mgm. dreistündlich ohne Befindensstörung ertrugen. In Frankreich giebt man das Präparat in Granules oder in alkoholischer Lösung. Zur Subcutaninjection ist letztere wegen heftigen Brennens ungeeignet. Aconitin von Hottot oder Petit sind dem von Duquesnel gleich zu dosiren, obschon sie etwas geringer wirksam sind. Das Aconitin von T. und H. Smith steht demselben in seiner Wirkungsintensität nahe. Noch intensiver scheint eine aus japanischen Aconitknollen dargestellte Base, das Japaconitin, zu wirken (Langaard), welche indes bis jetzt im Handel nicht vorkommt.

### Präparate:

1) **Extractum Aconiti; Eisenhutextract, Sturmhutextract.** Dickes Macerationsextract, mit Weingeist und Wasser bereitet, gelbbraun, in Wasser trübe löslich. Maximale Einzelgabe 0,02, maximale Tagesgabe 0,1. Das Präparat vertritt das aus den Blättern dargestellte Extract früherer Phkp. und die Saft-extracte auswärtiger Phkp., welche es an Wirksamkeit weit übertrifft. Man giebt es innerlich in Pillen oder Solutionen zu 0,005–0,02, 3–4mal täglich, oft in Verbindung mit Substanzen, welche als antirheumatisch gelten (Colchicum, Guajacum, Tart. stib.), oder mit Sedativa (Aq. Amygd. amar.). Äusserlich dient es zu schmerzstillenden Einreibungen (in Wasser oder aromatischen Aufgüssen gelöst), Salben (1:5–10 Fett) und Pflastern. v. Ammon liess es mit Opium und Speichel in die Schlafengegend bei Ophthalmia arthritica einreiben.

2) **Extractum Aconiti siccum; Trocknes Eisenhutextract.** Das vorige mit ää Süssholzpulver, zur Anwendung in Pulverform, in doppelter Dosis wie Extr. Aconiti.

3) **Tinctura Aconiti; Aconittinctur, Eisenhuttinctur, Sturmhuttinctur.** Macerationstinctur, mit 10 Th. Spir. dil. bereitet, braungelb. Maximale Einzelgabe 0,5, maximale Tagesgabe 2,0. Innerlich zu 0,3–1,0 mehrmals täglich. In Tropfenform bei Rheumatismus (mit Tinctura Colcici) oder bei Neuralgien

(nach Gabalda abwechselnd mit Chinin); äusserlich für sich oder mit hautreizenden und schmerzstillenden Mitteln (Chloroform, Tinct. Bellad.) bei schmerzhaften Affectionen zu Einreibungen. Zum Coupiren von Erkältungskrankheiten dient die Tinctur meist in sehr kleinen Dosen, anfangs 5 Tropfen, später stündlich 1—2 Tropfen in Zuckerwasser (Spark). Man thut übrigens bei der Dosirung zum inneren Gebrauche überhaupt wohl, nicht über 5—10 Tropfen hinauszugehen, zumal da in anderen Ländern, z. B. Oesterreich, eine stärkere Tinctur (1:5) officinell ist. Für äusserliche Zwecke ist genaue Signatur zur Vermeidung von Verwechslung zu internem Gebrauche, wodurch wiederholt selbst tödtliche Vergiftung herbeigeführt wurde, höchst nöthig. Ueberhaupt ist die Abgabe von Aconitpräparaten sub sigillo veneni zweckmässig.

Die Tinctur ersetzt ältere mit anderen Extractionsmitteln, meist aus frischen Blättern oder Knollen gemachte und dann weit weniger active Auszüge, z. B. die in Frankreich officinelle Alcoholatura Aconiti, von der Simon bei Kindern 200 Tropfen verabreichte, ohne dass Nebenerscheinungen eintraten, die Tinct. Aconiti aetherea und acida, die Essentia Kaempferi s. Tr. Aconiti salina.

#### 5. Ordnung. Neurotica vasomotoria, vorzugsweise auf die Vasomotoren wirkende Stoffe.

Zu dieser Abtheilung gehört nur das in der neueren Zeit viel benutzte Amylnitrit nebst einigen verwandten Stoffen, von denen das Nitroglycerin bereits S. 354 abgehandelt wurde.

##### *Amylium nitrosum*; Amylnitrit.

Ein in neuester Zeit ausserordentlich häufig verwendetes Mittel stellt das früher als Aether amylo-nitrosus s. Aether amylicus nitrosus s. Amylenum nitrosum bezeichnete Präparat dar, in welchem zuerst Brunton ein wahrscheinlich durch Einwirkung auf die peripherischen Gefässnerven den Blutdruck stark herabsetzendes Mittel erkannte, das in Folge davon bei verschiedenen angiospastischen Neurosen in Anwendung gezogen wurde.

Die von Ballard (1844) entdeckte Verbindung  $C^5H^{11}NO^2$ , welche beim Erwärmen von Fuselöl mit Salpetersäure entsteht, bildet eine klare, gelbliche, flüchtige Flüssigkeit von nicht unangenehmem fruchtartigem Geruche, die, kaum löslich in Wasser, sich in allen Verhältnissen mit Weingeist und Aether mischt, bei 77—99° siedet und angezündet mit gelber, leuchtender, russender Flamme verbrennt. Bei der Bereitung können sich leicht Nebenproducte bilden, namentlich Blausäure, von welcher das officinelle Präparat selbstverständlich vollständig frei sein muss. Durch Aufnahme von Wasser findet leicht Zersetzung des Amylnitrits statt, wobei Salpetersäure frei wird, die ihrerseits wieder den entstehenden Amylalkohol zu Baldriansäure oxydirt. Das Präparat muss vor Licht geschützt über einigen Krystallen von Kaliumtartrat aufbewahrt werden.

Schon 1859 fand Guthrie, dass eine geringe Menge des Dampfes beim Einathmen Röthung des Gesichts, Beschleunigung der Herzaction und starkes Klopfen der Carotiden bedinge. Diese Erscheinungen zeigen sich regelmässig bei Inhalation weniger (2—5) Tropfen Amylnitrit, wobei die Röthung nicht immer auf Gesicht, Ohren, Bindehaut und Hals sich beschränkt, sondern bei stärkerer Einwirkung anfangs fleckig, später diffus, sich auf die Brust, Arme und zuweilen bis in die Schamgegend ausdehnt. Mit der gleichzeitig eintretenden Vermehrung der Pulsfrequenz, die nach wenigen Minuten bereits wieder

vollständig verschwindet, verbindet sich qualitative Veränderung der Pulscurve, indem der absteigende Schenkel plötzlich abfällt und monokrot wird. Mit diesen bei gesunden und kranken Menschen constanten objectiven Erscheinungen verbindet sich Schwindelgefühl von verschiedener Intensität mit der Empfindung von Hitze und starkem Herzklopfen, mitunter gesteigerte psychische Erregung wie beim Rausche, manchmal Lachkrampf (Schramm) und selbst choreaähnliche Erscheinungen (Black). Nach Ladendorf wird die Kopftemperatur bei Amylnitritinhalation constant gesteigert, ebenso die Achselhöhlentemperatur. Bei einzelnen Individuen können schon kleine Mengen krampfhaft tiefe Inspirationen mit Kühle der Haut, kaltem Schweiss und kleinem Pulse bedingen (Samelsohn, Sander). Derartige Collapsphänomene kommen auch mitunter bei Personen vor, welche an den Gebrauch des Amylnitrits gewöhnt sind (Urbantschitsch).

Bei Thieren sind die Erscheinungen der Gefässerweiterung die nämlichen; bei Warmblütern wird zunächst ein rauschartiger Zustand hervorgerufen, auf welchen Stupor und Muskelschwäche folgt, dann kommt es zu klonischen Krämpfen und Zittern, worauf allgemeine Resolution mit Anästhesie und Lähmung der Sphinctern folgt; das Blut zeigt eigenthümliche chokoladebraune Farbe (Binz und Pick, Amez-Droz, Veyrières). Bei der Vergiftung wird die Temperatur im Rectum ausserordentlich stark herabgesetzt, während die Temperatur des Rumpfes gesteigert ist (Veyrières). Amylnitritdampf vernichtet rasch bei directem Contact die Muskelreizbarkeit und lähmt glatte Muskelfasern (Pick). Bei grösseren, nicht letalen Dosen entsteht beträchtlicher Zuckergehalt des Harns, mitunter bei stark vermehrter Diurese (Hoffmann). Nach den verschiedenen physiologischen Versuchen ist die hauptsächlichste Wirkung des Amylnitrits die zuerst von Brunton constatierte starke Herabsetzung des Blutdrucks, über deren Ursache die Anschauungen auseinander gehen. Die Meisten betrachten mit Brunton die Wirkung als eine periphere, da Amylnitrit auch nach Durchschneidung des Halsmarks noch weiteres Sinken des Blutdruckes bewirkt und andererseits, selbst in starken Dosen, die Erregbarkeit der vasomotorischen Nervenstämmen (Splanchnicus) zwar stark herabsetzt, aber nicht vernichtet, besonders aber weil die Wirkung auch bei Ausschluss der gesammten Blutzufuhr zum Gehirn, nicht aber bei ausschliesslicher Zuleitung des Amylnitrits zum Gehirn eintritt (S. Mayer u. Friedrich). Pick supponirt directe Einwirkung auf die Gefässmuskeln. Die mit dem Sinken des Blutdrucks einhergehende Vermehrung der Herzschlagzahl ist nach S. Mayer u. Friedrich Folge einer Herabsetzung des Vagustonus, dessen Erregung durch Sauerstoffverarmung des Blutes vom Amylnitrit aufgehoben wird; bei sehr grossen Dosen resultirt Herzschlagverlangsamung durch directe Wirkung auf das Herz (Filehne). Das Athemcentrum wird vom Amylnitrit anfangs direct erregt und bei starken Dosen später herabgesetzt. Die Reizbarkeit der peripherischen Nerven und der Muskeln wird bei Vergiftung nicht afficirt (Eulenburg und Guttman, Mayer und Friedrich). Die durch Amylnitrit verursachten Krämpfe resultiren durch Reizung im Hirn und im verlängerten Mark belegener Centren; andererseits werden die durch directe Reizung des Gehirns resultirenden Krämpfe durch Amylnitrit aufgehoben. Amylnitrit erzeugt nach Versuchen an Thieren auch in der Pia mater deutliche Erweiterung der Gefässe; auch die in der Chloroformnarkose verengten Arterien der Hirnhäute erweitern sich, während gleichzeitig Respiration und Puls unter Amylnitritinhalation beschleunigt werden.

In rationeller Weise hat man Amylnitrit bei verschiedenen Krankheitszuständen verwendet, welche auf Krampf oder excessiver Spannung in den Arterien beruhen oder bei denen Anämie des Gehirns und anderer Nervegebiete die rationelle Grundlage verschiedener Krankheitsformen darstellt. Das Mittel fand zunächst in England bei Angina pectoris (Brunton, Madden) erfolgreiche Anwendung und steht bei uns besonders bei Hemicrania angiospastica in Ruf, wo schon die Inhalation weniger Tropfen zum sofortigen vorübergehenden Verschwinden des Schmerzanfalls führt. Auch bei anderen, auf Anämie oder Gefässkrampf beruhenden Neuralgien, wie Gesichtsschmerz (Evans), Cardialgie (Fuckel), Cervicobrachialneuralgie (Kurz), Menstrualkolik u. a. hat es Empfehlung gefunden. Riegel sah bei Bleikolik durch Amylnitritinhalation gleichzeitig die Schmerzen und die Spannung der Arterien schwinden. Mehr-



fach gebraucht ist Amylnitrit auch bei Epilepsie, besonders mit vasomotorischer Aura (Crichton Browne). Hier kann es den Anfall coupiren, scheint aber die Zahl der Anfälle nicht zu vermindern, und in einzelnen Fällen sogar verschlimmernd zu wirken (Hoegh, Finkelnburg). Bei ischämischen Psychosen, namentlich Melancholie, ist Amylnitrit oft von überraschendem Nutzen (Meynert, Schramm), jedoch mehr bei Melancholia cum stupore, als bei der mit Angstgefühlen complicirten Form (Hoestemann). Einzelne Erfahrungen sprechen auch für die Anwendung bei periodischem Schwindel (Zuntz), hysterischem Blepharospasmus und bei Kinderconvulsionen (Engel). Bei Hysterie sind die Erfolge im Allgemeinen nicht günstig. Steinheim u. Heldt rühmen Amylnitrit bei Amblyopie mit Blässe des Opticus und der Retina, Michael und Urbantschitsch bei Ohrensausen und Otalgie. Blake sah in einem Falle von Basedowscher Krankheit Exophthalmus, Palpitation und Oedem schwinden, während das Struma zurückblieb.

Die Verwendbarkeit des Amylnitrits zur Wiederbelebung bei Ohnmachten und Erstickung, auf welche bereits Guthrie hinwies, und welche die physiologische Wirkung auf Herz und Athemcentrum zweifelsohne rechtfertigt, hat sich bei verschiedenen Aerzten in ausgezeichnete Weise bewährt. O'Neill rettete einen an mehrstündiger Syncope liegenden Herzkranken durch Amylnitriteinathmung, wobei angeblich 8,0 verbraucht wurden; Kurz empfiehlt das Mittel bei drohender Herzparalyse. Das Cheyne-Stokesche Athemphänomen kann durch Amylnitrit beseitigt werden (Filehne). Maximowitsch benutzte Amylnitrit mit Erfolg bei Kohlendunstvergiftung und erklärt es für das beste Belebungs-mittel bei Ohnmachten. Auch bei Chloroformsyncope wird es von englischen und amerikanischen Aerzten (Munro, Border u. A.) gerühmt. Gray empfahl Amylnitrit als Antidot gegen Strychninvergiftung, Clapham gegen Seekrankheit.

Man wendet das Amylnitrit vorzugsweise zur Inhalation an, wozu man 1—3 Tropfen auf ein Stück Löschpapier, Watte oder ein Tuch gießt. Die Einathmung geschieht in aufrechter Stellung und unter gehöriger Beobachtung des Kranken, so dass beim Eintritt der physiologischen Effecte die Inhalation sofort ausgesetzt wird. Bei der ausgesprochenen Differenz der Toleranz einzelner Individuen für das Mittel beginne man stets mit 1 Tropfen versuchsweise, überlasse aber überhaupt niemals die Inhalation dem Kranken allein oder vertraue diesem doch höchstens zu eigener Verwendung 2 Tropfen an (Urbantschitsch). Da zersetztes Amylnitrit leicht zu Hustenreiz führt, ist es zweckmässig, dasselbe nach Vorschrift der Phkp. über einigen Krystallen Kaliumtartrat oder nach Pick und Urbantschitsch mit etwas Magnesia oder Chlorcalcium in einem mit Glasstöpsel oder einem mit Metallhülse verschlossenen Gläschen aufzubewahren. Strassburg empfiehlt die Aufbewahrung in luftdicht verschlossenen Gefässen auf Charpie; Solger in zugeschmolzenen Lymphröhrchen, die unmittelbar vor der Anwendung in einem Leinwandläppchen vor Mund oder Nase des Patienten zerbrochen werden. Maximowitsch empfiehlt eine Verbindung von 8 Th. Amylnitrit und 1 Th. Spiritus nitrico-aethereus. Bei Zahnschmerz bringt es Atkinson pure auf Baumwolle in die Zahnhöhle.

Die mitunter versuchte innerliche und subcutane Anwendung giebt nicht so gute therapeutische Resultate wie die Inhalation. Man kann innerlich 2—5 Tropfen und vielleicht noch mehr auf Zucker geben, da selbst bei Inhalation 10 Tropfen und mehr bei nicht besonders empfindlichen Individuen ohne Nebenwirkungen gegeben werden können.

Das dem Amylnitrit isomere, gleich riechende, bei 160° siedende Nitropentan wirkt nicht in gleicher Weise auf die Gefässe, sondern erzeugt epileptiforme Krämpfe nach Art des Pikrotoxins, lebhafte Darmperistaltik, Speichelfluss und Mydriasis (Filehne, Schadow).

**Spiritus Aetheris nitrosi, Spiritus nitroso-aethereus, Spiritus nitrico-aethereus, Spiritus Nitri dulcis; Versüsster Salpetergeist.**

Das Präparat wird in der Weise erhalten, dass von 48 Th. Spiritus und 12 Th. Acidum nitricum aus einer gläsernen Retorte 40 Th. abdestillirt werden,

das Destillat mit Magnesia neutralisirt und nach 24stündigem Stehenlassen und Decanthiren aufs Neue im Wasserbade der Destillation unterworfen wird. Man erhält so eine klare, angenehm ätherisch, Borsdorfer Aepfeln ähnlich riechende und angenehm süsslich schmeckende, fast farblose Flüssigkeit von 0,840—0,850 spec. Gew., welche im Wesentlichen eine Lösung von Aethylnitrit oder Salpetrigsäure-Aethyläther in Weingeist darstellt, übrigens auch Aldehyd, Essigäther und selbst Essigsäure (bei Contact mit Luft leicht entstehend) enthält. Die Dämpfe dieses Präparats sollen nach Flourens weit heftiger als die des Aethers wirken und leicht Krämpfe, Alterationen in der Farbe und Beschaffenheit des Blutes, Lähmung und Tod bedingen. In praxi dient es übrigens kaum zu etwas Anderem wie als aromatischer Zusatz zu bitteren Mixturen, als Carminativum und als Diureticum. In letzterer Beziehung fand Nunneley bei Gesunden die Harnmenge unbedeutend vermehrt und die festen Harnbestandtheile ein wenig verringert. Die Hauptwirkung muss auf das Aethylnitrit,  $C^2H^5NO^2$ , bezogen werden, welches eine farblose, angenehm ätherisch riechende Flüssigkeit darstellt und nach den Versuchen von B. W. Richardson in ähnlicher Weise wie Amylnitrit inhalirt Pulsbeschleunigung, Kopfschmerz und Gefässerweiterung bedingt und zu 5 Tropfen inhalirt Thiere tödtet. Es ist nicht mit dem Aethylnitrat oder Salpetersäureäther,  $C^2H^5NO^3$ , zu verwechseln, der nach Chambert anästhesirend wirkt, aber langsamer als Aether, starke Muskelrigidität bedingt und leicht den Tod herbeiführt.

---

## XII. Classe. Pneumatica, Respirationsmittel.

Schon in früheren Abschnitten wurde eine Anzahl von Medicamenten besprochen, welche bei Krankheiten der Respirationsorgane verwendet werden, um auf katarrhalisch afficirte Schleimhäute der einzelnen Abschnitte heilsam zu wirken. In dieser Richtung dienen z. B. die Alkalicarbonate und verschiedene Alkalisalze, die Mehrzahl der adstringirenden Mittel (Tannin, Gallussäure, Bleizucker u. s. w.), sowie diverse ätherisch-ölige Mittel (Terpenthinöl, Ammoniacum u. a.), welche man früher unter der Bezeichnung Balsamica zusammenfasste. Ausser den bereits erwähnten, in anderen Beziehungen für die Therapie wichtigeren Substanzen giebt es noch eine kleine Anzahl von Medicamenten, welche ausschliesslich bei Affectionen der Athemwerkzeuge benutzt werden und die wir hier unter dem Namen Pneumatica vereinigen. Die auf diese Mittel bezüglichen allgemeinen pharmakodynamischen Facta wurden schon S. 89 angegeben.

### **Radix Senegae, Radix Polygalae Senegae s. Virginianae; Senegawurzel.**

Die Senegawurzel stammt von *Polygala Senega* L., einer in Canada und verschiedenen Staaten der Nordamerikanischen Union in trockenen, felsigen Wäldern vorkommenden Polygalae. Die Droge stellt den knorrig-igen, mit zahlreichen Stengelästen und röthlichen Blattschuppen versehenen Wurzelkopf nebst der oben geringelten, höchstens 1,5 Cm. dicken Wurzel und ihren wenigen bis 2 Cm. langen, einfachen Aesten dar. Charakteristisch für die Droge ist der um den Wurzelast herumlaufende schwache Kiel, welcher aus einseitiger Entwicklung der Bastfasern hervorgeht. Die Senegawurzel hat eine aussen gelbliche oder graubraune, nicht über 1 Mm. dicke Rinde; der marklose Holzcylinder ist an zahlreichen Stellen eingerissen und ausgehöhlt. Die Droge enthält kein Stärkemehl, schmeckt anhaltend scharf kratzend, kaum bitter und besitzt einen eigenthümlich ranzigen, jedoch schwachen Geruch, welcher besonders beim Kochen mit Wasser hervortritt. Der Staub wirkt stark irritirend auf Nase und Fauces. In einzelnen Gegenden wird auch die wenig gekielte Wurzel einer anderen Polygalaart gesammelt. Oft ist der Handelswaare die spindelförmige und mehlig-e Wurzel von *Panax quinquefolius* L. und das ganz anders gestaltete Rhizom von *Cypripedium pubescens* Wild. beigemengt.

Das wirksame Princip ist Saponin oder ein demselben ausser-



ordentlich nahe verwandtes Glykosid (Senegin oder Polygalasäure).

Nach Christophsohn giebt die Wurzel 2% Senegin, das am reichlichsten in den Wurzelästen sich findet (Schneider). Die Droge enthält ausserdem noch wenig ätherisches Oel, Harz, gelben Farbstoff, Apfelsäure und Zucker (nach Rebling 7%).

Ursprünglich von den Seneka-Indianern als Mittel gegen Klapperschlangenbiss gebraucht (Seneka rattle snake root), wurde die Wurzel von Tennent (1734) bei Pneumonie und Pleuritis empfohlen und gilt noch bis auf den heutigen Tag in Nordamerika und England als ein in diesen Krankheiten, besonders beim Stocken des Auswurfs, indicirtes Mittel, wie überhaupt als Expectorans bei diversen Affectionen der Athemwerkzeuge (Bronchialkatarrh, Asthma, Keuchhusten etc.).

Man schreibt der Wurzel eine secretionsbefördernde Wirkung zu, welche besonders an der Respirationsschleimhaut sich zu erkennen geben soll. Kleine Dosen Senegin (0,02) verursachen nur etwas scharfen, bitteren Geschmack und Kratzen am Gaumen, 0,1–0,2 Hustenreiz und Vermehrung des Bronchialsecrets, sonst aber keine Beschwerden (Schroff). Auf Thiere wirkt es minder stark giftig wie Saponin aus *Agrostemma Githago* oder *Quillaja Saponaria*, ist aber qualitativ in seiner Action nicht different. Hunde werden durch 0,2 bis 0,4 intern getödtet (Schroff). Hustenreiz und vermehrte Schleimsecretion fand auch Boecker bei Versuchen mit kleinen Mengen Senegawurzel an gesunden Individuen, daneben Coryza und leichten Bindehautkatarrh bei Einzelnen; die Kohlensäureausscheidung durch die Lungen wurde stark gesteigert, die Diurese nur wenig vermehrt. Grössere Dosen bedingen Salivation, Erbrechen und wässrige Stühle.

Die Senega scheint nach Stokes, Traube u. A. vor Allem indicirt, wenn schleimig-eitrige oder eitrig-schleimige Sputa in den Bronchien angehäuft sind, daher vorzugsweise im 2. Stadium acuter Bronchialkatarrhe und bei Pneumonie im Stadium der Resolution. Die günstigen Effecte in diesen Verhältnissen lassen sich vielleicht aus dem Einflusse des Saponins auf das respiratorische Centrum (vgl. S. 836) erklären. Bei spärlichen und zähen Sputa passt Senega nicht. Nothnagel hält dieselbe für contraindicirt beim Fieber, was bei der herabsetzenden Action des Saponins auf die Temperatur wohl kaum richtig ist. Bei der feindseligen Wirkung auf Magen und Darm ist das Mittel jedenfalls bei bestehenden Magen- und Darmkatarrhen zu meiden. Bei Phthisikern ist es wegen Beeinträchtigung der Digestion nicht empfehlenswerth, überhaupt für längeren Gebrauch ungeeignet. Dies spricht auch gegen die Anwendung, welche ältere Aerzte zur Beförderung der Aufsaugung von Exsudaten und namentlich eitrigen Exsudaten von der Senega machten (Wendt, v. Ammon). Das Mittel sollte namentlich bei derartigen Augenaffectionen wirken und wurde geradezu dem Calomel als vegetabilisches Calomel zur Seite gestellt.

Man giebt die Senega zu 0,5–2,0 mehrmals täglich, am besten im Aufgusse oder Decoct (1:10–20 Colatur).

Pulver sind wegen der Schärfe stets in Haferschleim oder Zuckerwasser zu geben.

#### Präparate:

**Syrupus Senegae; Senegasyrup.** Macerat von 5 Th. Senegawurzel mit 5 Th. Weingeist und 45 Th. Wasser; in 40 Th. der filtrirten Colatur 60 Th. Zucker gelöst, gelblich. Als Zusatz zu expectorirenden Mixturen.

Früher war auch ein trocknes, wässrig spirituöses Extract, Extractum

Senegae, officinell, das man zu 0,2—0,5 mehrmals täglich in Pillenform verabreichte.

**Radix Pimpinellae, Radix Pimpinellae albae; Bibernellwurzel.**

Von zwei durch ganz Europa und einen Theil von Asien auf Wiesen und Triften verbreiteten Umbelliferen, *Pimpinella Saxifraga* L. und *Pimpinella magna* Pollich., stammt die eigenthümlich bockartig riechende und aromatisch und scharf beissend schmeckende Bibernellwurzel, welcher im Handel gar nicht selten die Wurzeln anderer Umbelliferen, namentlich die minder scharf schmeckenden von *Heraclium Sphondylium* L. (Bärenklau), substituirt werden. Das geringelte mehrköpfige Rhizom trägt bisweilen noch Reste der Blattstiele und Stengel und geht nach unten in die runzligen und höckrigen, bis 2 Dm. langen und bis 15 Mm. dicken Wurzeln über. Auf dem Querschnitte unterscheidet man die weisse oder röthlichweisse, grosslückige Rinde von dem ungefähr gleich breiten, gelben Holzcylinder; in der Rinde finden sich zahlreiche grosse rothgelbe Balsamgänge, einreihig radial geordnet. Eine als *Pimpinella nigra* Willd. bezeichnete Varietät führt im Frühling blauen Balsam. Nach Bley enthält die Bibernellwurzel ein nach Petersilie riechendes Oel (0,38 % in *Pimp. nigra*), 10 % Harz und Zucker. Buchheim will daraus einen in Alkohol löslichen, krystallinischen Stoff, welcher in alkoholischer Lösung sehr scharf und brennend schmeckt und von ähnlichen Umbelliferenstoffen, z. B. Peucedanin, verschieden ist, isolirt haben.

Die *Radix Pimpinellae* verdankt ihren Ruf als Arzneimittel besonders Stahl und seiner Schule, welche sie nicht allein als Expectorans bei Katarrhen der Respirationsorgane, sondern auch bei Magenkatarrhen und Hydrops empfahlen. Inwieweit die von Harnisch befürwortete *Pimpinella nigra* Vorzüge besitzt, steht dahin, dagegen hat *P. magna* wegen ihrer stärkeren Rinde und ihrer zahlreichen, weiteren Balsamgänge wohl entschieden schärfere Wirkung. Die neuere Medicin hat die *Pimpinella* fast complet aufgegeben; beim Volke steht sie noch immer in Ruf bei Anginen und Heiserkeit, wo vielleicht, besonders bei chronischen Formen, günstige Action durch ihr scharfes Princip möglich ist, ähnlich wie durch Capsicum in den Tropenländern.

Man kann die Bibernellwurzel zu 0,3—1,5 3—4 mal täglich in Pulver, Pillen oder im wässrigen Aufgusse (1:5—10), der übrigens von dem scharfen Princip nur äusserst wenig aufnimmt, verordnen. Man benutzt die Droge auch als Kaumittel, zu Zahnpulvern und (im Aufgusse) zu Collutorien und Gargarismen. Die Phkp. hat auch die **Pimpinelltinctur, Tinctura Pimpinellae** (mit 5 Th. Spir. dil. bereitet, gelbbraunlich), aufgenommen, die, zu 20—30 Tr. auf Zucker, als Abortivmittel bei Anginen populär ist und auch in Mixturen (besonders im Linctus) verordnet wird. Ein schwärzlich-braunes Spiritus-extract war als *Extractum Pimpinellae* vor Jahren sehr gebräuchlich, besonders als Constituens für expectorirende, resolvirende und diuretische Pillen (z. B. *Pilulae Heimii*).

**Verordnung:**

R  
*Tinct. Pimpinellae* 5,0  
*Liq. Ammon. anisati* 3,0  
*Mucilag. Gi. Arabici*  
*Syrup. Amygdalarum aā* 15,0  
*Aq. Amygdalar. amar. dilutae* 50,0 |

*M. D. S.* 2—3stündlich 1 Theelöffel.  
 (Leipziger Hustensaft.)

**Fructus Anisi vulgaris, Semen Anisi vulgaris, Semen Anisi; Anis, gemeiner Anis. Oleum Anisi, Anisöl.**

Der Anis stammt von einer in Aegypten, Kleinasien und auf den Griechi-

schen Inseln einheimischen einjährigen Umbellifere, *Pimpinella Anisum* L. s. *Anisum vulgare* Gaertn., welche in vielen europäischen Ländern, bei uns in Franken, Sachsen und Thüringen, cultivirt wird. Er bildet ein rundlich eiförmiges, von den Resten der Griffel gekröntes, mit 10 graden, glatten, etwas helleren Rippen durchzogenes, leicht in die beiden Theilfrüchtchen spaltbares Doppelachänium von ziemlich eiförmiger grünlich grauer Farbe und durch kurze Börstchen rauher Oberfläche, welche ebenso wenig wie die Berührungsfläche der Theilfrüchtchen Oelgänge erkennen lassen. Die Frucht erreicht etwas über dem Grunde einen Durchmesser von 3 Mm., verschmälert sich sehr nach oben und hat eine Länge von 5 Mm. Der Anis besitzt einen süsslich gewürzhaften Geruch und Geschmack. Den Hauptbestandtheil bildet ein ätherisches Oel, das Anisöl, welches bis zu 2% in den Früchten enthalten ist, übrigens meist nicht aus diesen, sondern aus den durch Absieben des Anis enthaltenen Abfällen, der Anisspreu, durch Destillation erhalten wird. Es ist ein Gemenge von einem Eläopten und Stearopten von gleicher chemischer Zusammensetzung, dem festen und flüssigen Anethol,  $C^{10}H^{12}O$ , welches sich auch in den Oelen von *Foeniculum officinale*, *Illicium anisatum* und *Artemisia Dracunculus* findet. Das Anisöl bildet in der Kälte eine weisse Krystallmasse, geschmolzen eine farblose, stark lichtbrechende, sehr aromatische Flüssigkeit von 0,980—0,990 spec. Gew., die sich mit Weingeist klar mischt.

Der Anis und das Anisöl gelten als expectorirend und als carminativ, auch als die Milchsecretion befördernd und emmenagog, doch sind keine pharmakologischen Versuche vorhanden, welche ihnen diese Wirkungen in anderem Maasse als anderen Olea aetherea vindicirten. Als Gift wirkt das Oel bei Säugethieren erheblich schwächer als andere (doch stärker als Fenchelöl), indem es zu 12,0 bei Katzen nicht tödtlich wirkt und zu 15,0—20,0 Hunde nicht afficirt (Strumpf, Magnan), dagegen sehr deleter auf Morpionen, Kopfläuse und Krätzmilben, die es in 10 Minuten tödtet (Küchenmeister). Auf die Haut wirkt Oleum Anisi reizend. Bei Katzen sah Strumpf sehr frequenten Herzschlag, grosse Mattigkeit, vermehrte Diurese, Obstipation und grossen Durst. 1 Tropfen auf die blosse Haut unter die Flügel eines Kanarienvogels gebracht bedingte Schmerzensäusserung, Narkose und Tod in 4 Stunden.

Man kann die Fructus Anisi zu 0,5—1,5 in Pulver, Species oder Latwerge, am zweckmässigsten im Infus (1:5—20), das Oleum Anisi zu 1—5 Tropfen als Elaeosaccharum reichen. Letzteres kann in fetten Oelen, Spiritus oder Linimentum volatile gelöst äusserlich als Hautreiz benutzt werden. Früher waren ein destillirtes Wasser, Aqua Anisi (als angenehmes Vehikel, auch gegen Kolik und Augenschwäche innerlich), ferner ein Spiritus und Syrupus Anisi officinell. Das Oleum Anisi ist ein Bestandtheil des Liquor Ammoniaci anisatus und der Tinctura Opii benzoica; die Früchte ein solcher des Brustthees.

In letzterem waren sie früher durch den bisher officinellen Sternanis, *Fructus Anisi stellati* s. *Semen Anisi stellati* s. *Badiani*, die Frucht eines noch nicht genauer bekannten Baumes aus der Gattung *Illicium* (Fam. Magnoliaceae), welcher in Cochinchina einheimisch ist und in China cultivirt wird und welchem Linné den Namen *Illicium anisatum* gab, ersetzt. Diese Droge besteht aus 8 sternförmig im Quirl einreihig um eine kurze Centralsäule vereinigten, linsenförmig plattgedrückten Karpellen, welche verholzt und der Länge nach an der Bauchnaht aufgesprungen sind, wodurch der in jeder Karpelle befindliche glänzende, dunkelbraune, aufrecht stehende Same sichtbar wird. Die Karpellen besitzen einen angenehmen, gleichzeitig an Anis und Fenchel erinnernden Geruch und einen süssen und aromatischen Geschmack mit säuerlichem Beigeschmacke. Der wesentliche Bestandtheil ist ein ätherisches Oel, welches frisch wasserhell, später gelblich wird und wie das Anis und Fenchelöl ein Gemenge von flüssigem und festem Anethol ist; ausserdem enthält der Sternanis Zucker und fettes Oel. Man hat die Droge aus der Pharmakopoe entfernt, weil dieselbe mit den Früchten von *Illicium religiosum* Sieb., dem sog. Japanischen Sternanis oder den Sikkimifrüchten, in denen ein stickstoffreicher, nicht glykosidischer Stoff, welcher nach



Art des Pikrotoxins heftige Krämpfe erregt, verfälscht wird, wodurch in den letzten Jahren mehrere Vergiftungsfälle in Holland und Nordwestdeutschland herbeigeführt wurden. Die Sikkimfrüchte sind meist um ein Drittel kleiner, von hellerer Farbe, die Karpellen runzelig, am Ende mehr schnabelförmig umgebogen, die Samen gelbbraun, an einem Ende mit einer vorspringenden Spitze versehen; der Geschmack ist nicht süß, sondern unangenehm scharf und etwas bitter, der Geruch nicht anisartig, mehr an Cubeben erinnernd.

Zu den wegen eines Gehalts an aetherischem Oel als Expectorantia benutzten Drogen gehört auch die *Herba Lippiae Mexicanae*, von einer mexikanischen Verbenacee, welche nach Podwissotzki ein sauerstoffhaltiges aetherisches Oel (Lippienöl) und einen Campher (Lippiol) enthält. Man giebt eine aus den Blättern und Blüthen mit Weingeist bereitete Tinctur zu 2,0 oder theelöffelweise 3—4 stündlich gegen Hustenreiz (Saxton). Ausserordentlich günstig soll auch ein Fluidextract aus den Blättern der chilenischen Myrthacee *Eugenia Chekan*, zu 8,0—15,0 4stündl. in Wasser verabreicht, bei chronischer Bronchitis mit Emphysem und auch bei Phthisikern wirken (Murrell). In Chile, wo die Pflanze auch als Cheken bezeichnet wird, steht das Extract im besonderen Rufe als Stypticum bei Hämoptysis, auch als Stomachicum und Diureticum; auch benutzt man einen Aufguss der Blätter zu Inhalationen bei Diphtherie, Laryngitis, Bronchitis und Bronchorrhoe, sowie zu Injectionen bei Gonorrhoe, Leukorrhoe und Blasenkatarrh. In ähnlicher Weise sind auch die Blätter unserer gewöhnlichen Myrthe im Aufguss bei chronischem Bronchialkatarrh und bei mucös purulenten Affectionen der Harnwege empfohlen (Delioux de Savignac). Alle diese Drogen enthalten übrigens auch Gerbsäure, welche die secretionsbeschränkende Wirkung wesentlich unterstützt. Bei der Myrthe ist der Tanningehalt so gross, dass die Blätter geradezu hämostatisch wirken.

*Turiones Pini*, *Gemmae Pini*, Fichtensprossen, Fichtenknospen. — Zu den balsamischen Medicamenten gehören die von unserer Fichte oder Kiefer, *Pinus sylvestris* L., im Frühjahr gesammelten und schnell getrockneten Sprossen, welche frisch von ausgeschwitztem Harze klebrig und auch getrocknet von starkharzig balsamischem Geruche und bitterem harzigem Geschmacke sind. Sie enthalten neben einem eigenthümlichen Terpenharze Wachs und einen glykosidischen Bitterstoff, das Pinipikrin. Man reicht sie bei chronischen Bronchialkatarrhen im Aufguss (1:10—20), zu 5,0—15,0 pro die oder gebraucht sie zu Inhalationen, welche letztere von Oppolzer bei Lungengangrän empfohlen wurden. Ausserdem wurden die Fichtensprossen nach Art der vegetabilischen Antidyscratica bei Gicht, Rheumatismus, chronischen Exanthenen und Secundärsyphilis benutzt. In dieser Richtung diene besonders auch eine zusammengesetzte Tinctur (aus Fichtensprossen, Guajakholz, Sassafras und Wachholderbeeren), die *Tinctura Pini composita* s. *Tinctura lignorum*, Holzinctur, welche innerlich zu 20—60 Tr. mehrmals täglich bei den genannten Affectionen gegeben wurde.

*Gemmae Populi*, *Oculi Populi*, Pappelknospen. — Die zolllangen, kegelförmigen, spitzen, von dachziegelförmig sich deckenden, braungelben, klebrigen Schuppen gebildeten, im Frühjahr gesammelten Blätter- und Blütenknospen der in ganz Europa einheimischen Schwarzpappel, *Populus nigra* L., riechen angenehm balsamisch, schmecken gewürzhaft bitter und enthalten ätherisches Oel neben Salicin und dem bis jetzt nur in der Pappelrinde und den Pappelblättern aufgefundene Populin,  $C^{20}H^{22}O^6$ , welches beim Kochen mit wässrigem Baryt oder Kalk in Salicin und Benzoësäure zerfällt. Früher als Balsamicum bei Respirationskrankheiten geschätzt und schon im Alterthume als Oelauzug (*Aegirinum*) benutzt, dienen sie noch jetzt zur Darstellung des Unguentum Populi s. *populeum*, Pappelsalbe, Pappelpomade, welche als kühlende Verbandsalbe bei entzündeten Hämorrhoidalknoten und Verbrennungen benutzt werden kann. Boerhave empfahl dieselbe bei Pleuritis und rheumatischen Nierenschmerzen. Gegenwärtig gehört sie vorzugsweise der Volksmedizin an.

**Fructus Phellandrii**, Semen Phellandrii aquatici, Semen Foeniculi aquatici s. caballini; **Wasserfenchel**, Wasserfenchelsamen, Peersaat.

Die Droge stellt die reifen, getrockneten Achänen der in fast ganz Europa und Nordasien in Gräben häufig vorkommenden Umbellifere *Oenanthe Phellandrium* Lam. (*Phellandrium aquaticum* L.) dar. Die Wasserfenchelsamen sind glatt, braun oder braungrün, manchmal purpurviolett, länglich cylindrisch, mit den Kelchzähnen und der konischen Griffelbasis gekrönt. Die meist im Zusammenhang bleibenden Fruchthälften sind 5 Mm. lang und 2 Mm. breit und zeigen auf der Rückenwölbung 3 schwächere Rippen und in jedem den 4 dazwischen liegenden schmalen Thälchen einen dunkleren Oelgang. Auch die hellgelbliche Fugenfläche zeigt 2 dunkle Oelgänge von 2 holzigen Randrippen eingefasst. Der Geruch des Wasserfenchels ist nicht besonders angenehm, der Geschmack scharf aromatisch. Der wirksame Bestandtheil des Wasserfenchels ist ein ätherisches Oel und ein dem Apiol (cf. *Fructus Petroselinii*) ähnlicher Körper (*Phellandriol*); die Angabe, dass darin ein narkotisches Princip (*Phellandrin* von Hutet) enthalten sei, beruht wahrscheinlich auf der nicht eben seltenen Beimengung giftiger Früchte im Wasser wachsender Umbelliferen, z. B. der eiförmigen, viel kürzeren Früchte von *Berula angustifolia* Koch oder gar der seitlich zusammengedrückten kugelrunden Achänen des Wasserschiefelings, zu dem analysirten Material. Das Mittel, ursprünglich bei Influenza der Pferde benutzt, wurde besonders von Marcus Herz, Hufeland und seinen Nachfolgern gegen chronische Katarrhe und Blennorrhöen der Bronchien empfohlen und hat eine Zeit lang als Schwindsuchtmittel im Ruf gestanden. Auch bei Wechselfieber, Keuchhusten und Asthma wurde es benutzt. Man kann den Wasserfenchel zu 0,3—0,6 (bei Intermittens zu 1,0—2,0) in Pulvern, Pillen oder Latwerge geben; gebräuchlicher sind Infuse (5,0—10,0 auf 100,0 Colatur). Als Corrigens dient Rad. Liquiritiae. Grössere Gaben sollen bei Phthisikern erhitzend wirken. — Früher wurde auch ein Extractum *Phellandrii* benutzt (zu 0,2—0,3 mehrmals täglich in Pillenform).

Verschiedene ähnliche in der Neuzeit wieder aufgefrischte Volksmittel gegen Husten oder Phthisis, z. B. die *Herba Scabiosae arvensis* (J. Hoppe), den durch sein Peptonisationsvermögen bekannten Sonnenthau, *Drosera rotundifolia* (Vigier), können wir als irrelevant übergehen.

**Stibium sulfuratum aurantiacum**, Sulfur stibiatum aurantiacum, Sulfur auratum Antimonii, Oxysulfuretum Antimonii; **Goldschwefel**, Sulfuraurat, Antimonsulfid.

In besonderem Rufe als Expectorans und daher in weit verbreitetem Gebrauche bei katarrhalischen Affectionen der Respirationsorgane steht der Goldschwefel, welcher sich, ebenso wie der früher in gleicher Richtung benutzte Mineralkermes, *Stibium sulfuratum rubeum* s. *Sulfur stibiatum rubeum* s. *Kermes minerale*, von dem Brechweinstein und anderen Antimonverbindungen dadurch unterscheidet, dass er weit weniger leicht den Magen afficirt und in grösseren Dosen ertragen wird.

Der Goldschwefel ist Fünffach-Schwefelantimon, welches durch Zersetzen von Antimonsulfid-Schwefelnatrium (sog. Schlipfesches Salz) mit Schwefelsäure bereitet wird und ein sehr feines, pomeranzenrothes, geruchfreies, in Wasser und Spiritus unlösliches Pulver bildet, welches sich in heisser concentrirter Salzsäure unter Zurücklassung von Schwefel löst und beim Erhitzen in Schwefel- und Antimonsulfür zerfällt. Bei längerer Aufbewahrung im Tageslichte wird Goldschwefel missfarbig unter Bildung von Antimonsulfür, bei gleichzeitigem Zutritte von Feuchtigkeit bildet sich Schwefelwasserstoff und

in geringen Mengen Thioschwefelsäure. Der Mineralkermes, welcher ein feines, rothbraunes Pulver darstellt, ist nach der bei uns gebräuchlichen Darstellungsweise keine rein chemische Verbindung, sondern ein Gemenge von amorphem (rothem) Dreifach-Schwefelantimon mit etwa 8—10% Antimonoxyd, das sich mikroskopisch als feine sechsseitige Säulen nachweisen lässt, mit höchstens 1% Antimonsulfid-Schwefelnatrium und etwa 30% Wasser (Hirsch). Durch das in ihm enthaltene Antimonoxyd ist er leichter resorptionsfähig als Goldschwefel und als der früher in einzelnen Ländern officinelle oxydfreie Mineralkermes.

Ueber die Wirkungen des Goldschwefels im gesunden thierischen und menschlichen Organismus, sowie über die Veränderungen, welche derselbe während seines Durchganges durch den Tractus erfährt, liegen ausreichende Untersuchungen nicht vor, doch ist theilweise Resorption und örtliche und entfernte Wirkung nach Art des Brechweinsteins zweifellos.

Antimonsulfid giebt beim Erwärmen mit concentrirter Salzsäure Schwefel ab und wird unter Entwicklung von Schwefelwasserstoff in Antimonchlorid verwandelt. Ein solcher Vorgang findet auch im Magen wahrscheinlich statt (Zimmermann, Bellini), worauf das gebildete Antimonchlorid mit den im Magen vorhandenen Chloralkalien zu Doppelsalzen sich verbindet. Ganz das nämliche Schicksal hat nach Bellini auch der Mineralkermes, indem das darin enthaltene Antimonoxyd, obschon dasselbe im geringen Maasse bei der Körpertemperatur in Wasser sich löst, durch die Salzsäure des Magens ebenfalls in Antimonchlorid umgewandelt wird. Nach Bellini wirkt Magensaft auf Antimonoxyd rascher lösend als auf die Schwefelverbindungen des Antimons. Im Darmcanal scheinen erhebliche Veränderungen nicht mehr vorzukommen und der grösste Theil des Goldschwefels (und Kermes) wird zweifelsohne mit dem Stuhlgang unverändert ausgeführt. Den eben angegebenen Veränderungen entspricht es auch wohl, dass der Mineralkermes örtlich eine stärker irritirende Wirkung zeigt als der Goldschwefel, welcher letztere in Dosen von 1,0—2,0 Erbrechen und Durchfall zu bewirken vermag. Eigentliche Gastroenteritis wird nach Bellini weder durch Sulphuraurat noch durch Antimonsulfür erzeugt, dagegen kann Mineralkermes in der That einen Zustand geringer Hyperämie herbeiführen. Nach Boecker soll Goldschwefel die Pulsfrequenz herabsetzen und die Sulfate im Harn, sowie die Kohlensäureausscheidung vermehren. Die Anschauung Bellinis, dass Sulf. aur. vorzugsweise durch den freiwerdenden Schwefelwasserstoff wirke, ist entschieden unhaltbar.

Der Goldschwefel findet gegenwärtig fast ausschliesslich als Expectorans Anwendung.

Der früher übliche Gebrauch als Alterans bei Scrophulose und Hautkrankheiten ist fast ganz obsolet und nur hie und da noch in Form des beim Calomel erwähnten Plummerschen Pulvers einigermaßen üblich. Als Expectorans giebt man Goldschwefel nicht nur bei fieberlosen Bronchialkatarrhen, sondern auch bei Pneumonie nach der Krise, wenn das Secret zähe und die Expectoration aus diesem Grunde beschwerlich ist. Der Kermes minerale findet vorzugsweise Anwendung in Frankreich und Italien und steht in seiner Wirkung gewissermaßen zwischen dem Sulfuraurat und dem Brech Weinstein, als dessen milderer Surrogat er betrachtet werden kann. In älterer Zeit stand der Mineralkermes unter dem Namen des Karthäuserpulvers, Pulvis Carthusianorum, Poudre des Chartreux, in grossem Ansehen bei Pneumonie und Pleuritis, ja beinahe als allgemeine Panacee. Die Angabe Thorels, dass Kermes minerale chemisches Gegengift von Strychnin sei, beruht auf Irrthum und kann derselbe höchstens durch mechanische Entfernung günstig wirken.

Man giebt den Goldschwefel zu 0,03—0,2 2—3mal täglich in Pulver, Pillen, Bissen oder Trochisken, weniger zweckmässig in Schüttelmixtur oder Lecksaft.



Die Verordnung in Schüttelmixturen ist aus verschiedenen Gründen verwerflich; einmal gehört Sulf. aur. nicht zu den mehr indifferenten Stoffen, dann ist es der spec. Schwere wegen zu dieser Form nicht passend, endlich ist die leichte Zersetzbarkeit des Mittels ein Umstand, welcher möglichst einfache Formen anzuwenden nothwendig macht. Man verordnet deshalb am besten Pulver mit Zucker oder Pasta Cacao. Zu meiden sind alle Metallsalze (selbst die früher beliebte Composition des Pulvis Plummeri mit Calomel ist bei Anwesenheit von Feuchtigkeit bald zersetzt), Säuren (weshalb zu Linetus und Schüttelmixturen nie Syr. Rubi Idaei und Cerasorum zu benutzen ist), Alkalien und Salzbilder. Organische Säuren wirken theilweise lösend und können deshalb bei gleichzeitigem Gebrauche mit Goldschwefel zu Gastroenteritis führen (Bellini). Syrupe mit viel Schleim fördern ebenfalls die Zersetzung. Waldenburg und Simon empfehlen mit Recht die Barezsehen Brustpastillen (Trochisken von 0,03 Goldschwefelgehalt), da Sulf. aur. eine der wenigen Substanzen ist, für welche alle Bedingungen der Trochiskenform vorliegen. Der Kermes minerale ist wie Goldschwefel zu verordnen, jedoch in dreimal so kleiner Dose (0,01—0,1).

## Verordnungen:

1)	R	2)	R
	<i>Stibii sulfurati aurant.</i> 0,5		<i>Stibii sulfurati aurant.</i>
	<i>Extr. Opii</i> 0,1 (dgm. 1)		<i>Camphorae tritae</i> aa 0,5
	<i>Sacchari albi</i> 5,0		<i>Sulf. dep.</i>
	<i>M. f. pulv. Div. in part. aeq. No. 10.</i>		<i>Sacchari albi</i> aa 10,0
	<i>D. S.</i> Dreimal täglich 1 Pulver. (Bei Hustenreiz.)		<i>M. f. pulv. Div. in part. aeq. No. 5.</i>
			<i>D. in chart. cer. S.</i> 2—3mal täglich
			$\frac{1}{2}$ Pulver in Fliederthee. (Pulvis diaphoreticus Ph. paup.)

**Ammonium chloratum**, Ammoniacum hydrochloratum, Sal ammoniacum depuratum, Ammonium muriaticum depuratum, Flores salis ammoniaci simplicis; **Ammoniumchlorid**, Salmiak, Chlorammonium.

Das Ammoniumchlorid,  $\text{NH}_4\text{Cl}$ , bildet weisse, harte, fasrig krystallinische Kuchen oder ein weisses Krystallpulver ohne Geruch und von unangenehm, scharf salzigem Geschmack; es ist luftbeständig, verflüchtigt sich in der Hitze ganz, ohne zu schmelzen, und löst sich in 3 Th. kaltem und in 1 Th. kochendem Wasser. In Weingeist ist es fast unlöslich. Es wurde früher fabrikmässig in Aegypten durch Sublimation des Russes von verbranntem Kameelmist gewonnen, wird aber jetzt bei uns aus dem Ammoniumcarbonat und viel brenzliche Oele enthaltenden Theerwasser oder Steinkohlengas u. a. bei trockener Destillation stickstoffhaltiger Substanzen resultirenden Flüssigkeiten nach verschiedenen Methoden dargestellt. Es dient zur Bereitung des kautischen Ammoniaks und technisch beim Löthen, Verzinnen und zu diversen anderen Zwecken; auch findet es sich bekanntlich im Magensaft.

Das Ammoniumchlorid schliesst sich in seiner Wirkung einerseits dem Ammonium carbonicum, andererseits dem Chlornatrium an. Von vorzüglicher Bedeutung betrachtet man für seine therapeutische Anwendung sein Vermögen, Mucin aufzulösen und die Epithelzellen der Schleimhäute anfangs aufzulockern und schliesslich unter Rücklassung der Kerne in eine dünnschleimige Masse zu verwandeln (C. G. Mitscherlich). Im Organismus findet theilweise Umwandlung in Harnstoff statt (Schmiedeberg).

Die ältern Pharmakologen hielten den Salmiak für ein ziemlich unschuldiges Mittel, dem sie namentlich in keiner Weise toxische Wirkung zutrauten. Nichtsdestoweniger ist dasselbe im Stande, in grösseren Dosen das Leben von

Thieren und Menschen zu vernichten, und zwar sowohl bei subcutaner Injection als bei directer Einbringung in das Blut in kleinerer Dosis als Ammoniumcarbonat (Th. Husemann) und Ammoniumsulfat (Böhm und Lange). Die eigenthümlichen Krämpfe und die Wirkung auf Athmung und Circulation, welche letztere hervorrufen, werden auch durch Chlorammonium herbeigeführt. Bei Kaninchen ist schon 1,0 subcutan injicirt im Stande, den Tod herbeizuführen. Chloralhydrat hebt die Krämpfe bei toxischen Dosen nicht auf und beschleunigt die letale Wirkung (Th. Husemann und Fliescher). Auch beim Menschen ist eine letale Vergiftung bei einem Geisteskranken, der grosse Mengen in Substanz verschluckte, beobachtet, wo ebenfalls Convulsionen und Gastritis vorkamen (Crichton Browne). Uebrigens können beim Menschen verhältnissmässig grosse Dosen tolerirt werden, ohne dass andere Erscheinungen wie die von Magenreizung, wie sie gleiche Mengen Kochsalz in gleicher Weise hervorrufen, resultiren (Jacquot). Einmalige Dosen von 0,3—0,5 machen ausser dem scharf salzigen, unangenehmen Geschmacke keine Erscheinungen; bei öfterer Wiederholung in stündlichen Intervallen können subjectives Wärmegefühl u. Unbehagen im Magen, leichtes Kopfweh und Drang zum Uriniren auftreten (Wibmer). Der Puls wird nach solchen Dosen bisweilen accelerirt, jedoch nicht immer, die Harnmenge vermehrt, dagegen die Schweissabsonderung nicht gesteigert (Rabuteau). Eine eigentlich abführende Wirkung kommt dem Salmiak selbst bei grösseren Dosen (10,0 pro die) nicht zu; dagegen wird unter dem Einflusse desselben eine grössere Menge Schleim den Faeces beigemischt. Wird Salmiak längere Zeit genommen, so stört er den Appetit und die Verdauung. Das Zustandekommen einer nach den Angaben von Huxham, Gumpert, Chaplain durch längeren Gebrauch von Salmiak verursachten Kachexie, die sich durch passive Blutungen aus Nase und Mund, Blutbrechen und Diarrhoe charakterisiren sollte, erfordert offenbar grössere Dosen und längeren Gebrauch als gegenwärtig üblich sind.

In Bezug auf die Wirkung des Salmiaks auf den Stoffwechsel wurde bereits von Boecker auf die Vermehrung des Harnstoffs hingewiesen, woneben die Kohlensäureausscheidung anfänglich vermehrt, später vermindert sein soll. Auch Rabuteau fand bei Selbstversuchen mit 5,0 Salmiak pro die Harnstoff und Harnsäure vermehrt. Die Harnstoffvermehrung findet übrigens z. Th. ihre Erklärung darin, dass das Chlorammonium ebenso wie andere Ammoniakalien im Organismus sich im Harnstoff umsetzt, doch scheidet ein gesunder Mensch nach Adamkiewicz, abgesehen von dem aus Ammoniak entstehenden Harnstoff, noch eine vermehrte Menge des letzteren ab. Bei Hunden geht Chlorammonium zum grössten Theil unverändert in den Harn über. Nach Rabuteau wird Chlorammonium auch durch die Speicheldrüsen und bei Subcutaninjection, vermuthlich auch durch die häufig nach grösseren Dosen in entzündlichem Zustande gefundene Darmschleimhaut ausgeschieden.

Seine hauptsächlichste therapeutische Anwendung findet Ammoniumchlorid bei Respirationskatarrhen, bei chronischen katarrhalischen Zuständen des Magens und der Urethra.

Bei chronischen Katarrhen ist Salmiak in Deutschland ein viel geschätztes Medicament. Auf jeden Fall passt er nur für fieberlose Zustände, oder doch nur bei Kranken, deren Fieber nachgelassen hat, somit also bei Pneumonie nur dann, wenn nach dem Eintreten der Krisis sibilirende Ronchi und erschwerte Expectorations sich finden. Man legte besonders auf die schleimlösende Wirkung des Ammoniumchlorids Gewicht und erklärte bei reichlichem und flüssigem Secret denselben für überflüssig. Eine schleimlösende Wirkung scheint indess nur dann stattzufinden, wo grössere Mengen direct mit den katarrhalisch afficirten Schleimhäuten in Berührung kommen, somit vorwaltend bei Magenkatarrh oder bei Anwendung der Verstäubung, auch bei Katarrhen der Trachea und der Bronchien. Bei Thierversuchen von Rossbach wirkte Salmiak ebenso wie Alkalien herabsetzend auf die Secretion. Der günstige Einfluss des Salmiaks bei leichten Exacerbationen chronischer Katarrhe ist jedem ältern Praktiker bekannt und der Misscredit, in welchen Chlorammonium gesunken, keineswegs völlig verdient. Freilich kann man weder durch interne Darreichung, noch

durch die neuerdings Mode gewordene Inhalation Phthisis heilen, wie dies Rösch gethan zu haben glaubt, und inwieweit die Angaben von Fish, dass die Dargereichung von 4,0—8,0 in viertelstündigen Dosen von 0,5 Diphtheritismembranen löse, Vertrauen verdient, steht dahin. — Beim sog. Status gastricus und im zweiten Stadium des acuten Magenkatarrhs steht Salmiak als Heilmittel in einer Reihe mit dem kohlensauren Natrium und scheint bei gleichzeitig vorhandenem Bronchialkatarrh sogar Vorzüge vor demselben zu besitzen. Bestehende Diarrhoe contraindicirt den Salmiak nicht, wohl aber wirkliche Entzündung der Magenschleimhaut. — Minder häufig als bei diesen Leiden kommt Salmiak bei Urethralaffectionen in Gebrauch, doch ist er namentlich bei chronischer Gonorrhoe nicht ohne Nutzen, während die grossen Dosen früher zugeschriebene Heilwirkung auf Stricturen eine illusorische ist.

Eine Benutzung des Salmiaks bei andern als den genannten Affectionen findet gegenwärtig kaum mehr statt. Man hielt ihn früher für ein Diaphoreticum und wandte ihn deshalb bei Rheumatismus und Erkältungskrankheiten überall an; doch ist die schweisstreibende Wirkung problematisch. Vor der Einführung des Iodkaliums in die Therapie war das Ammoniumchlorid ausserordentlich geschätzt als resolvirendes Mittel, namentlich zur Zertheilung vergrösserter und indurirter Drüsen (Lymphdrüsen, Leber, Prostata, Ovarien), bei Indurationen des Blasenhalses, des Uterus u. s. w. Die aus Adamkiewicz's Versuchen hervorgehende Steigerung des Eiweisszerfalls kann für die Wirkung eine Erklärung bilden. Auch bei nervösen Leiden kam es in Anwendung und neuerdings empfahl Anstie dasselbe gegen Myalgie in Folge von Ueberanstrengung bestimmter Muskeln, z. B. der Recti abdominis und Intercostales bei Näherinnen und Schustern, ferner zur Abkürzung von Migräneanfällen, sowie bei Interostalneuralgie stillender Frauen und phthisischer Individuen, endlich bei Neuralgia hepatica, wo es sogar besser als Morphininjection wirken soll. Anstie rühmt es auch als Cholagogum, Cholmeley als Emmenagogum, Fish sogar bei Cerebrospinalmeningitis. Chlorammonium ist auch ein altes Mittel bei Wechselfieber und als solches in neuerer Zeit von Aran wieder hervorgebracht, doch gaben Versuche von Jacquot unbefriedigende Resultate. Adamkiewicz empfiehlt Salmiak bei Diabetes, weil er gefunden zu haben glaubt, dass derselbe die Zuckermenge im Harn, die Harnmenge und den Dunst herabsetze, während beim Gesunden die letzteren zunehmen, doch hat Guttman von dem Mittel keinen Erfolg gesehen. Stewart rühmt Salmiak zu 1,25 bei activer Congestion der Leber.

Auch ausserlich ist Salmiak bei einer grösseren Anzahl von Krankheiten theils als gelindreizendes Mittel, z. B. als Sternutatorium bei fötidem Nasenkatarrh, zu irritirenden Injectionen behufs Wiederhervorrufung von Gonorrhoe, theils zu resolvirenden Umschlägen bei Drüsengeschwülsten, theils nach Art des Salpeters zu Kältemischungen (z. B. im sog. Liquor discutiens Vogleri) benutzt.

Innerlich giebt man Salmiak zu 0,3—1,0 mehrmals täglich, meistens in Mixturen, mit Succus Liquiritiae als Corrigens.

Pulverform ist wegen des abscheulichen Geschmacks des Salmiaks unzweckmässig; dagegen lassen sich Tabletten aus 1 Th. Salmiak und 10 Th. Lakriz oder Bacilli aus derselben Masse nehmen. Bei der Verordnung sind Natriumcarbonat und Bicarbonat, sowie die entsprechenden Kalium- und Calciumsalze zu vermeiden, weil sie zum Auftreten von Aetzammoniak Veranlassung geben, ebenso Metallsalze, welche Doppelsalze damit produciren, Calomel u. s. w.

Die in älteren Zeiten üblichen grösseren Dosen (selbst bis zu 2,5 pro dosi) kommen beim Gebrauche des Mittels gegen katarrhalische Affectionen nicht in Anwendung. Anstie empfiehlt Gaben von 0,5—1,5 bei Myalgie.

Die statt der internen Application bei Katarrhen der Respirationsorgane sehr in Aufnahme gekommene Inhalation kann in verschiedener Weise bewerkstelligt werden. Gieseler empfahl Verdampfen von Chlorammonium in Hessischen Tiegeln, welches Verfahren jedoch in manchen Fällen zu sehr irritirend auf die Respirationsorgane wirkt. Waldenburg fand bei stockendem



Auswurf Nutzen von Inhalation verstäubter Lösung (1:125 Aq. dest.). Levin, Beigel und Paasch rühmen die Inhalation von Chlorammoniumdämpfen in statu nascendi mittelst eines aus 3 Stehkolben bestehenden Apparates, von denen der eine Salzsäure, der zweite Ammoniakflüssigkeit enthält, während in dem dritten sich Wasser befindet, unter welchem die Ableitungsröhren der beiden andern münden.

Zu Kältemischungen wird Salmiak in der nämlichen Weise wie Salpeter verwendet, häufig auch zusammen mit diesem oder mit Kochsalz, wobei als Lösungsmittel Wasser und Essig oder Spiritus dienen. Zu Umschlägen verwendet Guéneau de Mussy 1—2 Th. Salmiak mit 5 Th. Decoct. cap. Papav. oder Wasser unter Zusatz von Opiumtinctur, bei scrophulösen Drüsenanschwellungen eine Salbe aus 5 Th. Chlorammonium, 1 Th. Campher und 30 Th. Fett. Ruete empfahl eine Mischung von Salmiak und Kalk zum Einstreuen in die Strümpfe zur Hervorrufung unterdrückter Fusschweisse.

#### Verordnungen:

- |  |   |
|--|---|
| <p>1)           ℞</p> <p><i>Ammonii chlorati</i> 5,0</p> <p><i>Macerati rad. Althaeae</i> (e 10,0)</p> <p style="text-align: right;">175,0</p> <p><i>Extracti Hyoscyami</i> 0,2</p> <p><i>Succi Liquiritiae</i> 10,0</p> <p><i>M. D. S.</i> Zweistündlich 1 Esslöffel.</p> | <p>2)           ℞</p> <p><i>Ammonii chlorati</i> 5,0</p> <p><i>Aq. destillat.</i> 180,0</p> <p><i>Succi Liquiritiae dep.</i> 10,0</p> <p><i>M. D. S.</i> Stündlich 1 Esslöffel voll.</p> <p>(<i>Mixtura solvens.</i>)</p> |
|--|---|

### XIII. Classe. Dermatica, Hautmittel.

Diese Classe begreift nur wenige Stoffe, da die bei verschiedenen Dermatosen in Gebrauch kommenden Mittel theils, wie die Theerpräparate, durch örtlich erethistische Action, theils, wie die Arsenikalien, auch durch ihre auf den gesammten Stoffwechsel gerichtete Action die Heilung bedingen. Es sind jedoch noch einzelne Substanzen zu betrachten, denen besondere Beziehungen zu der Schweisssecretion zukommen und welche man fast ausschliesslich gebraucht, um Veränderung der Thätigkeit der Schweissdrüsen zu bewirken, die bei den einen Vermehrung, bei den anderen Verminderung der Secretion bezweckt.

---

#### 1. Ordnung. Hidrotica, Schweisstreibende Mittel.

Das Nähere über die allgemeinen Verhältnisse der schweisstreibenden Mittel findet sich bereits S. 93—94. Eine Reihe sehr wirksamer Hidrotica (warmes Wasser, Spirituosen, diverse Ammoniakalien und Pflanzenstoffe mit Gehalt an ätherischen Oelen) haben schon bei anderen Classen Erledigung gefunden.

#### Flores Sambuci; Holunderblüthen, Fliederblumen.

Das populärste aller Diaphoretica bilden die Blüthen des in fast ganz Europa und einem grossen Theile von Asien einheimischen Holunderstrauches, *Sambucus nigra* L. (Fam. Caprifoliaceae), statt dessen in Amerika die Blüthen von *Sambucus Canadensis* benutzt werden.

Die Droge bildet der ganze Blüthenstand, dessen 5 Zweige sich in 3—5 Aeste spalten, die wiederholt gablig getheilt, zuletzt an feinen, bis 6 Mm. langen Stielchen mit einer radförmigen, weissgelben, epigynischen Blumenkrone abschliessen, welche beim Trocknen mehr schmutziggelbe Färbung annimmt. Staubfäden, Kronlappen und Kelchzähne sind je 5 an Zahl; mit den ursprünglich flach ausgebreiteten, durch das Trocknen stark eingeschrumpften Lappen

der Blumenkrone wechseln die viel kürzeren Kelchzähne ab. Die Flores Sambuci sind bei trockener Witterung zu sammeln, da sie sonst leicht braun werden. Sie haben einen unbedeutend schleimigen, etwas süßlichen, nachträglich nur wenig kratzenden Geschmack und einen eigenthümlichen, von dem widrigen Geruche der Blätter und Rinde von *Sambucus nigra* abweichenden Geruch.

Als das wirksame Princip ist ein in den Holunderblüthen nur in sehr geringer Menge vorhandenes ätherisches Oel, neben welchem sich etwas Harz und Baldriansäure findet, zu betrachten.

Das Oel setzt beim Stehen ein Stearopten ab, ist aber hinsichtlich seiner chemischen und physiologischen Eigenschaften wenig bekannt. Die frische Rinde und Blätter wirken emetokathartisch und stehen beim Volke als Mittel gegen Wassersucht im Ansehen. Die Wirkung geht durch Trocknen und durch Einwirkung höherer Temperatur verloren (Govaerts).

Man giebt die Flores Sambuci bei Erkältungskrankheiten und Katarrhen im Aufguss (1:10—20), den man meist im Hause der Kranken anfertigen lässt und häufig als Vehikel für andere schweiss-treibende und expectorirende Mittel benutzt.

Aeusserlich kommen die Fliederblumen in Form von Kräuterkissen und (im Aufguss) von Fomenten und Gurgelwässern oder zu Inhalationen in Anwendung. Unter dem Namen *Pulvis florum Sambuci compositus* s. ad Erysipelas gebrauchte man ehemals eine Mischung von Fliederblüthen, Bolus, Kreide und Weizenmehl bei Rothlauf.

Ein als *Aqua Sambuci concentrata* früher officinelles destillirtes Wasser dient mit 9 Th. dest. Wasser verdünnt zur Darstellung des Fliederblumenwassers, *Aqua Sambuci*, welches man als Vehikel oder Zusatz zu schweiss-treibenden Mixturen benutzte.

Govaerts empfiehlt einen kalt bereiteten *Succus foliorum Sambuci* zu 60,0 und einen ebenfalls kalt bereiteten *Succus corticis Sambuci* zu 15,0—30,0 als Emetocatharticum.

#### Flores Tiliae; Lindenblüthen.

Dieses etwas in Misscredit gekommene Diaphoreticum bildet die Trugdolden der verschiedenen im mittleren und nördlichen Europa wachsenden Lindenbäume, *Tilia parvifolia* Ehrh. (*T. ulmifolia* Scop.) und *T. grandifolia* Ehrh. (*T. platyphyllos* Scop.), welche bei uns hauptsächlich von der zweitgenannten Art gesammelt werden.

Bei allen diesen Tiliaarten ist der kahle Stiel bis zur Hälfte mit einem papierdünnen, deutlich durchscheinenden Deckblatte verwachsen. Bei *Tilia parvifolia* sind bis 13 gestielte Blüthen vorhanden, bei *Tilia grandifolia* nur 3 bis 5 erheblich grössere Blüthen mit dunklen, gelblichbraunen Blumenblättern. Die Lindenblüthen schmecken süßlich und riechen angenehm, doch geht der Geruch, welcher von einem in den Oberhautzellen der Blumenblätter eingeschlossenen ätherischen Oele herrührt, beim Trocknen mehr oder weniger verloren. Die Pharmakopoe verwirft die nicht aromatischen Blüthen von *Tilia tomentosa* (*Tilia argentea*), welche ausser den 5 Corollenblättern noch 5 petaloide Staubblätter besitzen und welche das unterseits meist sternhaarige Deckblatt, welches oben am breitesten ist (oft mehr als 2 Cm.), charakterisirt. In Nordamerika wird der Blüthenstand von *Tilia Canadensis* wie unsere Lindenblüthen benutzt.

Die Lindenblüthen, statt deren die Alten die Blätter benutzten, dienen im Aufguss (1:10) ganz in derselben Weise wie Flieder-



blüthen. Eine besondere Wirksamkeit gegen Krämpfe (Kreysig) kommt ihnen wohl nicht zu.

Die früher officinellen destillirten Wasser, *Aqua Tiliae concentrata* und *Aqua Tiliae*, werden wie die entsprechenden Präparate der *Flores Sambuci* benutzt.

**Flores Primulae, Schlüsselblumen.** — Den schweisstreibenden Mitteln reihen sich auch die Blumen der bei uns auf Wiesen allgemein verbreiteten *Primulaceae Primula officinalis* Jacq (*Primula veris* Smith) an. Ueber die physiologische Wirkung ist nichts bekannt. Man setzt die ohne die Kelche gesammelten, trocken nicht mehr wohlriechenden, gelben Blüthen mitunter diaphoretischen Species zu, doch wohl vorzugsweise zur Decoration.

**Folia Jaborandi, Folia Pilocarpi; Jaborandiblätter. Pilocarpinum hydrochloricum; Pilocarpinhydrochlorat.**

Das hauptsächlichste schweisstreibende Mittel der Gegenwart bildet die unter dem Namen Jaborandi bekannte Droge, welche die Blätter einer in Brasilien wachsenden 3 M. hohen strauchartigen Rutacee, *Pilocarpus pennatifolius* Lemaire, bildet, und ihre Wirksamkeit einem darin enthaltenen Alkaloide, dem Pilocarpin, verdankt, dessen chlorwasserstoffsaurer Salz wegen der Leichtigkeit, dasselbe hypodermatisch anzuwenden, die nur innerlich zu benutzendes Jaborandiblätter aus der Praxis fast vollständig verdrängt hat.

Die Jaborandiblätter bestehen aus 2 oder 3, seltener 4 sitzenden oder kurz gestielten Jochen derblederartiger, ganzrandiger Fiederblättchen und einem unpaarigen Endblatte, das von einem bis 3 Cm. langen Stiele getragen wird. Die etwas scharf schmeckenden Blättchen sind lanzettlich oder oval, vorn etwas stumpf oder ausgerandet, bis 16 Cm. lang und 4—7 Cm. breit und lassen im Blattparenchym sehr zahlreiche durchsichtige Oeldrüsen erkennen. Die Droge wurde 1873 zuerst von einem brasilianischen Arzte Coutinho nach Paris gebracht und von Gubler als stark wirkendes schweiss- und speicheltreibendes Mittel erkannt. Der Name Jaborandi (Jaguarandy) wird von den Eingeborenen Brasiliens nicht allein auf die in Frage stehende Droge, sondern auch auf verschiedene, beim Kauen ebenfalls speicheltreibend wirkende Pflanzen aus der Familie der Piperaceen, insbesondere *Serronia Jaborandi* Gaudich und *Piper reticulatum* L., auch auf einige andere Rutaceen bezogen; doch sind Blätter dieser Pflanzen, welche anfangs statt der officinellen Droge, die man ihnen gegenüber als *Pernambuco Jaborandi* bezeichnet, im Handel häufiger vorkamen, jetzt aus demselben verschwunden. Man vindicirte die Wirksamkeit zunächst dem in den *Pilocarpus*blättern in reichlicher Menge vorhandenen ätherischen Oele, welches vorzugsweise aus einem Terpen, *Pilocarpen*, besteht; doch zeigte sich bald, dass das 1875 von Hardy entdeckte Alkaloid Pilocarpin das active Princip sei. Dieses stellt eine amorphe weiche Masse dar, während das officinelle Pilocarpinhydrochlorat weisse, bitterschmeckende und an der Luft Feuchtigkeit anziehende Krystalle bildet, die sich leicht in Wasser oder Weingeist, wenig in Aether oder Chloroform lösen und deren verdünnte wässrige Solution neutral reagirt und von Ammoniak oder Natronlauge nicht gefällt wird. Neben dem Pilocarpinhydrochlorat ist auch das Pilocarpinnitrat, *Pilocarpinum nitricum*, welches ebenfalls krystallinisch ist, medicinisch benutzt.

In Bezug auf den Sitz des Pilocarpins constatirten Lohrisch, Tizzoni und Chiocconi die Unwirksamkeit des Holzes und Markes; die Rinde erwies sich nach Rovida wirksamer als die Blätter. Galippe und Bochefontaine fanden die Wurzelrinde entschieden schwächer als Jaborandiblätter. Stumpf fand die Blätter stärker wirkend als die Stengel, Penzold Blätter und Stiele ziemlich gleichwerthig.

Die Jaborandiblätter enthalten neben Pilocarpin noch ein in seiner Wir-

kung völlig verschiedenes Alkaloid, das Jaborin, welches leicht aus Pilocarpin entsteht und dessen Action mit der des Atropins qualitativ übereinstimmt, quantitativ jedoch etwas schwächer ist. Dasselbe findet sich nicht allein in käuflichem Jaborandiextract, sondern auch dem Pilocarpin des Handels beigemengt, weshalb auf den Gebrauch eines krystallinischen Salzes zu halten ist, da Jaborinsalze nicht krystallisiren.

Das Pilocarpin zeigt bezüglich seiner Resorptionsverhältnisse keine Abweichungen von den meisten Alkaloiden und wird durch den Harn eliminirt.

Albertoni constatirte Pilocarpin nach subcutanen letalen Dosen bei Hunden im Blut, sowie den Baueingeweiden, beim Menschen nach 0,01 subcutan in der ersten 4 St. im Harn. Vom Mastdarm aus wirken Jaborandeaufgüsse und Pilocarpin hidrotisch, jedoch später, schwächer und erst in grösseren Dosen (Rosenbach; Jacobi).

Das Pilocarpin steht in seiner Wirkung dem von Schmiedeberg aus dem Fliegenpilze und später auch künstlich dargestellten Muscarin, auch dem Physostigmin, bis zu einem gewissen Grade auch dem Nicotin (Harnack und Hans Meyer) nahe. Als seine hauptsächlichste und interessanteste Wirkung erscheint die sehr rasch auftretende Vermehrung verschiedener Secretionen, insbesondere der Speichelsecretion und des Schweißes.

Nach dem Einnehmen eines Aufgusses von 2,0—4,0 Folia Jaborandi oder bei subcutaner Injection von 0,01—0,02 Pilocarpinhydrochlorat tritt die angeordnete Wirkung in der Regel sehr rasch (in 5—45 Min.) ein, wobei bald Prävalenz des Schweißes über den Speichel, bald das Umgekehrte statthat, und hält mehrere Stunden (selten mehr als 2) an. Meist tritt die Diaphorese etwas später ein als die Vermehrung des Speichels, zunächst an der Stirn, dann über den ganzen Körper sich ausbreitend. Auch überdauert die Salivation in der Regel den Schweiß. Selten kommt Diaphorese ohne Salivation oder Salivation ohne Diaphorese vor.

Die hidrotische Wirkung der Jaborandi in kaltem Aufgusse und ebenso des Pilocarpins übertrifft diejenigen aller übrigen bekannten Hidrotica. Die Menge des producirt Schweißes, der unter den ungünstigsten äusseren Bedingungen hervortritt, ist meist der Dosis proportional (Curschmann) und beträgt durchschnittlich gegen 500,0 (Stumpf, Ferri), somit das 5fache der normalen Grösse und mehr, mitunter selbst 1200,0. Die Beschaffenheit des Speichels ist verschieden, bald dünnflüssig, klar und neutral, bald mehr zähe, fadenziehend und alkalisch; Rhodankalium ist vermindert oder fehlt, das diastatische Ferment erhalten, die Salze vermehrt (Voit), ebenso der Harnstoff (Robin). Bei Maniakalischen ist der hidrotische Effect grösser als bei Melancholischen (Challand und Rabow). Minder constant, aber häufig kommt Vermehrung der Thränen und des Nasalschleims, viel seltener und meist nur im geringen Grade eine solche des Tracheal- und Bronchialsecrets, ausnahmsweise Vermehrung der Milchsecretion bei Säugenden (Ringer und Gould) vor. Sehr variabel ist das Verhalten der Harnsecretion, das theils durch individuelle Verhältnisse oder pathologische Zustände, theils durch differente Dosen beeinflusst wird. Das Vorkommen starker Steigerung bei Verminderung des spec. Gewichts (Cantani, Tonoli) kann nicht in Abrede gestellt werden und bei kleinen Dosen, welche nicht sialagog und diaphoretisch wirken, ist die Diurese deutlich gesteigert (Robin); andererseits ist bei starken Dosen Verminderung der Harnmenge an dem Tage der Darreichung sehr häufig gegen frühere und folgende Tage vorhanden (Robin, Leyden). Stumpf fand das spec. Gewicht des Harns unter 36 Fällen 19mal erhöht, 10mal vermindert und 7mal gleich, die chemischen Verhältnisse nicht geändert. Robin fand die Harnstoffausscheidung in den ersten 24 Std. um 21% vermindert und am folgenden Tage noch stärker herabgesetzt, theilweise in Folge von Vermehrung des Harnstoffs im Schweiß und Speichel, theilweise vermöge geringer Herabsetzung der Ver-

brennung im Organismus. Der Variation der Harnstoffausscheidung entsprechend, ist die Harnsäureausscheidung nach Robin in den ersten 24 Std. herabgesetzt und am zweiten bei vorausgehender profuser Perspiration vermehrt, bei schwachem Schweisse vermindert; bei Fiebernden kommt nur Verringerung vor (Robin). Auch die Chloride im Harn nehmen ab, jedoch weniger bei Fiebernden.

Das Verhalten der Temperatur ist keineswegs constant, bald steigend, bald fallend, beides nicht in hohem Maasse, in der Regel steigt die Temperatur im Momente des beginnenden Schweisses und sinkt nach dem Ausbrechen profuser Perspiration im Laufe von 3—4 Std. (Robin, Greene, Ambrosoli, Salkowski); bei Fiebernden ist die Anfangssteigerung geringer, bei starkem Schweiss die Abnahme bedeutender, sogar um 2°, selbst am folgenden Tage oft noch ausgesprochen (Robin).

Die schweiss- und speicheltreibende Wirkung des Pilocarpins tritt auch bei Thieren, besonders bei Pferden, exquisit hervor. Dasselbe gilt in Bezug auf Thränen und Bronchialschleim, selbst die Ohrschmalzsecretion wird gesteigert. (Marmé), ebenso die Pankreas- und Magensaftsecretion (Pilicier). Die Wirkung ist bei Schweiss-, Speichel- und Thränensecretion eine doppelte, theils auf die Drüsen und deren Nerven, theils auf centrale Theile (Speichelcentrum, Schweisscentrum) gerichtete; auf die Schweissfasern in ihrem Verlaufe wirkt Pilocarpin nicht (Marmé).

Eine zweite Wirkung des Pilocarpins bezieht sich auf das Herz und insbesondere die Vagusendigungen, die dadurch in einen Erregungszustand versetzt werden.

Die schon von Popow u. Nawrocki angegebene Wirkung documentirt sich am eclatantesten am Froschherzen, an welchem durch 0,0005–0,002 starke Verlangsamung und diastolische Stillstände hervorgerufen werden, welche Atropin beseitigt. Bei Warmblütern erzeugt reines Pilocarpin niemals Acceleration, sondern stets mit Drucksenkung verbundene Retardation, indem es zuerst die Vagusendigungen reizt, später erfolgt Lähmung derselben und des vasomotorischen Centrums; die durch Nicotin bedingte secundäre Blutdrucksteigerung durch Gefässkrampf ist beim Pilocarpin nicht ausgesprochen (Harnack und Hans Meyer).

Beim Menschen ist nach Jaborandiaufgüssen Vermehrung der Pulszahl anfangs mit Verstärkung der Herzenergie sowohl bei Fiebernden als bei Nichtfiebernden von den meisten Beobachtern (Robin, Stumpf, Riegel u. A.) als Regel, Pulsverlangsamung als Ausnahme constatirt; daneben Erschlaffung des Arterienrohres (Riegel). Sphygmographische Untersuchungen Leydens und Fränkels ergeben nach medicinalen Gaben Pilocarpin neben Beschleunigung, nach toxischen Mengen neben Verlangsamung der Pulsfrequenz, Erweiterung der Arterien und Venen; die Schläfearterie kann selbst um das Doppelte anschwellen und die Curven einem Pulsus celer und subdicrotus entsprechen.

Das Pilocarpin besitzt ferner einen Einfluss auf den Uterus, den es zu Bewegungen erregt (Harnack, Van der Mey) und eine erregende Action auf die Peristaltik.

Bei Kaninchen erfolgen nach intravenöser oder subcutaner Injection in 2–10 Min. Contraktionen des Uterus, manchmal anfangs von tetanischem Charakter, die durch Zerstörung des Rückenmarks nicht aufgehoben werden, Abortus konnte dadurch bei Kaninchen nicht erzielt werden (Van der Mey). Die Wirkung auf die Peristaltik ist nach Harnack und Hans Meyer auf die Erregung der Darmganglien zu beziehen.

Mit der Einwirkung auf die Bewegung der Eingeweide stehen vermuthlich manche Nebenwirkungen der Jaborandi in Connex, namentlich das nicht seltene Erbrechen, welches Einzelne von dem verschluckten Speichel herleiten, Andere dem unangenehmen Geschmacke des Aufgusses zuschreiben, da es bei subcutaner Application von Pilocarpin seltener auftritt, ferner Dysurie und Harndrang mit Schmerzen in der Lendengegend.



Ein besonderer Einfluss auf Gehirn und Rückenmark ist zweifelhaft.

Die eigenthümliche krampferregende Wirkung des Nicotins kommt dem Pilocarpin in keiner Weise zu; wenn auch bei *Rana temporaria* pikrotoxinähnliche Krämpfe nach 0,01—0,15 auftreten (Harnack und Meyer) und Infusion von Pikrotoxin bei Warmblüthern Krämpfe erzeugt, ist es doch sicher statthaft, mit Albertoni diese Erscheinungen auf die Alteration der Circulation zu beziehen. Es gilt dies auch von dem nach Ablauf der Pilocarpinwirkung beim Menschen sehr häufigen, aber vorübergehenden Schwächezustande mit Schlafneigung, die Stumpf mit Wahrscheinlichkeit auf die durch die Fluxion zur Körperoberfläche resultirende Gehirnanämie bezieht. Auch der mitunter beobachtete Schwindel kann in gleicher Weise erklärt werden.

Von besonderem Interesse ist endlich die myotische Wirkung des Pilocarpins, welche bei Localapplication eintritt.

Die schon von Tweedy 1875 bei Application von Jaborandiextract auf das menschliche Auge beobachtete Pupillenverengung mit gleichzeitiger Tension des Accomodationsapparats und Näherung des Nahe- und Fernpunkts, sowie mit amblyopischer Beeinträchtigung des Sehvermögens, ist bei Pilocarpin nicht so stark wie beim Physostigmin (Scotti) und wird durch Atropin leicht aufgehoben. Meist ist sie in  $1\frac{1}{2}$  Std. verschwunden. Sie tritt auch bei Hunden und Katzen ein, kaum bei Kaninchen (Albertoni). Bei letaler subcutaner Vergiftung kommt sie bei Hunden nicht zu Stande (Albertoni). Jaborinhalige Präparate können geradezu zu Mydriasis führen. Als Nebenerscheinung bei medicinalen Dosen Jaborandi oder Pilocarpin beim Menschen ist Myose ausserordentlich selten; häufiger kommt Nebelsehen vor (Stumpf, Oehme u. A.). Robin will sie auf der Höhe des Schweisses wiederholt beobachtet haben. Bei localer Application kommt sie auch bei Thieren nach Durchschneidung des Oculomotorius vor; beim Menschen auch bei Mydriasis paralytica (Galezowski).

Jaborandi und Pilocarpin haben in allen Fällen von Kranksein Anwendung gefunden, wo die günstige Wirkung gesteigerter Diaphorese empirisch festgestellt ist, vor Allem bei Erkältungskrankheiten, rheumatischen Affectionen, zur Beseitigung wässriger Exsudate (Hydrops, pleuritisches Exsudat), selbst zur Bekämpfung dyskrasischer Leiden (Syphilis) und chronischer Metallvergiftung.

Die grossartigen Erwartungen, welche man bei der Einführung der Jaborandi in den Arzneischatz hegen zu dürfen glaubte, haben sich zwar nicht erfüllt, doch hat das Mittel entschieden in Erkältungskrankheiten und gewissen rheumatischen Affectionen seine Berechtigung. Beim Rheumatismus acutus kürzt Jaborandi die Dauer des Leidens nicht ab und wirkt symptomatisch weit weniger günstig als Salicylsäure (Robin); bei Complication mit frischen oder alten Herzklappenfehlern oder Endocarditis scheint Pilocarpin geradezu contraindicirt. Günstig wirkt es bei 2—3 maliger Anwendung bei Rheumatismus arthriticus und bei Muskelrheumatismus, namentlich in frischen Fällen, mitunter auch bei Lumbarschmerzen und Ischias. Namentlich französische Autoren (Robin, Gubler) haben bei acuten Brustkrankheiten, z. B. Pneumonie, beginnender Pleuritis, Bronchitis acuta, aber auch bei chronischen, z. B. Bronchitis an Emphysem leidender Personen, und bei asthmatischen Anfällen das Mittel zum Coupiren mit Erfolg versucht. Einzelne glauben, dass es weniger im Beginn als zur Zeit der Krise von Nutzen sei (Dupré). Bei Katarrh, Grippe, Angina catarrhalis und Bronchitis capillaris steht es gewiss den Dampfbädern und anderen Mitteln nicht nach. Auch bei Diphtheritis faucium ist es zur Loslösung der Membranen empfohlen (Gutmann). Bei pleuritischen Exsudaten ist mitunter deutliche Verminderung nach dem jedesmaligen Gebrauche nachweisbar (Cantani). Meist bleibt die Wirkung vorübergehend. Dasselbe gilt von anderen serösen Transsudaten; bei solchen in die Lungen scheint das Mittel sogar contraindicirt, insofern es durch Erzeugung vermehrter Secretion das Re-

spirationshinderniss verstärken kann (Rosenkranz). Czarnicki rühmt Jaborandi bei Orchitis metastatica im Verlaufe von Mumps. Obschon die Theorie italienischer Aerzte, wonach die Hauptwirkung des Pilocarpins in einer Steigerung des Verbrennungsprocesses bestehe, als abgethan betrachtet werden muss, so ist doch die Heilung von Syphilis oder chronischen Hautkrankheiten, z. B. Psoriasis (Chipon), durch wiederholte Anwendung Thatsache. Lewin heilte 75% damit behandelter Syphilitischer, von welchen nur 6% recidivirten. Selbst bei Fettsucht (Israel) hat man davon Gebrauch gemacht. Besonders günstige Erfolge haben einzelne Augenärzte bei der zuerst von Weber empfohlenen Behandlung von Glaskörpertrübungen gesehen. Bei Meningitis cerebrospinalis sind nur vorübergehende Erfolge beobachtet (Macchiavelli und Robin).

Rationell ist unstreitig die Verwendung bei chronischen Metallvergiftungen, obschon in den bisherigen Versuchen der Nachweis einer gesteigerten Ausscheidung der abgelagerten Metallverbindungen nicht gelungen ist. Robin fand es in frischen Fällen von Colica saturnina eclatant nützlich. Frommüller rühmt es bei Tremor mercurialis der Spiegelbeleger. Lussana will es bei Arsenicismus verwerthen.

Besondere Bedeutung haben Jaborandi und Pilocarpin für die Behandlung von Nierenkrankheiten (Leyden, Jacobi u. A.) gewonnen, und namentlich liegen zahlreiche Beobachtungen vor, in denen bei urämischen Erscheinungen günstige Effecte erhalten wurden.

Zwar lässt sich nicht behaupten, dass in allen Fällen von acuter oder chronischer Nephritis Pilocarpin dauernde Besserung und Verminderung der Eiweissausscheidung im Harn herbeiführe, ja es kommt sogar unter Umständen zu Steigerung der Albuminurie. In frischen Fällen von Nephritis desquamativa, namentlich nach Scharlach, giebt Pilocarpin vorzügliche Resultate. Die günstigen Effecte bei urämischen Convulsionen (Boegehold, Massmann) sind z. Th. auf die vermehrte Harnstoffausscheidung durch Schweiß und Speichel zu beziehen. Die Oedeme schwinden, auch ohne dass diuretischer Effect eintritt; mitunter bleibt die Diaphorese aus und wird durch starke Diurese ersetzt. Bei Diabetes sah Cantani während des Pilocarpinschweisses den Zucker im Harn schwinden, doch wirkt Pilocarpin nicht dauernd (Sakowski).

Eine sehr rationelle Anwendung hat Simon vom Pilocarpin und vom Syrupus Jaborandi bei Prurigo gemacht, wo nicht allein sofort der heftige Juckreiz schwindet, sondern auch das Exanthem in 14 Tagen fast gänzlich beseitigt wird. Auch Pick sah ähnliche Erfolge bei chronischem Nesselfieber. Verbürgt ist durch mehrfache Erfahrungen die zuerst von Schmitz betonte Thatsache, dass auf den Gebrauch von Pilocarpin bei Kahlköpfen neuer Haarwuchs eintrat. Ebenso hat man bei Hemianästhesie (Grasset, Gille), gefunden, dass mit dem Pilocarpinschweiss häufig die Sensibilität vorübergehend und selbst dauernd wiedergekehrt sein soll. Armaingaud will durch Pilocarpin fötide Fusschweisse geheilt haben. Der Versuch, Pilocarpin in der Geburtshilfe einzuführen, theils bei Atonie des Uterus, theils zur Einleitung künstlicher Frühgeburt, ist wegen der Inconstanz der Wirkung (Felsenreich, Kroner a. A.) gescheitert. Der vermeintliche antidotarische Werth des Pilocarpins bei Atropinvergiftung wird durch die bisher gemachten Erfahrungen beim Menschen in keiner Weise sicher gestellt; mit letalen Gaben Atropin vergiftete Thiere werden durch Pilocarpin nicht gerettet (F. Deutschmann). In der Augenheilkunde hat man Pilocarpin bei glaucomatöser Erblindung (Keyser), bei Retinitis albuminurica (von Schroeter) und selbst bei Netzhautablösungen (Josso) benutzt. Longhi empfiehlt Einträufelung von Pilocarpinlösung in den äusseren Gehörgang bei chronischen Katarrhen. Als Antipyreticum ist Jaborandi und Pilocarpin nicht in Aufnahme gekommen, da die Wirkung zu unsicher ist. Die Erfolge bei Intermittens (Rokitansky) sind nicht ermutigend.

Eine Contraindication des Pilocarpingebrauches bilden bestehende Schwächezustände des Herzens. Bei längerer Anwendung

von Pilocarpin ist die von der starken Diurese abhängige Tendenz zu Erkältungen vom Arzte nicht ausser Acht zu lassen.

Obschon rasch vorübergehender Collaps nach grösseren Dosen (0,03) wiederholt beobachtet ist, muss derselbe doch bei den jetzt meist üblichen Dosen von 0,01 als grosse Rarität bezeichnet werden, doch giebt es nach Petrina Individuen, wo die Wiederholung dieser Dosis in einem Zwischenraume von 1—2 Tagen den Puls ausserordentlich retardirt und bei bestehenden Circulationshindernissen Arrhythmie bedingt. Bei Jaborandi ist der Collaps noch häufiger in Folge des leichter eintretenden Erbrechens. Nach Leyden lässt sich der Collaps, da eine schwächende Einwirkung des Pilocarpins auf den Herzmuskel nicht existirt, durch vorsichtige Anwendung ganz vermeiden. Die im Verlaufe von Pilocarpinbehandlung bei Scharlach mehrfach beobachteten Pneumonien stehen vielleicht mit der gesteigerten Tendenz zu Erkältungen im Zusammenhang. Ohms hält Pilocarpin bei Typhus und Magengeschwür für contraindicirt, weil die dadurch bedingte Erweiterung der Gefässe zu Blutungen prädisponire.

Man giebt die Folia Jaborandi im Aufguss (seltener im Decoct) zu 2,0—6,0 auf 150,0—200,0 Colatur; doch werden dieselben meist durch das officinelle Pilocarpinsalz ersetzt, welches man gewöhnlich hypodermatisch in 2—4 % Lösung zu 0,01—0,02 anwendet.

Ein diaphoretischer Syrup, durch Auflösen von 18 Th. Zucker in 15 Th. eines filtrirten Wein-Aufgusses von Jaborandiblättern (1:5) gewonnen und als Syrupus Jaborandi zu 2—3 Esslöffel verordnet, ist ebenfalls durch das Pilocarpin ersetzt. Als Maximaldosis für Pilocarpinum hydrochloricum setzt die Phkp. 0,03 für den einmaligen Gebrauch, 0,06 für den Tag. Man vermeide unmittelbar nach Beendigung des Schweisses eine neue Pilocarpindosis zu administriren, da dadurch leicht die bestehende Herzschwäche und Abnahme des Blutdruckes in gefährlicher Weise gesteigert werden und Asystolie eintreten kann (Dupré). Im Uebrigen ist Pilocarpin wenig gefährlich; selbst 0,4 subcutan erzeugt nur die oben erwähnten Nebenerscheinungen auf die Dauer mehrerer Stunden (Sziklai), welche durch Atropin oder Homatropin leicht verschwinden. Dosen von 0,03—0,04 machen kaum mehr Nebenerscheinungen als 0,01—0,02 (Dupré); selbst 0,07 pro die werden ohne jeden Collaps ertragen (Boegehold). Für interne Anwendung empfiehlt sich überhaupt 0,03 als Einzelgabe (Challand und Rabow). Bei Säuglingen wird es zu 0,001—0,0025, bei Kindern über einem Jahre 0,002—0,005 hypodermatisch, innerlich in doppelter oder dreifacher Menge benutzt. Albrecht verordnet bei Keuchhusten einen Theelöffel bis einen Esslöffel voll einer Mixtur aus 0,025 Pilocarpinhydrochlorat, Cognac 5,0, Syr. cort. Aurantii 25,0, Aq. 70,0. Keating empfahl Jaborandiaufgüsse local bei Oedemen.

**Liquor Ammonii acetici, Ammoniacum aceticum solutum, Ammonia acetica liquida, Spiritus Mindereri; Ammoniumacetatlösung, essigsäure Ammoniumflüssigkeit, flüssiges essigsäures Ammoniak, Essigsalmiak.**

Dieses Ammoniakpräparat, welches seine Einführung in den Arzneischatz dem Augsburger Arzte Minderer († 1621) verdankt, wird durch Neutralisation von 10 Th. Liquor Ammonii caustici mit einer genügenden Menge Acidum aceticum dilutum und Versetzen mit so viel destillirtem Wasser, dass das spec. Gew. 1,032—1,034 beträgt, dargestellt. Es bildet eine farblose, neutrale Flüssigkeit von schwachem, fadem Geruche und salzigem, stechendem Geschmacke, welche beim Erwärmen sich völlig verflüchtigt und in 100 Th. 15 Th. Ammoniumacetat enthält.

Das Ammoniumacetat verbrennt im Organismus zu Ammoniumcarbonat und verwandelt sich wieder wie dieses in Harnstoff. Zu 15,0 intern wirkt es auf



Kaninchen nicht toxisch, ruft dagegen zu 30,0 intern oder zu 15,0 subcutan analoge Krämpfe hervor, wie sie andere Ammoniaksalze bedingen (C. G. Mitscherlich). Auch bei Menschen scheinen erheblich grosse Dosen ertragen werden zu können, ohne toxische Erscheinungen hervorzurufen (nach Cullen selbst 120,0 auf einmal). Wibmer sah bei Selbstversuchen ausser leicht reizender Empfindung im Schlunde geringes Wärmegefühl im Magen und später in der Haut, etwas Kopfschmerz und Appetitmangel hervortreten. Andere Beobachter, z. B. Richter, sahen Beschleunigung des Pulses mit Zunahme der arteriellen Spannung, Eintritt allgemeiner Erregung, Wärme der Haut und vermehrte Schweisssecretion danach auftreten. Auf der äusseren Haut ruft die Ammoniumacetatflüssigkeit bei länger dauerndem Contact, wahrscheinlich in Folge allmählicher Bildung von Ammoniumcarbonat, Röthe und Entzündung, welche selbst mit Blasenbildung und Exsudation einhergehen kann, hervor. Nach Tolmatschew kann bei Waschungen mit Spiritus Mindereri starke Schweisssecretion an den gewaschenen Theilen hervortreten, was uns von verschiedenen praktischen Aerzten, welche sich des Mittels äusserlich bei Kranken bedienten, bestätigt wird.

Wenn es eine Zeit gegeben hat, wo man den Liquor Ammonii acetici in grosser Ausdehnung bei den verschiedensten Krankheiten gebrauchte (besonders in der Form des ursprünglichen Spiritus Mindereri, welcher durch Verdünnung des Liquor Ammonii acetici mit *aa* Aq. destillata erhalten werden kann), so ist jetzt sein Gebrauch fast ausschliesslich auf Beförderung der Hautausscheidung bei fieberhaften Katarrhen und Rheumatismen beschränkt, wo man den Liquor Ammonii acetici zu 5,0—25,0 in rasch hinter einander folgenden Gaben entweder für sich oder mit andern Diaphoretica reicht oder nach Tolmatschew äusserlich einreibt. Die Anwendung gegen Algien, Dysmenorrhoe, Hemikranie, Krämpfe, Epilepsie, Hysterie, Trunkenheit (Massuyer), Ascites, Scarlatina u. s. w. kann als obsolet bezeichnet werden. Aeusserlich wandte man das Mittel bei Sugillationen, Quetschungen, Drüsengeschwülsten, selbst gegen drohenden Brand (hier auch innerlich nach A. Cooper), chronischen Augenentzündungen und Anginen an, auch glaubte man durch Einhüllen des Halses mit Flanell, welcher in den erwärmten Liquor Ammonii acetici getaucht war, Croup heilen zu können. Bei Verordnung des Mittels sind sowohl starke Mineral- und Pflanzensäuren als namentlich kautische Alkalien und alkalische Erden, sowie deren Carbonate zu meiden; die letzteren könnten sogar zur Bildung freien Ammoniaks oder Ammoniumcarbonats führen und zu Intoxicationen Veranlassung geben.

#### Verordnung:

℞

*Liq. Ammon. acet.* 20,0

*Inf. Flor. Sambuci* 150,0

*Succi Sambuci insp.* 20,0

M. D. S. Stündlich 1 Esslöffel voll.

## 2. Ordnung. Schweissvermindernde Hautmittel, Dermatica anidrotica.

In dieser Ordnung ist nur ein einziges Medicament zu besprechen, das fast ausschliesslich zur Beseitigung colliquativer Schweisse im letzten Stadium der Phthisis benutzt wird, das aber seit der Erkenntniss der anidrotischen Wirkungen des Atropins nur noch wenig Anwendung findet und deshalb aus der Pharmacopoe entfernt wurde, zu besprechen.

**Fungus Laricis, Agaricus albus, Agaricum album, Boletus Laricis; Lärchenschwamm.** — Der Lärchenschwamm, *Polyporus officinalis* Fries (*Boletus Laricis* L. s. *Boletus purgans* Pers.) ist ein seitlich an den Stämmen unserer Lärchtanne, *Larix decidua* Miller, sowie an deren als *Larix Sibirica* Ledebour s. *Pinus Ledebourii* Endl. unterschiedenen Varietät  $\beta$  *Rossica*, welche durch das ganze Europäische und Asiatische Nordrussland verbreitet ist, wachsender Pilz, welcher die Grösse eines Kopfes und die Schwere von 14 Pfd. erreicht. Auf der nach unten gerichteten Seite finden sich unzählige runde, grosse Poren. Die Handelswaare bildet leichte, gelblichweisse, zähe, schwierig zu pulverisirende Stücke von anfangs süsslichem, später widerlich bitterem Geschmacke und dumpfem Geruche. Masing wies im Lärchenschwamm 4 verschiedene Harze nach, über deren Beziehungen zur Wirkung der Droge nichts bekannt ist. Der Fungus Laricis ist ein bereits im Alterthume geschätztes Arzneimittel, welches in grösseren Dosen (zu 0,5—1,0) drastisch wirkt und bei Ingestion in Substanz den Stühlen vermöge Beimengung seiner korkigen Fasern eine weissliche Farbe ertheilt, welche irrthümlich von beigemengtem Schleime abgeleitet wurde. Man benutzt ihn jetzt kaum noch als Purgans, obschon er Bestandtheil einer Anzahl veralteter Präparate, z. B. des Elixir ad longam vitam, die noch beim Volke in Ansehen stehen, ist, sondern verwendet ihn vorzugsweise zur Bekämpfung der Nachtschweisse bei Phthisikern und Arthritikern, wo er in der That entsprechend den ältern Empfehlungen von Kopp, Schmiedel, Wendt, Burdach sich in manchen Fällen ausgezeichnet bewährt. Man giebt ihn zu 0,05—0,15, nicht in höheren Dosen, um die durch das Purgiren bedingte Schwächung des Organismus zu vermeiden, am besten in Pulvern oder Pillen. Die früher officinellen Präparate (z. B. Fungus Laricis praeparatus, wie Fructus Colocynthis praep. bereitet, und Resina Agarici) sind obsolet. Ueber die Art und Weise, wie die anidrotische Wirkung zu Stande kommt, ist bis jetzt nichts bekannt; sicher steht sie nicht mit wässrigen Entleerungen im Darmcanal in Connex.

---

#### **XIV. Classe. Nephrica, Nierenmittel.**

Die Nierenmittel stimmen im Wesentlichen mit den früher als harntreibende Medicamente oder Diuretica bezeichneten Stoffen überein, über deren Wirkung das Allgemeine S. 89—93 mitgetheilt worden ist. Eine Anzahl diuretischer Stoffe, z. B. verschiedene Kalium- und Natriumsalze, Digitalis u. s. w., haben bereits in früheren Kapiteln ihre Erledigung gefunden. Die hier abzuhandelnden Stoffe werden fast ausschliesslich als harntreibend bei hydropischen Ansammlungen in Anwendung gezogen. Durch das Lithiumcarbonat wird der Uebergang von den Diuretica zu den sog. Litholytica gemacht, über welche S. 39 Bemerkungen gegeben sind.

---

##### **1. Ordnung. Nephrica hydragoga, harntreibende Nierenmittel.**

**Bulbus Scillae, Radix Scillae s. Squillae; Meerzwiebel.**

Wir stellen an die Spitze der Diuretica die schon von den Alten hochgeschätzte Zwiebel von *Urginea maritima* Baker (*U. Scilla* Steinheil, *Scilla maritima* L.), einer der Mittelmeerflora angehörigen, auch in Portugal und Frankreich vorkommenden Liliacee, deren wirksames Princip ein als Herzgift wirkendes Glykosid, das Scillitoxin, ist.

Die Meerzwiebel kommt im Handel unter zwei Formen, als rothe und weisse Scilla, vor, ohne dass eine Trennung dieser Farbenvarietäten nach botanischen Principien oder nach der Herkunft beider möglich wäre. *Urginea maritima* besitzt eine faust- bis kindskopfgrosse, oft mehrere Pfund schwere, rundlich-eiförmige, einfache Zwiebel, welche aus einem ziemlich groben Centraltheile und zahlreichen, dicht über einander liegenden Schalen besteht, von denen die äusseren trocken, röthlich-braun, die innern fleischig und saftig sind. In den deutschen Officinen findet sich nicht der ganz frische Bulbus, welcher in manchen Mittelmeerländern in den Handel gebracht wird, sondern die zerschnittenen, mittleren Schalen in Form durchschnittlich 3 Mm. dicker, 3—5 Cm. langer und  $\frac{1}{2}$ —2 Cm. breiter, hornartiger, durchscheinender, von starken Querstreifen durchzogener, weisser oder weissgelblicher (*Bulbus Scillae albus*) Streifen, die sich leicht der Länge nach zerbrechen lassen. Im frischen Zustande hat die



Meerzwiebel einen schleimigen, bitteren und scharfen Geschmack, der, jedoch ohne die Schärfe, auch der getrockneten Droge in etwas geringerem Maasse zukommt; der Geruch ist frisch höchst unbedeutend, getrocknet gleich Null. Das Gewebe der Scilla besteht aus polyëdrischen Zellen, welche reichlich einen gelatinisirenden Schleim und Krystalle von Calciumoxalat einschliessen. Nicht völlig ausgetrocknete Stücke ziehen begierig Wasser an und schimmeln leicht.

Das Scillitoxin von Merck ist identisch mit dem Scillain von Jarmirstedt und wahrscheinlich auch mit dem freilich nicht so reinen Scillitin von Marais. Das Scillitoxin führt beim Frosche schon zu 0,1 Mgm. systolischen Herzstillstand im Laufe einer Stunde nach anfänglicher kurzdauernder Beschleunigung und rasch darauf folgender starker Verlangsamung herbei und tödtet subcutan zu 0,01 resp. 0,05 Kaninchen und Hunde in 1—3 Std. (C. Möller).

Sowohl das aus der Meerzwiebel dargestellte officinelle Extract (Th. Husemann und A. König) als das Scillitoxin (C. Möller) wirken besonders auf das Herz und verhalten sich gegen dasselbe genau wie Digitalis, so dass sie zunächst Verstärkung und Verlangsamung der Herzcontractionen und bei Anwendung letaler Dosen systolischen Herzstilland bedingen, welcher bei Warmblütern stets vor dem Sistiren der Respiration erfolgt.

Vom Scillain wies v. Jarmirstedt das dem Digitalin analoge Verhalten der Wirkung auf die Circulation von Warmblütern (anfängliche Steigerung des Blutdrucks und Verlangsamung der Herzschlagzahl, später bei letalen Dosen Herabsetzung des Blutdrucks und Beschleunigung der Pulsfrequenz) nach. Ob die Scilla neben dem Scillitoxin noch weitere wirksame Stoffe enthält und ob der Droge noch andere Wirkungen als auf das Herz zukommen, sind von verschiedenen Seiten different beantwortete Fragen. Die früher als Scillitin bezeichneten, meist extractähnlichen Stoffe können dabei wegen ihrer höchst variablen Activität nicht in Frage kommen; einzelne Präparate werden als zu 1,0 bei Kaninchen Schüttelkrämpfe, Sinken der Athmung und Tod in 6 Std. bedingend bezeichnet (Schroff), während andere auf Frösche und Kaninchen in Dosen ungiftig sind, in welchen das gewöhnliche Extract den Tod herbeiführt (Th. Husemann und A. König). Mandet wollte in der Scilla neben einem mit diuretischen und expectorirenden Eigenschaften begabten Körper (Scillitin) einen irritirend und toxisch wirkenden Stoff (Sculein) gefunden haben. Merck hat neben dem nur in Alkohol löslichen Scillitoxin aus der Scilla noch einen leicht löslichen, bitter schmeckenden Körper, Scillipikrin genannt, isolirt, der weit weniger toxisch als Scillitoxin wirkt und erst in der Dosis von 0,1 bei Fröschen Herzstillstand bedingt, in kleineren Dosen die Circulation verlangsamt. Frommüller will diesem Scillipikrin die Hauptwirkung zuschreiben, da es bei Oligurie bessere Dienste leistet als das allerdings gleichfalls diuretisch wirkende Scillitoxin. Ein der Scilla eigenthümliches Kohlehydrat (Sinistrin) ist für die Wirkung indifferent.

Man schreibt der Scilla örtlich reizende Wirkung zu, besonders basirt auf die Angabe, dass in Griechenland u. s. w. die Meerzwiebel in Scheiben geschnitten als hautröthendes Derivans gebraucht werde, welche Wirkung vorwiegend auf ein dem Senföl ähnliches ätherisches Oel zurückgeführt wird. Wenn auch in der frischen rothen Scilla ein solches Princip existiren mag, so fehlt es doch in der getrockneten Handelswaare vollständig, und das durch Einreiben von Scillapulver in die Haut entwickelte Prickeln, ebenso das dadurch bedingte Kratzen im Halse lassen sich durch die mechanisch reizende Einwirkung der höchst spitzigen Krystallnadeln von Calciumoxalat erklären (Tilloy, Schroff, Krahmer), welche selbst 10 % des Pulvers ausmachen (E. Queckett). Mit Scillaextract längere Zeit gefütterte Thiere zeigen niemals bedeutende Reizung des Magens oder Darms, ebenso wenig locale Inflammation bei interner oder subcutaner Einführung letaler Dosen; ebenso fehlen intensivere Reizungserscheinungen der Nieren, Blutextravasate in denselben u. s. w., wie sie bei ätherischen Oelen auftreten, durchgängig (A. König). Die bei Menschen und Thieren beobachteten und als Irritationsphänomene gedeuteten Erscheinungen von Ekel

und Erbrechen sind allen sog. Herzgiften eigenthümlich und brauchen nicht auf örtliche Irritation bezogen zu werden.

Beim Menschen verliert der Puls auch nach medicinalen Dosen an Frequenz bei erhöhter Spannung der Arterie; doch geht dies in einigen Stunden vorüber. Bei einzelnen Personen sollen kleine Dosen wässrige Stuhlgänge bedingen. Längere Darreichung stört die Digestion, scheint jedoch nie narkotische Erscheinungen nach Art von Digitalis zu bedingen; dagegen kommt es nach grösseren Mengen zu Uebelkeit, Erbrechen, Diarrhoe, bedeutender Pulsverlangsamung, selbst bis zu 40 Schlägen, schliesslich zu Prostration, Betäubung und Convulsionen, selbst zum Tode (in 1 Falle nach 1,5 Meerzwiebelpulver). Die Diurese kann durch toxische Dosen unterdrückt werden; bisweilen scheint Hämaturie durch dieselben veranlasst zu werden.

Bei Thieren (Kaninchen, Hunden, Mäusen, Ratten, Tauben, Fröschen, Kröten) ist das Intoxicationsbild nach subcutaner oder interner Einführung von Meerzwiebelextract das nämliche wie bei Digitalisvergiftung; besonders hervortretend sind die verlangsamten und verstärkten Herzpulsationen und der systolische Herzstillstand; die Temperatur wird nicht nennenswerth herabgesetzt, die Reizbarkeit der Muskeln und Nerven nicht vermindert; die Pulsverlangsamung beruht vorwaltend auf Reizung des Vagus (Th. Husemann und König).

Die hauptsächliche Anwendung findet die Scilla als Antihydropicum, ausserdem schreibt man ihr expectorirende Wirkungen zu und gebraucht sie, jedoch meist in Verbindung mit anderen brechenenerregenden Substanzen, als Emeticum.

Die Indicationen der Meerzwiebel bei Hydrops müssen auf Grundlage der neuesten pharmakodynamischen Versuche anders gestellt werden, wie dies früher üblich war. Dieselben sind ebenso wie die Contraindicationen die nämlichen wie bei Digitalis, indem ausschliesslich in der Veränderung des Blutdrucks die Ursache der diuretischen Wirkung zu finden ist. Vor dem Fingerhute hat die Meerzwiebel den Vorzug, dass sie keine cumulative Wirkung besitzt und deshalb längere Zeit ohne besonders nachtheilige Folgen gegeben werden kann. Dass jedwede leichte Irritation der Nieren den Gebrauch der Scilla contraindicirt, wie dies meist angenommen wird, können wir nicht als den Thatsachen entsprechend ansehen. Nothnagel betrachtet die Meerzwiebel bei Hydrops im Stadium der Compensationsstörung bei Herzfehlern als der Digitalis an Wirksamkeit nachstehend, erklärt dagegen eine Verbindung beider Mittel für recht vortheilhaft. Sehr günstig wirkt manchmal bei anämischen und kachektischen Hydropikern eine Verbindung der Scilla mit Eisen oder Chinin. Bei der Anwendung ist es zweckmässig, Pausen in der Darreichung eintreten zu lassen, da bei längerem Gebrauche bisweilen die diuretische Wirkung ohne andere Ursachen abnimmt. — Die verschiedenen Meerzwiebelpräparaten nachgerühmten expectorirenden Wirkungen bei Lungenkatarrhen, Asthma, Emphysem, chronischen Bronchialkatarrhen sind nach vielfältigen Beobachtungen an Kranken nicht zu bezweifeln. Bei Kindern sind Meerzwiebelpräparate auch als Brechmittel, meist jedoch nur als Adjuvantia des Brechweinsteins und der Ipecacuanha, zur Entfernung in den Luftwegen angehäuften Secrets gebräuchlich.

Man giebt die Meerzwiebel innerlich zu 0,05–0,2 und allmählig steigend selbst bis zu 0,5 und darüber mehrmals täglich, am besten in Pillenform, weniger zweckmässig wegen der Hygroscopicität der Meerzwiebel in Pulverform. Auch Aufgüsse oder Abkochungen (2,0 — 5,0 auf 200,0), sowie wässrige oder weinige Macerationen sind in Gebrauch.

Die endermatische Application von Meerzwiebelpulver (zu 0,1–0,5 vorsichtig steigend) ist wegen der dadurch bedingten Schmerzhaftigkeit und Inflammation nicht empfehlenswerth. Die früher beliebte Anwendung von Meerzwiebelsalben oder von Bähungen und Umschlägen aus Meerzwiebelaufgüssen (1:20) bei Hydrops zur Erzielung von Diurese ist wahrscheinlich völlig nutzlos.

## Präparate:

1) **Acetum Scillae, Acetum scilliticum; Meerzwiebeleessig.** Durch 8tägige Digestion von 5 Th. trockner Meerzwiebel, 5 Th. Weingeist, 9 Th. verdünnter Essigsäure und 36 Th. Wasser bereitet; klar, gelblich, sauer und hintennach bitter schmeckend. Man giebt das schon von Hippokrates in Anwendung gezogene Präparat entweder für sich zu 20 Tropfen bis zu einem Theelöffel mehrmals täglich oder in Form der Saturation. Bei Anwendung zu Umschlägen, Gargarismen, Klystieren kann er, ebenso wie bei Lösung von Ammoniakgummi zu Pflastern, durch Acetum purum ohne Schaden ersetzt werden.

2) **Oxymel Scillae, Oxymel scilliticum s. squilliticum; Meerzwiebelsauerhonig.** 1 Th. Acetum Scillae und 2 Th. Mel depuratum zu 2 Th. abgedampft; klar, gelbbraunlich. Sehr gebräuchlich als Zusatz zu expectorirenden, diuretischen und emetischen Mixturen (15—30:100), wo er seines bitteren, unangenehmen Beigeschmackes wegen kaum als Corrigenes des Geschmacks bezeichnet werden kann, wird der Meerzwiebelsauerhonig auch zu 1 Theelöffel bei kleinen Kindern als Brechmittel, bei Erwachsenen als Diureticum und Expectorans benutzt. Krahmer warnt vor der Anwendung des Mittels als Emeticum bei kleinen Kindern wegen der oft auftretenden erschöpfenden Durchfälle. Aeusserlich lässt es sich wie Oxymel simplex in Mund- und Gurgelwässern verwenden, doch ist der Geschmack unangenehm.

3) **Tinctura Scillae; Meerzwiebeltinctur.** Aus 1 Th. getrockneter Meerzwiebel mit 5 Th. Spiritus dilutus bereitet, gelb. Innerlich zu 10—20 Tropfen mehrmals täglich als Diureticum, auch äusserlich bei Hydrops (in die Nierengegend) und Hydrocele eingerieben; im Ganzen selten benutzt. Früher war auch ein Macerat aus 8 Th. Scilla, 1 Th. Kali causticum und 50 Th. Spiritus dilutus unter dem Namen Tinctura Scillae kalina officinell. Diese von Hufeland empfohlene, übel schmeckende und leicht zersetzliche diuretische Tinctur wurde zu 10—20 Tropfen mit Wasser verdünnt gegeben.

4) **Extractum Scillae; Meerzwiebelextract.** Macerationsextract, mit 4 Th. Spiritus dilutus bereitet; von Extractconsistenz, gelblich-braun, ziemlich klar löslich. Zu 0.03—0.2 mehrmals täglich. Maximale Einzelgabe 0.2, maximale Tagesgabe 1.0. Am besten giebt man es in aromatischen Wässern gelöst. Pillen und Bissen sind wegen starker Hygroskopicität des Extracts minder zweckmässig; zur Bereitung ersterer ist ein Zusatz von Eibischpulver am dienlichsten.

## Verordnungen:

1)  $\mathcal{R}$   
*Extracti Scillae*  
*Pulv. bulbi Scillae*  
 — *rad. Althaeae*  $\overline{\text{aa}}$  2,5  
*M. f. pilul. No. 50. Consp. D. S.* Dreimal täglich 2—3 Pillen.

2)  $\mathcal{R}$   
*Bulbi Scillae*  
*Fol. Digital.*  $\overline{\text{aa}}$  1,5 (dgm. 15)  
*Infunde*  
*Aq. fervid. q. s. ad colatur.* 150,0  
*Liquoris Kalii acetici*  
*Succi Juniperi inspissati*  $\overline{\text{aa}}$  25,0  
*M. D. S.* 2stündlich 1 Esslöffel.

3)  $\mathcal{R}$   
*Liquoris Kalii acetici*  
*Oxymellis Scillae*  $\overline{\text{aa}}$  15,0  
*Decocti rad. Senegae* (e 10,0)  
 150,0  
*M. D. S.* Stündlich 1 Esslöffel. (Bei drohendem Lungenödem.)

4)  $\mathcal{R}$   
*Bulbi Scillae* 2,0  
*Ammoniaci*  
*Rhizom. Zingiberis*  
*Saponis medicati*  $\overline{\text{aa}}$  1,5  
*Syrupi communis q. s.*  
*ut f. massa pilul. e qua form. pilul.*  
*No. 100. Consp. D. S.* Dreimal täglich 5 Pillen. (*Pilulae Scillae compositae Ph. Br.*)



An die Meerzwiebel schliessen sich eine grössere Anzahl vegetabilischer Drogen, welche Herzgifte einschliessen und durch diese nach Art des Scillitoxins und der Digitalisstoffe in kleinen Dosen steigend auf den Blutdruck und die Diurese wirken. Manche der hierhergehörigen Drogen enthalten übrigens neben dem als Herzgift wirkenden noch anders wirkende Principien und sind deshalb auch nach anderen Richtungen hin therapeutisch verwertbet. Dies gilt besonders von der früher officinellen grünen Nieswurzel, *Radix Hellebori viridis*, dem Wurzelsystem der in Deutschland wie überhaupt in den gemässigten Strichen von Europa und Nordamerika einheimischen Ranunculaceae *Helleborus viridis*, und von dem Rhizom der in Oberbayern und Oesterreich wild vorkommenden und wegen ihrer mitten im Winter erscheinenden schönen Blüten bei uns in Gärten cultivirten schwarzen Nieswurz (*Helleborus niger*). In beiden finden sich zwei stark wirkende Glykoside, welche von ihren Entdeckern A. Husemann und Marmé als Helleborin und Helleborein benannt sind. Von diesen ist das in Wasser lösliche Helleborein ein starkes Herzgift, welches, subcutan applicirt, zu 0,001—0,005 Frösche in wenigen Minuten und zu 0,08 bis 0,12 subcutan Katzen und Hunde in einigen Stunden tödtet. In das Blut gebracht tödtet 0,012 Katzen in 20 Minuten. Es hat eine stark irritirende Action auf Schleimhäute (nicht auf die äussere Haut) und namentlich auf den Tractus, und kann die interne Einführung wiederholter kleiner Gaben geradezu zu Gastroenteritis Veranlassung geben, die bei Lebzeiten durch Brechen (selbst Hämatemesis) und flüssige Dejectionen (selbst blutigen Stuhlgang mit Tenesmus) und nach dem Tode durch alle Grade der Irritation sich äussert. Die Wirkung auf das Herz und ebenso auf den Blutdruck ist völlig der des Digitalins gleich. Helleborein vermehrt Diurese und Speichelsecretion und bedingt bei weiblichen Thieren constant starke Anfüllung der Uterusgefässe mit Injection der Gebärmutter Schleimbaut. Endlich erzeugt das Helleborein in toxischer Dosis lähmungsartige Schwäche, Herabsinken des Kopfes, Zittern, Ausgleiten der Extremitäten und Krämpfe. Das Helleborin ist trotz seiner geringen Löslichkeit in Wasser stark giftig, indem es Frösche zu 0,08 (subcutan) und Kaninchen und Hunde zu 0,2—0,4 intern tödtet. Es wirkt auf Schleimhäute ebenfalls irritirend, jedoch schwächer als Helleborein und verlangsamt die Herzaction nur in sehr grossen Dosen, während es besonders auf das Gehirn wirkt und bei starker Einwirkung die tiefste Betäubung mit completer Anästhesie bedingt.

Die grüne Nieswurz war ein Ersatzmittel für die im Alterthume als Heilmittel bei Geisteskrankheiten höchst geschätzte und selbst sprüchwörtlich gewordene Nieswurz (von Anticyra), die Wurzel der in Kleinasien einheimischen *Helleborus orientalis* L. Früher war als solches Ersatzmittel die *Radix Hellebori nigri* officinell, welche jedoch die Erwartungen moderner Aerzte nicht befriedigte und deshalb der grünen Nieswurz weichen musste, welche viel mehr von dem auf das Gehirn wirkenden Glykosid enthält und deren Helleborein dem aus *Helleborus viridis* dargestellten an Wirksamkeit ausserordentlich nachsteht. Ob übrigens auch die grüne Nieswurz medicinisch dasselbe leistet wie die orientalische, ist um so mehr problematisch, als nach den Versuchen von Schroff bei *Helleborus orientalis* die narkotische Wirkung in weit ausgeprägterem Maasse hervortritt und doch nur von dieser, d. h. vom Helleborin, die Heileffecte bei Psychose herrühren können. In allen übrigen Krankheiten, wo man *Helleborus* angewendet hat, ist es in gleicher Weise ausser Credit gekommen. Die hauptsächlichste Verwendung als Drasticum wird durch die Gefahren, welche die Herzwirkung des Helleboreins mit sich führt, vollkommen unthunlich gemacht, ebenso der Gebrauch als Emmenagogum. Rationelle Indication des Mittels ist offenbar das Vorhandensein von Insomnie und Oppression im Verlaufe von Hydrops, wo gleichzeitig die durch das Helleborein gesetzte Steigerung des Blutdrucks und die durch Helleborin bedingte Hypnose von Nutzen sein kann. Irrationell ist die Anwendung von Salben und Fomenten als Derivans der Nervenleiden oder als Reizmittel bei chronischen Dermatosen, obsolet die Anwendung von Nieswurzstücken als Ersatz der Erbsen in Fontanellen (Columella). Man bereitete aus der grünen Nieswurz früher mit verdünntem Spiritus eine Tinctura *Hellebori viridis*, die man zu 10—20 Tr. mehrmals täglich verordnete. Die Versuche, das in Wasser leicht lösliche Helleborein als Ersatzmittel des Digitalins zu verwenden (Leyden, Görtz), lieferten

negative Resultate, bei interner Anwendung, wo selbst 0,15 im Tage tolerirt wurden, kam es zu starken dyspeptischen Erscheinungen (Görtz).

Von anderen Ranunculaceen enthält *Adonis vernalis*, deren Wurzel mitunter mit *Radix Hellebori* verwechselt wird, ebenfalls ein als Herzgift wirkendes Glykosid, in Wasser und Aether wenig, leicht in Alkohol löslich, das Adonidin von *Cervello*, welches in der Intensität seiner Wirkung dem Digitoxin gleichkommt. Bubnow (1879), dem wir die ersten Versuche über die physiologische Wirkung der *Adonis vernalis* verdanken, empfiehlt ein Infus von 4,0–8,0 auf 200,0 Colatur als in manchen Fällen die *Digitalis* an Wirksamkeit übertreffend.

Ausser der Familie der Ranunculaceen enthält namentlich diejenige der Apocynaceae glykosidische Herzgifte, die sich z. B. im Oleander (*Nerium Oleander*), in *Thevetia nereifolia*, in *Strophanthus hispidus*, einer afrikanischen Pflanze, in *Apocynum cannabinum* L., welche als Gifte und theilweise auch als Arzneimittel, wie die letztgenannte Pflanze in Nordamerika, bei Wassersucht bekannt sind. Der Milchsafft von *Antiaris toxicaria*, aus welchem in Ostasien ein Pfeilgift bereitet wird, enthält ebenfalls ein glykosidisches Herzgift. Alle diese Stoffe und verschiedene andere aus tropischen Pflanzen gewonnenen Herzgifte haben bisher Bedeutung für die Therapie nicht gewinnen können. Nur die sog. Sassyrinde, die Rinde einer westafrikanischen Papilionaceae, *Erythrophloeum Guineense*, welche in ihrer Heimath nach Art der bekannten Gottesgerichtsbohne zur Ueberführung von Zauberern benutzt wird und welche sich den Herzgiften anreihet, indem sie zwar kein Glykosid, aber ein auf das Herz nach Art des Digitalins wirkendes Alkaloid, das *Erythrophloein*, enthält, welches aber gleichzeitig nach Art des Pikrotoxins auf das verlängerte Mark krampferregend wirkt, hat praktische Anwendung erfahren, doch zeigen die mit einer Tinctur der Rinde von Drummond (1880) bei Herzkranken angestellten Versuche zwar die den Puls verlangsamende und die Systole verstärkende Action, jedoch weniger zuverlässig und langsamer als bei *Digitalis*. Cumulative Wirkung fand bei der Darreichung von 5–10 Tr. der Tinctur nicht statt.

In allerneuester Zeit hat die Maililie, *Convallaria majalis* L., welche ein russisches Bauernmittel bei Hydrops ist, als Surrogat der *Digitalis* und der Scilla Empfehlung gefunden (Botkin, Troitsky, Bojojawlensky, Sée). Dieselbe enthält zwei Glykoside, von denen eines, das *Convallamarin*, purgirend wirkt, während das andere, das *Convallarin*, ein ziemlich energisches Herzgift ist (Marmé). Sée bezeichnet die Maililie als das beste Diureticum, während Stiller und Leyden weder von einem Aufguss noch von Maililien-extract bei Compensationsstörungen günstige Resultate hatten. Die angenehm riechenden Blüthen wurden früher als Schnupfpulver verwendet. Das *Convallarin* ist nur in Weingeist, nicht in Wasser löslich.

**Radix Ononidis**, Rad. restae bovis s. Remorae atrati; Hauhechelwurzel, Harnkrautwurzel.

Die Art und Weise der Wirkung der zu den beliebtesten Diuretica gehörenden Wurzel der bei uns an grasigen, unbebauten Stellen sehr häufigen Leguminose *Ononis spinosa* L., Hauhechel, ist bis jetzt nicht aufgeklärt. Dasselbe enthält ein eigenthümliches Glykosid, das Ononin, dagegen kein ätherisches Oel.

Die *Radix Ononidis* ist 5–7 Dm. lang, 1–2 Cm. dick, oben vielköpfig, cylindrisch (nicht spindelförmig, wie die Wurzel der nahe verwandten *Ononis repens* L.), abgeplattet, um ihre Axe gedreht, und löst sich nach oben in zahlreiche Stengeltriebe auf. Sie ist getrocknet aussen schmutziggelbbraun, innen weiss, dicht, holzig, äusserst zähe und biegsam. Der sehr unregelmässig contourirte Querschnitt bietet zahlreiche Strahlen von ungleicher Länge und eine

festanhaftende Rinde von weniger als 1 Mm. Dicke. Die Droge findet sich in den Officinen meist längsgespalten und ist ohne erheblichen Geruch, die Aussenrinde auch ohne Geschmack, während das Holz bei anhaltendem Kauen schwach säuerlichen Geschmack auf der Zungenspitze zurücklässt und die dünne, hellbraune Innenrinde anfangs stark bitter schmeckt und nach dem Zerkauen für einige Zeit einen süsslichen Lakrizgeschmack (wahrscheinlich von einem dem Glycyrrhizin ähnlichen, als Ononid bezeichneten Körper abhängig) und schwach brennende Empfindung im Munde mit vermehrter Speichelabsonderung zurücklässt.

Das von Reinsch entdeckte Ononin bildet mikroskopische, farblose, vierseitige Prismen oder Blättchen, welche sich nicht in kaltem und nur wenig in kochendem Wasser, langsam in starkem Weingeist lösen. Beim Kochen mit wässriger Salzsäure und verdünnter Schwefelsäure zerfällt es in Glykose und Formononetin, welches seinerseits beim Kochen mit wässrigen Alkalien oder Baryt in Ononetin und Ameisensäure zerfällt. Mit Barytwasser oder wässrigem Kali gekocht, spaltet sich Ononin in Ameisensäure und Onospin, eine geschmackfreie, krystallinische Masse, welche nach dem Schmelzen bei  $162^{\circ}$  amorph wieder erstarrt und dann Geschmack zeigt und beim Kochen mit verdünnten Säuren in Ononetin und Glykose zerfällt. Das Ononin erzeugt ein nach längerer Zeit sich entwickelndes Gefühl von Kratzen und Rauigkeit im Gaumen und Schlundkopf, wirkt aber zu 0,2—0,3 weder diuretisch noch irgendwie störend ein.

Der Gebrauch der Hauhechelwurzel als Antihiydropicum ist bis jetzt nur als auf Empirie beruhend anzusehen. Man benutzt sie auch wegen ihrer diuretischen Wirkungen als Antidystraticum bei Hautaffectionen (Bestandtheil der Species ad decoctum lignorum) und chronischen Rheumatismen, gegen welche Ascherson auch das Hauhechelkraut, Herba Ononidis, empfahl.

Ein besonderer Werth des Mittels liegt in seiner völligen Unschädlichkeit den Nieren und dem Gesamtorganismus gegenüber. Man giebt die Rad. Ononidis zu 15,0—30,0 pro die in Abkochung (1:5—10) und verordnet sie meist in Speciesform in Verbindung mit andern diuretischen Drogen.

Mit solchen bildet sie einen Hauptbestandtheil verschiedener früher officineller, als Species diureticae bezeichneter Mischungen, welche sich zweckmässig durch magistral zu verordnende gleiche Theile von Rad. Ononidis, Rad. Levistici, Fruct. Juniperi und Rad. Liquiritiae ersetzen lassen.

**Anhang.** Wie bei Ononis befinden wir uns auch bezüglich mancher anderer populären Diuretica in Zweifel über das eigentliche active Princip. So namentlich bei den als Flores Stoechados citrinae bezeichneten Blüten des Sandruhrkrauts, Helichrysum arenarium DC. (Fam. Compositae), welche zu 5,0—10,0 pro die im Aufguss nicht allein als Hydragogum, sondern auch bei chronischen Hautkrankheiten, z. B. Impetigo (Andrejewski) Empfehlung gefunden haben. Zu derselben Familie gehört die als Herba virgae aureae s. Consolidae Saracenicae bezeichnete Goldrute, Solidago virgaurea L., das im Aufguss zu 10,0—20,0 pro die verwendete Hauptnierenmittel der Rademacherianer. Alkaloidhaltig ist ein in Grossbritannien seit Cullen sehr geschätztes und von Pereira allen ähnlichen Mitteln vorgezogenes Diureticum, die Cacumina Scoparii s. Spartii, die blühenden Zweigspitzen des bei uns in Sandgegenden verbreiteten Besenginsters, Sarothamnus scoparius Wimmer s. Spartium scoparium L. (Fam. Leguminosae), welche im frischen Zustande eigenenthümlich kressenartig riechen und widerlich bitter schmecken. Stenhouse fand in denselben eine flüchtige Base von der Formel  $C^{15}H^{26}N^2$ , das Spartein, und einen krystallinischen Farbstoff, das Scoparin,  $C^{21}H^{22}O^{10}$ . Das letztere, das als gallertartige Substanz, die nach dem Trocknen eine spröde, amorphe Masse bildet, oder in Krystallen erhalten wird und sich wenig in kaltem, reichlicher in warmem Wasser und Alkohol löst, wird von Stenhouse als das diuretische Princip des Besenginsters bezeichnet, indem es zu 0,3—0,4 die Harnmenge in 12 Stunden um das Doppelte steigere; dagegen fand Schroff



Mercksches Scoparin zu 0,1—0,3 wirkungslos, zu 0,5 Bauchgrimmen und Kollern im Leibe verursachend. Das Spartein, in reinem Zustande ein wasserhelles, dickflüssiges Oel von schwachem, an Anilin erinnerndem Geruche und intensiv bitterem Geschmacke, welches sich am reichlichsten in dem an sonnigen Stellen gewachsenen Besenginster entwickelt, wirkt nach Versuchen von Mitchell zu 0,25, nach Schroff schon zu 1 Tr. letal auf Kaninchen, und hat nach J. Fick einige Aehnlichkeit mit Coniin, indem es bei Anwendung grosser Dosen die motorischen Nerven vollständig lähmt und die Reflexaction stark herabsetzt; daneben beeinträchtigt es auch die Hirnfunction, ohne das Bewusstsein völlig zum Schwinden zu bringen, hebt die elektrische Reizbarkeit des Vagus in kleinen Dosen rasch auf, indem es gleichzeitig die im Herzen belegenen Hemmungscentra lähmt, und tödtet bei Säugern durch Lähmung des respiratorischen Centrums. Auch nach Spartein kommt vermehrte Diurese vor (J. Fick). Man benutzt in England entweder den an Kalisalzen sehr reichen Presssaft frischer Besenginsterstippen (zu 5,0—10,0) oder eine Abkochung der trocknen *Cacumina Scoparii* (von 15,0 pro die). Aeltere deutsche Pharmakopöen hatten statt des Besenginsters den früher von Marochetti als russisches Volksmittel zur Verhütung der Wasserscheu empfohlenen Färbeginster, *Herba Genistae tinctoriae* (von *Genista tinctoria* L.), officinell und benutzten ihn mit Rad. *Ononidis* u. a. zu Species diureticae.

Hier ist auch noch die Kainkawurzel, *Radix Caincae*, die Wurzel von *Chiococca racemosa* und verschiedenen anderen Brasilianischen *Chiococca*-Arten (Fam. *Rubiaceae*), welche in ihrem Vaterlande als milde Purganzen dienen, zu nennen, indem sie in Abkochung (8,0 auf 200,0 esslöffelweise) bei Hydrops, Herz- und Nierenleiden gegeben wurde (Langsdorf, Löwenstein, Spitta, Wendt). Pelletier und Caventon isolirten daraus eine eigenthümliche glykosidische Säure, die Cainesäure (Caincin), welche nach François und Lefort zu 0,12 bis 1,0 gereicht in ausgezeichneter Weise diuretisch (nur ausnahmsweise purgirend oder emetisch) wirken und selbst bei längerer Darreichung weder die Magenschleimhaut, noch Nieren und Blase irritiren soll.

Völlig unaufgeklärt sind wir über das diuretische Princip der in den letzten Jahren bei Hydrops viel versuchten, in Russland als Volksmittel bei Wassersucht geschätzten *Tarakane*, *Blatta orientalis*. Ueber das von Bogomolepoff aus dem unter dem Namen Kakerlak oder Küchenschabe bekannten Insekt dargestellten krystallinischen Stoff Antihydropin ist Zuverlässiges nicht bekannt. Man giebt die *Blatta* zu 0,3—1,2 in Pulverform oder Aufguss oder eine daraus bereitete Tinctur zu 10—40 Tr. im Tage.

**Fructus Juniperi, Baccae Juniperi; Wacholderbeeren. Oleum Juniperi, Oleum fructuum Juniperi; Wacholderöl, Wacholderbeeröl.**

Die Wacholderbeeren, deren Wirksamkeit ausschliesslich auf dem darin enthaltenen, ebenfalls officinellen ätherischen Oele beruht, stellen den zur Reife gelangten beerenartigen Fruchtstand des im nördlichen und mittleren Europa und in Nordasien allgemein verbreiteten, in Südeuropa selteneren, bei uns strauchigen, in arktischen Gegenden baumartigen Wacholder, *Juniperus communis* L. (Fam. *Coniferae* oder *Cupressineae*), dar.

Die Wacholderbeeren sind kugelig, ungefähr erbsengross, bläulich bereift, nach Entfernung des Reifes schwarzbraun. Die Beeren, welche am Grunde von zwei dreizähligen Wirteln brauner Deckblättchen umgeben sind, an der Spitze einen eingesenkten dreistrahligen Stern und drei zwischen den Strahlen sich erhebende Höcker (durch Verwachsung der fleischig werdenden obersten drei Deckblätter des Fruchtstandes gebildet) zeigen, bestehen aus dem braungrünen,

pulpösen, an Balsamräumen reichen Fleische und drei mit den Fruchtwänden verwachsenen, harten, dreikantigen Samen, an deren Innen- und Rückenfläche sich kleine, bis 2 Mm. lange Schläuche finden, welche mit dem ätherischen Oele gefüllt sind, das in älteren Früchten durch ein krystallisirtes farbloses Stearopten oder Harz ersetzt wird. Die Wacholderbeeren haben einen aromatischen Geruch und einen angenehmen gewürzhaften, süsslich bitterlichen (bei sehr alten Früchten etwas säuerlichen) Geschmack. Zur Reifung bedürfen die Wacholderbeeren zwei Jahre. Die nicht zulässigen unreifen Wacholderbeeren, *Fructus Juniperi immaturi* (aus dem ersten Jahre), sind im trockenen Zustande blassbraungrün und enthalten wenig ätherisches Wacholderbeeröl und ein davon verschiedenes, mit Iod explodirendes ätherisches Oel mit niedrigerem Siedepunkte. Geröstete Wacholderbeeren sind fast schwarz und schmecken nicht süss, sondern mehr oder weniger empyreumatisch bitter. Früher war auch das viel geringere Mengen Balsam einschliessende blassröthliche oder weisse leichte Holz des Stammes und der Wurzel des Wacholderstrauches als *Lignum Juniperi officinell* (besonders zu Räucherungen).

Die *Fructus Juniperi* enthalten, vom Wacholderöle abgesehen, das in reifen Früchten  $\frac{3}{4}$ – $1\frac{1}{4}$ % beträgt und am reichlichsten in nördischen Fr. Junip. vorzukommen scheint, viel Traubenzucker, der sie zur Darstellung gegohrener Getränke (Gin, Genever, Steinhäger) qualificirt, ferner Harz und einen eigenthümlichen gelben Stoff (*Juniperin*). Das ätherische Wacholderöl ist farblos oder blassgelb, dünnflüssig, von starkem, aromatischem Geruche und Geschmacke, neutral, in Weingeist wenig löslich, mit Schwefelkohlenstoff klar mischbar. Es ist ein Gemenge zweier nicht vollständig von einander zu trennender Camphene, nimmt an der Luft Sauerstoff auf und scheidet dann farblose Tafeln von Wacholdercampher ab, giebt bei längerem Contact mit warmem Wasser ein krystallisirendes Hydrat, dagegen mit Salzsäure nur eine flüssige Verbindung und explodirt mit Iod nicht.

Ueber Wacholderbeeren und Wacholderöl liegen wenige physiologische Untersuchungen vor, wonach letzteres dem Terpenthinöl analog erscheint und beide Präparate diuretisch wirken.

Wacholderöl tödtet Kaninchen zu 15,0–20,0 in 10–22 St. unter Zunahme der Pulsfrequenz, beschleunigter und mühsamer Athmung und Vermehrung der Diurese, Diarrhoe und Collaps, (Simon). Dass grössere Dosen Wacholderbeeren (90,0) auf Pferde und Kühe diuretisch wirken, beobachtete schon Moiroud. Puls- und Respirationsbeschleunigung resultiren beim Menschen nach Wacholderöl, der Urin nimmt nach kleinen Gaben häufig Veilchengesuch an, grössere können zu Hämaturie führen. Nach Selbstversuchen von Nunneley soll Ol. Juniperi zu 30 Tropfen pro die die Urinmenge vermindern, dagegen Ausfuhr von Harnstoff und festen Harnbestandtheilen um das Doppelte steigern. Auf der Haut veranlasst Wacholderöl Röthung und Bläschenruption.

Therapeutisch dienen die Wacholderbeeren hauptsächlich als Diureticum (van Swieten, Hegewisch) bei Wassersucht, wo sie nur bei bestehender Nierenentzündung, hier aber ganz entschieden zu widerrathen sind.

Ein Einfluss bei katarrhalischen Affectionen diverser Schleimhäute, wie sie dem Terpenthinöl zukommt, ist auch dem Wacholderbeeröl eigen. Die Anwendung bei chronischem Blasenkatarrh und davon abhängiger Ischurie (Richter), sowie bei Gonorrhoe, wo Hacker und Schmid mit dem *Succus Juniperi inspissatus* (zu 25,0–50,0 pro die) gute Erfolge erzielt haben wollen, ist daher keineswegs irrationell. Waldeck will nach Juniperusthee den Zuckergehalt im Urin eines Diabetikers abnehmen gesehen haben (?). Schneider empfahl Ol. Juniperi auch bei Bronchoblennorrhoe, ferner bei Digestionsschwäche, chronischem Rheuma und Gicht, sowie als Emmenagogum, wogegen auch Chambers dasselbe (mit Aloë) gebraucht. — Die irritirende Wirkung des Wacholderöls auf die Haut lässt auch die Anwendung der Wacholderbeeren bei Algien, Rheu-

matismus, schmerzhaften und ödematösen Anschwellungen (in Form von Species zu Kräutersäckchen) oder von den bei dem Volke noch sehr beliebten Fumigationen mit den Dämpfen bis zum Verkohlen erhitzter Wacholderbeeren rationell erscheinen. Schneider empfahl das Oel auch äusserlich bei Anasarka, Ascites und Gelenksteifigkeit; Larsen pinselte es bei scrophulöser Ophthalmie auf.

Man verordnet die Wacholderbeeren als Diureticum zu 10,0—15,0 pro die, meist als Theespecies (1 Esslöffel auf 2 Tassen), seltener in Aufguss (1:10—20). Zu einer Räucherung rechnet man 2,0—5,0. Das Oleum Juniperi kann innerlich zu 2—4 Tropfen mehrmals täglich in Oelzucker oder spirituöser Lösung, äusserlich mit Fett (1:2—5) oder in Spiritus gelöst benutzt werden. Wacholderöl theilt auch die antiseptische Wirkung des Terpenthinöls und ist deshalb Bestandtheil des Acetum aromaticum. Kocher (1881) empfahl Catgut vor dem Aufbewahren in Weingeist 24 Std. in Wacholderöl zu legen.

### Präparate:

1) **Succus Juniperi inspissatus**, Roob Juniperi, Extractum Juniperi, **Wacholdermus**. Durch Auspressen frischer, mit 4 Th. Aq. ferv. übergossener Wacholderbeeren und Eindampfen zur Consistenz eines dünnen Extracts bereitet; dunkelbraun, süss gewürzhaft, in Wasser trübe löslich. Innerlich theelöffelweise pure oder als Zusatz zu diuretischen Mixturen.

2) **Spiritus Juniperi**; **Wacholderspiritus**. Fruct. Juniperi 5 Th., mit aa 15 Th. Spiritus und Aq. 24 Std. macerirt, dann 20 Th. abdestillirt; klar, farblos. Innerlich pure zu 20—60 Tropfen, auch diuretischen Mixturen zugesetzt; äusserlich zu Waschungen und Einreibungen.

Andre früher gebräuchliche Präparate, Aqua Juniperi, Unguentum Juniperi und der aus Wacholderbeeröl, Fenchelöl und Kümmelöl bereitete Spiritus Juniperi compositus sind obsolet.

### Radix Levistici; Liebstöckelwurzel.

Die Wurzel von Levisticum officinale Koch s. Ligusticum Levisticum L., einer in Südeuropa wild wachsenden, bei uns vielfach cultivirten Umbellifere, bildet 3—4 Dm. lange, bis 4 Cm. dicke, schwammige, weiche, biegsame Stücke mit gelblichbrauner, querrunziger und längsgefurchter Aussenfläche und blassgelbem Innern. Die schwammige Rinde ist weit mächtiger als der Holzcylinder und zeigt zerstreute, beinah concentrisch geordnete, orangefarbene Balsamgänge. Dünne Stücke quellen im Wasser stark auf. Die Droge besitzt einen eigenthümlichen Geruch und einen unangenehmen, süsslich bitteren, aromatischen Geschmack, welchem ein brennendes Gefühl nachfolgt. Ueber die wirksamen Bestandtheile (Harz und ätherisches Oel) liegen Untersuchungen nicht vor. Die Droge ist mehr Volks- und Veterinärmittel und kann innerlich zu 0,5—2,0 mehrmals täglich in Maceration oder Aufguss (1:10—20) gereicht werden. Magistral verwendet man dieselbe meist in Verbindung mit andern diuretischen Vegetabilien in Speciesform.

Fructus s. Semen Petroselini; Petersiliensamen. — Einen nicht unbedeutenden Ruf als Diureticum geniessen die Früchte unserer als Küchengewächs allgemein bekannten Petersilie, Petroselinum sativum Hoffm. s. Apium Petroselinum Linn., einer ursprünglich dem östlichen Gebiete des Mittelmeeres angehörigen Umbellifere. Die Petersilienfrucht hat einen ziemlich starken und eigenthümlichen Geruch und Geschmack, welche von dem darin in wechselnden Mengen (zu 0,8—3,2%) vorkommenden ätherischen Oele und einem von Homolle und Joret dargestellten eigenthümlichen Körper, dem Apiol, herrühren. Das ätherische Oel ist ein Camphen, welches ausserordentlich stark zur Oxydation neigt, so dass aus dem wässrigen Destillate beim Abkühlen oder längerem Stehen Prismen eines Stearoptens (Petersilien campher) anschliessen. Letzterer findet sich auch in geringen Mengen im Petersilienöl des Handels. Das Apiol bildet ein farbloses, öliges Liquidum von 1,078 spec. Gew., starkem Petersiliengeruch, scharfem und beissendem Geschmack und saurer Reaction, welches sich nicht in Wasser, leicht aber in Weingeist, Aether und Chloroform löst. Dasselbe bedingt nach Joret und Homolle zu 0,5—1,0 nach Art des



Kaffees cerebrale Excitation mit einem Gefühle von Wohlsein und Wärme im Magen, zu 2,0—4,0 eine Art Rausch, Funkensehen, Betäubung, Ohrensausen, Schwindel und Stirnkopfschmerz, ausnahmsweise auch Aufstossen, Uebelkeit und gallige Diarrhoe. Man benutzt die Petersiliensamen therapeutisch nur als Diureticum, meist in Verbindung mit andern harntreibenden Mitteln, innerlich zu 0,5—1,0 in Pulver- oder Speciesform, oder im Aufguss (1:10—20). Ausserdem werden sie vom Volke mit Erfolg in Salbenform (1:3—5 Adeps oder Butyrum insalum) gegen Kopfläuse verwendet. Joret und Homolle empfahlen das Apol und ebenso die Petersiliensamen, welche in einzelnen Gegenden von Frankreich Volksmittel gegen Intermittens sind, als billiges Surrogat des Chinins bei Wechselfiebern, aber wenn sich auch allerdings dem Apol eine antitypische Wirksamkeit nicht absprechen lässt, so heilt es doch selbst von den leichteren Quotidian- und Tertianfiebern nur die Hälfte, bleibt bei Quartanen wirkungslos, lässt häufiger als Chinin Recidiven auftreten und beseitigt derartige Recidiven nicht. Ueber die Wirksamkeit des Apols bei typischen Neuralgien, unterdrückter Menstruation und Menstrualkolik (Joret und Homolle) fehlt es an einer hinreichenden Zahl beweiskräftiger Beobachtungen. Man kann bei Intermittens das Apol in Gallertkapseln zu 1,0 vor dem Anfalle reichen; auch ist von Pügel ein Apolsyrup (5:1000 Zucker und 500 Wasser) angegeben. Bei Menostase lassen Joret und Homolle 8 Tage vor dem zu erwartenden Eintritt der Katamenien täglich 0,25 Apol nehmen.

Früher war auch ein destillirtes Wasser der Petersiliensamen, Aqua Petroselini, officinell, welches man esslöffelweise für sich oder als Vehikel diuretischer Mixturen benutzte.

Zu den sehr zahlreichen ätherischöligen Diuretica aus der Familie der Umbelliferen gehören auch die ehemals viel gebräuchlichen Radix, Herba et Semina Apii, die entspr. Theile des der Petersilie nahe verwandten, zu culinarischen Zwecken viel cultivirten Sellerie, dessen zu Salat dienende Knollen hier zu Lande beim Volke als Aphrodisiacum und in Griechenland als antitypisches Mittel (in Abkochung angewendet) besonders Ruf geniessen, das als Herba Sii nodiflori bezeichnete Kraut von Helosciadium nodiflorum Koch, die auch als Carminativa und bei Impotenz benutzten Samen Ammi s. Ammeos vulgaris von Sison Ammi L. und Ammi majus L. und viele andere.

Zu den Diuretica aethereo-oleosa gehört vermuthlich auch das als Herba Pyrolae umbellatae s. Chimaphilae bezeichnete Kraut der von den Eingeborenen Nordamericas zuerst als Diureticum benutzten, übrigens auch in einzelnen Gegenden von Deutschland einheimischen Ericaceae Pyrola umbellata L. (Chimaphila umbellata Nutt.). Dasselbe bewirkt frisch auf der äusseren Haut Röthe und Blasenbildung und bedingt wie Uva ursi bei interner Einführung Schwarzfärbung des Urins. Mitchell (1803) und Somerville machten zuerst auf die diuretischen Effecte aufmerksam, welche von Radius u. a. deutschen Aerzten bestätigt wurden; auch hat es Anwendung bei Blasenkatarrhen und selbst bei Harn- und Griesbildung (vielleicht wegen seines Gehaltes von Gallussäure) gefunden. Man giebt es zu 8,0—15,0 pro die in Abkochung (1:10—20) und verordnet es als Mixture oder in Theeform.

Die als Folia Bucco s. Folia Buchu bezeichneten Blätter mehrerer am Cap der guten Hoffnung wachsender Species von Barosma, Barosma crenulata Hooker, Barosma serratifolia Wildenow und B. betulina Bartling (Fam. Diosmeae), enthalten nach Flückiger 1,58 bis 1,63% ätherisches Oel von pfefferminzähnlichem Geruche, in welchem ein Stearopten und Elaeopten vorhanden ist, ausserdem Schleim. Sie wurden zuerst von den Hottentotten zum Salben des Körpers oder als weniges Destillat (Buchu brandy) gegen Magen- und Darmbeschwerden benutzt, stehen aber jetzt als Diureticum und als Mittel bei chronischen Katarrhen der Blase und Harnröhre, wogegen sie zuerst Reeve (1823) und Mac Dowell anwandten, in besonderm Ansehen. Sie verursachen selbst bei grösseren Gaben und anhaltendem Gebrauche keine Reizung der Harnwege und sind sogar bei mit Blutungen verbundenen Affectionen der Nieren und Blase oft von günstigem Einflusse. Man giebt die Buccoblätter zu 0,5—2,0 pro dosi mehrmals täglich, gewöhnlich im Aufgusse (1:20), selten in Pulverform. In England ist auch eine Tinctura Bucco gebräuchlich.

Ferner gehört zu den ätherisch öligen Diuretica das Kraut von *Erigeron Canadense* L., einer jetzt durch ganz Europa verbreiteten nordamerikanischen Synantheree, das in Decocten oder Infusen (1:10—20, 3stdl. 1 Weinglas voll) in Amerika bei Hydrops und Blasenleiden angewendet wird. Das ätherische Oel ist von Williams und Wilson als blutstillendes Mittel (zu 5 Tropfen) bei Metrorrhagie und Menorrhagie gerühmt, scheint aber in seinen Erfolgen inconstant. Eine *Tinctura Erigerontis* ist in Amerika bei Darmkatarrhen und Dysenterie gebräuchlich.

Vermuthlich gehören zu den Aethereo-Oleosa auch die aus der Familie der Labiaten stammenden *Herba Ballotae lanatae*, die weissfilzigen Stengel, Blätter (meist zerbrochen) und Blüten des in Südsibirien wachsenden *Leonurus lanatus* Sprengel. Salze sind reichlich vorhanden, auch ein bitterer Stoff und ein Stearopten; der Geruch ist theeartig. Dieses südsibirische Hausmittel gegen Wassersucht wurde als solches von Rehmann (1815) und Schilling, gegen Gicht von Brera empfohlen, und wird zu 50,0—60,0 pro die in Abkochung (besser in Infusodecoct) gegeben. Ob die durch einen äusserst scharfen brennenden Geschmack ausgezeichneten, geruchlosen Blätter von *Sedum acre* (*Herba Sedi acris s. vermicularis*), welche früher auch örtlich bei Hühneraugen und Warzen dienten, ihre Schärfe einem dem Senföle verwandten ätherischen Oele verdanken, steht dahin.

**Kalium s. Kali aceticum, Terra foliata tartari; Kaliumacetat, essigsäures Kalium (Kali).**

Schon bei der Besprechung des Kaliumnitrats und Kaliumcarbonats wurde auf die diuretische Wirkung der Kalisalze hingewiesen und die grosse Permeabilität für Membranen erwähnt, welche namentlich dem Kaliumcarbonat eigen ist. Da die pflanzensauren Kalisalze bekanntlich im Organismus sich in Carbonate verwandeln, kommen denselben selbstverständlich die nämlichen entfernten Wirkungen zu, und so kann es nicht auffallen, dass gerade das Kaliumacetat einen besonderen Ruf als Diureticum genießt.

Dasselbe bildet eine schwach alkalische, schneeweisse, schuppig oder blättrig krystallinische, pulverige Salzmasse von mild stechend salzigem Geschmacke, welche an der Luft schnell zerfliesst und sich in 0,36 Th. Wasser und in 4 Th. Weingeist löst. Es schmilzt bei 280°, giebt bei 360° Essigsäure ab und hinterlässt nach weiterem Glühen durch Kohle graugefärbtes Kaliumcarbonat. Letzteres bildet sich allmählig auch in wässriger Lösung des Kaliumacetats.

Kleine medicinale Gaben (1,0—2,0) können von den meisten Personen relativ lange Zeit ertragen werden, ohne den Magen zu belästigen; nur selten bewirkt eine einzige derartige Gabe Schmerzen im Epigastrium und flüssigen Stuhl, welche bei grösseren Mengen nicht fehlen. Schnelligkeit und Menge der Urinabsonderung wird sowohl bei gesunden Menschen (Golding Bird, Boecker) als bei Thieren (Binz) vermehrt; doch ist die Zunahme der Harnmenge beim Gesunden nur unbedeutend (Nunneley); der Urin wird nach etwas grösseren Mengen neutral oder alkalisch. Ueber den Einfluss des Salzes auf die festen Harnbestandtheile differiren die Angaben; Golding Bird und Easton fanden das spec. Gew. und die festen Harnbestandtheile vermehrt, Nunneley Harnstoff und Fixa im Allgemeinen deutlich herabgesetzt, Boecker Vermehrung der Phosphate und Verminderung der übrigen Salze. Der Einfluss auf Puls und Temperatur weicht wahrscheinlich nicht von dem des Kaliumcarbonats ab, zumal da theilweise Umwandlung des Salzes in letzteres schon im Magen stattfindet. Grössere Mengen sollen ausser Vermehrung der Diurese auch Hämaturie und Katarrh der Harncanälchen erzeugen können (Clarus).

Als harntreibendes Mittel ist das Kaliumacetat unter allen Kalisalzen entschieden das am meisten geschätzte und leistet dasselbe nicht nur bei Anasarca und Ascites, sondern auch ganz

entschieden bei peritonitischen und pleuritischen Exsudaten (nach Ablauf der entzündlichen Erscheinungen) Vorzügliches.

Im Uebrigen theilt es die Indicationen des Kaliumcarbonats und kann bei den Affectionen, wo dieses gebraucht wird, Anwendung finden, so bei Gicht, Lithiasis und acutem Rheumatismus, wo das Mittel vor dem Carbonat den Vorzug hat, dass es viel besser vom Magen längere Zeit tolerirt wird. Bei Rheumatismus acutus u. a. fieberhaften Krankheiten kann es recht gut den schlechter schmeckenden Salpeter ersetzen; ebenso das Kaliumcarbonat als Alterans bei Scrophulose, chronischen Hautaffectionen (Easton, Golding Bird), Gonorrhoe u. a. m. Auch bei subacutem und selbst bei acutem Magencatarrh bewährt sich das Mittel, nach Marotte vorzugsweise bei starkem Zungenbelag und Appetitlosigkeit, wenn Erbrechen und Durchfall fehlen. Hier wird jedoch die Kohlensäure und Kaliumacetat enthaltende Saturation (vgl. S. 170) von den meisten Aerzten bevorzugt, die auch beim acuten Rheumatismus in der Regel verordnet wird.

Man giebt das Kali aceticum zu 0,5—4,0 meist in Lösung (wobei stärkere Säuren vermieden werden müssen), seltener in Pillen, z. B. mit Rhabarber. Gewöhnlich verordnet man zu Solutionen statt des Salzes dessen officinelle wässrige Lösung, den *Liquor Kali acetici* s. *Liquor terrae foliatae Tartari* s. *Kali aceticum solutum*, eine durch Sättigung von *Acidum aceticum dilutum* mit Kaliumbicarbonat und Verdünnen mit Wasser erhaltene klare, farblose Flüssigkeit von 1,176—1,180 spec. Gew., von welcher 3 Theile 1 Th. Kaliumacetat enthalten. Dieselbe ist somit in der dreifachen Dosis für sich oder in Mixturen zu geben. Statt derselben diene in früherer Zeit eine Sättigung von *Kalium carbonicum crudum* und *Acetum crudum* von geringerem Gehalte an Kaliumacetat (8%) als sog. *Liquor Kali acetici nigri* s. *crudi* s. *Liquor digestivus Boerhavii*.

Aeusserlich hat man Schnupfenlassen von *Liquor Kali acetici* bei Schleimpolypen der Nase empfohlen. Ausserdem dient ein Gemenge des trocknen Salzes mit *Kalium bisulfuricum* oder *Kalium bitartaricum* als Riechsalz zur Entwicklung von Essigsäure.

**Anhang.** *Kalium citricum*; *Kaliumcitrat*, citronensaures Kalium. — Das Kaliumacetat ist als Diureticum, Antipyreticum und als internes Medicament überhaupt durch das wohlgeschmeckende citronensaure Kaliumsalz zu ersetzen, welches indes meist in durch Sättigung von Citronensaft oder Citronensäure mit *Kalium carbonicum* oder *bicarbonicum* erhaltenen Mixturen zur Anwendung gebracht wird. Auf die Diurese Gesunder wirkt Kaliumcitrat wie Kaliumacetat (Nunneley). Man hat es auch als Antiscorbuticum zu 0,2—0,5 pro dosi versucht (Attfield).

**Natrium** s. *Natrum aceticum*, *Terra foliata tartari crystallisata*; *Natriumacetat*, essigsäures Natrium (*Natrum*).

Das Salz bildet farb- und geruchlose, durchsichtige, prismatische Krystalle, welche an der Luft verwittern und in 1,4 Th. Wasser und in 23 Th. kaltem und 2 Th. kochendem Weingeist löslich sind. Beim Erhitzen auf 75° schmelzen sie in ihrem Krystallwasser und gehen bei weiterem Erhitzen unter Verlust des Krystallwassers in eine pulverförmige Masse über, die bei 240° aufs Neue schmilzt. In der Glühhitze wird das Salz in Natriumcarbonat verwandelt. Das officinelle Präparat wird aus dem als Rothsatz bezeichneten unreinen Natriumacetat durch Umkrystallisiren gewonnen. Es dient auch zur Darstellung des Eisessigs. Medicinisch wird es wie Kaliumacetat verwendet, vor dem es den Vorzug besitzt, dass es nicht zerfliesst und deshalb auch in Pulverform anwendbar ist, während es andererseits keine antipyretischen Effecte und wahrscheinlich auch wegen schwächerer Diffusion geringere diuretische Wirkung besitzt. In grösseren Dosen wirkt es purgirend und kann wie andre Natronsalze als Abführmittel dienen.

Analog verhält sich dem entsprechenden Kalisalze das Natriumcitrat,



*Natrium citricum*, welches von französischen Aerzten mit *Aq. carbon.* und Syrup. Citri als angenehmes Laxans zu 25,0—40,0 empfohlen ist.

*Urea nitrica*, salpetersaurer Harnstoff. — Als Anhang zu den diuretischen Stoffen muss auch noch der Harnstoff erwähnt werden, welchen Segalas, Laennec, Tanner, Mauthner, Kingdon und Rieken entweder als solchen oder als salpetersaures Salz zu 0,5 bis 4,0 in wässriger Lösung oder bei Kindern zu 0,1—0,2 mit Erfolg gereicht haben wollen, während ihn Piorry gegen Albuminurie, Dulk und Rochoux gegen Diabetes benutzten. Die diuretischen Effecte sind beim Gesunden auch nach 5,0 Harnstoff nicht eben ausgesprochen (Rabuteau). Bei Einbringung in den Magen oder in das Blut findet sich die gesammte Harnstoffmenge unverändert im Urin (Wöhler und Frerichs) und im Speichel (Rabuteau) wieder. Grössere Dosen wirken toxisch, doch müssen bei Kaninchen mehr als 5,0 pro Kilo subcutan injicirt oder bei Hunden in die Venen eingeführt werden, um tödtlich zu wirken; nicht letale Gaben erzeugen tiefes Coma, letale auch paroxystische tetaniforme Krämpfe, denen ein Stadium gesteigerter Respirationsfrequenz mit Zittern, Injection der Ohrgefässe und öfterem Harnlassen vorausgeht (Falck).

## 2. Ordnung. *Nephrica litholytica*, steinlösende Nierenmittel.

*Lithium carbonicum*; Lithiumcarbonat, kohlensaures Lithium.

Das Lithiumcarbonat stellt die einzige officinelle Verbindung des in der Natur zwar sehr allgemein verbreiteten, aber doch verhältnissmässig seltenen Alkalimetalles Lithium dar. Man verwendet dasselbe medicinisch bei harnsaurer Diathese und Gicht wegen seines grossen Lösungsvermögens für Harnsäure, das es in höherem Grade als andere Alkalicarbonat und selbst Borax besitzt, indem 250 Th. bei Blutwärme 900 Th. Harnsäure lösen (Lipowitz, Ure).

Das Lithium kommt in der Natur in verschiedenen seltenen Mineralien, als Silicat im Petalith, Lepidolith und Spodumen, als Phosphat im Triphyllin (zu 5—7%), ausserdem in sehr geringer Menge sowohl im Meerwasser als in fast allen Brunn- und Quellwassern (in bedeutenderer Menge als Chlorlithium in einer Quelle zu Redrute in Cornwallis), in der Asche verschiedener Pflanzen, in der Milch und in menschlichen Blute vor. Das kohlensaure Lithium bildet ein weisses, geruchloses, scharf alkalisch schmeckendes Pulver, das die Wein-geistflamme carminroth färbt, sich in 150 Th. siedendem oder kaltem Wasser, leichter in kohlensäurereichem Wasser löst, beim Erhitzen schmilzt und beim Erstarren in eine krystallinische Masse übergeht. Legt man die mit harnsaurem Natrium incrustirten Knochen- oder Knorpelstücke von Arthritikern in gleichstarke Lösungen der Carbonate von Natrium, Kalium oder Lithium, so verlieren sie die Incrustation in bestimmter Zeit in der Lithiumlösung ganz, in der Kalilösung zu einem grossen Theil, dagegen in der Natronlösung gar nicht (Garrod). An Stelle des Lithiumcarbonats ist auch zur Erhöhung der Wirkung Lithiumbenzoat (Climent) und Lithiumsalicylat empfohlen worden, von denen das letztere namentlich bei schmerzhaften arthritischen Gelenkaffectionen Anwendung verdient.

Die physiologische Wirkung der Lithiumsalze ist denen der Kaliumsalze gleich. (Th. Husemann und Hesse).

Bei Warmblütern und Fröschen bedingt Lithiumchlorid in derselben Dose wie Kaliumchlorid diastolischen Herzstillstand und Tod. Häufig wird bei

Säugethieren vermehrte Diurese beobachtet; die Temperatur sinkt bei toxischen Dosen ebenso stark wie bei Kalisalzen. Dem Alkalimetallgehalt entsprechend sind Lithiumsalze viel giftiger als die entsprechenden Kalisalze (Th. Husemann und Hesse). Darreichung von 0,25 2—3mal täglich afficirt den gesunden Organismus nicht sichtlich (Garrod). Dagegen rufen Tagesgaben von 5,0—10,0 leicht Magenkatarrh hervor.

Im Harn lässt es sich schon nach 8 Min. nachweisen (Bence Jones), Chlorlithium bei Application auf die Vaginalschleimhaut nach 2 Std. (Ham-burger). Vermehrung der Harnsäureausscheidung wird durch Lithiumcarbonat weder bei Gesunden noch bei Arthritikern bewirkt, dagegen verschwinden bei letzteren die Sedimente. Ausserdem beschränkt das Mittel bei Gicht die Anfälle.

Man hat das Lithiumcarbonat oder an dessen Stelle die im Organismus zu Carbonat verbrennenden pflanzensauren Lithiumverbindungen (Acetat, Citrat) auch bei chronischem acutem Rheumatismus, sowie bei herpetischen Krankheitsformen (Wolff) empfohlen; auch wurde Inhalation von Lithiumcarbonatlösung zur Auflösung der Membranen bei Croup und Diphtheritis, für die es ein dem Kalkwasser gleiches Lösungsvermögen besitzt (Foerster), proponirt.

Man giebt das kohlensaure Lithium innerlich zu 0,06—0,3 (mit Zucker in Pulvern, welche man zweckmässig in Selterswasser nehmen lässt), auch in Saturation. Zu litholytischen Einspritzungen in die Blase rath Ure 2,0—4,0 in Wasser gelöst an.

**Borax, Natrium biboricum s. biboracicum s. boracicum; Natriumborat, Borax.**

Der Borax, welcher früher unter dem Namen Tinkal oder Pounxa aus Tibet und Indien nach Europa kam, jetzt in Toscana durch Sättigung der natürlich vorkommenden Borsäure mit Natriumcarbonat gewonnen wird, ist tetraborsaures Natrium und bildet als sog. raffinirter Borax des Handels weisse, harte, wasserhelle, scharf rhombische Säulen oder krystallinische Stücke von süsslichem, mild kühlendem Geschmacke, welche an der Luft verwittern, beim Erhitzen zu einer weissen schwammigen Masse (gebrannter Borax) und in der Glühhitze zu einem farblosen Glase (wasserfreier Borax), das fast alle Metalloxyde aufzulösen vermag, schmelzen. Er giebt mit  $\frac{1}{2}$  Th. siedendem und 17 Th. kaltem Wasser farblose Lösungen, welche Curcumapapier bräunen. In Alkohol löst er sich nicht, dagegen reichlich in Glycerin. Der in der Technik ausserordentlich viel (besonders zum Löthen, zur Darstellung von Email, Glasuren u. s. w.) benutzte Borax hat als Medicament untergeordnete Bedeutung. Im Ganzen wirkt er wohl kaum anders wie irgend ein mildes Natriumsalz und sind deshalb die therapeutischen Effecte und Indicationen die nämlichen. Selbst 12,0 im Tage sind völlig unschädlich (Cyon). Man schreibt ihm vor Allem diuretische Action zu, ausserdem ein sehr starkes Lösungsvermögen auf harnsaure Concremente, weshalb er bei Hydrops und bei Gries- und Harnsteinbildung (Wetzler, Berzelius) besonders Empfehlung gefunden hat. Die lösende Wirkung auf Urate, welche nach Binswanger nur der des Lithiumcarbonats nachsteht, kann Borax um so mehr bethätigen, als er unverändert in den Urin (auch in die Galle) übergeht. Ausserdem hat man ihn intern als Emmenagogum (Pitschaft) und wehentreibendes Mittel verwerthet, ohne dass für diese Wirkung Beweise vorliegen, obschon Copland mit Borax sogar Polypen abgetrieben und Poitevin damit Metrorrhagien post partum gestillt haben will. Man giebt ihn innerlich zu 1,0—2,0 mehrmals täglich in Pulvern oder wässriger Lösung.

Wie der Borsäure (vgl. S. 270) kommt auch dem Borax eine ausgesprochene antiseptische Wirkung zu, so dass Leichentheile in Boraxlösung sich lange unversehrt halten. Selbst im Erdreich, welches mit Boraxlösung imprägnirt ist, wird die Fäulniss von Cadavern verhindert (Bédoin). Borax hemmt die Sprossung von Hefezellen und die Keimung von Sporen (Kosegarten), womit offenbar z. Th. die günstigen Effecte in Zusammenhang stehen, welche Borax unbe-

stritten bei Aphthen und aphthösen Geschwüren, sowie bisweilen beim Soor, ebenso wie bei Ptyalismus, Glossitis und Anginen zeigt. Man wollte dieselben sonst durch Neutralisation des sauren Secrets im Munde, welche das Wachsen von Pilzvegetationen befördern sollte, erklären, doch ist dies nicht ausreichend. Borax ist in dieser Beziehung dem Kaliumchlorat überlegen. Man wendet ihn hier in Pinselsäften oder in Gargarismen (mit Honig und Wasser) an. Waldenburg empfiehlt Lösungen in Glycerin (1:5) zum Pinseln des Pharynx, Larynx und der Nasenhöhle (auch in Fällen leichten Katarrhs). Zergehenlassen eines Stückes Borax im Munde ist bei Sängern gegen plötzliche Heiserkeit und Stimmverlust gebräuchlich (Corson). In der Kinderpraxis sind auch die von Devreux empfohlenen Pastillen zweckmässig. Gebräuchlicher sind Pinselsäfte (sog. *Mel boracicum*, 1 Th. Borax mit 9 Th. Rosenhonig). Die antiseptische Wirkung führte auch zur Benutzung bei brandigen Buben (Schuh, Effenberger) in Form von Verbandwässern (5,0—10,0 auf 1 Pfd. Wasser). Bouchut benutzt Borax im Klystier (2,0 auf 100,0) bei Diarrhoe der Kinder; auch wird er zu Injectionen bei Leukorrhoe, Tripper, stagnirendem Secrete der Nasenhöhle, zu Collyrien bei Blepharospasmus und Photophobie, zu Waschungen und Salben bei leichteren und schweren Hautaffectionen (Ephelides, Pityriasis versicolor, Eczema, Lichen), besonders bei Pruritus genitalium und ani (Cazenave, Bielt), auch bei Frostbeulen (Trousseau) benutzt. Man nimmt zu den flüssigen Formen 5,0 auf 75,0—250,0 Wasser oder Rosenwasser, zu Salben 1:5—10 Th. Fett. In England ist Borax seit lange in Gebrauch zum Abhärten der Brustwarzen (in Brantwein gelöst). Devreux empfiehlt Borax mit Zuckerpulver bei Aphthen der Kinder auf die Brustwarze der Mutter zu streuen. Pharmaceutisch dient Borax als Zusatz zu Salben, um die Incorporation von Balsamen und Harzen zu erleichtern. Mit Gummischleim und Mucilago Amyli und Salep darf Borax nicht verordnet werden, weil er damit einen zähen, gallertartigen Körper bildet. Stärkere Säuren, Metall- und Erdsalze sind gleichfalls zu meiden. Längerer interner Gebrauch soll Psoriasis veranlassen (Gowers).

## Verordnungen:

- 1)  $\mathcal{R}$   
*Boracis* 5,0  
*Mell. rosati* 30,0  
*Aq. Rosarum* 15,0  
 M. D. S. Zum Bepinseln. (Sog. *Mel rosatum cum Borace* Ph. Wirt.)

M. D. S. Aeusserlich. (Bei hartnäckigem Eczema capillitii, I. Neumann.)

- 2)  $\mathcal{R}$   
*Boracis*  
*Aluminis crudi aa* 3,0  
*Glycerini* 50,0

- 3)  $\mathcal{R}$   
*Boracis* 5,0  
*Extr. Opii* 0,5  
*Infusi fol. Salviae* 150,0  
*Mellis depur.* 25,0  
 M. D. S. Gurgelwasser. (Bei schmerzhaften Anginen. Oppolzer.)

**Anhang.** Dem Borax schliesst sich der Wirkung nach das Magnesium boro-citricum, boricitronensaure Magnesia an, welche C. A. Becker als vorzügliches steinlösendes Mittel bei Nierensteinen, Harngries und Blasenleiden entweder in Pulverform (mit aa Zucker täglich messerspitzenweise) oder in Brausemischungen (mit Natr. bicarb.) dringend empfahl. Das Präparat wird ebenso wie der von Becker gleichfalls empfohlene Boracitsalmiak aus den bei Stassfurth vorkommenden, an Boraten reichen Boracit oder Stassfurthit, in welchem Becker den Ludus Paracelsi, das berühmte Geheimmittel des Paracelsus gegen den Stein, erkannt zu haben glaubte, dargestellt.

**Ammonium phosphoricum, Ammoniumphosphat, phosphorsaures Ammoniak.** — Dieses im Wasser leicht lösliche Salz wurde von Buckler u. a. amerikanischen Aerzten zu 0,5—2,0 mehrmals täglich als Litholyticum bei Gicht und Rheumatismus aus theoretischen Gründen angewendet, um den in Blute enthaltenen, aus Natron- und Kalkurat bestehenden Gichtstoff zu zersetzen, und besonders durch Edwards, Mattei und Hamolecki bei



allen rheumatischen Affectionen befürwortet. Edwards empfiehlt auch eine Lösung als Waschung bei Gichtknoten.

Vegetabilische steinlösende Mittel. — Man hat auch verschiedenen Vegetabilien eine specifische Wirkung auf Harnconcremente zugeschrieben und dieselben besonders bei Gries verwerthet. Bei den meisten dieser Medicamente ist, da sie in Tisanenform angewendet werden, die reichliche Zufuhr von Wasser ohne Zweifel der Grund etwaiger günstiger Effecte. Bei Einzelnen wirkt der grosse Gehalt an löslichen Salzen entschieden mit, z. B. bei der neuerdings von Bertheraud und Vigier bei Nierensteinkolik, Gries, Dysurie, acutem und chronischem Blasenkatarrh empfohlenen Strandpflanze *Arenaria rubra*, deren Abkochung alkalisch reagirt, da die Pflanze 5% lösliche Salze (Chlorkalium, Kalium- und Natriumcarbonat) enthält. Ausserordentlich verbreitete Verwendung haben die zuerst in den Tropenländern (Wassink) benutzten Narben der Maispflanze, *Stigmata Maïdis*, bei den genannten Affectionen und insbesondere bei Blasenkatarrh gefunden. Man giebt diese, different wirkende Stoffe nicht einschliessende Droge entweder als Tisane (1 Liter pro die) oder als syrupöses Extract, *Extractum stigmatum Maïdis*, zu 2–3 Esslöffel 2–3mal täglich in Thee oder heissem Wasser (Dufau).

Worauf die Wirkung der bis auf den heutigen Tag in Grossbritannien bei Stein und Gries, sowie als Diureticum und bei Blasenleiden überhaupt, namentlich *Cystitis chronica*, in Ansehen stehenden *Radix Pareira brava* beruht, ist nicht nachgewiesen, da das in derselben von Wiggers aufgefundene Alkaloid Pelosin, welches Flückiger mit Buxin identificirte, physiologisch nicht geprüft ist. Die echte *Pareira brava* (portugiesische Bezeichnung für wilde Weinrebe) ist die Wurzel des in Peru und Brasilien wachsenden Schlingstrauches *Chondodendron tomentosum* (Fam. Menispermaceae), wird aber häufig mit der von *Cissampelos Pareira* verwechselt.

Die als *Radix Junci* bezeichnete Wurzelstock verschiedener einheimischer Binsenarten, *Juncus effusus* L. und *J. conglomeratus* L., welche Spitta und Hartmann im Decoct zu 15,0–30,0 pro die gegen Stein und Gries rühmten, schliesst sich den indifferenten Mitteln an.

---

## XV. Classe. Genica, Sexualmittel.

Diese Classe zerfällt in drei Ordnungen, von denen die erste gleichzeitig für das männliche und weibliche Geschlecht Bedeutung hat, während die zweite und dritte ausschliesslich Functionen des weiblichen Geschlechts betreffen.

---

### 1. Ordnung. Antiblennorrhagica, Trippermittel.

Gewissermaassen den Uebergang von den Diuretica zu den Genica bilden zwei besonders bei Schleimflüssen der Urethra, aber auch der Vagina, und insbesondere gegen Tripper viel gebrauchte Medicamente, deren Action offenbar mit der Elimination ihrer wirksamen Principien durch den Harn im Zusammenhange steht. Ihre Action ist auch auf andere Schleimhäute gerichtet, doch ist der Gebrauch gegen Gonorrhoe ein so überwiegender, dass ihre Anwendung bei Bronchoblennorrhoe dagegen kaum in Betracht kommt.

Die activen Principien sind ätherische Oele und Harze, von denen die ersteren zum Theil im Organismus zu Harzen oxydirt werden. Dieselben erscheinen im Urin, dessen Einwirkung auf die Schleimhaut allgemein als das Wirksame bei der Heilung des Trippers angesehen wird, besonders seitdem Ricord seine Beobachtungen von Hypospadiaceen publicirte, bei denen die Gonorrhoe auf dem hinteren, von dem Harn bespülten Theile der Harnröhrenschleimhaut cessirte, während der Ausfluss im vorderen fort dauerte. Weickart hat die Ansicht ausgesprochen, dass die im Urin ausgeschiedenen Salze der Harzsäuren in eigenthümlicher Weise auf die Eiterzellen wirken, indem diese zwar nicht deren Proteinsubstanzen verändern, aber ihnen die Fette entziehen und dadurch, indem sie gleichzeitig eine Schrumpfung der Contouren der Eiterzellen hervorbringen, die Fortentwicklung derselben hemmen. Man hat gegen diese Theorie eingewendet, dass die Behandlung des Trippers durch den Urin von Personen, welche grosse Mengen der in Rede stehenden Substanzen einnehmen, negatives Resultat giebt (Bernatzik) und dass die fraglichen Mittel bei directer Injection in die Urethra weit weniger wirksam sind als bei interner Einführung (Marchal). Man hat deshalb eine substitutive Action auf die Blasen- und Urethralschleimhaut angenommen (Stillé) oder einen contrahirenden Einfluss auf die Gefässe, welche bei der Elimination sich geltend macht, woraus eine Beschränkung der Secretion hervorgehe. Nun sind aber in

den Experimenten Bernatziks nur verhältnissmässig geringe Mengen Urin versucht worden und andererseits ist es Thatsache, dass bei Leukorrhoe und Urethralblennorrhoe des Weibes Copaivabalsam und Cubeben die Harnröhrenaffection viel rascher als die Scheidenaffection heilen, dass letztere aber durch den Urin der betreffenden Kranken, wenn sie die fraglichen Mittel nehmen, geheilt werden kann (Hardy). Die Frage würde sich am besten durch die locale Anwendung der harzsauren Salze entscheiden lassen, die, wenn die Theorie von Weickart richtig ist, entschieden örtlich applicirt das beste Trippermittel darstellen müssen.

Die internen Trippermittel, unter denen Copaiva und Cubeben ohne Zweifel die zuverlässigsten sind, stehen im Ganzen den Injectionen von Zinksulfat und ähnlichen Mitteln nach, indem letztere den Ausfluss in der Regel rascher und sicherer beseitigen und der Arzt oft gezwungen wird, die interne Behandlung zu verlassen und mit den Einspritzungen zu vertauschen; andererseits giebt es aber auch Individuen, bei denen auch die regelrechte Cur mit Injectionen nicht anschlügt und man mit den sog. Balsamica verhältnissmässig rasch zum Ziele gelangt. Manchmal ist entschieden der gleichzeitige Gebrauch beider Methoden das Beste. Eine Hauptregel bei Anwendung der Balsamica, deren häufiges Uebersehen die Heileffecte oft beeinträchtigt, ist die, dass auch nach Wegbleiben des Ausflusses die Mittel noch 8–14 Tage fortzugeben sind.

**Cubebae, Baccae s. Fructus Cubebae, Piper Cubebae, P. caudatum;**  
**Cubeben, Schwanzpfeffer.**

Die Cubeben stellen die getrockneten unreifen Steinfrüchte der zur Familie der Piperaceen gehörenden strauchartigen *Cubeba officinalis* Miq. s. *Piper Cubeba* L. dar, welche auf Java, Borneo und Sumatra einheimisch ist.

Sie sind von dunkelgraubrauner Farbe und etwa von der Grösse des schwarzen Pfeffers, ziemlich hart, einsamig, mit einem dünnen Fruchtgehäuse versehen, an dem Grunde in einen 4–6 Mm. langen Stiel sich verdünnend, netzförmig runzlig und besitzen einen starken eigenthümlichen Geruch und einen aromatischen, lang andauernden, gleichzeitig etwas scharfen und bitterlichen Geschmack. Sie unterliegen mannigfachen Verfälschungen, z. B. mit den unreifen Früchten von *Rhamnus cathartica* (4samig, Fruchtstiel leicht ablösbar), mit den unreifen Früchten von *Piper nigrum* und mit den Beeren von *Myrthus Pimenta* (ohne Fruchtstiel). Aehnliche Früchte wie die officinellen Cubeben liefern auch andere Arten der Gattung *Cubeba*, unter denen die von *Cubeba canina* Miq. als *Cubebae caninae* s. *minores* bezeichneten und nur durch ihre geringere Grösse unterschiedenen der meisten Handelswaare sich beigemischt finden. Als Beisorte wurden auch grössere, weniger runzlige Früchte von einem an Macis und Terpenthinöl erinnernden Geruche in den Handel gebracht, welche von Einzelnen als reife Früchte von *Cubeba officinalis* angesehen werden. Die in der Handelswaare befindlichen, bis 4 Cm. langen Stiele des Fruchtstandes sind bei Dispensation zu beseitigen.

Die hauptsächlichsten chemischen Bestandtheile der Cubeben sind ein ätherisches Oel, welches den Namen Cubebén erhalten hat, ein indifferenter Körper, das Cubebin, und ein Harz, welches aus einem neutralen und einem sauren Antheile, der Cubebensäure, besteht.

Das ätherische Cubebenöl, welches in der Droge in sehr verschiedenen Verhältnissen (6–15%) sich findet, besteht nach Schmidt aus zwei Kohlenwasserstoffen von der Formel  $C^{15}H^{24}$ ; beim Stehen setzt es Cubebencampher (Cubebénhydrat) in rhombischen Oktaëdern ab. Das von Soubeiran und Capitaine entdeckte Cubebin, welches sich zu 0,4–2,5% in den Cubeben



findet, ist geruch- und geschmacklos und löst sich nicht in kaltem Wasser, schwierig in heissem, leicht in kochendem Spiritus, sowie in 30 Theilen Aether. Sowohl das neutrale Harz, welches 3% der Cubeben ausmacht, als die Cubebensäure, von der die Cubeben 3% enthalten, sind amorph und nicht in Wasser, wohl aber in Weingeist, Aether und Chloroform leicht löslich; auch die meisten Salze der Cubebensäure scheinen nicht zu krystallisiren. Ausserdem enthalten die Cubeben Gummi (8%), fettes Oel und apfelsaure Erdsalze.

Die therapeutischen Effecte der Cubeben scheinen vor Allem auf die darin enthaltene Cubebensäure bezogen werden zu müssen, während das Cubebin unwirksam ist und das ätherische Oel nur von untergeordneter Bedeutung für die Wirksamkeit erscheint, obschon ihm physiologische Wirkungen nicht abgehen. Immerhin sind aber die Cubeben in Substanz bei Tripper entschieden wirksamer als die einzelnen Componenten (Bernatzik). Die nach dem Gebrauche grösserer Einzeldosen von Cubeben (15,0—25,0) auftretenden gastrischen Störungen (Erbrechen, Magenschmerzen) sind offenbar die Folge des ätherischen Oeles.

Nach Bernatzik und Schmidt bewirkt das Cubebin selbst zu 4mal 4,0 in 24 Stunden keine Störung des Befindens und geht zu geringen Mengen in den Harn über, ist aber ohne Einfluss auf die Gonorrhöen. Die Cubebensäure bewirkt nach Bernatzik zu 10,0 in getheilten Dosen binnen 6—8 Std. genommen bei Gesunden häufiges Aufstossen, Blähungen, vermehrtes Wärmegefühl, geringe Zunahme der Pulszahl und Eigenwärme und stark vermehrte Harnsäureausscheidung in dem unter leichtem Gefühl von Brennen und Harnzwang entleerten Urin. Nach Schmidt bedingt sie völlig rein (Bernatziks Präparat enthielt viel Cubebin) zu 0,6 15 Stunden anfangs 2stündlich, später 1stündlich genommen Wärme im Magen, Kopf- und Leibschmerzen, sowie starke Diurese, bei Tripperkranken auch Brennen in der Urethra. Im Urin und im Stuhl findet sich Cubebensäure in sehr geringer Menge wieder. Das ätherische Cubebenöl wirkt auf Hunde und Kaninchen zu 25,0 toxisch und zu 30,0 in 12—72 Stunden letal unter den Erscheinungen gesteigerter Pulsfrequenz und Athmung, vermehrter Diurese, Albuminurie, Nephritis und Cystitis (Goedecke). Beim Menschen bewirken 2stündl. Dosen von 40 Tropfen bis zu 6,0 genommen Ructus, Blähungen, Schwindel und etwas Reiz zum Harnlassen, 10,0 in 6 Stunden genommen lebhaftere Reizung der Harnwege und des Tractus (jedoch weder Emese, noch Katharsis, noch Eiweisssharn), Steigerung der Pulsfrequenz und der Körperwärme (Bernatzik); doch können schon selbst kleinere Dosen, z. B. bei Schmidt 7 2stündliche Dosen von 10 Tropfen, heftigere Erscheinungen (Eingenommenheit des Kopfes, Schwindel, erschwertes Schlucken, Erbrechen und Diarrhoe, Fieberhitze, unruhigen Schlaf und mehrtägliches Unwohlsein) hervorrufen. Auf Gonorrhoe ist es ohne Einfluss. Schmidt hatte auch von der Cubebensäure keinen Erfolg bei Tripper.

Die den Magen verhältnissmässig weniger belästigenden Cubeben werden aus diesem Grunde von manchen Aerzten dem Copaivabalsam bei Behandlung des Trippers vorgezogen.

Die Cubeben scheinen in kleineren Dosen nicht erheblich anders wie Pfeffer zu wirken und stören in grösseren Mengen wie dieser die Digestion. Die von einzelnen Aerzten als Heilmittel empfohlenen Gaben von 15,0—30,0 produciren sehr häufig ganz analoge Phänomene, wie sie Schmidt nach ätherischem Cubebenöl beschrieben hat. Bisweilen, jedoch seltener als beim Copaivabalsam, kommt darnach Urticaria oder Roseola (Cane) zur Beobachtung. Die Möglichkeit einer acuten Gastroenteritis durch grosse Mengen Cubeben, wie sie ältere Beobachter angeben, ist keineswegs in Abrede zu stellen. Auch der längere Gebrauch des Mittels führt nicht selten zu Digestionsstörungen.

Die den arabischen Schriftstellern bereits bekannten Cubeben waren schon im 13. Jahrhundert im europäischen Handel, dienten jedoch damals und bis zum

Jahre 1818, wo Crawford die in den ostasiatischen Ländern längst bekannte antiblennorrhagische Wirkung derselben ausserordentlich rühmte, nur als Gewürz. Abgesehen von der Gonorrhoe, wo ihre hauptsächlichste Wirksamkeit meist im Anfangsstadium, aber seltener bei chronischem Verlaufe hervortritt, sind dieselben auch bei anderen Urethra- und Blasenkatarrhen bei Männern und Frauen (Trousseau) und chronischer Cystitis (Brodie), bei Enuresis (Deiters), bei Neuralgien des Blasenhalses (Caudmont), bei Wechselfieber (Delieux, Barby), ja selbst bei Diabetes und Cholera asiatica in Anwendung gekommen. In neuerer Zeit rühmten Trideau u. A. das Mittel ausserordentlich bei Groupp. Bestehender Magen- oder Darmkatarrh contraindicirt die Anwendung der Cubeben in allen Fällen.

Man giebt die Cubeben bei Gonorrhoe am besten allmählig steigend zu 1,0—10,0 3mal täglich in Form von Pulvern oder Boli.

Bei Darreichung in Pulvern macht Zusatz von Zucker oder Süssholzpulver den an sich unangenehmen Geschmack des Mittels noch widerwärtiger, während derselbe durch Zimmt oder andere Aromatica besser verdeckt wird. Am zweckmässigsten lässt man Cubebenpulver in Oblaten nehmen. Unzerkleinerte Cubeben, welche man früher bei Dyspepsie (auch verzuckert als *Cubebae conditae*) benutzte, kommen bei Gonorrhoe nicht in Anwendung. Seltener Arzneiformen sind Latwergen (mit Honig, Syrup oder Balsamum Copaivae), Emulsionen (mit Eigelb zu 8,0—15,0, von Velpeau u. A. nur zu Klystieren empfohlen) und Aufgüsse (1:5—10, in England zu Einspritzungen gebräuchlich). Sehr rationell erscheint es, die von dem ätherischen Oele befreiten Cubeben als sog. *Cubebae praeparatae* in Anwendung zu bringen, weil dadurch die ungünstigen Wirkungen auf die Digestion aufgehoben werden und die Anwendung grösserer Einzelgaben ermöglicht wird.

#### Präparat:

**Extractum Cubeborum; Cubebenextract.** Aetherisch-spirituöses, dünnes Extract, braun, nicht in Wasser löslich. Das Präparat enthält sowohl das ätherische Oel als das Cubebin und die Cubebensäure und setzt beim Stehen Cubebin krystallinisch ab. Man giebt es zu 0,5—2,0 mehrmals täglich in Pillen, Bissen, Electuarien oder am zweckmässigsten in Gallertkapseln. Entsprechender würde ein spirituöses Extract der vorher durch Destillation vom ätherischen Oele befreiten Cubeben sein, billiger und einfacher auch das in Oesterreich officinelle spirituöse Extract. Das in Frankreich sehr gebräuchliche und von Demarquay sehr gepriesene *Extractum Cubeborum oleoso-resinosum*, welches zu 3,0—6,0 in Kapseln gegeben wird, hat offenbar keine Vorzüge. Eine Mischung des letzteren mit 3 Th. Weingeist bildet die zu 5,0—15,0 administrierte *Essence concentrée de cubèbe* (*Tinctura cubeborum*); ein Gemenge mit 7 Th. Zucker und 2 Th. Gummi arabicum das *Saccharure d'extraît de cubèbe*, welches zu 2—3 Esslöffel voll in Wasser verrührt genommen wird (*Rabuteau*).

#### Verordnungen:

- |  |  |
|--|--|
| 1) $\mathcal{R}$<br><i>Pulv. Cubeborum</i> 50,0<br><i>D. in charta. S.</i> Dreimal täglich 1—2<br>Theelöffel voll in Oblate zu nehmen. | 2) $\mathcal{R}$<br><i>Cubeborum pulv.</i> 15,0<br><i>Succi Juniperi insp.</i><br><i>Syrupi simpl.</i> aa 30,0<br><i>M. f. elect. D. S.</i> In 24 Stunden zu<br>verbrauchen. (Zeissl.) |
|--|--|

**Matico.** — Der Abstammung nach den Cubeben nahe verwandt sind die als Antiblennorrhagicum besonders in Frankreich sehr geschätzten Blätter der in dem nördlichen Theile von Südamerika einheimischen Piperacee *Piper angustifolium* Ruiz et Pav. s. *Artanthe elongata* Miq., welche in ihrer Heimat als *yerba s. palo del soldado* (Soldatenkraut) grossen Ruf als blutstillendes Mittel besitzen. Dieses als *Folia Matico* bezeichnete Mittel enthält viel ätherisches Oel, Harz, eine krystallisirende Säure (Artanthesäure) und

Tannin, kommt übrigens im Handel vielfach verfälscht vor, obschon das auffallende Adersystem der Blätter dies von vornherein kaum als möglich erscheinen lässt. Dasselbe ist von Favrot als den Copaivabalsam übertreffendes Trippermittel gerühmt, da es die Gonorrhoe in 4–7 Tagen heile und auch in grossen Dosen den Magen nicht irritire. In neuerer Zeit hat sich die Industrie des Mittels bemächtigt, und Grimaults in den Zeitungen viel gepriesenen Maticoinjectionen enthalten hauptsächlich Kupfersulfat (Frickinger). Man kann Matico als wässrig spirituöses Extract (zu 2,0 in Pillenform) oder als Tinctur anwenden. Auch gegen Blasenkatarrh, bei Lungenblutungen, Bronchitis und Dyspepsie fand es in Frankreich Benutzung.

**Balsamum Copaivae; B. Copaiba, B. Capivi; Copaivabalsam.**

Der Copaivabalsam stammt von verschiedenen in den tropischen Ländern Südamerikas einheimischen Species der zur Familie der Caesalpinieen gehörigen Gattung *Copaifera* ab.

Die betreffenden Pflanzen, welche den schon seit Anfang des 17. Jahrhunderts bekannten Balsam liefern, der zuerst durch die Portugiesen in den europäischen Handel kam, sind theils hohe ansehnliche Bäume, theils Sträucher. Die hauptsächlichsten Species sind *Copaifera officinalis* L. (*C. Jacquinii*) in Venezuela, Neu-Granada und auf Trinidad, *C. Guianensis* Desf. in Surinam, Guyana und am Rio negro, wahrscheinlich identisch mit *C. bijuga* Hayne, *C. coriacea* Mart. s. *C. cordifolia* Hayne in den brasilianischen Provinzen Bahia und Piahy, *C. Langsdorfii* Desf. s. *C. nitida* Hayne, in West- und Nordbrasilien sehr verbreitet, und *C. multijuga* Hayne, von welcher der aus Para ausgeführte Copaivabalsam abstammen soll. Nach den Berichten der Reisenden fliesst der Balsam in grossen Mengen aus halbrunden Oeffnungen, welche am unteren Theile des Stammes bis in das Kernholz getrieben werden, oft in wenigen Stunden pfundweise aus einem einzigen Stamme. Karsten nimmt an, dass der Balsam durch Zerfall der Zellenwandungen entstehe.

Der Copaivabalsam ist eine Auflösung mehrerer Harze in ätherischem Oele.

Je nach der Menge des ätherischen Oeles ist der Copaivabalsam von verschiedener Consistenz, bald mehr zähflüssig, bald dünnflüssiger, stets aber von hellgelber bis goldgelber Farbe und unangenehm aromatischem eigenthümlichem Geruche, sowie von sehr scharf kratzendem und bitterlichem Geschmacke. Zum medicinischen Gebrauche wählt man die dickflüssigeren Sorten von 0,96–0,99 spec. Gew. Die meisten Proben drehen die Polarisationsebene stark nach links. Der Balsam ist mit absolutem Weingeist, Schwefelkohlenstoff, ätherischen und fetten Oelen vollkommen mischbar und löst sich leicht in Aether und Essigäther.

Die Frage, welchen Componenten des Copaivabalsams die antiblennorrhagische Wirksamkeit desselben zuzuschreiben ist, wird different beantwortet. Die Meisten schreiben dieselbe dem ätherischen Oele, *Oleum Balsami Copaivae aethereum*, zu und vindiciren dem Harzgehalte höchstens eine die Wirksamkeit mehr fixirende und verlangsamende Action (Schroff), während Andere (Weickart, Gubler, Zeissl) den Harzcomplex für ein ebenso sicheres und noch dazu billigeres Trippermittel als den Balsam selbst erklären. Nach den auf Veranlassung von Bernatzik in verschiedenen österreichischen Militärhospitälern angestellten Versuchen hat Copaivaoöl allerdings antiblennorrhagische Wirkung, ohne jedoch die billigern flüssigen und ölreichen Balsamsorten an Activität zu übertreffen, und gilt dasselbe von dem Harzgemenge,



welches jedoch vermöge seiner stark irritirenden Einwirkung auf den Tractus zur medicinischen Anwendung sich schlecht qualificirt.

Das Copaiväöl,  $C^{10}H^{16}$  oder  $C^{20}H^{32}$ , ist ein wasserhelles dünnes Oel von 0,88—0,91 spec. Gew., gewürzhaftem Geruche, brennend scharfem Geschmacke und neutraler Reaction, welches bei 245—260° siedet. Es löst sich nicht in Wasser, dagegen in 2 $\frac{1}{2}$  Th. absolutem und 8 Th. rectificirtem Alkohol und in jedem Verhältnisse in Aether und Schwefelkohlenstoff. Es verbindet sich mit Iod ohne Verpuffung, bildet mit Salzsäure eine krystallinische Verbindung und wird durch schwächere Salpetersäure in eine harzartige Masse verwandelt. Auf der Haut bei Menschen eine Stunde lang applicirt, bedingt es kurzdauerndes gelindes Brennen, aber keine Röthung. Zu 30,0 tödtet es junge Kaninchen in 11—30 Std.; die Vergiftung verläuft unter Steigerung der Puls- und Athemfrequenz, vermehrter Diurese, Abgang schleimigblutiger Stühle, Adynamie und verminderter Sensibilität ohne Convulsionen (Mitscherlich). Beim Menschen treten nach grossen Dosen (30,0 in 2 Tagen in Einzelgaben von 3,0—6,0) Ructus, Brechneigung, selbst Erbrechen, Leibschmerzen und Diarrhoe, auch Dysurie auf, wobei der Puls anfangs voller und frequenter wird und die Temperatur um  $\frac{1}{2}^{\circ}$  steigt, während zur Zeit der intensiven Darmreizung Pulsschwankung und Sinken der Eigenwärme beobachtet werden (Bernatzik). Wenn auch schon 2,0 Durchfall herbeiführen können, so ist doch die toxische Wirkung offenbar nicht gross, da selbst 15,0 auf einmal ohne nachtheilige Folgen verschluckt wurden (Pereira). Das Copaiväöl wird theils durch den Urin und die Exspiration, vielleicht auch durch die Haut als solches eliminirt, theils in ein violett-rothes Harz oxydirt, welches im Urin erscheint; die Elimination durch den Harn, in welchem etwa 5% Oel unverändert wiedergefunden werden, ist in 36 Std. vollendet (Bernatzik). — Das Copaivaharz, welches aus einem sauren und indifferenten Harzanthteile besteht, von denen der letztere aus einem in Alkohol löslichen und einem darin schwierig löslichen Bestandtheile zusammengesetzt ist, welche in ihrer Action keine Differenzen darbieten, bewirkt schon zu 2,5—3,0 heftige Leibschmerzen und führt in wiederholten Gaben von 5,0 zu intensiven Brechdurchfällen und Gastroenteritis. Auch entsteht danach vermehrte Diurese, Lumbarschmerz und Albuminurie, während Blase und Urethra weniger als durch das Oel irritirt werden und vermehrte Harnsäureexcretion nicht eintritt. Das Harz, von welchem sich ca. 13% im Harn wiederfinden, erscheint darin schon nach 6 Std.; die Elimination ist in 36 Std. vollendet (Bernatzik). Die Ansicht Köhlers, dass die Copaivasäure, welche Schweitzer in Form rhombischer Prismen von bitterem Geschmacke, schwachem Geruche und saurer Reaction erhielt, das wirksame Princip im Copaivabalsam sei, ist um so mehr zu bezweifeln, als viele Copaivabalsamsorten diesen Körper gar nicht oder nur spurweise enthalten; noch weniger ist erwiesen, dass das aus dem Copaiväöl im Körper resultirende Harz Copaivasäure ist, oder dass der in Spiritus schwer lösliche Antheil des Copaivaharzes im Körper zu Copaivasäure wird. — Die heftig reizende Wirkung auf den Tractus, welche grössere Dosen Copaivabalsam besitzen, muss nach den mitgetheilten Untersuchungen den darin enthaltenen Harzen zugeschrieben werden. Ein sowohl nach grossen Dosen als nach längerem Gebrauche kleinerer Gaben eintretendes eigenthümliches Phänomen ist das Auftreten von Roseolae, in einzelnen Fällen von Ekzem, welches von manchen Aerzten als das Aussetzen des Mittels bei Gonorrhoe indicirend angesehen wird, da gerade bei Patienten, welche das Exanthem bekommen, der Tripper am schlechtesten heilen soll. Seltener kommt diffuses Erythem und Purpura vor (Mauriac).

Die Anwendung des Copaivabalsams als Antigonorrhoeicum datirt aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts (Fuller), während das Mittel ursprünglich in seiner Heimat zur Behandlung von Wunden diente; später haben besonders Hunter und Swediaur, Ribes, Delpech, Theden, Chopart zur Verbreitung der Balsamtherapie beigetragen. Im Allgemeinen findet jetzt das Mittel vorzugsweise Anwendung, wenn die entzündliche Reizung bei Gonorrhoe geschwunden ist, doch hat bereits Ribes den Nachweis geliefert, dass auch frische Gonorrhoe und selbst die sog. Trippermetastasen (Epididymitis, Orchitis, Arthritis gonorrhoeica) durch Copaivabalsam geheilt werden können. Ob gerade

die mit dem Mittel vorgenommenen Abortivcuren der Gonorrhoe (Richter, Köhler) Stricturen hinterlassen, oder ob dieselben vorzugsweise den damit behandelten alten Fällen zukommen, halten wir für unentschieden. Ueber den Werth des Copaivabalsams den topischen Adstringentien gegenüber haben wir uns schon oben ausgesprochen. Eine Inconvenienz bei seiner Anwendung ist der Widerwillen der meisten Patienten gegen denselben, sowie die nach grossen Dosen nicht selten auftretende Blasenreizung und Empfindlichkeit der Nieren-egend. Dass Copaivabalsam Gonorrhoe nur dann heile, wenn er Diarrhoe bewirke (Ansiaux, Krahmer), ist unrichtig.

Von der Gonorrhoe abgesehen fand Copaivabalsam auch bei Cystitis chronica innerlich und in Injection (Souchier, Dupuytren u. A.), selbst bei C. haemorrhagica (Baizeau), bei chronischen Katarrhen der Bronchien der Lunge, namentlich bei reichlicher schleimigeitriger Absonderung (hier meist mit Terpenthinöl), aber auch selbst bei Lungenblutungen und als Specificum gegen Croup und Diphtheritis (Trideau), als Diureticum bei Wassersuchten, wo das schon von Monro empfohlene und von Wilks und Dixon 1874 wieder aufgefrischte Mittel nach den Erfahrungen in Guy's Hospital in der Form der Resina Copaivae sich bei Integrität des Nierenparenchyms ganz vorzüglich bewährt und namentlich bei Compensationsstörungen die Wirkung der Digitalis vorzüglich unterstützt (Taylor), bei Iritis und Hypopyon (Hall), bei Dysenterie (Body) und chronischem Rheumatismus (Hall), endlich bei Psoriasis, wo Hardy und Purdon eine substitutive Entzündung der Haut mittelst Copaivabalsam zu bewirken suchten, Verwendung. Auch hat man den Balsam pure extern bei Ophthalmia purulenta, indolenten Schenkelgeschwüren und drohender Mastitis (Hall), sowie bei Scabies statt Perubalsam mit Erfolg benutzt (Fröhlich, Monti).

Man giebt Copaivabalsam am einfachsten in Substanz in Gallertkapseln zu 0,5—2,0 (10—40 Tropfen) pro dosi 3—4mal täglich.

Die Form der Capsules gélatineuses au copahu, Capsules de Mothe, von denen jede etwa 0,5 enthält, macht jede andere Darreichungsform überflüssig. Das Hinunterspülen der befeuchteten Kapseln ist offenbar nicht schwerig. Man hat auch ähnliche Kapseln mit  $\bar{a}\bar{a}$  Extr. Cubeborum oder mit Myrrha, Copaiva und einem Eisensalze oder selbst mit Pepsin und Bismut. nitr., welche jedoch keine Vorzüge darbieten und den Zweck, Irritation des Magens zu vermeiden, nicht erreichen. Bei nicht zu empfindlichen Geschmacksorganen kann man Copaivabalsam auch pure in Tropfenform nehmen lassen, am besten aus einem Liqueurgläschen, worin ein Paar Theelöffel Portwein oder Arrac sich befinden. Auch kann man etwas Citronensaft oder einige Tropfen Spiritus Menthae piperitae nachnehmen lassen. Posner und Simon empfahlen vorheriges Ausspülen des Mundes mit Pfefferminzwasser oder Einnehmen mit Kaffee, Thee oder Kamillenthee; Siegmund Verreiben des Balsams mit Zucker zu einer Paste. Will man den Balsam unverändert in Pillen administrieren, so lässt man 1 Th. geschabtes Wachs mit 2 Th. Balsam zusammenrühren und 3 Th. Pflanzenpulver (am besten Pulv. Cubeborum) hinzufügen. Früher machte man Pillen aus Copaivabalsam in der Weise, dass man ihn mit Gi. Arab. emulgirte und Pflanzenpulver hinzusetzte. Ebenso waren Emulsionen (10,0 bis 20,0 mit  $\frac{1}{2}$  Gi. Arab. auf 150,0 Colatur) und Latwergen (mit 2 Th. Pulv. Cubeb. auf 1 Th. Bals. Cop.) und Mixturen beliebt, von denen einzelne, z. B. die sog. Potio Choparti, noch jetzt hie und da Anwendung finden. Zusatz von Mineralsäuren soll die von dem Balsam bedingten Verdauungsbeschwerden mildern. Electuarien nimmt man in Oblaten, ebenso die nicht unzweckmässige Form der Oelgallerte (Gelatina Balsami Copaivae s. Bals. Cop. solidificatum), die man durch Vermischen mit  $\frac{1}{6}$  Cetaceum herstellt und messerspitzen- bis theelöffelweise administriert.

Manche aus Copaivabalsam gefertigte Formen enthalten nicht sämtliche Bestandtheile desselben, sondern nur vorzugsweise das Harz oder eine aus demselben dargestellte Harzseife. Dahin gehört die mit  $\frac{1}{2}$  Th. Magnesia usta unter Erwärmen dargestellte Masse, welche auch durch 8—10tägiges Stehenlassen von

16 Th. Balsam mit 1 Th. Magnesia usta erhalten werden kann und besonders zur Darstellung von Pillen (mit aa Pulvis Cubeborum) dient. Aehnliche Verseifungsproducte sind auch mit Kalk zu erhalten und z. B. in den Capsules Anglaises du Dr. Humann enthalten, wie sich die Magnesiaverbindung in den Capsules de Raquin findet. Die völlig vom Oel befreite Harzmasse bildet das Balsamum Copaivae siccum s. Resina Copaivae s. Balsamum Parisiense, welches innerlich zu 1,0—4,0 pro die in Pillen (mit Magnesia, Cubeben und einem Extract), bei Hydrops zu 3mal täglich 0,8 in Emulsion (Taylor) Anwendung findet.

Das Copaivaöl ist ebenfalls am zweckmässigsten in Gallertkapseln zu 10—20—30 Tr. allmählig steigend anzuwenden. Wolfsheim gab es in Emulsionen (8,0 auf 120,0 und 20 Tr. Opiumtinctur, 3stündlich einen Esslöffel voll); Reil rühmte Injectionen in Urethra (6 Tr. auf 200,0).

Vielfach verbindet man zum inneren Gebrauche den Copaivabalsam mit Cubeben oder Cubebenextract. Mischungen dieser Art bilden die sog. Copahine und Copahine Mège, welche letztere ursprünglich ein durch Salpetersäure solidificirter und veränderter Balsam war. Oblonge Boli aus einer mit Eigelb gemachten Emulsion von aa Balsam. Copaiv. und Extract. Cubeb. oleoso-resinosum mit Eibischpulver bilden die sog. Trochisci cubebini Pharm. Hamb.

Ausserlich ist der Copaivabalsam in Klystierform (Bretonneau, Velpeau), in Injectionen (Jeannel) und in Suppositorien (Colombat) benutzt. Bei der Anwendung im Klystier, wobei man sich der Emulsion bedient, hat man sich davor zu hüten, den Sphincter beim Herausziehen der Spritze mit dem Inhalte zu befeuchten, weil sonst die ganze Flüssigkeit auf einmal wieder abgeht. Zu Injectionen dient der mit Natron verseifte Balsam, zu Suppositorien die Resina Copaivae (mit aa Oleum Cacao und etwas Opiumextract).

Zur Injection empfiehlt Langlebert auch eine Aqua Copaivae, namentlich als Vehikel für Zinksulfat und andere Adstringentien.

## Verordnungen:

- |  |   |
|--|---|
| <p>1) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Balsami Copaivae</i> 15,0<br/> <i>Tinct. cort. Aurantii</i> 2,0<br/> <i>M. D. S.</i> 3mal täglich 20 Tropfen, allmählig auf 40—60 steigend. (Simon.)</p> <hr/> <p>2) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Balsami Copaivae</i> 15,0<br/> <i>Tinct. aromaticae acidae</i> 5,0<br/> <i>M. D. S.</i> 4mal täglich 15—20 Tropfen. (Zeissl.)</p> <hr/> <p>3) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Cerae albae rasae</i> 5,0<br/> <i>terendo admisce</i><br/> <i>Balsami Copaivae</i> 10,0<br/> <i>Pulv. Cubeborum</i> 15,0<br/> <i>F. pilul. No. 150. Consp. pulv. Cassiae.</i><br/> <i>D. S.</i> 3mal täglich 5—10 Stück.<br/>         (Besser in Form von Boli, vgl. S. 150.)</p> <hr/> <p>4) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Massae balsami Copaivae cum Magnesia usta</i><br/> <i>Pulv. Cubeborum</i> aa 10,0<br/> <i>M. f. boli No. 20. Consp. Cass. pulv.</i><br/> <i>D. S.</i> Täglich 3mal 1—2 Stück.</p> <hr/> | <p>5) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Balsami Copaivae</i> 15,0<br/> <i>Magnesium carbonici q. s.</i><br/> <i>ut f. massa aequalis e qua form. boli No. 40. Obducantur gelatina. D. S.</i><br/>         2mal täglich 1—2 Stück. (Pilules de Copahu Cod. Fr.)</p> <hr/> <p>6) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Balsami Copaivae</i> 30,0<br/> <i>Magnesia ustae</i> 3,0<br/> <i>Catechu pulv.</i> 5,0<br/> <i>Pulv. Cubeb.</i> 40,0<br/> <i>Olei Ment. pip.</i><br/> <i>Ol. Cassiae</i> aa gtt. 5.<br/> <i>M. f. elect. D. S.</i> 3mal täglich 1 Theelöffel voll in Oblate. (Beyran.)</p> <hr/> <p>7) <math>\mathcal{R}</math><br/> <i>Balsami Copaivae</i><br/> <i>Syrupi Balsami Tolutani</i> aa 50,0<br/> <i>Aq. Ment. pip.</i> 100,0<br/> <i>Spiritus</i> 50,0<br/> <i>Spiritus nitrico-aetherei</i> 5,0<br/> <i>M. D. S.</i> 2mal täglich 1 Esslöffel.<br/>         (Potion de Chopart. Auch gegen Lungenblutungen benutzt.)</p> <hr/> |
|--|---|



8)  $\mathcal{R}$   
*Balsami Copaivae* 15,0  
*Gummi Arabici* 4,0  
*Aquae* 10,0  
*Olei Menth. pip.* 0,3  
*Syrupi simpl.* 75,0  
*M. D. S.* Mehrmals täglich  $\frac{1}{2}$ —1 Ess-  
 löffel. (Sirop au copahu von  
 Puche.)

9)  $\mathcal{R}$   
*Balsami Copaivae* 40,0  
*Natrii carbonici* 20,0  
*Aq. dest.* 940,0  
*M. D. S.* Zur Injection mit 3 Th. Wasser  
 verdünnt anzuwenden. (Jeannel)

Als Surrogate des Copaivabalsams dienen in Ostindien der sog. Gurjunbalsam, *Balsamum Dipterocarpi s Gurjunae*, welcher von verschiedenen ostindischen Species von *Dipterocarpus* (Fam. Guttiferae) abstammt, und der Balsam von *Hardwickia pinnata* Roxb, für welche beide die Bezeichnung Woodoil im Handel gebräuchlich ist, ferner das aus dem gelben Sandelholz durch Destillation erhaltene, ebenfalls als Woodoil bezeichnete *Oleum Santali citrini* (Henderson, Panas), welches in seinem Vaterlande als Parfum verwendet wird. Alle diese Stoffe werden zu 0,5—2,0 intern an: besten in Gallertkapseln oder in Emulsion verordnet. Ostindische Aerzte rühmen den Gurjunbalsam intern in Emulsion (30,0 mit 15,0 Gummi Arab. und 450,0 Kalkwasser zu 3mal täglich 1 Esslöffel) und äusserlich in Umschlägen mit aa Kalkwasser als Specificum bei Lepra. Bei dem internen Gebrauche gegen Tripper darf man Dosen von 4,0, auf 2mal bei der Mahlzeit genommen, nicht wohl überschreiten, da sonst leicht Kolik und heftige Diarrhoe entsteht (Mauriac). In den Harn scheint vom Gurjunbalsam mehr als vom Copaivabalsam überzugehen (Deval); Schweiss und Athem zeigen den Geruch des Balsams, der nicht so leicht wie Copaiva Roseola erzeugt. Vidal fand Umschläge mit aa Kalkwasser besonders bei Eichel-, Vorhaut- und Scheidentripper wirksam.

## 2. Ordnung. Uterina, Gebärmuttermittel.

Wir vereinigen unter dieser Abtheilung die eigentlichen Emmenagoga, deren Hauptrepräsentant die *Herba Sabinae* bildet, und das durch seine Eigenschaft, den Uterus zu Contractionen anzuregen, als wehentreibendes Mittel geschätzte Mutterkorn. Das Nähere über Wirkung und Gebrauch, so weit solches nicht bereits S. 96 Erledigung gefunden hat, wird bei den einzelnen Artikeln mitgetheilt werden.

**Summitates Sabinae**, *Herba Sabinae*, *Frondes s. Ramuli Sabinae*; **Sabina-**  
**kraut**, Sadebaumspitzen, Sevenbaumkraut.

Die Sadebaumspitzen sind die Zweigspitzen von wildwachsener oder cultivirter *Sabina officinalis* Garcke (*Juniperus Sabina* L.), einem Strauche oder Baume aus der Familie der Cupressineae, welcher in den subalpinen Gegenden von Mittel- und Südeuropa, Nordasien und Nordamerika einheimisch ist und sich durch seine gedrängten Aeste und seine überhängenden (nicht aufrechten) Beerenzapfen von der nahe verwandten *Juniperus Virginiana* Berg unterscheidet. Die Zweigspitzen des Sadebaumes sind mit 3 oder 4 Reihen stumpfer (*Sabina tamariscifolia*) oder etwas zugespitzter (*S. cupressina*), 3 Mm.

langer Blättchen schuppig eingehüllt, an deren convexer Rückenfläche eine runde oder längliche, dunklere, vertiefte Oeldrüse sich findet. Die dunkelblauen oder braungrauen, unregelmässig eingeschrumpften, meist 2 Samen einschliessenden Beeren sind von einem Durchmesser von 5 Mm., riechen wie die Blätter stark unangenehm balsamisch und schmecken widerlich harzig bitter. Um die Verwechslung mit *Juniperus Virginiana*, welche bei uns ebenfalls cultivirt wird und welche einen viel schwächeren Geruch besitzt, zu verhüten, erscheint es zweckmässig, die *Summitates Sabinae* von fruchttragenden Bäumen zu sammeln, da nur die Verschiedenheit der Früchte als Kriterium der Aechtheit anzusehen ist.

Das wirksame Princip der Sadebaumpitzen ist das früher officinelle Sabinaöl oder Sadebaumöl, *Oleum Sabinae*, welches zu den am schärfsten wirkenden *Olea aetherea* gehört.

Das gewürzhaft brennend schmeckende, penetrant riechende Oel, von welchem die frischen Blätter und Zweige  $1\frac{1}{8}\%$ , die getrockneten 1% und die frischen Beeren 10% liefern, ist blass- oder dunkelgelb und rectificirt farblos. Es ist isomer mit dem Terpenthinöl, löst sich in jeder Menge Weingeist und verpufft mit Iod heftig. Es erzeugt bei äusserlicher Application intensive Röthung und Blasenbildung und tödtet intern zu 8,0—15,0 Kaninchen binnen 6 Std., indem es Beschleunigung des Herzschlages, anfangs Zunahme und später Abnahme der Athemfrequenz, vermehrte Diurese und Defécation, Muskelzittern, Mattigkeit, Anästhesie und Tod bedingt, worauf die Section Entzündung im Magen, Darm, Nieren und Blase nachweist (C. G. Mitscherlich). Die Wirkung toxischer Dosen bei Thieren ist im Wesentlichen der des Terpenthinöls gleich und differirt in keiner Weise von derjenigen der Sadebaumpitzen, von denen 15,0 einen Hund tödtet (Orfila). Dass in letzteren das Sadebaumöl das einzige active Princip ist, scheint daraus zu erhellen, dass ältere trockne *Summitates Sabinae* viel minder stark giftig wirken als frische Zweigspitzen, wenn sie in Substanz genommen werden, und dass auch Aufgüsse und Abkochungen schwächer als Sabina in Substanz wirken. Die verhältnissmässig zahlreichen Vergiftungen mit Sadebaum am Menschen, welche die Anwendung desselben als volksthümliches Abortivum zu Wege gebracht hat, zeigen in ihrer Symptomatologie eine Combination der Erscheinungen von Magen- und Darmirritation (heftigen Magenschmerz, Erbrechen, selbst Blutbrechen, in einzelnen Fällen Speichelfluss, selten Purgiren) mit denen von Reizung der Niere und Blase (Strangurie, manchmal Hämaturie) und mit Cerebrospinalsymptom (Dyspnoe, allgemeine Anästhesie, Krämpfe, Coma, bisweilen Mydriasis). Die Behandlung der Vergiftung, welche schon in 12—14 Std. zum Tode führen kann, ist eine rein symptomatische und erfordert je nach den vorwiegenden Erscheinungen bald Antiphlogose und Demulcentia, bald Opiate und Narcotica, bald Analeptica. Der Uebergang des Sadebaumöls in Blut, Harn und Athem ist bei toxischen Dosen durch den Geruch constatirt.

Man schreibt den *Summitates Sabinae* und dem Sadebaumöl specifische Action auf den Uterus zu, weshalb sie bis auf den heutigen Tag missbräuchlich zur Abtreibung der Leibesfrucht in Anwendung gezogen und von Aerzten bei Menostase verordnet werden.

Die schon seit Galens Zeiten bekannte abortive Wirkung der Sabina lässt sich nach den praktischen Erfahrungen nicht in Abrede stellen, doch ist selbst nach grossen toxischen Dosen Eintritt von Abortus bei Schwangeren nicht constant, und sogar in Fällen, wo das Mittel den Tod herbeiführte, kam es häufig nicht zum Abgange der Frucht; so berichtet Taylor, dass von 4 ihm bekannten Todesfällen durch Sabina 3 ohne Abortus verliefen. Nach Fodéré nahm eine Frau in abortiver Absicht ohne Erfolg 3 Wochen lang täglich 100 Tr. Sabinaöl. Hertwig konnte an trächtigen Thieren die abortive Action der Sabina nicht constatiren. Das Eintreten von Abortus nach dem Mittel ist manchmal Folge des dadurch bedingten äusserst heftigen Erbrechens, in der

Regel aber wohl von dem Andränge des Blutes zu den Beckenorganen und Hyperämie des Uterus abzuleiten, welche zu vorzeitiger Ablösung der Placenta oder auch zu apoplektischem Tode des Fötus (Vogt) führt. Es braucht kaum bemerkt zu werden, dass der Arzt bei Menostase nur in solchen Fällen von der Sabina Gebrauch machen darf, wo jeder Verdacht auf Gravidität fern liegt.

Andere Anwendungen der Sabina, z. B. als blutstillendes Mittel bei Metrorrhagie, als Diaphoreticum bei Gicht, wogegen es Alexander Raven nach Erfahrungen in einem Nonnenkloster zu Münster rühmte, sowie gegen Unfruchtbarkeit, wobei Krahmer das von Kopp empfohlene Mittel nicht bewährt fand, sind ohne Bedeutung. Auch äusserlich, wo Sabina als starkes Reizmittel in verschiedenen Richtungen Anwendung erhielt, lässt sich dieselbe durch andere scharfstoffige Medicamente ersetzen.

Man giebt die Summitates Sabinae innerlich als Emmenagogum zu 0,2—1,2 in Pulverform oder einen Aufguss von 2,0—10,0 auf 200,0 Colatur esslöffelweise. Äusserlich dienten sie früher als Streupulver und besonders zu Salben zur Beseitigung von Condylomen (mit aa Fett nach Horn), seltener zu irritirenden Einspritzungen in Aufgussform (1:10—20) bei Blennorrhagie, Fluor albus, Nachtripper und veralteten Fistelgeschwüren. Das Oleum Sabinae lässt sich innerlich zu  $\frac{1}{3}$ —3 Tr. und mehr in Oelzucker, Pillen oder spirituösen Lösungen verordnen, äusserlich ist es pure bei cariösen Zähnen und zur Bepinselung von Condylomen, auch in Salben und Linimenten als Hautreiz sowohl bei Menostase als bei Lähmungen und Alopecie (Pinkus) gebraucht.

#### Präparat:

**Extractum Sabinae; Sabinaextract, Sadebaumextract.** Wässrig-spirituöses dickes Macerationsextract, grünbraun, in Wasser trübe löslich. Innerlich zu 0,03—0,2 mehrmals täglich, in Pillen. Aus 3 Th. Extract und 3 Th. Ungt. cereum ex tempore gemischt wurde die früher officinelle, als scharf reizende Verbandsalbe (bei Fontanellen u. s. w.) oder zu irritirenden Einreibungen benutzte Sadebaumsalbe, Unguentum Sabinae, bereitet. In älterer Zeit war auch eine Tinctura Sabinae und ein mit dieser bereitetes Cerat (Ceratum Sabinae) in Gebrauch.

**Anhang:** Sonstige Emmenagoga. Ein ähnliches Oel wie das Oleum Sabinae ist das sog. Cedernöl, Oleum Cedriae s. Juniperi Virginianae, welches in Amerika als Emmenagogum und Anthelminticum gebraucht wird und wiederholt, als Abortivum angewandt, zu Vergiftungen führte, welche unter allgemeinen tonischen Krämpfen, Trismus, Pulsverlangsamung, Dyspnoe und Erbrechen einer nach dem Oele riechenden Flüssigkeit zu Coma und Tod führten. In den Vereinigten Staaten steht die Wurzel der Baumwollpflanze *Gossypium herbaceum* L., *Radix Gossypii*, als Emmenagogum und Abortivum in Form eines Decocts in Ruf. In gleichem Rufe stehen in Frankreich u. England die Blätter des Eibenbaumes, *Taxus baccata* L., welche neben ätherischem Oele ein Alkaloid enthalten, welches bei Infusion in die Venen Hunde zu 0,12 und Kaninchen zu 0,02 in  $\frac{1}{4}$ —1 Std. tödtet, wobei die Symptome in starkem Sinken der Atmefrequenz und Herzaction, Dyspnoe und terminalen Krämpfen bestehen und der Tod durch Erstickung eintritt (Borchers). Endlich gelten auch die Blüten der bei uns als Zierpflanze cultivirten Pfingstrose, *Paeonia officinalis* L., deren glänzende, schwarzbraune Samen der Aberglaube früherer Zeiten zu Hals- und Armbändern für zahnende Kinder verarbeiten liess, als menstruationsbefördernd. Das wirksame Princip ist nicht bekannt, doch sind die Blütenblätter entschieden giftig, da ein Aufguss Kopfschmerz, Ohrensausen, Flimmern vor den Augen, heftige Leibscherzen, Erbrechen und intensive mehrwöchentliche Darmentzündung produciren kann (Thomson).

**Folia s. Herba Rutae; Rautenblätter.** — Diese früher officinelle, wenig gebrauchte Droge stellt die meergrünen, durch ansehnliche Oelräume durchscheinend punktirtten Blätter der in den Mittelmeerländern wild wachsenden, bei uns in Gärten gezogenen Gartenraute, *Ruta hortensis* L., eines Halbstrauches aus der Familie der Rutaceen, dar. Ihr eigenthümlicher,



starker, etwas an Pimpinelle erinnernder Geruch und bitterlicher, aromatischer Geschmack gehen beim Trocknen mehr oder minder verloren. Sie enthalten ein als Rautenöl, *Oleum Rutae*, bezeichnetes ätherisches Oel, von welchem jedoch selbst aus südfranzösischem Kraute nicht mehr als  $\frac{1}{4}\%$  (aus den Früchten 1%) erhalten wird. Dasselbe besteht aus einem unter 200° siedenden Kohlenwasserstoff und einem bei 226° siedenden, durchsichtig farblosen, von oben gesehen bläulich fluorescirenden, bei +6° fasrig krystallinisch erstarrenden, sauerstoffhaltigen ätherischen Oele, welches als Methylcaprinol oder Methylpelargonylketon sich ausgewiesen hat (Giesecke). Das Rautenöl, welches zu 1,0 in die Vene eines Hundes injicirt in 2 Min. Erbrechen, Schwindel und Lähmung der Hinterbeine, jedoch nicht den Tod bedingt (Orfila), ist wahrscheinlich die Ursache der emmenagogen Wirkung der Raute, welche den Alten (Hippocrates) schon bekannt war und in Frankreich noch gegenwärtig vom Volke zu abortiven Zwecken ausgenutzt wird, in welcher Hinsicht Wurzel, Kraut und Saft den Blättern nachstehen sollen (Hélie). Grosse Dosen des Saftes können zu Vergiftung, unter deren Symptomen Speichelfluss, Anschwellung der Zunge, Enteritis und Sinken der Körpertemperatur und des Pulses sich auszeichnen, selbst mit letalem Ausgange, führen (Tardieu). Das Kraut von *Ruta graveolens* (und noch mehr von *R. montana* L.) ist ausserordentlich scharf und kann das Einsammeln der Blüten und Samen oder das Schneiden des Krautes an den Händen erysipelatöse Entzündung mit heftigen Schmerzen und Jucken, selbst mit Blasenbildung und späterer Desquamation, bedingen, welche Affection mehrere Wochen dauern kann. Die herabsetzende Wirkung auf den Geschlechtstrieb bei Männern und viele schöne andere Sachen, welche die Schola Salernitana der Gartenraute zuschreibt (*Ruta viris minuit Venerem, mulieribus addit, Ruta facit castum, dat lumen et ingerit astum*), existiren nur in der Phantasie. Das *Oleum Rutae* diente früher zu ableitenden Einreibungen (bei Tympanitis, wo es das Frottiren allein auch wohl thut) und innerlich zu 1—5 Tr. bei Krämpfen, Menostase und Helminthiasis.

#### **Secale cornutum: Mutterkorn.**

Dieses seit dem 16. Jahrhundert medicinisch benutzte vegetabilische Product ist das Dauermycelium eines als *Cordiceps purpurea* Fr. oder *Claviceps purpurea* Tulasne bezeichneten Pilzes aus der Familie der Pyrenomyceten. Derselbe kommt in drei verschiedenen Entwicklungszuständen vor, von denen die beiden ersten an der Blüthe und den Fruchtknoten verschiedener Gramineen sich entwickeln, namentlich am Roggen, *Secale cereale* L., und deren zweiter das Mutterkorn darstellt.

Von den zuerst durch Tulasne als zusammengehörig erkannten, früher als selbstständige Bildungen angesehenen Entwicklungszuständen von *Claviceps purpurea* ist der erste die sog. *Sphacelia* von Leveillé oder der Roggenhonigthau, ein zäher gelblicher süsser Schleim von unangenehm Geruche, der sich in jungen Roggenblumen in der Weise entwickelt, dass die auf diese niedergefallenen Pilzsporen eine Menge feiner Zellfäden, sog. Hyphen, treiben, welche den untern Theil des jungen Fruchtknotens durchziehen, wobei gleichzeitig ein süsser Saft als regressives Product des mehr oder minder zerstörten Fruchtknotens ausschwitzt. Diese *Sphacelia*form besteht aus einer zelligen Schlauchschicht oder Keimhaut und basidienähnlichen Schläuchen, an deren Spitze eine Kette kleiner, länglich eirunder Zellen, sog. Spermatien, sich ab schnüren. Ist die *Sphacelia*form vollständig entwickelt, so bildet sich durch Anschwellung und Verdichtung der Myceliumfäden am Grunde des Blütenbodens ein dichtes und festes Zellgewebe, das später zu einem fleischigen, dreieckig prismatischen, meist gekrümmten, nach beiden Enden oder nur nach oben verschmälerten, aussen violett schwarzen Körper auswächst, der an seiner

Spitze das vertrocknete und verschrumpfte Sphacelium wie eine schmutzige weisse Mütze trägt. Dieses wegen seiner Aehnlichkeit mit einem Sporn von den Franzosen als Ergot bezeichnete Gebilde, das zweite unfruchtbare Entwicklungsstadium des Pilzes (*Sclerotium* oder *Dauermycelium*), ist das Mutterkorn, *Sclerotium clavus* DC., aus welchem sich, wenn es von der Getreideähre losgelöst im Herbst oder Frühjahr auf günstigen Boden geräth, der eigentliche Kernpilz entwickelt, indem die äussere Schicht des *Sclerotium* sich nach Verlauf mehrerer Wochen hier und da in Lappchen ablöst und an den entblössten Stellen kleine, anfangs röthlichgelbe, später bräunliche gestielte Köpfchen sich entwickeln. An jedem Köpfchen befinden sich unter der Form von in das Stroma eingesenkten Warzen die Fruchthälter oder Perithezien, welche mit zahlreichen Sporenschläuchen (*Asci*) gefüllt sind, von denen jedes acht Keimkörner (Sporen) enthält. Ein *Sclerotium* kann 20–30 Kernpilze produciren, welche eine Million Sporen entwickeln.

Das Mutterkorn des Roggens — das allein medicinische gebräuchliche, welches die auf anderen Gräsern vorkommenden analogen Bildungen an Grösse meist übertrifft — bildet gerundet dreikantige, meist bogenförmig gekrümmte, spindelförmige Körner, welche höchstens 40 Mm. lang und 6 Mm. dick sind und deren dunkelviolette oder schwarze, am Grunde hellere, schwach bereifte, oft eingesunkene Flächen gewöhnlich bis tief in das innere weisse oder röthliche Gewebe hinein aufgerissen sind. Das Mutterkorn ist von derbem Gefüge und dichtem Bruche, hornartig, schwierig zu pulvern, von fadem, eigenthümlichem unangenehmem Geschmacke und von ranzigem widrigem Geruche. Das Mutterkorn muss in der Apotheke vorsichtig aufbewahrt werden und bedarf öfterer Erneuerung; besonders leicht zersetzt es sich in gepulvertem Zustande, weshalb es zweckmässig erscheint, stets frisch gepulvertes Mutterkorn zu verordnen. Nach der Pharmakopoe soll Mutterkorn nur nach völliger Erschöpfung mit Aether zur Verwendung kommen. Die Droge muss vor der Reife des Roggens in vollkommen entwickeltem Zustande gesammelt werden; unreifes und überreifes Mutterkorn ist ohne Wirkung. Das wirksamste scheint in höheren Lagen auf Sand- oder Kalkboden zu wachsen (*Oesterlen*). Einzelne Mutterkornarten von andern Gramineen, z. B. von der nordafrikanischen *Ampelodesmus tenax*, scheinen noch stärker als Roggenmutterkorn zu wirken. Die von *Estachy* als Maismutterkorn bezeichnete und als Ersatz empfohlene Droge ist vermuthlich nicht zu *Claviceps* gehörig, sondern Maisbrand, *Ustilago Maïdis*, welcher allerdings ebenfalls nach veterinärärztlichen Erfahrungen fruchtabtreibend wirkt. Das Maismutterkorn ist nicht mit dem als *Verderame* bezeichneten Pilze der Maiskörner zu verwechseln, auf welchen die Entstehung des in Italien so verderblichen Pellagra zurückgeführt wurde (*Balardini*). Die gegen Hautkrankheiten (*Ekzem*, *Psoriasis*, *Scabies*) mit Erfolg benutzten Präparate aus verdorbenem Mais (*Mais guasto*) von *Lombroso* und *Erba*, *Oleum* et *Tinctura Maïdis corruptae*, sind nicht aus dem mit *Verderame* behafteten Mais, sondern aus einem durch künstliche Fermentation veränderten Mais erhalten.

Als schädliche Beimengung des Getreides ist Mutterkorn bereits im Mittelalter in Frankreich erkannt. Die wehentreibende und blutstillende Wirkung fand zuerst in der deutschen Volksmedizin Verwerthung. Die Empfehlung von *Camerarius* (1688) in der Geburtshülfe kam später in Vergessenheit, so dass das Mittel 1807 durch *Stearns* von Amerika aus gewissermassen nach Europa neu importirt wurde. Der Name Mutterkorn scheint nicht in den Beziehungen zur Gebärmutter seinen Grund zu haben, vielmehr deutet die Bezeichnung *mater secales* auf Kornmutter, d. h. vergrössertes Korn, hin.

Als die wirksamen Principien des Mutterkorns sind nach den Untersuchungen von *Dragendorff* und *Podwissotzky* eine eigenthümliche Säure, die *Sclerotinsäure*, und eine als *Scleromucin* bezeichnete colloidale Substanz anzusehen.

Die *Sclerotinsäure*, welche in gutem Mutterkorn zu 4,5% enthalten ist, bildet eine geschmack- und geruchfreie, hygroskopische, in Wasser lösliche,

in Alkohol schwer lösliche, nicht glykosidische, alkalische Kupferlösung langsam reducirende Substanz, welche von Gerbsäure und Phosphormolybdänsäure gefällt wird. Das Scleromucin, welches sich im Mutterkorn zu 2–3% findet, wird in unreinem, stark mit Aschenbestandtheilen imprägnirtem Zustande durch Fällung eines wässrigen Mutterkornauszuges mit 40–50% Alkohol erhalten. Beide Körper sind stickstoffhaltig; das Scleromucin soll sich zu Sclerotinsäure wie Bassorin zu Gummi verhalten. Die Sclerotinsäure, welche offenbar das hauptsächlichste active Princip des Mutterkorns ist, tödtet Frösche zu 0,12, kleine Katzen zu 0,3 und Kaninchen zu 0,8; das in seiner Wirkung gleichartige sclerotinsaure Natrium wirkt bei Warmblütern erst in der zwei bis dreifachen Menge toxisch.

Neben den activen Principien findet sich im Mutterkorn ein aus Olein, Palmitin und wenig Butter- und Essigsäure bestehendes Fett, welches bis 35% des Pilzes ausmacht und dessen angebliche giftige Wirkungen (Wright, Parola) offenbar nur auf Beimengungen zurückzuführen sind. Bedeutungslos für die Wirkung ist auch der eigenthümliche Mutterkornzucker (Mykose), welcher sich leicht in Milchsäure zu verwandeln scheint. Dasselbe gilt von den Farbstoffen (Scleroidin, Scleroxanthin und Sclererythrin, obschon letzteres nicht ganz unwirksam ist, doch kommt es nur zu  $\frac{1}{20}$ – $\frac{1}{10}$ % im Mutterkorn vor. Seit den Untersuchungen Dragendorffs thut man wohl, die früher viel gebräuchliche Bezeichnung Ergotin für das active Princip des Mutterkorns zu meiden, zumal da dieser Name ganz verschiedenen Substanzen beigelegt wurde. Zuerst gebrauchte denselben Wiggers für ein durch Auskochen von gepulvertem, mit Aether vom Fett befreiten Mutterkorn mit Weingeist und Behandlung des Verdunstungsrückstandes des weingeistigen Auszuges mit Wasser erhaltenes rothbraunes, scharf und bitter schmeckendes, in Wasser und Aether unlösliches, dagegen in Alkohol lösliches Pulver, welches allerdings toxisch wirkt, jedoch Herz und Gefässe nicht wie Mutterkorn oder Mutterkornextract beeinflusst, sondern neben Herabsetzung der peripheren sensiblen Nerven Convulsionen und Tetanus von den Centren aus erregt (H. Köhler). Später gebrauchte Bonjean die Bezeichnung Ergotin (Ergotin von Bonjean) für das in die Praxis eingeführte wässrige Extract, in welchem der wesentlich wirksame Bestandtheil sich allerdings findet. Endlich gebrauchte Wenzell die Benennung Ergotin für ein von ihm im Mutterkorn aufgefundenes Alkaloid, dessen Wirkung nicht näher bestimmt wurde, während von Wenzell selbst die contrahirende Wirkung auf den Uterus, jedoch ohne sichere Belege, einem zweiten Alkaloide, dem Ekbolin, zugeschrieben wurde. Rossbach (1874) fand ein nach Wenzells Methode dargestelltes Ekbolin zu 0,01 die Contractionen des Ventrikels des Froschherzens verlangsamt und einzelne Parteen desselben, offenbar durch directe Wirkung auf den Muskel, lähmend. Ein in Wasser unlösliches, krystallinisches, fluorescirendes Mutterkornalkaloid ist neuerdings von Tanret aufgefunden und als Ergotin in bezeichnet, kann aber ebenfalls nicht als das auf den Uterus wirkende Princip betrachtet werden, obschon es toxisch wirkt und Hunde in wenigen Stunden nach vorausgehenden Brechdurchfällen und Sinken der Temperatur unter Convulsionen und Lähmung tödtet (Galippe und Budin) und beim Menschen zu 0,004–0,006 regelmässig in den folgenden 24 Std. Nausea, Erbrechen und schmerzhaftes Koliken hervorruft (Dujardin-Beaumetz), dagegen bei Blutungen höchst inconstant wirkt (Gosselin). Wernich erklärte zuerst das active, d. h. auf das Gefässsystem wirkende Princip für eine Säure, weil es sich in säurehaltigem Weingeist besser als in wässrigem Alkohol löst. Auf die Bedeutung eines dem thierischen Leime ähnlichen Körpers, der sich aus dem Kleber des Roggens bilde, für die Wirkung des Mutterkorns hat zuerst Buchheim hingewiesen.

Die Wirkung des Mutterkorns und des daraus dargestellten wässrigen Extracts ist theilweise eine örtliche, theilweise eine entfernte.

Oertlich irritirende Wirkung zeigt sich z. B. bei subcutaner Einspritzung von wässrigem Extract in wässriger Solution (Wernich). Obschon hierbei vielleicht der Milchsäuregehalt mit im Spiele ist, so ist doch auch die Sele-



rotinsäure in starker Verdünnung nicht ganz ohne local irritirende Wirkung. In den Versuchen von Stumpf, in der Münchener medicinischen Klinik, kam es in der Hälfte der Fälle, besonders häufig nach concentrirteren Solutionen (1:2—5), zu Röthung und Entzündung, in 10% sogar zu Abscedirung der Injectionsstelle. Intern eingeführte grössere Dosen Mutterkorn erregen beim Menschen Aufstossen, Uebelsein, Würgen und Erbrechen, bisweilen Kolikschmerzen und Diarrhoe, meist auch vermehrte Speichelsecretion. Aehnliche Phänomene kommen auch nach dem Genuisse mutterkornhaltigen Brodes fast constant vor. Neubert fand bei einer an Mutterkornvergiftung zu Grunde gegangenen Gravida hämorrhagische Erosionen im Magen. — Die Sclerotinsäure wird als solche im Urin ausgeschieden (Nikitin).

Die entfernten Wirkungen des Mutterkorns treten einestheils am Nervensystem, andererseits am Gefässsystem und am Uterus, an denen dasselbe Contraction erzeugt, hervor.

Sclerotinsäure bewirkt zu 0,3 subcutan bei Fröschen innerhalb einiger Stunden Lähmung, die in 4—7 Tagen vorübergeht. Bei Warmblütern sind die Erscheinungen der Parese ebenfalls vorwaltend, daneben sinkt die Körpertemperatur und die Athemzahl, und die Athmung erlischt vor der Herzaction (Nikitin). Sowohl am trächtigen als am nicht trächtigen Uterus erregt Sclerotinsäure Contractionen mit gleichzeitigem Blasserwerden des Organs (Nikitin). Stumpf beobachtete nach dem Gebrauche bei Kranken selbst nach 0,6 subcutan keine Nebenerscheinungen, wohl aber hohe Spannung der Arterien, welche meist auch nach Fortlassung des Mittels noch mehrere Tage anhielt und in der Regel erst nach Tagen, selbst nach einer Woche auftrat. Kobes fand daneben Herabsetzung des Pulses um 10—20 Schläge. Scleromucin wirkt quantitativ und qualitativ gleich (Dragendorff und Podwissotzky).

Beim Menschen erzeugen Dosen von 0,5—1,5 Mutterkorn (ausser Contractionen des Uterus im Zustande der Gravidität) keine entfernten Erscheinungen (Schroff). Bei höheren Gaben (4,0—8,0) entstehen nach den Selbstversuchen von Lorinser, Parola, Gross, Bonjean u. A. ausserdem Völle im Kopf, Taumel, Schwindel, Pupillenerweiterung ohne besondere Störungen (Trousseau) und beträchtliche Verlangsamung des Pulses (durchschnittlich um 10—15 Schläge in der Minute). Hooker beobachtete auch nach dem das active Princip des Mutterkorns enthaltenden fetten Oele, in einständlichen Intervallen zu 2,0 und 2mal zu 4,0 genommen, grosse Abgeschlagenheit und Schmerzhaftigkeit der Muskeln, Sinken des Pulses (um 36 Schläge) und hochgradige Abnahme der Athemzahl. Duméril, Demarquay und Leconte wollen geringe Zunahme der Temperatur nach Mutterkorngebrauch beobachtet haben, Hermanides nach Bonjeans Ergotin stets Pulsbeschleunigung.

Bei Thieren treten nach grösseren Gaben ähnliche Erscheinungen ein und bei toxischen Dosen erfolgt nach vorausgehendem Taumeln, Lähmung der Hinterbeine, Anästhesie, Auftreten von Zuckungen und starker Prostration der Tod. Die contractionserregende Wirkung auf den Uterus konnten Wright und Bonjean bei Thieren nicht constatiren, wohl aber ist ein epizootisches Abortiren nach Fütterung mit Mutterkorn bei Kühen beobachtet, und auch bei Schweinen, Katzen und Hündinnen ist von andern Beobachtern (Oslere, Percy, Laurent, Diez) Abortus nach Mutterkorn constatirt. Ebenso gebrauchte Youatt bei Thieren Mutterkorn gegen Wehenschwäche mit dem besten Erfolge. Manche Experimentatoren sahen vom Mutterkorn bei Thieren keine toxischen Effecte, so z. B. Block bei Lämmern, doch liegt die Vermuthung nahe, dass bei diesen Versuchen verdorbenes oder unreifes Mutterkorn in Gebrauch gezogen wurde.

Die über verschiedene Mutterkornextracte angestellten physiologischen Versuchen lassen ebenso wie Nikitins Studien über Sclerotinsäure einen directen Einfluss auf den Uterus nicht bezweifeln.

Nach Nikitin bewirkt Sclerotinsäure bei Warmblütern Beschleunigung der Darmperistaltik und Contractionen des Uterus sowohl im trächtigen als nicht trächtigen Zustande, verstärkt auch vorhandene Uteruscontractionen und bedingt gleichzeitig Contraction der Uteringefässe und der Gefässe des Darms. Nach Wernich zeigt sich die Uteruscontraction nach Mutterkornextract früher als die Veränderung in der Blutfülle des Uterus und bleibt aus, wenn das Rückenmark oberhalb des 4. Brustwirbels durchschnitten wird. Die Bewegungen des Uterus treten selbst nach Zerstörung sämtlicher Stämme und Plexus, welche zum Uterus gehen, und nach Elimination der vasomotorischen Centra auf. Die Farbenveränderung ist Folge, nicht Ursache der Uterincontractionen (Boreischa.)

Die früher allgemein angenommene Verengung des gesammten arteriellen Stromgebiets durch Mutterkorn und die damit im Zusammenhange stehende Steigerung des Blutdrucks wird in neuester Zeit als directer Effect des *Secale cornutum* in Zweifel gezogen.

Dass Verengung der kleinen Gefässe nach Mutterkornextract vorkommt, kann freilich keinem Zweifel unterliegen. Dieselbe tritt sowohl an den Capillaren der Froschschwimmhaut und des Fröschesenteriums (Briesemann, Eberty) als an der Zunge, den Schleimhäuten und der Iris (Klebs), als an der Pia mater des Rückenmarks und Gehirns (Brown-Séquard), als an der Retina (Patrick und Mossop) auf und ist oft so hochgradig, dass das Kaliber der Gefässe bis zu  $\frac{1}{3}$  abnimmt. Auch die Steigerung des Blutdrucks und zwar nicht allein im arteriellen, sondern auch im venösen Systeme, ist erwiesen (H. Köhler); bei kleineren Dosen geht demselben vorübergehendes Sinken des arteriellen Seitendruckes voraus (Haudelin). Holmes sah bei Einspritzung von wässrigem Mutterkornextract in grösserer Entfernung vom Herzen, z. B. in die Schenkelarterie, zuerst Steigen und später Sinken des Blutdrucks. Köhler und Wood zeigten, dass diese Gefässverengung und Blutdruckssteigerung nicht durch Reizung der peripherischen vasomotorischen Nerven bedingt werde, sondern vom vasomotorischen Centrum abhängt. Zweifel hat die Gefässverengung, die bei curarisirten Fröschen später erfolgt und bei chloroformirten und chloralisirten ausbleibt, als Reflexwirkung des durch die Injection bedingten sensiblen Reizes in Anspruch genommen. Bei grösseren Dosen Ergotin beobachtete Haudelin dauerndes Sinken des arteriellen Blutdrucks. Nikitin will bei Sclerotinsäure den Blutdruck nach kleinen Dosen vorübergehend, nach grossen dauernd sinken gesehen haben; auch constatirte derselbe nur im Darm und am Uterus, nicht aber in anderen Gefässgebieten Contraction. Boreischa stellt selbst die Gefässcontraction im Darm in Abrede, indem er auf die nach Mutterkornvergiftung wiederholt constatirte enorme venöse Blutüberfüllung im ganzen Abdominalgebiete hinweist. Nach Boreischa besitzt übrigens Ergotin neben einer Wirkung auf die vasomotorischen Centra und die peripheren Gefässnerven, welche sich durch Erweiterung zunächst im Gebiete der Nervi splanchnici zu erkennen giebt, eine lähmende Wirkung auf den Herzvagus und die Herzganglien.

Im Uebrigen wirkt Sclerotinsäure vorzugsweise auf das Centralnervensystem, setzt die Reflexerregbarkeit des Rückenmarks herab, bei Kaltblütern bis zu vollständiger Lähmung, verlangsamt die Respiration und führt bei Warmblütern Tod durch Respirationslähmung herbei; die Herzthätigkeit wird nur bei Fröschen herabgesetzt, die sensiblen Nerven ausschliesslich bei directer Einwirkung gelähmt, während sie bei allgemeiner Vergiftung, ebenso wie die motorischen Nerven und die Muskeln intact bleiben (Nikitin). Die Temperatur wird während der Mutterkornvergiftung herabgesetzt. Aehnliche Resultate mit verschiedenen Mutterkornextracten wurden auch von Köhler und Eberty, Zweifel u. A. erhalten.

Ueber die chronische Vergiftung durch den Genuss von Mutterkorn, welches mit Roggenmehl zu Brod verbacken wurde, müssen wir kurz hinweggehen, da weder die schwere als Ergotismus gangraenosus bezeichnete Form, noch die bei uns häufigere sog.

Kriebelkrankheit, *Ergotismus convulsivus*, durch medicinalen Gebrauch von Mutterkorn oder Mutterkornpräparaten jemals hervorgerufen werden.

Die meisten Anwendungen des Mutterkorns erfordern nur kurzen Gebrauch desselben; nur bei Lähmungen und Blutspeien hat man es längere Zeit hindurch gegeben. Bei Phthisikern sind niemals ausser etwas allgemeiner nervöser Depression (Anstie) übele Symptome beobachtet. Bei Gelähmten hat nur Petrequin Prickeln in den Fusssohlen und Kriebeln in den Extremitäten nach Mutterkorngebrauch auftreten sehen. — Die chronische Mutterkornvergiftung oder der *Ergotismus*, welcher wiederholt seit dem Mittelalter bis in die neueste Zeit hinein in verschiedenen Ländern, früher besonders in der Sologne und in einzelnen Theilen des nördlichen Deutschlands, in unserer Zeit mit grösster Intensität in Schweden und Finnland epidemisirte, kommt bei uns fast ausschliesslich unter der Form der Kriebelkrankheit vor, welche sich durch das Auftreten von Störungen der Sensibilität (ausgesprochen durch Kriebeln, Formication, Gefühl von Pelzigsein oder durch vollkommene Anästhesie der Finger und Zehen, weiterhin auch der Extremitäten oder des ganzen Rumpfes), in schweren Fällen auch durch heftige und ausserordentlich schmerzhaft tonische Contractionen der Muskeln, namentlich der Flexoren, Schwindel, Pupillenerweiterung, Störungen des Sehvermögens und epileptiforme Anfälle charakterisirt. Das Vorkommen von Brandblasen an den Fingern und brandiger Abstossung von Fingergliedern bei einzelnen Erkrankten bildet den Uebergang zu der schwereren Form der Brandseuche, welche in den Epidemien des heiligen Feuers (*Ignis sacer*) im Mittelalter und der in der Sologne noch in diesem Jahrhundert vorgekommene *Gangraena epidemica* ihren Ausdruck findet und sich durch brandiges Abstossen einzelner Glieder, in der Regel der Zehen, aber auch der ganzen Beine und Arme (*Courhaut*) kennzeichnet. Offenbar ist letztere Form als Steigerung der ersten zu betrachten und wahrscheinlich durch Einführung viel grösserer Mengen von Mutterkorn bedingt, das bei uns in den bisher beobachteten Epidemien höchstens  $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{5}$ , in den französischen  $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$  des verbackenen Mutterkorns betrug. Brand der unteren Extremität bei Wöchnerinnen nach hohen Dosen Mutterkorn wird von Maunsell angeführt, ist aber entschieden zweifelhaft.

Das Mutterkorn hat seine hauptsächlichste Bedeutung in der geburtshülftlichen Praxis als Mittel zur Hervorrufung von Contractionen des Uterus.

Die Anwendung des Mutterkorns bei Geburten ist der Gegenstand ernstlicher Angriffe gewesen, welche indessen wohl nur in Bezug auf den von Hebammen und unerfahrenen Geburtshelfern geübten übertriebenen und unzweckmässigen Gebrauch des Medicaments sich beziehen. Man hat in der Anwendung desselben Gefahren für Mutter und Kind erblickt, welche bei vorsichtigem Gebrauche ganz gewiss nicht vorhanden sind. Selbst ziemlich hohe Gaben Mutterkorn erregen ausser Uebelkeit und Erbrechen in der Regel kein anderes unangenehmes Symptom. Verschiedene amerikanische und englische Geburtshelfer (Beathy, Ramsbotham u. A.) vindiciren dem Mutterkorn toxische Wirkung auf den Fötus, dessen Herzschlag wie der der Mutter beträchtlich verlangsamt und unregelmässig werden soll, oder befürchten von den durch das Mittel hervorgerufenen tetanischen Contractionen asphyktischen Tod des Kindes. Einzelne bürdeten dem Mittel gewiss mit wenig Scharfblick die Zunahme der Todtgeburten in Frankreich und England auf; Andere nannten das Mutterkornpulver mehr witzig als gerecht ein Pulvis ad mortem statt Pulvis ad partum. Obschon sich nicht in Abrede stellen lässt, dass durch die vom Mutterkorn hervorgerufenen stürmischen Uterincontractionen Circulationsstörungen zunächst in den Uteringefässen, dann auch in der Placenta und weiterhin im Nabelstrange und im Kreislaufe des Kindes resultiren können, thäte man doch bestimmt Unrecht, den Tod aller unter Mutterkorngebrauch während der Geburt absterbenden Kinder auf Rechnung des Mittels zu setzen, da dasselbe häufig unter Umständen verabreicht wird, wo an sich die Bedin-



gungen der Asphyxie gegeben sind. Namhafte Geburtshelfer, wie Credé, Chapman, sahen vom Mutterkorngebrauch niemals die angegebenen übeln Zufälle, und Millet sah Kinder gesund zur Welt kommen, welche 2 Std. nach der Darreichung des Mutterkorns geboren wurden. Busch zählte unter 177 bei Mutterkorn darreichung geborenen Kindern 70 Todtgeburten und 18 Fälle von Scheintod, was gewiss kein sehr ungünstiges Verhältniss darstellt. Immerhin mag es gerechtfertigt sein, nach dem Vorgange von Dépaül Schwäche und Irregularität des fötalen Herzschlages als Contraindication des Mutterkorngebrauches zu betrachten, und schwerlich wird Jemand das Verfahren von Garraway, scheidotdte Kinder durch Ergotin zu beleben, nachahmenswerth finden. Verschiedene Gegner des Mutterkorns schreiben ihm auch Gefahr für das Leben der Mutter in der Weise zu, dass es zu Rupturen des Uterus prädisponire (Hardy). Die Fälle, worauf sie sich stützen, sind jedoch sämmtlich solche, wo das Mutterkorn unter unrichtigen Indicationen zur Anwendung kam, indem es entweder vor völliger Erweiterung des Muttermundes oder unter abnormen Beckenverhältnissen in Gebrauch gezogen wurde. Man schreibt dem Mittel ferner von gegnerischer Seite das Vermögen zu, sanduhrförmige Contractionen der Gebärmutter zu erzeugen, oder in Folge stürmischer Wehen Zerreissung des Dammes und selbst Inversio uteri (Dewees) herbeizuführen, doch gehören solche Vorkommnisse gewiss zu den äussersten Seltenheiten. Jedenfalls aber weisen diese Befürchtungen auf Contraindicationen des Mittels hin, das man bei starker Rigidität der Weichtheile, insbesondere bei Erstgebärenden in vorgerückterem Lebensalter, am zweckmässigsten vollständig vermeidet. Ueberall, wo der austreibenden Wirkung der durch Mutterkorn erzeugten Wehen ein mechanisches Hinderniss, sei es in einer abnormen Lage des Fötus, sei es in Beckenverengung, Rigidität der Weichtheile oder Geschwülsten bestehend, entgegensteht, ist Mutterkorn contraindicirt, wie es auch bei Degeneration und Atrophie der Uteruswände niemals Anwendung finden darf. Ob andererseits, wie Freunde des Mutterkorns behaupten, sein Gebrauch während der Geburt das Eintreten von Metrorrhagien in der Nachgeburtsperiode verhindern und Nachwehen vermindern kann (Leriche), steht dahin. Bei der Darreichung beschränke man sich stets auf wenige Dosen, da das stundenlange Fortgeben niemals Contractionen hervorruft, wenn dieselben nicht durch die ersten Gaben entstehen.

Als hauptsächlichste Indication für die Anwendung des Mutterkorns ergibt sich demnach Wehenschwäche im Verlaufe normaler Kopfgeburten bei normalen Beckenverhältnissen nach gehöriger Erweiterung des Muttermundes und Tiefstand des Kopfes, in Fällen, wo nicht unmittelbare Gefahr für das Leben der Mutter oder des Kindes die Beendigung der Geburt durch Kunsthilfe nöthig macht. Ferner erscheint das Mutterkorn bei unvermeidlichem Abortus zur Beendigung desselben angemessen. Auch bei Retention der Placenta in Folge mangelhafter Contraction des Uterus oder bei zurückgebliebenen Blutcoagula lässt sich S. c. verwenden; doch ist dasselbe in ersterer Richtung durch das Credé'sche Verfahren der Placenta-Entfernung zu ersetzen. Als Mittel zur Einleitung künstlicher Frühgeburt (Ramsbotham, Raynes) ist es nicht allgemein in Aufnahme gekommen; hier stehen ihm dieselben Bedenken entgegen, welche seine Anwendung bei noch nicht erweitertem Muttermund verbieten. Hermanides empfiehlt Ergotin besonders bei Placenta praevia. Dass durch Mutterkorn künstliche Frühgeburt und Abortus herbeigeführt werden kann, unterliegt keinem Zweifel; doch fallen allerdings wohl die meisten verbrecherischen Versuche, die Leibesfrucht mit dem S. c. abzutreiben, vergeblich aus (Danyon), da Mutterkorn in früheren Schwangerschaftsmonaten viel weniger leicht Contractionen hervorruft als in späteren. Dass es aber auch auf den nichtschwangeren Uterus einwirkt, beweisen Fälle, wo in den Uterus eingedrungene Blutegel durch Mutterkorn wieder entfernt wurden (Taylor). Die Ansicht amerikanischer Aerzte, das M. sogar zur Constatirung der Schwangerschaft zu benutzen sei, indem es nur bei Gravidae Ziehen und leichten Schmerz im Rücken und Oberschenkeln veranlassen soll, beruht auf Geistesheherei, da directe Experimente von Trouseau und Maisonneuve das Auftreten von wehenartigen Schmerzen (Colique

utérine) auch bei Jungfrauen darthaten. Inwieweit die Angaben von Aran, dass S. c. auch bei Hypertrophia uteri Rückbildung zur Norm herbeiführen könne, auf Wirklichkeit beruht, steht dahin. — Besondere Bedeutung hat in neuerer Zeit die zuerst von Hildebrand beobachtete Reduction von Uterusmyomen unter dem Gebrauche von subcutanen Mutterkornextractinjectionen gewonnen. Obschon das darauf begründete Verfahren keineswegs in allen Fällen hilft, lässt sich doch nicht verkennen, dass sie unter der dadurch bedingten Contraction des Uterus theilweise zur Resorption gelangen und sich in nennenswerther Weise verkleinern, wie dies auch durch Keating, Scanzoni, Burow u. A. bestätigt ist. Am meisten geeignet für die Ergotinbehandlung sind jedenfalls die weichen und mehr submucös gelegenen Tumoren, während subseröse Fibrome zwar nicht resorbirt, aber oft mehr hervorgedrängt und gestielt werden (Hildebrand). Wesentliche Bedingung für günstige Effecte ist die Contractionsfähigkeit der Uterinwandung und das Fehlen exsudativer Processe.

In zweiter Reihe kommt das Mutterkorn bei Blutungen, und zwar bei Weitem am häufigsten bei Metrorrhagien, in Anwendung, und kann ein günstiger Effect bei Hämorrhagien der verschiedensten Organe nicht in Abrede gestellt werden, wie dies namentlich auch die neueren Erfahrungen über subcutane Injection des Mutterkornextracts und der Sclerotinsäure (Stumpf) zur Evidenz darthun.

Die günstigsten Resultate erzielt man entschieden bei Blutungen in der Nachgeburtsperiode, denen mangelhafte Contraction des Uterus zu Grunde liegt, wo das Mittel entweder durch Herbeiführung von Zusammenziehung des Uterus und Verengerung der Gefässe hämostatisch wirkt oder durch erstere die die Blutung unterhaltenden Coagula entfernt. Jeder Arzt wird in seiner Praxis beweisende Fälle aufzuweisen haben, wenn schon vielleicht sehr schwere Fälle, wie Nothnagel will, rascher wirkende Eingriffe erfordern. Die im 3. Decennium dieses Jahrhunderts vielfach ventilirte Frage, ob Mutterkorn auch Blutungen aus dem jungfräulichen Uterus, wo eine Vergrößerung der Muskelfasern nicht statthabe, stille, ist durch die bereits oben erwähnten Versuche von Trousseau und Maisonneuve im Hôtel Dieu entschieden, welche die Heileffecte des Medicaments bei Menorrhagie auch bei Frauen, welche nie geboren hatten, sicher stellten und wobei sich gleichzeitig ergab, dass weder das Alter noch die Dauer der Blutung die Heilwirkung oder die Dosis — in manchen Fällen genügte eine einzige Gabe von 0,6, während in anderen selbst bis zu 18,0 im Ganzen gegeben werden musste, ehe die Blutung stand — von Einfluss sind. Am wenigsten darf man vom Mutterkorn bei Metrorrhagien erwarten, welche mit Geschwülsten im Uterus in Verbindung stehen, doch giebt es für die Heilwirkung auch aus neuerer Zeit Gewährsmänner, welche das *Secale cornutum* bei Carcinomen oder Fibromyomen (Hildebrand) mit Erfolg in Anwendung zogen.

Von anderen Blutungen sind besonders Lungenblutungen zu nennen, gegen welche zuerst italienische Aerzte (Sparjani, Bazzoni), später besonders Oppolzer von S. c. günstige Erfolge sahen und bei welchen neuerdings auch Stewart von der subcutanen Anwendung des Mutterkornextracts bestimmten Erfolg sah. Analoge Effecte sind bei Magen-, Darm- und Nierenblutungen constatirt (Drasche, Hermanides). Henoch empfahl Mutterkorn auch gegen *Purpura haemorrhagica*. Die Effecte bei entfernten Blutungen, welche nicht in Abrede gestellt werden können, erklärt man jetzt vorzugsweise aus dem herabsetzenden Einflusse auf die Circulation, nicht der gefässverengenden Wirkung des Mutterkorns, die nur für den Darm und den Uterus feststeht. Die in neuerer Zeit vielfach ausgeführte Behandlung von Aneurismen und Varicen mit subcutaner Application von Mutterkornextractlösungen (v. Langenbeck, Voigt) ist offenbar nicht durch active Contraction der Gefässhäute wirksam, sondern in analoger Weise wie die Schwalbeschen Alkoholinjectionen durch adhäsive Entzündung oder durch den Druck der durch solche Injectionen häufig auftretenden inflammatorischen Schwellung (Hermanides). Ähnlich erklären sich günstige Effecte bei Prolapsus ani (v. Langenbeck). Auf die Gefässcontraction bezog man

früher auch die Erfolge der Mutterkornbehandlung bei chronischen Katarrhen. Dieselben treten besonders bei Leukorrhoe hervor, jedoch nicht in allen Fällen, namentlich nicht da, wo der Vaginalkatarrh von Erosionen und Exulcerationen abhängig ist, wohl aber in Fällen, wo nach dem Ablauf von Menorrhagien blutigseröse Flüssigkeit aus Uterus und Vagina bis zur Wiederkehr der nächsten Menses heraus sickert (Trousseau, M. Hall, Negri, Fife). Günstige Wirkung hat Mutterkorn auch bei Blasenkatarrhen, im Gefolge von Rückenmarksparalyse. Ravel, Shearer, Forster u. A. rühmen Mutterkorn meist in Verbindung mit Opium oder Gerbsäure als die Zuckerabscheidung beschränkend. Nach Meola stillt Ergotin von Bonjean bei Subcutanapplication in nicht unmittelbarer Nähe nicht allein die Blutungen von Krebsgeschwüren, sondern hemmt auch die weitere Entwicklung der Krebse. Planat empfahl Ergotinlösungen (1,0—1,5) in 20,0 Glycerin oder Rosenwasser) zur Einträufelung bei Blepharconjunctivitis und Keratitis.

Von geringerer Bedeutung ist die Anwendung des Mutterkorns bei Paralyse und verschiedenen Neurosen.

Bei Paresen, wo zuerst Barbier Secale cornutum mit Erfolg anwendete, erklärt Brown-Séquard das Mittel in solchen Fällen für indicirt, wo Blutüberfüllung, chronische Entzündung oder Entzündungsresiduen in den Nervencentren oder deren Häuten die Ursachen der Lähmung sind. Hauptsächlich sind es Paraplegien mit Urincontinenz, wo das Mittel sich bewährte (Payen, Giraud u. A.), doch sind auch Fälle von hysterischer Paraplegie und selbst von Ataxie (Taylor) dadurch geheilt. Minder bewährt ist das Mittel bei Chorea (Maderna) und trotz der Befürwortung von Brown-Séquard u. Jeats bei Epilepsie, wo Köhler niemals Erfolge davon sah, bei Tetanus (Maderna), bei Manie u. a. mit Hirncongestion in Connex stehenden Psychosen (Mann, v. Andel). Eulenburg empfahl es bei vasomotorischen Neurosen z. B. Hemiparalyse angioparalytica u. s. w. Griepenkerl, welcher in einer Kriebelkrankheitspidemie davon befallene keuchhustenkranke Kinder rasch genesen sah, empfahl Mutterkorn gegen Tussis convulsiva und hat der Nutzen dieser Medication durch Zamboni Bestätigung gefunden.

Der Gebrauch von Mutterkorn bei Schwäche des Herzens (Thompson, Garraway), bei Hirncongestion nach Verschwinden von Haemorrhoidalblutung (Schwanniger), bei Kropf (Coghill, Crocket), bei Milztumor (Jones, Cromet), Cholera asphyctica, Pharyngitis und Bronchitis chronica (Smith), Lungenphthise (Parola, Rossi), Gonorrhoe, profusen Eiterungen, Spermatorrhoe (Robert), Trichinose (Rohde), erfrorenen Nasen (Riedinger) u. a. m. kann füglich übergangen werden.

Innerlich wird das Mutterkorn als wehenbeförderndes Mittel und bei Metrorrhagien zu 0,5—1,0 in Intervallen von 10—15 Min. gegeben, bis der gewünschte Effect erreicht wird, während man bei andern Krankheiten 0,3—1,0 2—3mal täglich benutzt. Die gewöhnlichste Anwendungsform ist die der Pulver (in charta cerata).

Verwerflich ist die früher übliche Schüttelmixtur, wenig gebräuchlich und nur für chronische Fälle geeignet die Pillenform. Flüssige wässrige Auszüge, welche von Einzelnen bevorzugt werden und in der That, da die wirksamen Bestandtheile vom Wasser aufgenommen werden, erfolgreich anzuwenden sind, lässt man durch Infusion oder Abkochung von 2,0—5,0 auf 100,0 Colatur bereiten. Häufig verbindet man in praxi ziemlich überflüssiger Weise das Mutterkorn mit andern Ecbolica, die ihm wie Borax und Zimmt entschieden an Wirksamkeit nachstehen; auch als Stypticum wird S. e. mit Bleizucker, Digitalis u. a. gern verbunden.

Ausserlich kann man Mutterkorn bei Blutungen als Streupulver oder (bei Metrorrhagie) in Aufguss als Injection anwenden. Auch hat man ein Infusum Secalis cornuti (3,0—8,0 auf 100,0 Colatur) als Klystier, um Wehen hervorzurufen, applicirt.



**Präparate:**

**Extractum Secalis cornuti, Mutterkornextract.** Das jetzt officinelle Präparat wird erhalten, indem 10 Th. Mutterkorn mit 20 Th. Wasser 6 Std. macerirt und der nach dem Abpressen bleibende Rückstand nochmals in gleicher Weise behandelt wird, die so erhaltenen Flüssigkeiten gemischt, colirt und bis auf 5 Th. eingedampft werden, der concentrirte Aufguss mit 5 Th. Weingeist gemischt und nach dreitägigem Stehen filtrirt und zu einem dicken Extracte eingedampft wird, worauf letzteres mit dem gleichen Gewichte Weingeist angerührt, die nach kurzem Stehen über dem Extracte befindliche Flüssigkeit abgossen, der Rückstand nochmals in gleicher Weise mit Weingeist behandelt und zu einem dicken Extracte eingedampft wird. Das rothbraune, in Wasser klar lösliche Extract ersetzt nach den in Berliner klinischen Anstalten angestellten Versuchen das Ergotin von Bonjean, *Extrait hémostatique de Bonjean*, welches als blutstillendes Mittel besonderen Ruf geniesst und eben so viel wie das Mutterkorn selbst in Anwendung gezogen wird. Es schmeckt widerlich bitter und riecht nach gebratenem Fleische. Man giebt dasselbe innerlich zu 0,1–0,6 3–4mal täglich in Pillen oder Solution; die in Frankreich hie und da empfohlenen Dosen von 1,0–2,0 dürften kaum zulässig erscheinen. Man verordnet es innerlich namentlich als blutstillendes Mittel bei Hämorrhagien des Tractus und entfernter Organe. Die Ansicht, dass das Ppt. nur die heilkräftigen, nicht die giftigen Bestandtheile des Mutterkorns in sich schliesse, ist selbstverständlich unrichtig und daher Vorsicht geboten. Auch äusserlich ist es als Hämostaticum viel gerühmt und zwar sowohl bei Flächenblutungen, selbst bei blutenden Arterien, als bei Metrorrhagien und Darmblutungen, wo man es in den dem jedesmaligen Zwecke entsprechenden Formen von Umschlägen, Einspritzungen und Klystieren in wässriger Solution (1:3–10) verordnet. Man verbindet es zur Stillung äusserer Blutungen mit andern Hämostatica, z. B. Eisenchlorid (Bonjean), und applicirt es bei äusseren Blutungen auf Charpie, welche man stets aufs Neue damit benetzt und mit Heftpflasterstreifen befestigt. Hannon rühmt als bestes Hämostaticum eine zur Extractdicke eingedampfte Abkochung von  $\text{aa}$  3 Th. Mutterkornextract und Alaun und 1 Th. Benzoëssäure mit 15 Th. Wasser. In neuerer Zeit wird dasselbe, besonders in der Gynäkologie, sehr häufig zu subcutaner Injection benutzt, wozu man entweder einfache wässrige Lösung (1:2) oder glycerinhaltige (1: $\text{aa}$  2 Wasser und Glycerin) verwendet. Die dem Ergotin zugeschriebene irritirende Wirkung auf die Einstichsstelle ist nicht so bedeutend, wie man gewöhnlich annimmt, wenn die Einspritzungsflüssigkeit tief genug eingebracht wird (Hildebrand). Man injicirt gewöhnlich  $\frac{1}{4}$ –1 Spritze voll. Viel gebraucht zu Subcutaninjectionen ist das fast ausschliesslich die Sclerotinsäure enthaltene, durch Dialyse gereinigte Extract von Wernich (*Extractum Secalis cornuti bis purificatum*), auch das von Eulenburg empfohlene *Ergotinum liquidum* von Bombelon.

Nicht mehr officinell ist die in Frankreich als *Liqueur obstétricale de Debouze* zu 10–20–30 Tr. alle 10–15 Min. oder bei Blutungen in 2–4 stündlichen Pausen in der Geburtshilfe gebrauchte, mit Spir. dil. bereitete *Mutterkorntinctur*, *Tinctura Secalis cornuti*. Das als *Oleum Ergotae* bezeichnete ätherische Extract des Mutterkorns wurde in früherer Zeit ebenfalls als wehentreibendes Mittel benutzt, ist aber jetzt völlig ausser Cours.

Die von Holst in der Geburtshilfe und Gynäkologie an Stelle des Mutterkorns und Mutterkornextracts empfohlene Sclerotinsäure hat sich in der Münchener und Greifswalder Klinik als blutstillendes Mittel bei Menorrhagie und Metrorrhagie, initialen Lungenblutungen, Blutungen der Intestina, Nieren und Blase in hohem Grade bewährt. Man applicirt dieselbe subcutan in wässriger Lösung von 1:5–10 in Dosen von 0,05–0,2, nöthigenfalls mehrmals wiederholt. Oertlich wirkt Sclerotinsäure weniger ungünstig als die meisten Mutterkornextracte. Die Lösung muss stets frisch bereitet werden, da sie schon in 24 Std. unbrauchbar wird und nach einigen Tagen vollständig verschimmelt. Kobert und Ganguillet erklären andere Mutterkornpräparate für wirksamer.

**Anhang.** Als ein wie Mutterkorn wirkendes Mittel werden neuerdings in Amerika die starkaromatischen Blätter von *Verbena urticifolia* empfohlen, welche

man in 4—6 halbstündigen Gaben von 8,0 als Echolicum und Hämostaticum darreicht. Als uterines Tonicum bei Leukorrhoe, Amenorrhoe und Dysmenorrhoe wird von amerikanischen Aerzten das Rhizom von *Chamaelirium luteum* Gray (*Veratrum luteum* L.) bezeichnet. Ein darin enthaltenes Glykosid, Chamaelirin, scheint wie Saponin zu wirken (Greene).

## Verordnungen:

- |   |   |
|---|---|
| <p>1) R<br/> <i>Secalis cornuti recenter pulverati</i><br/> <span style="float: right;">0,5</span><br/> <i>Pulv. Cinnamomi Cassiae</i><br/> <i>Sacchari albi aa</i> 2,5<br/> <i>M. f. pulv. Disp. tales doses No. 4. D.</i><br/> <i>in charta cerata. S. Alle 10 Minuten</i><br/> ein Pulver. (Bei Wehenschwäche.)</p> <hr/> <p>2) R<br/> <i>Secalis cornuti recenter pulverati</i><br/> <i>Boracis aa</i> 0,6<br/> <i>M. f. pulv. D. tales doses No. 4 in</i><br/> <i>charta cerata. D. S. Alle 10 Minuten</i><br/> ein Pulver.</p> <hr/> <p>3) R<br/> <i>Secalis cornuti</i> 4,0<br/> <i>Rad. Ipecacuanhae</i> 0,2<br/> <i>Infunde c.</i><br/> <i>Aq. ferv. q. s. ad colaturam</i> 150,0<br/> <i>Tinct. Opii simpl. gtt.</i> 20<br/> <i>Acidi phosphorici</i> 2,0<br/> <i>Syrupi Cinnamomi</i> 25,0<br/> <i>M. D. S. 1/2—1 stündl. 1 Esslöffel. (Bei</i><br/> <i>Metrorrhagie. Schöller.)</i></p> | <p>4) R<br/> <i>Extracti Secalis cornuti</i> 1,0<br/> <i>Aq. destillat.</i> 100,0<br/> <i>Syrupi Aurantii florum</i> 25,0<br/> <i>M. D. S. Stündlich einen Esslöffel voll.</i><br/> <i>(Bei Metrorrhagie und andern Blu-</i><br/> <i>tungen. Bonjean.)</i></p> <hr/> <p>5) R<br/> <i>Extracti Secalis cornuti</i> 2,5<br/> <i>Glycerini</i> 10,0<br/> <i>Aq. dest. aa</i> 7,5<br/> <i>M. D. S. Zur Subcutaninjection.</i></p> <hr/> <p>6) R<br/> <i>Extracti Secalis cornuti</i><br/> <i>Acidi tannici</i> 1,0<br/> <i>Extr. Opii</i> 2,0<br/> <i>Succi Liquir. dep. q. s.</i><br/> <i>ut f. pilul. No. 20. Consp. Magnesia.</i><br/> <i>D. S. 2—3 stündl. 1 Pille. (Bei Hä-</i><br/> <i>moptysis. Lebert.)</i></p> |
|---|---|

## 3. Ordnung. Galactagoga, milchvermehrnde Mittel.

**Fructus Foeniculi, Semina Foeniculi; Fenchel. Oleum Foeniculi;**  
**Fenchelöl.**

Die *Fructus Foeniculi* stammen von *Foeniculum capillaceum* s. *vulgare* Gaertn. (*Anethum Foeniculum* L.), einer im südlichen Europa, vorzüglich in Italien und Griechenland wildwachsenden, gelbblühenden Umbellifere, welche in verschiedenen Gegenden Deutschlands angebaut wird und zwei- bis mehrjährig ist. Es ist eine cylindrische, etwa 8 Mm. lange und 3 Mm. dicke, mit den Resten der Griffelbasis gekrönte Zwillingssfrucht, welche sich leicht in die beiden Theilfrüchte trennen lässt, die in der getrockneten Waare meist isolirt vorkommen. Letztere sind graubraun oder grünlichbraun und an der äusseren Fläche von fünf stark hervortretenden, grünlichgelben, längsstreifigen Rippen durchzogen, an der Berührungs-

fläche dagegen glatt. In jedem Thälchen ist ein Oelgang deutlich, ebenso finden sich zwei auf der Berührungsfläche.

Der sog. Römische oder Kretische Fenchel, *Fructus Foeniculi Romani* s. *Cretici*, von der einjährigen *Foeniculum dulce* DC. stammend, ist grösser und stärker gekrümmt, heller grün und bietet die Oelstriemen minder deutlich, der Geschmack ist süsser und feiner.

Der aromatische Geruch und Geschmack des Fenchels wird durch seinen Gehalt an ätherischem Oele, dem Fenchelöl, *Oleum Foeniculi*, bedingt, das sich im Deutschen Fenchel etwa zu 3 bis 4 %, im Römischen in geringerer Menge, aber von feinerer Qualität findet.

Das Fenchelöl ist farblos oder gelblich, etwas dickflüssig, von 0,90–1,0 spec. Gew., in seinen Eigenschaften dem Anisöl am ähnlichsten. Es ist wie dieses im Wesentlichen ein Gemenge von festem und flüssigem Anethol, neben welchem noch ein bei 185–290° siedender, dem Terpenthinöl isomerer Kohlenwasserstoff sich findet.

Das Fenchelöl kann zu 30,0 Kaninchen in 30 Stunden tödten und scheint bei Vergiftungen nicht in den Urin überzugehen (C. G. Mitscherlich). Die Dämpfe erzeugen Thränenfluss, Husten und bisweilen Ptyalismus (Magnan).

Der Fenchel bildet eins der geschätztesten Galactagoga, welches ausserdem auch in der Kinderpraxis als Carminativum und Expectorans ungemein häufig in Anwendung gezogen wird.

In wie weit es in beiden Beziehungen anderen Aethereo-oleosa vorzuziehen ist, steht dahin, indessen hat der Usus die Benutzung geheiligt. Die Milchsecretionsbefördernde Wirkung ist neuerdings viel in Abrede gestellt, jedoch durch die Untersuchungen von Bontemps, wonach schwache Aufgüsse von Fenchelthee bei Stillenden in der That eine Vermehrung der Milchsecretion erzeugten, während starke Aufgüsse Eintreten der Katamenien und Sistiren der Milchabsonderung zur Folge hatten, eine Beziehung zu den Brustdrüsen wahrscheinlich gemacht. Als Expectorans und Carminativum wurde Fenchel bereits von Avicenna empfohlen. Im Alterthume war übrigens die ganze Pflanze gebräuchlich, deren Geruch von dem des Samens nicht unerheblich abweicht und welche man z. B. gegen Ikterus in Anwendung zog. Eine besondere Wirksamkeit schrieb der Arzneiglaube älterer Zeiten dem Fenchel bei Augenaffectationen zu, wobei man ihn sogar gegen Amblyopie und Amaurose verwendete. Man giebt die *Fructus Foeniculi* innerlich zu 0,5–2,0 mehrmals täglich in Pulver, Electuarien oder Aufgüssen (1:10–20). Als Galactagogum verwendet man ihn meist in Form von Species (2–3 Theelöffel auf 2 Tassen), oder in Form älterer pulverförmiger Gemische, wie des sog. *Pulvis Foeniculi compositus* s. *Pulvis galactopoeus Rosensteinii*, welches aus aa 1 Th. Fenchel und Pomeranzenschale, 4 Th. *Magnesia carbonica* und 2 Th. Zucker besteht. Nicht selten wird der Fenchel auch als Geschmacks corrigens für Species, weniger als Conspergens für Pillen benutzt.

Das *Oleum Foeniculi* giebt man zu 1–4 Tropfen als Oelzucker.

### Präparat:

**Aqua Foeniculi; Fenchelwasser.** Destillat von 1:30, etwas trübe. Das Fenchelwasser ist eins der gebräuchlichsten aromatischen Wässer, welches theils für sich als Carminativum in der Kinderpraxis theelöffelweise, theils als Vehikel für intern anzuwendende Medicamente und für adstringirende Mittel bei Augenaffectationen in Anwendung kommt. Eine Lösung von Zinkvitriol in Fenchelwasser bildet die sog. Rommershausensche Augenessenz, welche als Geheimmittel sowohl bei chronischen Bindehautkatarrhen als bei Augenschwäche in Ruf steht.



Nicht mehr officinell ist der Fenchelsyrup, *Syrupus Foeniculi*, durch Lösen von 18 Th. Zucker in 10 Th. wässrigen Fenchelaufgusses (1:6) bereitet und als Zusatz expectorirender und carminativer Mixturen benutzt. In älterer Zeit war auch ein spirituöser Auszug des Fenchels mit  $\frac{1}{24}$  Fenchelöl als *Tinctura Foeniculi composita* officinell, welche mit 15 Th. Rosenwasser die *Aqua ophthalmica foeniculata* bildet.

**Anhang.** Sonstige *Galactagoga*. — In ähnlicher Weise wie Fenchel steht auch der nahe verwandte Dill, *Fructus Anethi*, von *Anethum graveolens* L. (bei uns als Gewürz beim Einmachen der Gurken, in England zur Bereitung einer *Aqua Anethi* dienend und als *Carminativum* geschätzt), in Ruf als *Galactagogum*; ebenso das Kraut einer anderen Umbellifere, die als Küchengewächs dient, des Körbels, *Scandix Cerefolium* L. s. *Anthriscus Cerefolium* Hofm. (früher als *Herba Cerefolii* officinell). Fenchel, Dill und Körbel bildeten die sog. *Species ad decoctum galactopoeum* Bergii. Als die Milchsecretion befördernd gelten auch die wohl ausschliesslich in der Veterinärpraxis verwendeten *Semina Nigellae*, die Samen der in Thüringen cultivirten südeuropäischen *Ranunculacee* *Nigella sativa* L., welche mehrere pharmacologisch noch nicht untersuchte Körper (*Nigellin*, *Melanthin*) enthält. Dringend empfohlen sind auch die Blätter der zur Familie der *Papilionaceen* gehörenden Geisraute, *Galega officinalis* L. (*Gillet-Damette*, *Bourgeois* u. A.). Nach *Gaucheron* geben mit *Galega* gefütterte Kühe in 24 Stunden 30% Milch mehr als bei gewöhnlicher Nahrung und soll das Kraut als Salat oder in einem versüssten Aufgusse genossen bei Stillenden, welche an Erschöpfung leiden, das Versiegen der Milch verhindern. Nach *Oettinger* soll das Mittel auch die Milch verbessern, so dass die Säuglinge in wenigen Stunden sich besser befinden und ruhiger werden wie zuvor.

---

## Nachträge.

---

**Hydrargyrum formamidatum.** — An die von v. Mering (S. 779) empfohlenen Verbindungen (Alaninquecksilber, Glycokollquecksilber) reiht sich auch das Quecksilberformamidat, *Hydrargyrum formamidatum*, welches neuerdings Liebreich zur Subcutanapplication an Stelle des Sublimats verwendet hat und von dem er besondere Effecte wegen des Freiwerdens von Hg im Körper hofft. Ausgedehnte Erfahrungen liegen darüber bis jetzt nicht vor. Liebreich glaubt, dass die zur Heilung der Syphilis nothwendige Menge geringer als bei andern Quecksilberpräparaten sei.

**Kairinum.** — Von der Voraussetzung ausgehend, dass im Chinin nicht Chinolin, sondern ein hydrirter Chinolinkern enthalten sei, von welchem sich die antitypische und antipyretische Wirkung desselben ableite, haben Fischer und Koenigs aus dem hydrirten Chinolin synthetisch mehrere Derivate dargestellt, von denen nach Versuchen von Filehne (1882) diejenigen sich als antipyretisch erwiesen, deren Stickstoffatom mit dem Kohlenstoff einer Methylgruppe oder eines andern Alkoholradicals verbunden ist. Unter diesen ist das Oxychinolin-aethylhydrin oder Kairin,  $C^{10}H^{13}NO$ , als leicht lösliches, salzig bitter und aromatisch schmeckendes Salz, zu 1,0—1,5, welche Nebenerscheinungen nicht hervorrufen, 2stündlich bei Fieberkranken mit Erfolg benutzt. Die Dauer der antipyretischen Wirkung scheint sich ähnlich wie bei Resorcin und Hydrochinon zu verhalten.

**Tonga.** — Mit diesem Namen ist eine von den Fidji-Inseln eingeführte Droge, ein Gemenge verschiedener Pflanzentheile, besonders Angehöriger aus der Familie der Aroideen, bezeichnet, welche Ringer und Murrell in Form eines Fluidextracts zu 8,0—15,0 halb bis zweistündlich (ohne Nebenerscheinungen) bei Neuralgien mit Erfolg verwendet haben. Die Zugehörigkeit des Mittels, dessen Werth von Korczynski bestritten wurde, zu einer bestimmten Classe von Medicamenten ist bis jetzt nicht festgestellt.

---

## Gesamtregister.

- |                            |                          |                           |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Abführmaccaronen 631.      | Acidum carbolicum 281.   | Acidum santonicum 206.    |
| Abiëtnsäure 544.           | — carbonicum 1001.       | — sclerotinicum 1193.     |
| Abkochung 180.             | — chloro-aceticum 448.   | 1204.                     |
| Absinth 660.               | — chloro-nitricum 436.   | — scytodepsicum 499.      |
| Absorbentia 38. 41.        | — chromicum 437.         | — succinicum 972.         |
| Absud 176.                 | — chrysophanicum impu-   | — sulfuricum 426.         |
| Acacin 327.                | rum 556.                 | — — Anglicum 426.         |
| Acajounüsse 530.           | — cinnamomicum 321.      | — — dilutum 431.          |
| Acetal 1079.               | — citricum 873.          | — — fumans 427.           |
| Aceta medicata 13.         | — composit. Reitzii 435. | — — Nordhusianum 427.     |
| Acetine 447.               | — fluoricum 441.         | — — solidificatum 431.    |
| Aceton 987.                | — formicum 527.          | — sulfurosum 255.         |
| Acetum 443.                | — gallicum 505.          | — tannicum 499.           |
| — aromaticum 320.          | — gallotannicum 499.     | — tartaricum 872.         |
| — camphoratum 948.         | — hydrobromicum 1111.    | — thymicum 305.           |
| — cantharidale 525.        | — hydrochloricum 667.    | — valerianicum 950.       |
| — Colchici 844.            | — — dilutum 671.         | — zooticum 1117.          |
| — Digitalis 900.           | — hydrocyanicum 1117.    | Acologia 1.               |
| — glaciale 443.            | — hydroiodicum 802.      | Aconitin 1136. 1140.      |
| — Lithargyri 485.          | — lacticum 441.          | Aconitum Napellus u. a.   |
| — Opii 1054.               | — malicum 872.           | Species 1135. 1136.       |
| — Plumbi 485.              | — metatartaricum 873.    | Acorus Calamus 657.       |
| — pyrolignosum 279.        | — muriaticum 667.        | Acrolein 355.             |
| — quatuor latronum 319.    | — nitrico-hydrochloratum | Adansonia digitata 868.   |
| — radicale 443.            | 436.                     | Adeps benzoatus 367.      |
| — Rosae 412.               | — nitricum 433.          | — suillus 367.            |
| — Rubi Idaei 876.          | — — dilutum 436.         | Adjuvans 122.             |
| — saturninum 485.          | — — fumans 433.          | Adonis vernalis 1172.     |
| — scilliticum 1170.        | — — solidefactum 435.    | Adspergo 133.             |
| Achaenium 6.               | — nitroso-nitricum 433.  | Adstringentia 485.        |
| Achillea Millefolium 661.  | — oleinicum 364.         | Aepfel 876.               |
| Achilleum lacinulatum 419. | — oxalicum 877.          | Aepfelsäure 872.          |
| Acida caustica 426.        | — phenicum 281.          | Aepfelwein 975.           |
| Acidum aceticum 443.       | — phenylicum 281.        | Aerugo 482.               |
| — — aromaticum 320.        | — phosphoricum 878.      | Aesculin 870.             |
| — arsenicosum 805.         | — picronitricum 210.     | Aesculus Hippocastanum    |
| — benzoicum 316.           | — pyrogallicum 557.      | 509.                      |
| — boracicum 270.           | — pyrolignosum 279.      | Aether 1009.              |
| — boricum 270.             | — pyroxylicum 279.       | — aceticus 1016.          |
| — Borussicum 1117.         | — pyrotartaricum 873.    | — alcoholicus 1015.       |
| — camphoricum 942. 948.    | — salicylicum 307.       | — amylicus nitrosus 1142. |
| — carbazoticum 210.        | — salis culinaris 668.   | — anaestheticus 1032.     |



Aether cantharidale 525.  
 — chloratus alcoholicus 1030.  
 — hydrocyanicus 1119.  
 — lignosus 987.  
 Aetherschweifelsäuren 35.  
 Aether sulfuricus 1009.  
 — vegetabilis 1016.  
 Aetherweingeist 1015.  
 Aether, zusammenge-  
 setzte 1010.  
 Aethidenchlorid 1031.  
 Aethiops 759.  
 — antimonialis 779.  
 — martialis 706.  
 — mineralis 779.  
 — vegetabilis 804.  
 Aethusa Cynapium 904.  
 Aethylaether 1009.  
 Aethylalkohol 973.  
 Aethylbromid 1030.  
 Aethylchlorid 1030.  
 Aethylenum chloratum 1031.  
 Aethylglykolalkohol 1032.  
 Aethylidenchlorid 1031.  
 Aethylidendiaethylaether 1079.  
 Aethyljodid 1030.  
 Aethylkalium 453.  
 Aethylnatrium 453.  
 Aethylnitrat 1017. 1145.  
 Aethylnitrit 1145.  
 Aethylschwefelsäure 1010.  
 Aethylsublimat 779.  
 Aetzammoniakflüssigkeit 988.  
 Aetzflüssigkeit 481.  
 Aetzgold 459.  
 Aetzkali 448.  
 Aetzkalk 453.  
 Aetznatron 453.  
 Aetzpaste, Wiener 452.  
 Aetzstein 448.  
 Aetzstifte 151.  
 Aetzsublimat 769.  
 Agar-agar 336.  
 Agaricus albus 1166.  
 Agaricus chirurgorum 420.  
 Alabaster 384.  
 Alaninquecksilber 779.  
 Alantwurz 341.  
 Alaun 495.  
 Albedo corticis Aurantii 656.  
 Album ceti 373.  
 Albumen iodatum 804.  
 — ovi 729.  
 Albuminate 8.  
 Alcohol amylicus 987.  
 Alcoholetum 12.

Alcohol sulfuris 1009.  
 — vini 973.  
 Alcolen 389.  
 Aldehyd 977.  
 Alembrothsaltz 772.  
 Alexipharmacon 241.  
 Algarothpulver 460.  
 Aliberts Krätzsälbe 230.  
 Alisma Plantago 841.  
 Alizarin 403.  
 Alkali minerale depura-  
 tum 681.  
 — volatile 994.  
 Alkalisch-salin. Quellen 610.  
 Alkaloide 7.  
 Alkanna 403.  
 Alkohol 973.  
 Alkohole, einsäurige 20.  
 Alkylbasen 21.  
 Alkylhaloide 1010.  
 Allium 538.  
 Alloxan 405.  
 Allylalkohol 987.  
 Aloë 624.  
 Aloëpräparate 627. .  
 Aloin 625. 627.  
 Aloysia 417.  
 Althaea officinalis 332.  
 — rosea 333.  
 Altheesälbe 547.  
 Alterantia 64.  
 Altschädenwasser 765.  
 Alumen 495.  
 — draconisatum 498.  
 — kinosatum 498.  
 — plumosum 384.  
 — ustum 495.  
 Alumina hydrata 498.  
 Aluminiumacetatlösung 271.  
 Aluminium chloratum 272.  
 — sulfuricum 271.  
 Amandes princesses 359.  
 Amanita muscaria 1160.  
 Amara 51. 645.  
 — adstringentia 645.  
 — aromatica 645.  
 — resolventia 645.  
 Amberkraut 542.  
 Ambiotica 82.  
 Ambra 373. 418.  
 — flava 550.  
 Ameisensäure 527.  
 Ameisensäure-Aethylester 1016.  
 Ameisenspirit 527.  
 Ammoniak 988.  
 Ammoniakgas 988.  
 Ammoniakgummi 548.  
 Ammoniakpflaster 549.

Ammoniakschwefelleber 825.  
 Ammoniakweinstein 607.  
 Ammoniumacetatflüssig-  
 keit 1164.  
 Ammonium benzoicum 319.  
 — bicarbonicum 994.  
 Ammoniumbisulfuret 825.  
 Ammonium bromatum 1110.  
 Ammoniumcarbaminit 994.  
 Ammonium carbonicum 994.  
 — — pyro-oleosum 997.  
 — chloratum 1153.  
 — — ferratum 719.  
 Ammoniumflüssigkeit, anishaltige 993.  
 — bernsteinsäure 997.  
 Ammonium iodatum 802.  
 — muriaticum depuratum 1153.  
 — — martiatum 719.  
 — nitricum 886.  
 — phosphoricum 1182.  
 — salicylicum 315.  
 Ammoniumsulfid 256.  
 Ammonium valerianicum 997.  
 Ammoniumwismutcitrat 377.  
 Ampelodesmus tenax 1196.  
 Amygdalae amarae 1116.  
 — dulces 358.  
 — virides 366.  
 Amygdalin 1117.  
 Amykosaseptin 270.  
 Amylather 1010.  
 Amylalkohol 987.  
 Amylchlor 216.  
 Amylchlorid 1032.  
 Amylen 1032.  
 Amyliodid 1031.  
 Amylium nitrosum 1142.  
 Amylum 339.  
 — arrow 746.  
 — iodatum 804.  
 — Marantae 746.  
 — Solani 339.  
 — Tritici 339.  
 Amylwasserstoff 216.  
 Amyris balsamifera 412.  
 Anacardia 530.  
 Anacyclus 563.  
 Anaesthetica 77. 998.  
 Anagallis arvensis 841.  
 Analeptica 77.  
 Anaphrodisiaca 82.  
 Anatripsologie 113.

*Anchusa tinctoria* 403.  
*Andaöl* 598.  
*Andira Araroba* 555.  
*Andropogon* 411.  
*Anemoin* 839.  
*Anethum* 1207.  
*Angelicasäure* 961.  
*Angelicawurzel* 961.  
*Angelim amargoso* 556.  
*Angraecum fragrans* 410.  
*Angusturarinde* 659.  
 — falsche 659. 913.  
*Anhydride* 22.  
*Anidrotica* 1165.  
*Anilin* 1116.  
*Anima hepatis* 616.  
 — Rhei 617.  
*Anime* 549.  
*Anis* 1148.  
*Anisum stellatum* 1149.  
*Anodynum* 1029.  
*Antacida* 38.  
*Antagonismus* 122.  
*Antarthritic powder* 646.  
*Antemetica* 57.  
*Anthelminthica* 37. 196.  
*Anthoxanthum odoratum* 410.  
*Anthraces* 277.  
*Anthrakokali* 277.  
*Antjar* 910.  
*Antiblennorrhagica* 1184.  
*Antidéperditeurs* 63.  
*Antidota* 37. 238.  
*Antidot der Blausäure*  
 von T. u. H. Smith 247.  
*Antidote multiple à l'hydrate ferrique* von Jean-  
 nel 246.  
 — — au sulfure de fer  
 247.  
*Antidoten-Tabelle* 242.  
*Antidot, galvanisches* 703.  
 — gegen Phosphor 248.  
*Antidotum Acidi hydro-*  
*cyanici* 247.  
 — *Arsenici* 244.  
 — universale 241.  
*Antidyscratica* 62. 748.  
*Antifermentativa* 39. 41.  
*Antigalactica* 96.  
*Antileprosa* 842.  
*Antilyssa* 871.  
*Antimon* 572.  
*Antimonbutter* 460.  
*Antimonial powder* 749.  
*Antimonium crudum* 348.  
 — *diaphoreticum* 572.  
 — *nigrum* 748.  
 — *oxydatum* 572.  
*Antimonsulfid* 1151.

*Antimontartrat* 577.  
*Antimonykaliumtartrat*  
 572.  
*Antiparasitica* 37. 196.  
*Antiperiodica* 66.  
*Antiplastica* 61.  
*Antiphlogistica* 68.  
*Antiputrida* 39.  
*Antipyretica* 65. 846.  
*Antirheumatica vegeta-*  
*bilia* 845.  
*Antiseptica* 39. 249.  
*Antiseptic treatment von*  
*Lister* 291.  
*Antiseptisches Catgut* 297.  
*Antiseptische Seide* 297.  
*Antispasmodica* 77.  
*Antitetanica* 77.  
*Antitypica* 66.  
*Antizymotica* 39.  
*Apfelsinenschalenöl* 414.  
*Aphrodisiaca* 82.  
*Apiol* 1176.  
*Apocynum cannabinum*  
 1172.  
*Apomorphium hydrochlo-*  
*ricum* 589.  
*Apotheken* 3.  
*Apozema purgans* 621. 622.  
*Aqua* 827.  
 — *acidula* 1001.  
 — *ad vermes* 761.  
 — *albuminata* 730.  
 — *Ammonii carbonici* 994.  
 — *Amygdalarum amara-*  
*rum* 1118.  
 — — *diluta* 1120.  
 — *Anhaltina* 539.  
 — *antihysterica Pragens.*  
 967.  
 — *apoplectica* 561.  
 — *aromatica* 12. 561.  
 — *arquebusade* 432.  
 — *Asae foetidae compo-*  
*sita* 964.  
 — *Batanea* 476.  
 — *benedicta Rulandi* 582.  
 — *Binelli* 304.  
 — *Calcariae* 696.  
 — *carbolisata* 297.  
 — *carbonica* 1005.  
 — — *febrifuga* 861.  
 — *Carmelitorum* 417.  
 — *carminativa* 957.  
 — *cephalica* 561.  
 — *Cerasorum amygdala-*  
*ta* 1120.  
 — — *nigrorum* 1119.  
 — *chalybeata cum Ferro*  
*citrice* 711.  
 — *Chamomillae* 957.

*Aqua Chlorig* 259.  
 — *Cinnamomi simplex*  
 571.  
 — — *spirituosa* 571.  
 — *coelestis* 481.  
 — *Coloniensis* 416.  
 — *communis* 828.  
 — *crystallina* 605.  
 — *destillata* 828.  
*Aquae aromaticae s. de-*  
*stillatae* 12.  
*Aqua embryonum* 561.  
 — *florum Aurantii* 413.  
 — — *Naphae* 413.  
 — *Foeniculi* 1206.  
 — *foetida antihysterica*  
 964.  
 — — *Pragensis* 964.  
 — *fontana* 828.  
 — *fortis* 433.  
 — *gazosa* 1001.  
 — *Goulardi* 486.  
 — *hepatica* 825.  
 — *hydrosulfurata* 825.  
 — *hydrothionica* 825.  
 — *Kreosoti* 305.  
 — *Laurocerasi* 1119.  
 — *laxativa Viennensis*  
 621.  
 — *Luciae* 990.  
 — *magnesiata* 600.  
 — *Melissae* 417.  
 — *Menthae crispae* 959.  
 — — *piperitae* 958.  
 — — — *spirituosa* 959.  
 — *mercurialis nigra* 777.  
 — — *simplex* 761.  
 — *nigra* 777.  
 — *ophthalmica foenicu-*  
*lata* 1206.  
 — *Opii* 1054.  
 — *orientalis* 773.  
 — *oxymuriatica* 259.  
 — *ozonisata* 254.  
 — *Persicae* 1119.  
 — *Petroselini* 1176.  
 — *phagedaenica* 765.  
 — — *decolor* 772.  
 — — *nigra* 777.  
 — *Picis* 553.  
 — *Plumbi* 486.  
 — — *Goulardi* 486.  
 — *Pruni Padi* 1119.  
 — *Rabelii* 432.  
 — *regia* 436.  
 — *reginae Hungariae* 539.  
 — *Rosae* 411.  
 — *Rubi Idaei* 876.  
 — *Salviae* 561.  
 — *Sambuci* 1158.  
 — *saphirina* 481.

- Aqua saturnina 486.  
 — scolopetaria 432. 539.  
 — Selterana artificialis 1005.  
 — — iodata 798.  
 — Sodae 688.  
 — stibiata 581.  
 Aquathee 968.  
 Aqua Tiliae 1159.  
 — Valerianae 952.  
 — vegeto-mineralis Goulardi 486.  
 — vulneraria 432.  
 — — acida 432.  
 — — spiritiosa 539.  
 — — vinosa 539.  
 Arabin 327.  
 Arachis hypogaea 366.  
 Araroba 556.  
 Arbrol-a-Brea Harz 547.  
 Arbutin 509.  
 Arcanum duplicatum 612.  
 Arenaria rubra 1183.  
 Argentum chloratum 473.  
 — — ammoniatum 473.  
 — cyanatum 473.  
 — foliatum 396.  
 — iodatum 473.  
 — natrico-sulfurosum 473.  
 — nitricum 460.  
 — — cum Kalio nitrico 472.  
 — oxydatum 472.  
 — sulfuricum 473.  
 Argilla 381.  
 — hydrica 498.  
 Aristolochia 845.  
 Armoracia rusticana 538.  
 Arillus Myristicae 567.  
 Arion empiricorum 727.  
 Arnica blüthen 953.  
 Arquebusade, weisse 539.  
 Arrow root 746.  
 Arsenicum album 805.  
 — chloratum 818.  
 — citrinum 818.  
 — iodatum 818.  
 — sulfuratum 818.  
 Arsenigsäureanhydrid 805.  
 Arsensäure 807.  
 Arsenwasserstoff 812.  
 Arvenhüße 366.  
 Arzneimittel 2.  
 Asa dulcis 406.  
 — foetida 962.  
 Asbest 384.  
 Asclepiadin 589.  
 Asclepias gigantea 841.  
 Aseptin 270.  
 Asperula odorata 410.  
 Asparagin 332.  
 Asparagiquecksilber 779.  
 Aspidium 203. 206.  
 Aspidosperma Quebracho 1134.  
 Assacu 529.  
 Atmopathic baths 188.  
 Atropinum sulfuricum 1079.  
 — valerianicum 1080.  
 Aufgüsse 176.  
 Augenessenz, Rommershausensche 1206.  
 Augenstein 473. 481.  
 Aurantia immatura 655.  
 Auripigmentum 818.  
 Auro-Natrium chloratum 780.  
 Aurum chloratum 459.  
 — — natronatum 780.  
 — foliatum 396.  
 Austernschalen, präparirt. 400.  
 Autenrieths Reizsalbe 581.  
 — scharfe Salbe 526.  
 Avena excorticata 743.  
 Avignonkörner 624.  
 Avornin 622.  
 Awa 534.  
 Axungia medullae bovis 368.  
 — oxygenata 436.  
 — pedum Tauri 740.  
 — porci 367.  
 Azulen 660. 956.  
 Baccae Berberidum 876.  
 — Coccognidii 529.  
 — Cubebae 1185.  
 — Juniperi 1174.  
 — Lauri 568.  
 — Mori 876.  
 — Myrtilli 516.  
 — Oxyccoccos 876.  
 — Rhamni catharticae 623.  
 — Rubi fruticosi 876.  
 — Sorbi 876.  
 — spiniae cervinae 623.  
 Bacilli 138.  
 — caustici 151.  
 — e Zinco chlorato 458.  
 Badeschwämme 419.  
 Bärlappsamen 375.  
 Bärentraubenblätter 509.  
 Balata 387.  
 Baldrianöl 950.  
 Baldriansäure 950.  
 Baldrianwurzel 949.  
 Balneum 184.  
 Balsama solidificata 153.  
 Balsame 11.  
 Balsamica 69.  
 Balsam, Jerusalemer 407.  
 Balsamum adstringens 940.  
 — Arcae 547.  
 — Canadense 543.  
 — Capivi 1188.  
 — Carpathicum 543.  
 — commendatoris 407.  
 — Copaivae 1188.  
 — Dipterocarpi 1192.  
 — embryonum 561.  
 — Filicis 205.  
 — Genofevae 545.  
 — Gurjunae 1192.  
 — Hardwickiae 1192.  
 — Hungaricum 543.  
 — Indicum nigrum 218.  
 — iodatum 797.  
 — Italicum 545.  
 — Lithavicum 555.  
 — Locatelli 545.  
 — mercuriale 777.  
 — moschatum 370.  
 — Myristicae 370.  
 — Nucistae 369.  
 — ophthalmicum rubrum 765.  
 — Parisiense 1191.  
 — Persicum 407.  
 — Peruvianum 218.  
 — Sulfuris compositum 232.  
 — terebinthinatum 232.  
 — — Frahmii 547.  
 — Tolutanum 408.  
 — traumaticum 407.  
 — universale 948.  
 — vitae externum 940.  
 — — Hoffmanni 220.  
 — — Rulandi 232.  
 — vulnerarium 545.  
 Bandaseife 370.  
 Bandoline 336.  
 Baptisia tinctoria 633.  
 Barbaloin 625.  
 Barégine 825.  
 Barezsche Brustpastillen 1153.  
 Barium chloratum 805.  
 — iodatum 805.  
 Baros-Campher 941.  
 Barosma 1177.  
 Baryta muriatica 805.  
 Bassorin 330.  
 Baumöl 240. 363.  
 Baumwachs 547.  
 Baumwolle, gereinigte 388.  
 — iodirt 795.  
 Baumwollwurzel 1194.



- Bdelium 561.  
 Bebeerin 868.  
 Bechica 89.  
 Beef-tea 726.  
 Behenöl 367.  
 Beifusswurzel 953.  
 Belladonnablätter 1079.  
 Belladonnapräparate 1093.  
 Bellocsche Kohle 276.  
 Benzaldehyd 1118.  
 Benzarsinsäure 812.  
 Benzinum 211.  
 — Petrolei 213.  
 Benzoë 406.  
 Benzoëssäure 34. 316.  
 Benzoëtinctor 407.  
 Benzolum 211.  
 Berberin 18. 652. 876.  
 Berberitzen 876.  
 Bergamottöl 414.  
 Bergapten 414.  
 Berkeleys antiherpetic capsules 553.  
 Berlinerblau 722.  
 Bernstein 550.  
 Bernsteinöl, gereinigtes 972.  
 Bernsteinsäure 972.  
 Bertramwurzel 563.  
 Beruhigungssaft 1060.  
 Besenginster 1173.  
 Bestucheffs Nerventinctur 719.  
 Betanaphthol 555.  
 Betelnüsse 512.  
 Betelpfeffer 534.  
 Bevergersche Erde 383.  
 Bezetta rubra 402.  
 Bezoarsteine 241.  
 Bhang 1063.  
 Bibergeil 933.  
 Bibernellwurzel 1148.  
 Bicuibawachs 373.  
 Biene 371.  
 Bier 742.  
 Bierhefe 742. 1003.  
 Biliner Pastillen 689.  
 Bilis bovina 671.  
 Bilsenkraut 1096.  
 Bilsenöl 1099.  
 Bilsensamen 1096.  
 Bimstein 401.  
 Bisam 930.  
 Bischof 986.  
 Biscuits d'Olivier 768.  
 Bismutum lacticum 381.  
 — nitricum 381.  
 — subcarbonicum 381.  
 — subnitricum 376.  
 — tannicum 506.  
 — valerianicum 1114.  
 Bissen 141.  
 Bittera 650.  
 Bittermandelöl 1118.  
 Bittermandelwasser 1118.  
 Bittersalz 611.  
 Bittersüßstengel 837.  
 Bitterwasser 612.  
 Black draught 612. 621.  
 — drops 1054.  
 — wash 777.  
 Blairs gout pills 843.  
 Blancardsche Pillen 723.  
 Blanc de fard 383.  
 — de perles 377. 383.  
 Blankenheimer Thee 655.  
 Blasenpflaster 526.  
 Blatta 1174.  
 Blattgold 396.  
 Blattsilber 396.  
 Blandsche Pillen 709. 722.  
 Blauholz 515.  
 Blausäure 1117.  
 Bleiacetat 487.  
 Bleichflüssigkeit 266.  
 Bleichkalk 263.  
 Bleiessig 485.  
 Bleiglätte 392.  
 Bleioxyd, essigsäures neutrales 487.  
 Bleipflaster 146. 392.  
 Bleisalben 392. 487.  
 Bleisalze, verschied. 495.  
 Bleitannat 506.  
 Bleitriäthyl 492.  
 Bleiwasser 486.  
 Bleiweiss 393.  
 Blistering tissues 527.  
 Blue pills 761.  
 Blut 729.  
 Blutegel 421.  
 Blutkoralie 401.  
 Blutlaugensalz 247.  
 Blutreinigungstropfen 631.  
 Blutstein 707.  
 Blutwurzel 510. 840.  
 Bockshornsamensamen 744.  
 Boghead Kohle 277.  
 Bohnenmehl 744.  
 Bois de Rhodes des ébénistes 412.  
 Boletus ignarius vel chururorum 420.  
 Boletus laricis 1166.  
 Boli 141.  
 Bolus 381.  
 — rubra 381.  
 Bombyx 388.  
 Bonjeans Ergotin 1197.  
 Borax 1181.  
 — Weinstein 607.  
 Borneol 941.  
 Borsäure 270. 271.  
 Borysalicylat 315.  
 Botany Bay Gummi 210.  
 Bougies 150.  
 Bouillon fortifiante de Verdeuil 726.  
 Bouillontafeln 337.  
 Boules de Nancy 711.  
 Bourbonthee 410.  
 Bovist 421.  
 Branntwein 975.  
 Brasilienholz 515.  
 Braunstein 267.  
 Brauselimonadenpulver 688.  
 Brausemagnesia 603.  
 Brausepulver 133. 687.  
 — abführendes 607.  
 Brechmittel 55. 239. 572.  
 Brechnuss 913.  
 Brechwein 582.  
 Brechweinstein 572.  
 Brechwurz 582.  
 Brenzkatechin 55. 301.  
 Brönners Fleckwasser 214.  
 Brom 268.  
 Bromäethyl 1030.  
 Bromalhydrat 1079.  
 Bromammonium 1110.  
 Bromarseniklösung 818.  
 Brombeeren 876.  
 Brombenzoëssäure 1103.  
 Brombenzol 1103.  
 Bromessigsäure 1103.  
 Bromkalium 1101.  
 Bromoform 1030.  
 Bromüre der Metalle und Alkaloide 1110.  
 Bromum 268.  
 — chloratum 459.  
 Bromuretum potassicum 1101.  
 Bromus catharticus 18.  
 Bromwasserstoffsäure 1111.  
 Bruchpflaster 383.  
 Brucein 914.  
 Brustelixir 351.  
 Brustpastillen von Barez 1152.  
 Brustpulver 621.  
 Brustthee 333.  
 Brustzeltchen 351.  
 Buccoblätter 1177.  
 Bulbus 5.  
 — Allii sativi 538.  
 — Cepae 538.  
 — Colchici 842.  
 — Scillae 1167.  
 Burnetts disinfecting fluid 457.

- Buttersäureaether 980.  
 Butylchloral 1078.  
 Butyrum 368.  
 — Antimonii 460.  
 — Cacao 371.  
 — Nucistae 369.  
 Buxin 868.  
  
 Cacao 745.  
 Cachen-Laguen 647.  
 Cachou 351. 513.  
 — de Boulogne 351.  
 Cacumina Spartii 1173.  
 Cadmium bromatum 1111.  
 — iodatum 803.  
 — sulfuricum 476.  
 Caffeon 968.  
 Cailcedrin 868.  
 Caincawurzel 1174.  
 Cajuputol 563.  
 Calabarbohne 924.  
 Calamina praeparata 381.  
 Calcaria chlorata 263.  
 — hypochlorosa 263.  
 — oxyymuriatica 263.  
 — saccharata 698.  
 — soluta 696.  
 — stibiata sulfurata 749.  
 — sulfurata Hoffmanni 749.  
 — usta 453.  
 Calcium benzoicum 319.  
 Calciumbromid 1110.  
 Calcium carbonicum praecipitatum 695.  
 Calciumchinovat 849.  
 Calcium chloratum 698.  
 Calciumhydrosulfid 233.  
 Calciumhydroxyd 453.  
 Calcium hypophosphor-  
 sum 698.  
 — iodatum 803.  
 Calciummonosulfuret 233.  
 Calcium oxydatum 453.  
 — phosphoricum 692.  
 Calciumsalicylat 315.  
 Calciumsulfat 384.  
 Calciumsulfid 256.  
 Calcium sulfuricum ustum 384.  
 — sulfocarbolicum 299.  
 Calomelas 765.  
 Calomel à vapeur 766.  
 Calx Stibii grisea 572.  
 — viva 453.  
 — Zinci 381.  
 Cambogia 637.  
 Campecheholz 515.  
 Camphene 10.  
 Campherspiritus 947.  
 Camphoglykuronsäuren 942.  
 Camphora 941.  
 — monobromata 948.  
 Camphoride 10.  
 Canadabalsam 543.  
 Canariensamen 366.  
 Candelaë females 407.  
 Canella alba 571.  
 Canelli Cinnamomi 569.  
 Cannabin 1063.  
 Canquoin's Pasta 458.  
 Canthariden 518.  
 Cantharidencollodium 526.  
 Cantharidinum oleosum 525.  
 Caoutchouc 387.  
 Capita Papaveris 1060.  
 Caprylwasserstoff 215.  
 Capsella bursa pastoris 559.  
 Capsicol 532.  
 Capsulae 134. 139. 140.  
 — Papaveris 1060.  
 Capsules Anglaises du Dr. Humann 1191.  
 — de Mothe 1190.  
 — de Raquin 1191.  
 — gélatineuses au copahu 1190.  
 — hématiques 729.  
 Caragaheen 335.  
 Caramel 343.  
 Carbo animalis 276.  
 — fossilis 277.  
 Carbolgaze 296.  
 Carbo ligni 276.  
 Carboljute 296.  
 Carbolöl 297.  
 Carbonsäure 281.  
 Carbolschwefelsäure 299.  
 Carbo mineralis 277.  
 Carboneum sesquichloratum 1032.  
 — sulfuratum 1008.  
 Carbo Spongiae 804.  
 Cardamine 559.  
 Cardamomum 565.  
 Cardiac 72.  
 Cardobenedicten 647.  
 Cardoleum 530.  
 Caricae 353.  
 Carica Papaya 666.  
 Carmelitergeist 417.  
 Carmin 401.  
 Carminativa 39.  
 Carnaubawachs 372.  
 Caro 725.  
 Caroba 353.  
 — di Giudea 507.  
 Carrara water 696.  
 Carthamus 405.  
 Caryophylli 319.  
 Cassia cinnamomea 569.  
 — fistula 595.  
 — lignea 569.  
 Castannas de Marannon 366.  
 Castoreum 933.  
 Castoröl 595.  
 Cataplasma 130.  
 — ad decubitus 506.  
 — Aluminis 498.  
 — carbonis 278.  
 — epispasticum 536.  
 — Fermenti 743.  
 — Sinapis 536.  
 — von Lelièvre 336.  
 Cataplasme instantané 336.  
 Catechu 512.  
 Catgut 420.  
 — antiseptisches 297.  
 Cathaeretica 425.  
 Cathartica 51.  
 Cathartinsäure 619. 621.  
 Caustica 48. 425.  
 — in bacillis 151.  
 Causticum arsenicale 817.  
 — lunare 460.  
 Caustique de Filhos 452.  
 — de Recamier 460.  
 — doré 459.  
 — éthiopique 431.  
 Cauterium potentiale 448. 452.  
 Cayennepfeffer 533.  
 Cedronöl 1194.  
 Cedronnüsse 650.  
 Celtis Australis 509.  
 Centaurea Calcitrapa 648.  
 Cera 371.  
 — arborea 547.  
 — Japonica 372.  
 Cerasa acida 875.  
 Ceratia 353.  
 Ceratum 148.  
 — Aeruginis 483.  
 — Cetacei 374.  
 — citrinum 547.  
 — de Minio rubrum 394.  
 — labiale 374.  
 — Myristicae 370.  
 — Picis 547.  
 — Plumbi 487.  
 — resinae Burgundicae 547.  
 — — Pini 547.  
 — Saturni 487.  
 — viride 483.  
 Cerealien 743.

- Cereoli 150.  
 — Plumbi 372.  
 Cerevisia 742.  
 Ceriumverbindungen 1115.  
 Cerussa 393.  
 — citrina 392.  
 Cetaceum 373.  
 Cetrarsäure 652.  
 Ceylonmoos 336.  
 Ceylonzimmet 569.  
 Chaberts Wurmöl 1115.  
 Chaulmugraöl 842.  
 Chalybthrenen 709.  
 Chandu 1053.  
 Charcoal poultice 278.  
 Charpie 421.  
 — schwarze 471.  
 Charta adhaesiva 328.  
 — antarthritica 551.  
 — antasthmatica densata 884.  
 — antirheumatica 527.  
 — 545. 551.  
 — atropinisata 1092.  
 — balsamica nitrata 884.  
 — bibula 421.  
 — calabarina 929.  
 — cerata 372.  
 Chartae adhaesivae 149.  
 — medicatae 141.  
 Charta nitrata 884.  
 — oleosa 393.  
 — resinosa 551.  
 — sinapisata 537.  
 — vesicatoria 527.  
 Cheiranthus Cheiri 418.  
 Chenopodium vulvaria 737.  
 Chevilles pour l'inoculation hypodermique 150.  
 Chicle Gummi 327.  
 Chilisalpeter 885.  
 Chinaalkaloide 846.  
 China cuprea 847.  
 Chinamin 848.  
 Chinasäure 35. 848.  
 Chinarine 846.  
 Chinawurzel 831.  
 Chinicin 848.  
 Chinidin 848.  
 Chinin 848.  
 Chininsalze, diverse 846.  
 Chininum aceticum 864.  
 Chininum amidato - bichloratum 865.  
 Chininum amorphum 866.  
 — bisulfuricum 862.  
 — ferro-citricum 863.  
 — hydrochloricum 862.  
 — resinoso-sulfuricum 866.  
 Chininum sulfuricum 861.  
 — tannicum 863.  
 — valerianicum 863.  
 Chininverbindungen, diverse 864.  
 Chinioidinum 865.  
 Chinoidin 848. 865.  
 Chinolin 870.  
 Chinovasäure 848. 849.  
 Chinovin 848. 849.  
 Chiretta 647.  
 Chlor 259.  
 Chlorätherweingeist 1030.  
 Chloräthyl 1030.  
 Chloräthyliden 1031.  
 Chloralum hydratum 1066.  
 Chlorammonium 1153.  
 Chloramyl 1032.  
 Chlorbarium 805.  
 Chlorblei 495.  
 Chlorbrom 459.  
 Chlorcalcium 698.  
 Chloreisentinctur 714.  
 Chloressigsäure 448.  
 Chlorgold 459.  
 Chlorgoldnatrium 780.  
 Chlorhydrin 354.  
 Chlorhydrophosphate de chaux 695.  
 Chloriod 804.  
 Chlorkalium 233. 1112.  
 Chlorkalk 263.  
 Chlornatrium 673.  
 Chlornatron 266.  
 Chloro-acetisation 1029.  
 Chlorodyne 1029.  
 Chloroformium 1017.  
 Chlorräucherung 263. 267.  
 Chlorsilber 473.  
 Chlorsaures Kali 233.  
 — Natron 237.  
 Chlorum solutum 259.  
 Chloruntersalpetersäure 436.  
 Chlorwasser 259.  
 Chlorwasserstoffsäure 667.  
 Chlorzink 455.  
 Chocolata medica 745.  
 Choleramixtur 505.  
 Cholertropfen von Lorenz 588.  
 Cholagoga 86.  
 Christholz 220.  
 Chromogene 9.  
 Chromoxydhydrat, grünes 440.  
 Chromsäure 437.  
 Chrysarobinum 555.  
 Chrysophansäure 556. 614. 619.  
 Cicutia virosa 904.  
 Cider 975.  
 Cigarrettes antispasmodiques 1096.  
 — balsamiques 884.  
 — camphrées 946.  
 — opiacées 1053.  
 — pectorales d'Espic 1091.  
 Cigarren, medicamentöse 191.  
 Cimicifuga racemosa 892.  
 Cinchona febrifuga 861.  
 Cinchonin 865.  
 Cinchonidin 848.  
 Cinchonin 848. 865.  
 Cineres clavellati 690.  
 Cinis Antimonii 572.  
 Cinnabaris 779.  
 Cinnamon 218.  
 Cinnamomum acutum u. a. Spec. 569.  
 Cirillos Salbe 773.  
 Citras Ferri et Chinini 863.  
 — et Magnesiae 711.  
 Citrate de magnésie 603.  
 Citrea 874.  
 Citronen 415. 874.  
 Citronenöl 415.  
 Citronensäure 873.  
 Clysmä 161.  
 Coicin 648.  
 Coaltar 280.  
 Coca 970.  
 Cocain 970.  
 Coccinella septempunctata 520.  
 Coccionella 401.  
 Cocoa 746.  
 Cocos nucifera 368.  
 Codein 1034. 1044. 1056.  
 Coffeinum 965.  
 Cognac 973.  
 Colatur 176.  
 Colchicumpräparate 844.  
 Coldcream 374. 412.  
 Colla animalis 337.  
 — piscium 338.  
 Collidin 1116.  
 Collodia medicata 149. 391.  
 Collodium 389.  
 — cantharidatum 526.  
 — causticum 391. 772.  
 — elasticum 389.  
 — iodatum 797.  
 — iodoformiatum 802.  
 — saturinum 392.  
 — stypticum 505.  
 — vesicans 526.  
 Collutorium 159.



- Collyrium 160.  
 Collyres secs gradués 141.  
 Colombo, americanische 647.  
 Colombowurzel 651.  
 Colophonium 542.  
 Coloquinthen 634.  
 Commandeurbalsam 407.  
 Conchae praeparatae 400.  
 Conchinin 848. 865.  
 Conditia 137.  
 Condies Chill pills 800.  
 Conditum Aurantii 657.  
 — Zingiberis 566.  
 Condurangorinde 840.  
 Conessin 1064.  
 Confectio 151.  
 — Alkermes 402.  
 — Amygdalarum 361.  
 — Aurantii 657.  
 — Calami 658.  
 — Opii 1054.  
 — Rosae caninae 877.  
 — Terebinthinae 941.  
 Coniin 904.  
 Conserva 14. 152.  
 — Amygdalarum 361.  
 — Rosae 412. 877.  
 Constitution water 690.  
 Contentiva 44.  
 Convallaria majalis 1172.  
 Convolvulin 629.  
 Copahine 1191.  
 Copaivabalsam 1188.  
 Copal 396.  
 Copalchirinde 658.  
 Copernicia cerifera 373.  
 Coptis trifolia 652.  
 Corallia 401.  
 Coriander 417.  
 Cornu cervi 337. 401.  
 Corrigens 122.  
 Cortex adstringens Brasiliensis 515.  
 — Angusturae 659.  
 — Aurantii Curassaviensis 656.  
 — Barbatimao 515.  
 — Buranhem 514.  
 — Cacao tostus 746.  
 — Canellae albae 571.  
 — caryophyllicoides 570.  
 — Cascarillae 658.  
 — Chinae 846.  
 — Cinnamomi 569.  
 — — acuti 569.  
 — — Cassiae 569.  
 — — Chinensis 569.  
 — — Ceilonici 569.  
 — Condurango 840.  
 — Conessi 1064.  
 Cortex Copalchi 658.  
 — Coto 516.  
 — Culilawan 570.  
 — Eleutheriae 658.  
 — Frangulae 622.  
 — fructus Aurantii 655.  
 — — Citri 415.  
 — Geoffroae 211.  
 — Granati 198.  
 — Guajaci 833.  
 — Guaranhem 514.  
 — Hippocastani 509. 870.  
 — Ingae 515.  
 — Malambo 572.  
 — Mezerei 529.  
 — Monesiae 514.  
 — Musenna 202.  
 — Pruni Virginianae 1119.  
 — Quebracho 1134.  
 — Quercus 508.  
 — Salicis 870.  
 — Sassafrae 832.  
 — Simarubae 650.  
 — Sintoc 570.  
 — Tartonraira 529.  
 — Thymiamatis 220.  
 — Ulmi 335. 509.  
 — viridis Juglandis 835.  
 — Winteranus 570. 571.  
 Cosmetica 44. 397.  
 Cosmisches Pulver 817.  
 Cotoinum 516.  
 Crayonsaunirate d'argent 471.  
 — au sulfate de cuivre 480.  
 — de Barral 472.  
 — de Desmarres 472.  
 Crème d'amandes amères 221.  
 — de Bismuth 376.  
 — céleste 374.  
 Cremor tartari 604.  
 — tartari solubilis 607.  
 Creta elutriata 695.  
 Crocus 403.  
 — Martis adstringens 707.  
 — Martis aperitivus 706.  
 Crotonchloral 1078.  
 Crotonöl 639.  
 Cryptopin 1034. 1043.  
 Crystalli tartari 604.  
 Cubebae 1184.  
 Cuculli 130.  
 Cumarin 410.  
 Cuminum Cyminum 960.  
 Cumulative Wirkung 105.  
 Cupediae 136.  
 Cuprum aceticum 482.  
 — aluminatum 481.  
 — ammoniacale 481.  
 Cuprum carbonicum 248.  
 — chloratum 268.  
 — nitricum 482.  
 — oxydatum 211.  
 — subaceticum 482.  
 — sulfuricum 476.  
 — — ammoniatum 481.  
 Curaçaoschalen 656.  
 Curare 910.  
 Curcuma 405.  
 Curry powder 405.  
 Cusparin 659.  
 Cyaneisen 722.  
 Cyankalium 1119.  
 Cyanmetalle 1118.  
 Cyanquecksilber 776.  
 Cyansilber 473.  
 Cyanwasserstoffsäure 1117.  
 Cyanzink 1119.  
 Cymol 960.  
 Cynoglossum officinale 904.  
 Cypridium 1146.  
 Dactyli 353.  
 Damiana 965.  
 Dammarharz 395.  
 Dandelion 663.  
 Darmseiten 420.  
 Dasjespiz 934.  
 Datura 1094. 1095.  
 Daubitz Kräuterliqueur 628.  
 Decimalgewicht 123.  
 Decocto-Infusum 181.  
 Decoctum 176.  
 — album Sydenhami 338.  
 — crystallorum Tartari 605.  
 — Lusitanicum 749.  
 — Mercurii 761.  
 — Salep 331.  
 — Sassaparillae compositum 831.  
 — Sarsaparillae concentratum 831.  
 — Zittmanni 831.  
 Delphinin 217.  
 Demulcentia 43.  
 Dental succedaneum 880.  
 Depilatorien 454.  
 Deposition 31.  
 Derivatorische Heilmethode 46.  
 Dermatica 1157.  
 Dermerethistica 518.  
 Desinfectionsmasse von Süvern 281.  
 Desinfectionsmittel 249.

- Desinfectionspulver von  
   Corne und Demaux 281.  
 Desinficientia 41. 252.  
 Desodorisantia 41.  
 Destruction im Organismus  
   31.  
 Deutoioduretum Hydrar-  
   gyri 775.  
 Dextrinum 342.  
   — iodatum 804.  
 Diachylonsalbe 392.  
 Diaethylacetal 1079.  
 Dianthus caryophyllatus  
   418.  
 Diaphoretica 93.  
 Diapnoica 93.  
 Diastase 740. 741.  
 Diazobenzol 34.  
 Dichloressigsäure 448.  
 Digestif animé 156. 547.  
   — mercuriel 547.  
 Digestionsaufguss 178  
 Digestionstinctur 13.  
 Digestiva 50.  
 Digestivsalbe 547.  
 Digitalin und Digitalis-  
   stoffe 893.  
 Dihydroxybenzole 300.  
 Dihydroxychinin 852.  
 Dill 1207.  
 Dimethylacetal 1079.  
 Dimethylarsinsäure 812.  
 Dimethylconiin 905.  
 Dinte, rothe 401.  
 Diphenylarsinsäure 812.  
 Diptercarpusbalsam 1192.  
 Dippelsöl 1115.  
 Diuretica 89.  
 Dolichos pruriens 44. 210.  
 Donovanische Lösung 818.  
 Dorsch 736.  
 Dosis 99.  
 Douglassches Desinfec-  
   tionspulver 300.  
 Doversches Pulver 1053.  
 Drachenblut 402.  
 Dracontium foetidum 965.  
 Dragées 137.  
   — au fer réduit 138.  
   — d'atropine 1092.  
   — de Lactate de fer 723.  
   — de Papaine 667.  
   — vermifuges au calomel  
     137.  
 Drastica 52.  
 Drouottisches Pflaster 527.  
 Druitts Zahnwehmittel  
   505.  
 Duboisin 1100.  
 Duflos' Antidot gegen  
   Phosphor 249.
- Dulcamara 837.  
 Dupuytren's Pulver 817.  
 Durands Mittel gegen  
   Gallensteinkolik 937.  
 Dysplastica 61.  
 Dzondis Pillen 772.  
 Dzondis Salmiakgeist 988.
- Eau azurée 481.  
   — céleste 481.  
   — de bouquet 416.  
   — — Cologne 416.  
   — — Javelle 266.  
   — — Labarracque 266.  
   — — lavande 541.  
   — — melisse des Carmes  
     dechaussés 417.  
   — — Luce 990.  
   — — Raphanel 495.  
   — des Carmes 417.  
   — de Tisserand 940.  
 Eau-de-vie Allemande 631.  
 Eau d'héliotrope 418.  
   — hémostatique de Broc-  
     chieri 940.  
   — inodore desinfectante  
     de Ledoyen 495.  
   — médicinale de Husson  
     843.  
   — ophtalmique 481.  
   — végéto-mercurielle 777.  
 Ebullitio 176. 180.  
 Ebur ustum 276.  
 Ecbolica 82.  
 Eccoproctica 52.  
 Eibisch 332. 333.  
 Eichelkaffee 747.  
 Eichenrinde 508.  
 Eier 729.  
 Eisenalaun 499.  
 Eisenalaun, ammoniak-  
   lischer 499.  
 Eisenalbuminat 719.  
 Eisenbrausepulver von  
   Mialhe 723.  
 Eisenbromid 1111.  
 Eisenchinincitrat 863.  
 Eisenchlorid 716. 717.  
 Eisenchlorür 713.  
 Eisenchocolade 706.  
 Eisencyanürcyanid 722.  
 Eisen-Extract, apfelsaures  
   710.  
 Eisenfeile 705.  
 Eisenhut 1135.  
 Eisenhydroxyd 244.  
 Eiseniodür 720.  
 Eisen, kohlenaures  
   zuckerhaltiges 708.
- Eisenkugeln 711.  
 Eisenlactat 710.  
 Eisenmoehr 706.  
 Eisenoxydchlorid, flüssiges  
   719.  
 Eisenoxyd, rothes 707.  
 Eisenoxydul 715.  
 Eisenpeptonat 713.  
 Eisenperchlorid 716.  
 Eisenpillen 708.  
 Eisenpulver 705.  
 Eisen, reducirtes 705.  
 Eisensalmiak 719.  
 Eisensesquichlorid 716.  
 Eisensulfocarbolat 299.  
 Eisensulfuret, hydratisches  
   mit Magnesiahydrat  
   246.  
 Eisensyrup 708.  
 Eisenvitriol 272.  
   — reiner 715.  
 Eisenwässer 709.  
 Eisenweinstein 711.  
 Eisenzucker 707.  
 Elaeoptene 10.  
 Elaeosacharum 346.  
 Elaterium 636.  
 Elaterin 636.  
 Elaylchlorür 1031.  
 Electuarium 151.  
   — e Senna 621.  
   — lenitivum 621.  
   — opiatum 1054.  
   — polypharmakon 1054.  
   — theriacale 1054.  
 Elemi 547.  
 Elephantenläuse 530.  
 Elimination 31.  
 Elixir 157.  
   — acidum Halleri 432.  
   — ad longam vitam 627.  
   — alexipharmakon Hux-  
     hami 860.  
   — amarum 661.  
   — antiscrofuloux 646.  
   — Aurantiorum comp. 657.  
   — balsamicum 657.  
   — cordiale 627.  
   — de Garus 627.  
   — e succo Liquiritiae 351.  
   — paregoricum 1054.  
   — pectorale 351.  
   — proprietatis Paracelsi  
     627.  
   — Regis Daniae 351.  
   — Rhei Darelii 617.  
   — Ringelmanni 351.  
   — roborans Whyttii 860.  
   — stomachicum 657.  
   — viscerales 657.  
   — vitrioli Mynsichti 432

- Emanateurhygiénique 553.  
 Emetica 55. 572.  
 Emetin 583.  
 Emollientia 43.  
 Empasma 133.  
 Emplastra 146.  
 Emplastrum ad clavos pedum 483.  
 — ad fonticulos 393.  
 — adhaesivum 393.  
 — — Anglicum 339.  
 — — Edinburgense 339.  
 — ad hernias 383.  
 — ad rupturas 383.  
 — agglutinativum 545.  
 — album coctum 394.  
 — anglicanum 339.  
 — Ammoniaci 549.  
 — antarthriticum Helgolandi 551.  
 — antihystericum 549.  
 — aromaticum 370.  
 — basilicum 551.  
 — Belladonnae 1093.  
 — camphoratum 400.  
 — Cantharidum 526. 527.  
 — cephalicum 1054.  
 — Cerussae 394.  
 — — rubrum 394.  
 — Cicutae 909.  
 — citrinum 547.  
 — Conii 909.  
 — consolidans 383.  
 — d'André Delacroix 545.  
 — defensivum rubrum 394.  
 — de Minio rubrum 394.  
 — de Vigo 764.  
 — diachylon 392.  
 — Drouotti 527.  
 — epispasticum 526.  
 — Euphorbii 526.  
 — Ferri 707.  
 — foetidum 549.  
 — Foeni Graeci comp. 745.  
 — fuscum 394.  
 — Galbani 548.  
 — griseum 381.  
 — Hydrargyri 763.  
 — Hyoscyami 1099.  
 — Janini 526.  
 — Lythargyri 392.  
 — — molle 392.  
 — — simplex 392.  
 — — malacticum 745.  
 — — matris adustum 394.  
 — Meliloti 410.  
 — Mezerei cantharidatum 527.  
 — mercuriale 763.  
 — Minii 394.  
 Emplastrum miraculosum 400.  
 — nigrum 394.  
 — Noricum 394.  
 — opiatum 1054.  
 — oxycroceum 548.  
 — Picis irritans 529.  
 — Plumbi compositum 392.  
 — — simplex 392.  
 — roborans 707.  
 — saponatum 400.  
 — spermatis ceti 374.  
 — stomachicum 370.  
 — Tartari stibiatu 581.  
 — universale 394.  
 — vesicatorium 526.  
 — viride 483.  
 Emulsio 359.  
 Emulsio 173.  
 — Amygdalarum 361.  
 — — composita 1100.  
 — Arabica 361.  
 — Cerae 175.  
 — communis 361.  
 — de goudron 554.  
 — oleosa 361.  
 — papillaris 219.  
 — resinae Scammoniae 631.  
 Endermatische Methode 113. 115.  
 Enema 161.  
 Engelsüss 352.  
 Englische Krätzsalbe 230.  
 Englisches Pflaster 339.  
 — Salz 612.  
 Enzian 645.  
 Epidermatische Methode 113.  
 Epispastica 44.  
 Epps concentrated solution of camphora 947.  
 Epsomsalz 612.  
 Erbsenmehl 744.  
 Erdbeeren 876.  
 Erdmandeln 366.  
 Erdnussölseife 398.  
 Erdöl 213.  
 Erdwachs 374.  
 Ergotin 1197. 1204.  
 Ericinol 509.  
 Erigeron Canadense 1178.  
 Errhina 50.  
 Erythrophloeum Guineense 1172.  
 Eserin 924.  
 Escharotica 48.  
 Espèces sudorifiques 834.  
 Essence chamomillée de cu-bèbe 1187.  
 — de bigarades 414.  
 — — jonquille 418.  
 — d'oranges 414.  
 — de petits grains 414.  
 Essentia 12.  
 — Belladonnae 1093.  
 — Pepsini 666.  
 — Sarsaparillae 831.  
 Essig 443.  
 Essigäther 1016.  
 Essig, medicinischer 13.  
 Essigrose 412.  
 Essigsäure 443.  
 Essigsalmiak 1164.  
 Essigsäure-Aethylester 1016.  
 Essigsäure-Amylester 1016.  
 Essigsäure-Methylester 1016.  
 Essigsprit 444.  
 Ester 1010.  
 Éther chlorhydrique chloré 1032.  
 — — monochloruré 1031.  
 — gélatinisé 1014.  
 — hydrique 1010.  
 — pur 1010.  
 Euazyme 743.  
 Eucalyptol 868.  
 Euphorbium 528.  
 Eupion 551.  
 Evacuántia 84.  
 Evonymus atropurpureus 635.  
 Excitantia 72.  
 Expectorantia 89.  
 Exsiccantia 58. 70.  
 Extracta fluida 13.  
 Extractionsformen 12. 176.  
 Extractivstoffe 9.  
 Extractum 13.  
 — Abietis 546.  
 — Absinthii 661.  
 — Aconiti 1141.  
 — Aloës 627.  
 — — acido sulfurico correctum 627.  
 — Aurantii 657.  
 — Belae liquidum 515.  
 — Belladonnae 1093.  
 — Calabar 929.  
 — Calami 658.  
 — Cannabis Indicae 1065.  
 — Cardui benedicti 648.  
 — carnis Liebig 724.  
 — Cascariillae 659.  
 — catholicum 617.  
 — Centaurii 647.  
 — Chamomillae 957.  
 — Chelidonii 840.



- Extractum Chinae 860.  
 — Cicutae 909.  
 — Cinae 209.  
 — Colchici acidum 844.  
 — Colocynthis 635.  
 — — compositum 635.  
 — Colombo 652.  
 — Conii 909.  
 — Cubebarum 1186.  
 — — oleoso-resinosum 1186.  
 — Digitalis 901.  
 — Dulcamarae 837.  
 — Fabae Calabariae 929.  
 — Ferri cum succo pomorum 710.  
 — — cydoniatum 710.  
 — — pomatum 710.  
 — Filicis 205.  
 — foliorum Juglandis 835.  
 — Gentianae 646.  
 — Glycyrrhizae 350. 351.  
 — Graminis 352.  
 — Gratiolae 628.  
 — haemostaticum 1204.  
 — Helenii 342.  
 — Hyoscyami 1099.  
 — Ipecacuanhae 587.  
 — Jalapae 629.  
 — Juniperi 1175.  
 — lactis 734.  
 — Lactucae virosae 1061.  
 — Ligni Campechiani 515.  
 — Liquiritiae radices 351.  
 — Malti 740.  
 — — ferratum 713.  
 — Mezerei 530.  
 — Millefolii 662.  
 — Monesiae 514.  
 — Myrrhae 562.  
 — Nicotianae 1132.  
 — nucum vomicarum 923.  
 — Opii 1053.  
 — pampinorum vitis 606.  
 — panchymagogum 617.  
 — Phellandrii 1151.  
 — Physostigmatis 929.  
 — Pimpinellae 1148.  
 — Pini 546.  
 — Polygalae 655.  
 — Pulsatillae 839.  
 — Quassiae 650.  
 — Ratanhiae 511.  
 — Rhei 616.  
 — — compositum 617.  
 — Sabinae 1194.  
 — Sambuci 876.  
 — sanguinis bovini 729.  
 — Saturni 485.  
 — Scillae 1170.  
 — Senegae 1147.
- Extractum Stramonii 1096.  
 — Strychni 923.  
 — Taraxaci 663.  
 — thebaicum 1053.  
 — Trifolii fibrini 647.  
 — Valerianae 952.  
 Extrait alcoolique de quinquina à la chaux 860.  
 — arteficiel de violettes 418.  
 — d'absinthe 661.  
 — d'oeillet 418.
- Faba alba 744.  
 — Cacao 745.  
 — Calabar 924.  
 — St. Ignatii 913.  
 — Tonco 410.  
 Färberröthe 403.  
 Fahamblätter 410.  
 Farina Amygdalarum 359.  
 — — amararum 1125.  
 — fabarum 744.  
 — Hordei praeparata 740.  
 — quatuor resolventium 744.  
 — Secalis 743.  
 — Triticici 743.  
 Federharz 11. 387.  
 Feigen 353.  
 Fel Tauri 671.  
 Fenchel 1205.  
 Fenchelholz 832.  
 Fenchelhonigextract 348.  
 Fer de Queyenne 706.  
 Fermente 8.  
 Fermentum cerevisiae 742.  
 Fernambukholz 515.  
 Ferri-Ammonium citricum 711.  
 Ferricyankalium 247.  
 Ferrisulfatlösung 244.  
 Ferro-Ammonium pyrophosphoricum 712.  
 Ferroammoniumcitrat 711.  
 Ferrocyankalium 247.  
 Ferrocyanzink 1112.  
 Ferro-Kalium cyanatum 247.  
 — tartaricum 711.  
 Ferro-Manganum lacticum 724.  
 Ferro-Natrium pyrophosphoricum oxydatum libuidum 712.  
 Ferrum aceticum 714.  
 — albuminatum 713.  
 — ammoniato-sulfuricum 499.
- Ferrum arsenicicum oxydulatum 818.  
 — bromatum 722.  
 — carbogenio reductum 706.  
 — carbonicum saccharatum 708.  
 — catalyticum 719.  
 — chloratum 713.  
 — — citricum 711.  
 — — cum Ammonio citrico 711.  
 — cyanatum 722.  
 — hydrico-aceticum in aqua 246. 715.  
 — hydricum 244. 706.  
 — — in aqua 244.  
 — hydrogenio reductum 706.  
 — iodatum 720.  
 — iodicum 722.  
 — lacticum 710.  
 — muriaticum oxydatum 716.  
 — — oxydulatum 713.  
 — oxalicum 712.  
 — oxydatum dialysatum 719.  
 — — fuscum 706.  
 — — hydratum 244. 703.  
 — — nigrum 706.  
 — — saccharatum soluble 704.  
 — — rubrum 707.  
 — peptonatum 713.  
 — phosphoricum 712.  
 — potabile Willisii 711.  
 — pulveratum 705.  
 — pyrophosphoricum cum Ammoniac citrico 712.  
 — — cum Natrio citrico 713.  
 — sesquichloratum 716.  
 — — solutum 718.  
 — sulfuratum hydratum 246.  
 — — — — et Natro 247.  
 — — — — Natro 247.  
 — sulfuricum 715.  
 — — crudum 272.  
 — — oxydatum ammoniatum 499.  
 — — siccum 715.  
 — — venale 272.  
 — tannicum 712.  
 — valerianicum 712.  
 Festucae Caryophylli 319.

- Festuca quadridentata* 18.  
 Fette 323. 358.  
*Feytonia* 1029.  
*Fibrinsago* 747.  
*Fichtenharz* 543.  
*Fichtennadelextract* 546.  
*Fichtensprossen* 1150.  
*Fichtentheer* 550.  
*Fiebertkleblätter* 647.  
*Fiebermittel* 65. 846.  
*Filamenta lintei trita* 421.  
*Filhosscus Causticum* 452.  
*Filixsäure* 204.  
*Fingerhut* 892.  
*Finhams Chloride of soda* 266.  
*Fischbein, weisses* 401.  
*Flachs* 364.  
*Flavido corticis Citri* 415.  
 — *Aurantii* 656.  
*Fleisch* 725.  
*Fleischbrühe* 726.  
*Fleischextract* 724.  
*Fleischsolution von Leube* 729.  
*Fliederblumen* 1157.  
*Fliedermus* 876.  
*Fliegenholz* 648.  
*Fliegenpilz* 1160.  
*Flohsamen* 334.  
*Flores Acaciae* 1119.  
 — *Alceae* 333.  
 — *Althaeae* 332.  
 — *Anthemidis* 955.  
 — *Arnicae* 953.  
 — *Aurantii* 413.  
 — *Balaustiorum* 199.  
 — *Benzoës* 316.  
 — *Brayerae anthelminthicae* 200.  
 — *Calendulae* 841.  
 — *Carthami* 405.  
 — *Cassiae* 569.  
 — *Chamomillae* 955.  
 — *Cinae* 206.  
 — *Convallariae* 1172.  
 — *Farfarae* 654.  
 — *Foeminellae* 404.  
 — *Hageniae* 200.  
 — *Koso* 200.  
 — *Lavandulae* 540.  
 — *Malvae* 333.  
 — — *arboresae* 333.  
 — *Millefolii* 662.  
 — *Naphae* 413.  
 — *Narcissi* 1135.  
 — *Paeoniae* 1194.  
 — *Primulae* 1159.  
 — *Pyrethri* 217.  
 — *Rhoeados* 1060.  
*Flores Rosae* 412.  
 — *salis ammoniaci maritiales* 719.  
 — *Sambuci* 1157.  
 — *Stoechados citrinae* 1173.  
 — *Sulfuris* 224.  
 — *Tanacetii* 209.  
 — *Tiliae* 1158.  
 — *Verbasci* 334.  
 — *Violae odoratae* 589.  
 — *viridis aeris* 482.  
 — *Zinci* 381.  
*Fluorwasserstoffsäure* 441.  
*Foenum Graecum* 744.  
*Folia Althaeae* 332.  
 — *Anthos* 539.  
 — *Arctostaphyli* 509.  
 — *Aurantii* 656.  
 — *Belladonnae* 1079.  
 — *Bucco* 1177.  
 — *Cardui benedicti* 647.  
 — *Coccae* 970.  
 — *Digitalis* 892.  
 — *Eucalypti* 868.  
 — *Farfarae* 654.  
 — *Hyoscyami* 1096.  
 — *Jaborandi* 1159.  
 — *Juglandis* 835.  
 — *Lauri* 568.  
 — *Lauro-cerasi* 1119.  
 — *Malvae* 333.  
 — *Matico* 1188.  
 — *Melissae* 416.  
 — *Menthae crispae* 959.  
 — — *piperitae* 957.  
 — *Nicotianae* 1125.  
 — *Pilocarpi* 1159.  
 — *Rhododendri* 845.  
 — *Rosmarini* 539.  
 — *Rutae* 1194.  
 — *Salviae* 559.  
 — *Scabiosae* 654.  
 — *Sennae* 618.  
 — — *sine resina* 619.  
 — *Sesami* 336.  
 — *Stramonii* 1094.  
 — *Tabaci* 1125.  
 — *Toxicodendri* 838.  
 — *Trifolii fibrini* 647.  
 — *uvae ursi* 509.  
*Fomenta sicca* 130.  
*Fomentationes frigidae*  
     *Schmuckeri* 160. 884.  
*Fontanellpapier* 483.  
*Fontanellpflaster* 393. 526.  
*Fontanellpillen* 145.  
*Fontinalis* 421.  
*Formica rufa* 528.  
*Formylum trichloratum* 1017.  
*Fowlersche Lösung* 805.  
*Fragae* 876.  
*Franzbranntwein* 973. 982.  
*Franzosenholz* 833.  
*Franzosensalbe* 762.  
*Frauentistel* 648.  
*Fraueuglas* 384.  
*Frauenhaarsyrup* 413.  
*Freisamkraut* 837.  
*Friars Balsam* 407.  
*Frondes Sabinae* 1192.  
 — *Thujae* 538.  
*Frostsalbe, Wahlersche* 707.  
*Froschlaichpflaster* 394.  
*Fruchtweine* 975.  
*Fructus Amomi* 534.  
 — *Anethi* 1207.  
 — *Anisi stellati* 1149.  
 — — *vulgaris* 1148.  
 — *Aurantii immaturi* 655.  
 — *Bael* 515.  
 — *Cannabis* 362.  
 — *Capsici* 531.  
 — *Cardamomi* 565.  
 — *Carvi* 960.  
 — *Cerasi* 874.  
 — *Ceratoniae* 353.  
 — *Citri* 874.  
 — *Colocynthis* 634.  
 — *Coriandri* 417.  
 — *Cubebae* 1184.  
 — *Cumini* 960.  
 — *Cynosbati* 877.  
 — *Foeniculi* 1205.  
 — *Juniperi* 1174.  
 — *Lauri* 568.  
 — *Mori humilis* 876.  
 — *Myrtilli* 516.  
 — *Oxyacanthi* 876.  
 — *Papaveris immaturi* 1060.  
 — *Petroselini* 1176.  
 — *Phellandrii* 1151.  
 — *Pimentae* 534.  
 — *Rhamni catharticae* 623.  
 — *Rosae Gallicae* 877.  
 — *Rubi Idaei* 876.  
 — *Sabadillae* 216.  
 — *Tamarindorum* 877.  
 — *Vanillae* 408.  
*Frühlingscuren* 663.  
*Fuchsin* 1116.  
*Fucus amylaceus* 336.  
 — *crispus* 335.  
 — *vesiculosus* 792.  
*Fuligo* 279.  
*Fuligokali* 279.  
*Fumigatio* 188.

- Fumigatio Chlorig fortior 267.  
 Fumigationes nitricae 436.  
 — Smythianae 436.  
 Fungus chirurgorum 420.  
 — Cynobrati 508.  
 — igniarius praeparatus 420.  
 — Laricis praeparatus 1156.  
 Furfur Amygdalarum 359.  
 — Tritici 743.  
 Fusel 975.  
 Fuselöl 975.  
  
 Galactagoga 95. 1207.  
 Galbanum 547.  
 Galesscher Räucherungskasten 189.  
 Galega officinalis 1207.  
 Galgantwurzel 565.  
 Galipot 544.  
 Galitzenstein, blauer 476.  
 — weisser 473.  
 Galium Mollugo 849.  
 Gallae 507.  
 Gallerte 152.  
 Gallertkapseln 139.  
 Gallussäure 505.  
 Galmeistein 381.  
 Gambir Catechu 512.  
 Gambogiasäure 637.  
 Ganja 1062.  
 Gargarisma 159.  
 Gartenmohn 362. 1033. 1060.  
 Gartennelke 418.  
 Gartenschierling 904.  
 Gasbäder 189.  
 Gasolen 214.  
 Gaultheria procumbens 316.  
 Gegengift der arsenigen Säure 244.  
 Gegengifte 37. 238.  
 Gegengift, universelles 241.  
 Geigenharz 542.  
 Geissospermum 1066.  
 Geist 12.  
 Gelatina 152. 336.  
 — alba 337.  
 — animalis sicca 336.  
 — Balsami Copaivae 1190.  
 — Carrageen 336.  
 Gelatinae medicatae in lamellis 139.  
 Gelatina Ichthyocollae 338.  
 Gelatina jecoris aselli 739.  
 — Lichenis Islandici 653.  
 — tabulata 337.  
 Gelatine discs 143.  
 Gelatiniren der Pillen 144.  
 Gelatinlamellen 139.  
 Gelbbeeren, persische 624.  
 Gelbschoten 404.  
 Gelbwurzel 652.  
 Gelin 336.  
 Gemmae 6.  
 — Pini 1135.  
 — Populi 1135.  
 Genippkräuter 661.  
 Genista tinctoria 1174.  
 Genofevabalsam 545.  
 Gentiana cruciata 841.  
 — lutea 645.  
 Genussmittel 3.  
 Geoffroya 211.  
 Geranium maculatum 510.  
 Geraniumöl 412.  
 Gerbersumach 509.  
 Gerbsäure 499.  
 Gerbstoff 8. 499.  
 Gerstenmehl; präparirtes 740.  
 Gerstenzucker 343.  
 Gesundheitschocolade 745.  
 Getah Lahae 373.  
 Geum rivale 510.  
 — urbanum 510.  
 Gewürzessig 320.  
 Gewürznelken 319.  
 Gewürzwein 540.  
 Gichtbeeren 876.  
 Gichtpapier 527. 545. 557.  
 Gichtrose 845.  
 Gichtrübe 636.  
 Gifte 3. 37.  
 Giftlattich 1061.  
 Giftumachblätter 838.  
 Gin 975.  
 Gingerol 566.  
 Giraumontsamen 211.  
 Glacies Mariae 384.  
 Glandes Quercus tostae 747.  
 Glandulae Lupuli 664.  
 — Rottlerae 202.  
 Glaubersalz 609.  
 Globuli martiales 711.  
 — vaginales 150.  
 Glonoin 354.  
 Gluten animale 337.  
 — Tritici 744.  
 Glycelaeum 358.  
 Glycérats 357.  
 Glycérés 357.  
 Glyceride 354.  
 Glycerin 353.  
 Glycerinsalbe 358.  
 Glycérolés 357.  
 Glycérophosphate de chaux 695.  
 Glycin 671.  
 Glyconin 358.  
 Glycyrrhizin 349.  
 Glykoside 9.  
 Glykokollquecksilber 779.  
 Glykuronsäure 34.  
 Gnaphalium arenarium 1173.  
 Goapulver 556.  
 Godfreys Cordial 1054.  
 Goelissches Kinderpulver 568.  
 Goldchlorid 459.  
 Goldlack 418.  
 Goldpräparate 780.  
 Goldschlägerhäutchen 396.  
 Goldschwefel 1151.  
 Goldzwirn 652.  
 Gombokakaffee 334.  
 Gondretsche Salbe 992.  
 Gossypium 388. 1194.  
 — iodatum 795.  
 Goudron glyciné 554.  
 Goulardsches Bleiwasser 486.  
 Graefes Choleramixtur 505.  
 Grammgewicht 123.  
 Grana Actes 876.  
 — Chermes 402.  
 — Moluccana 639.  
 — paradisi 565.  
 — Tiglii 639.  
 Granatrinde 198.  
 Granula 141.  
 Granular citrate of magnesia 603.  
 Granules d'antimoine 818.  
 — de bromhydrate de cutine 910.  
 — — Digitaline 901.  
 — perlés 138.  
 Granuloides 138.  
 Graphites 277.  
 Grasöl 411.  
 Gratiola 628.  
 Graupen 740.  
 Grauspiessglanz 748.  
 Grénétine 337.  
 Grey lotion 777.  
 Grieswurzel 1183.  
 Griffiths Eisenmixtur 709.  
 Grünspan 482.  
 Guacamachaextract 904.  
 Guaco 841.  
 Guajak 833.  
 Guajaktinctur 834.



Guanidin 903.  
 Guarana 482.  
 Guindrésches Salz 610.  
 Gumma Gettania 336.  
 — Gutta 336.  
 Gummi Acaciae 326.  
 — Arabicum 326.  
 — elasticum 387.  
 — Euphorbii 528.  
 Gummigutt 637.  
 Gummi Guttiae 637.  
 — Hederæ 549.  
 — Kino 514.  
 — Mimosæ 326.  
 — Myrrha 561.  
 Gummipflaster 392.  
 Gummiresinae 10.  
 Gummi Senegalense 327.  
 Gummisurrogat 342.  
 Gummi Tragacantha 329.  
 Gurgelwasser 159.  
 Gurjunbalsam 1192.  
 Gurke 366.  
 Gurnüsse 966.  
 Guttae 165.  
 — antodontalgicae 166.  
 — ophthalmicae 166.  
 Gutta Gambier 512.  
 — Percha 385.  
 Guttaperchapapier 385.  
 Gutta Tuban 385.  
 Gutti 637.  
 Guyton Morveausche  
 Räucherungen 267.  
 Gypsum ustum 384.

Haemastica 61.  
 Haematosin 729.  
 Haematoxylin 515.  
 Hämorrhoidalsalbe 487.  
 Haemostatica 59.  
 Hafergrütze 743.  
 Hagebutten 877.  
 Hallersches Sauer 432.  
 Hallesches Waisenhaus-  
 pflaster 394.  
 Hamburger Pflaster 394.  
 Hammeltalg 370.  
 Hanf 362.  
 — Indischer 1062.  
 Hanfsamen 362.  
 Hardwickia 1192.  
 Harlemer Oel 232.  
 Harnstoff 1180.  
 Harz, Burgundisches 544.  
 Harzcerat 547.  
 Haschisch 1063.  
 Haselnüsse 366.  
 Hauhechel 1172.

Hausenblase 338.  
 Hausseife 398.  
 Haustus 158.  
 — antilyssus 523.  
 Hebras Schwefelpaste 232.  
 Heftpflaster 393.  
 — Edinburger 393.  
 Hegyallaweine 974.  
 Heidelbeeren 516.  
 Heilmittel 1.  
 Heilquellen 3.  
 Heimsche Pillen 638.  
 Heliotrop 418.  
 Helleborus viridis u. a.  
 1171.  
 Helmerichs Salbe 230.  
 Helminthochortos 211.  
 Hemidesmus Indicus 832.  
 Hennestrauch 403.  
 Henslers Kinderpulver 617.  
 Hepar sulfuris 821.  
 — — calcareum 233.  
 — — volatile 825.  
 Hepatica 86.  
 Herba 5.  
 — Absinthii 659.  
 — Althaeae 332.  
 — Aloysiae 417.  
 — Anthos 539.  
 — Apii 1177.  
 — Auriculæ muris ma-  
 joris 654.  
 — Ballotæ lanatae 1178.  
 — Beccabungae 559.  
 — Belladonnae 1079.  
 — Betyos Mexicanae 953.  
 — bursae pastoris 559.  
 — Calaminthæ 542.  
 — Cannabis Indicae 1062.  
 — Cardui benedicti 647.  
 — Centaurii minoris 647.  
 — Cerefolii 1207.  
 — Chelidonii 839.  
 — Chenopodii ambrosioi-  
 dis 953.  
 — Chimaphilæ 1177.  
 — Chironiæ angularis  
 647.  
 — Cichorii 663.  
 — Cicutæ 904.  
 — Cochleariæ 558.  
 — Conii 904.  
 — Consolidæ sarraceni-  
 cae 1178.  
 — Cunilæ thymoidis 542.  
 — Erigerontis 1178.  
 — Farfarae 654.  
 — Fumariæ 663.  
 — Galeopsidis 655.  
 — Genippi 661.  
 — Genistæ 1173.

Herba Gratiolæ 628.  
 — Hederæ terrestris 655.  
 — Hyoscyami 1096.  
 — Jaceæ 837.  
 — Ledi 845.  
 — Linariæ 335.  
 — Lini cathartici 628.  
 — Lobellæ 1132.  
 — Majoranæ 542.  
 — Malvæ 333.  
 — Mari veri 542.  
 — Marrubii albi 655.  
 — Matrisylvæ 410.  
 — Meliloti 409.  
 — Melissæ 416.  
 — — Turcicae 542.  
 — Menthae piperitæ 957.  
 — — Romanae 960.  
 — Menyanthis 647.  
 — Millefolii 662.  
 — Ononidis 1172.  
 — Origanii 542.  
 — Patchouli 417.  
 — Polygalæ amarae 655.  
 — Pulegii 960.  
 — Pulmonariæ 654.  
 — Pulsatillæ 838.  
 — Pyrolæ umbellatæ  
 1177.  
 — Rhois toxicodendri 838.  
 — Rosmarinii 539.  
 — Rutæ 1194.  
 — Sabinae 1192.  
 — Salviæ 559.  
 — Sedi 1178.  
 — Serpylli 541.  
 — Sii nodiflori 1177.  
 — Solidaginis 1178.  
 — Spilanthis 564.  
 — Stoechados citrinæ  
 1173.  
 — Stramonii 1094.  
 — Tanacetii 209.  
 — Taraxaci 662.  
 — Thujæ 538.  
 — Thymi 541.  
 — Trifolii 647.  
 — — odorati 409.  
 — Tussilaginis 654.  
 — Violæ tricoloris 837.  
 — virgæ aureæ 1178.  
 Herbstzeitlose 842.  
 Hermodactyli 842.  
 Hesperidin 655.  
 Herzgifte 73.  
 Hexenmehl 375.  
 Hibiscus esculentus 334.  
 Hidrotica 93. 1157.  
 Hieracium murorum 654.  
 Himbeeren 876.  
 Hippocolla 337.

Hippomane Mancinella 529.  
 Hippursäure 34.  
 Hirschhorn 337.  
 Hirudines 421. 422.  
 Histozyum 34.  
 Hoang-nan 913.  
 Hocklack 337.  
 Höllenöl 597.  
 Höllenstein 460.  
 Hoffmannsches Magenelixir 657.  
 Hoffmannstropfen 1016.  
 Hoffisches Malzextract 742.  
 Holarrhena Africana 1066.  
 Holunder 1157.  
 Holzessig 279.  
 Holzgeist 987.  
 Holzkohle 276.  
 Holzsäure 279.  
 Holztränke 829.  
 Homotropin, bromwasserstoffsäures 1100.  
 Honig 347.  
 Honigsalbe 154.  
 Honigseife 400.  
 Honigwasser 349.  
 Hopea 395.  
 Hopfen 664.  
 Hopfenmehl 664.  
 Hopfenöl, spanisches 542.  
 Hordeum perlatum 740.  
 Hornkleesamen 744.  
 Huechys sanguinea 520.  
 Hühnerier 729.  
 Hufelandsches Kinderpulver 617.  
 Huflattich 654.  
 Huile de cade 554.  
 — — Palmarosa 412.  
 Hundefett 367.  
 Hundspetersilie 904.  
 Hura crepitans 529.  
 Hustenkügelchen 351.  
 Hyacinthe 418.  
 Hydrargyrum 759.  
 — aceticum oxydulatum 777.  
 — amidato-bichloratum 773.  
 — ammoniato-muriaticum 773.  
 — bibromatum 778.  
 — bichloratum 769.  
 — — aethylatum 779.  
 — — albuminatum 773.  
 — — cum Natrio chlorato 772.  
 — bicyanatum 776.  
 — biiodatum 775.

Hydrargyrum biiodatum cum Hydrargyrochlorato 779.  
 — — — Kalio iodato 775.  
 — bromatum 778.  
 — chinicum 778.  
 — chloratum 765.  
 — cum creta 762.  
 — — magnesia 762.  
 — cyanatum 776.  
 — depuratum 759.  
 — formamidatum 1208.  
 — iodatum 774.  
 — muriaticum mite 765.  
 — nitricum oxydulatum 777.  
 — oleinicum oxydatum 778.  
 — oxydatum 764.  
 — — subsulfuricum 778.  
 — oxydulatum nigrum 777.  
 — peptonatum 773.  
 — phosphoricum oxydulatum 777.  
 — praecipitatum album 773.  
 — — rubrum 764.  
 — saccharatum 762.  
 — stibiato-sulfuratum 779.  
 — sulfurato-stibiatum 779.  
 — sulfuratum 779.  
 — sulphuricum oxydulatum 777.  
 Hydras Chlorali 1066.  
 Hydrastin 633.  
 Hydride 20.  
 Hydrochinon 301. 509.  
 Hydrocotarnin 1034. 1045.  
 Hydrogenium peroxydatum 255.  
 — sulfuratum 822.  
 Hydromel 349.  
 — infantum 622.  
 Hydrothionsäure 822.  
 Hydrüre 20.  
 Hyoscin 1097.  
 Hyoscyamin 1097.  
 Hypnotica 77.  
 Hypodermatische Methode 113.  
 Hypophosphite 698.  
 Hyposulfite 256.  
 Hyposulfite de soude et d'argent 473.  
 Hyraceum 934.

Jaborandiblätter 1159.  
 Jalapenknollen 628.  
 Jamata 1.  
 James powder 749.  
 Jasmin 418.  
 Jassers Salbe 230.  
 Iatreusologia 1.  
 Iatroleptische Methode 113.  
 Ichthyocolia 338.  
 Idiaton 1029.  
 Idiosynkrasie 104.  
 Jeannels Theeremulsion 554.  
 Jerusalem Balsam 407.  
 Jervin 886.  
 Jesuitenthe 953.  
 Ignatia amara 913.  
 Ilang-Ilang 418.  
 Ilex 966.  
 Immunität 105.  
 Imperatoria Ostruthium 962.  
 Implantation, hypodermatische 116.  
 Indian Tobacco 1132.  
 Indigblau Schwefelsäure 406.  
 Indigo 406.  
 Indischer Hanf 1062.  
 Indisch-Hanfextract 1065.  
 Indurjoo Samen 1066.  
 Iné 910.  
 Inebriantia 76.  
 Infusion 117. 161.  
 Infuso-Decoct 131.  
 Infusum carnis salitum 726.  
 — Ipecacuanhae compositum 588.  
 — Lini compositum 366.  
 — Rhei kalinum 617.  
 — Sennae compositum 621.  
 — — salinum 622.  
 Ingber 566.  
 Ingluvin 666.  
 Ingweröl 411.  
 Inhalatio 189.  
 Injectio 161.  
 — hypodermatica 116. 167.  
 — subcutanea 116. 167.  
 Inoculation 113.  
 — hypodermique par enchevillement 115.  
 Inosinsäure 725.  
 Insectenpulver 217. 218.  
 Inulin 341.  
 Inunctionscur 762.  
 Invertsucker 343. 348.  
 Iod 782.

- Iodaethyl 1030.  
 Iodalbumin 799. 804.  
 Indammonium 787. 802.  
 Iodarsen 818.  
 Iodamylum 804.  
 Iodbarium 805.  
 Iodblei 803.  
 Iodicigarren 796.  
 Iodchocolade 804.  
 Iodeisen 720.  
 Iodeisenleberthran 740.  
 Iodeisenpillen von Blancard 721.  
 Iodeisen, zuckerhaltiges 720.  
 Iodkadmium 803.  
 Iodkalium 782.  
 Iodkleber 804.  
 Iodkohle 804.  
 Iodleberthran 740.  
 Iodlösung, kaustische, von Richter 798.  
 Iodmilch 804.  
 Iodnatrium 787. 802.  
 Iodöl 795.  
 Iodoformium 798.  
 Iodo-Hydrargyrus Potassii 775.  
 Iodquecksilber, gelbes 774.  
 — rothes 775.  
 Iodsäure 803.  
 Iodschwefel 804.  
 Iodtinctur 796.  
 — farblose 803.  
 Iodzink 803.  
 Johannisbeeren 876.  
 Johannisbrod 353.  
 Johannismurzel 203.  
 Jonquille 418.  
 Josephpapier 440.  
 Ipecacuanha 582.  
 Iridin 633.  
 Iris 410. 633.  
 Iriserbsen 411.  
 Irritantia 48. 517.  
 Isländisches Moos 652.  
 Isonaphthol 555.  
 Isopelletierin 199.  
 Isopropyllessigsäure 950.  
 Isovaleriansäure 950.  
 Juckbohne 44. 210.  
 Juglandin 633.  
 Juglans cinerea 633.  
 — regia 835.  
 Juluben 353.  
 Julapium 157.  
 — moschatum 933.  
 Juncus effusus u. a. Spec. 1183.  
 Jungfernhonig 347.  
 Jungfernleder 329.  
 Jungfernmilch 407.  
 Jungfernöl 363.  
 Jungfernwachs 371.  
 Jus 726.  
 Jusculum 726.  
 Jute 296. 421.  
 Iva 661.  
 Kabliau 736.  
 Käfersalbe 525.  
 Kaempferid 565.  
 Kaempfsche Klystiere 662.  
 Kaffeebohnen 965.  
 Kaffeeöl, empyreumatisches 968.  
 Kainkawurzel 1174.  
 Kairin 1208.  
 Kakerlak 1174.  
 Kakodylsäure 778.  
 Kalialaun 495.  
 Kali borussicum 247.  
 — causticum fusum 449.  
 — — siccum 449.  
 Kalierème 222.  
 Kali hydricum 448. 449.  
 — — solum 448.  
 Kalilauge 448.  
 Kalio-Magnesium borocitricum 1182.  
 — — tartaricum 607.  
 Kali oxymanganicum 273.  
 — oxymuriaticum 233.  
 Kalisalpeter 880.  
 Kalisalze vgl. unter Kalium.  
 Kaliseife 222.  
 Kalitinctur 451.  
 Kalium aceticum 1178.  
 — bicarbonicum 690.  
 — bichromicum 439.  
 — bitartaricum 604.  
 — bromatum 1101.  
 — bromicum 1101.  
 — carbonicum 690.  
 — — crudum 690.  
 — chloratum 233. 1112.  
 — chloricum 233.  
 — chromicum 440.  
 — citricum 1179.  
 — cyanatum 1118.  
 Kaliumeisencyanid 247.  
 Kaliumeisencyanür 247.  
 Kalium ferro-cyanatum 247.  
 — hydroxydatum 448.  
 — iodatum 782.  
 — iodicum 803.  
 Kaliummagnesiumtartrat 607.  
 Kalium manganicum 276.  
 Kaliummetall 453.  
 Kaliumpentasulfuret 822.  
 Kalium permanganicum 273.  
 — picronitricum 210.  
 Kaliumpolyiodid 783.  
 Kalium sulfuratum 821.  
 — sulfuricum 612.  
 — tartaricum 606.  
 Kaliumwasserglas 385.  
 Kaliumwismuttartrat 377.  
 Kalk, chinovasaurer 867.  
 — gebrannter 453.  
 — kohleusaurer, gefällt 695.  
 — phosphorsaurer 692.  
 Kalkerde, phosphorsaure 692.  
 Kalkschwefelleber 233.  
 Kalkwasser 696.  
 Kalmus 657.  
 Kamala 202.  
 Kamille 955.  
 — Römische 955.  
 Kandis 343.  
 Kaneel 569.  
 Karlsbader Salz, künstliches 611.  
 Karotte 352.  
 Kartoffel 18. 837.  
 Kartoffelbranntwein 975.  
 Kartoffelstärke 339.  
 Kaskarillrinde 658.  
 Katchin 513.  
 Katzenkraut 542.  
 Katzenwurzel 949.  
 Kaumittel 49.  
 Kautschuk 387.  
 Kawa 534.  
 Kellerrasseln 520.  
 Kellerhalsrinde 529.  
 Kermes animale 402.  
 — minerale 1151.  
 Kerosolen 214.  
 Kiefernadelöl 546.  
 Kienholztheer 550.  
 Kienöl 551.  
 Kienruss 279.  
 Kindermehl 740.  
 Kinderpulver 568. 602. 617.  
 Kino 514.  
 Kirschgeist 975.  
 Kirschlorbeerwasser 1119.  
 Kirschsyrup 875.  
 Kirschwasser 1120.  
 Klatschrosen 1060.  
 Klauenöl 740.  
 Kleber 744.  
 Klebtaffet 149.  
 Kleesäure 877.



Kleister 339.  
 Klepperbeins Magen-  
 pflaster 370.  
 Klettenwurzel 835.  
 Klippdachs 935.  
 Kluges Aetzmittel 454.  
 Klystier 161.  
 Knaupsches Adstringens  
 498.  
 Knoblauch 538.  
 Knochenkohle 276.  
 Knochen, weissgebrannte  
 401. 693.  
 Knollen 5.  
 Knoppert 507.  
 Knorpeltang 335.  
 Kochsalz 240. 673.  
 Kochsalzbäder 678.  
 Kochsalzthermen 679.  
 Kochsalztrinkquellen 677.  
 678.  
 Kochsalzwasser, natürl.  
 677.  
 Königschinarinde 846.  
 Königskerze 334.  
 Königspflaster 551.  
 Königssalbe 546.  
 Königswasser 436.  
 Kohlehydrate 8.  
 Kohlenpulver 277.  
 Kohlensäure 1001.  
 Kohlenoxsulfid 825.  
 Kohlenstoffsesquichlorid  
 1032.  
 Kokkelskörner 998.  
 Kopflattich 1061.  
 Korallen 401.  
 Korinthen 353.  
 Kornbranntwein 975.  
 Kosoblüthen 200.  
 Krähenaugen 913.  
 Krätzsalben 230.  
 Kräuterbäder 131.  
 Kräuterkissen 130.  
 Kräuterliqueur v. Daubitz  
 628.  
 Kräuteröl, Schweizer 364.  
 Kräutersaft 175.  
 Kräutersaife, Borcharts  
 400.  
 Kräuterwein 540.  
 Kraftbrühen 337.  
 Krappwurzel 403.  
 Krauseminze 959.  
 Kraut 5.  
 Kreatin 725.  
 Krebsaugen 401.  
 Krebsdistel 648.  
 Krebse 727.  
 Kreide 695.  
 Kresotinsäure 316.

Kreosotöl 280.  
 Kreosotum 302.  
 Kresse 559.  
 Kreuzdornbeeren 623.  
 Kronsbeeren 516.  
 Krummholzöl 940.  
 Küchenschelle 838.  
 Kühlwasser 486.  
 Kümmel 960.  
 Kümmelöl 960.  
 Kürbissamen 211.  
 Kuhhornsamen 744.  
 Kummerfeldsches Wasch-  
 wasser 230.  
 Kumys 734.  
 Kupferacetat 482.  
 Kupferalaun 481.  
 Kupfercarbonat 248.  
 Kupferchlorid 268.  
 Kupfergrün 248.  
 Kupfernitrat 482.  
 Kupferoxyd 211.  
 Kupfersalmiak 481.  
 Kupfersulfat 476.  
 Kupfertinctur, Rade-  
 machers 483.  
 Kupfervitriol 476.  
 Kussin 201.  
 Kusso 200.  
 Kutsch 512.

Lac 732.  
 — Ammoniaci 549.  
 — Asae foetidae 964.  
 Lacca 402.  
 — Florentina 402.  
 — musica 406.  
 Lac ebutyratum 732.  
 Lachenknoblauch 538.  
 Lachgas 1005.  
 Lac iodatum 804.  
 Lack dye 402.  
 Lackfarben 10.  
 Lackmus 406.  
 Lacktinctur 402.  
 Lac Magnesiae 603.  
 — perlarum 696.  
 — Scammoniae 631.  
 — Sulfuris 224.  
 Lactagoga 95.  
 Lactolin 734.  
 Lactophosphate de chaux  
 695.  
 Lactucarium 1061.  
 Lac virginis 407.  
 Ladanum 549.  
 Lärchenschwamm 1166.  
 Läusesamen 216. 217.  
 Laevulose 348.

Lagenaria vulgaris 211.  
 Lakrizensaft 350.  
 Laminaria 419.  
 Lana camphorata 947.  
 — Gossypii 388.  
 — philosophorum 381.  
 — Pini sylvestris 546.  
 Landolfis Aetzpaste 458.  
 Lapis calaminaris 381.  
 — cancorum 401.  
 — divinus 481.  
 — haematites 707.  
 — infernalis 460.  
 — memphites 1003.  
 — miraculouss 482.  
 — mitigatus 472.  
 — ophthalmicus 481.  
 — pumicis 401.  
 — specularis 384.  
 Lappa 835.  
 Lardoil 367.  
 Lardum 367.  
 Lathyrusöl 598.  
 Latours Schwindsuchts-  
 pillen 505.  
 Latwerge 151.  
 Laudanin 1034. 1046.  
 Laudanosin 1034. 1046.  
 Laudanum 1033.  
 — de Rousseau 1054.  
 — liquidum Sydenhami  
 1053.  
 Laugensalz, flüchtiges 994.  
 Laurineencampher 941.  
 Laurostearin 369.  
 Lavacrum 160.  
 Lavatera 334.  
 Lavement purgatif 622.  
 Lavendel 540.  
 Lavender drops 541.  
 Laxantia 52.  
 Lebensbalsam, Hoffmann-  
 scher 220.  
 Lebensbaum 538.  
 Lebenselixir 627.  
 Lebermittel 86.  
 Leberthran 736.  
 Lechlers Bandwurmmittel  
 205.  
 Lecksaft 169.  
 Lederzucker 329.  
 Ledum palustre 845.  
 Leguminose 744.  
 Leichdornpflaster 483.  
 Leim 336.  
 Leimformen, trockne 139.  
 Leinkuchen 364.  
 Leinöl 364.  
 Leinsamen 364.  
 Leipziger Hustentrunk  
 1148.

Lenitiva 52.  
 Leontodonium 662.  
 Lepidium sativum 559.  
 Leptandrin 633.  
 Lethal 373.  
 Lerpmanna 595.  
 Lettuce Opium 1061.  
 Leubes Fleischsolution 729.  
 — Pankreasklystiere 729.  
 Leuchtöl 214.  
 Lichen amyloaceus 336.  
 — Carageen 335.  
 Lichenin 652.  
 Lichen Islandicus 652.  
 Liebersche Auszehrungs-  
 kräuter 655.  
 Liebesapfel 18.  
 Liebestranke 523.  
 Liebigs Fleischbrühe 726.  
 — Fleischextract 724.  
 — Nahrungsmittel für  
 Kinder 741.  
 Liebstöckelwurzel 1176.  
 Lignum Anacardium 655.  
 — benedictum 833.  
 — Campechianum 515.  
 — Gnjacis 833.  
 — Juniperi 1175.  
 — lentiscinum 396.  
 — Moluccanum 639.  
 — Picraenae 649.  
 — Quassiae 648.  
 — Jamaicensis 649.  
 — Pavanae 639.  
 — Rhodii 412.  
 — sanctum 833.  
 — sandalinum rubrum  
 401.  
 — Sassafras 832.  
 — vitae 833.  
 Lilionese 691.  
 Lilium candidum 418.  
 Limatura Martis praepa-  
 rata 705.  
 — Stanni 210.  
 Lime moxa 454.  
 Limes chimiques 480.  
 Limonadepulver 874.  
 Limonade sèche au citrate  
 de magnésie 603.  
 — von Desvignes 606.  
 — sulfurique 433.  
 Limonen 415. 874.  
 Linctus 169.  
 — emeticus Hufelandi  
 588.  
 — leniens 321. 362.  
 Lindenblüthen 1158.  
 Linimentum 169.  
 — Aeruginis 483.

Linimentum ad ambus-  
 tionem 697.  
 — Ammoniae compositum  
 993.  
 — ammoniato-camphora-  
 tum 993.  
 — ammoniatum 993.  
 — calcareum 363.  
 — Camphorae 948.  
 — Chloroformi 1029.  
 — Crotonis 642.  
 — diureticum 175. 940.  
 — e vitello ovorum 730.  
 — Opii 1053.  
 — saponato-ammoniatum  
 993.  
 — — camphoratum 993.  
 — saponatum iodatum  
 797.  
 — Terebinthinae 941.  
 — volatile 993.  
 — — camphoratum 993.  
 Linteum carptum Angli-  
 cum 421.  
 — — Germanicum 421.  
 Lippenpomade, rothe 374.  
 Lippia citriodora 417.  
 Liqumamen Myrrhae 562.  
 Liqueur de goudron con-  
 centré 554.  
 — de Pennes 299.  
 — de Pressavin 777.  
 Liqueure 975.  
 Liqueur mercurielle nor-  
 male 772.  
 — obstétricale de Debouze  
 1204.  
 — transmutative von  
 Faivre 468.  
 Liquor acidus Halleri 432.  
 — Aluminae sulfuricae  
 bibasicae 272.  
 — Aluminii acetici 271.  
 — — hypochlorosi 272.  
 — Ammonii acetici 1164.  
 — — anisatus 973.  
 — aromaticus 994.  
 — Ammonii benzoici 997.  
 — — carbonici 996.  
 — — — pyro-oleosi 997.  
 — — caustici 988.  
 — — — spirituosus 988.  
 — — succinici 997.  
 — — sulfurati 825.  
 — — tartarici 997.  
 — anodynus martiatus  
 719.  
 — — mineralis Hoff-  
 manni 1015.  
 — — vegetabilis 1016.  
 — antarthriticus Elleri 997.

Liquor antereithicus 1142.  
 — antimiasmaticus 481.  
 — Antimonii tartarisati  
 581.  
 — antipodagricus Hoff-  
 manni 825.  
 — antispasticus 997.  
 — Bellostii 777.  
 — Chlori 259.  
 — Citratis bismutico-am-  
 monici 381.  
 — cornu cervi succinatus  
 997.  
 — corrosivus 481. 772.  
 — — camphoratus 772.  
 — Cupri ammoniato-  
 chlorati 481.  
 — — perchlorati 268.  
 — digestivus Boerhavii  
 1179.  
 — discutiens 448. 1156.  
 Liqueores pulverisati 185.  
 Liquor Ferri acetici 714.  
 — — albuminati concen-  
 tratus 713.  
 — — chlorati 714.  
 — — dialysati 719.  
 — — muriatici oxydati  
 718.  
 — — — oxydulati 714.  
 — — oxychlorati 719.  
 — — sesquichlorati 718.  
 — — Sesquinitratis 720.  
 — — sulfurici oxydati  
 244.  
 — fumans Boylii 825.  
 — Gowlandi 772.  
 — haemostaticus Pagliari  
 498.  
 — Hollandicus 1031.  
 — Hydrargyri corrosivi  
 772.  
 — — nitrici oxydulati  
 777.  
 — Iodi 797.  
 — Kali caustici 448.  
 — Kalii acetici 1179.  
 — — arsenicosi 805.  
 — — carbonici 692.  
 — — silicici 385.  
 — Morphiae Hydrochlo-  
 ratis 1055.  
 — Myrrhae 562.  
 — Natri caustici 453.  
 — — chlorati 266.  
 — Natrii carbolicus 299.  
 — — hydrici 453.  
 — — hypochlorosi 266.  
 — — nitrici Rade-  
 macheri 886.  
 — — silicici 385.

- Liquor oleosus Sylvii 994.  
 — Opii sedativus Battleyi 1054.  
 — pectoralis 1100.  
 — Plumbi subacetici 485.  
 — Sacchari tosti 343.  
 — Salis Tartari 692.  
 — seriparus 183.  
 — Stibii chlorati 460.  
 — Strychniae 923.  
 — terrae foliatae Tartari 1179.  
 — von Swieten 772.  
 — Villati 481.  
 — Zinci et Aluminii sulfurici 272.  
 Lisboa diet drink 530.  
 Listerscher Verband 291.  
 Lithanthrax 277.  
 Lithargyrum 392.  
 Lithium bromatum 1110.  
 — carbonicum 1180.  
 — iodatum 803.  
 Lithiumsalicylat u. a. Salze 365. 1180.  
 Lithomarga 383.  
 Lithontriplica 39.  
 Lixivium causticum minerale 453.  
 — — vegetabile 448.  
 Lobelia inflata 1132.  
 Lobethals Schwindsuchts-essen 676.  
 Localisation 31.  
 Löffelkraut 558.  
 Löschpapier 421.  
 Lösung 156.  
 Löwenzahn 662.  
 Lolium temulentum 18.  
 Looch 151.  
 — album Parisiense 361.  
 — pulmonale 321.  
 — vert 366.  
 Lorbeeren 568.  
 Lorenz Choleratropfen 588.  
 Lotio 160.  
 — flava 765.  
 Loxopterygium 1134.  
 Lozenges 138.  
 Ludus Paracelsi 1182.  
 Lugolsche Lösung 165. 783. 796. 798.  
 Lupulin 664.  
 Lustgas 1005.  
 Lustpulver 523.  
 Lutidin 1116.  
 Lycopodium 375.  
 Maceratio 176.  
 Macisöl 567.  
 Maesa picta 202.  
 Magenelixire 667. 860.  
 Magenpflaster, Klepperbeinsches 370.  
 Magentropfen 646.  
 Magisterium Bismuti 376.  
 — sulfuris 224.  
 Magnesia 599.  
 Magnesia-Limonade, trockne citronensaure 603.  
 Magnesiamilch 603.  
 Magnesia ponderosa 602.  
 — usta 599.  
 Magnesiawasser, doppelt-kohlensaures 600.  
 Magnesium aceticum 604.  
 — benzoicum 319.  
 — boro-citricum 1182.  
 — carbonicum 599.  
 — chloratum 612.  
 — citricum effervescens 603.  
 — hydro-oxydatum 601.  
 — hypochlorosum cum Magnesia 248.  
 — lacticum 604.  
 — oxydatum 599.  
 — ricinolicum 599.  
 — salicylicum 315.  
 — silicicum 384.  
 — sulfuricum 611.  
 — sulfurosum 256.  
 — tartaricum 604.  
 Mahon'sches Enthaarungspulver 454.  
 Maililie 1172.  
 Majoran 542.  
 Maismutterkorn 1196.  
 Maisnarben 1183.  
 Maiwurm 523.  
 Malamborinde 572.  
 Malicorium 199.  
 Maltoleguminoze 744.  
 Maltum 740.  
 Malzextrat 713. 740. 742.  
 Mancinellbaum 529.  
 Mandeln, bittere und Präparate 1116.  
 — süsse und Präparate 358.  
 Mandelsäure 35. 1117.  
 Mandiocamehl 746.  
 Manganchlorürlauge 268.  
 Manganum hyperoxydatum 267.  
 Manganum sulfuricum und a. Mangansalze 724.  
 Manna 593. 595.  
 Manna metallorum 761.  
 Mannit 591.  
 Marantastärke 746.  
 Maraschino 975.  
 Marcasita alba 376.  
 Mariendistel 648.  
 Marienglas 384.  
 Marienkäfer 520.  
 Mars solubilis 711.  
 Martialia 699.  
 Massicot 392.  
 Massoyrinde 570.  
 Mastiche 395.  
 Maté 966.  
 Materia medica 2.  
 Matico 1187.  
 Matthieus Bandwurm-mittel 205.  
 Mechanica 43. 322.  
 Meconium 1033. 1034. 1043.  
 Meconsäure 1035. 1046.  
 Médecine noire 622.  
 Médicamenta 572.  
 Médicaments d'épargne 63.  
 Medulla bovina 368.  
 — ossis sepiae 401.  
 — ossium praeparata 368.  
 — Sassafra 335.  
 Medusen nesselnde 528.  
 Meerrettig 538.  
 Meerschäum 383.  
 Meerzwiebel 1166.  
 Meisterwurz 962.  
 Mel 347.  
 Melaleuca 563.  
 Melandrium sylvestre 836.  
 Melangallussäure 499.  
 Melasse 344.  
 Mel boracicum 1182.  
 Melia Azedarach 211.  
 Melilotenkle 409.  
 Melissenblätter 416.  
 Mellago 13.  
 — Graminis 352.  
 — Taraxaci 663.  
 Mellite 14.  
 Meloë 520.  
 Melone 366.  
 Mennige 394.  
 Menthol 957.  
 Menyanthin 647.  
 Menzers Stahlpulver 723.  
 Mephitis Chinga 934.  
 Mercurialia 749.  
 Mercurio-Ammoniumnitrat 777.  
 Mercurius dulcis 765.  
 — extinctus 759.  
 — gummosus Plenckii 762.  
 — iodatus ruber 775.  
 — niger Moscati 777.



- Mercurius praecipitatus albus 773.  
 — — flavus 788.  
 — — ruber 764.  
 — solubilis Hahnemanni 777.  
 — sublimatus corrosivus 769.  
 — vivus 759.  
 Metachloral 1066.  
 Metadihydroxylbenzol 301.  
 Metagallussäure 499.  
 Metamorphin 1034. 1043.  
 Metaphosphorsäure 878.  
 Metasyncretica 62.  
 Metaweinsäure 873.  
 Methane 20.  
 Methylaceton 987.  
 Methyläther 1010.  
 Methylalkohol 987.  
 Methylamin 1116.  
 Methylated ether 1010.  
 Methylchloroform 1032.  
 Methylchlorür 1029.  
 Methylconiin 905.  
 Methylenbichlorid 1029.  
 Methylglykolechlorür 1029.  
 Methylguanidin 903.  
 Methyljodid 1031.  
 Methylsalicylsäure 316.  
 Metoxybenzoëssäure 34.  
 Mezquite Gummi 327.  
 Mialhes Eisenweinsteinpastillen 711.  
 Mica panis albi 743.  
 Milch 732.  
 — condensirte 734.  
 Milchconserven von De Lignac 734.  
 Milcheextract 734.  
 Milchsäure 441.  
 Milchverzehrspflaster 374.  
 Milchwein 734.  
 Milchezucker 346.  
 Millepedes 520.  
 Mineralkermes 1151.  
 Mineralöl 214.  
 Minium 394.  
 Mirbanöl 1118.  
 Mittelöl 280.  
 Mittelsalze 53.  
 Mixta et composita 5.  
 Mixtura 129.  
 — acida 432.  
 — agitata 172.  
 — alba 696.  
 — Ammoniaci 549.  
 — Amygdalarum 361.  
 — Camphorae 948.  
 — cretacea 696.  
 Mixtura Ferri composita 709.  
 — Griffithi 722.  
 — gummosa 359.  
 — media 172.  
 — odorifera 414.  
 — — moschata 414.  
 — olei Amygdalarum 361.  
 — oleosa balsamica 220.  
 — solvens 1156.  
 — Spiritus vini Gallici 730.  
 — sulfurica acida 432.  
 — tonico-antihectica Griffithi 709.  
 Mixtur, flüssige 156.  
 Möhringsöl 214.  
 Mönchsrhabarber 614.  
 Mohnkapseln 1060.  
 Mohnöl 362.  
 Mohnsaft 1033. 1060.  
 Mohnsamen 362.  
 Mohrrübe 352.  
 Molken 182. 730.  
 Monaethylsulfat 1010.  
 Monesia 514.  
 Monobromcampher 942. 948.  
 Monobromessigsäure 1103.  
 Monochloräthylenchlorid 1032.  
 Monochloressigsäure 448.  
 Moosbeeren 876.  
 Moscovade 343.  
 Moos, Irländisches 335.  
 — Isländisches 652.  
 Morellen 875.  
 Mori 876.  
 Morisons Pillen 635.  
 Morphinchloral 1078.  
 Morphinpastillen 1056.  
 — Quecksilberchlorid, chlorwasserstoffsaures 779.  
 Morphinsalze, verschiedene 1056.  
 Morphinum aceticum 1056.  
 — hydrochloricum 1055.  
 — meconicum 1056.  
 — muriaticum 1055.  
 — sulfuricum 1056.  
 Morphinum 1034. 1035.  
 Morsellen 137.  
 Morsuli 137.  
 — antimonialia Kunkeli 749.  
 — stomachales 137.  
 Mosche di Milano 527.  
 Moschus 930.  
 — amerikanischer 418.  
 — artificialis 973.  
 Moschuswurzel 965.  
 Mouches de Milan 527.  
 Mucilaginosa 326.  
 Mucilago 182.  
 — Cydoniae 334.  
 — Gummi Arabici 329.  
 — Salep 331.  
 Mucuna pruriens 210.  
 Mudarwurzel 841.  
 Muscae Hispanicae 518.  
 Muscarin 1160.  
 Muscatbalsam 369. 370.  
 Muscatblüthen 567.  
 Muscatnuss 567.  
 Muscatnussbutter 369.  
 Muscatnussöl 369.  
 Muscatweine 974.  
 Muscheln 727.  
 Muscus Corsicanus 211.  
 Musennarinde 202.  
 Mustard paper 533.  
 Mutterharz 547.  
 Mutterkorn 1195.  
 Mutterkümmel 960.  
 Mutterlauge 673.  
 Mutterpflaster 392. 394.  
 Mutterzäpfchen 150.  
 Mydriatica 79.  
 Mylabris 518. 519.  
 Myotica 79.  
 Myricin 371.  
 Myristinsäure 369.  
 Myrobalanen 509.  
 Myrosin 535.  
 Myrrha 561.  
 Myrsine Africana 202.  
 Myrthe 1150.  
 Nachtschatten 837.  
 Nahrungsmittel 3. 62.  
 Naphtha aceti 1016.  
 Naphthalinum 213.  
 Naphtha montana 213.  
 — vegetabilis 1616.  
 — vitrioli 1009.  
 — von Hastings 987.  
 Naphthol 555.  
 Nardus Gallica 950.  
 Narcein 1034. 1043. 1057.  
 Narcisse 418. 1135.  
 Narcotica 74.  
 Narkotin 1034. 1044. 1057.  
 Naschwerksformen 136.  
 Nasturtium officinale 559.  
 Natrium aceticum 1179.  
 — aethylosulfuricum 608.  
 — benzoicum 316.  
 — bibericum 1181.  
 — bicarbonicum 681.

- Natrium boracicum 1181.  
 Natriumbrechweinstein 577.  
 Natrium bromatum 1110.  
 — carbolicum 298.  
 — carbonicum 681.  
 — chloratum 673.  
 — chloricum 237.  
 — choleinicum 671.  
 — citricum 1179.  
 — cresotinicum 316.  
 Natriumgoldchlorid 780.  
 Natrium hydrocarbonicum 681.  
 Natriumhydroxyd 453.  
 Natrium hypochlorosum 266.  
 — hyposulfurosum 257.  
 — iodatum 802.  
 — lacticum 442.  
 — methylschwefelsaures 608.  
 — nitricum 885.  
 Natriumnitrit 885.  
 Natrium phosphoricum 608.  
 Natriumplatinchlorid 782.  
 Natrium pyrophosphoricum ferratum 712.  
 Natriumquecksilberchlorid 772.  
 Natriumquecksilberpyrophosphat 752.  
 Natrium, ricinölsaures 597.  
 — salicylicum 307.  
 — santonicum 209.  
 — sclerotinicum 1205.  
 Natriumsilberhyposulfit 473.  
 Natrium subsulfurosum 257.  
 Natriumsulfantimoniat 823.  
 Natrium sulfocarbolicum 299.  
 — sulfomethylicum 609.  
 — sulfophenylicum 299.  
 — sulfovinicum 608.  
 — sulfuratum 825.  
 — sulfuricum 609.  
 — — dilapsum 610.  
 — tartaricum 606.  
 — thiosulfuricum 257.  
 — thymolicum 307.  
 Natriumwasserglas 385.  
 Natron causticum solutum 453.  
 Natronhydrat 453.  
 Natronkrene 688.  
 Natronlauge 453.  
 Natronsalpeter 885.  
 Natronschwefelleber 825.  
 Natronseife 397.  
 Natrum muriaticum purum 673.  
 Nauseosa 56.  
 Nelke 319. 418.  
 Nelkenöl 319.  
 Nelkenpfeffer 533.  
 Nelkenwurz 510.  
 Nervensalbe 539.  
 Neurotica 74. 903.  
 Neutralisantia 38.  
 Newtons Zahnwehmittel 670.  
 Nicotin 1126.  
 Niesepulver 133.  
 Niesmittel 50.  
 Nieswurzel, grüne 1171.  
 — weisse 886.  
 Nigella sativa 1207.  
 Nihilum album 381.  
 Nitrile 1119.  
 Nitrobenzin 212. 1118.  
 Nitrogenium oxydulatum 1005.  
 Nitroglycerin 354.  
 Nitromannit 594.  
 Nitrum cubicum 885.  
 — depuratum 880.  
 — flammans 886.  
 — tabulatum 884.  
 Nourtouak 332.  
 Nuces Avellanae 336.  
 — Brasilienses 366.  
 — Juglandis 366.  
 — moschatae 567.  
 — vomicae 913.  
 Nuclei Cembrae 366.  
 — Pineae 366.  
 — Pistaciae 366.  
 Nufflers Bandwurmmittel 205.  
 Nürnberger Pflaster 394.  
 Nutrientia 62.  
 Nyssa 420.  
 —  
 Oakum 421.  
 Oblatenkapseln 134.  
 Obst 871.  
 Obstruentia 58.  
 Occultans 126.  
 Ochsenklauenfett 740.  
 Ochsenkreuzpflaster 548.  
 Ochsenmark 368.  
 Ocubawachs 373.  
 Oculi cancerorum 401.  
 — Populi 1150.  
 Odontine 149. 400. 602. 1014.  
 — English 1029.  
 Odontoide 396.  
 Odontotrimma 133.  
 Odoramentum 133.  
 Oelbaum 363.  
 Oelemulsion 173. 361.  
 Oelgallerte 153.  
 Oelpapier 393.  
 Oelsäure 364.  
 Oelseife 398.  
 Oelsüss 353.  
 Oelzucker 133. 346.  
 Oenanthäther 980.  
 Ohrenpillen, Pintersche 947.  
 Olea aetherea 10.  
 — pinguis 11.  
 Oleate 364.  
 Olea volatilia 10.  
 Olein 364.  
 Oleum abietinum Helveticum 940.  
 — Amygdalarum 358.  
 — — amararum 1116.  
 — Andae 598.  
 — animale aethereum 1115.  
 — Anisi 1148.  
 — anthelminticum Chamberi 1115.  
 — Anthos 538.  
 — Aurantii corticis 413.  
 — — florum 413.  
 — Avellanae 366.  
 — Balsami Copaivae 1188.  
 — Batavorum 1031.  
 — Behen 367.  
 — Bergamottae 414.  
 — betulinum 555.  
 — Cacao 371.  
 — cadinum 554.  
 — Cajeputi 563.  
 — Calami 657.  
 — camphoratum 948.  
 — Cannabis 362.  
 — Cantharidum 525.  
 — Carvi 960.  
 — caryophyllorum 319.  
 — Cassiae 569.  
 — Cedriae 551. 1194.  
 — cerae 371.  
 — Chamomillae 957.  
 — chartae 555.  
 — Cinnamomi 569.  
 — — Cassiae 569.  
 — Citri 415.  
 — Cocos 368.  
 — cornu cervi 1116.  
 — crinale 415.  
 — Crotonis 639.  
 — Curcadis 597.  
 — de Cedro 415.

Oleum empyreumaticum  
   coniferarum 550.  
 — Fagi empyreumaticum  
   550.  
 — Filicis 205.  
 — florum Naphae 413.  
 — Foeniculi 1205.  
 — Gabianum 213.  
 — Gaultheriae 316.  
 — Geranii 412.  
 — Helianthi 366.  
 — Hyoscyami infusum  
   1099.  
 — Jatrophae 597.  
 — jecoris aselli 736.  
 — infernale 597.  
 — iodatum 795.  
 — Juglandis 366.  
 — Juniperi 1174.  
 — — empyreumaticum  
   554.  
 — — Virginianae 1194.  
 — Lathyridis 598.  
 — Lauri 369. 569.  
 — Lavandulae 540.  
 — ligni fossilis empyreu-  
   maticum 555.  
 — Lini 364.  
 — — sulfuratum 231.  
 — Lithanthracis 280.  
 — Macidis 567.  
 — — expressum 370.  
 — Majoranae 542.  
 — Martis 718.  
 — Menthae crispae 959.  
 — piperitae 957.  
 — Morrhuae 736.  
 — Myristicae 369.  
 — Myrrhae per deliquium  
   562.  
 — Napi 367.  
 — Neroli 413.  
 — Nucistae 369.  
 — nucum Fagi 366.  
 — Olivarum 363.  
 — oxygenatum 436.  
 — Palmae 369.  
 — — Christi 595.  
 — Patchouli 417.  
 — Papaveris 362.  
 — pedum Tauri 740.  
 — Pelargonii 412.  
 — petrae Italicum 213.  
 — phosphoratum 821.  
 — Picis 551.  
 — Pini rubrum 551.  
 — — sylvestris 546.  
 — Provinciale 363.  
 — Rajae 740.  
 — Rapae 367.  
 — Rhodii 412.

Oleum Ricini 595.  
 — — artificiale 642.  
 — Rosae 411.  
 — Rosmarini 538.  
 — Rutae 1194.  
 — Rusci 555.  
 — Sabinae 1193.  
 — Salviae 560.  
 — Santali citrinum 1192.  
 — Sassafras aethereum  
   832.  
 — Schoenanthi 411.  
 — Sesami 366.  
 — Sinapis aethereum 534.  
 — Succini 972.  
 — sulfuris Beguini 825.  
 — Tanacetii 209.  
 — Tartari per deliquium  
   692.  
 — templinum 940.  
 — Terebinthinae 935.  
 — — ozonisatum 940.  
 — — sulfuratum 232.  
 — Theae 367.  
 — Thymi 541.  
 — Unonae 418.  
 — Valerianae 950.  
 — virgineum 363.  
 — Vitrioli 427.  
 — Vitrioli dulce 1016.  
 — Wittnebianum 563.  
 Olibanum 549.  
 — sylvaticum 544.  
 Olivenöl 363.  
 Onguent blanc de Rhazes  
   393.  
 — de la mère Thècle 394.  
 Ononis 1172.  
 Onopordon Acanthium 648.  
 Operment 818.  
 Opheliasäure 647.  
 Opianin 1034. 1043.  
 Opiat 151.  
 Opium 1033. 1039.  
 Opiumalkaloide 1033. 1042.  
 Opium depuratum 1053.  
 — minerale 1113.  
 Opodeldok 993.  
 Opopanax 550.  
 Orangenblüthen 413.  
 Orangenblüthenwasser  
   413.  
 Ordeal bean 924.  
 Oregontraube 652.  
 Orellana 405.  
 Organodecursoren 31.  
 Orgeadenextract 361.  
 Orlean 405.  
 Orthodihydroxylbenzol  
   301.  
 Orthophosphorsäure 878.

Ossa calcinata 693.  
 — Sepiae 401.  
 — usta 276. 401. 693.  
 — — nigra 276.  
 Osseline 338.  
 Ostseebäder 681.  
 Oulachan Oil 740.  
 Ova gallinacea 729.  
 Oxalis Acetosella 878.  
 Oxalsäure 877.  
 Oxycrat 448.  
 Oxycroceumpflaster 548.  
 Oxydum Argenti cyana-  
   tum 473.  
 — Arsenici album 805.  
 — ferroso-ferricum 706.  
 Oxygenium 252.  
 Oxydel 448.  
 — Aeruginis 483.  
 — Colchici 844.  
 — Scillae 1167.  
 Oxyulfuretum Antimonii  
   1151.  
 Ozokerit 374.  
 Ozonum 252.  
 Ozonwasser 254.  
 Paeonia officinalis 1194.  
 Paku Kidang 420.  
 Paleae Cibotii 420.  
 Palladiumchlorid 33.  
 Palliativa 1.  
 Palmieris lithontriptische  
   Tropfen 553.  
 Palmöl 369.  
 Palo del soldato 1187.  
 Palo santo 833.  
 Panacea 2.  
 Panamarinde 836.  
 Panchymagogum Querce-  
   tani 766.  
 Pancreatinum 667.  
 Pankreasklystiere von  
   Leube 729.  
 Panna 206.  
 Pannus vesicatorius 527.  
 Pansomatica 643.  
 Paopereirarinde 1066.  
 Papainum 666.  
 Papaverin 1034. 1045. 1058.  
 Papier calabarisé 929.  
 Papier nitré 884.  
 Papieröl 555.  
 Pappelsalbe 1150.  
 Paracotoinum 516.  
 Paracotorinde 516.  
 Paradieskörner 535.  
 Paraffinöl 214. 375.  
 Paraffinsalbe 374.



- Paraffinum 374.  
 — liquidum 374.  
 Paraguay Roux 564.  
 — Thee 966.  
 Paraldehyd 1079.  
 Paratinctur 564.  
 Paregorica 77.  
 Pariserblau 722.  
 Parmelia parietina 615.  
 654.  
 Parturefacientia 82.  
 Parvolin 1116.  
 Paspalum scrobiculatum 18.  
 Passulae 353.  
 Pasta 139.  
 — aceto-tannica 447.  
 — Althaeae 329.  
 — Cacao 745.  
 — — cum Lichene Islandico 653.  
 Pasta Canquoini 458.  
 — Chloreti zincici et Chloreti stibici 458.  
 — caustica Viennensis 452.  
 — dentifricia 149. 400.  
 — epispastica 536.  
 — escharotica Anglica 453.  
 — — Viennensis 452.  
 — Guarana 968.  
 — gummosa 329.  
 — Jujubarum 353.  
 — Lichenis Islandici 653.  
 Pastillae fumales 407.  
 Pastillen 138.  
 Pastilles digestives de Bilin 689.  
 — du sérail 407.  
 — pour les fumeurs 331.  
 — purgatives à la Magnésie calcinée 603.  
 Patchouli 417.  
 Pâte d'amandes douces 431.  
 — de Canquoin 458.  
 Patent corns exstirpators 387.  
 Pâtes alimentaires 712.  
 Paxilli ad inoculationem 150.  
 Pechkappen 545.  
 Pechpflaster, weisses 547.  
 Pech, weisses 551.  
 Pectinstoffe 8.  
 Peersaat 1151.  
 Pegologia 3.  
 Pé-La 373.  
 Pelletierintannat 200.  
 Pelosin 1183.  
 Penghawar Djambi 420.  
 Pennyroyal 960.  
 Pepsin 665.  
 Pepsin-Pankreatin-Pastillen 667.  
 — vegetabilisches 666.  
 Pepsinwein 666.  
 Peptone 727.  
 — aus Erbsenmehl 744.  
 Peptonnährmittel von Jaworski 728.  
 Peptonquecksilber 773.  
 Percha lamellata 385.  
 Perchloräthan 1032.  
 Pericarpium Citri 415.  
 Perles d'éther 1015.  
 Perlgraupen 740.  
 Perlmoos 335.  
 Perlsago 747.  
 Perlsalz 608.  
 Perlweiss 377.  
 Permanganas Potassae 273.  
 Peroxide of hydrogen 255.  
 Peroxychlorure de fer officinale 720.  
 Perubalsam 218.  
 Pessarum medicatum 150.  
 Pestessig 320.  
 Petala Rosae 412.  
 — Rhoeados 1060.  
 Petersilie 1176.  
 Petroleum 213.  
 Petroleumaether 214.  
 Petroleumbenzin 213.  
 Peysonscher Trank 1180.  
 Pfefferminzcampher 957.  
 Pfefferminze 957.  
 Pfefferminzöl 957.  
 Pfefferminzwasser, weingeistiges 959.  
 Pfeffer, schwarzer 533.  
 — spanischer 531.  
 — weisser 538.  
 Pfeilwurzelmehl 746.  
 Pflanzenpapier, ostindisch. 328.  
 Pflanzenensäuren 7.  
 Pflanzenwachs 12.  
 Pflaster 146.  
 — Englisches 339.  
 — gelbes 547.  
 — immerwährendes 526.  
 Phalaris Canariensis 366.  
 Pharmakopöe 3.  
 Phenol 281.  
 Phénol sodique 298.  
 Phenylalkohol 281.  
 Phenylschwefelsäure 299.  
 Philadelphus coronarius 418.  
 Phlobaphene 10.  
 Phosphate de chaux 693.  
 Phosphor 818.  
 Phosphorsäure 878.  
 Phyllis amara 1125.  
 Physostigminum salicylicum 924.  
 Phytolaccin 633.  
 Pichurimbohnen 832.  
 Picolin 1116.  
 Pierre de Hesselbach 482.  
 — divine de St. Yves 481.  
 Pigmente 9.  
 Pigmentum Indicum 406.  
 Pikrinsäure 210.  
 Pikrolichenin 654.  
 Pikrotoxin 998.  
 Pilocarpinum hydrochloricum 1159.  
 Pilulae aeternae 572.  
 — aethiopicae 761.  
 — aloëticae 628.  
 — — ferratae 716.  
 — anodynae 1054.  
 — aperitivae Stahl's 628.  
 — Asae foetidae 964.  
 — Asiaticae 817.  
 — Barbarossae 761.  
 — bechicae 1058.  
 — benedictae 628.  
 — Blandii 709.  
 — Bontii 638.  
 — Cambogiae compositae 638.  
 — coeruleae 761.  
 — Colocynthidis et Hyoscyami 635.  
 — de Cynoglossa 1054.  
 — Dzondii 772.  
 — Ferri carbonici 708.  
 — — iodati 723.  
 — foetidae succinatae 964.  
 — hydragogae Heimii 638.  
 — Hydrargyri 761.  
 — — ferruginosae 761.  
 — Italicae nigrae 716.  
 — Meglini 1100. 1109.  
 — mercuriales 768.  
 — odontalgicae 1054.  
 — pectorales Heimii 1058.  
 — Picis Danicae 545.  
 — Plummeri 768.  
 — purgantes cum Hydrargyro 768.  
 — resolventes Schmuckeri 582.  
 — Rhei compositae 618.  
 — Rufii 628.

- Pilulae Scillae compositae 1170.  
 — sedativae 1098.  
 — Valleti 709.  
 Pilules de copahu 1191.  
 — de Dupuytren 773.  
 — — protoiodure de mercure 775.  
 Piment 534.  
 Pineoli 366.  
 Pinguedines 323, 358.  
 — solidificatae 153.  
 Pintersche Ohrenpillen 947.  
 Pinus australis u. a.  
   Terpenthin liefernde Species 543.  
 — Cembra 366.  
 — maritima 509.  
 Piper album 533.  
 — caudatum 1184.  
 — Cubebae 1184.  
 — Cayennense 533.  
 — Hispanicum 531.  
 Piperin 533.  
 Piper longum 533.  
 Piper nigrum 533.  
 Pisa Iridis 411.  
 Piscidia 1066.  
 Pistacien 366.  
 — terpenthin 543.  
 Pituri 1100.  
 Pix alba 551.  
 — liquida 550.  
 — navalis 551.  
 Placenta Lini 364.  
 Plastica 61, 643.  
 Platanus orientalis 509.  
 Platinchlorid 782.  
 Platino-Natrium chloratum 782.  
 Plencksche Solution 772.  
 Plumbago 277.  
 Plumbum aceticum 487.  
 — — basicum solutum dilutum 486.  
 — carbonicum 393.  
 — chloratum 495.  
 — hydrico-aceticum solutum 485.  
 — hydricocarbonicum 393.  
 — hyperoxydatum rubrum 394.  
 — iodatum 803.  
 — muriaticum 495.  
 — nitricum 495.  
 — oxydatum 392.  
 — phosphoricum 495.  
 — sulfuricum 495.  
 — tannicum 506.  
 Plummers Pulver 768.  
 Pneumatica 1146.  
 Pockensalbe 581.  
 Pockholz 833.  
 Po de Bahia 556.  
 Podophyllin 632.  
 Pois élastiques 530.  
 Polei 960.  
 Polyanthes tuberosa 418.  
 Polychroit 403.  
 Poma acidula 876.  
 — Aurantii 655.  
 — Citri 874.  
 — Colocynthis 634.  
 Pomade 154.  
 — mélanique 431.  
 Pomata Bergamottae 414.  
 — cosmetica 415.  
 Pomeranzen 655.  
 Pomeranzenblätter 656.  
 Pomeranzenblüthen 418.  
 Pomeranzenschale 655.  
 Porcellanthon 383.  
 Porphyroxin 1034, 1045.  
 Portlands antarthritic powder 646.  
 Portland Sago 747.  
 Portwein 974.  
 Potassa caustica 448.  
 — sulfurata 822.  
 Potato fly 519.  
 Potio 158.  
 — antiemetica Riverii 688.  
 — Choparti 1191.  
 Potion ammoniacale 994.  
 Potio nigra Anglorum 612, 621.  
 — Riverii 170, 172, 688.  
 Pottasche 690.  
 Potus antatrophicus 730.  
 Poudre contre la migraine 967.  
 — de Dubois 817.  
 — de Dupuytren 817.  
 — de Goa 556.  
 — de Rousselot 817.  
 — de savon 415.  
 — des frères Mahon 454.  
 — de succession 490.  
 — nutritive de Corvisart 665.  
 Präcipitat, gelber 778.  
 Präcipitatsalbe, rothe 765.  
 Praeparate 4.  
 Prager Tropfen 964.  
 Précipité blanc 773.  
 Preisselbeeren 516.  
 Pressschwämme 419.  
 Preussische Latwerge 523.  
 Prinzessinnenwasser 407.  
 Prophylactica 1, 37, 196.  
 Propolis 371.  
 Propylamin 737.  
 Protective 292.  
 Proteinstoffe 8.  
 Protoioduretum Hydrargyri 774.  
 Protopin 1034.  
 Provencer Oel 363.  
 Prunus Virginiana 1119.  
 Pruriginantia 45.  
 Pseudoaconitin 1136.  
 Pseudoemulsion 173.  
 Pseudomorphin 1034.  
 Psychotria emetica 583.  
 Ptarmica 50.  
 Pteris aquilina 206.  
 Ptisana 180.  
 Ptyalagoga 49, 85.  
 Ptychotis 305.  
 Pulmonaria officinalis 654.  
 Pulpa Cassiae 595.  
 — Tamarindorum 877.  
 Pulu 421.  
 Pulvilli 130.  
 Pulvinaria Lupuli 664.  
 Pulvinaria medicata 130.  
 Pulvis 132.  
 — ad erysipelas 1158.  
 — ad Limonadam 874.  
 — ad potum effervescentem 688.  
 — aërophorus 133, 687.  
 — — Anglicus 688.  
 — — cum Magnesia 603.  
 — — laxans 607.  
 — — martiatus 709.  
 — — Seidlitzensis 607.  
 — alexiterius 1053.  
 — alterans Plummeri 768.  
 — antacidus 617, 636.  
 — antiepilepticus 1114.  
 — antiscrophulosus Goe-lisii 568.  
 — antispasmodicus 884.  
 — aromaticus 571.  
 — arsenicalis Cosmi 817.  
 — Carthusianorum 1152.  
 — causticus 452.  
 — comitissae 847.  
 — contra cimices 217.  
 — Content 743.  
 — cosmeticus 362.  
 — dentifricus 133, 135.  
 — — albus camphoratus 696.  
 — — Hufelandi 867.  
 — — niger 867.  
 — depuratorius Jasseri 749.

- Pulvis diaphoreticus 1153.  
 — digestivus Kleinii 617.  
 — Doveri 1053.  
 — effervescens 687.  
 — — laxans 607.  
 — emeticus 582.  
 — errhinus 133.  
 — e Tartaro stibiato 582.  
 — Ferri alcoholisatus 705.  
 — florum Sambuci comp. 1158.  
 — Foeniculi compositus 1206.  
 — fumalis nobilis 541.  
 — galactopoeus Rosensteini 1206.  
 — Glycyrrhizae compositus 621.  
 — gummosus 329.  
 — Jalapae compositus 631.  
 — infantum 617.  
 — Jesuiticus 847.  
 — Ipecacuanhae opiatas 1053.  
 — lenitivus tartarisatus 618.  
 — Liquiritiae compositus 621.  
 — Magnesiae cum Rheo 617.  
 — nucis moschatae compositus 568.  
 — nutritivus Liebig 741.  
 — Oryzae 744.  
 — odoratus 133.  
 — patrum 847.  
 — pectoralis Kurellae 621.  
 — — Trosii 654.  
 — Plummeri 768.  
 — pro fumo 132.  
 — — infantibus 696.  
 — refrigerans 605.  
 — resolvens stibiatus 884.  
 — Rhei compositus 617.  
 — — tartarisatus 617.  
 — salinus compositus 610.  
 — saponatus cosmeticus 415.  
 — sternutatorius 133.  
 — sternutatorius viridis 542.  
 — strumalis 790.  
 — stypticus 498.  
 — Sulfuris compositus 232.  
 Pulvis temperans 605. 884.  
 Pumex 401.  
 Purga macho 631.  
 Purgantia 52.  
 Purgirkörner 639.  
 Purpura mineralis Cassii 780.  
 Purpurissimum 383.  
 Pustelsalbe 581.  
 Pustulantia 45.  
 Putamen 6.  
 Putamina nucum Juglandis 835.  
 Putzöl 214.  
 Pyrethrum 217.  
 Pyridin 1116.  
 Pyridinbasen 21. 1116.  
 Pyrocatechin 551.  
 Pyrogallussäure 557.  
 Pyrola umbellata 1177.  
 Pyroleum Fagi 550.  
 Pyrothionide 555.  
 Pyrophosphas Ferri et Natri 712.  
 Pyrophosphorsäure 878.  
 Pyroxilin 389.  
 Pyrrhopin 839.  
 Quallen, nesselnde 528.  
 Quassia 648.  
 Quebracho 1134.  
 Queckenwurzel 552.  
 Quecke, rothe 835.  
 Quecksilber 759.  
 Quecksilberalbuminatmixture von Bärensprung 771.  
 Quecksilberchlorid 769.  
 Quecksilberchloriodür 779.  
 Quecksilberchlorür 765.  
 Quecksilberiodid 775.  
 Quecksilberiodür 774.  
 Quecksilbermethyl 754.  
 Quecksilbermohr 779.  
 Quecksilberoxyd 764.  
 Quecksilberoxydsalze 777.  
 Quecksilberoxydulacetat 777.  
 Quecksilberoxydul 777.  
 Quecksilberoxydulsalze 777.  
 Quecksilberpflaster 763.  
 Quecksilberpräcipitat, rothes 764.  
 — weisses 773.  
 Quecksilbersalbe, gelbe 777.  
 — graue 762.  
 — weisse 774.  
 Quecksilbersublimat 769.  
 Quellwasser 828.  
 Quendel 541.  
 Quercitrin 513.  
 Quina blanca 658.  
 — del Carony 659.  
 Quinetum 861.  
 Quinium 860.  
 Quittenkerne 334.  
 Quittenschleim 334.  
 Racahout de l'Orient 747.  
 Rademachers Kupfertinctur 483.  
 Radix 5.  
 — Alkannae 403.  
 — Althaeae 332.  
 — Anchusae 403.  
 — Angelicae 961.  
 — Anserinae 510.  
 — Apii 1177.  
 — Archangelicae 961.  
 — Aristolochiae 845.  
 — Armoraciae 538.  
 — Arnicae 953.  
 — Artemisiae 953.  
 — Asari 589.  
 — Bardanae 835.  
 — Belladonnae 1080.  
 — Bistortae 510.  
 — Bryoniae 636.  
 — Caincae 1174.  
 — Calumbo 650.  
 — Caricis 835.  
 — Cardopatiæ 835.  
 — Carlinae 835.  
 — Caryophyllatae 510.  
 — Chinae 831.  
 — Christophoræ Americanae 192.  
 — Cichorii 663.  
 — Colombo 650.  
 — colubrina 510.  
 — Consolidæ majoris 335.  
 — Corniolæ 332.  
 — Curcumæ 405.  
 — Cyperi 366.  
 — Dauci 352.  
 — Dracontii 965.  
 — Enulae 341.  
 — Filiculæ dulcis 352.  
 — Filicis 203.  
 — Galangæ 565.  
 — Gei 510.  
 — Gelsemii 1134.  
 — Gentianæ 645.  
 — Geranii maculati 510.  
 — Ginseng 965.  
 — Glycyrrhizae 349.



- Radix Gossypii* 1194.  
 — *Graminis* 352.  
 — *Helenii* 341.  
 — *Hellebori albi* 886.  
 — — *viridis* 1171.  
 — *Jalapae* 628.  
 — — *albae* 631.  
 — *Imperatoriae* 962.  
 — *Inulae* 341.  
 — *Ipecacuanha* 582.  
 — *Ireos Florentinae* 410.  
 — *Junci* 1183.  
 — *Krameriae* 510.  
 — *Lapathi* 614.  
 — *Levistici* 1176.  
 — *Liquiritiae* 349.  
 — *Lopez* 651.  
 — *Mechoacanhae albae* 631.  
 — *Nanari* 832.  
 — *Ononidis* 1172.  
*Radix Orizabensis* 631.  
 — *Oxylapathi* 614.  
 — *Pentaphylli* 510.  
 — *Pereirae* 1183.  
 — *Pimpinellae* 1148.  
 — *Polygalae Hungaricae* 655.  
 — — *Senegae* 1191.  
 — *Polypodii* 352.  
 — *Pyrethri Germanici* 563.  
 — *Ratanha* 510.  
 — *Remorae aratri* 1172.  
 — *restae bovis* 1172.  
 — *Rhabarbari* 613.  
 — *Rhapontici* 614.  
 — *Rhei* 613.  
 — — *Monachorum* 614.  
 — — *tostus* 616.  
 — *Rubiae tinctorum* 403.  
 — *Salep* 330.  
 — *Salsaparillae* 829.  
 — *Sanguinariae* 840.  
 — *Saponariae* 836.  
 — *Sarsae* 829.  
 — *Sarsaparillae* 829.  
 — — *Indicae* 832.  
 — *Scillae* 1167.  
*Radix Senegae* 1146.  
 — *Serpentariae* 949.  
 — *Sumbul* 965.  
 — *Taraxaci* 662.  
 — *Tormentillae* 510.  
 — *Turpethi* 632.  
 — — *spurii* 530.  
 — *Uncomocomo* 206.  
 — *Valerianae* 949.  
 — — *alpinae u. a. m.* 950.  
 — *Veratri albi* 886.  
 — *Vincetoxici* 589.  
 — *Zedoariae* 566.  
*Radix Zingiberis* 566.  
*Räucherkerzen* 407.  
*Räucherspecies* 131. 407.  
*Raffinade* 344.  
*Ragolos Mittel gegen Epilepsie* 952.  
*Rahm* 732.  
*Rainfarn* 209.  
*Ramuli Sabinae* 1192.  
*Raphanus sativus* 366.  
*Rasura ligni Guajaci* 833.  
*Ratafia* 975.  
*Ratanha* 510.  
*Ratanha, deutsche* 510.  
*Ratanhaextract, amerikanisches* 512.  
*Rauchspecies* 131.  
*Rautenöl* 1195.  
*Receptirkunst* 4.  
*Rechtsweinsäure* 872.  
*Refrigerantia* 74.  
*Reglisse, weisse* 329.  
*Regulus Antimonii* 572.  
*Reis* 743.  
*Reissblei* 277.  
*Reizsalbe* 525. 581.  
*Reitersalbe* 762.  
*Relaxantia* 77.  
*Remedia* 1.  
*Remedium universale* 2.  
*Rennet wine* 666.  
*Reseda* 418.  
*Residuum resinorum Chinini* 866.  
*Resina* 10.  
 — *acaroides* 210.  
 — *alba* 544.  
 — *Benzoës* 406.  
 — *Burgundica* 544.  
 — *Chinae praeparata* 866.  
 — *citrina* 544.  
 — *Colophonium* 542.  
 — *communis* 544.  
 — *Copaivae* 1189.  
 — *Dammar* 395.  
 — *Draconis* 402.  
 — *elastica* 387.  
 — *Elemi* 547.  
 — *empyreumatica liquida* 550.  
 — *Euphorbii* 528.  
 — *flava* 544.  
 — *Guayaci* 833.  
 — *Hederae* 549.  
 — *Jalapae* 629.  
 — *Kino* 514.  
 — *laricis* 544.  
 — *lutea Novi Belgii* 210.  
 — *Mastiche* 395.  
 — *Pini* 544.  
 — *Sandaraca* 396.  
*Rosina Scammoniae* 631.  
*Resinate* 11.  
*Resina Thapsiae* 530.  
*Resineon* 555.  
*Resolventia* 62.  
*Resorcin* 300.  
*Resorptionswirkung* 25.  
*Respirationsmittel* 62.  
*Rettig* 366.  
*Revalenta* 744.  
*Bevalesscière* 744.  
*Revulsive Heilmethode* 46.  
*Rhabarber* 613.  
*Rhabarbarin* 615.  
*Rhamnocathartin* 623.  
*Rhapontikwurzel* 614.  
*Rheum officinale u. a. Species* 613.  
*Rhigolen* 214.  
*Rhizoma* 5.  
 — *Asari* 589.  
 — *Calami* 657.  
 — *Caricis* 835.  
 — *Chamaelirii* 1205.  
 — *Chinae* 831.  
 — *Curcumae* 405.  
 — *Filicis* 203.  
 — *Galangae* 565.  
 — *Graminis* 352.  
 — — *Italici* 352.  
 — *Imperatoriae* 962.  
 — *Iridis* 410.  
 — *Polypodii* 352.  
 — *Tormentillae* 510.  
 — *Valerianae* 949.  
 — *Veratri* 886.  
 — — *viridis* 891.  
 — *Zedoariae* 566.  
 — *Zingiberis* 566.  
*Rhodankalium* 886.  
*Rhododendron chrysanthum* 845.  
*Rhoadin* 1034. 1060.  
*Rhus coriaria* 509.  
 — *toxicodendron* 838.  
*Ribkes Kinderpulver* 617.  
*Richardsonia scabra* 583.  
*Ricinusöl* 595.  
*Riechmittel* 50.  
*Riechpulver* 133.  
*Riechsalz* 135.  
*Roborantia* 62.  
*Rochellesalz* 607.  
*Röhrencassie* 595.  
*Roggenmehl* 743.  
*Rohrzucker* 343.  
*Rommershausens Augenessenz* 1207.  
*Roob Dauci* 352.  
 — *Ebuli* 876.  
 — *Juniperi* 1176.

- Roob Laffecteur 831.  
 — Sambuci 876.  
 Rophetica 44. 322. 418.  
 Rosa canina 877.  
 Rosenblätter 412.  
 Rosenholz 412.  
 Rosenhonig 349.  
 Rosenöl 411.  
 Rosensalbe 372.  
 Rosenschwämme 508.  
 Rosenwasser 411.  
 Rose wood 412.  
 Rosinen 353.  
 Rosmarinus officinalis 538.  
 Rosmarin, wilder 845.  
 Rosskastanienrinde 509. 870.  
 Rosswurzel 835.  
 Rotulae 136.  
 — Calami 658.  
 — Menthae piperitae 959.  
 — Sacchari 136.  
 Rouge végétal 405.  
 Rubefacientia 44.  
 Rubia tinctorum 403.  
 Rubus villosus 510.  
 Ruchgras 410.  
 Rüböl 240.  
 Ruhrwurzel 510. 583. 651.  
 Rum 975.  
 Runkelrübe 343.  
 Russ 279.  
 Russische Bäder 187.  
 Rusma 818.  
  
 Sabadillsamen 216.  
 Sabina 1192.  
 Saccharolatum 139.  
 — Lichenis Islandici 654.  
 Saccharum 343.  
 — aluminatum 497.  
 — hordeatum 343.  
 — lactis 346.  
 — Saturni 487.  
 Saccharure 139.  
 — d'extract de cubèbe 1187.  
 — d'iode 795.  
 Saccharuretum Lichenis Islandici 654.  
 Sadebaum 1192.  
 Säftchen 346.  
 Sauerlinge 689. 1001.  
 Saflor 405.  
 Safran 403.  
 Sagapenum 964.  
 Sago 747.  
 Sal acetosellae 878.  
 — amarum 611.  
 — ammoniacum depuratum 1153.  
 — Anglicum 611.  
 Salbe 153.  
 — flüchtige 993..  
 — flüssige 169.  
 — graue 762. 766.  
 Salbei 559.  
 Sal Carolinum factitium 611.  
 — catharticum 609.  
 — culinare 673.  
 — de duobus 612.  
 Sale amarissimo anti-febrile 653.  
 Salep 330.  
 Salepschleim 331.  
 Salep, Westindischer 746.  
 Sal Epsomense 612.  
 — essentielle Tartari 872.  
 — febrifugum Sylvii 1112.  
 — fossile 673.  
 — gemmae 673.  
 Salicin 870.  
 Salicylamid 34.  
 Salicylsäure 307.  
 Salicylsaures Natrium 307.  
 Sal marinum 673.  
 Salmiak 1153.  
 Salmiakgeist 988.  
 Sal mirabile 609.  
 — — perlatum 608.  
 — montanum 673.  
 — odoratum 135.  
 Salpeter 880.  
 Salpeterpapier 884.  
 Salpetergeist, versüsster 1144.  
 Salpetersäure 433.  
 Salpetrigsäureaether 1144.  
 Salpetrigsäure-Amylaether 1142.  
 Sal polychrestum Glauberi 609.  
 — Prunellae 884.  
 — sedativum Hombergii 270.  
 — Sodae 681.  
 — Succini volatile 972.  
 — Tartari 690.  
 — thermarum Carolinarum factitium 611.  
 Salvia columbariae 334.  
 Sal volatile 994.  
 — — cornu cervi 997.  
 — — oleosum Sylvii 994.  
 Salzaether, leichter 1030.  
 Salzbäder 677.  
 Salzgeist, versüsster 1030.  
 Salzsäure 667.  
 Salzsäureaether 1030.  
 Salzsoolen 673.  
 Samenemulsion 173.  
 Sandaraca 396.  
 — Germanica 396.  
 Sanguis 729.  
 — Draconis 402.  
 Sanguisuga 422.  
 Santelholz 402. 412. 1192.  
 Santolina rosmarinifolia 539.  
 Santoninnatrium 209.  
 Santonium 206.  
 Saoria 202.  
 Sapo Alicantinus 398.  
 — aromaticus pro balneo 399.  
 — Coccois 398.  
 — Crotonis 642.  
 — dentifricius 400.  
 — domesticus 398.  
 — Glycerini 398.  
 — guajacinus 834.  
 — jalapinus 630.  
 — iodatus 797.  
 — kalinus 222.  
 — Kalii sulfurati 825.  
 — medicatus 397.  
 — mellis 400.  
 — mollis 222.  
 Saponos cosmetici 399.  
 — medicinales 12. 149. 398. 400.  
 Sapo niger 222.  
 Saponin 836.  
 Saponurés 400.  
 Sapo oleaceus 398.  
 — pellucidus 398.  
 — sebacinus 398.  
 — Starkeyanus 940.  
 — Tannini 504.  
 — terebinthinatus 940.  
 — unguinosus 451.  
 — viridis 222.  
 Sareptasenf 534.  
 Saracenia purpurea 842.  
 Sarsapilla 830.  
 Sarsaparillabkochung 831.  
 Sarsaparille, deutsche 835.  
 — ostindische 832.  
 Sassafrasnüsse 832.  
 Sassafras officinale 335. 832.  
 Sassaparille 829.  
 Sassy Rinde 1172.  
 Saturatio 170.  
 Satureja 542.  
 Sauborns Krebstropfen 940.  
 Sauerhonig 448.

- Sauerklee 877.  
 Sauerkleesalz 878.  
 Sauerstoff 252.  
 — ozonisirt 252.  
 Saulharz 395.  
 Saxoleum inspissatum 375.  
 Saxolin 375.  
 Scammoniumharz 631.  
 Scepastica 322.  
 Schafgarbe 661.  
 Schafrippenthe 662.  
 Scharlachsyrup 402.  
 Schaumweine 974.  
 Scheidewasser 433.  
 Schellack 402.  
 Schierlingskraut 904.  
 Schiessbaumwolle 389.  
 Schiffspech 551.  
 Schlagwasser 561.  
 Schlangenmoos 375.  
 Schlangenholz 913.  
 Schlangenpulver 375.  
 Schlangentrunk, weisser 990.  
 Schlehenblüthen 1119.  
 Schleim 182.  
 Schleimharz 10.  
 Schlipfesches Salz 823.  
 Schluckkugeln 138.  
 Schlüsselblumen 1159.  
 Schmierkur 762.  
 Schmierseife 222.  
 Schminkbohne 744.  
 Schminklappchen 402.  
 Schmuckersche Fomentationen 884.  
 Schnabelsche Haferkur 743.  
 Schnupfpulver 133.  
 Schnupftabak 240. 889.  
 Schobelts Zahnwehmittel 712.  
 Schöllkraut 839.  
 Schönheitskugeln 400.  
 Schüttelmixtur 172.  
 Schutztaffet 292.  
 Schwalbenwurz 589.  
 Schwanzpfeffer 1185.  
 Schwarzwurzel 335.  
 Schwefel 224.  
 Schwefeläther 1009.  
 Schwefeläthergeist 1016.  
 Schwefelantimoncalcium 749.  
 Schwefelbäder, künstliche 824.  
 Schwefelblumen 224.  
 Schwefelcalcium 233.  
 Schwefelcyanakrinyl 537.  
 Schwefelcyanallyl 534.  
 Schwefelcyanbutyl 559.  
 Schwefeleisen, hydratisches 246.  
 Schwefelkohlenstoff 1008.  
 Schwefelleber 821.  
 Schwefelleberseife 825.  
 Schwefelmilch 224.  
 Schwefelnatrium 825.  
 Schwefelpaste, Hebras 232.  
 Schwefel, plastischer 224. 227.  
 Schwefelquecksilber 779.  
 Schwefelquellen 825.  
 Schwefelräucherung 231.  
 Schwefelsäure 426.  
 Schwefelsäuren, gepaarte 34.  
 Schwefelsalben 231.  
 Schwefelspiessglanz 748.  
 Schwefelwasserstoffgas 822.  
 Schwefelwasserstoff-Schwefelammonium, flüssiges 825.  
 Schwefelwasserstoff-Schwefelcalcium 233.  
 Schwefelwasserstoffwasser 822. 825.  
 Schweflige Säure 255.  
 Schweineschmalz 367.  
 Schwererde, salzsaure 805.  
 Scilla maritima 1167.  
 Scincus marinus 727.  
 Scleromucin 1196.  
 Sclerotinsäure 1196. 1204.  
 Scoparin 1173.  
 Scorbutkraut 558.  
 Scutellaria lateriflora 841.  
 Sebum ovile 370.  
 — ovillum carbolisatum 297.  
 Secale cereale 743.  
 — cornutum 1195.  
 Secte 974.  
 Sedantia 57. 76.  
 Seebäder 679.  
 Seegras 421.  
 Seesalz 673.  
 Seide, antiseptische 297.  
 Seidelbastrinde 529.  
 Seidlitzpulver 607.  
 Seife 12. 241.  
 — medicinische 140. 397.  
 Seifenessenzen 400.  
 Seifenpflaster 400.  
 Seifenspiritus 224.  
 Seife, schwarze 222.  
 — venetianische 398.  
 Seignette Salz 607.  
 Selleri 1177.  
 Selterswasser 689.  
 Semen Ammi 1177.  
 — Anisi 1148.  
 — — stellati 1149.  
 — Apii 1177.  
 — Avenae excorticatum 743.  
 — Badiani 1149.  
 — Cacao 745.  
 — Cannabis 362.  
 — Carvi 960.  
 — Cataputiae minoris 598.  
 — Cedron 650.  
 — Cinae 206.  
 — Cocculi 998.  
 — Colchici 842.  
 — Coriandri 417.  
 — Cucurbitae 211.  
 — Cumini 960.  
 — Cydoniae 334.  
 — Cynosbati 877.  
 — Daturae 1094.  
 — Erucae 537.  
 — Faenugraeci 744.  
 — Foeniculi 1205.  
 — — aquatici 1151.  
 — Hyoscyami 1096.  
 — Indurjao 106.  
 — Lini 364.  
 — Lycopodii 375.  
 — Myristicae 567.  
 — Nigellae 1207.  
 — Oryzae 743.  
 — Papaveris 362.  
 — Pedicularis 217.  
 — Petroselini 1176.  
 — Phellandrii 1151.  
 — Physostigmatis 924.  
 — Psyllii 334.  
 — Quercus tostum 747.  
 — Sabadillae 216.  
 — Santonicae 206.  
 — Sinapis albae 537.  
 — — nigrae 534.  
 — — viridis 534.  
 — Staphisagriae 217.  
 — Stramonii 1094.  
 — Strychni 913.  
 — Zedoariae 206.  
 Semina chia 334.  
 — Gnidii 529.  
 — quatuor frigida 366.  
 Senegawurzel 1146.  
 Senekaöl 213.  
 Senföl 534.  
 Senfpapier 537.  
 Senfsamen 534.  
 — weisse 537.  
 Senfteig 536.  
 Sennapräparate 622.



- Sennesblätter 618.  
 Sericum Anglicum 339.  
 Serpentaria 949.  
 Serronia Jaborandi 1159.  
 Serum lactis 182. 730.  
 — — acidum 605.  
 — — aluminatum 498.  
 — — carbonico-acidulum 732.  
 — — chalybeatum 710.  
 — — dulce 183.  
 — — sinapisatum 183. 537.  
 — — tamarindinum 877.  
 Seufzerpillen von Closs 498.  
 Sexualmittel 1184.  
 Sherry 974.  
 Sialagoga 49. 85.  
 Siderokrenen 709.  
 Siegelerde 383.  
 Signatur 17. 123.  
 Sikkimfrüchte 1149.  
 Silberglätte 392.  
 Silbernitra 460.  
 Silberoxyd 472.  
 Silbersalpeter 460.  
 Silbersalmiak 473.  
 Silbersalze, diverse 473.  
 Siliqua dulcis 353.  
 — hirsuta 210.  
 — Indica 877.  
 — Tamarindorum 877.  
 — Vanillae 408.  
 Silphium 530.  
 Silybum Marianum 648. ✓  
 Simaruba 650.  
 Sinalbin 537.  
 Sinapismus 536.  
 Sinigrin 535.  
 Sintocrinde 570.  
 Sirop au copahu 1192.  
 — de chaux 698.  
 — — codéine 1057.  
 — — Cuisinier 831.  
 — — Henri Mure 1103.  
 — — Nafé 334.  
 — — Papaine 667.  
 — d'éther 1015.  
 — sudorifique 831.  
 Slivoviz 975.  
 Smalte 406.  
 Smilacin 830.  
 Soda 681.  
 Sodapastillen 688.  
 Soda phosphorata 608.  
 — powder 689.  
 — vitriolata 609.  
 Sodawasser 688.  
 Solanin 837.  
 Soluté ioduré caustique 796.  
 — — rubéfiant 796.  
 Solutio 156.  
 — Aluminae benzoica 272.  
 — Ammonii valerianici 997.  
 — arsenicalis Bietti 818.  
 — — Fowleri 805.  
 — — Pearsoni 818.  
 — Asae foetidae aquosa 964.  
 — bromo-arsenicalis 818.  
 — Calcariae sulfuratae 232.  
 — carnis 729.  
 — Donovanii 818.  
 — Fowleri 805.  
 — Freibergi 772.  
 — Iodi spiritiosa 796.  
 — — Leontodon 663.  
 — Morphini 1056.  
 Solution of iodine 797.  
 — — leontodon 663.  
 Solutio Plenckii 772.  
 — Tartari depurati 605.  
 Solventia 39.  
 Sonnenblumenöl 366.  
 Soolbäder 677.  
 Soporifica 77.  
 Sore throat salt 884.  
 Spagirica 572.  
 Spanisch Fliegenpräparate 525. 526.  
 Spanischhopfenöl 542.  
 Spanischpfeffertinctur 532.  
 Sparadrap 148. 483.  
 — de Vigo 764.  
 Spartein 1173.  
 Species 129.  
 — ad clyisma viscerale 662.  
 — — decoctum galactopoeum Bergii 1206.  
 — — lignorum 834.  
 — — fomentum 540.  
 — — fumigationem 131.  
 — — gargarisma 333.  
 — — suffiendum 407.  
 — aromaticae 540.  
 — cephalicae 540.  
 — compressae 132.  
 — diatragacanthae 329.  
 — discutientes 957.  
 — emollientes 333.  
 — hierae picrae 627.  
 — laxantes 621.  
 — lignorum 834.  
 — pectorales 333.  
 — pro clysteribus 662.  
 — — cucuphis 540.  
 Species pro fumo 131.  
 — purgantes 610.  
 — resolventes 540. 957.  
 — viscerales 662.  
 Specificum 1.  
 — purgans Paracelsi 612.  
 Speck 367.  
 Speckstein 383.  
 Spenders Salbe 454.  
 Spermaceti 373.  
 Spiessglanz 748.  
 Spiessglanzbutter 460.  
 Spiessglanzmetall 572.  
 Spiessglanzwein 582.  
 Spigelia 211.  
 Spinnewebe 421.  
 Spiritus 12. 973.  
 — acetico - aethereus 1016.  
 — — — martiatus 715.  
 — Aeruginis 987.  
 — aethereus 1015.  
 — — benzoatus 407.  
 — — oleosus 1016.  
 — Aetheris acetici 1016.  
 — — chlorati 1030.  
 — — nitrosi 1144.  
 — Ammoniaci caustici Dzondii 988.  
 — Angelicae compositus 961.  
 — Anhaltinus 539.  
 — antiparalyticus 948.  
 — ardens 975.  
 — aromaticus 417.  
 — camphoratus 947.  
 — Carvi 960.  
 — Cochleariae 559.  
 — coeruleus 539.  
 — Coloniensis 416.  
 Spiritusdampfbäder 183. 986.  
 Spiritus dilutus 973.  
 — Ferri chlorati aethereus 719.  
 — formicarum 527.  
 — frumenti 975.  
 — fumans Glauberi 668.  
 — Juniperi 1176.  
 — Kreosoti 305.  
 — Lavandulae compositus 541.  
 — lignosus 987.  
 — Mastiches compositus 396.  
 — matricalis 396.  
 — Melissa compositus 417.  
 — Menthae piperitae Anglicus 959.  
 — Mindereri 1164.

- Spiritus muriatico-aethe-  
 reus 1030.  
 — nitri acidus 433.  
 — — dulcis 1144.  
 — — fumans 433.  
 — nitrico-aethereus 1144.  
 — nitroso-aethereus 1144.  
 — Oryzae 975.  
 — pyro-aceticus 987.  
 — pyroxylicus 987.  
 — Rosmarini compositus  
 539.  
 — Sacchari 975.  
 — salis 668.  
 — — ammoniaci anisatus  
 993.  
 — — — aquosi 996.  
 — — — causticus 988.  
 — salis dulcis 1030.  
 — saponatus 224.  
 — Serpylli 542.  
 — Sinapis 537.  
 — Solani tuberosi 975.  
 — sulfurico-aethereus  
 1015.  
 — Terebinthinae 935.  
 — theriacalis 961.  
 — vini Cognac 973.  
 — — Gallici 974.  
 — — rectif 973.  
 — Vitrioli 431.  
 — — dulcis 1015.  
 — — vulnerarius 539.  
 Spongiae ceratae 419.  
 — compressae 419.  
 — marinae 419.  
 — tostae 419.  
 Spongilla lacustris 44.  
 Spongopiline 419.  
 Spray 292.  
 Stärke 339.  
 Stärkegummi 342.  
 Stärkemehl 339.  
 Stärkezucker 348.  
 Stahlkugeln 711.  
 Stahlpulver von Menzer  
 723.  
 Stahls Brandsalbe 697.  
 Stahlwässer 709.  
 Stanniol 396.  
 Stannum chloratum 1114.  
 — limatum 210.  
 Stanntriaethyl 1114.  
 Stearin 370.  
 Stearoptene 10.  
 Steatine 148.  
 Stechapfel 1094.  
 Steinklee 409.  
 Steinkohle 277.  
 Steinkohlentheer 280.  
 Steinöl 213.  
 Steinsalz 673.  
 Stephanskörner 217.  
 Stercus diaboli 963.  
 Sternanis 1149.  
 Sternkugelchen 138.  
 Sternutatoria 50.  
 Stevens Mittel gegen  
 Stein 697.  
 St. Germain Thee 621.  
 Stibio-Kali tartaricum  
 572.  
 Stibium arsenicosum 818.  
 — metallicum 572.  
 — oxydatum 572.  
 — sulfuratum aurantia-  
 cum 1151.  
 — — nigrum 748.  
 — — rubeum 1151.  
 — — rubrum 749.  
 Stickstoff 1006.  
 Stickstofftetroxyd 433.  
 Stickstoffmonoxyd 1005.  
 Stickstoffoxydul 1005.  
 Sticta pulmonacea 654.  
 Stiefmütterchen 837.  
 Stigmata 6.  
 — Croci 403.  
 — Maydis 1183.  
 Stinkasant 962.  
 Stinkasantpflaster 549.  
 Stinkthier 934.  
 Stipites 5.  
 — Chiratae 647.  
 — Dulcamarae 837.  
 — Jalapae 631.  
 Stirnsalbe, A. v. Graefes  
 774.  
 Stizolobium 44.  
 Stocklack 402.  
 Stockrose 333.  
 Stör 388.  
 Stolones 5.  
 — Graminis 352.  
 Stomachica 50. 565.  
 Storax 220.  
 Stramoniumcigarren  
 1096.  
 Streukugelchen 138.  
 Streupulver 133. 375. 498.  
 Streuzucker 138.  
 Strobili Lupuli 664.  
 Strychnin 913.  
 Strychninsalze 923.  
 Strychninum nitricum 913.  
 Strychnossamenextract  
 923.  
 Stuckverband 384.  
 Stütz Methode 691.  
 Stuhlzapfen 149.  
 Stuppa 421.  
 Sturmfederwein 540.  
 Sturmhutknollen 1135.  
 Styptica 58. 485.  
 Styrax 220.  
 Styrol 221.  
 Subcutaninjection 167.  
 Sublimat 769.  
 Sublimatalbuminat 772.  
 Sublimatalkaloide 779.  
 Sublimatcigarren 773.  
 Substitution 117.  
 Succinum 550.  
 — — marinum 373.  
 Sucre-tisane von Limou-  
 sin 829.  
 Succus Citri 874.  
 — cydoniorum expressus  
 877.  
 — Dauci 352.  
 — Glycyrrhizae 350.  
 — herbarum recentium  
 175.  
 — Juniperi inspissatus  
 1176.  
 — Liquiritiae 350.  
 — — tabulatus 351.  
 — recens 175.  
 — Sambuci inspissatus  
 876.  
 — Thebaicus 1033.  
 Sudorifica 93.  
 Süssholz 349.  
 Süssweine 974.  
 Süverns Desinfectionsmit-  
 tel 281.  
 Sulfas Aluminae et Po-  
 tassae cum Aqua 495.  
 Sulfidum carbonei 1008.  
 Sulfite 256.  
 Sulfocarbonate 299.  
 Sulfocyanalium 886.  
 Sulfocyanäure-Allylather  
 534.  
 Sulfomorphid 590.  
 Sulfophenylsäure 299.  
 Sulfotartras Chinini 864.  
 Sulfur 224.  
 — auratum Antimonii  
 1151.  
 — depuratum 224.  
 Sulfuretum Stibii 748.  
 1151.  
 Sulfur iodatum 804.  
 — praecipitatum 224.  
 — stibiatum aurantiacum  
 1151.  
 — sublimatum 224.  
 — vegetabile 375.  
 Sumbulwurzel 965.  
 Summitates Absinthii 659.  
 — Cannabis 1062.  
 — Meliloti 409.

- Summitates Millefolii 662.  
 — Sabinae 1192.  
 Sumpfporst 845.  
 Suppositorium 149.  
 — Morphiae 1055.  
 — Plumbi compositum 494.  
 — vaginale 150.  
 Suppurantia 45.  
 Sylvinsäure 544.  
 Symphytum officinale 335.  
 Synaptase 359.  
 Syringe 418.  
 Syrupus 14. 157.  
 — acetositis Citri 875.  
 — albus 346.  
 — Allii 538.  
 — Althaeae 333.  
 — Amygdalarum 361.  
 — Atropini 1092.  
 — balsamicus 220.  
 — Balsami Peruviani 220.  
 — — tolutani 408.  
 — capillorum Veneris 413.  
 + caput Papaveris 1060.  
 — Cerasi 875.  
 — Chamomillae 957.  
 — Cichorei cum Rheo 617.  
 — Cinnamomi 571.  
 — communis 344.  
 — corticis Aurantii 657.  
 — Croci 405.  
 — Diacodion 1060.  
 — domesticus 623.  
 — emulsivus 361.  
 — Ferri chlorati 714.  
 — — iodati 722.  
 — — oxydati solubilis 708.  
 — florum Aurantii 413.  
 — Foeniculi 1207.  
 — Glycyrrhizae 351.  
 — gummosus 329.  
 — Hollandicus 344.  
 — Hydrargyri 762.  
 — Ipecacuanhae 588.  
 — Kalii iodati 798.  
 — Kermesianus 402.  
 — lactis amygdalatus 734.  
 — Lichenis Islandici 654.  
 — Liquiritiae 351.  
 — Manna 595.  
 — Menthae 959.  
 — — crispae 960.  
 — — piperitae 959.  
 — Morphini 1055.  
 — Natrii chlorati 676.  
 — opiatu 1054.  
 — Papaveris 1060.  
 Syrupus Papaveris rubri 1061.  
 — pomorum acidulorum 876.  
 — Rhamni catharticae 623.  
 — Rhei 617.  
 — Rheados 1061.  
 — ribium 876.  
 — Rosae 412.  
 — Rubi Idaei 876.  
 — Sacchari 346.  
 — Sarsaparillae compositus 831.  
 — Senegae 1147.  
 — Sennae 622.  
 — — cum Manna 595. 622.  
 — simplex 346.  
 — spiniae cervinae 623.  
 — succi Citri 875.  
 — Violarum 589.  
 — Zingiberis 567.  
 Sweet Quinine 865.  
 Tabaksblätter 1125.  
 Tabernacula 138.  
 Tabulae 138.  
 Tacahamaca 549.  
 Taffetas adhaesivus 149. 339.  
 — ceratus 372.  
 Tafia 975.  
 Talcum 383.  
 Talg 370.  
 Tamarinden 877.  
 Tamarix Gallica mannifera 595.  
 Tampicin 629.  
 Tanacetum vulgare 209.  
 Tanjorepillen 814.  
 Tannenzapfenöl, Schweizer 940.  
 Tannin 240. 499.  
 Tannalbuminat 505.  
 Tapiocamehl 746.  
 Taraxacin 662.  
 Tarfastrauch 595.  
 Tar oil 551.  
 Tartarus ammoniatus 607.  
 — boraxatus 607.  
 — chalybeatus 711.  
 — depuratus 604.  
 — emeticus 572.  
 — ferratus purus 711.  
 — martiatus 711.  
 — natronatus 607.  
 — stibiatus 572.  
 — tartarisatus 606.  
 Tartarus vitriolatus acidus 613.  
 Tartras ferrico-kalicus 711.  
 Tatze 202.  
 Taurocholsäure 671.  
 Tausendgüldenkraut 647.  
 Taxus baccata 1194.  
 Tayuya 834.  
 Tela aranearum 421.  
 Temperantia 74.  
 Terebin 321.  
 Terebinthina cocta 544.  
 — communis 542.  
 — larinica 543.  
 — Veneta 543.  
 Terebinthusgallen 507.  
 Terpene 10.  
 Terpenthin 542.  
 — Carpathischer 543.  
 — chiotischer 543.  
 Terpenhindampfbäder 546.  
 Terpenthin, gekochter 544.  
 Terpenthinöl 935.  
 — künstliches 214.  
 — ozonisirtes 940.  
 Terpenthinölseife 940.  
 Terpenhinsalben 547.  
 Terra foliata tartari 1178.  
 — — crystallisata 1179.  
 — Japonica 512.  
 — ponderosa salita 805.  
 — sigillata 382.  
 Testae praeparatae 400.  
 Tetrachlorkohlenstoff 1030.  
 Teufelsdreck 962.  
 Teufelsklauen 376.  
 Thapsia 530.  
 Thebain 1034. 1045. 1058.  
 Thedens Wundwasser 432.  
 Theeblätter 966.  
 Thee, Blankenheimer 655.  
 Theer 550.  
 Theerkapseln von Guyot 553.  
 Theeröl 551.  
 Theerseife 554.  
 Theerwasser 553.  
 Theinum 965.  
 Theobromin 745.  
 Theriak 1054.  
 Thermalsoolbäder 679.  
 Thermen, indifferente 828.  
 Thierkohle 276.  
 Thieröl, ätherisches 1115.



- Thiokrenen 825.  
 Thiosinnamin 535.  
 Thonerdehydrat 498.  
 Thonerdelösung, essig-  
 saure 271.  
 Thonerde, reine 498.  
 — schwefelsaure 271.  
 Thonerdetannat 506.  
 Thon, weisser 381.  
 Thridax 1061.  
 Thuja 538.  
 Thus 549.  
 — vulgare 544.  
 Thymen 541.  
 Thymiancampher 305.  
 Thymianöl 541.  
 Thymiansäure 305.  
 Thymian, wilder 541.  
 Thymolum 305.  
 Tinctura 12.  
 — Absinthii 661.  
 — Aconiti 1141.  
 — Aloës 627.  
 — — composita 627.  
 — amara 646.  
 — — Biesteri 661.  
 — Ambrae 418.  
 — anodyna simplex 1053.  
 — Antimonii acris 452.  
 — antispasmodica Len-  
 tini 952.  
 — Arnicae 955.  
 — aromatica 571.  
 — — acida 432.  
 — Asae foetidae 964.  
 — Aurantii 656.  
 — aurea tonico-nervina  
 Lamottii 719.  
 — balsamica 407.  
 — Balsami Peruviani 220.  
 — Belladonna 933.  
 — Benzoës 407.  
 — — composita 407.  
 — Calami 658.  
 — Camphorae 947.  
 — — composita 1054.  
 — Canabis Indicae 1065  
 — Cantharidum 525.  
 — Capsici 532.  
 — Cascarillae 659.  
 — Castorei 934.  
 — Catechu 513.  
 — Chelidonii 840.  
 — Chinae 860.  
 — composita 860.  
 — Chinoidini 866.  
 — Cinnamomi 571.  
 — Coccae 972.  
 — Coccinellae 520.  
 — Coccionellae 402.  
 — Colchici 844.  
 Tinctura Colocynthis  
 635.  
 — Aurantii 656.  
 — Coto 516.  
 — Croci 405.  
 — Cubebae 1187.  
 — Cupri acetici 483.  
 — Dasjespis 935.  
 — Digitalis 900.  
 — Erigerontis 1178.  
 — Eucalypti 869.  
 — Euphorbii 529.  
 — Ferri acetici aetherea  
 715.  
 — — Rademacheri  
 715.  
 — — ammoniata 719.  
 — — chlorati 714.  
 — — — aetherea 719.  
 — — Perchloridi 719.  
 — — pomata 710.  
 — — Sesquichloridi 719.  
 — — tartarici 712.  
 — — vinosa cum auran-  
 tiis 710.  
 — Foeniculi composita  
 1207.  
 — Fowleri 805.  
 — Fuliginis Clauderi  
 279.  
 — Galbani 548.  
 — gallarum 508.  
 — Gentianae 646.  
 — gingivalis 170. 563.  
 — Guajaci 834.  
 — — ammoniata 834.  
 — Gutti kalina 638.  
 — Hellebori 1171.  
 — Hyracei 935.  
 — Jalapae composita  
 631.  
 — Iodi 796.  
 — aetherea 797.  
 — — decolorata 803.  
 — Ipecacuanhae vinosa  
 587.  
 — Kino 514.  
 — kalina 452.  
 — Kamala 203.  
 — Laccae 402.  
 — Lobeliae 1133.  
 — martialis Klaprothi  
 715.  
 — Martis aperitiva 719.  
 — — Ludovici 712.  
 — Meconii 1053.  
 — Menthae piperitae  
 959.  
 — mineralis Fowleri  
 805.  
 — Moschi 932.  
 Tinctura Myrrhae 562.  
 — — composita 563.  
 — — nucis vomicae 923.  
 — — Opii ammoniata 1054.  
 — — benzoica 1054.  
 — — crocata 1053.  
 — — Eckardi 1053.  
 — — fermentata 1054.  
 — — nigra 1054.  
 — — simplex 1053.  
 — Pimpinellae 1148.  
 — Pini composita 1150.  
 — Ratanhiae 511.  
 — resinae Jalapae 631.  
 — Rhei 617.  
 — Sabinae 1194.  
 — salis Tartari 452.  
 — Scillae 1170.  
 — — kalina 1170.  
 — Secalis cornuti 1204.  
 — sedativa von Magendie  
 1056.  
 — seminis Colchici 844.  
 — Spilanthidis composita  
 564.  
 — stomachica 646. 657.  
 — Stramonii 1097.  
 — Strychni 923.  
 — — aetherea 923.  
 — sulfuris volatilis 825.  
 — Thebaica 1053.  
 — Thujae 538.  
 — tonico-nervina Bestu-  
 scheffii 719.  
 — Toxicodendri 838.  
 — Valerianae 952.  
 — — composita 952.  
 — Vanilla 409.  
 — Veratri albi 889. 891.  
 — — viridis 892.  
 — Veratrini 891.  
 — Zingiberis 567.  
 Tienté 910. 913.  
 Tjientjang 336.  
 Tiglinsäure 639.  
 Tilly-Oel 232.  
 Tisane 180.  
 Tissu électromagnétique  
 386.  
 Toile caoutchouqué 387.  
 Toiletteseife 399.  
 Tokayer 974.  
 Toleranz 105.  
 Tollkirsche 1080.  
 Tolubalsam 408.  
 Toluol 551.  
 Toluylsäure 34.  
 Tomato 18.  
 Tonga 1095. 1208.  
 Tonica 62.  
 Tonkabohnen 410.

- Tormentillwurzel 510.  
 Tragacantha 329.  
 Traganth 329.  
 Tragemata 137.  
 Tragopogon 335.  
 Transfusion 117.  
 Transparentseife 398.  
 Trauben 605.  
 Traubencerat 374.  
 Traubencuren 605.  
 Traubenkraut, Mexica-  
 nisches 953.  
 Traubenlack 402.  
 Traubenmost, süß 606.  
 Traubenzucker 348.  
 Traumaticinum 336.  
 Treacle 344.  
 Trehala 595.  
 Trianosperma ficifolia 834.  
 Tricala 595.  
 Trichloraldehyd 1066.  
 Trichlormethan 1017.  
 Trimethylamin 737.  
 Trinitrocellulose 389.  
 Trinitrophenylalkohol 210.  
 Trisulfocarbonsäure 34.  
 Trisulfocarbonsäure Alka-  
 lien 1009.  
 Trochisci 138.  
 — Acidi tartarici 873.  
 — Alhandal 634.  
 — bechici nigri 351.  
 — Bismuti hydrico-nitrici  
 380.  
 — Castorei 934.  
 — cubebini 1191.  
 — excipientis 139.  
 — Magnesiae ustae 603.  
 — Morphini acetici 1056.  
 — Natrii bicarbonici 688.  
 — Sacchari 139.  
 — Santonini 209.  
 — seripari 184.  
 Trona 682.  
 Tropaeae 1100.  
 Tropfen 165.  
 Tropin 1080.  
 Tuber 5.  
 — Aconiti 1135.  
 — Jalapae 628.  
 Tubericidium Orchidis 330.  
 Tuberosa 418.  
 Tuber Salep 330.  
 Türkische Bäder 188.  
 Tunica bracteata 396.  
 Tupelostifte 420.  
 Turiones 6.  
 — Pini 1150.  
 Turnera aphrodisiaca 965.  
 Turpethum minerale 778.  
 — nitrosum 777.  
 Turpithwurzel 632.  
 Tutia 381.  
 Uebermangansäure 273.  
 Ulmenrinde 509.  
 Ultramarin 406.  
 Unguentum 153.  
 — acre 526.  
 — ad fonticulos 526.  
 — — phthiriasin 217.  
 — Aegyptiacum 483.  
 — album simplex 393.  
 — ammoniacale Gondretii  
 992.  
 — Argenti nitrici Clinici  
 472.  
 — aromaticum 539.  
 — arsenicale Hellmundi  
 817.  
 — Autenriethii 581.  
 — — contra decubitus  
 506.  
 — basilicum 546.  
 — — fuscum 547.  
 — Cantharidum 525.  
 — cereum 372.  
 — Cerussae 393.  
 — — camphoratum 394.  
 — Cicutae 909.  
 — cinereum 762.  
 — citrinum 547.  
 — Conii 909.  
 — contra pediculos 217.  
 — de Nihilo albo 381.  
 — — uvis 374.  
 — diachylon Hebra 392.  
 — digestivum 547.  
 — — fortius 155.  
 — Digitalis 901.  
 — e lapide calaminari  
 381.  
 — Elemi 547.  
 — emolliens 374.  
 — epispasticum 525. 526.  
 — 530.  
 — epuloticum 381.  
 — exsiccans 382.  
 — flavum 547.  
 — Gallae et Opii 1055.  
 — Glycerini 358.  
 — Guthrianum 472.  
 — haemorrhoidale 487.  
 — Hydrargyri album 774.  
 — — amidato-bichlorati  
 774.  
 — — cinereum 762.  
 — — praecipitati albi  
 774.  
 — — rubrum 765.  
 Unguentum Hyoscyami  
 1099.  
 — irritans 525.  
 — Iodi compositum 797.  
 — — Rademacheri 797.  
 — Kalii iodati 797.  
 — Kreosoti 305.  
 — laurinum 369.  
 — leniens 374.  
 — Linariae 335.  
 — Majoranae 542.  
 — matris 394.  
 — mellitum 154.  
 — mercuriale 762.  
 — — citrinum 777.  
 — Mezerei 530.  
 — narcotico-balsami-  
 cum Hellmundi 909.  
 — Neapolitanum 762.  
 — nervinum 369. 539.  
 — 540.  
 — nigrum 156. 472.  
 — ophthalmicum 154. 765.  
 — — compositum 765.  
 — opiatum 1055.  
 — oxygenatum 436.  
 — Paraffini 374.  
 — paralyticum 430.  
 — Plumbi 487.  
 — — compositum 487.  
 — — subcarbonici 393.  
 — — tannici 506.  
 — Populi 1150.  
 — resinae Pini 547.  
 — rosatum 372.  
 — Rosmarini compositum  
 539.  
 — rubefaciens 530.  
 — Sabinae 1194.  
 — stibiatus 581.  
 — Styracis 221.  
 — sulfuratatum simplex  
 231.  
 — Sulfuris compositum  
 231.  
 — Tartari stibiati 581.  
 — Terebinthinae 547.  
 — — compositum 547.  
 — Turneri 381.  
 — universale 487.  
 — Veratrin 891.  
 — Zinci 381.  
 Universalmittel 2.  
 Untersalpetersäure 433.  
 Unterschwefelsäure 257.  
 Unterschweifligsaures  
 Natron 257.  
 Upas 910. 913.  
 Urari 910.  
 Urceola elastica 387.  
 Urea nitrica 1180.

- Urobutylchloralsäure 1079.  
 Urson 509.  
 Urtica 528.  
 Ustilago Maydis 1196.  
 Uvae 353.  
  
 Valdivin 650.  
 Vaginalkapseln 140.  
 Vaginalkugeln 150.  
 Valeriana 949. 950.  
 Valeriansäure 950.  
 Valletsche Pillen 709.  
 Valonen 507.  
 Vanilla 408.  
 — saccharata 409.  
 Vanillechocolade 745.  
 Vanillin 409.  
 Vaselineöl 375.  
 Vaselinum 375.  
 Veilchen 418. 589.  
 Veilchensyrup 589.  
 Veilchenwurzel 410.  
 Venena 37.  
 Venenum Americanum 910.  
 Venuspaste 400.  
 Veratrin 886.  
 Veratroidin 891.  
 Veratrum album 886.  
 — Lobelianum 891.  
 — luteum 1205.  
 — viride 891.  
 Verband, antiseptischer 43.  
 Verbena triphylla 418.  
 — urticifolia 1204.  
 Vesicantia 44.  
 Vesicantien, fliegende 526.  
 Vesicatorin 519.  
 Verstäubungsmethode 185.  
 Vichyplätzchen 688.  
 Viehstallcuren 1004.  
 Villatesche Lösung 446. 481.  
 Vinum 973.  
 — Antimonii Huxhami 582.  
 — aromaticum 540.  
 — bonum nostras 975.  
 — camphoratum 948.  
 — chalybeatum 706.  
 — Chinae 860.  
 — — martiatum 706.  
 — Colchici 844.  
 — Condurango 841.  
 — emeticum 582.  
 — ferratum 706.  
 — generosum album 974.  
  
 Vinum Antimonii rubrum 974.  
 — Ipecacuanhae 587.  
 — Kreosoti 305.  
 — Madeirense 974.  
 — Malacense 974.  
 — medicatum 13.  
 — Opii 1053. 1054.  
 — paregoricum 1053.  
 — Pepsini 666.  
 — Rhei 617.  
 — seminis Colchici 844.  
 — stibiatum 582.  
 — Tocaiense 974.  
 — Xerense 974.  
 Vinylchlorür-Chlorwasserstoff 1031.  
 Viola odorata 418. 589.  
 — tricolor 837.  
 Viper 727.  
 Virginia Vaseline 375.  
 Viride aeris 482.  
 Viridin 891.  
 Visceralklystiere 662.  
 Vitellus ovi 729.  
 Vitrum Antimonii 572.  
 Vitriolmolke 183.  
 Vitriolspiritus 431.  
 Vitriolum album purum 473.  
 — coeruleum 476.  
 — Cupri 476.  
 — Martis 272. 715.  
 Vitriolöl 427.  
 Vitriolum viride 272. 715.  
 Vitsbohne 744.  
 Vlemingksche Solution 232.  
 Vogelbeeren 876.  
 Vogelnester, ostindische 336.  
 Vulcanöl 214.  
  
 Wacholderbeeren 1174.  
 Wacholderbeeröl 1174.  
 Wachs 371.  
 Wachsarten 372. 373.  
 Wachsbugies 372.  
 Wachs, Chinesisches 373.  
 Wachsemulsion 372.  
 Wachs, grünes 483.  
 — Japanisches 372.  
 Wachsöl 371.  
 Wachspapier 372.  
 Wachspflaster 148.  
 Wachssalbe 372.  
 Wachsschwämme 419.  
 Wachstaffet 372.  
 Wasser, destillirte 12.  
  
 Wahlersche Frostsalbe 707.  
 Waid 406.  
 Waldmeister 410.  
 Waldwollöl 546.  
 Walfischthran 740.  
 Walnuss 366. 835.  
 Walrat 373.  
 Wandflechte 615.  
 Warrens blutstillender Balsam 432. 940.  
 Waschpulver 133.  
 Waschung 160.  
 Waschwasser, Kummerfeldsches 230.  
 Wasser 827.  
 Wasser, destillirtes 828.  
 Wasserfenchel 1151.  
 Wasserglas 385.  
 Wassermelone 366.  
 Wasserschierling 904.  
 Wasserstoffsulfid 822.  
 Wasserstoffsuperoxyd 255.  
 Watte 388.  
 Wegwartwurzel 663.  
 Weichharze 11.  
 Weidenrinde 870.  
 Weihrauch 549.  
 Wein 973.  
 Weinbergsschnecke 727.  
 Weinessig 444.  
 Weingeist 973.  
 — geheimer der Adepten 987.  
 Weinsäure 872.  
 Weinstein 604.  
 Weintrauben 605.  
 Weissbrod 743.  
 Weizenkleie 743.  
 Weizenmehl 743.  
 Weizenstärke 339.  
 Werg 421.  
 Wergverbände 546.  
 Wermut 659.  
 Westcappsches Bauernmittel bei Angina 498.  
 Whisky 975.  
 Wiener Aetzpaste 452.  
 — Trank 621.  
 Wildbäder 828.  
 Wilkinsonsche Salbe 230.  
 Windsorseife 398.  
 Wintergrünöl 316.  
 Winters Rinde 571.  
 Wismutnitrat, basisches 376.  
 Wismutsalze, diverse 381.  
 Wismutvalerianat 1114.  
 Wismutweiss 376.  
 Wohlverleihblüthen 953.



Wollblumen 334.  
 Woodoil 1192.  
 Woorara 910.  
*Wrightia antidysenterica*  
 1066.  
 Wütherich 904.  
 Wundbalsam 407. 545.  
 Wunderbaum 595.  
 Wunderpfeffer 534.  
 Wundschwamm 420.  
 Wundstein 482.  
 Wurmfarnwurzel 203.  
 Wurmmoos 211.  
 Wurmsamen 206.  
 Wurzelstock 5.

*Xanthogensäure* 34. 1009.  
*Xanthoproteinsäure* 433.  
*Xanthorrhiza* 652.  
*Xanthorrhoea* 210.  
*Xylocassia* 569.  
*Xyloidin* 389.  
*Xylol* 321.

Yellow wash 765.  
 Yerba del soldato 1187.

Zahnkitt 936.

Zahnlatwergen 151.  
 Zahnpaste 400.  
 Zahnpillen 1054.  
 Zahnpulver 133.  
 Zahnseife 149. 400.  
 Zahntincturen 170.  
 Zahntropfen 166. 1059.  
 Zahnwehmittel 505. 670.  
 712.  
 Zätze 202.  
 Zauberrübe 636.  
 Zeitlosensamen 842.  
 Zeltchen 138.  
 Zibethratte 418.  
 Zibethum 418.  
 Zimmt 569.  
 Zimmtöl 569.  
 Zimmtsäure 35. 321.  
*Zincum aceticum* 484.  
 — chloratum 455.  
 — cyanatum 1119.  
 — ferrocyanatum 1112.  
 — iodatum 803.  
 — lacticum 1112.  
 — muriaticum 455.  
 — oxydatum crudum 381.  
 — — purum 1112.  
 — phosphoratum 821.  
 — phosphoricum 1112.  
 — sulfocarbolicum 300.  
 — tannicum 506.  
 — sulfuricum 473.  
 — valerianicum 1112.  
*Zingiber officinale* 566.

Zinkbutter 455.  
 Zinkoxyd 381. 1112.  
 Zinksalbe 381.  
 Zinksilicat 381.  
 Zinkvitriol 473.  
 Zinkweiss 381.  
 Zinnfeile 210.  
 Zinnober 779.  
 Zinnverbindungen 1114.  
 Zipollen 538.  
 Zirbelkiefer 366.  
 Zirbelnüsse 366.  
 Zittmannsches Decoct  
 831.  
 Zittwersamen 206.  
 Zittwerwurzel 566.  
*Zostera marina* 421.  
 Zucker 343.  
 Zuckerbinsen 137.  
 Zuckerkalk 698.  
 Zuckerkügelchen 136.  
 Zuckerpaarlinge 9.  
 Zuckertinctur 343.  
 Zuckerwerksformen 136.  
 Zuckerstoffe 9.  
 Zuckersyrup 346.  
 Zuckerwasser 346.  
 Züllichauer Pflaster 394.  
 Zugmittel 44.  
 Zuggpflaster 393. 526.  
 Zugsalbe 525.  
 Zunder 420.  
 Zwiebel 5.  
 Zwiebeln 538.

Druck von Fr. Aug. Eupel in Sondershausen.





# Die Pflanzenstoffe

in  
chemischer, physiologischer, pharmacologischer und  
toxicologischer Hinsicht.

Für Aerzte, Apotheker, Chemiker und Pharmacologen

bearbeitet von

**Dr. A. Husemann,**  
weil. Prof. der Chemie an der Kantonschule  
in Chur,

**Dr. A. Hilger,**  
o. ö. Prof. an der Universität Erlangen.

und

**Dr. Theod. Husemann,**  
Prof. der Medicin an der Universität Göttingen.  
Zweite, völlig umgearbeitete Auflage.

In zwei Bänden.

Erster Band. Preis 12 M.

(Der zweite Band befindet sich unter der Presse.)

---

## Chemie der menschlichen Nahrungs- und Genussmittel.

Von

**Dr. J. König,**

Vorsteher der agriculturchemischen Versuchsstation zu Münster i. W.

Erster Theil:

Chemische Zusammensetzung der menschlichen Nahrungs-  
und Genussmittel.

Nach vorhandenen Analysen mit Angabe der Quellen zusammengestellt und berechnet.

Zweite, sehr vermehrte und verbesserte Auflage.

*Eleg. geb. Preis 9 M.*

Zweiter Theil:

Die menschlichen Nahrungs- und Genussmittel,

ihre Herstellung, Zusammensetzung und Beschaffenheit, ihre Verfälschungen und deren Nach-  
weisung. Mit einer Einleitung über die Ernährungslehre.

Zweite, sehr vermehrte und verbesserte Auflage

(befindet sich unter der Presse).

---

## Grundriss

der

## Pharmaceutischen Chemie.

Ein Leitfaden für den Unterricht

zugleich als

Handbuch zum Repetiren für Pharmaceuten und Mediciner.

Von

**Dr. Fritz Elsner,**

Apotheker.

Dritte gänzlich umgearbeitete Auflage. — Preis 6 M. — Eleg. geb. 7 M.

---

== Zu beziehen durch jede Buchhandlung. ==













